

X

i 58-2

醫家大法中

490.9  
Ix-5

No. 2144  
18158-2



肺

七牢辛肺生于兌上歛肺  
者相傳之官治節出焉

秋分之氣虛爲衛

大法卷之三

重三斤三兩六葉兩耳凡八葉○兌澤爲口與  
艮山合山澤通氣故肺金受氣於寅陽升於泰  
驅陰氣而上也至己爲六陽而乾用事也  
諸氣臟鬱皆屬肺金

脉扁鵲云如三菽之重與皮毛相得浮而短濶者  
爲陽中之陰也又云一陰三陽脉來沉濶而短  
特一浮也其時燥其性歛九月十月之氣也右  
經云秋日下膚如蟄蟲將去



富士川文庫

1349



叔和云大腸共肺爲傳送

有餘爲寒

氣人參  
藿香

生薑

半夏  
桔梗

丁香

血五味子

烏梅

木瓜

貝母

不足爲熱

氣石膏  
寒水石

知母  
乾生薑

粳米  
杏仁

桔梗  
茯苓

仲景

標麻黃湯

桂枝湯

大青龍湯

實

麻黃  
桂枝

粳米  
桂枝

厚朴  
芍藥

厚朴  
芍藥

實則泄人參  
虛則補白豆蔻

梗米  
黃芪

桑白皮  
松殼

厚朴  
阿膠

厚朴  
阿膠

厚朴  
阿膠

血梔子

黃芩

厚朴  
莖蘿

厚朴  
莖蘿

厚朴  
莖蘿

手太陰肺經濕土化五道三三末六月也

走陽明也

正手太陰之正別入淵腋少陰之前入走肺散之  
太陽上出缺盆循喉嚨復合陽明此爲六合也  
肺絡手太陰之別名曰列缺起干腕上分間並太  
陰之經直入掌中散入干魚際其病實則手銳  
掌熱虛則欠欬小便遺數取之去腕一寸半別

本三黃湯 石膏湯 即竹葉石膏湯  
又一轉標 白虎湯 本涼膈湯

實 杏仁  
虛 人參

手太陰之脈起于中焦下絡大腸還循胃口上鬲  
屬肺從肺系橫出腋下下循臑內行少陰心主  
之前下肘中循臂內上骨下廉入寸口上魚際  
循魚際出大指之端其支者從腕後直次指內  
廉出其端

是動則病肺脹滿膨脹而喘咳厚朴 陳皮 茯苓  
大淵 列缺  
缺盆中痛甚則交兩手而瞀此爲肩厥是主肺  
所生病者欬上氣喘渴煩心胸滿人參 枳殼  
少陰胞絡此肺病連及心胞與胃絡也  
膈臂內前廉痛厥掌中熱少陰胞絡此肺病連及心胞與胃絡也


氣盛有餘則肩背痛風寒汗出中風黃芩 薄荷小便  
數而欠 氣虛則肩背痛寒少氣不足以息人  
桂枝 黃芩 涼色變 冒虛 白朮  
茯苓 人參

一法金欝則泄之謂解表利小便也

痰五色 色白西方本色 色黃逆而之脾 色  
紅甚而之丙金受火囚  
為難治 色青受風之羈絆 色

黑如烟煤點順而之北方不治自愈也

白血證經云陽明司天唾白血者死白血者淺紅  
如肺色故曰血有正化對化之異



### 大腸三

一長庚大腸生於乳三連大腸傳道之官變化出焉

重二斤十二兩長二丈一尺廣四寸徑一寸半當臍右回營積一十六曲盛穀一斗水七升半肛門即魄門也一名廣腸重十二兩大八寸徑二寸大半長二尺八寸受穀九升三合八勺合之一一名迴腸

氣 白腸司有形糟粕

庚金爲降申爲生血之首  也

脉微毛而浮大腸平也濇者肺也微濇而浮大腸

病也

實

杏仁  
大黃

桃仁  
芒硝

郁李仁  
巴豆

牽牛

麻子仁

虛

阿膠  
蕷夷

白朮  
乳香

白蘆英  
荊子

白石英

瞿麥

聖栗

仲景

標

白虎湯  
犀角地黃湯

本

麻仁丸  
溫白丸  
厚陽丸  
七宣丸  
潤腸丸

又云

胃中在燥屎五六枚宜調胃承氣湯本在大腸

正手陽明之正從手循膺乳別於肩髃入柱骨下走大腸屬于肺上循喉嚨出缺盆合於陽明也

大腸絡手陽明之別名曰偏歷去腕三寸別入太陰其別者上循臂乘肩髃上曲頰偏齒其別者入耳合于宗脉實則齒齦耳聾虛則齒寒痺膈取之所別也

手陽明大腸經燥金清化九大壯二三卯二月也  
手陽明之脈起于大指次指之端外側循指上廉出合谷兩骨之間上入兩筋之中循臂上廉入肘外廉上循臑外前廉上肩出髃骨之前廉上出于柱骨之會上下入缺盆絡肺下膈屬大腸

其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中還出夾口  
交人中左之右右之左上夾鼻孔

是動則病齒痛頸腫是主津液

所生病者目黃口乾

駉駉

犀角地黃湯

喉痺

商陽

合谷

肩

前脣痛大指次指痛不可用

此半

陽明

火

湯也

曲

池氣有餘則當脉所過者熱腫虛則寒凜不復

### 大便自利

寒人參

乾薑

風防風

燥當歸

地黃

熟甘草

澤瀉

茯苓

寒硫黃

半夏

熱大黃

芒硝

滑石

年老秘虛弱不可寒熱下者

氣

杏仁

陳皮

蜜

血

桃仁

陳皮

蜜

大便秘服神芎丸大便不通小便反利不知燥濕  
之過本大腸少津液以寒燥之藥治之是以轉  
燥少服則不濟多服則亡血所以不通若用四  
物麻子杏仁之類則可經云燥則爲枯濕痢所  
以潤之

此腎燥

大便泄服理中湯小便不利大便反泄不知氣化  
之過本肺不傳化以純熟之藥治之是以轉泄  
少服則不濟多服則愈熱所以不分若以青皮

陳皮之類治之則可經云膀胱者津液之府氣化則能出矣

胃  
戊爲天地之門戶所以總係

於天胃者倉廩之官五味出焉

爲黃腸重二斤十四兩糸曲屈伸長二尺六寸大一尺五寸徑五寸盛穀二斗水一斗五升天五之氣統系於天何也戊己則序中列在乾則與巽相對東南西北之方遁甲曰戊己即天地之門戶也

脉脉若若以渭是有胃氣一脉變序四時四時皆以胃氣為本春弦夏洪秋毛冬石無胃氣皆死○緩者脾也微緩而浮者胃也

實

能食

大黃  
巴豆

芒硝  
輕粉

虛

不能食

乾姜  
神曲

白朮  
麥芽

蒼木  
大棗

生薑  
甘草

草豆蔻

標

葛根

升麻

犀角

石膏

知母

本

枳實

檳榔

厚朴

三棱

蓬木

經云

陽明雖從中治

在仲景則亦有標本

仲景

標

升麻葛根湯

標之本

調胃承氣湯

本

調胃承氣湯

本之標

白虎加人參湯

煩

陽

梔子

圓香豉

不得眠

煩

梔子

知母

桂附子

圓茱萸

更烏頭

酸木仁

桂附子

知母

知母

正足陽明之上至髀入干腹裏屬胃散之脾上通

名

胃口爲上焦主納而不出

霧不散而爲喘滿此出而不納也

中焦胃爲水穀之海

注

與脾同爲腐熟

樞不利而存留飲留不散

久存中滿不能出納也

膀胱爲下焦主出而不納

瀆不利而爲腫滿此納而不出也

此言三焦之體所以爲水穀之道路上焦如霧

中焦如樞下焦如瀆咽門至賁門

賁門至闌門分別清濁爲三焦之部

分

如何是無狀空有

於心上循咽出干口上額頤還繫目系合干陽  
明也

胃絡足陽明之別名曰豐隆去踝八寸別走大陰  
其別者循脛骨外廉上絡頭項合諸經之氣下  
絡喉嗌其病氣逆則喉痺瘡瘍實則狂癲虛則  
足不收脛枯取之所別也

胃之大絡名曰虛里貫膈絡肺出於左乳下其動  
應辰服宗脈之所會也

足陽明胃經燥金清化四觀 三三酉八月也

足陽明之脉起于鼻交頰中旁約太陽之脉下循  
鼻外入上齒中還出俠口環唇下交承漿却循  
頤後下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循  
髮際至額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨  
入缺盆下膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內  
廉下俠脅入氣街中其支者起於胃下口循腹  
裏下至氣街中而合以下髀關抵伏菟下入膝  
膕中下循脛外廉下足跗入中指內間其支者  
下膝三寸而別以下入中指外間其支者別跗

上入大指間出其端

是動則病淒淒然振寒 內庭 善伸數欠 內庭 顏

黑麥門冬

解谷

病至則惡人與火聞本音則惕然而

驚心動欲獨閉戶塞牖而處甚則欲上高而歌

棄衣而走貴響腹脹是謂髀厥是主血

衛陽

所生病者狂瘡溫溼汗出

當歸

玄參

渴唇緊

防風連翹湯

頸腫喉痺

陷谷大腹水腫

腰腹痛

桔梗湯

便連循膺乳衛股伏菟肝外羸足跗

上皆痛中指不用

此陽明連及少陽也

氣盛則身以前皆

熟其有餘於胃則消穀善飢溺色黃 調胃承氣湯

不足則身以前皆寒慄胃中寒則張滿理中湯

食利則吐謂之嘔

嘔

生薑半通湯

食入則吐謂之暴吐

湯

生薑橘皮湯

食已則吐謂之嘔吐溢

橘皮半夏湯

食久則吐謂之反胃

水煮金花丸

食再則吐謂之翻胃

易老紫沉丸

且食不能暮食則吐

食不下

脉實而滑半夏生薑大黃湯

岐伯論見陰證例

能食能便

胃實腸虛

枳實  
遺糧丸

厚朴 赤石脂

不能食不能便

胃虛腸實

白术  
枳殼

理中湯 厚朴 寄

能食不能便

胃實腸實

大黃  
枳殼

巴豆 牽牛

不能食能便

胃虛腸虛

白术  
理中湯

厚朴 枳實

扁鵲云陰氣大盛陽氣不得營也故曰格陽氣  
大盛陰氣不得營也故曰關陰陽俱盛不得相  
營故曰關格者不得盡其命而死矣

仲景云關則不得小便格則吐逆關者甚熱之  
氣格者甚寒之氣關無出之由故曰關格無入

之理故曰格

口苦

寒則補胃  
熱則泄膽

舌乾水多沉澆

四君子湯  
麥門冬飲子

五物厚腸湯

脾

三三五短已脾生干坤六斷脾  
三三者倉廩之官五味出焉

重三斤三兩扁廣三寸長五寸有散膏半斤溫  
五藏○坤土爲腹爲霧露得成數五獨立四傍  
黃庭云脾長一尺掩大倉與胃同熟水穀脾本  
不動而動於□如鋤耰耕耨同四散之動連及  
其脾體本坤靜

諸濕腫滿皆屬脾土

脉扁鵲云九菽之重與肌肉相得中州有陰陽戊  
火從心肺己土從腎肝混而一之府藏各從上

下又云脾者中州也其平和不可得而見衰乃  
見爾來如雀之啄如水之下漏是脾之衰也又  
云一陰二陽脉來長而沉濇脾也其時濕其性

緩六月八月之氣也

右開

叔和云阿阿緩若春楊柳此是脾家居四季一  
脉變爲四時胃與此同又云脾胃相連五穀消  
實有餘爲濕氣茯苓 乾薑 甘草 人參 陳皮 青皮  
血白朮 茄木 中桂 吴茱萸

虛不足爲燥

氣人參 黃芪 沙參 益智膠飴  
血木瓜 烏梅 大棗 白芍藥 塵仁 麴

鹽

### 仲景

標 不渴脉浮桂枝湯

濕勝則濡泄理中湯

本渴欲飲湯四逆湯

亡液則燥渴理中丸

熱治則近於火寒治則近於水宜溫治可也在

裏同法

正足太陰之正別上至髀合於陽明與別俱行上  
結于咽貫舌中此爲三合也

脾絡足太陽之別名曰公孫去本節後之一寸別  
走陽明其別者入絡腸胃厥氣上逆則霍亂實  
則腹中切痛虛者鼓脹之所別也

脾之大絡名曰大包出淵液下三寸布胷脇實則  
身盡痛虛則百節盡皆縱此脉若羅絡之血者  
皆取之脾之大絡脉也

足太陰脾經濕土化五臨三三丑十二月也

足太陰之脉起于大指之端循指內側白肉際過  
核骨後上內踝前廉上腨內循骻骨後交出缺  
陰之前上循膝股內前廉入腹屬脾絡胃上膈  
俠咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注  
心中

是動則病舌本強食則嘔胃脘痛芍藥 半夏

太陰絡胃散痛

腹脹善噫得後與氣則快然而

灸公孫三壯

衰芍藥

木香

沉香

身體皆重是主脾

白朮

灸木瓜 茄子

灸三陰交

所生病者舌本痛體不能動搖灸三陰交

食不下生薑

白朮煩心心下急痛

桂枝寒瘞瘻瘕泄理中湯水

閉黃疽好卧不能食肉唇青強立股膝肉痛

厥足大指不用

此痺病連及心胃也

一法土鬱則棄之謂下之令無壅礙也

腹脹滿

虛

芍藥心腹痛

厚朴黃芩

人參大黃

寒

小茴香玄胡索

脅腹痛

白朮

小腹痛

婦人四物加川芎

寒

小茴香

玄胡索

素問

飧泄

清氣在下則食不化

胃泄穀不化

承氣湯白朮調中湯

洞泄

腸滑不止

脾泄

脹滿

注下食則嘔逆

建中湯

寒中

大腸泄

食已窘迫大便

乾薑

厚朴

寒瀉

濕淫於內所勝

小腹痛

小腸泄

小腹痛

氣氣湯

大瘕泄

裏急後重數至

固而不能便

中痛

濕燥

脫肛

濕熱便膿血

截毒下血

有鮮血不可下宜解化

風濕

溏泄

鶯泄

如鴨之後寒泄也

天麻附子

乾薑

吳茱萸

仲景云虛寒相搏而爲腸鳴○叔和云濕多成

五泄腸走若雷奔

治濕不利小便非其治也

心三

三虛丁心生於離中虛心者君主之官神明出焉

夏至之氣同爲榮

重十二兩中有七孔三毛盛精汁三合○離火爲腎主血之原故降中虛一陰也

經云君主之官神明出焉故主明則下安國乃大昌主不明則十二官危殆國則亡矣

諸痛痒瘡瘍皆屬心火

脉扁鵲云如六菽之重與血脉相得浮而滑太陽中之陽本體實大隱而不出有若沉之意滑也又云一陰三陽脈來浮而長時一沉也其時熟

其性軟三月四月之氣也

叔和云心與小腸爲受盛

大法夏脉大三焦條下以君火與相火同治

有餘爲熱

氣

牛黃

天竺黃

龍腦

黃連

不足爲寒

血

人參

茯苓

當歸

乾薑

心盛則生熱

子能令母實

桂心

生地黃

黃連

心虛則熟收內

母能令子虛

桂心

熟地黃

大黃

殊砂

標 黃連

子能令母實

實則泄其子

桂心

黃連

殊砂

本 地黃

生者自病丁與丙治同

通理二穴在腕後一寸熱疾卒心中懊憹數欠

頻伸悲

肺恐

腎也

目眩

肝頭痛而赤

而熱心慄時

臂膚痛實則股腫

脾也

虛則不能言心

也苦嘔喉痺

脾也

少氣遺溺

三焦

針入三分可灸三壯心有五

系通絡五藏故自病五藏皆病穴因以名通理

正手少陰之正別入於腕腋兩筋之間屬於心上

走喉嚨出干面合目內眞此爲四合也

心絡手少陰之別名曰通理去腕一寸半別而上

行循經入于心中繫舌本屬目系其實則走膈

虛則不能言取之掌後一寸別走太陽也  
手少陰心經君火熟化三姤三三午五月也  
手少陰之脉起于心中出屬心系下膈絡小腸其  
支者從心系上俠咽繫目系其直者復從心系  
却上肺下出腋下下循臑內後廉行太陰心主  
之後下肘內循臂內後廉抵掌後銳骨之端入  
掌內後廉循小指之內出其端

是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主

心人參

麥門冬

天門冬

咽痛

神門七壯

大

枸杞子

五味子

如麥大

所生病者目黃 脾入肺 炙青靈  
膾臂內後廉痛 胞絡 条通  
厥掌中熱痛 胞絡  
心悸 汗多 半夏 桂枝 少陰  
痞悶 實 陰証 枳實 寒 白术 雜病  
痞心 下有水 下無水  
下之心下痞 雜病 假寒  
下之腸下痛 傷寒  
一法治 實 芍藥 柴胡  
一法火鬱則發之謂汗之令疎散也

小腸三六□丙小腸生干良覆枕小  
腸者受盛之官物出焉

重二斤十四兩長三丈二尺廣一寸半徑八分  
分之少半左迴疊積十六曲盛穀二斗四升水  
六升三合合之太半

血赤腸司無形溺以下言之大小二便皆有  
數也以前後言之溺則無形也以其與壬相通  
故曰司溺本則食飲混而居下入于大腸也司  
無形但言其標而不言其本耳

丙與三焦丁與心胞爲四主假令用蒼木燥胃  
丙火自生子能令

母實  
也

脉微鈎而浮小腸平也大者心也微大而長小腸

病也

實

赤小豆  
海金沙

茯苓  
琥珀

燈草  
木通

車前子  
生地黃

扁豆  
瞿麥

虛

白茯苓  
白龍骨

茜草  
赤石脂

粳米  
治瀉而便膿血

白芍藥  
白芍藥

錢仲陽廣仲景

標

茯苓  
石膏

本尊赤散

正手太陽之正指地別于肩解入腋走心繫小腸

也

小腸絡手太陽之別名曰支正上腕五寸內注少陰其別者上走肘絡有髓實則筋弛肘廢虛則生肱小者如指痂瘀之所別也

手太陽小腸經寒水化火三月也

手太陽之脉起于小指之端循於外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循脣外後廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆向腋絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目銳眥却入耳中其支者別頰上頸

抵鼻至目內皆斜絡于額

是動則病瞤痛頸腫不可以顧肩似拔膾似折

所生病者耳聾目黃頸頸肩腰肘臂外後

是主腋液

少澤  
養充

廉痛

此半太陽連  
及陽明也

小便自利

下虛則寒  
畜血則熱

求責餘症

諸症皆恐不得為寒  
諸症皆寒不得為熱

小便秘

乙

通草  
橘草  
扁豆

芍藥辛

蒲黃  
豐麥  
梔子

旋覆花

苦黃  
陳皮

胞

不脅

遺瀉癃閉

足一厥陰  
足太陽

膀胱不約

澤泻

芍藥

紫苑  
梔子  
陳皮

胞

沉脅

仲景

標 麻黃 桂枝 黃芩 白朮  
防風 桂枝 防己 蒼朮

膀胱艮山爲午爲背膀胱者州都之三官津液藏焉氣化則能出矣

重九兩二銖縱廣九寸盛溺九升九合爲黑腸  
有上口無下口

脉微石而滑膀胱平也沉者腎也微沉而忽似浮  
者膀胱病也浮之損小沉之實大爲陰盛陽虛  
沉之損小浮之實大爲陽盛陰虛

實

澤泻

茯苓

滑石

牽牛

旋覆花

虛 苦梗

山茱萸

本五苓散 滑石

仲景加減三十七法

正足太陽之正別走于膀胱中其一道下尻五寸別入于膀胱屬于膀胱散之腎循脊當心入散直者從脊上出干項復屬于太陽此為一經也

膀胱絡足太陽之別名曰飛陽去踝七寸別走少陽實則鼻塞頭昏痛虛則羸弱取之所別也

足太陽膀胱經寒水化一剝 二二二 戊九月也

足太陽之脈起于目內眞上額交顙上其支者從

顙至耳上角其直者從顙入絡腦還出別項下循肩膊內夾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下會於後陰下貫臀入臍中其支者從腰內左右別下貫脾過髀樞循髀外後廉下合膕中以下貫腸內出外踝之後循京骨至小指外側

是動則病頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲膕如結腸如裂是庠蹊厥是主筋

滑石 獨活  
至陰 通谷 股骨

所生病者痔瘻黃芩當歸在癩疾頭顱頂痛目黃淚

出川芎

陽明少陰太陽之脉

升麻項背

黃連

地黃牡丹皮

芍藥項背

腰尻臍脇脚皆痛小指不用

明也

嵩岑京骨

經云膀胱者津液之府氣化則能出矣又云肺氣通調水道下輸膀胱又云肝膽同歸津液府所以太陽厥陰同參一治又云膀胱腎合為津慶此腎主大小二便難也

一人病虛服附子熟藥小便悶諸藥不效惟得

黃連黃芩則效

一人服內托藥大便大泄小便悶或用五苓散

悶與陳皮茯苓氣化則效

胞

血下口滲

陳皮

茯苓

沈香

枳壳

經云胞遺熱於膀胱則厚遺溺閉癃又云膀胱內痛按之若沃以湯淡於小便則厚胞痺注云胞內居之○仲景云膀胱者胞之室也胞居膀胱之內所以為十二藏○經云肝膽同歸津液府巨陽總領甲乙也

目服藥則神方犀角丸點藥則五輪圓明膏洗藥

則桑皮滑石散暴赤加黃連 差明加當歸 痛加防風  
久赤加乾薑 乾渴加芍藥

能遠眎不能近眎 有其火無其水補腎六竅補腎

能近眎不能遠眎 有其水無其火神心益隂補心

近眎不能遠眎空心服四物湯加澤瀉芩桂牡鴟

目痛不能久眎鼻頭目赤 血勝則痛

臨卧服五苓丸加甘菊花竇家花此通手足少陰

頭風溫川芎

頭汗風脈爲熱 陰脈爲寒

汗傷寒脉緊麻黃葱豉斂之汗出於衛

傷寒脉緩白朮桂枝止之汗出於榮

往來寒熱柴胡連翹和之汗出千少陽

體若燔炭地骨皮秦艽解之汗出於三焦

厥而抑鬱柴胡麻黃梔之汗出於血

熱聚於胃大黃芒硝下之汗出於足陽明

陰毒大汗附子乾薑溫之汗出於三陽

盜汗虛黃杏連翹湯

實三黃連翹湯

經云寢汗憎風注云俗呼爲盜汗即賊汗也睡  
則有覺則無

小便不通非小腸膀胱厥陰也強力房事過忍小  
便故也

治胞轉病鹽一斤隔紙攤臍上熨斗熨令通

腎二三四促癸腎生於坎中滿腎者作強之官伎巧出焉冬至之氣同

分二枚重一斤一兩○坎水爲耳爲生氣之原所能升坎中滿也性心念者元始之氣爲生命之門精血所自生其用在三焦包絡即天地之所由生也○九天生神章云渾結元始王而腎中之真陽也煉而至頂爲純陽混合歸元一也與肝魂益之

諸寒收引皆屬腎水

脉大法曰冬日在骨蟄蟲固蜜君子居室○扁鵲

云按之至骨舉指來疾如以盂覆水而出相似  
又云按濡舉疾陰中之陰一陰一陽脉來沉而  
滑其時寒其性堅十月十一月十二月之氣也

左尺

叔和云膀胱腎合爲津液

有餘爲寒

氣破故紙天雄附子陽起石山茱萸

不足爲熱

血氣山藥牡礪

腎溫則實

澤鴻車前子

猪苓滑石

盛則寒附子肉桂

腎虛則寒動於中

肉蓯蓉破故紙

虛則燥

天門冬生地黃礪

仲景

腎虛則寒動於中

車前子

猪苓滑石

虛則燥當歸

生地黃礪

標

麻黃附子細辛湯  
麻黃附子甘草湯

本熟

大承氣湯  
四逆湯

細辛味辛溫熟以潤肉寒主頭痛腦痛百節拘  
牽風濕痺痛汗不出血不行所以主足少陰連  
及足厥陰也

厚朴枳實雖治大實大滿本治傷寒頭痛大風  
在皮與大黃芒硝同用白膏而下無所通與酒  
浸大黃同爲佐使仲景之法可謂極矣

標之本猪苓湯

本之標

白虎湯  
通脈四逆湯

姜附湯

本之本承氣湯

桃仁承氣湯

抵當湯

抵當丸

咽物無妨 咽物無妨 不腫為寒 炙耳草湯  
半夏乾桔湯 桂 茶酒

紫河車散 磬石散

苦酒

內經喉氣通於天 咽氣通於地 傷於風上先受之傷於濕下先受之

命門 有餘 生地黃 黃芩 砂砂

寒水石

知母

川烏 天雄

陽起石

烏喙

正足少陰之正至腋中別走太陽而合上至脅當十四觀出屬帶脉直者繫舌本復出干項合于太陽此為一合成以諸陰之別皆為正也

腎絡足少陽之別名曰大鍾當踝後繞跟別走大陽其別者並經上走于心胞下外貫腰脊其病氣逆則煩悶實則癃閉虛則腰痛取之所別也足少陰腎經君火熱化四復三三子十一月也足少陰之脉起于小指之下斜趨足心出然谷之下循內踝之後別入眼中以上肺內出腋中內廉上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨夾舌本其支者從肺出絡心主腎中

是動則病飢而不欲食

心懸若飢  
狀心病

面赤如炭色

然谷咳嗽則有血喉鳴而喘

肺病

桂

梔子  
黃芩  
坐

而欲起目瞓瞓無所見

熟地黃  
防風

氣不足則善恐

心惕惕如人將捕之是爲腎厥是主腎遠忘

所生病口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛

五味子  
人參

甘草  
大絡桔便煩心心痛

梔子  
黃疸陽澼  
黃芩  
春

股內後廉痛

肺  
膀胱  
腰脅也

當歸天門冬

此腎

一法欒則折之謂抑之制其衝逆也過者折之

以其畏也

過大過也大過者以其味渾之以鹹  
潤腎酸潤肝辛潤肺苦潤心甘潤脾

馮爲畏也

益火之源  
烏附  
使涌有節

消渴

調五味子

人參

寒  
壯水之主使  
渴不思飲

蛤蚧

菖蒲  
內芩  
根

消中

調五味子

桂枝

附子  
益火消陰

寒  
人參  
山茱萸

消渴

菖蒲  
內芩  
根

消渴

調五味子

桂枝

附子  
壯水制陽

寒  
黃連

精滑

黃芩  
天麻

消渴

調五味子

桂枝

附子  
壯水制陽

仲景云濡脉男子得之失精亡血婦人得之半產漏下○叔和云脉濡精頻涌恍惚夢魂多

陰囊濕痒

白附子  
自蒺藜

卷沽  
黃芩

吳茱萸  
盤龍子  
薄荷

前四味爲細末湯酒任調空心下加

癩疝有小腸氣有膀胱氣有腎餘氣所生的是何

經又經云太陰受寒氣聚爲疝又云控睾又云

控卯

予嘗治脫精不止者以瀝劑收之則不能收  
不能止不若鴻心火若鴻心火不能止之不若  
用升陽之劑如風藥之類止之非此能止之也  
舉其氣上而不下也二法可選用

又年老人虛秘是下亡津液也以升麻湯舉之  
陽升陰降是地氣上爲雲天氣下爲雨也所以  
通利

心胞絡三

吳風爲股一名相  
大二名手厥陰

扁鵲云手少陰與心主爲別脉心主與三焦爲表裏俱有名而無形

脉十八難云手心主少陽火生足太陰陽明土右尺巳午即其位也

實

犀角砂

牡丹皮  
生地黃

虛

當歸  
沒藥

川芎  
血竭

仲景

標

渾心湯

犀角地黃湯

本

桃仁

氣湯

正手心之正別下淤脰三寸入胸中別屬三焦出

循喉嚨出耳後合少陽完骨之下此爲五金也  
心胞絡手心主之別名曰內關去腕二寸出于兩  
筋之間循經以上繫于心胞絡心系氣實則心  
痛虛則爲煩心取之兩筋間也

手厥陰心包絡風木風化八軌三三已四月也  
手厥陰之脉起于胸中出屬心包絡下膈歷絡三  
焦其支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下下循  
脰內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之  
間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小

指次指出其端此即合少陽同為尊  
如天地也虛不可補  
是動則病手心熱臂肘摩急腋腫甚則胸脇支  
滿心中憺憺大動柴胡根實而赤目黃喜矣不休是  
主脉

所生病者煩心心痛掌中熱三黃湯  
生地黃  
當歸危子 蓼

此心胞絡痛連  
及少陽少陰也

三焦

三焦者決瀆之  
官水道出焉

乾爲首而復下西北戌爲天之門也又爲長夏  
濕土爲用地二生火君火也君火以名相火以  
位君主無爲而不生歲運相火成之若原其手  
左尺與左寸相對地在天上矣此即言其用也  
而寸復在下金爲體也是戌旁矣至三焦之經  
寄於手而能高於首而復能下之左右前後無  
所不同天行健動而不息亦用之象也命門所  
以居尺者體也原也

頭至心爲上焦 心至臍爲中焦 脘至足爲下焦

寸

關

尺

此三焦之上下也 所以爲三部

皮毛標爲上焦 胸膈膻爲中焦 脾藏本爲下焦

浮

中

沉

此三焦之内外也 所以爲九候

包羅天地者元氣也 主持天地者亦元氣也 易曰 天地設位易行乎其中矣 又曰 神則無方 易則無體 仰之彌高 鑽之彌堅 謹之在前 忽然在

後 故能不言而四時行百物生性與天道不可得而聞也 無聲之可聽 無臭之可聞 信矣 然可以形者隨體應見 輕於面 益於背 施於四體 安得不見此色 脉治之大綱也

脉內經云 夏日濇濇半萬物若有餘○扁鵲云 一陰一陽脉浮而濇 三焦其時暑 其性柔 五月六月之氣也右又云 三焦無狀空有名

仲景

上焦不歸噫而吞酸

中焦不歸不能消穀引食 樞衛皆虛無衛守只微淡  
下焦不歸則遺溺

扁鵲脉

上焦如霧不敢而喘滿 中焦如樞不利而留飲中滿  
下焦如瀆不利而腫滿

頭為天之天 鼻為天之人 肺為天之地  
故上部之藥清辛涼肺也 中州之藥甘溫平脾  
也 下部之藥鹹溫熟腎也

實麻黃 玄參 桔子 黃芩 連翹

虛桂附子 疏黃 肉蓯蓉 陽起石 破故紙  
大熟 石膏 大寒 肉桂

仲景

標有汗

無汗

桂枝

黃芪

白朮

石膏

地骨皮

金沸草

荆芥

薄荷

本

益智

肉桂

黃芪

熟地黃

正手少陽之正指天別于顛入于缺盆下走三焦

散于胸中也

三焦絡手太陽之別名曰外關去腕二寸外繞臂  
注胸中合心主病實則肘癱虛則不收取之所

別也

手少陽三焦經相火化七否 三三申七月也

手少陽之脉起小指次指之端上出而指之間循手表腕出臂外而骨之間上貫肘循臑外上肩而交出足少陽之後入缺盆交膻中散絡心包下膈偏屬三焦其支者從膻中上出缺盆上項俠耳後直上出耳上角以屈下頰至頤其支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰至目眚

是動則病耳聾煇煇焞焞

柴胡 連翹

嗌腫喉

痺 輕紫河車 白僵蚕

是主氣

所生病者汗出

桂枝

黃芪目銳背痛

黃連 川芎

頰痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指之用

此手陽明

連及足少陽 痛也  
支溝 外開

經既言五藏之本又言脾胃大小二腸膀胱三焦爲倉廩之本營之所居也又云三焦者水穀之道路故云倉廩也

有天地然後萬物生焉天地之間者爲萬物故

受之以屯屯者盈也屯者物之始生也自雲郭氏曰三才之序先天地而後萬物萬物盈天地之間人居萬物之中聖人之道周萬物而濟天下則萬物復附于聖人故聖人與天地相似是以萬物盈天地聖人之道亦盈天地初盡則聖人之道盡孟子所謂塞乎天地之間者也

膽三八動甲膽生於巽下短膽者中正之官決斷出焉

在肝之短葉間重三兩三銖盛精汁二合一名相火為少陽即嫩陽也故能生氣經云少火生氣為青腸

甲木為升寅為生氣之首金也

脉微弦而浮膽平也急者肝也微急而浮者膽病也

實 柴胡 連翹 黃連 秦艽

草龍膽氣味苦寒能泄熱

虛 人參 當歸 細辛 熟地黃  
酸棗仁 實多睡生用茶調下虛少眠熟用竹葉湯下

經云少陽雖從中治在仲景傷寒則有標本

仲景

標 柴胡

標之本

柴胡葛根湯

本 粕萎根

本之本

大柴胡湯

正足少陽之正繞脾入于毛際合于厥陰別者入季脇之間循胸裏屬膽散之上肝貫心以上俠咽出頤領中散于面係目系合玄陽于外皆也膽絡足少陽之別名曰光明去牒五寸別走厥陰下絡足跗實則厥虛則痿躉生不能起取之所

別也

足少陽膽經相火 化二泰三宣正月也

足少陽之脉起于目銳眎上抵頭角下耳後循頸行手少陽之脉前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眎後其支者別目銳眎下入耳中迎合少陽抵干竄下加頰車下頸合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循腸裏出氣街遶毛際橫入髀厥中其直者從缺盆下腋循胸中過季脇下合髀厥中

以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵  
絕骨之端下出外踝之前循足跗上入小指次  
指之間其支者別跗上入大指之間循大指歧  
內出其端貫爪甲出三毛

是動則病口苦善太息 心腸痛不能反側  
甚則面微有虛體無膏澤藁本白芷足外反熱是為  
陰厥是主骨

所生病者頭痛額痛目銳背痛黃連芎藭柴胡  
陽輔臨泣陽池  
缺盆中腫痛腋下腫痛馬刀挾癰連翹湯 汗出

振寒瘡小柴胡湯加桂胸中腸肋髀膝外至脛絕骨外  
踝前及諸節皆痛小指次指不用

此少陽連及少陰陽明也

小柴胡湯

身熱欲衣被者

熱在皮毛寒在骨髓

身寒欲去被者

寒在皮毛熱在骨髓

氣中之火 平旦潮熱 肺氣主之

白虎湯 光明穴

血中之火 日晡潮熱 腎氣主之

地骨皮湯光明穴

辨肌熱潮作以手捫之上至頭中至胸下至足

心按之熱須臾與不病人相似者熱在皮毛也

按之熟久之與初相似者熟在肌肉也按之久且重熟愈甚於初者熟在骨髓也

皮毛者施子  
黃芩 皮寒熱者鼻橐

肌肉者

黃連  
芍藥

肌寒熱者唇橐 寒者總用桂枝

骨髓者

知母  
黃柏

骨寒熱者齒橐

察其在氣在血有汗無汗咸佐以柴胡地骨皮牡丹皮若大實者大黃下之

或人病正月往來寒熱予曰大壯之氣或曰正為寅泰也陰陽乃天地之象所以往來予曰是

則然矣若以寅為往來之象卯之北純陰之方安得寒熱大壯雖四陽實居正卯卯者分之氣也天度順行南之則熱逆行北之則寒所以往來不定也若以寅為北之陰非相火也以火言之南方也嘗居卯之前辰則卯之北為陰為太陽何為泰之陰陽各半也寅不只在卯之前亦居卯之上既居正卯所以能往來也經云分二氣異說正卯所以不言泰而只言大壯也寅子本居卯後而復居卯前而又居卯上若言相

火前來出地之皮是以寅居卯之下噫天地陰  
陽錯綜如此豈輕議哉

肝三

五結乙肝生干震仰孟肝者將軍之官謀慮出平

春分之氣實

叔和云厚榮

重四斤四兩左三葉右四葉凡七葉○震雷為

足即東海也

諸風掉眩皆屬肝木

脉內經云春日浮浮如遊魚之在波○扁鵲曰十

二菽之重與筋平牢而長陰中之陽又云一陰

二陽脉來沉濇滑而長其時風其性動正月二

月之氣也

叔和云肝膽同歸津液腑能通眼目為清淨此

震前良後先士而以甲乙太陽厥陰同一治也

有餘則聚聚則宜通

氣 薄荷 荆芥 防風 元活 葛子  
氣 雄黃 皂莢 丹参 獨活 莪藶  
血 紅花 三棱 廣木 蕉鯉甲  
血 鱉甲 姜蟲 水蛭

不足則燥燥則宜潤

氣 柏子仁 密蒙花 吳茱萸  
氣 甘菊花 杏仁子 天麻  
血 當歸 川芎 桂枝 牡仲 牛膝 白芍藥 熟地黃  
血 血竭 没藥 紅花 桃仁 細辛 槐莢 兔絲子  
風實則泄 荊活 獨活 細辛 桃仁 大黃 牛膝 丹参 丁首烏  
風虛則補 白花蛇 姜黃 蟬蛻 天麻 伸筋 南星  
風虛則補 白僵蚕 杜仲 蟬蛻 天麻 伸筋 南星  
風虛則補 白僵蚕 杜仲 蟬蛻 天麻 伸筋 南星

仲景

標初病渴欲飲者少少與之則愈此雖在裏即是標當歸四逆湯  
本煩滿濡縮脉沉滑脈力皆倍者當下之此即  
大小二便俱秘難用承氣湯弗若四物湯加

標為標當歸四逆湯或吳茱萸湯渴欲飲者少少與之則愈此雖在裏即是標當歸四逆湯或吳茱萸湯

大黃尤嘉胸滿囊縮目下不治自愈厥陰

本無下証大槩言傷寒傳入裏可下之

又一轉厥陰証

標亦系初病

當熟

無汗

麻黃  
葱薑

旋覆花  
荳木

桂枝  
白朮

地骨皮  
黃芩

汗之而發

麻黃

清涼以為汗 細辛

和之而汗

柴胡

下之而汗 大黃

吐之而汗

瓜蒂  
防風

正足厥陰之正別跗上至毛際合于少陰與別俱行此為二合也

肝絡足厥陰之別名曰蠡溝去內踝五寸別走少陽其別者循脛上羣結于莖其病氣逆則羣腫卒疝實則挺長虛則暴痺取之所別也

足厥陰肝經風木化三坤

三三亥十月也

足厥陰之脉起于大指聚毛之際上循足跗上廉去內踝一寸上踝八寸交出太陰之後上膕內廉循股陰入毛中環陰氣抵少腹夾胃屬肝經膕上貫膈布腸肋循喉嚨之後上入頸頸連日系上出額與督脈會于顛其支者從目系下頰

裹環唇內其支者復從肝別貫膈上注肺

是病則病腰痛不可以俛仰

溫六丸  
加羌活

丈夫癲疝

婦人小腹腫

酒真當歸丸

其者嗌乾面塵脫色是痔

所生病者胸滿嘔逆

大衛洞泄孤疝

脾或陰挺

出此肝病連及脾

遺溺癃閉

四物澤渾湯

胃肺膽腎也  
曲泉  
蠡溝

一法木齧則達之謂吐之令條達也

眩運眩為目黑運脊頭旋僵仆

仰曰僵俯曰仆

素問 癲多喜

難經 癲

意不樂  
僵仆

狂

高賢辨智責  
倨妄笑歡樂

多怒

癇

寒

妙香散

五生丸

二經不同何也經云母腹中因驚而得長後有激而發

一法以小蒸餅一枚內白礬作一大塊蒸熟乘熱去皮可丸入臍粉秤一錢量虛實加減丸梧桐大每服二十九隨經下

偏枯汗出偏沮使人偏枯

男中左女中右是其從也

陰蹻 照海 陽陵泉

奇經八脉

二維

陽維陰維者維絡於身溢畜不能環流灌漑諸經者也十二大經行如總走如蟻涓涓不息合於天度奇經則不然行若風得息走如奔馬至暴至速天度不能拘神宇之江河是也此其乾坤之脉絡也楊氏曰維者維持之義也此脉爲諸脉之經維故曰維也。

陽維起于諸陽之會陰維起于諸陰之交人脉

隆盛入于八脉而不環周故十二經亦不能拘其受邪氣畜則為腫熱故砭射之也潔古云諸陽皆會於頭諸陰皆會于足

陽維於陽陰維於陰若陰陽不相維則悵然失志溶溶不能自收持潔古云衛為陽榮為陰陽維為陰陽維為陰陰陽相維則榮衛和諧也陰陽不相維則榮衛不諧則悵然失志悵者快也失為悲也溶溶者慢也何以知之仲景云病常自汗是衛氣不與榮血諧也

### 陽維起于諸陽之會

為病苦寒熱 桂枝 黃芪 芍藥

仲景云病常自汗榮衛不相和諧宜桂枝湯又云服桂枝反煩不解先刺風池風府却與桂枝湯愈此二穴陽維之會也潔古云謂桂枝湯後其證尚自汗發熱惡寒脉尚寸浮尺弱而反煩為邪痺在陽維故先針此二穴非陽維經太陽經穴在項後髮際大筋外廩陷中名天柱穴不針此為桂枝已主太陽病故是也

陰維起於諸陰之交

爲病苦心痛

潔古云其治在足少陽三陰交仲景太陰證則理中湯少陰證則四逆湯厥陰證則當歸四逆

吳茱萸湯

## 二蹻

甲乙經問曰蹻脉安起安止何氣營也對曰蹻脉者少陰之別起于然谷之後上內踝之上直上循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出人迎之

前入頸屬內皆合于太陽陽蹻而上行氣井相還則為濡目氣不營則目不合問曰氣獨行五藏不營六府何也對曰氣之不得無行也如水之流如日月之行不休故陰脉營其藏而陽脉營其府如環之無端莫知其紀終而復如其流溢之氣內溉藏府外濡腠理問曰蹻脉有陰陽何者當其數對曰男子數其陽女子數其陰當數者為經不當數者為絡也  
陽蹻與陰蹻氣井而相連左右任脈與督脈水

溝而相接前後也

潔古云陽蹻者肌肉之上陽脈所行謂之陽蹻通貫六府蹻者捷也主持諸表其名為陽蹻之絡陰蹻者肌肉之下陰脈所行謂之陰蹻通貫五臟主持諸裏其名為陰蹻之絡楊氏曰蹻者捷疾也言此脉是人行走之機要動走之所由故名蹻脉焉

陽蹻起于跟中循外踝上行入風池

諸陰脈盛散入陽蹻則為

病陽

爲病陰緩而陽急陽急則狂走目不昧○潔古云裏和表病爲陰不病而陽病陽病則寒其治風池風府若在陽表當汗若在陰裏當下  
陰蹻起于跟中循內踝上行至咽隴交貫循脉諸陰脉盛散入陰蹻則為陰病

爲病陽緩而陰急陰急則厥足脰直五絡不通潔古云表和裏病總爲陽不病而陰病陰病則熱其治可灸照海陽陵泉

任衡

甲乙經云衝脈任脈起于胞中上循背裏為經  
絡之海其浮而外者循腹上行會于咽喉別而  
絡唇口氣盛則克脣熱肉血獨盛則滲灌皮  
膚生毛今婦人之生有餘於氣不足於血以其  
月下數脫血任衝並傷故也任衝之交脉不營  
其口唇故髡鬚不生

任脈起于中極之下以上毛際循腹裏上關元至  
咽喉上顧循面入目

按雜經甲乙經無上  
循顧而入目六字

楊氏曰任者妊也此是人之生養之本故曰任

脉中極之下○潔古云中極之下曲骨穴也在  
於脐下四寸以名氣之源循腹裏上至關元衝  
干咽喉天突穴也此陰脉之海也

任絡任衝之別名曰尾翳下鳩尾散於腹竇則腹  
皮痛虛則痒搔取之所別也

爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚

雜經作任  
結男子為七疝  
女子為瘕聚

潔古酒食當歸丸仲景若傷寒當病咽喉不利  
及水腫之證五苓散主之若不已可參中庭穴

膻中中腕

衝脈起于氣街並少陰之經俠臍上行至胸中而散此脉與原難經作起于氣街並足陰明之經  
虞氏曰衝街之義俱通况少陰之經俠臍各五分陽明之經俠臍左右合二寸氣衝又是陽明脈氣所發如此推之則衝脈自起氣衝在陽明少陰二經之內俠臍上行其理明矣○楊氏曰衝者通也言此脉下至於足上至於頭通受十二經之氣血故曰衝焉為十二經之海○王氏

由氣衝在臍腹下橫骨兩端鼠鼷上一寸腹部

第二行與足厥陰合

為病氣逆而裏急

陳皮 黃芩 白朮 穖拂 吴茱萸

仲景傷寒身熱目痛鼻乾不得卧病在足陽明經也承氣湯下之若不已當灸氣街立已

內經云治療獨取陽明者何對曰陽明者五臟六府之海主關宗筋主膏束骨而

也衝脈者經脉之海也主滲灌谿谷與陽明合于宗筋陰陽總宗筋之會會于氣街而陽明為

千宗筋陰陽總宗筋之會會于氣街而陽明為

之長皆屬于帶脈而絡於督脈故陽明虛則宗筋縱帶脉不引故足痿不用也又問曰治之柰何答曰各補其榮而通其俞調其虛實和其逆順筋脉骨肉各以其實受月則病已

督脈起于小腹以下骨中央女子入繫艇孔其孔溺孔之端也其絡循陰器合募間繞募後別繞脣至少陰與巨陽中絡者合少陰上股內後廉貫脊屬腎與太陽起干目內眞上額交顴上入絡腦還出別下項循肩髀內夾脊抵腰中入循

膂絡督其男子循莖下至募與女子等其小腹直上者貫脊中央上貫心入喉上頤環唇上繫雨目之下中央此生疾從小腹上衝心而痛下得前後爲衝疝其女子不孕癃閉遺溺嗌乾督脈生病治督脈治在骨上謂腰橫骨上髮際中曲骨定也甚者在臍下營謂臍下一寸陰交穴也

難經云起干下極之俞並於脊裏上至風府入屬於腦厥陰與此同會于顱○楊氏曰督之言郵也是人陽脉之都網人脉比於水故呂氏曰陽脉之海

下極者長強也○潔古云下極者尾骶骨也循脊裏入中額中者乃陽明脉之海也

督絡督脉之別名曰長強俠膂上項散頭上下當肩脾左右別走太陽入貫督實則脊強虛則頸重高搖之俠脊之有過者取之所別也

爲病脊強而欣

冕活附子

獨善大黃

荆芥黃連

防風

細辛藁本

鳥頭道人頭

仲景云脊強者五痓之總名其證卒口噤背反

張而瘓癰諸藥不已

可灸身在穴大願陶道

帶脉起于季脇回身一周

管顧

諸陽

使不妄行如

人腰之帶而前垂

故曰

帶婦人惡露隨帶  
臙而下故曰帶下

楊氏曰帶之言束也言總束諸脉使得調柔也季脇在肋下下接於脊之間是也迴繞也繞身一周猶如束帶焉潔古云季脇者章門穴也爲病腹滿腰溶溶如坐水中川芎艾葉當歸地黃芍藥阿膠白朮龍骨

甲乙經作帶脉爲疾腰腹縱容如囊水狀○一云帶之爲病太陰所生以其脾散膏溫藏藏榮也仲景傷寒云大病瘥後腰以下有水氣牡礪澤

瀉散主之功不可灸章門穴

內經云邪客於太陰之絡令人腰痛引小腹控  
眇不可以養息眇謂李腸下空軟處○一云小兒癩疝  
可灸章門穴三壯愈以其與帶自行於厥陰之  
分而太陰主之

血崩久而成枯

二者皆益

崩者淡劑收

芍藥、白朮、艾葉、黃芩

血閉久而成竭

四物湯閉者破劑通

三候紅花、牛膝、棗仁

黃芩、桃仁、桂枝

初治 四物紅藍花調肉桂黃芪

破血三治 次治 四物

紅藍花調鯁鮀甲、桃仁、桂枝、童子小便與酒煮煎尤佳

末治 四物紅藍花調易老沒藥散

四物湯春加川芎風勝也夏加芍藥火勝也秋  
加當歸金勝也冬旺水勝又加地黃以益之若  
血旺必無服四物之理以其血衰而煩以此補  
之故用加地黃也又既可服四物知其血衰之  
甚也故用加之

扁鵲以陰陽二蹠為二絡玄晏以任督二脈為  
二絡二者孰是絡有十二以應十二經餘三絡  
即陰陽二蹠與脾之大絡有十五焉大素云有

曾之太絡名曰虛里在左乳下其動應辰宗氣之所會是十六焉

海藏云陰絡者六府連及五藏是為所不可見之絡也經云陽絡從嗌則益從射之陰絡為病何以知之帝曰邪熱入于陽絡則為鼻血邪熱入於陰絡則為後血以此知陰絡病鼻血者在上也後血溺血者在下也若吐血嘔血者是知在中也上厥下竭之證或從耳目或從口鼻俱出上窮然亦水隨其藏也

靈樞經云四海者天地之東西南北命之也人何以應之岐伯曰腦為髓之海膻中為氣之海衝為血之海胃為水穀之海此人之有形之四海也以應人之地無形之四海以應人之天何如內丹訣云任督二脈為一身陰陽之海主藏元氣此即機會斷交二穴唇內齒上絡任督之會一身之要一物含五行永作仙人祥至人漱嚥納五行之英華水溝也此任脈為陰之海督脈為陽之海前後也獨無左右乎維陽蹻為外

之左右陰躋為內之左右外之左右亦陽之海也裏之左右亦陰之海也前後者南北也左右者東西也不如是何以俱在十六丈二尺中左右陰陽之晦明矣地之有形之四海主納之天之無形之四海主出之納者收也歸也降也出者流也轉也升也是已又聞地之陰天之陽有升有降往來無窮故能長生故帝干辛行於丙通于壬注于乙納于甲也降而復出辛得之出也升也升降往來如環之無端混元一氣總攝

無形有形也所以五藏之氣出而傳之於經諸經之氣入而傳之于藏也

氣海有餘者氣滿會中俛息

氣海不足者氣少不足以言

血海有餘者常想其身大怫然不知其所病血海不足者亦想其身小狹然不知其所病

水穀之海有餘則腹脹滿

水穀之海不足則飢不受穀物

髓海有餘則輕□無力則過其廣

髓海不足則腦轉耳鳴脰瘦目無所見懈怠嗜卧

伊尹湯液仲景廣為大法卷之三終

諸氣

- 虛補人參 薤香 益智 天門冬 麥門冬  
實泄 枳實 厚朴 茅蘆 桑白皮  
逆順 青皮 木香  
滯通 青皮 破砂 陳皮 香附子  
盛破 枳殼 牛牽 蘿蔔子  
少益 丁香 白豆蔻 五味子  
食消 烏茱 沉香 木瓜 白檀香  
脫收 龍骨 牡礪 白芍藥 白豆蔻 藥子皮 山茱萸

鬱生 甘草 甘松

## 癰腫

內外不通

五藏不和邪氣不得外泄則害其九竅  
六府不和陽氣不得內通則留結爲癰

營氣不從逆於腠理乃生癰腫有二

膏梁之變營氣大過不能行皮毛逆而復回  
榮衛亦從而逆腠理飢肉實滯乃生癰腫治  
宜大洩以奪氣壅

飲食之虧營氣不及不能克皮毛短而不盈

榮衛亦從而逆腠理虛滯乃生癰腫治宜大  
補以滋氣少

實者堅硬而痛其色赤宜泄 大黃

虛者不硬少痛其色白宜補 當歸

如加減 淘 連翹加 大黃湯

發膿發瘡 脉浮不宜灸以其自外而入內托散補之

脈沉者宜灸以其自內而出連翹湯湧之

先腫而後痛者形傷氣 先治血後治氣

先痛而後腫者氣傷形 先治氣後治血

經云風中血脉而成厲風仲景云厲風久成瘀

頰生紫黑瘡化膿水作法不時或皮燥痒如牛  
領狀搔之成瘡目睛白久數年不愈者外治先  
以神方摩風膏傳之次以三稜鍼頻刺紫羸出  
血隨發隨刺內以易老祛風丸主之可以大效

摩風膏方

槐枝

柳枝

杏仁

當歸

黃芩

白芷

以上各一錢碎如黍粒以香油浸一宿次日  
熬煉黃紫色去滓瀝油約量時月入真楓香  
一兩化開再入黃丹三四錢重煨少時下火  
不住手攪令凝上下勻杏黃色冷為度以蒼

醋醬湯熱洗拭乾以此藥搽敷日二易之如  
可後再發紫黑瘡未成膿水速以五花刺之  
出血大效經云血實者宜決之新發諸瘡者  
亦宜舊瘡用迴飢死色紫黑堅木不柔軟者  
亦宜決之也

面赤紫胞

梔子

鼻塞生薑鼻窒窒者斂之始

鼻赤白癩

梔子

鼻塞官桂斂之始

鱗鰥

膽受胃熱

鼻漏

膽胃熱

於脣則心煩

鼻漏汗血也

鼻漏

鼻漏渴不止

塗面藥

白芨  
麝香

白芷  
零陵香

白丁香  
細辛

甘松  
土瓜

胭脂  
白附

白檀香

右為細末每服三錢七水煎成澤洗面後塗

面冬月用

去黑七白散

白附  
白斂

白芷  
白檀香

白丁香  
白牽牛

右為細末臨卧津調少許塗面天明洗之

齒血斷蝕皆同畜血

輕則犀角地黃湯  
重則桃仁承氣湯

緩治則為湯

口糜內熱燒作又士移丙傳丁導赤滑石甘草

黃連湯○內經云膀胱移熱於小腸膈腸

不便上為口糜

唇脣火輕涼膈湯

重承氣湯

刷牙藥

五倍子

膽礬

金絲礬

牙子綠礬

海浮石

黃礬

折傷

外傷墮高墜下損折瘀血脈陰花藥石散脉陽

四物大黃湯可下者大黃生地黃當歸湯酒煮

□甚者蜜虫水蛭當歸大黃湯隨經引子

墮高墜下因而肉裏骨外腫痛外封不可忍者  
毒氣徐徐而出當作何治速復神應復元治血  
湯乳膏仲應散紫金丹當歸導滯散

聖靈丹

水氣

仲景大畧高低內外輕重隨經補鴻安常謹察  
陷谷水清喘嗽痰涎面目浮腫葦蘆大棗鴻志湯  
心下有水氣小腹滿小青龍湯心下水結如盤枳  
木湯腰已下有水氣牡礪澤瀉散兩肠氣腹中雷  
鳴下利生薑鴻湯乾嘔脇痛有水氣十乘湯風  
濕相搏小便不利身微腫甘草附子細辛官桂湯  
少陽證三二日不已至五六日張痛小便不利

五積

息竇 肺 人參 紫菀  
伏梁 心 菖蒲 黃連 桃仁  
痞氣 脾 濕丸內加朮 乾薑 吳茱萸  
肥氣 肝 柴胡 川芎

云腹中有癰不須用治五藏之疾去癰亦去  
一云腹中有癰不須用治五藏之疾去癰亦去

矣元本無癖五藏疾生癖亦生五藏疾去癖去潔古云實人無積虛人有積治之之法便滿座皆君子小人無客地矣

東垣先生云異功散大補脾胃水益黃之可比  
此別有一轉詰士濕盛用助風木之藥以鴻之乃鴻脾之濕熱也

肉積 硼砂 水銀 酒積 神曲 蔗蘆  
血積 蟲蟲 水蛭 食積 碳石 巴豆  
氣積 木香 檳榔 水積 甘遂 黑牽牛

涎積 雄黃 腸粉

許學士云大抵治積或以所惡者攻之以所喜者誘之則易愈如此各從其類也若有群隊之藥分其勢則難取效須是認得分明是何積裏兼見何證然後增加佐使之藥不爾又有所損要在臨時通變也





