

✕

i 61

Kitasato Memorial Medical Library

F 1
1-32

2册

499.2
IK
2

No. 2147 19161


適齋堀内先生著

醫家必携序
必推乃

米澤日涉園藏

青藜閣發

醫家必携序



夫病有寒熱緩急之症、藥有溫涼治弱之性、故醫
病而不揣藥性、固其宜也、但藥雖能治其病、配伍不
律、則溫涼古刻、不能以違其性、分重失法、則治弱古
亂、不能以伸其能、豈唯不能違其性能而已哉、死生
安危、亦安如一操、肺古不悟、每逢其逆境、殞死于藥
家、豈不亦寬乎、近世分析、則大開深探、造化之秘、妙
窮事物之理、是以配伍之律、分量之法、繁然其若、既
善復一毫之差、不法於藥性書中、得之亦何庸汗
牛充棟也、但其說詳於此、而畧於彼、不得滿於一

書之其書浩漭、頗不便于探索、頃日就法家書中、
予節錄其性能、用配伍分量之法、以欲便于書中
采之用、稿終成、適門生聖請上之于梓、以有騰寫
之勞、余因辭、不請益也、因觀僅三小冊子、固不足供
大家之用、然其書不載、皆先哲之經實、後者不一
加私意也、若初學挾帙、以政思、則其性能、功用、庶幾
善及、刻錯、亂隔、冠乎、某為之過乎、

安斐丁巳秋日於江都郵舍客寓

適富增厚後



醫家必携

一 往年三浦大道醫贅ノ舉、ア、未夕成ラス大道
雄飛ノ四方ニ遊フ家門生等其功ヲ卒ヘサル
ヲ惜ミ余ニ托メ其後ヲ繼カシム蓋シ醫贅ノ
舉專ラ巾箱ニ便スルニ在リ而シ其卷帙亦夕
浩漭ノ弊ナキニ非ス因テ新章一書ヲ作ラシ
ルヲ得ス然レ編輯ノ式一ニ大道ノ例ニ從フ
其功ヲ没スルヲ欲セサレハナリ但シ余學菲
識淺其疏謬アラレトヲ恐レ同社高橋玄益卜

相議レ頗ル校正ヲ加フ然レ其取舍ノ間亦
 タ捨玉抱瓦ノ非ナキ能ハス
 一 編輯ノ式一ニ簡潔ヲ要ス要ヲ取り複ヲ去リ
 原文ノ文ヲ採ラスメ原意ノ意ヲ取ル這是レ
 此書一體ノ大意
 一 此編主トメ依百乙氏密篤兒氏法烏拔兒氏ノ
 論ヲ折中レ旁ラ扶歌氏李加兒度氏昆斯氏摸
 烏普氏ノ方ヲ收メ又夕莉兒林氏模斯篤氏昆
 斯骨夫氏越尔實幾氏等ニ及フ者亦夕有リ要
 スルニ日用簡便ノ諸方ヲ採ント欲スレハ其

方多カラスト雖レ諸家ニ涉ラサルコト得ス
 一 引用ノ書多クハ諸家ノ譯ヲ經ル者ナリ而メ
 其刊行ニ至ラサルハ數本ヲ校シ或ハ原書ニ
 就テ訂正シ以テ誤謬ナキコトヲ期ス
 一 此編多ク内服ノ方ヲ舉テ外用ノ法ヲ畧ス是
 レ此ノ卷帙已ニ滿ツルヲ以テ次篇ノ舉ヲ期
 スレハナリ
 一 用藥ノ量藥力ノ強弱疾病ノ緩急年齒男女ノ
 別多血粘液ノ差アリテ異同ナキコト能ハス而
 一 諸家ノ式或ハ亦夕必ス一定セス今此ニ數

則ヲ舉ク

模氏

小兒 一歲 八分

四歲 三分一

七歲 二分一

十四歲 三分二

扶氏ノ量最モ精詳亦下二之ヲ舉ク

生下一週

六歲

二十

李氏

一歲 八分一

二歲 四分一

三歲 三分一

四歲 二分一

七歲 至 稍加半分

十一歲 至 三分二

十六歲 至 二分一

一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	一歲	二歲	三歲	四歲	五歲	六歲	七歲	八歲	九歲	十歲	十一歲	十二歲	十三歲	十四歲	十五歲	十六歲	十七歲	十八歲	十九歲	二十歲	二十一歲	二十二歲	二十三歲	二十四歲	二十五歲	二十六歲	二十七歲	二十八歲	二十九歲	三十歲	三十一歲	三十二歲	三十三歲	三十四歲	三十五歲
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------

醫家以類
精之一并例

四歲 十八 廿五歲 四十五

五歲 二十

一分量ノ符及秤量ノ器其大概ヲ舉ク

一尺 一厘七毛強又 一刃 三分四分三厘七毛強又

一弓 一錢零二厘六毛強又 一易 一錢二分四分三厘七毛強又

一比 九分六厘又百錢零 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

一匙 茶匙 骨匙 骨喜匙 一匙 一食匙 一厘二分八毛強又

ノ式自ラ君臣佐使ノ理アリ是レ亦タ知ラサルヘカラス方中最要ノ藥之レヲ君藥ト云フ君藥ノ効ヲ輔クル者之レヲ臣藥ト云フ腐敗熱ニ機那ヲ用ウル片攝爾扁ヲ加フルカ如ク揮發衝動ノ藥ヲ加テ諸藥ノ幹旋ヲ逞セシムルカ如シ又加テ以テ君臣二藥ノ強劇ヲ制スル者ノ如キ之ヲ佐藥ト云フ金硫ヲ用ウルニ酸液ノ症アラハ麻屈涅失ヲ加ヘテ其害ヲ拒クカ如シ又夕藥ノ製造ヲ便ニシ加テ服シ易カラシムル者ノ如キ之レヲ使藥ト云フ散劑

ヲ製シテ砂糖ヲ加フルカ如シ然レ劑必ス君臣佐使ヲ具スヘキニアラス臣佐使互ニ其用ヲ兼ヌル者之レアリ此等ノ式亦タ知ラサルヘカラス
一 凡ソ藥或煎或丸或浸或散亦タ皆定式アリ何レノ藥モ皆能ク煎浸丸散ト為スヘキニアラス此ニ其大畧ヲ舉ク他ハ類推メ知ルヘシ
○煎劑 水ヲ以テ煎スル者是レ也水ニ煎スレハ其藥中含ム所ノ護謨越幾斯分本篇中譯フノ溶化スヘキ藥及ヒ水ニ溶化スヘカラサ

ル華爾斯分モ熱沸ノ勢ニ乘メ融合溶流スヘ
キ藥等ヲ煎劑ト為スヘシ亞爾托木香、睡菜、蜀
羊泉、葛尔儒、葛斯加里、機那、茜根、朴屈福烏、篤健
質、鹿角、依蘭苔、山午勞、水楊梅、大黃、刺苔尼、薩尔
沙、遠志、甘草、荅麻林度等ノ類是也但シ揮發透
竄ノ藥ハ煎スレハ性味揮散メ切ナシ且ツ又
タ久ク煎スヘキ者アリ鹿角、朴屈福烏、篤ノ如
キ堅硬ニメ華爾斯性ヲ含ム者ハ大抵一時或
ハ半時之ヲ煎スヘシ其他皮材根莖ハ四分時
或ハ八分時煎スヘシ又久シク煎メ性味ヲ變

スル者アリ旋那過煎スレハ人ヲメ腹痛セシ
メ甘草反テ苦味ト為リ依蘭苔本性ヲ亡スル
カ如シ但シ數品合煎メ一味過煎スヘカラス
又タ多ク粘液ヲ含シ他藥ノ煎出ニ害アル者
ハ他藥ヲ煎メ後ニ加ヘ煎スルヲ要トス
○浸劑 水、或酒、或熱湯、熱酒ヲ以テ浸出シ製
スル者是ナリ其水ニ浸出スヘキハ水ニ溶化
スルノ成分及ヒ微ニ揮發性ヲ帶タル成分ヲ
具スル者ニメ護謨、越幾斯、糖質、塩性、微々タル
揮發油等ナリ纈草、水楊梅、亞尔蘇、健質、蓄艸、睡

萊機那、括失亞等ト為ス其熱湯ニ泡熟浸出ス
ヘキ者ハ右件諸藥ノ外白芷、葛斯加里、菖蒲、吐
根、蜀羊、亞尔尼加華根、實芟、荅利、良薑、薄荷、橙葉、
太那設點、大黃、玫瑰、撒尔比亞、雜夫藍、旋那、甘艸、
施綿等ト為ス其酒若クハ燒酒ト水トヲ合メ
浸出スヘキ者ハ則チ多量ノ揮發油及ヒ華尔
斯ヲ得ヘキ諸品等ト為ス太約浸劑ハ其藥ハ
倍ノ液ニテ浸出ス且ツ其浸漬ノ間四分時ヨ
リ數日ニ至ルヲアリ然レモ大抵一二日ヨリ
二三日ニ至ルニテ足ル既ニ浸出セハ漉過メ

聽用ス金服量ニ弓ヨリ三弓ニ至リ又夕六
弓ハ弓ニ至ルモ亦夕アリ
○散劑 凡ソ藥皆散ト為スヘシト雖モ峻烈
刺衝ハ口腹ニ害アルハ散用スヘカラス蕃椒
瑞香、外朮、剥多亞斯等是レナリ胃液ニ化スヘ
カラサル者ハ散用スヘカラス朴屈、福烏篤、依
蘭苔、苗根等是ナリ濕ヲ引テ粘凝流滴スル者
ハ散用スヘカラス阿魏、沙列布、護謨、安沒尼亞、
的列並等是ナリ且ツ胃化虛弱ノ者ハ用ウル
ト大カレ峻藥ヲ小量ニ用ウル片ハ別ニ佐使

醫家必讀 卷之九

ノ藥甘草、砂糖、蝟蛄、麻屈、温失ノ類ヲ加フヘシ
若シ油性藥ヲ加ヘント欲セハ散成テ之ヲ加
フヘシ大抵散劑ノ量五匁十匁ヨリ三四匁ニ
至ルヘシ外用メ眼ニ点スル如キハ極末ヲ要
ス噴劑ソ如キハ極末ニ過サルヲ要スヘシ
○丸劑最簡易ノ法トス然レモ或ハ即効ヲ
望シ或ハ吐血、胃管痙攣等ハ用ウヘカラス專
ラ痼毒沈痾内ニ潛藏スル諸症ニ用ウヘシ丸
ソ丸ト為スヘキ藥ハ根莖花葉ノ末、護謨、華尔
斯、酸化金屬、諸塩等是ナリ然レモ多量ニ非サレ

効ナキ者ハ丸ト為スヘカラス又夕凝結メ
溶化シ難キ亞刺比亞ノ類濕ヲ引キ易キ者ノ
如キハ丸ト為スヘカラス且ツ丸ハ硬ニ過ク
テ力ヲ又越幾斯、蜜、甘草膏、稠舍利別、石鹼、拔尔
撒謨、燒酒、水等ニテ丸トシ白蒸餅ニ砂糖ヲ加
フル者亦夕可ナリ例スルニ粘滑亞尔托ノ如
キハ水ヲ以テ丸スルニ足ル粘性ニ非サル金
硫黄ノ如キハ越幾斯、舍利別、蒸餅等ニ宜シ阿
魏的列並ノ如キハ石鹼ニ宜シ石鹼久服メ胃
膽ニ峻藥胃ニ害アルハ本藥ヲ輕クメ佐使

醫家必讀 卷之九

ヲ重クシ以テ宜ニ從フヘシ夜トナスニハ石
松子、桂末、金銀箔等之ニ宜シ○其他煉漿膏錠
其類亦タ多シ一々揭示セス要應サニ類推ス
ヘシ○合劑アリ綿窟設兒是ナリ其藥溶化ス
ヘキト溶化スヘカラサルト俱ニ合メ劑ト成
ス飲劑ニ異ナリ凡ソ製劑皆成式アリ杜撰妄
断私製スヘキニ非ス古人ノ成式ニ從テ斟酌
スヘキナリ
藥名冗長ニメ稱呼ニ便ナラサル者西人亦タ
畧稱スルノ例アリ故ニ此編亦某劑ノ本条ニ

藥ノ名目ヲ掲擧スル時ニハ謹テ本名ヲ擧ク
レ凡論中往々畧呼スル者アリ施綿失那ヲ施
綿ト云ヒ健質亞那ヲ健質ト呼フカ如シ者官
幸ニ之ヲ恕セヨ家門生小周益齋寛司原有鄰
二桂莽皆能ク余カ編輯ノ勞ヲ助ク其功亦タ
没スヘカラサルナリ

安政四年丁巳秋日米澤堀内淳誌於江戸邸舎
客窓下

醫家心集卷之十一

容痰不
安地四平下日煉日米鞞
安地四平下日煉日米鞞
二卦養吾補之
幸二之
藥之

醫家心集卷之一目次

○下劑總括

滿那 荅麻林度 瀉利塩 荅苾硝 霸王塩孕

酒孕鹼酒石 純精酒石 大黃 蘆薈 旃那

藤黃 葯刺巴 格祿董篤 巴豆油 附録

一道

○吐劑總括

吐根 吐酒石 安質沒扭酒 膽礬 皓礬

附録一道

○發汗劑總括

醫家必知
卷之一
目次

接骨花 加密列花 山午莠根 薩沙布羅斯

薩尔沙波利尔羅 榆白皮 朴屈福烏篤同華

斯尔白瑞香 雙鸞菊 民埕列利精 挖歇兒斯

發汗散 的里亞加 ○吐酒石吐劑 安質沒扭

酒吐劑 金硫黃解凝 硫黃同 礶砂同 附錄一

道附補 ○利尿劑總括 附錄一

海葱 格兒失屈謨 實芟荅利斯 杜松子

木賊 洋芹子 結兒歇兒 德兒非奴謨 沃

諾溺斯 孕礪酒石 拔尔撒謨骨泮波 拔尔

撒謨加奈荅 的列並底那 羌菁 附錄一道

醫家必携卷之一

此書乃醫家必備之書也其書中載有各種醫方及藥性之說明其書之體裁極為整齊且其文字極為簡潔易於理解誠為醫家之良伴也

醫家必携卷之一

○下劑總括
凡大便ヲ通利スルノ藥之ヲ下劑ト云フ或ハ腸ヲ潤滑ニシ或ハ腸ノ筋纖維ヲ刺衝シ蠕動機ヲ進メ或ハ腸液ノ分泌ヲ促シテ蓄藏ヲ稀渙スル等ノ性ヲ具スル者是ナリ下劑獨ハ腸胃ニ効用ヲ致スノミナラス他部ト雖凡利導感傳又偉

米澤幸堀内淳忠亮 輯

凡大便ヲ通利スルノ藥之ヲ下劑ト云フ或ハ腸ヲ潤滑ニシ或ハ腸ノ筋纖維ヲ刺衝シ蠕動機ヲ進メ或ハ腸液ノ分泌ヲ促シテ蓄藏ヲ稀渙スル等ノ性ヲ具スル者是ナリ下劑獨ハ腸胃ニ効用ヲ致スノミナラス他部ト雖凡利導感傳又偉

醫家必携卷之一

績ヲ逞ウスルノ藥劑ト不但藥力ニ寛猛ノ異アリ藥性ニ寒熱ノ別アリ宜ク症ニ從テ之ヲ用ウヘシ例スルニ胃腸汚物飲食不化腐敗膽液粘液酸液停滯諸物虻蟲及ヒ腸胃官能緩慢ニハ黃疸水腫等ヲ發スル者又夕眼目焮衝咽喉焮腫腸胃熱膽液熱粘液熱等ノ如キハ皆下藥ニ宜シトス然而メ惡性熱虛衰ノ諸症胃腸焮衝勞瘵尿崩敗性下利及ヒ礬石汞毒等ノ下スヘカラサルノ症殊ニ腸腫狹窄等ノ如キハ皆下藥ニ宜シカラストス

性緩

滿那服大人二錢至四錢至二錢五分至一錢五分配伍中性

功用 妊婦及ヒ熱病胸病咳嗽胃咳等酷厲諸毒ヲ

緩下ス小兒粘性胸病ニ海葱醋蜜ニ和シ風氣諸

症ニ香竈苦味藥ニ合シ焮衝諸病ニ純精酒石等

二伍ス

方例 滿那舍利別神滿那四錢梅那三錢苗香四錢砂

糖二百錢九十右舍利別十シ每服一二茶匕小兒ノ

下劑トス

塔麻林度服自八錢至十錢禁銅氣ヲ含ム物ト

清涼性

塔麻林度服自八錢至十錢禁銅氣ヲ含ム物ト

功用腐敗熱、焮衝熱、膽液性ノ下利、黃疽、黑膽液鬱

蓄及ヒ諸失血ノ膽液刺衝ニ因ルモノ膽液性ノ

眼目假焮衝、胸肺焮衝、瘰血、痔血閉止、血液粘稠

焮衝ニ傾クノ症ニ用ウ按ニ扶氏此藥ヲ腐敗

ヲ拒ク

方例涼下飲依荅麻林度四二錢十蒲公英六錢十蘆根六錢十

水ニ淹レ一匕ヲ取り滿那二錢十霸王塩二錢十合和レ

毎時三四七ヲ服ス

清涼解凝

瀉利塩量服至自八錢忌禁塩灰汁塩、硝、酸、汞、剥、多、亞、斯

功用涼下メ解凝利尿ノ効アリ壅塞ヨリ發スル

諸病ヲ微利メ寛解ス腸癰、箱頓ニ下劑ヲ與ヘテ

吐スル者ニ小量頻服メ効アリ大量久服ハ虚ス

ルノ恐アリ宜シカラス且ツ解凝利尿ハ一刀ヨ

リ一錢ニ至ルヲ用ウ又夕啣筒法ト為ス且ツ之

ヲ服メ吐スル者ハ桂薑、益智等ノ香芳藥ヲ加ヘ

或ハ瘰性症ニ阿芙蓉ヲ加フ

同

量服下劑ニハ五錢至二錢同上配荅麻林度

等伍スニ

功用粘液、膽液、汚物、腸胃ニ蓄フル者、或ハ傷冷毒

性間歇熱、誓留熱、虻蟲ニ効アリ小量自一錢ヲ用

醫家心法

井テ解凝發汗利尿ノ効アリ腸間膜腺壅塞ノ胃
虚小兒虚瘦水腫等ニ苦味熬劑ニ伍ス但シ解
凝藥ニハ風化ノ白粉トナル者五八ヨリ三分強
ニ至ルヲ用井下劑ニハ風化セズ結莖スル者ヲ
用ウ

方例 一方 硝石 八錢 至 扁桃油 十二錢 亞刺比亞
適水 八錢 右溶解シ 每時一茶匙

霸王鹽 孕石 至 四錢 配 大黃 薄荷 刺巴 禁 諸 鑽
製劑 硝石 承 鈔 孕石 固 日 同 物 二 非 益 硫

糖等 孕石 承 鈔 孕石 固 日 同 物 二 非 益 硫
酸ヲ 含 別 ア ル ナ リ 酸 五 固 日 同 物 二 非 益 硫
金酸 ノ 別 ア ル ナ リ 酸 五 固 日 同 物 二 非 益 硫

功用 解凝 清涼 驅熱 ノ効アリ 內藏 壅塞 ノ間歇熱
消化不良 黃疸 水腫 等ハ 苦味 熬劑 峻下 ノ劑ニ伍
ス但シ 解凝ヲ要セハ 其量 半刀ヨリ 三刀ニ至ル

方例 利尿散 依 孕礬酒石 螞蛄石 等 二 刀ノ量ヲ
苗香水ニ點服ス 一方 袖 孕礬酒石 錢 二 牡蛎 錢 右

丸貼 二分 子 每時 一服 一方 苗香水 錢 二 牡蛎 錢 右

同 孕礬酒石 量 服 至 四 錢 配 蘇 那 及 七 華 爾 斯 二 伍 煎
等 二 禁 諸 鑽 孕石 承 鈔 孕石 固 日 同 物 二 非 益 硫

功用 疏利 解凝 ノ効 解凝劑ニ用ウ 至 八 刀ノ量ヲ
胃熱 膽液 熱 粘液 熱 膈膜 以下 諸藏 ノ病 依 剝 昆 埴

胃熱 膽液 熱 粘液 熱 膈膜 以下 諸藏 ノ病 依 剝 昆 埴

醫家必知
卷之一

尔、肝藏病、痔疾等ニ用ウ旨痔ニ用井テ熟ヲ去リ
痔囊ヲ薄カラシメ、頭腦ニ血液進迫スル者ヲ減
シ吐血ヲ止ム

方例 依剥昆垓尔方 袖孕礮酒石 錢三 大黃 錢一 硫黃乳

二 橙皮末 十 麻屈但失 錢各半 苗香油糖 錢三 調勻シ一

茶七ヲ服ス日三次冷水送下 ○一方 孕礮酒石

四 蒲公熬 蘆根熬 錢各二 加密列水 三錢 十 溶化每時

一 食七

同

純精酒石 服下劑ニ自八錢至十二錢清涼 伍配 劑下
疾ニハ 梅那滿那大黃藥刺巴等ニハ 實幾 荅利私等ニ

合ス

切用 清涼解凝利尿ノ切ヲ兼又膽液熱ニ称用ス

膽ノ結石膽液性ノ下利後重腹内諸病隱伏肝焮

腫黃疽痔疾ニ解凝劑ト為シ水腫腹水或ハ酒客

水腫ニ的當ス胃虚ニハ用井ス

方例 實性膽液熱ヲ治スル方 法 純精酒石 四錢 至

水 七 右砂糖若クハ蜂蜜ニ和ス ○利尿散 昆純精

酒石 一 海葱 錢 吐酒石 二 右調勻シ日二茶七或ハ

三茶七ヲ服ス ○又方 扶消石 錢三 純精酒石 錢二 實幾

荅利私熬 至自三 亞尔托亞舍利別 半 右和勻シ

醫家必知

卷之一

五

壯強

初每四分時二一食七後半時若クハ每時用少

大黃

量服三下劑二八自十ハ至一錢浸劑二伍配ハ下劑二

酒石硝石甘汞等伍ハ症ニ從テハ麻屈涅失吐
根橙皮桂露苦味熬劑石礮阿芙蓉ニ配スハ涅失又
日其効ノ遲スハ
梅那蘆薈ヲ伍スヘシト

功用揮發芳藥ニメ收斂ヲ帶フ炙炒ノ者ハ唯收

斂ス瀉下ヲ要スルノ諸症ハ初生兒粘液鬱蓄又

酸液症霍乱腹肚壅塞依剝昆垓尔子宮衝逆黃疽

腸胃汚物ニ根スル疝痛等ナリ小量ニ用井テ強

壯ノ効アリ萎黃病粘液熱泄瀉痢病腸胃衰弱ノ

下利止マサル者不食酸液風氣等ヲ治ス又夕胃

腸ヲ強壯ニシ粘液鬱滯ヲ防キ小兒諸病英病ニ按

英吉利病是ナリ今初起腹脹等ヲ治ス又夕利尿

ノ効アリ酸液ニ下劑ト為スヘシ但シ腸焮腫腸

ノ感觸過敏痔疾ノ如キ局所ノ積血硬腫癌瘍等

ハ害アリ凡ソ清涼下劑ニテ衰弱ノ恐レアルモ

ノニ用ウヘシ

方例大黃舍利別製法常緩下ノ良方ニメ小兒初

生ニ良ナリ服量自二錢至一弓○保嬰散扶麻屈

涅失錢八錢大黃錢二顯草錢半苗香油糖錢四散ト為シ初生

兒每服一小刀尖○解凝下劑依大黃石礮各半

醫家必類

卷之一

九

藥刺巴五分上件三分丸下ナシ銀箔ヲ夜トス日

二三次三丸ヲ用ウ○解凝散神大黃麻屈温失

各半一錢苾硝錢四橙皮黃錢一右散ト為シ每服一茶匕○

一方同大黃錢一孕礮酒石錢一右二分ヲ一丸ト為シ

朝夕七丸○大黃浸劑同大黃錢一瀉利塩錢四苗香刀一

右熱湯六弓ニ浸シ漉過シ滿那一弓ヲ加フ每服

半劑

熱性
峻下

蘆薈服量三自二分至伍配石礮苦味熱劑等ニ伍不

功用熱性苦味ノ下劑タリ其功ヲ厚腸ニ致ス故

二厚腸ノ官能萎衰スル便秘ニ効アリ健胃殺蟲

強壯ノ効アリ膽液ヲ助ケ粘液鬱蓄血行緩慢ノ

閉塞ヲ開キ通經ノ能アリ但シ強實多血ノ經閉

妊婦ニハ崩血流産ノ恐レアリ又タ能ク痔血ヲ

催ス運行遲慢粘液質ノ痔血常トナル者閉塞ス

ルニ的應ス多血家旨痔焮痛等ニハ之ヲ禁ス

方例解凝通經一方依蘆薈半錢沒藥二錢健質熬

礬紅錢各一右調勻シ朝夕一卵七ヲ用ウ或ハ丸ト

為ス○律比丸神蘆薈熬二沒藥一雜夫藍各半舍

利別宜右丸ト為シ每服十分至二十分日ニ三次

○殺蟲一方神蘆薈健質熬分右丸ト為ス

醫家必類

卷之一

二

下峻

梅那

量服

浸自一錢至四錢此末一

伍配

純荅麻林度滿那

カ伍ラス或曰煎用ニ發スト

功用峻下藥中ノ緩ナル者ナリ寒熱二症ニ通用

ス或曰熱性ニ属スル焮衝症ニ適當セスト此物

腹痛ヲ發セス下後便秘セス或曰梅那ハ敏覺ノ

人腹痛嘔吐ヲ發ス芳香藥ヲ加ヘテ之ヲ防クヘ

シト

方例

一方扶梅那浸二錢或ハ三錢沸湯ニ瀉利塩

滿那

錢各三右調勻シ頓服ス○一方扶梅那錢二苾硝

七弓二浸出ス沸湯吐酒石二滿那弓右溶化シ每半

時一二食七ヲ用ウ

同

藤黃

量服自一過六ハ

功用峻下ノ効アリ運行遲慢粘液壅塞ノ水腫ニ

苦味解凝藥ヲ用井テ後之ヲ與フヘシ條蟲ニハ

砂糖

二和シ與ヘテ効アリ

方例

利尿一方依藤黃海葱各一石礮錢三右三人

丸ト為シ甘草末ヲ衣トス每服五丸日ニ四次

○條蟲試驗方神藤黃大藥刺巴大黃鋸吐根

實幾荅利私半金硫黃各半甘汞二阿魏二蘆根熬

錢各三太那設油過泥子油五各滴右二瓜丸ト為

醫家必類

石松子ヲ衣トス早朝六九ヲ服シ舍利別ニテ
送下ス後毎半時ニ服ス且ツ初服四分時後蓖麻
油一食七ヲ喫ス○一方扶藤黃實幾荅利私
海葱 金硫黃 地榆熬分各等右二ハヲ一九トシ
每一時半服一九漸加量

同

峻下劑ト為ス運行遲慢粘液質ノ腸胃汚物
虵蟲ニ効アリ腸胃壅塞ノ經久間歇熱腸間膜閉
為峻下劑ト為ス運行遲慢粘液質ノ腸胃汚物
ハ撮綿施那海葱醋劑ニ配純精酒石苗香薄荷ノ糖製
蜜等ニ伍スヘシ

塞英病疳勞等ニ用ウ又夕水腫腦水ヲ治ス○華
兒斯其功同ク其力烈シ至十五ハ

方例 一方 袖 藥刺巴 孕礬酒石 二 過泥子油 一 右
二服トス○驅蟲舐劑 昆 纈草根 攝綿施那 各 二

藥刺巴 三 十 海葱醋蜜 宜 適 右 調 勻 每服一茶七○
一方 袖 藥刺巴 華 尔 私 甘 汞 石 礮 各 一 右 二 八

丸トシ 每 日 十 九 ヲ 服 ス 石 礮 各 一 右 二 八

同

格 碌 瑾 篤 峻 下 劑 八 分 八 分 自 三 至 五 緩 下 二
功用 峻刺解凝ノ下劑ト為ス蟲ヲ殺ス粘液頑壅
水腫精神病等ニ効アリ動モスレハ下血腹痛ス

醫家必類

醫家必類
卷之十一

粘滑藥ニ伍用スヘシ妊婦弱人ニハ與フヘカラ

又用之

方例格碌董多丁幾劑或格碌董多錢八大茴香錢一燒

酒二百錢右浸出スル一三日十滴ヨリ三十滴ニ至

ルヲ服ス或巴豆油五分亞刺比亞護謨五分

同

巴豆油量服至自二滴配甘美ノ舍利別、亞刺比亞

功用其効最モ峻烈疾速ニメ腹痛ヲ發セス頑固

便秘鉛毒疔腸胃官能ヲ失スル者粘液質又ハ血

液頭部ニ鬱蓄スル卒中風水腫條蟲等ニ用ウ

方例小兒良方或巴豆油二滴白糖二錢亞刺比亞護謨

半複方益智丁幾劑錢半水宜適右能ク混和シ五六歲

ノ兒每一時半或二時二三茶匕ヲ與フ○外用此

油六滴阿列茂油ニ和シ腹ニ塗リ内服ト効ヲ同

シ聲嘔百日咳等ニ塗擦ス吐酒石膏打膿等ニ勝

ル又夕僕麻質痛風骨節腫強直ニ塗リテ効アリ

附録依氏藥性論下劑○止瀉下方○腹痛甚シク

下利不止方阿列茂油同亞刺比亞護謨同白罌

粟舍利別各二阿芙蓉液十五滴右調勻シ四分時每

ニ一匕○經久頑固下利方吐根二砂糖許少早朝

之ヲ服シ夜ニ至テ阿芙蓉ヲ用ウ或ハ先ツ腸胃

ヲ清滌吐劑次ニ大黃一味或ハ阿ヲ用井而後
 鎮痛飲劑桂露六亞兒托舍利別一福布蔓鎮痛液
二阿芙蓉三赤石脂錢三吉納護護錢二右調勻レ每時
 一七或拳參、蚤休、沒食子、阿仙藥、甘字設木ヲ浸出
レ衰弱下利經久ヲ治ス○唧筒法方蔓菁油、亞
 麻油若クハ牛乳加阿芙蓉量少○又一方沙列布
二十水錢五煮テ加甘乳五右調勻レ施用ス○攣痛
ヲ治スル方鯨膠亞刺比亞、水、乳等分若クハ加
 密列泡劑ニ溶化レ服ス三茶ハ與ス○水煎

○吐劑總括

凡ソ胃中ノ諸物ヲ涌吐スルノ藥之レヲ吐劑ト
 云フ功用尤凡廣ク其力啻ニ胃腸ニ達スルノレ
 ナラス震蕩ノ勢延テ肺藏、肝、脾等ニ及ヒ分泌ヲ
 進メ閉塞ヲ開キ又夕能ク皮表ニ達メ汗ヲ發セ
レノ神經ニ感メ興奮、鎮痙ノ績ヲ致ス故ニ其効
 用ノ道ニ直達、次達ノ二アリ直達ハ誤テ諸毒
ヲ服レ未夕久レカラサル者ハ已ニ時ヲ發スル者ハ
却テ害胃腸指ノ上端汚物、膽液熱、腸胃熱、粘液熱、
 假肺焮衝、假咽喉焮衝、膽液性ハ咽喉、胸膜、眼目諸

嗽衝胃瘕胃痛等及ヒ神經熱腐敗熱ノ初起泄瀉
 窘迫利ノ胃腸汚物ニ根スル等ニ用ウルヲ云フ
 殊ニ汚物上涌ノ徵アル者尤用ウヘシ若シ嗽
 衝ノ徵アルハ刺絡後ニ用ウヘシ按ニ扶氏曰小
兒症ニ從テ吐前啣
筒法ヲ施スヘシト八達トハ黃疸腺腫內藏閉塞
 粘液喘息義膜喉腫聖京屈痛風瘡疹百日咳子宮
 病癩癩發狂鬱憂病等皆ナ分利振蕩開達利導ノ
 効ヲ要スルヲ云フナリ吐劑害アル症ハ多血ニ
 ヲ血液頭腦ニ進湊シ胃腸嗽衝頭部創傷孕婦箱
 頓癩心藏大血管脹咯血吐血子宮脫等用ウヘカ

吐根亦按ニ真嗽衝諸症モ
亦タ用ウヘカヲ入

分量ヨリ至一分至一分
三分八分
四分一分
五分一分
六分一分
七分一分
八分一分
九分一分
十分一分

功用性緩ニメ吐後ノ勞無ク下利ヲ發セズ妊婦

小兒ニ撰用スヘシ又夕祛痰鎮瘕發汗止瀉ノ功
 アリ腹部神經ニ作用ヲ致ス下藥刺巴ノ如シ此
 藥ハ胃ト腸ノ上部トニアリテ藥刺巴ハ厚腸ニ
 利アルヲ異ナリトス又夕痢根ノ名アリ赤痢ニ

ハ大黃、阿芙蓉ニ伍シ用ウ但シ惡性症ニハ害アリ且ツ崩漏ニ用井テ鎮痙ノ功ヲ取ル脉小緊小便清白、四支厥冷スル者ニハ此物四分ハ一丸頻服メ奇功アリ

方例 單味吐方 依吐根一散トシ少量ノ液ヲ以テ服ス惡心ヲ發スルヲ待テ多ク微温湯ヲ飲マシム但シ早ク飲液ヲ與フヘカラス ○一方同方吐根一吐酒石ハ右頓服ス ○一方扶吐根一吐酒石一錢ニ落水ハ海葱醋蜜 覆盆子 舍利別 各四右和合シ四分時毎ニ一食七小兒ハ一茶七ヲ與フ吐ヲ以

テ度トス 按者ニ勝レル多ク似テ頻服メ吐ヲ待
 吐例ニ要アスラルスハ ○一方袖吐根ニ半ハ至砂糖乃右散
 頓服 ○下利方 同吐根四ハ至阿芙蓉ニハ至砂糖
 乃右散 四貼ニ分チ毎時若クハ一時半一服ス ○
 痙性帶下方 今吐根ハ桂末 桂油糖各四 右散八
 包ト為シ 毎半時一服ス

吐酒石 量服 大人ハ小兒ハ劑自一ハ至半ハ四 **伍配** 水散ト溶シ又大

便ヲ利スルハ芒硝ニ伍シ發表ニハ龍腦、阿芙蓉、杜
 松ニ伍シ祛痰ニハ遠志、海葱、利尿ニハ純精、酒石、杜
 合ス 糖ニ **忌禁** 單寧等ヲ化忌 屈塩

功用 性猛烈ニメ吐下ヲ發スルヲ神速ナリ大量

二用ウレハ腸胃焮衝ヲ發シ死ニ至ル者アリ若
 毒ヲ貼スル者ハ油質粘滑ノ包撮飲ヲ用井且ツ水
 蛭ヲ貼スル者ハ幸ニ早ク招カレ其毒未タ發セサ
 テル時ハ黃機ヲ煎スヘシ用井又夕一種意識ノ病狂風
 ノ如キ知覺己ニ鈍呆トナルハ六人至十人尚且
 ツ加用スヘキ者アリ腸胃熱ノ初起ニハ解凝清
 涼劑ニ加ヘ粘液、虻蟲ニハ解凝藥ニ加ヘ聖京屈
 儻麻質、膽液性ノ間歇熱ニ腹肚壅塞ヲ兼ル症ニ
 用ウ經久儻麻質、痛風ニ雙蘭菊熬、蔓陀羅花等ト
 互用スヘシ又夕癩狂、癩症、鬱憂病、黑障眼等ニ効
 アリ肺焮衝、義膜喉腫等ニ防焮劑ト為ス性論ヲ

照見ス大概吐酒石ハ吐下ヲ要メ惡性熱ナルト
 強壯、知覺鈍ナル者トニ良トシ吐根ハ知覺敏ナ
 ル者ニ宜シトス

方例 小兒吐劑 神吐酒石一 蒸餾水三 右先ツ半ヲ
 服シ後八分時毎ニ一食七ヲ服シ吐ヲ得ルヲ度
 トス ○精神錯乱鬱憂病吐方全 吐酒石四 蒸餾水
 右每半時一食七ヲ服ス ○肺焮衝脇痛吐方全
 吐酒石六 蒸餾水六 右每時一食七ヲ服ス ○
 百私孫解熱方全 吐酒石八 以テ蒸餾水 白罌粟
 舍利別 亞刺比亞 橙花水各半 免熱時一食七

ヲ服シ後半時二食七ヲ服シ又夕半時三食七ヲ服シ午飯後再七一食七ヨリ始メ漸増前ノ如シ
 ○外用擦膏ト為ス吐酒石錢一家猪脂八錢至塗擦
 メ小疱ヲ發スルニ至ル

安質沒尼酒

劑一ヲ二吐酒 石二ハヲ舍ム
 量服 大人自一錢至四錢 小兒半錢至一錢 發汗祛痰二八二滴至二十滴此

功用 催吐、解凝、發汗、祛痰ノ効アリ其製吐酒石十二

白蒲桃酒十二右溶解シ吐方ト為ス小兒殊効アリ每五分時十分時ニ一茶七ヲ用テ吐ヲ得ルニ至ル解凝劑ト為シ粘液性內藏壅塞、腺病ヲ治

又發汗、祛痰劑ト為シ自十一錢 一滴急慢二性諸病、聖

京屈、樓麻質性ノ諸症ニ効アリ

方例 小兒吐方袖 安質沒尼酒半 海葱蜜 亞爾托

舍利別各三錢 右每八分時一茶七ヲ服シ吐ヲ得ル

ニ至ル ○發汗方扶 安質沒尼酒錢一 民埵列精接

骨花氷煎 蘇餹水各四錢 橙花舍利別右 每時一食

七熱劇シキ者硝石二錢ヲ加フ ○祛痰方扶 安質

沒酒六 孕礮酒石錢一 甘草舍利別錢一 蜀羊泉莖半

水十 煮テ取ル者八 右調勻シ每服二食七日四次

膽礬

量服 大人自三分至六分 小兒四分至五分

蝟蛄錢三亞的兒五二右調勻十振蕩ノ每時一七〇
 腐敗膽液ノ嘔吐方全酒石塩一杓椽汁錢四右調勻
レ沸蕩ニ衆メ用ウ〇扶氏曰ク吐劑後或ハ劇吐
ヲ發レテ危キ者ハ一ハ胃焮衝ヲ發レニハ吐血
ヲ致レ三ハ精カヲ耗ス無ニ必應ノ良方ヲ李歇
 里飲トスト下方杓椽汁条又按ニ鎮嘔散混沸散ヲ
リ下方酒石酸条共ニ宜レ但レ扶氏ハ既ニ刺衝ヲ
 受ル胃ヲ復タ刺衝スルカ故ニ混沸スル者ヲ良
トセス飽和ノ方ヲ良トス且ツ利歇里飲ヲ用ウ
ルニ先テ粘滑飲液ヲ與ヘ又タ兼テ薄荷ヲ酒ニ

煮テ胃部ニ貼スヘ〇越尔實幾ハ治惡咀方
 吐根末六八至椒格刺度適右調勻百二十錠トナ
シ每時一錠ヲ與フ

衝ノ景況アル者之ニ宜シカラス凡ソ此劑ヲ服
スルニ當テ宜ク調護ヲ慎ミ寒温度ニ適スルヲ
要トス厚ク被覆メ熱セシムルヲ勿レ

接骨花

服量 一握 大約 三至八錢 舍

功用常用ノ發汗藥ニメ感冒、聖京屈、癩、質性慢
性諸病、皮膚病、粘液性諸病、聖京屈性胸病等ニ用
ウ或曰此藥緩性ナリト雖凡焮衝及ヒ熱ヲ兼ヌ
ル皮膚疹ニ妄用スルヲ禁スト
方例此物多ク泡劑浸劑ト為ス○發汗方 依接骨
花 加密列各一握麗春花半握薩沙布羅私半握雜夫藍

半錢右浸出メ茶ノ如クス○接骨木子舍利別或ハ

昆設尔布アリ良性ノ發汗劑トメ熱病ニ用ソ○

一方昆亞尔托煎八錢接骨子昆設兒布半握調勻ス○

又夕花水アリ共ニ發汗ノ効アリ又夕洗眼水ニ

加フ○外用メ羅斯性ノ焮腫、聖京屈等ニ藥囊ト

為シ或ハ咽喉焮腫ニ含嗽劑ト為ス

加密列花

服量 末服 六錢 半錢 至二錢 浸泡 八錢 以入

功用驅風強壯、鎮痙發汗、通經ノ功ヲ具ヌ故ニ間

歇熱ニ機那ヲ用ウルニ先テ此品ヲ與フルヲ要

ス風氣膨脹メ内藏攣急、泄瀉、赤痢、慢性神經病依

剥昆垓尔、子宮病、經閉等ヲ治ス且ツ腸ト神經ト
ニ属スル諸病ニ殊効アリ

方例 健胃浸劑 李加密列 姜 右浸劑トス ○通

經一方 扶 加密列 默栗沙 薄荷各二錢 薩昆那一錢

右沸湯二碗ニ浸出シ朝夕其半ヲ服ス外用ハ唧

筒、蒸熨、藥囊、琶布ト為シ、攣急諸病、箱頓癩等ニ用

ウ

山午莠根 服量 以テ煎シ九十二錢ヲ取ル **伍配** 藥木飲類、蜀

烏多杜松木 等ニ配ス

功用 發汗、利尿、解疑ノ効アリ 聖京屈、痺麻質、痛風

蒸氣閉塞ノ水腫、石林等ヲ治ス 腺病初起輕症ニ

効アリ又夕諸疹、浸蝕性瘡、梅毒ニ用ウ

方例 清血方 扶 午莠根 薩尔沙根 朴屈福烏萬

蜀羊泉 甘草 濱藿麦各等 右細判毎日八錢若

クハ十二錢ヲ取り水二比ヲ以テ煎劑トス

薩沙布羅私 服量 以テ浸出シ八至十二錢ヲ取ル

功用 衝動、發汗、利尿ノ効アリ 慢性聖京屈、痺麻質

痛風、水腫、瘰癧、梅毒ノ頑固皮膚病ニ効アリ 皮膚病ニ

ハ安質没、汞劑ニ伍シ 梅毒ニハ藥木飲ニ配ス

薩尔沙波利尔羅 服量 劑ト為ス一至一錢多ク煮テ

十弓十二弓
ノ液ヲ取ル

功用 梅毒ニ効アリ患者汞劑ニ堪ヘス或ハ長服
ノ衰弱スル者夜發ノ頭痛骨痛ニ良功アリ汞劑
殊ニ猛汞ニ伍メ其功ヲ佐ケ又夕汞劑ノ食機ヲ
損スルヲ防ク或ハ頑固慢性癩麻贅痛風皮病浸
蝕瘍硬結腫癌瘍等攝生ヲ慎テ用ウレハ奇効アリ
或曰午莠根代用メ同効ヲ收ムト又夕曰世此
藥ヲ以テ治梅ノ聖藥トスト益レ前藥此藥ヲ用
テ始テ効ヲ奏スルカ將夕配伍ノ藥ノ功ナルカ
抑此藥ヲ用ウル時緊シク攝生ヲ慎ムカ為メカ

必スシテ此藥ノ功トノ云フヘカラス

方例 梅毒良方 依薩尔沙根二朴屈福烏多一薩沙

布羅私錢二右二比ノ水ニ浸ス一晝夜煮テ一比ヲ

取ル○全經久沈痼ノ症一方薩尔沙根 朴屈

福烏多猪右熱湯四比ヲ以テ浸ス一晝夜煮

テ半ヲ減シ亞刺比亞半薩沙布羅私錢二ヲ加ヘ泡

出シ用ウ此餘滓ヲ取り水多量ニ煮日常飲料ト

ス但シ患者多血強壯ナラハ刺絡下劑稀釋方法

浴法等ヲ施シ虚人ハ此午前本劑一比ヲ服レ午

後再餘ノ煎湯ヲ飲ム食餌ハ軟化ノ品消化レ易

キ物ヲ用ウ兼テ汞劑ヲ用ウル尤モ良ナリ猛汞
 酒劑ハ此劑ニ混和シ貯フヘカラス之レヲ用ウ
 ルニ當テ加服スヘシ此法持長ニ利アリ沈病ハ
 三月モ持久スヘシ用藥ノ間温煖ヲ保スヘシ寒
 冷ニ冒觸スレハ効ナシ蓋シ此劑ヲ功ナシト為
 スノ人ハ持長保煖ヲ慎マサルニ望スレハナリ
 榆白皮量服ハ北ヲ水八北ヲ以テ煎シ北ヲ以テ煎シ
 功用發汗ノ効ナリ頑強痲痺汞劑ニテ愈ヘサル
 者連服セシムヘシ
 土伏苓量服液ヲ取ル

功用發汗ノ効アリ儂麻質痛風梅毒ニ効アリ藥
 木飲ト為シ汞劑ノ佐ト為スヘシ
 射屈福鳴多量服一北錢ヲ至二十四錢水三北ニ煮伍配
苳、蜀羊泉、薩尔
沙等ニ配ス
 功用解凝發汗衝動利尿ノ効アリ胃及ヒ諸藏ヲ
 健ニシ惡液ヲ清シ皮膚諸病慢性儂麻質痛風腺
 病等ヲ治シ惡液酷厲液ヲ發越シ又夕汞劑ニ佐
 トメ其功ヲ助ケ瞑眩ヲ拒キ或ハ汞劑効ナキ者
 ニ用井テ効アリ但シ其性薩沙布羅私ニ同ク熱
 性多血ニ害アリ故ニ刺衝少キ藥ニ配スヘシ

方例 朴屈煎 袖 朴屈木屑 二 甘草 半 右水 二 匕 以
 テ煮テ一匕ヲ取り每一時半一茶碗ヲ服ス ○ 朴
 屈煎一方 依 朴屈木 三 薩尔沙 二 黄檀 一 甘草 一 蜀
 羊泉 各 二 薩沙布羅私 六 錢 右水十匕ヲ以テ朴沙檀
 三味ヲ煎シ半ヲ減ス餘品ヲ入レ煮ルヲ四分時
 瀘過シ五六ヲ服スル日ニ三四回
 朴屈華尔斯 性効本藥ニ同ク其力尤凡勝ル多量
 長服メ通利ヲ促ス五入至十二入ヲ用ウ慢性痺
 麻質痛風ヲ治ス益シ熱退テ病毒除カス萎衰忘
 惰ノ者粘液皮病内攻等ニ的應ス但シ多血焮衝

腸胃汚物瘵病等ニ禁スヘシ若シ發汗ノ力ヲ進
 メント欲セハ阿芙蓉、托歇爾私散、安質没、硫黄等
 ニ配スヘシ梅毒、皮病、痛風、骨痛等ニハ汞劑ニ伍
 スヘシ浴ヲ兼施メ尤凡良ナリ ○ 一方 扶 朴屈華
 尔斯 蜀羊泉熬 各 二 錢 失鳩荅熬 硫黄花 甘汞
各半 右二入ヲ一丸ト為シ每服十九日ニ二次 ○
 遷延、痺麻質痛ノ丸劑 依 朴屈華尔斯 四 石礮 半 右
 三入ヲ一丸トシ甘草ヲ衣トス每服六丸八丸日
 ニ二三回 ○ 一方 扶 朴屈華尔斯 半 金硫黄 甘汞
 失鳩荅熬 各 一 苗香油糖 右散朝夕半劑ヲ服

ス○中風預防ノ一方 扶 朴屈錢半 酒石錢一 白糖錢半 右散朝夕其半ヲ服シ二三日連用○朴屈華爾斯揮發下幾劑或 朴屈華爾斯ヲ礪砂加石灰精ヲ燒酒者六十度右先ヲ華爾斯ト燒酒トヲ和シ精ヲ加フ其功峻烈刺衝發汗解凝ノ効アリ 痺麻質痛風諸症等ノ頭痛ニ効アリ 服量二十滴六十滴ニ至ル小量ノ水或粘液舍利別等ニ和スヘシ 大量ノ水酸類酸性塩ト和スヘカラス○朴屈華爾斯下幾劑同華爾斯錢一燒酒者二十度右浸ス六日 功用前二同シ 每服三四十滴其性太夕峻ナリ妄用スルコ

勿レ又夕此物ニ水ヲ和スルコ勿レ服後水ヲ飲ムコ勿レ共ニ華爾斯ヲ分解スレハナリ○一方 扶 朴屈華爾斯下幾錢一亞刺比亞漿錢一扁桃舍利別 橙皮舍利別各半 右每服半食七日ニ三次 白瑞香服五分至二錢ヲ煎ル 配 薩爾沙午莠根 功用性酷厲胃ニ入テ危殆ノ歟衝ヲ發スルノ毒アリ 梅毒骨痛潰瘍骨塊腫黴性痛風等ニ効アリ 又夕經久皮病ヲ治ス 方例皮病惡性瘍ヲ治スル方 依 白瑞香 甘草各 羊蹄根 午莠根各一 右水三斗ニ煮テ十八コ

ヲ取り飲服 四回 ○外用ニハ此皮ヲ直ニ皮膚ニ貼シテ發泡スヘシ

雙鸞菊 服量 丸散 半ハ至十ハ或一ハ至十ハ或二ハ至七ハ

功用 衝動發汗劑ニメ遷延聖京屈梅毒痛風膝痛

子宮漏血經久ノ者ニ良ナリ熬劑ハ藥力尤凡峻

ナリ煮沸ニ過クレハ性効ヲ失フ此レ有毒ノ品

タルヲ以テ多量ナレハ瞑眩ヲ發スルト他ノ麻

醉藥ニ同シ植物酸醋揮發衝動藥阿芙蓉量小等能

ク解毒ス熬劑ヲ用ウルニ先ツ下劑ヲ與ヘ其夜

一ハ第二夜二ハ第三夜四ハ至ル若シ瞑眩ノ

徴アラハ後服ヲ止ム又夕癩癩失心ニ効アリ

方例 一方 雙鸞菊熬ハ白糖 右十六貼ニ分チ

朝夕一貼 ○聖京屈治方ハ雙鸞菊熬 半安質沒酒

右二十滴至三十滴朝夕服ス ○痛風定時發作

方袖 雙鸞熬ハ硫酸規尼扭 桂油糖ハ右散 卜為

レ每服一貼 日ニ三次 ○一方ハ雙鸞熬 甘汞五

蒲公熬半錢 右午莠根末ヲ加ヘ六十丸卜為レ朝

夕一丸ヲ服ス

民埜列利精 服量 自一錢 配伍 清涼解癢衝動等 **禁** 諸酸

塩、石、灰、水、諸、土、諸、塩、金、屬、塩、ヲ、忌、ム

醫家必携 卷之一

功用 勁銳發汗劑ニメ血液運行ヲ推蕩スルコトナ

ク熱病ニ宜トス輕症聖京屈、痺麻質熱、々性瘡疹

痘、麻、赤斑熱等、焮衝甚シカラサル者、劇性聖京屈

熱ノ病末、分利ノ微アリテ未タ竄透衝動劑ヲ用

ウヘカラサル者、水腫ノ蒸氣閉塞、斑熱消散ノ早

キニ因テ来ル者ニ効アリ

方例 一方 接骨花水三全羅布濃煎劑五錢民埴列

利精一錢右八分時間ニ服ス○一方 袖民埴列利精

至安質沒酒二錢接骨花水六錢屋施茂兒一錢右每

半時或ハ一時一二食ヒヲ服ス

托歇尔斯發汗散

功用 發汗良方ニメ皮膚痙攣ヲ發シ蒸氣鬱閉シ

肌膚冷ヘ滲淡萎縮、脉小緊實ニメ數ナル者、瘧性

疼痛、慢性痺麻質、痛風、腰痛、膀胱痛、顔面痛、梅毒痛ニ

用ウ又夕泄瀉、下利、聖京屈、痺麻質性ヨリ来リ腸

ニ感痛スル者、皮表水腫ニ効アリ熱病瀉血後或

ハ此藥ヲ用ウルコトアリ○發汗散方 依阿芙蓉一

吐根一孕礬酒石九右散ト為シ服ス若シ的功ヲ

要セハ臨卧ニ温飲ヲ用ウヘシ

的里亞加服一錢半至一錢半

功用 温熱性功ヲ以テ寒性粘液質熱候退テ後衰
 弱スル者ニ用ウ疼痛ヲ止メ不寐ヲ安ンシ胃寒
 ヲ發汗シ鎮痙ノ功アリ虚痘ヲ起シ膿ヲ釀ス丸
 焮衝多血諸病ニ大害アリ舊方駁雜メ用ニ當ラ
 ス新製ノ良ナルニ如カス新製方拔太比桂益智
 乾姜各ニ 纈草ニ 阿芙蓉精製三錢 蒲萄酒蜜煮テ
去比 右阿芙蓉ヲ研和シ次ニ餘藥ヲ入ル此劑一
 錢ニ阿芙蓉一匁ヲ含ムト云フ
附録 依氏 過汗ヲ制スルハ保護調攝ヲ慎ムニア
 リ夜被度ニ適シ飲ヲ禁シ幾那、鉄劑、懈皮、沒食子

等ヲ良トス○一方 大黃一錢 白礬半錢 阿仙藥二錢 蚕
 休熬半錢 柘榴花一錢 右三匁ノ丸ト為シ每時四九
 ヲ與フ又夕落葉松寄生過汗ヲ止メ殊ニ能ク肺
 勞ノ消耗汗ヲ止ムト云フ
補 **石炭** 繆布涅尔氏癩病ニ用法及ヒル所ノ實幾氏
痛風ニ稱用スル所ノ
方例 癩病方 安荅刺古加里或ハ加里○ニ 安荅刺
 金硫黃三匁 煨麻屈涅失或ハ三匁 右三味調勻三包
 トシ一日夜ニ服盡ス之ヲ用ウル數日ニ至レハ
 全身或ハ一部抗力ヲ發シ熱ヲ起シ汗ヲ發スル

ニ至ル而メ始テ其効ヲ見ルヘシ○又夕慢性皮
病消食機良者安荅刺ハ甘草末五右二味混和

日二三劑新製腐蝕加里石炭

製法 新製腐蝕加里石炭色ノ者ヲ良右二

味火ニ上セ攪拌シ熬乾セシメ火ヲ下シ温乳鉢

ニ入レ研末シ硝子器ヲ温メ之レヲ入レ固封シ

貯フニ濕ヲ引キ易キカ故○硫化安荅刺古加里ナ

ル者アリ上方ニ硫黄華半ヲ加フ製法前ニ同

石炭油 服用病ノ輕重ニ隨フト雖凡長用メ三

ハ半年一年過キサレハ久遠ノ効ヲ見ルナリテ結

方例 痛風ノ慢性痺麻質私ニ近似シ尚ホ且ツ骨

節焮腫石灰質ノ物分泌スルニ用井テ偉効アル

ノ方 石炭油 生安質母尼各一鵲栗拔奴護錢二

蜀羊莖末六錢右四味調勻二ハヲ一丸ト為シ甘草

末ヲ衣トナス每服六丸至十九日三次○骨節癢

着スル者ニ外用メ内服ノ効ヲ助ルト尤凡多シ

（Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 水腫, 利尿, 腎臟, etc.)

○利尿劑總括

凡ソ分泌ヲ催シ小水ヲ利スル藥之レヲ利尿劑ト云フ然レ分泌ヲ妨ケ小水ヲ不利ナラシムルノ病其因亦タ多シ故ニ其藥モ亦隨テ異ナリ乃チ緩和強壯鎮痙解凝諸劑瀉血法ノ如キモ運用ノ妙ニ從ヘハ皆此域ニ筭入スヘシ今此篇ニ舉ル所ノ者ハ特リ世ニ通用スル利尿劑ト稱メ分泌ヲ催シ小水ヲ利シ泌尿器衰弱、沕乙ノ増息メ或ハ局所ニ溜渚シ或ハ全身水腫スル等ノ症ニ宜シキ藥是ナリ若シ泌尿器焮衝シ血液鬱積シ

利尿減少レ或ハ過多レ或ハ尿道閉塞メ尿閉ヲ致シ器械ヲ用ウヘキ症ノ如キハ此藥ヲ與フルニ當ラサルナリ

海葱 服量 六半八至 伍配 熬劑トノ配シハ 腎ノ症ニハ 鹿角 精固性揮發ノ石鹼等ニ伍スレ

功用 利尿祛痰催吐解凝ノ効アリ **利尿** 水脉官能

萎衰スルニ由テ發スル水腫腹水胃腸粘液鬱滯ヲ兼ヌル症ニ偉効アリ大約初起ニ用ウルヲ以テ益々良トス但シ胸水ニ粘液喘息ヲ兼ヌルノ外多ク用井ス間歇熱後ノ水腫ニ承劑又タハ機

那規尼担等ヲ配スルヲ緊要トス且ツ此品胃ヲ刺衝メ消化ヲ害ス健胃劑ヲ兼用スヘシ大抵體質弛弱覺機遲鈍ノ人此藥ニ堪ユヘシ而メ多血鬱蓄覺機敏銳發熱焮衝脉緊實症ヲ發シ凝體衰弱血液溶崩内藏硬結アル症痔疾泌尿諸器ニ瘡瘻ヲ帶ヒ潰瘍膿腫結石ヲ兼ヌル如キ諸症ハ皆此藥害アリ **祛痰** 經久ナル肺藏聖京屈粘痰咯出レ難ク粘液喘息粘液癆百日咳等ニ良ナリ 此按ニ **催吐** 小兒肺胃大ニ粘液ヲ

蓄ウル者ヲ吐ス **解凝腸胃** 粘液壅塞腸間膜腺閉
塞黃疽等ニ効アリ苦味解凝熬劑汞鈇劑等ヲ配
メ可ナリ

方例 清涼利尿方 依海葱一純精酒石 砂糖各六

右十貼ニ分チ日ニ四回服ス ○清涼一方 依海葱

十二純精酒石 實芟荅利私六右六貼ニ分チ日

ニ三次服ス此方尤宜シ若シ嘔吐ヲ催セハ其ノ

量ヲ減スヘシ ○健胃利尿丸 依海葱二健質二葛

私加里 錢二薄苛油六亞尔托舍利別 宜適右百二十九

ト為シ日ニ三次三丸ヲ服ス ○海葱醋蜜 依海葱

醋海葱 微煖方海葱 細剉四 出スル 硝子壘 固

去リ醋水 薄苛水 和シ 每時若クハ一時半 一食

七ヲ服シ 利尿 蜂蜜 二味混和ス 此方最良ナリ 利

尿祛痰ノ功アリ 年紀ニ從テ五分至三錢 日ニ二

三次服ス ○祛痰丸方 依海葱一護謨安沒尼 錢二石

礮 右丸ト為ス ○利尿丸方 依海葱熬 十二蘆薈

熬六健質熬 錢二杜松油 滴二十杜松末 宜適右二瓜ノ丸

ト為シ 每服十九日ニ二三次 ○外用海葱膏ノ方

扶海葱醋 宜適護謨安沒尼 半煮テ硬膏ト為シ 寒腫

殊ニ膝ノ寒性腫ヲ分解スルノ良藥トス

格兒失屈謨

功用 水腫、粘液性喘急ヲ治ス又夕慢性痺麻質痛

風等ニ殊稱アリ 按ニ武氏痛風脚痛ニ稱譽シ依

多ク用フ但シ有毒ノ品タルカ故ニ妄用ヲ禁ス

戒慎メ清涼中和塩ヲ伍用スヘシ

方例 格爾失屈謨醋蜜 格爾失屈醋葱 一ヲ製法海

蜜ヲ右調勻シ半錢至二錢ヲ用ウ民埜列利精ヲ

加ヘテ利尿ノ奇効アリ

實 芟 荅 唎 斯 服量 一ハ至二ハ五分 神識諸病ニ按ニ法氏曰

テ初切ヲ分見ルニ至ル漸トク加 伍配 阿芙蓉ニ伍ス

功用 利尿ノ効アリ又夕心臟運動ヲ弛緩メ脉動

ヲ遲鈍スルノ能アリ水腫、顔面慘淡、肌冷、脉弱、結

メ不齊、浮腫メ皮膚軟ナル者、運行不順ヨリ閉塞

ヲ致セル水腫、經閉水腫、胸水、腹水ニ切アリ赤班

熱後ノ水腫、又腦水ニ甘汞ヲ伍ス又夕苛烈麻醉

ノ毒アリ其功力直ニ動脈一系ニ達ス而メ其効

速ヤカニ發セス服後一二日或ハ服ヲ停テ後ニ

發シ其猛力ヲ残スアアリ腸腎ニ器神經ニ走ル

過服メ瞑眩ヲ發スレハ惡心、昏冒、見ル者綠色ヲ

成シ脉搏減シ利尿過多、冷汗出、吃逆、搐掣ヲ發ス

此物又夕替留熱間歇熱脈數肌燥譫語失血ノ恐
 レアリテ利尿乏シキ者諸失血殊ニ瘧性咯血崩
 血妊婦脫血瘰癧諸症肺勞ノ覺機敏捷胃寒時ナ
 キ者胸痛及ヒ心藏尿管厥損又心悸烈シキノ症
 等ニ効アリ但シ嫩衝病急性病ハ用ウルヲ勿レ
 其効力數日留在メ或ハ其病ヲ激抗スルヲアレ
 ハナリ

方例利尿散 依 實芟荅 沙糖 右二十貼二分チ
 朝夕一服 ○心藏失常方 神 實芟荅 沙糖 一
 右一貼トシ日ニ二服 ○利尿方 全 實芟荅 甘汞

海葱熬 各半 過泥子油 右散一貼トス日ニ二三
 服 ○肺勞方 全 實芟 鉛糖 各一 沙糖 右一服ト
 為シ毎夕一服 ○利尿一方 全 實芟荅 錢 葛斯加里
 半 氏埵列精 海葱熬 桂舍利別 右水十ヲヲ
 以テ上ノ二味ヲ煮テ八ヲ取リ瀉過 餘藥ヲ
 加ヘ毎二時半若クハ三時ニ半食七ヲ服ス又夕
 加ヘテ一食七ニ至ル ○治頭水方 神 實芟荅 甘
 汞 砂糖 右散八貼二分チ 每時一服 按ニ小兒
 酌ス其量ヲ斟 ○丁幾劑 藥量八倍ノ燒酒ニ浸出
 ス服量十滴二十滴三十滴ニ至ル ○浸劑 藥量

一錢液五勺或八勺ニ浸出ス依曰每時一七ヲ服
メ吐下ヲ發スルニ至ルト

杜松子

功用利尿發汗温煖驅風ノ効アリ胃ヲ害セス反

テ食機ヲ助ク持重ニ用井テ他ノ利尿劑ニ勝ル

一遠シ蒸氣閉塞内藏虚弱ノ腹水胃虚風氣膨滿

酸液粘液皮病等ニ良ナリ又夕間歇熱癩麻質痛

風ヲ預防ス但シ多血焮衝性ニハ宜シカラス婦人

衰弱月經遲渋シ萎黃病ヲ兼ル者ニ良

方例煎劑酒浸水浸皆可ナリ水酒浸劑共ニ半ヲ

ヲ浸メ六勺ノ液ヲ取ル〇一方袖杜松子一蒲公

英錢各二甘草二右搗碎泡劑ト為ス〇杜松子油服

一滴至アリ利尿ノ効アリ傑列乙羅布共ニ發汗

利尿ノ効アリ〇複方杜松子精穴杜松子北格墨

因小苗香北各半燒酒九北度者右浸ス一日水適

宜ヲ加ヘ蒸餾メ九匕ヲ取ル利尿健胃驅風ノ良

効アリ水腫ニハ三四錢ヲ實芟荅海葱等ニ伍シ

用ウ〇一方扶杜松子油錢半實芟荅丁幾劑錢一甘硝

石精錢二每服三十滴至六十滴日三次

木賊

...

功用 利尿ノ外保固收斂ノ効アリ血液神經ニ變
 動ヲ生セス腎藏衰憊血脉弛緩黒血ヲ利シ及ヒ
 血ヲ尿スルヲ治シ腎膀胱ノ細石粘液ヲ除キ泌
 尿器虚弱メ尿ヲ分泌セサルヲ強壯ニシ蒸氣ノ
 閉塞ヲ腎ニ向テ分利シ皮膚病、癩麻質、痛風等ヲ
 治シ或ハ過汗ヲ制メ小水ヨリ利セシム但シ熾
 衝病殊ニ腎熾衝夫レヨリ發スル小便頻數尿血
 硬腫、癌腫、血液溶崩等ニ害アリ

方例 一方 密木賊錢二三 水半 煮テ漉過シ 大人ハ半
 茶碗 一茶碗 小兒ハ一七二七ニ至ル ○外用乳汁

ニ煮テ陰部ヲ温メ淋痛ヲ治ス

洋芹子水

搗爛シ水ヲ取

金雀花

葉花

皆利尿ノ効アリ金

雀花ハ膿煎シ白芥子ヲ加ヘテ腹水ヲ治ス根モ

亦浸劑ト為スヘシ

結兒歇兒

功用 祛痰利尿ノ効アリ勞瘵久咳咯血水腫ニ用

ウ

方例

一方 依結兒歇兒新鮮汁 淨消石六八 或五種

開達根舍利別錢四 右調勻シ日ニ四次久シク用ウ

ヘシ

德兒非奴謨

功用 水腫ノ良藥ニメ腹水腫下體ニ及フ者ヲ治

ス

方例 一方依德兒非奴謨ヲ火酒ハ右浸シ瀘過メ

十二滴ヲ用ウ日ニ四次

沃諾瀦斯

功用 利尿ノ効アリ小便澁滯粘滑劑効ナキ者ニ

利アリ又タ肉癩ヲ治ス散ト為シ日ニ一錢ヲ服

メ奇効アリ

孕礪酒石

量服 利尿半錢至一錢 禁諸土、金屬、酸化、羅屈、塩、礆

等ヲ忌ム

功用 二便ヲ利シ解凝ノ効アリ水腫腹水赤班後

ノ水腫慢性水腫等ニ効アリ慢性症ハ衝動利尿

藥ニ伍シ持長スルニハ保固強壯藥ニ配スヘシ

拔尔撒謨骨泔波

量服 二十滴至三十滴

功用 泌尿器ノ粘膜ニ利アリ故ニ淋疾ニ宜シ

衝全ク退キ慢性ノ徵ヲ標スル者陰莖勃起或ハ

ク退カサレ覺ユルハ全ニ用ウ否ラサレハ

起シ淋止シ尿澁リ攝護畢丸焮腫メ尿道硬結狹

窄等ヲ遺ス粘性遷延肺病モ亦タ然リ焮衝隱伏

スル者ニ用ウレハ焮衝ヲ再起ス慎ムヘシ故ニ
 腎膀胱攝護腺ノ膿潰白帶下慢性聖京屈熱無キ
 者肺藏萎弱水液胸中ニ蓄積スル者等ニ効アリ
方例白糖若クハ香竈水亞刺比亞漿蛋黃ニ和シ
 用ウ○後淋白帶下一方袖格泮波錢二亞刺比亞末
錢一蒸餾水宜適右乳トナシ百藥煎末鉄屑健質錢各半一
 ヲ加ヘテ二分ヲ丸ト為シ每服八九日ニ三次
拔尔撒謨加奈荅 性功主治服法共ニ骨泮波ニ
 同シ
的列並底那 量服至五二十分

功用衝動温暖利尿ノ効アリ大量ニ用ウルキハ
 瀉下ス泌尿器萎衰ニ由ルノ諸症皆用ウヘシ尿
 道粘液鬱蓄潰瘍小便閉後淋精道衰弱等焮衝ナ
 キ者ニ用ウヘシ誤テ焮衝ノ有無ヲ檢セサレハ
 大害アリ水腫泌尿器衰弱ヨリ来ルモノニ功ア
 リ
方例一方扶的列並半錢鷄子黃一箇加密列水錢四
 亞尔托舍利別右乳劑ト為シ每時一食七○丸或
 ハ乳ト為スニ亞刺比亞鷄子黃ヲ加ヘテ為スヘ
 シ○外用メ膏ト為シ功用尤モ多シ

同油

功用 本条ニ同シ過量ニ用ウレハ尿崩遺精尿血等ヲ發ス○膀胱方依的列並油錢二蜂蜜一右每服一茶七日ニ二次○條蟲方袖的列並油錢一蜂蜜二右五箇二分チ一日夜服○膽石溶解スル方今的列並油錢一亞的尔錢三右朝夕二十滴至三十滴乳清ニ和レ服ス○癩癩方合的列並油二錢至薄苛水一亞尔托舍利別一右乳劑每二時一二食七○外用利尿擦方扶的列並油 海葱醋各二捲埵尔精三右腹部ニ擦ス○頑固後淋注射方袖的列並油

錢一 鷄子黃箇一 蒸餾水一 右注射ス

〔荒着〕自四分一 〔配伍〕亞刺比亞甘扁挑ヲ配シ至半人一人 〔丸劑〕乳劑ヲ製シ用ウ

〔功用〕 悍烈刺衝ノ劑ニメ陰具泌尿器ニ走ル故ニ

衰弱症他因ヲ狹マス膀胱官能萎衰麻痺スルノ小便閉及ヒ水腫膀胱括約筋麻痺スルノ小便失禁遺尿纖維弛緩ノ經久石淋或ハ漏精過多陰萎失精等ニ宜シ又夕恐水病凶症未發ノ前ニ用井テ預防ノ効アリ窒咳百日咳病末覺機遲鈍粘液質ヲ良トス慢性神經病角弓反張癩癩麻痺等及ヒ神經熱ニ用ウ是皆其神經ニ感スルノ効ヲ取ル但シ此苛

烈ノ毒性誤用スレハ小便難尿閉尿血陰具焮衝
慾火妄動甚シキハ煩悶ノ斃ルニ至ル粘滑劑温
乳亞刺比亞漿加羯布羅等ヲ解毒ト為シ且ツ軟
和粘劑ヲ腎部ニ貼シ或ハ唧筒法ト為スモ亦夕
良ナリ

方例慢性水腫方 依 芫菁末六阿芙蓉清淨者右十

二丸トナシ朝夕一丸漸ク半丸ヲ増ス○狂犬毒

恐水病方 同 芫菁六桂皮十二沙糖十三玫瑰舍利

別適右三十九ト為ス一五丸中ニ芫菁一歳ノ兒每

時一丸四歳二丸七歳以上四丸大人六丸兼テ芫

菁膏ヲ創口ニ貼ス○疫咳方 袖 芫菁丁幾劑二複

方幾那丁幾劑右每服二十滴至四十滴日二三

○芫菁丁幾劑方 芫菁一錢燒酒二十度右浸出入

ル下六日初服量五滴至十滴二十滴用升而後漸ノ加

此テ液十滴微下芫菁一ルニ至五滴ト或曰覺機敏捷ノ

者此方最良ナリ但シ主治禁戒本条ニ同シ多量

ノ粘滑劑ニ和シ服スヘシ○外用ノ道三網アリ

一曰刺衝是レ神經熱等ニ施スノ法二曰利導是

レ儂麻質等ニ施スノ法三曰打膿是レ咬傷毒等

ニ施スノ法ナリ詳ニ次篇ニ載ス

附録依此過尿モ亦調攝ヲ慎ムヲ要トス務テ水液飲料ヲ避ケ温覆メ膀胱ニ向テ注ク所ノ液ヲ皮表ニ輸サシムヘシ利尿過度ノ症ニハ白丸乳糖ヲ良トス其方牛乳ニ七煮テ白丸二錢ヲ加フ兼テ催臨劑ヲ與ヘ酸味食物菓瓜肉食ヲ禁ス尿管渴太ク利尿飲ム所ヨリ多ク尿質糖狀ニ變スルハ危症ナリ前方ヲ與ヘ攝養ヲ謹ムヘシ其因ハ腎ノ官能病ヲ得テ興奮シ拮掣性ヲ成スニ由ル又夕蜜尿モ補給力一種ノ異變ヲ得テ常有ノ鹽ヲ生セス糖ヲ生スルナリ此症ニ於テハ阿英

蓉ヲ主藥トス大量連服シ兼テ肉食ヲ命スヘシ

門人

山田靖

宮寄覺

同校

結城敬

醫家必携卷之一終

醫家必携卷之一

Faded vertical text columns within a rectangular border, likely bleed-through or very light ink. Some legible characters include '門人', '宮', '山田', '肉', '命'.

主集小六大量數類... 兼肉食命...

醫藥十部

Kitasato Memorial Medical Library