

醫家
義推
乃

中

⊗

i 61

醫士川文庫

⊗

499.2

Iκ

2



東京川口野田

1888

499.2

I



No. 5148

18 / 61

499.2
I1c
2



富士川文庫
3331

醫家心携卷之二目次

○通經劑總括

護謨安沒尼亞幾 沒藥 苗草根 薩毘那

雜夫藍 墨列僕里 良姜 礪砂 ○阿魏鎮

劑瓦尔拔奴謨同蘆薈下 芸香鎮 薄苛驅 健質風

加密列發汗鐵劑強壯麥奴麻醉羗活強神衝健質風

亞那劑強壯附錄一道益督三奈五谷

○殺蟲劑總括

施綿失那 太那設點謨 綿馬 鷓鴣菜 大

蒜 胡桃 石腦油 ○阿魏鎮 牛膽強壯汞

解凝的列並底那利尿劑 拓榴皮收斂劑

○驅風劑總括

過泥子 茴香 益智 葛儂子 杓椽皮 橙

皮 胡安子 薑 菖蒲 三奈 薄荷 孟荅

幾里期把 肉豆蔻 刺巴子 草零陵 胡椒

耶麻依加姜 蕃椒 ○丁香強壯劑 良姜通經

劑

○祛痰劑總括

甘草 乳糖 黠失刺護 匪卒布 伊里私布

魯連底那 剝禮瓦刺亞麻刺 遠志 乙切草

魯髦哩耶應布羅荅 百尔藍獨留謨 砂糖

蜂蜜 拔尔撒謨字露附魯堂 拔尔撒謨 ○

土木香強壯劑 護謨安沒尼亞通經 拔尔撒謨骨

洋波利尿劑 拔尔撒謨加奈多全 亞刺比亞護謨和緩

亞尔托全 達羅侃篤護謨全 沒藥通經 硫黃凝解

金硫黃全 結尔茂斯密涅刺列全 依蘭苔強壯劑

海葱利尿劑 蘇黃 小葱

○清涼劑總括 固刺亞尔刺里 陣之亞慎

杓椽汁 酒石酸 硝石 酸摸 清涼仁 蔬

菜 熟菓醋 ○荅麻林度下劑 純精酒石全 民埕

列利精發汗劑篇 礪沙解凝劑篇 硝酸收斂劑篇

○解凝劑總括

礪砂 酒石葉 固注亞尔加里 剥多亞斯

酒石塩 石礪 硫黄 水銀越真屋布私密湿刺列○外取○加

兒羅塩酸金塩 安質沒尼母 金硫黄 海綿

炭 木炭 加尔剥亞扭麻里獸炭沃實湿 塩

酸重土 白屈菜 濱翟麦 蜀羊泉 蒲公英

大半夏 紫堇 睡菜 水萬苣 鬱金 艾

葉 ○孕礪酒石下劑篇 孕礪酒石全

○緩和劑總括

亞刺比亞護謨 達羅侃篤護謨 亞尔托根

錦葵 沙列布 亞麻仁 扁桃 阿列襪油

蓖麻油 鹿角 鯁膠阿蜜蠟 諸麦、米、亞尔魯

密菓

醫家必携 卷之二

醫家必携

醫家必携卷之二 聖藥天閣 聖藥天閣 聖藥天閣 聖藥天閣

米澤

堀内淳忠亮

輯

通經劑總括

經閉之通以經血之匱乏ヲ補ルル藥之ヲ通經劑
ト云フ但シ經閉ノ因固美ル多端其藥亦
外隨テ多端ナリ其瘧瘵ニ因ル者鎮瘧劑ニ宜ク
官能衰弱ニ因ルハ刺衝強壯劑ニ宜ク多血ニ因
ル中瀉血脚湯等ニ宜ク然レハ許多ク藥

劑中又夕自ラ通經ノ性効ヲ具有スル者有テ存
スレハ則チ收テ此篇ニ入ル、ナリ而テ衝動強
壯ノ通經藥ニ宜シカラサルノ諸症アリ即五姪
婦子宮諸病急肉ノ硬類天葵終尽之期子宮出血ノ
癖アル者處女膜厚強宮口腔内愈合ノ經閉スル
者等はナリ

護謨安沒泥幾 量服至五二八十八 伍配石礮苦味熬劑安

甘硝石精
等ニ伍ス

功用 鎮瘻通經解凝祛痰ノ効アリ肺ノ分泌ヲ進
メ血行ヲ奨進シ壅閉ヲ開達ス故ニ内藏脉管等

ノ官能萎衰粘液溜滞閉塞ニ由ル慢性腹肚諸病
ニ効アリ肝脾閉塞黃疸飲食不化陰部萎衰或ハ
閉塞ニ瘻孿ヲ兼ヌル經閉又夕白帶下ニ効アリ
且ツ内藏壅塞ニ由ル腹水及ヒ胸水初起ニ用ウ
粘液喘息慢性胃寒粘痰咯出シ難キ者等ニ効アリ
然レモ熱性ニハ妄用スヘカラス慢性胸病ニ
ハ初ヨリ用ウヘシ

方例 解凝一方依護謨安沒 石礮 蒲公熬各二

右三八ノ丸ト為シ甘草ヲ夜トナス日ニ四次五
丸ヲ與フ○通經一方依護謨安沒 沒藥各二蘆

蒼乃薩昆那油十二滴調勻三入ノ丸ト為シ銀箔ヲ

衣ト入日ニ四次五丸ヲ與フ○外用硬腫寒腫ヲ

消散ス即チ膏ト作スヘシ

沒藥服量 三至半錢

功用衝動防腐解凝通經祛痰ノ効アリ故ニ胃腸

虛弱粘液鬱積消化不良門脉腸間膜腺閉塞陰部

弛緩衰弱ニ由ル月經不順白帶下ヲ治ス經閉陰

部虛弱ヲ兼ル者此藥尤切的トス又夕粘痰喘

息慢性胸病胃寒咳嗽粘液勞肺勞ニ効アリ多血

嗽衝性ニ害アリ真肺勞ニハ尤切戒慎スヘシ

方例 粘液胸病一方 沒藥半乳糖二右日ニ四

次一卵匕ヲ與フ乳糖欠ル片ハ砂糖麻屈涅失分

ヲ以テ製ス按昆斯ノ方乳糖肺勞一方神沒藥

錢二拔尔撒謨亭露半錢阿芙蓉熬三右二入ノ

丸ト為シ每時二丸○通經一方 沒藥 瓦尔拔

奴 墨列僕里熬錢各一蘆薈半葛私薦儂謨ノ右二

以ノ丸トナシ每用十九日ニ二三次○外用腐性

瘡瘍ヲ治ス

苗草根服量 細末半錢日三次効ルハ

功用 經血ヲ催進スル人効アリ又夕骨病ニ用フ

然レ氏或ハ乍メ取ラス
ト母雖ニ依氏此藥ヲ排
ト雖ニ依氏此藥ヲ排

據ル片ハ歴試トメ有効ノ通經藥タリ且ツ性功平
穂ニ方毒ヲ根取リ橙皮汁苗香日ノ五右水六骨病此煎

煎劑ニ加フ取リ冷定シ一香日ノ五右水六骨病此煎

劑ニ加フ取リ冷定シ一香日ノ五右水六骨病此煎

薩毘那量服多散ラトハ煎ハ一弓水一錢ヲ以テ液煮

功用其性峻烈ノ通經藥トス覺機遲鈍血液運行

溢滯シ陰部官能萎衰弛緩ニ由ル經閉ニ異効アリ

少多産或ハ屢々半産スルノ婦人老年ニ至テ子

宮腫レ白帶下子宮病惡液質ヲ兼ヌル者等ニ効

アリ殊ニ頑固白帶下大ニ効ヲ得ルアリ越按ニ

實幾經過多ニ効ヲ收ムルニ試飲用ノアルヲ加ヘテ

又夕慢性痛風ニ良或ハ云フ此藥能ク墮胎スト

嘗テ妊婦ニ試ルニ血液沸騰メ咯血ヲ發スル

アリト雖氏胎ニ於テハ恙ナシ但シ多量ニ用ウ

レハ瞑眩ヲ發ス戒ムヘシ○薩毘那油性烈服量

半滴ヨリ四滴ニ至ル砂糖ニ和シ服シ或ハ乳劑

ト為ス

方例一方袖薩毘那一兩水七右文火ニ煮六弓ヲ

取リ桂舍利別ヲ加ヘ毎時半碗ヲ服ス○一方

取リ桂舍利別ヲ加ヘ毎時半碗ヲ服ス○一方

扶加密列 默栗沙 薄荷錢各二 薩毘那錢一 右沸湯

二碗ニ浸シ朝夕其半ヲ服ス ○一方 昆 薩毘那熬

沒藥熬各一 橙皮末四 沙糖一 右一劑ト為シ日

二一二次服ス

雜夫藍 服二十至

功用 一種爽神ノ効アリ過服スレハ失笑ノ死ニ

至ルコアリ且ツ發汗通經ノ効アリ肺ノ感冒毒

ヲ解散シ惡液痘ノ内陷ヲ托出ス經血適々来リ

疼痛困難スルニ數日前ヨリ之ヲ與フ又夕鎮瘧

ノ効アリ小兒ニ尤モ良兼テ粘液ヲ解キ咳嗽ヲ

治シ聖京屈毒ヲ解散ス性熱然モ銳烈ナラス但

シ焮衝病ニハ用ウヘカラス

方例 浸劑 泡劑 ト為スハ每服十ハヲ用ウ ○小兒

散 袖 雜夫藍八 遏泥子末半 麻屈涅失一 纈草末各

錢 伊里斯布魯連半 甘草二 右散每服小刀尖二

三抄日ニ二三次 ○外用藥囊ニ劑シ心窩ニ安シ

嘔吐胃瘕ヲ治ス

墨列僕哩 服散至十五ハ浸ハ二錢至四錢

功用 古人吐下ノ効ヲ稱ス又通經ノ能アリ虛家

粘性閉塞ニ由ル經閉ニ用ウ服後閉塞已ニ開キ

身體倦怠腰痛腹脹經將ニ来ラントスルノ徵ヲ

呈スルハ其功ノ見ル、ナリ又夕意識病鬱憂癩

狂及ヒ虚性水腫ニ用ウ水腫ニハ其量ヲ増シ下利ヲ促スヘシ

方例通經一方依墨列僕里熬 蘆薈 礞鉄花各半

雜夫藍二錢阿芙蓉一右大黃丁幾劑ヲ加ヘ二

ノ丸ト為シ甘草末ヲ衣トス日ニ五丸ヨリ十二

丸ニ至ヲ用ウ又痔血ヲ通ス○水腫一方或墨

列僕里熬 沒藥熬各等葛尔儒葉末 右丸トナ

シ初メ朝夕一丸漸増メ八九十九ニ至ヲ用ウ

良姜量服半錢至二酒浸トス或ハ

功用性温ニメ強壯健胃通經ノ功アリ

方例健胃通經方依健質一白芷 良姜各三刪篤

里 薄荷各一老里兒拔加杜松子 胡妥子各六

錢 火酒十一ヲ以テ丁幾劑トシ日ニ三回半七

ヲ服セシム同

研砂量服至五至三十ハ禁忌金屬酸加尔發重土硫酸麻屈温失

等忌

功用通經制酸ノ効アリ多血瘕性ニ由ル經行不

順遲澁疼痛ヲ兼ルノ症子宮虚弱或分娩遲滯子

宮機力ヲ失シ陣痛微弱ナル者ニ効アリ症ニ從

テ清涼興奮鎮痙藥等ニ伍メ陣痛ヲ奮發シ生ヲ
催ス多血甚シキ者ハ刺絡後ニ用井知覺鈍ナル
者ハ麦奴ヲ加フルヲ妙トス又夕能ク鶯口瘡等
ヲ治ス

方例 催生方 袖 硃砂 錢一 雜夫藍 十 桂油 滴二 右二服ト

シ 每半時一服 ○同 全 硃砂 消石 錢各一 沙糖 錢二 右

散 每半時一茶匕 ○同 兼痙方 全 硃砂 十六 至 阿芙蓉

蓉 至四分 八 桂油糖 乃一 右散 每半時一服 ○鶯口瘡方

全 硃砂 錢一 玫瑰蜜 三 右一茶匕 日二 四次 用按ノ可ナ外

附録

依氏吐下汗尿劑ノ末ニ皆其排泄過多ヲ制

テ漏血過多ヲ止ムルノ方ヲ載セシ今姑ク

昆斯等ノ書ニ據テ略々其一ニ示スノミ

凡ソ經血過度ノ症或ハ頻發シ或ハ過多ナルヲ

以テ危險トス能ク其因ヲ跡テ之ヲ治スヘシ多

血沸騰等ヨリ来ルハ退焮法、痙攣ヨリスルハ鎮

痙法、衰弱ヨリスルハ強壯法ヲ行フノ類是レナ

リ然レ一時止血療法ヲ施スヘキハ全服ニ冷水

ヲ貼シ或ハ冷水ヲ腔中ニ射入シ乳房ニ軋角ヲ

施ス等皆ナ一法ト為スヘシ ○一方 明礬乳精

明礬 ○一方 明礬 半吉納護 護 右 每時一劑 昆 ○

醫家心法
卷之三
目録

一方麦奴五桂白糖一劑ト為シ日二四次越
○一方收斂亞的尔五滴桂丁幾劑四十大麦煎二
和シ與フ謨

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

○殺蟲劑總括

蛇ノ自ラ保ツ所以ノ者ハ粘液巢アルヲ以テナ
リ巢ナケレハ蛇モ亦夕保ツト能ハス故ニ解凝
刺衝メ下利ヲ發セシムル者ヲ以テ其粘液ヲ解
キ其巢ヲ破ルトヲ要スヘシ然レ唯條蟲ハ一旦
ニ之ヲ驅斥スルト難キ力故ニ續用メ其全功ヲ
收ムヘシ

施綿失那散至二三為ハ大人半錢至一錢小兒十以

六取ル液至二為ハ大人半錢至一錢小兒十以

功用透竄苦味ノ殺蟲劑ニメ蛇蟲、蟻蟲、諸蟲ニ偉

功アリ

方例殺蟲方 依施綿錢一藥刺巴一錢至蜜半右小

兒每三時小茶七大人其量ヲ増ス兼大人癩癩、蛇吐

酒加石三〇蛇熱方 扶施綿錢二梅那錢一水三泡出シ

瀉過シ扁挑油錢四亞刺比亞乳劑ト為ス和胸舍利

別錢八硝石錢一右每時一七〇虛性蛇症方 袖施綿

纈草定各瀝シ熱湯ニ泡出シ半時冷胡桃熬 福布

蔓液 橙皮丁幾劑各半橙皮舍利別半右每時一

茶ヒ

太那設黠謨量服以散テト為ハ一刀至一錢浸劑一弓ヲ

強弱ニ

功用 刺性香竄苦味ノ殺蟲藥ト為ス又夕發汗利

尿ノ功アリ 蟻蟲ニ由ル播掣ニ良或曰殺蟲ノ功

施綿ニ減セスト 〇油アリ内外用ノ殺蟲ノ効アリ

リ二滴至五滴ヲ他ノ殺蟲劑ニ加フ

方例殺蟲丸 扶太那熬 枯失亞熬錢各二太那油滴十

右二匹ノ丸ト為シ朝夕十九ヲ服ス 驅蟲膏昆

太那油適牛胆 石礮錢各一右軟膏ト為シ腹ニ擦

ス

綿馬量服三一錢至三一錢小兒

功用 殺蟲ノ効アリ殊ニ條蟲ニ妙トス

方例 條蟲方 綿馬二錢或ハ三錢ハ大人ノ量ナリ 依氏曰三錢ハ大人ノ量ナリ

虚人減スヘシト 此藥ヲ用ウルノ前一日煮肉ノ汁少許ヲ與ヘ 依氏曰与脂油蒸汁 次早空心芳葯水ヲ

以テ服ス依氏同シ 珍曰水舍利一時ヲ過テ依氏

日服後又ク前量ノハ藥ヲ擦皮桂末等 甘汞藤黃二味

ノ峻下劑ヲ與フ依氏接骨子羅布薑右頓服ス 珍黃

ノ方羅布ナクアリ而後始テ茶ヲ許スヘシ 下劑

服メ効ナクハ苾硝或瀉利塩ハ半ヲ或ヲ與フ 依氏

全トシ又ク 自ラ出ル者ハ引出若シ猶出スハ二

三日依氏 ヲ過テ又夕前法ノ如ク用ウヘシ但シ

虚人 妊婦ハ用ウル勿レ ○綿馬油効尤 峻

十八滴至二十滴每朝空心ニ服ス後蓖麻油清下

浸劑ヲ用ウ期 蘇ハ 蘇ハ 蘇ハ 蘇ハ 蘇ハ

鷓鴣菜散 二十錢至四錢 煎代 蘇ハ 蘇ハ 蘇ハ

功用 殺蟲ノ効アリ瘰癧ニ 稱用ス蓋シ沃實涅ヲ

含メハナリ煎用シ又夕燒キ末ニスヘシ

大蒜服 絞汁半 乳至 浸劑ハ 以テ浸出ス醋

功用 驅蟲利尿ノ効アリ乳ニ煮テ每朝二食七ヲ

用ウ又夕唧筒法ト為ス或ハ曰ク條蟲ヲ驅ルト

用ウ又夕唧筒法ト為ス或ハ曰ク條蟲ヲ驅ルト

石腦油

功用殺蟲ノ効アリ又夕條蟲ヲ治ス

方例條蟲一方依石腦油二錢阿魏三錢龍胆宜適右三八

分九トナシ毎時三九ヲ與フ

胡桃

量服小熬ヒトヲ用ウニ三

功用殺蟲ノ効アリ實ノ外皮ヲ燒酒ニ浸シ寒性

風氣攣急ノ腹痛ヲ治シハ痲症ニ青皮ハ梅毒ヲ

治ス熬ト為シ浸未熟テ熬トナ熟湯ニ二三七ヲ

用井テ蚊ヲ殺ス○油亦軟和驅蟲ノ効アリ

方例梅毒一方依胡桃青皮一熱湯比ニ浸出スル

六時煮ル一四分時ニメ漉過シ聽用ス又夕熬ニ

水ヲ和シ用ウルモ可ナリ○胡桃油五ヲ用井

テ條蟲ニ妙ナリ

(Faint bleed-through text from the reverse side of the page)

○驅風劑總括

腸胃中ニ激炭刺衝スル所ノ風氣ヲ上下ニ驅斥

シ疼痛ヲ寛解スルノ藥之ヲ驅風劑ト云フ凡ソ

風氣腹痛ハ胃腸他ノ刺衝ニ由テ痙攣ヲ起シ疼

痛ヲ發シ又々其刺衝毒ノ為ニ消化諸器常ニ失

テ衰弱ヲ致シ風氣ヲ生ス故ニ香竈刺衝揮發油

性ノ藥ヲ以テ宜トス然レ其因ニ隨テ治方亦

夕一ナラズ粘液汚物壅塞ニ由ル者ハ之ヲ通シ

痙攣劇甚ニ由ル者ハ阿芙蓉ヲ加ヘテ療スヘシ

若シ腸ニ焮衝アリテ痛ヲ發スレハ此劑宜シカ

ラス其脉緊實ナルト痛ヲ發スルノ因症下ヲ檢
メ刺絡、清凉、菓仁乳等ヲ用ウヘシ

過泥子 散 錢十以テ六ヲ八ノ浸劑ハ液ヲ取

功用 性効大ニ苗香ニ類ス驅風劑ト為人風氣疝

痛ニ効ア少殊ニ旃那ニ伍ル以テ之ヲ防外ニ

微ニ刺衝性アリ能ク乳ノ分泌ヲ増ス油多服ス

レハ譫妄ヲ發スルヲ除クニ滴ヨリ六滴ニ過ク

ヘカラス

猫香 散 上ニ同シ浸劑ハ二錢ヲ浸テ六ヨリ八

功用 興奮、鎮痙、驅風、祛痰ノ功アリ小兒酸液ニ由

ル腹痛、泄瀉、合併症ニ良藥トス又夕肺胃ノ粘液

ヲ解ク初生兒腹痛苗香水ニ服量ニヨリ八ヨリ或

ハ麻屈涅失ヲ加用ス便秘ナクハ白罌粟舍利別

ヲ加フ油劑、服量ニ滴至六滴砂糖ニ和ス子根共

利尿ノ功アリ

方例 增乳方 氏方 麻屈涅失 半 苗香 橙皮 各二

右散 每服一茶匙

益智 散 至三ニハ

功用 性温ニメ強壯、利尿、發汗、通經、驅風ノ効アリ

又夕能ク胃及ヒ頭ノ胃寒ヲ治ス

葛縷子 格墨因 服量 二品共二錢至四錢水至一錢浸劑ハ

六手八手ノ液ヲ取ルニ葛油一滴 功用 二品共ニ性温ニノ風氣ヲ驅リ痙性腹痛ニ

効アリ熱性ニハ用井ス

栲櫟皮

功用 橙皮ト同効ニメ苦味香氣稍々劣レリ藥用

モ亦少シ

橙皮 服量 散ハ水ハ刀至半錢浸劑一ヲ取リ蒲萄酒或

功用 健胃興奮驅風ノ効アリ故ニ間歇熱食機缺

乏風氣膨脹胃痙虛性失血等ヲ治ス又夕強壯ノ

効アリ殊ニ胃腸ヲ強壯ニス

方例 福布曼健胃酒 袖 橙皮黃 弓 青橙 桂 各ニ剥

薦亞斯 弓 燒酒 弱者 加斯加栗熬 亞尔鮮熬 王健

質熬 膳菜熬 各一 杓櫟皮油 錢 福布曼鎮痛液 仁

右越列幾劑ト為ス每服六十滴八十滴ニ至ル或

ハ一茶七〇健胃酒方 扶 福布曼健胃酒 扶 橙皮下

幾 錢 格綸僕熬 刀 右每用八十滴日ニ二次 〇 鉄酒

扶 橙皮 括失亞 膳菜 〇 山奈 良姜 健質 絡

弓 幾那 弓 精製鉄屑 錢 六 右剉 燒酒 八 弓 浸ス 〇

緩下散 昆 橙皮 大黃 孕鹼酒 石 略 右一茶七

〇

〇

服ス○油劑尤銳烈トス方依橙皮油十滴砂糖六錢伊里斯布魯連二錢右時々小卵七ヲ服シ胃虚ヲ治ス○青橙服量橙皮ニ同シ○同花 乾ク者香脫ス未服スヘシ十五人至晚近多ク煎錫水ト為ス古人癩癩ヲ治スト云フ今多ク鎮痙劑ニ伍メ子宮病、神經病、痙攣諸症ニ用ウ○露水八服量一弓至二弓或ハ一食七ヲ服ス○葉強壯温暖ノ功アリ或ハ癩癩ニ用ウ纈草、薄荷二伍シ散用數人至二錢又夕浸劑ト為スヘシ

胡妥子

功用性温ニメ強壯、驅風ノ効アリ橙、桂、茴香、薄荷等ト伍シ酒ニ浸シ寒性胃痛ニ用ウ服量定限ナシ

薑

服量散二月一日

功用胃虚、食機缺乏、風氣、胃腸粘液積滯、痛風、鼓脹

胃咳、寒性嘔吐ヲ治ス古人肺聖、京屈ノ末期ニ祛痰劑トス此物能ク胃腸衝覺ニ機衰弱スル所ノ

粘性諸症ニ用ウ按ニ李氏方牙賣加地薑アリ日

健胃ノ劑トシ凡消化不良、風氣充脹症ニ温

又夕痛風ヲ拒キ粘ク痔疾等ニ良ナリト勅カサ

劑一方此物及ヒ腸ノ加感觸敏ナル症等ニ用ウ或ハ

刺答尼ヲ加フヘシ

方例三香散袖姜 桂 益智分等 右半茶匕ヲ水若

ハ酒ヲ以テ用ルヲ日ニ三次○敗血病方昆沙羅

葡萄三極末鉄屑一大黃半乾姜二白蒲萄酒北二浸

ス一六日ニメ瀘過シ每服一茶蓋日ニ四次○外

用ハ含嗽劑トナシ懸壅垂扁桃腺ノ弛緩ヲ強固

ニシ口筋麻痺ヲ治ス

葛蒲カクミク量服散半錢至一錢浸劑四錢食ヲ浸シ伍配幾那、額

氏阿芙蓉液ニ伍ス

功用性温、刺衝強壯、驅風ノ効アリ惡性神經熱腐

敗熱、粘液熱病末、或ハ下利ヲ兼又ル症ニ効アリ

脉數、血液頭腦ニ滲リ腸胃汚物アル者等ニハ用

ウル一勿レ間歇熱、腸胃虚弱、酸液、風氣、蛇蟲、依卜

昆垓兒、子宮病、腸胃虚弱ニ由ル者ニ良ナリ胸腔

諸器衰弱スル粘液病、痰咳、白帶下、敗血病、腺病、水

腫等ニ用井又夕間歇熱ニ幾那ニ代用シ經久痛

風、胃寒等ニ用ウ

方例胸膜焮衝、神經熱ニ變スル終期ノ方昆水楊

梅三葛蒲二錢共ニ泡ルハ桂露一亞刺比亞各半

橙皮丁幾右調勻○葛蒲煎依、按、頑、強、方葛蒲半水

二煮液ヲ取テハ橙皮舍利別半一ヲ龍腦合亞刺比亞漿ニ

十二阿芙蓉液滴ハ右每時一茶七一晝夜ニ服盡

ス〇又夕能ク酒劑精劑ニ製シ風氣腹痛ヲ治ス

三捺 量服 單五分ニ至ル

功用 性温ニメ驅風健胃制酸ノ効アリ

薄苛 量服 一散六人至十五人油一滴至四滴水劑每服

取 **功用** 健胃驅風通經ノ効アリ胃痙嘔吐風氣疝痛

下利ヲ兼又ルノ症ニハ散或ハ油ニ阿芙蓉ヲ加

フ依卜昆垚兒子宮病神氣虛憊眩暈神經性頭痛

食機衰弱痙性胸痛喘息百日咳等ニ良ナリ炊衝

性ニハ用ウルヲ勿レ又夕神經熱腐敗熱ニ腸胃

學急諸症ヲ兼又ル者ニ用井月經遲澁痛ヲ兼又

ル症ニ良トス〇油劑殊ニ辛熱ニメ刺衝健胃ノ

良劑トス功用本条ノ如シ此油苗香油ト同効ニ

メ稍烈ナリ水劑浸劑皆用ウヘレ

方例 喘息方 昆薄苛水 沙羅蔔水 各三民垚列精

二沙糖錢四 琥珀塩一 右每時一食七〇外用ノ乳房

凝結ヲ解キ且断乳ノ時毬布トナシ乳汁ヲ稀解

レ膿瘍ヲ拒ク又夕腺ノ硬結羅斯樣皮膚焮腫僕

醫家必携 卷之二

七

麻質痛、腹部ノ攣痛等ヲ鎮メ、又英病等ノ小兒ニ
強壯浴法ト為スヘシ

孟塔幾哩斯把薄苛一薄種量服全薄苛ニ

功用性中和、辛温、其油薄苛ニ同メ弱シ故ニ症ニ

因テ却テ宜キヲ得風氣酸液、胃痛等ヲ治ス胃ノ

覺機敏ニメ薄苛水ノ辛烈ニ堪サル者ノ如キニ

良ナリ

方例健胃一方、依孟塔三奈、施綿各一鉄屑錢二

右散トナシ二十四貼ト為シ、毎時服ス又夕能ク

經血ヲ通ス若シ患者虚弱ナラハ強壯補血ノ方

ヲ行テ此散ニ薩昆那油一滴ヲ加用スヘシ○同

今孟塔油二十滴桂末一錢沙糖二右散一卵匕ヲ服ス

體温ヲ増シ蒸氣ヲ發シ又夕能ク利尿、通經ノ功

アリ又夕陰痿ヲ治ス或曰陰痿ノカヲ減スト雖ト○

外用薄苛ニ同シ

肉豆蔻附肉豆蔻膜服量散五、外至一、府利、散二、滴至六

功用性辛熱ニメ衝動、驅風、鎮痙ノ効アリ消食機

衰弱、粘液、風氣、嘔吐、泄瀉、疝痛等ニ用ウ又夕虚性

久下利ヲ治ス他藥ニ加ヘテ醜味ヲ消ス膜尤熱

性核ハ收斂性ヲ兼又共ニ驅風強壯ノ良藥ナリ

方例豆蔻散 扶豆蔻三赤石脂半右散ト為シ六包

二分毎時一包〇一方全大黃二喇蛄石二亞刺比

亞各一舍電阿芙蓉液二豆蔻二右散ト為シ日ニ

二三服〇油外用ノ風氣痲痛胃痛嘔吐等ヲ治ス

刺巴子草零凌香二品共ニ驅風健胃ノ効アリ多

ク用井ス

白胡椒浸ハ熟スル者ヲ海水ニ量服五粒至二十粒

功用健胃驅風ノ効アリ又夕間歇熱ニ用ウ又夕

嚏藥トナス但シ焮衝病ニハ害アリ **必百里**捏胡椒

熱ヨリ取ル所ノ解 間歇熱ヲ治ス然レ確實ノ功機

那ニ及ハス

方例間歇熱方 袖胡椒二錢燒酒二時二桂水四橙

皮舍利別二右毎時半食七

耶麻依カ胡椒量服五分至伍配温強壯諸

功用健胃驅風ノ効アリ疝痛ヲ治ス

蕃椒量眼九分至十錢取至二錢含嗽劑

功用健胃驅風ノ効アリ鼓脹水腫惡性咽腫間歇

熱ヲ治ス

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

○祛痰劑總括

肺ト氣管トノ裏膜ニ無數ノ小腺アリテ粘液ヲ分泌シ以テ外氣ノ刺衝ヲ拒クヲ其常トス若シ疾病アリテ此粘液或ハ稠凝或ハ稀薄或ハ酷厲ヲ致スコトアレハ之ヲ和解メ其稠凝ヲ稀シ其稀薄ヲ溥シ其酷厲ヲ包攝驅除スヘキノ藥之ヲ祛痰劑ト云フ然レ疾病ノ多端ナル此ニ利アレハ彼ニ害アリ一定通治ノ藥アルコトナシ苟モ當ヲ得テ之ヲ行ハハ刺絡消焮鎮痙麻醉ノ諸法何者カ祛痰トナラサラン今唯此ニ尋常咯痰和解ニ

需之所ノ諸藥ヲ舉クルル

甘草 散五弘至十人煎二錢至半ヲ浸割半

功用 緩和祛痰ノ良藥ニメ呼吸器急慢諸病ニ効

アリ酷厲ヲ包攝シ肺ノ聖葎屈胃寒ニ由ル咳嗽

聲嘎粘液肺勞等ニ用ウ肺焮衝ノ初メ亞尔托麗

春花等ニ劑メ防焮ヲ要シ中コ口茴香加密列等

ニ劑メ解凝ヲ要シ終ニ亞兒尼加等ニ劑メ全切

ヲ要スヘシ故ニ麻疹胃寒熱病及ヒ胃腸尿道等

ノ焮衝ニ用ウ又夕淋疾結石等ヲ寛解シ頑固酷

厲ノ皮膚病痛風癩麻質等ニ藥木飲ニ加用ス然

レ凡又夕別ニ主能ナシ唯他藥ノ配伍ニ供スヘ

シ○甘草膏アリ銅氣ヲ含ム者ハ再製シ用ウヘ

シ**功用** 共ニ本条ニ同シ咳嗽ノ家常藥トナシ又

夕ヨ外丸藥ノ用ニ供スルニ良ナリ

乳糖 牛驢ノ乳ニテ製ス散若クハ溶シ用

功用 緩和祛痰ノ功アリ下利ヲ發ス呼吸器焮衝

勞瘵性慢性胸痛遷延感冒粘性喘息等ヲ治ス或

ハ曰玫瑰浸劑ト合メ内藏閉塞ヲ開キ依ト昆垓

兒ノ惡液質ニ變スルヲ除キ痔疾ニ良ナリト○

乳清アリ肺勞内藏壅塞癩瘰英病皮病泌尿器諸

病ニ良小兒乳餌ヲ少クモノニ滋養ノ効アリ製

細々精義初

方例和胸散神乳糖一亞刺比亞五沙糖三右每服

一茶匕

點失刺護服煎劑一手ヲ以テ水一伍配機那鉄丁幾

伍

功用粘膠ニメ少ク收斂ス咳ヲ治ス粘性弛弱ノ

肺病遷延胃寒粘液勞ニ變シ易ク腺腫質ノ人肺

ニ小瘍ヲ生シ愈テ又夕發スルモノ又腺腫諸症

ニ用ウヘシ幾那効ナキニ効アリ腺腫ノ小兒顔

色青白腹脹眼爛ル者ハ長服メ効アリ新絞汁ハ

軋葉ニ勝レリトス一弓至二弓ヲ服ス

方例和胸飲扶布爾拔斯花ニ點失刺護接骨花

亞尔托甘草各一伊里私布魯連苗香各二右

泡出ス煎去之入水中煎之入茶中飲之

匪卒布微草苦伍配甘艸亞兒托

功用粘痰ヲ解キ咳ヲ治ス嫩衝性病ニ適當セス

伊里私布魯連底那散大人一刀至半

功用生鮮ハ催吐峻下ノ能アリ軋ク者ハ微ニ刺

衝シ其功ヲ肺ニ達ス粘性胸病遷延喘息冒寒咳

等ニ良但シ焮衝性病ハ用ウルヲ勿レ又夕小兒

瘵癰腹痛ニ制酸劑ニ加用ス

剝禮瓦刺剝禮瓦刺亞麻刺亞麻刺煎劑煎劑半ヲ以テ水一食匕ニ

功用 粘液勞ニ用ウ真膿勞焮衝性肺病ニ適當セ

ス

方例 儂麻質熟去テ咳ヲ遺ス方 昆剝禮瓦刺 依

蘭苔蘭苔 甘草膏甘草膏 右上ノ二味ヲ煮テ八弓ヲ取

リ甘草膏ヲ加フ或ハ機那ニ伍ス

遠志遠志 散五弘至十弘三弘液ヲ取リ每服一錢ヲ以

功用 刺衝性ニメ水脉呼吸器粘膜ニ走リ解凝發

汗利尿ノ功アリ又夕胃神經ヲ刺衝シ延テ肺神

經ニ及フ肺衰弱シ咯痰ヲ妨クル諸症肺焮衝後

ノ咯痰難ナル者又夕脉實ニメ熱未夕退カス焮

衝ノ餘炎猶消盡セサル者亦夕用ウヘシ要スル

ニ第二期ニ用ウルヲ良トス此症ニ用ウルハ

等ニ伍但シ真焮衝ニハ害アリ義膜喉腫第二期

瀉血後ニ用井テ能ク再發ヲ拒キ又夕神經熱神

經性聖京屈熱假焮衝ヲ兼又ル者痘麻諸疹熱或

ハ疹内陷メ假肺焮衝ヲ發スル者ニ良且ツ遷延

粘液性胸病喘急粘液勞經久冒寒粘痰ヲ咯出シ

難キ者水腫胸水症焮後ニ發スル等ニ良又夕毒

蛇咬傷ニ散一乃至半錢ヲ用井テ良此物浸劑尤

モ良始メ大量ニ用ウルヲ禁ス咽喉及ヒ胃中ニ

抵觸メ吐瀉煩悶等ヲ發スルコトアレハナリ

方例遠志煎扶遠志ニ亞尔托亞舍利別半右水煎

四弓ノ液ヲ取り舍利別ヲ加フ毎時一茶七〇利

尿方異遠志ニ海葱醋蜜一右水ハ弓ヲ以テ煮テ

五弓ノ液ヲ取り醋蜜ヲ加ヘ毎服一食七〇遠志

治眼焮衝驗方越遠志分五右一日ニ服ス八日ニメ

効アリ按ニ焮衝稍減メ赤色鈍痛ノ症

紅切草服散一錢花穂一握ヲ泡劑ト為

功用和胸愈創利尿ノ効アリ按ニ此物稍ク抜

葡萄酒ニ浸シ勞症ニ用ウ又夕乳汁凝固乳核ヲ散

ス〇外用メ愈創藥ト為ス

魯覽哩亞應布羅答量服丁幾

功用粘液性痙攣性ノ喘息粘液咳等ノ妙劑トス

海葱遠志護安但シ毒アリ過用スレハ瞑眩ヲ

發ス丁幾劑ト為ス尤モ良ナリ

百吹瀾獨留謨量服散十

功用刺衝麻酔ノ性失鳩答ノ如シ粘性間歇熱粘

液勞、冒寒、瘰癧性勞症、初發、焮衝ナキ症、又夕腫瘍、緣圍弛、縱膿汁多ク持久メ止マサル者ニ良、但シ焮衝現在スル片ハ用井ス且ツ真肺瘍ニハ効ナ

方例 一方 袖 百爾蘭度 半 亞刺比亞 六 乳糖 一 砂糖

二 右散每服一茶七日ニ三四次

砂糖

功用 纖維緊急ヲ緩メ、酷厲刺衝ヲ包攝シ、胃寒、乾咳ニ効アリ、諸藥ニ加合シ、舍利別、昆設、尔布等ト為ス、砂糖一弓半、諸藥油半錢ヲ和シ、磨勻シ、油糖

劑トナン之ヲ水ニ和メ、諸藥露水ニ代ユ

蜂蜜

功用 緩和解凝、祛痰、下利ノ効アリ、油類ト伍メ、結

石痛ヲ緩ニス、食機乏シキ症ニハ意ヲ用ウヘシ

蜜ハ砂糖ヨリ解凝ノ性強キ力故ニ真肺勞ニハ

用ウルヲ勿レ、此物多クハ他藥ニ合シ用ウヘシ

方例 屋施茂兒 依 蜂蜜 三 醋 一 煮テ適宜ノ稠トス

清涼稀釋、祛痰ノ効アリ、呼吸器焮衝諸病ニ用ウ

一弓至二弓

拔尔撒謨淳露

附 魯加 拔 尔撒謨 量 服

至三十滴

功用骨并霍ニ同シ更ニ辛熱トス肺病ニ用ウ熱甚シキハ蝮蛇霸王塩等ヲ與ヘ運行ヲ鎮靜シテ後ニ用ウ粘液勞ニ良冒寒後頑強ノ痰咳肺管攣急等ニ効アリ然レモ焮衝及ヒ酷屬性肺病ニ害アリ

方例前症ヲ治スル方依的列並油 亭露各半硝子壘ニ入レ暖メテ溶和セシメ乳汁砂糖等ニ点服ス此物ノ辛熱ヲ以テヨク的列並ヲ揮發ス默加拔尔撒謨亦他ノ拔尔撒謨ト効ヲ同フシ尤モ好品トス多魯堂拔尔撒謨亦亭露ニ似テ辛熱ナ

ラス没藥護謨安没尼金硫黄ト合シ丸トシ用ウ共ニ解凝和胸ノ効アリ

此は清涼劑總括の前の諸篇ニ舉ル者ヲ主トナシテ
凡ク清涼劑ノ功ヲ論ズルニシテ先ニ
人身生々ノ機心藏脉管ノ抵抗力大ニ亢進シ
過大體軀ノ温度太シク超過スル者ヲ調理抑制
スル功ヲ云フモ之ヲ清涼劑ト云フ凡ク焮衝熾
盛膽液諸熱ニ的應スルモ是ナリ
○水ノ如キハ尤モ清涼藥トスヨク焮衝ヲ撲滅ス外用ノ菴
覆濯浴等ノ法アリ氷モ亦小片ヲ外用メ鎮熱ノ
功アリトス

○清涼劑總括

此は清涼劑總括の前の諸篇ニ舉ル者ヲ主トナシテ
凡ク清涼劑ノ功ヲ論ズルニシテ先ニ
人身生々ノ機心藏脉管ノ抵抗力大ニ亢進シ
過大體軀ノ温度太シク超過スル者ヲ調理抑制
スル功ヲ云フモ之ヲ清涼劑ト云フ凡ク焮衝熾
盛膽液諸熱ニ的應スルモ是ナリ
○水ノ如キハ尤モ清涼藥トスヨク焮衝ヲ撲滅ス外用ノ菴
覆濯浴等ノ法アリ氷モ亦小片ヲ外用メ鎮熱ノ
功アリトス

枸橼汁 服量 自一至三勺

功用 煖衝熱、膽液熱ヲ清凉ニシ失苟尔倍苦ニ効アリ又夕酒石塩等ト和メ痙性嘔吐ヲ治ス

方例 鎮嘔飲 扶炭酸剥多亞斯錢二枸橼汁 宜適右飽和

ヲ待テ蒸餾水ヲ三覆盆子舍利別ヲ加ヘ一時每

二食七ヲ服人飲所謂里歇利○清凉飲 依大麦煎

枸橼汁、沙糖、右適宜ニ合和ス又此液ニ沙糖

ヲ加ヘ煮テ舍利別ト為ス尤凡便宜トス○一方

昆淨硝石錢二枸橼汁一泉水十沙糖 宜適右每時半茶

蓋ヲ用テ栗斂子、桑椹等亦同効アリ

酒石酸 服量 散五至二錢至十人飲ト為ハ自一 **禁忌** 亞里諸土加

炭酸羅屈、塩、石、灰、鈴、性、諸、塩、配、者、唯、鎮、嘔、屈、塩、土、製、ス

金属、酸、化、硫、肝、等、二、伍、七、ス

功用 清凉ノ良品 枸橼汁ノ缺ヲ補フヘシ腸胃熱

煖衝熱及ヒ其熱腐敗神經性ニ頗ク症ニ良下痢

ヲ恐ル、モノハ用ウルト勿レ法氏曰腹部、氣管

等ノ粘液ニ因ル熱病ニ此等ノ藥ヲ用ウヘカラ

不腹部ノ症ハ加蜜列浸氣管ノ症ハ接骨浸ニ民

埴列精ヲ加ヘテ足ル只煖衝ヲ見テ蟻針植酸等

ヲ概メ用ウルハ固ナル力ナ

方例 清凉方 袖酒石酸一錢 橙花水四至 覆盆子

舍利別一右 每半時一食七〇 擬造利没奈堙依酒

石酸二 沙糖 拘椽油四滴 白湯北二 右研磨ス〇 鎮嘔

散 昆麻屈三六 酒石酸八 砂糖全 右合六

包二 分一 包一 水二 点二 滾沸二 衆ノ 服ス〇 一

方 滾沸散 扶麻屈七 酒石酸八 湯北二 右研磨ス〇 鎮嘔

酒石酸 沙糖各一 右散ト 為スモ 按ニ 此等ノ 滾沸

シ 要スル ハ 宜シ 散五 煎一 至二 錢十 忌禁 烈性 諸酸 硫酸 伍配 此藥 甘ノ 緩

硝石散 煎至 錢十 忌禁 烈性 諸酸 硫酸 伍配 此藥 甘ノ 緩

托煎阿芙蓉等 伍ス 沃私 爾伍 七ス 酸伍 配伍 性此 藥甘 緩

功用 清凉 防焮ノ魁品主藥タリ 脉勢大過 肌熱壯

盛ヲ 減シ 燥渴ヲ 潤シ 血液凝滯ヲ 稀渙シ 利尿ノ

効アリ 又夕 能ク 腸ト 皮膚ト ノ 分泌ヲ 進ム 通利

尤モ 真焮 衝諸熱ニ 用テ 他藥ニ 冠タリ 胸部真焮

衝腸痛劇甚ノ 僂麻質熱焮 衝性ノ 諸痛頭痛等ニ

効アリ 但シ 緊脉已 緩シ 焮衝熱減セ ハ 硝石ノ

量ヲ 減ス ヘシ 又夕 乾咳多血等 硝石三 四錢ヲ 用

ウルニ 至ル 者アリ 實性失血症 刺絡ト 并行ス ヘ

シ 肺焮 衝麻疹 勞咳ノ 如キ ハ 却テ 咳ヲ 増ス 者アリ

リ 妄ニ 投ス ヘカ ラス 但シ 麻疹焮衝ノ 期ニ 用ウ

ヘシトス然レモ反テ痛ヲ促スコアルヲ以テ純
 精酒石ヲ用ウルノ宜キニ如カサルナリ焮衝病
 兼テ利尿ヲ要スル紅火疹後ノ浮腫ノ如キニ用
 ウ肝焮衝嘔吐ナキ者モ亦夕用ウヘシ嘔吐アル
 者ハ汞劑加阿芙蓉ニ利アリ子宮焮衝劇甚ナル
 者ニ用ウヘク虚候アラハ用ウルコ勿レ小兒痘
 熱焮性ノ者ニ良九リ此劑多服スルト雖モ久用
 スヘカラス虚候ヲ生スルコアルヲ恐ル、ナリ
 惡性瘡疹亦内陷ノ恐レアリ又夕失血症ニ用ル
 ニハ尤モ戒慎スヘシ蓋シ硝石ノ性血液ヲ稀渙

スルカ故ニ固トヨリ的當スル者ニアラス此藥
 又夕胃腸咽喉焮衝等直ニ其部ニ觸ルヘキ症ニ
 ハ用ウルコヲ禁スヘシ

方例 小兒生齒痛咳嗽便秘睡中驚惕等出血ナキ
 者ノ方依硝石錢一白罌粟舍利別錢十右每半時一卵
 七〇鎮痙散袖硝石錢一孕丸酒石錢半銀朱錢二右研和
 レ每時半茶匕冷水送下〇散劑方袖硝石錢一亞刺
 比亞錢一砂糖錢一右散六貼トレ每時一服〇飲劑
 方袖硝石錢一亞刺比亞錢二蒸餾水錢五亞尔托舍
 利別錢一安質沒酒錢二右每半時一食匕〇胸

焮衝方昆亞尔托煎根半消石錢亞尔托舍利

別半右調勻亞

酸模服量

功用 清凉、防腐、効アリ、惡液失、苟尔陪苦ヲ治ス

方例 失、苟兒陪苦方、酸模葉搾液三山、菴、碎米、水

萬苴搾液各右、每朝、枵腹ニ服ス

清凉仁 胡瓜、甜瓜、瓠瓜、西瓜等、四種ノ仁是ナリ

功用 諸仁共ニ軟和、滋潤ニメ、油脂ヲ含シ、酷厲ヲ

包攝シ、刺衝ヲ撫循シ、粉質ヲ帶ヒ、仁乳ト為スヘ

ク、扁桃、亞麻ニ異ナラス、或ハ硝石ヲ加テ用ウル

モノアリ、但シ辛、發、腐敗ヲ檢スヘシ、是レ反テ害

アリトス、惡、刺、衝、毒、味ニ、鮮、刺、藥

蔬菜 萬苴、洋芹、馬齒莧、菠薐菜、是ナリ、味、甜、酸、苦、

功用 又、夕、清凉ノ効アリ、新鮮ニメ、酸味ヲ帶ヒ、苦

粘性アルモノ、其液ヲ搾取メ、藥用ニ供ス

熟菓 林檎、梨子、李、桃、葡萄等、是ナリ、香、甜、酸、

功用 清凉ノ効アリ、焮熱、膽液症、間歇ノ壯熱等ニ

用ウ、然レモ多食メ、下利ヲ發セシムルヲ勿レ

醋 醫藥ニ供スルハ、蒲萄酒醋ヲ多ク用ウ

功用 清凉、鎮癢、防腐、發汗ノ効アリ、外用メ、洗劑、奄

劑、含嗽劑、唧筒法トス又夕能夕阿芙蓉毒吐後

用テ其毒ヲ解ス○蒸餾醋更ニ清淨トス

方例膽液熱、胆液質疝痛、下利等又夕其腐敗ニ傾

ク者方依熱湯北四蒲萄醋ヲ常舍利別半酒石塩錢一

福布曼鎮痛液乃二右每半時二七○香罈醋或醋

葛蒲 白芷 亞尔蘇 撒尔非亞 芸香 府利

羯布羅精右八味醋ヲ以テ六味ヲ浸出シ漉

過シ羯布羅精ヲ加フ嗅藥ト為メ神經諸症ニ効

アリ又夕惡性傳染病ニ預防藥トス

○解凝劑總括

細管ノ壅塞ヲ解達シ血液ノ凝泣ヲ稀渙スル藥

之ヲ解凝劑ト云フ然レモ其解凝ノ功亦區別ア

リ一曰疏利解凝即チ腸管ノ裏面ヲ刺衝シ粘膜

ノ分泌ヲ促ス中和塩ノ類是ナリ二曰稀釋解凝

即チ衝動ノ力ヲ以テ吸收管、水脉、腺等ノ官能ヲ

奮ヒ諸液ノ稠膠ヲ解キ腺ノ閉塞ヲ開キ滲出液

ヲ吸收スル或膜ノ形亞尔加利、石礮、水銀等是ナ

リ三曰刺戟解凝即チ分泌、吸收ノ二機衰敗シ或

ハ痙攣ニ阻碍セラレモノヲ興奮鎮靜シ其蓄

利疏

液ヲ疏解スル安質母扭製劑沃實涅及ヒ吐下藥
等ヲ輕服スルノ類是ナリ四曰固壯解凝即チ塩
性苦味ノ保固強壯藥ノ類是ナリ

鹵砂量服自自五分至十分或配伍阿芙蓉、菲沃斯、護謨、安

沒尾甘草禁砂、鉛、糖、水、銀、刺、薦、亞、私、曹、達、消、酸、銀、等

功用 緩性刺衝解凝劑ニ腸胃ノ粘液膜ニ達ス

大量ヲ久服スレハ故ニ腸胃粘液間歇熱、蛇蟲熱

ニ苦香ノ藥ニ伍ス聖京屈、儂麻質熱、慢性胃寒、粘

性喘息、咽喉焮衝、膀胱尿道、子宮等ノ粘液漏泄、痘

麻、紅火疹、急性瘡疹、其熱純焮衝性ニ非ル者、肌膚

灰白、瘡疹出齊セス舌汚穢、大渴スル者、或ハ内藏

腹腺閉塞ニ由ル黃疸、水腫、或ハ子宮病、依卜昆垵

尔、月經不順、痔疾、腺病、殊ニ此症、蒸氣閉塞、肌膚乾

燥、身熱、脈縮小、其他熱病ノ光景ヲ兼ルモ、ニ苦

味解凝、緩性發汗藥ト伍ス按ニ聖京、儂麻、痘疹等

ト又夕胃管直腸ノ狹窄ニ大量ヲ用ウ又夕防焮

劑トス殊ニ蒸氣ヲ開達スヘキ症ニ用ウ焮衝性

ニ類スル間歇熱、腐敗熱、神經熱ノ初起、脈緊實ノ

モノ膽液熱、肝焮衝ニ効アリ真焮衝、虚脱ノ諸症

咽喉腸胃等ノ焮衝ノ如キ直ニ抵觸スル者ハ禁

スヘシ

方例腸胃積滯熱方昆蘆根蒲公英各一匁煎ヲ

取精製礪砂一匁蘆根熬半匁右服用○間歇熱方袖礪

砂一匁珊多里熬各一匁蒲公熬半匁加密列水六匁至

每時一食匕○遷延喘急及膏淋方全礪砂甘草

各二右九貼三分十每一時半一服○和胸催生通

經方全礪砂錢二羯布羅四亞尔尼加花半匁沙糖六右

散每服一茶匕日二三四次○礪砂精八寒性粘液

由ル卒仆恐怖驚惕烈レキ泄利ニ由ル眩暈失

氣等ニ用ウ又夕卒厥昏倒ニ小捻子ニ蘸レ鼻中

ニ挿入ス又夕外用メ含嗽洗滌膏等トナス

同
酒石葉量服自十錢

功用緩性疏利解凝ノ効アリ發汗利尿メ緩和清

涼ノ下劑トス膽液性ノ間歇熱暫留熱黃疸水腫

腹肚閉塞ニ由ル痔疾依剥昆垚爾疹後ノ水腫等

ニ用ウ○酒石葉液酒石葉晶共ニ効同シ

方例一方神接骨花浸六匁至酒石葉一匁海葱蜜

至每服一食匕日二三次

固性亞尔加里純精剝服
忌剝萬亞斯酒石塩

功用 制酸、利尿、碎石、鎮痙、稀釋、解凝ノ效アリ其腐蝕性タルヲ以テ多量ノ水ニテ稀クシ用ウヘシ

制酸劑トメ酸液消化不良ニ効アリ利尿劑トメ閉塞ニ由ル水腫ニ効アリ又夕結石ヲ疏解シ能ク痙攣ヲ鎮ム稀釋劑トメ義膜喉腫、産婦腹膜焮衝等ニ必用トシ

治ス且ツ分泌、吸收管、全身腺系ヲ刺衝メ閉塞病、腺病、肝、脾、睪、腸間膜、唾腺ノ硬腫、英病、癩瘰性皮膚病ノ良藥トス

○外用浴法ト為シ痙攣ヲ鎮定ス癩疽ヲ温タル所ノ灰汁ニ蘸メ効アリ

同

剝多亞斯

量服

自四分一至二分

忌禁

諸酸、諸塩、諸土、金屬

功用 腺病ヲ治シ

碎石ノ効アリ腐蝕性ナルヲ以テ水ニテ稀クシ粘性液ニ和シ戒慎メ用ウヘシ

○外用腐劑トス又夕浴法、蒸劑トメ痙攣ヲ治ス浴ノ量一弓至二弓蒸一錢至二錢三十六弓ノ液ニ溶

ス

同

酒石塩

量服

制酸ニハ毎服自二人至十人

忌禁

諸酸

石炭水、吐酒、塩、消酸、銀、水、銀、等ヲ忌ム

功用 主治 大概 固性亞爾加里塩ニ同シ阿芙蓉等

人麻酔藥ニ伍用メ鎮痙藥トス

方例 結石ヲ治スル炭酸亞尔加里水方 酒石塩

二 泄爾設兒水 右一晝夜ニ服ス ○李歇里鎮

飽和ヲ待テ用ニ供ス稀釋解凝鎮吐發汗ノ効アリ

○制酸方 酒石塩一亞刺比亞漿錢一鷄子黃

三水三舍利別 右每時一食七小兒服量トス ○

鎮瘻方 酒石塩一錢至清水四二溶シ每時二食

七ヲ用ウ其甚シキ者ハ阿片一入ヲ互用ス

炭酸 剝薦亞斯 量服 散若ハ溶劑十 忌禁 酒石塩

同 功用 主治 酒石塩ニ同シ而メ浸蝕性ナシ内服メ

更ニ優レソトス又夕能ク瘧性嘔吐ヲ鎮ム

石礮 量服 自自一月至一月二十錢 日 忌禁 爾諸酸重土泻利塩金

同 功用 解凝ノ功ヲ主トス肝脾腸間膜腺等ノ壅塞

黃疸水腫腺病大便不通ニ大黃苦味熬劑ニ合シ

小兒酸液ニ苦味芳香藥ト伍ス樓麻質痛風等ニ

剥屈福烏多羯布羅安質沒劑ニ配ス又夕結石ニ

牡蛎灰ヲ合メ良此物久用メ或ハ消化器ヲ害ス

胃虚敗血性又夕諸熱病失血ニ用弗ス ○酷厲金

石中毒ニ良石礮九十六錢ヲ四倍ノ水ニ溶シ五

石中

分時每一盞ヲ服ス礬石及ヒ汞毒ヲ解ス氏法
外用メ洗滌蒸膏等トナシ灌腸ノ量一乃至一錢
浴ハ三乃至六ヲ

方例 解凝丸 袖白石礮 蒲公熬 護謨安謨 各等

右丸トス ○制酸方 全 白石礮十 麻屈涅失 過泥

子末 各一錢 右豆大ヲ服ス日ニ四次

同 **硫黃** 量服 自五八 至二三 十八 **伍配** 純精 硝石大 黃剝 屈華 尔斯 等

ト合 **功用** 解凝發汗通利豁痰ノ功アリ醫藥ニ供スル

二硫黃花ヲ良トス 按葉舖鷹目ト称 第一皮疹濕

瘡ニ良第二蒸氣抑遏皮疹内陷ニ由ル慢性肺病
粘性喘息冒寒咳嗽熱候ナキ者粘性肺勞ニ良第
三門脉壅塞鬱憂病月經不順或ハ痔血凝滯ヲ疎
通ス或ハ泄血閉止ニ由テ頭胸ニ血液鬱蓄スル
者ニ良熱候アルモノ清涼藥運行遲慢ハ解凝刺
衝藥ニ伍ス又夕金石ノ毒ヲ解ス汞ト合スレハ
汞其力ヲ失ス真燉衝實性失血多血刺衝性者經
血中或ハ痔血又ハ血液敷迫スルノ痔痛等ニ戒
慎ヲ要スヘシ 硫黃乳 每服三五 至二十 八同 ○外用メ
頑癬等ヲ治ス

方例首痔方 依硫黃花一硝石二錢石長生舍利別宜

右每二時一卵七〇硫黃錠神硫黃花三錢甘草膏

四沙糖二右錠トナシ七十箇トナス此錠一箇硫

黃三ハヲ含ム散ヲ惡ムモノニ良每時一箇至四

箇ヲ服ス〇痔疾方昆硫黃花精淨硝石酒石

酸酪四右調勻シ日ニ三四茶匕〇硫黃散依硫黃

花沙糖等每服一刃每時之ヲ服ス皮膚内陷ヨ

リ發スル水腫等ニ宜シ硫肝解凝發汗豁痰ノ効

アリ汞劑後ノ吐涎ニ良又夕金石毒ヲ解ス〇一

方李硫肝匕食熱湯匕右溶化シ頻服ス若得此物ハ

同

硫黃一茶匕亞爾鮮塩八ハ或〇外用暗厄利斯治

癬膏方神硫黃花石礮各半藜蘆二硝石一家猪

脂半右研和擦劑トス血

銀

功用脉管ヲ刺衝シ分泌吸收ノ二管及ヒ唾腺ニ

一異感動ヲ起シ汗ト二便トヲ催進スルノ効ヲ

リ但シ持久連服スレハ危險ノ流涎ヲ發シ身体

ヲ虚瘦セシム〇微毒ノ主藥トメ之ニ代用スヘ

キモノナシ按ニ梅毒ニ汞劑ヲ用井テ其功用ヲ

ニ就テ熱〇焮衝ノ後列乙巴ノ滲出凝稠ヲ治シ

醫家心法 卷之二 三

焮衝將ニ慢性ニ轉シ若ハ硬腫トナラントスル者放血消焮藥ヲ施スノ後之ヲ用テ良切アリ義膜喉腫小兒腦膜焮衝産婦腹膜焮衝肝焮衝聖京屈僂麻質性焮衝是ナリ㊦腺系水脉系ニ根スル慢性諸病亦藏閉塞硬腫頑固皮病一種ノ水腫等ヲ治ス又タ一種ノ神經病狂犬咬傷胆病等ニ良允ソ此製劑ハ知覺敏ナル神經病出血ノ癖アルモノ血液焮崩腐敗熱敗血病癌腫危篤ノ膿潰等ニハ害アリ

方例 護謨規吉丸 水銀一錢 亞刺比亞 錢三 大黃舍利

同

別宜適白蒸餅心右上ノ三味ヲ合シ子細研和シ星ヲ見サルニ至リ蒸餅心ヲ加フ布連幾氏殊ニ之ヲ徽毒ニ称用ス○殺虫水銀煎方扶水銀半二層ノ精細木綿ニ包シ磁器ニ入レ水一比ヲ注キ煮テ其水ヲ傾ケ取り方ニ依テ之ヲ用ウ

越質 屋布 斯蜜 涅刺列 服至十二日 **忌** 諸酸、々性塩

生水銀 硫黃 各等分混和研磨シ星ヲ見サルニ至ル者是ナリ汞劑中尤凡緩性トス梅毒、瘰癧、皮病、多血、肥胖ノ兒腸間膜壅塞、腹堅、臍、僂麻質、聖京屈等ヲ治ス○一方袖越質屋布 蝟蛄各一橙

皮半錢右散十包二分日三服按一痲疥

全

并子汞量服或自十六分至半分過スト一人忌酸純亞爾加里硫

肝石等ヲ忌ム餅ト白糖等

功用性頗ル猛服量大ナレハ腸胃劇痛燒クカ如ク

苦悶甚ク頭痛割カ如ク大渴引飲血液腦中ニ

激衝シ血ヲ瀉メ死ス和毒用ル法蛋青ト水ヲ諸管

遲怠精力未夕脱セス梅毒根蒂ヲ固フスル者其

毒或ハ骨膜關節ニ着クモノ骨腫骨痛喉内潰爛

ニ良慢性儂麻質殊ニ梅毒ヲ併發シ又夕足ノ經

久潰瘍瘰癧性皮膚病等ニ効アリヲ服藥ノ間攝生○

儂麻質痛風方外汞ニ淨水半ヲ格爾失鳩謨酒

自半ヲ右三味外汞ヲ淨水ニ溶化シ次ニ格爾失

鳩謨酒ヲ加フ若シ下利セハ更ニ服量自二十滴

至三十滴○外汞水袖外汞ニ蒸餾水ハ右朝夕一

食七亞爾托煎ニ和シ服ス○外汞酒斯方外汞六

燒酒六錢十右調勻シ朝夕四錢ヲ服ス○外汞丸袖

二度九尊外汞十些二少以蒸餾白蒸餅心沙糖各適

右二百四十九トナシ初日四丸ヲ服シ隔日二每

服二丸ヲ加ヘ以テ三十九三十九中外汞ニ至ル

二十八日ヲ限トス服藥中沙爾薩根煎ヲ兼用シ

全

蒸氣ヲ進ノ滋味飽食ヲ禁スヘシ
 服スルニ亞麻仁煎扁桃乳等ヲ兼服スヘシ又夕
 日丸ナスニ甘草膏穀粉ヲ伍メ用ウヘシト○外
 用ノ痛風僂麻質疥癬疥攻等ニ浴湯トス
 加羅茂兒量服家自半年行病三性等二日從テ差等ア用シ梅
 次テ増加スヘシ吐瀉ヲ度トス治後ニ速ニ止メ始
 十四日間續用スハ吐瀉ヲ度トス治後ニ速ニ止メ始
 一慢性病ノ如キハ小量ヨリ漸ク加テ大ニ用
 至ル下劑ト為スハ大人五至八小兒三服ニ用
 至ル下劑ト為スハ大人五至八小兒三服ニ用
 二服ト云忌禁純粹羅屈石炭等刺伍セ私伍配ス阿尤伍
 入ト云忌禁純粹羅屈石炭等刺伍セ私伍配ス阿尤伍
 可ナリ或ハ羯麻屈濕トシ合スル下悉ア熟煎煎
 等ニ伍シ或ハ羯麻屈濕トシ合スル下悉ア熟煎煎

功用

此劑諸永中最氏廣ク用ウヘシ其功峻ニメ
 害少シ大人小兒共ニ用ウヘシ小兒尤良小兒ノ
 二ウルノ症特義膜喉腫小兒腦膜焮衝産婦腹膜焮
 衝及内藏焮衝ニ放血後ニ用ウ痘麻紅火疹窒扶
 私惡性熱病ノ虚性焮衝ヲ制ス腸胃熱膽液熱肝
 腸ノ焮衝性ヲ合併スル者聖京屈僂麻質熱馬所
 ノ焮衝ヲ發シ或ハ慢性梅毒ヲ兼ヌル者ニ良神
 經熱腦肺腹内諸藏ノ焮衝ヲ合併スル者ニ用ウ
 間歇熱又夕肝脾門脉腸間膜腺等壅塞黃疸水
 腫經閉等ニ驗アリ殊ニ腺病ノ一要藥トス然氏

失下
脱荷

胃虚失兒陪苦質ニ戒慎ヲ要スヘシ就中其末期
 二於テ溶崩下利消耗熱血液溶崩ノ徴アル症ハ
 嚴ク之ヲ禁スヘシ慢性神經病顔面痛神經疼痛
 黒障眼初起按ニ布廉幾、密驚兒共ニ稱用スル所
 結列弊尔嚏劑ノ奇方アリ今畧メ
 性論ニ詳ナリ藥ニ用ウ梅毒諸症皆用ウヘシ又夕
 蚬蟲ヲ殺ス○加羅茂兒散袖加羅茂兒一沙糖一
 右一劑日ニ一服或ハ二服下人梅毒肝焮衝遷延
 水送下小兒服量ハ年紀
 二從ヒ減スヘシ○清血散同加羅茂兒
 全加羅茂兒二沙糖一
 右散一劑每時若一時半冷
 水送下小兒服量ハ年紀
 二從ヒ減スヘシ○清血散同加羅茂兒

刺戟

金硫黄各一甘草膏二右二一ノ九ト為シ朝夕二
 丸承、硫、研、和、仔○下劑方同加羅茂兒藥刺巴華
 尔私石礮各一右二一ノ丸トシ每服九九○
 稀痘丸方扶加羅茂兒
 六右火酒適宜ヲ注キ蒸
 散シ蒸餅心二テ丸シ八十九ト為シ小兒年行ノ
 數ヲ用ウ
 鹽酸金鹽服水劑ハ二
 服六滴日ニ三
 次九劑ハ二
 三溶テ每
 九散劑ハ一布半錢二
 和シ艸膏末
 二錢ニ合シ
 朝夕一
 十ニ貼トシ毎夕ハ一
 包大量ニ用
 ウルモ一ハ
 二過
 服ヤ停テ齒齦
 二擦スヘシ

醫家心法
 卷之二
 其骨刺
 其骨刺
 其骨刺

功用延年梅毒ニ良又夕其骨膿骨贅夜間骨痛太

シキモノ經久眼焮衝潰爛スル者等ニ良又夕瘰

癧ニ用井乳癭子宮癌ニハ内外用ス殊ニ舌癌ニ

効アリ二按ニ種ノ妙効藥トス方此塩ニ口内上顎鼻

脂一分ヲ半ニ和シ豆大ヲ取リ摩擦ス又方此塩十

六分ハ乳糖三ハ指頭ヲ津唾ニ湿

ニ擦入ス着ケ擦入ス津唾ニ云

安質謨尼母同

功用催吐通利發汗豁痰解凝ノ効アリ多クハ製

煉ノ用ウ安質謨尼酒吐酒石吐劑金硫黄皆ナ其

最ナル者ナリ草膏ニ古ニハ

同

金硫黄量服四分ハヨリ半忌禁諸酸、味菓物、塩酸、亞

配伍阿芙蓉、石礆、麻屈涅失、羯布結兒蔑斯密涅刺列

伍配羅屈華尔、斯等ト伍ス結兒蔑斯密涅刺列

金硫黄ト大抵同効ニメ稍猛ナ日ニ四六三四

功用豁痰發汗解凝ノ効アリ皮表肺藏腺系ニ走

ル故ニ慢性癩麻質痛風焮衝忒テ之ヲ用ウ呼吸

器諸病瘧性ノモノ或ハ衰弱スル者ニ効アリ熱

烈シキモノ血肺ニ聚ル者ハ害アリ百日咳及喘

急義膜喉腫ノ第二期瘧性粘性喘息焮衝後肺藏

衰弱或ハ稠痰咯出セス或ハ氣管粘膜衰弱粘液

鬱滯及ヒ肺勞粘痰咯出シ難キノ症ニ良熱性疹

類粘液熱肝脾腸間膜腺閉塞ノ黄疽水腫ヲ發ス
ルモノ遷延間歇熱ニ効アリ腺病皆大用ウヘシ

或曰腺病金硫ナクハ醫ヲ為ス可能ハスト

方例和胸丸昆金硫半護謨安沒尼甘草膏錢各四

右二人ヲ一丸トシ每服六丸八九解凝方神金

硫六礪砂甘草錢各半右散三貼トシ二時每二

服金鸞丸神金硫雙鸞菊各二朴屈華爾斯

甘草膏錢各二右二人ヲ一丸トシ日ニ四次三四

丸和胸方全金硫羯布羅各六亞刺比亞礪砂

糖各二右苗香水六弓和シ每時一食匕

同 海綿炭

功用瘰癧痛ナキモノニ効アリ症ニ因テハ沃實

涅ニ優レリトス

方例初メ肩胛痛之後チ脊骨偏倚愈着セリ之ヲ

瘰癧合併病トメ治スル方海綿炭錢一炭酸曹達

半二右二味朝夕服ス外敷方全海綿炭礪砂

食塩研末右三味等分瘰癧ヲ消散ス一方扶

海綿炭半牡蛎杓糖油各一越質屋布密涅刺

列半右研和二服トシ朝夕服ス

同 木炭

木炭量服三十人至

功用保固強壯、瀉下ノ功アリ、小量ヲ以テ制酸ノ

功アリトス、遷延肺病、肝病ニ用ウ、肺病不潔ノ粘

痰ヲ吐クコト多ク、勞熱ヲ兼ル者ニ効アリ

方例 腐敗胆液熱方 袖木炭六錢 至錫布羅至三十八

右散 每半時半茶匕酒ヲ以テ送下ス ○敗性赤

痢方 今木炭一亞刺比亞錢二沙糖一煎餹水 適右舐

劑ト為シ、每四分時一食匕 ○外用 止腐ノ貴品ト

ス、不潔ノ齒齦口中惡臭ニ磨齒散トス、奉那夫烏

兒 ル人 止血散 松脂二亞羅比亞分木炭末分 右散

外用トス

全

加爾剝亞扭麻里 テ續肉キ助骨ヲ連ル者ヲ器ニ入ク

八分時 ム一 量服 至自三以伍配 亞加ハテ散トス

功用 癌腫ニ用ウ ○外用メ 癌腫ノ破潰不潔ノ創

傷ヲ潔クシ、腐ヲ止ム

全

沃實 量服至一分 越爾實 氏治驗書及 蘇馬兒藥

性論 ヲ考ヘ 其

功用 瘰癧、腺腫、腺硬結、耳腺、乳、畢丸等硬結、子宮口

腺腫、狀、硬結等ニ良、又夕扁桃腫、咽喉慢性腫、咽

喉内後面經久潰瘍、汞劑効ナキ者ニ用ウ、流涎ハ

内外用メ之ヲ拒ク、此藥何病ヲ論セズ、戒慎メ用

ウヘシ多量長服スレハ胃管大ニ焮衝シ神經劇
症ヲ併發シ肺勞等ノ原トナル大約焮衝性洩瀉
胃痛、疝痛、少僻アル者諸失血、勞瘵、質妊婦等ニハ
害アリ

方例 沃實涅丁幾劑 沃實涅 八ハ十燒酒者一五度

此劑久ク貯フヘカラス蓋シ下幾二十滴中沃實

涅一ハヲ含ム大人每服十滴日ニ二三一次一盞ノ

白糖湯ニ点服ス漸加メ二十滴ニ至ル○溶劑方

全 敵度里屋 柁斯 剝 薦 亞 斯 六 三 十 蒸 餾 水 一 右 溶 和

ス 其 効 沃 實 涅 丁 幾 二 同 八 按 沃 實 涅 ノ 羅 屈 塩 二

全

飽和スルモノナリ其論浩漸ナルヲ以テ別ニ之
ヲ分タス其詳論ノ如キハ突氏藥性論ヲ需用ノ
右ニ方共ニ舍利別砂糖水、亞刺比亞漿ト合用○
ス又ク亞刺比亞末等ト合シ丸トナスモアリ○

外用ノ瘰癧腺ノ硬腫ニ塗擦ス疼痛スルモノ 蟻
針ヲ施メ後之ヲ用ウ○ 敵度里膏方 敵度里屋

柁斯 剝 多 亞 斯 錢 一 家 猪 脂 半 一 右 調 和 ス
塩 酸 重 土 量 服 方 香 藥 液 一 以 一 錢 溶 用 年 紀 二 從 利

功用 腺病、頸腺硬結、瘰癧性眼焮衝、胃管硬結、腸間
膜閉塞、羸瘦病、瘡疹、禿瘡ニ効アリ肺勞、腺病ヨリ
來ルモノ第一期ニ効多シ但シ戒慎シ用ウヘシ

胃腸粘液、蛇蟲ニ効アリ、大量ニ用ウレハ洩泄、嘔吐、神經症ヲ發ス、故ニ小量ヲ要スヘシ、近世多ク

用井ス

白屈菜

性温 量服 熟トナシ九割ト

功用 解凝、利尿ノ効アリ、肝、脾、門脈、腸間膜等ノ閉

塞ニ効アリ、故ニ頑固間歇熱、肝硬結、黃疸、水腫、依

ト昆蛭兒等ニ稱用ス、熬ホナシ用ウ○外用ト此

草ノ液ヲ角膜翳点ニ塗ルヘシ、煎取テ二十リニ

濱瞿麥

量服 一ヨリ二ヨリ取リ煮テ二十リニ

功用 緩性解凝藥ニメ、肺及ヒ内藏粘膜炎ニ走リ分

泌ヲ調理ス、慢性粘液病、濕咳、痰喘等ヲ治ス、百日

咳末期、腹肚閉塞、肝、門脈腺閉塞、黃疸、依ト昆蛭兒

皮病等ニ稱用ス、煎取テ二十リニ

方例 解凝煎 昆濱瞿麥 半蒲公英根 一右水三匕ヲ

以テ煎テ至一匕瀘過シ、蘆根熬適宜ヲ加ヘテ美

味ニ至ラシメ、毎服一茶盞 煎取テ二十リニ

獨羊泉

量服 煎取ルニ錢至一ヨリ煎テ六ヨリ十二ヨリ液

功用 皮表、肺、腎ノ分泌ヲ進シ、肺藏粘液、經久冒寒、

粘液喘息、粘液勞、肺勞初期、癩瘰、質ニ由ル者、内藏

粘液閉塞、梅毒、瘰癧、慢性皮膚病、癩麻、痛風等ニ良

浸劑煎劑熬劑下不...

方例蜀羊飲劑扶蜀羊荃半...

丸酒石錢安質沒酒滴...

食七日二四次○清血丸昆...

蜀羊荃末錢右三人九ト...

日二三次○九劑方扶蜀羊熬錢...

丸ト九ト四九至八九日二...

木飲料二合レ用ウ又依蘭苦等ト...

アリ取煎煎閉閉塞塞...

全蒲公英量煎絞汁日...

半

切用存藏閉塞腸間膜腺門脉肝脾等...

其間歇熱消食機虛弱酸液黃疸水腫...

羸瘦病等二効アリ...

方例積滯熱方昆蒲公英根蘆根...

ノ液ヲ取リ孕礮酒石錢接骨花昆...

○水腫方神蒲公熬半薄苛水挂...

舍利別ヲ每時一食七至二食七○解凝丸扶...

蒲公熬白屈熬石礮護謨安沒錢...

右二丸ト每服十二丸日二三次

大半夏 服至十五人 每服十二日 一二六

功用 衝動、利尿、發汗ノ効アリ、粘膠鬱積、食機ヲ損スル症ニ用ウ、生根多服スレハ毒アリ、乾者ヲ緩性トス、粘滑品ニ配メ、咕劑、仁乳トナスヘシ

紫葳 服多ハ熟ヲ用ウ 日

功用 解凝、防腐、強壯ノ効アリ、故ニ惡液病、腹肚壅塞症ニ宜トス、間歇熱、脇痛ノ門脉壅塞ヲ兼子黃、疽、胃腸ニ鬱滯アルモノニ用ウ、又夕腎痛、結石ニ此熬劑ニ石礮ヲ加用ス、此物生絞汁、新鮮艸、乾艸、共ニ用ウヘシ、熬ト為スモ亦タ可ナリ

膳菜 服多クハ熬劑トス 自十人至二十人又

功用 括失亞格、綸僕等ノ効アリ、苦味ヲ以テ胃腸衰弱、消化不良、間歇熱、依ト昆埵兒、內藏虛弱ノ黃疸、水腫、敗血病等ニ効アリ、粘性腹肚壅塞、脾病ニ用ウ

方例 一方 扶膳菜熬 蒲公熬 錢各二 大黃丁幾 福

布曼越列幾 各三錢 福布曼越列幾方橙皮半ヲ浸スル者ニ錢先メ諸熬ヲ和ス 薄苛水ヲ右調勻

每服一食七日ニ四次

氷瀉道

功用 味苦、石礮質ニメ能ク敗血病ヲ治ス山薺菜

碎米薺等ヲ伍スヘシ

鬱金又夕黃疽

ヲ治ス

大國

用

底本

意

四

細

○緩和劑總括

大凡體軀ノ筋纖維ヲ緩和シ強急ヲ弛メ刺衝ヲ

鈍ニシ疼痛ヲ甘和スルノ藥之ヲ緩和劑ト云フ

凡ソ粘滑油質、粉質、膠類、蛋清質等ノ刺衝酷厲ヲ

包攝シ硬強乾燥ヲ緩潤ニスルモノ是ナリ但シ

運動弛弱、纖維縱緩ノ症ハ必ス之ヲ用ウルト勿

レ

亞刺比亞護謨 服至自半二錢

功用 緩和、包攝ノ効アリ、焮衝聲嘎、酷厲性ノ呼吸

器諸病、粘液剝脫、酷厲酸液中、毒病毒轉移、焮衝等

二由ル胃及七諸藏ノ痙攣痛、劇性下利、裏急後重、腎焮衝、小便不利及七閉止、淋病初期又夕攣急、焮衝等ニ由ル泌尿器ノ疾病等ニ効アリ、腎膀胱結石痛、麻酔毒、光菁毒ニ用ウ、胃寒咳、肺勞、聖京屈性ノ胸焮衝ニ良トス、又夕此物能ク水ニ溶ケカ、カ羯布羅、拔爾撒謨、華爾斯、護謨、安沒尼、脂油等ヲ人解化セシメ、又丸トスルニ便ナラ、**方例** 亞刺比亞漿、或亞刺比亞、或溫湯二ヲ或右溶化ス、外房剥ノ眼焮衝、唇吻、○咳嗽、色嘔、酷厲毒ヲ治スル方、依亞刺比亞粘液分ニ倍或ハ等解化ス、阿利襪油

白罌粟舍利別或別ハ亞爾各二錢右調勻ス、○勞咳劇甚ナル者ヲ治スル方、依亞刺比亞粘液二大麥湯ヲ六分甘硝石精四分、每時二小茶碗ヲ服ス、**達刺侃篤護謨** 功用亞刺比亞ニ同シ、痙性疝痛ヲ治ス

亞爾托亞根 服量 煎液ヲハ一取ルニ、舍利別ハ一茶、七一二食、スヲ服ス

功用 緩和、包攝ノ功最多シ、又夕滋養ノ性アリ、故ニ腸胃粘液剥脫、或ハ稀薄、或ハ酷厲物ノ侵刺等ニ由ル諸病、泄瀉、裏急後重、疝痛、小便不利、若クハ

閉止、粘液膜、焮衝、殊ニ呼吸器、泌尿器ノ粘液膜、焮衝ニ効アリ、又夕肺、咽喉、焮衝、氣管及肺ノ聖京屈、咳嗽、嘶嘎、淋病、眼焮衝、初期、結石痛、光菁毒ノ淋瀝、刺衝、疼痛、痙攣、諸症、梅毒ノ酷厲ニ由テ尿道刺痛スル者等ニ用ウ、性本ト無毒害ナシ、只消化機ヲ弛弱ニスルカ故ニ、粘液鬱蓄ノ症ハ用井ス。

方例 梅毒ノ酷厲ニ由テ尿道自然ニ滑液ヲ剥脱スル者ヲ治スル方、依亞爾托、亞麻仁、右水煎

○肺焮衝方、昆亞爾托煎、八硝石、ニ再製酒、石英、接骨子、傑列、弓半、右調勻、○又方、今亞爾托、八半、弓、煎、液、

ルヲ取白糖、錢ニ右調和ス、○肺焮衝稍減シ、多ク痰ヲ吐シ、下利水ノ如ク、脉實數ニメ、軟ナル者ノ方、今

亞爾托、煎、半、弓、麗春花、蜀羊泉、各、二、錢、ヲ、加、ヒ、泡、出、

地亞護、度、粟、飯、ノ、亞、爾、托、別、右、調、和、ス、○外、用、メ、緩、和、

熨劑、琶布等トス、錦葵、切、用、亞、爾、托、ニ、同、シ、然、レ、モ、多、ク、ハ、外、用、ト、ス、

抄列布

功用、緩和、滋養シ、酷厲液ヲ包攝シ、粘液ノ不足ヲ

補ヒ、大過ノ感觸ヲ減ス、勞瘵、呼吸器、聖京屈、咳嗽、洩瀉、窘迫、痢腸ノ裏面ノ粘液、剥脱、内藏、焮衝、疝痛

等又經血過度白帶下ヲ治ス小兒乳ヲ缺キ虚羸スル者ニ効アリ

方例沙列布漿錢一沙列布錢一水ニ浸シ膨脹スル片

熱湯ハ十ヲ或ヲ加ヘ徐々ニ攪拌シ漿トナシ每半

時或一時一食七ヲ服ス○勞咳方依大麥水十

沙列布漿二白罌粟舍利別半右每二時一茶椀

亞麻仁量服浸若十クハ煎半ヲ至一ヲ以煎

功用油質粘滑ニメ緩和包攝ノ効アリ内藏泌尿

器等ノ痙性或ハ焮衝疼痛諸病腸焮衝小便不利

石淋等ニ効アリ○油毛亦夕下利ス効アリ

方例亞麻浸李亞麻仁一甘草錢二熱湯六百四浸出

肺焮衝咳嗽初發麻疹結石胃焮衝等ヲ治ス○

油空每服一二食七肺管ニ小石或ハ刺戟物刺衝

咯血スル者ニ効アリ又夕脇痛咳嗽ニ効アリ

外用メ琶布熨劑灌腸劑トナス

甘扁桃量服每多ハ乳ト為ス油ハ

功用焮衝内藏諸病ニ用ヒ酷厲物ヲ包攝ス殊ニ

荒菁ノ瞑眩ニ由ル尿器諸病小便不利小便閉淋

疾石淋等ニ効アリ又夕胸聖京屈乾咳嘶嗶等ヲ

治ス諸熱病衰弱スル者ヲ滋養ス多ハ乳劑ト為

シ用ウ○搾油ハ乳ニ次テ緩和ノ効アリ但シ變
敗スレハ害アリ戒慎スヘシ○苦扁桃アリ毒アリ
リ用ニ供セス

方例扁桃乳新鮮者扁桃仁新鮮者温湯六白糖半右扁

桃仁ヲ取り殻ヲ去リ石臼ニ入レ搗爛シ温湯白

糖ヲ加ヘ搗キ泥トナシ絞リ瀘メ乳ヲ取ル○扁

桃大麦乳全扁桃仁脱殼者大麦水二十舍利別一

橙花水半右前ノ如ク製シ舍利別橙花水ヲ加フ

○胆液熱神經熱患者刺衝性ノ者方依扁桃油一

亞刺比亞一苗香水六滿那一荅麻林度六右每服

二七○虻蟲熱方扶扁桃油四苗香水亞刺比亞

漿和胸舍利別各六右或ハ滿那霸王塩ヲ加フ

又夕設綿ヲ加テ製スル方アリ蛇ノ刺衝ニ強キ

殺蟲劑ヲ投スレハ却テ騷擾ノ患アリ先ツ此油

劑ヲ與テ其刺激性ヲ制メ効アリ○砒石猛汞等ノ

毒ニ此油ヲ用ウ依

阿列襪油服中毒、恐水、蛇虫等每服一食

功用内藏痙性若クハ燥屎ニ由ル便秘及ヒ痙攣

疼痛、胃痙、鉛毒疝、胃及ヒ諸藏焮衝、小便不利ヲ治

シ腎膀胱ノ結石痛ヲ鎮靜ス又夕兒ノ枕痛、咳嗽

喘息吐血等ノ急ヲ兼ヌル者ニ良又夕草木金石ノ毒速ニ此油ヲ用ウレハ吐シ且ツ毒ヲ包攝メ苛烈ノ勢ヲ挫ス殺蟲藥トナシ又夕痛風三ハ内外用ウ但シ敗發スルハ内服ニ供セズ

方例 痛風方 阿列襪油三 或右飲服ス又夕之

ヲ患部ニ塗ル

蓖麻油 服量 自一錢 至二錢

功用 内藏焮衝、痙性便秘ニ良、腸焮衝、鉛毒疝吐糞病、箱頓癩ヲ治ス、又殺蟲劑トス、鑛毒ニ良ナリ、新鮮ノ毛ハヲ用ウヘシ

方例 痙性疝痛方 蓖麻油半 鷄子黃一個 薄荷水一

阿芙蓉液十滴 罌粟舍利別錢一 右頓服 ○條蟲方 枳

麻油一食匕ヲ取り肉羹汁ニ和シ服ス日三次

鹿角 服量 煎汁一 煎茶七

功用 煎メ膠トナシ性太夕消化シ易ク滋養ノ効アリ熱病實症、胃腸ノ感動敏ナルニ由リ嘔吐、下利、腹痛等ヲ發スル者ニ効アリ失血、暴瀉等精力虚スル者、常用飲食ニ堪ヘサル者等良ナリ又夕酷厲性下利ヲ包攝メ治ス

方例 舍田氏鹿角煎 鹿角屑 蒸餅心各二 水三

右煎ノ二匕ニ至リ砂糖半ヲ和ス効用鹿角膠ニ同

鯨膠附阿

功用 二膠共ニ緩和滋養包攝ノ功アリ虚羸病泄血々液酷厲稀薄ヲ致スノ諸病酸敗胃痛腸痛ニ效アリ又夕赤痢ヲ治ス味美ナラス桂水ヲ加ヘ用ウ

方例 膀胱潰瘍方 依鯨膠粘液一沒藥液一蒸餾水一

右調勻○酸敗液方 依鯨膠粘液三大麦水十二

桂舍利別手蝟蛄石半阿芙蓉液二十右二三時每滴

二二七此物薄クメ白色ナル者ヲ水ニ溶シ粘滑液トナシ用ウ

蜜蠟

功用 膏トナシ外用スルキハ脂油ニ和スヘシ内用メ下利ヲ止メ消耗下痢瀉泄窘迫痢勞咳ニ用ウ

方例 赤痢方 依蠟半甘扁挑油半微火ニ溶シ玫

瑰昆設兒布錢二右調勻又夕阿芙蓉許少ヲ加ヘテ良

ナリ

燕凌大凌裸凌小麥砂吳米亞爾魯米碎附

功用 諸穀煎汁ハ勞瘵ニ滋養劑トシ殊ニ骨蒸熱ヲ兼ヌル者ニ効アリ胸腹諸器ノ痙性炊衝諸病腸ノ剥脫メ粘液減耗スル者ニ用井痙性ヲ鎮メ酷厲ヲ包攝ス

方例 大麦煎方 大麦ニ洗ヒ水比一右暫時煮テ洗淨シ更ニ水比五ヲ加ヘ煮テ半ヲ減ス○複方 大麦煎 大麦握水比一煮テ漉過シ蜜食比二上好醋比三右清涼常飲劑トス共ニ諸炊衝熱ヲ治ス○麦或ハ米煮汁方 扶諸麦或ハ米之ヲ搗ヲ用井ス熱湯ニ浸シ粉麵性ヲ脱シ水ヲ注キ武火ニ煮沸シ

清澄ノ汁ヲ得ヘシ此方小兒滋養劑トス煮過セハ胃化ヲ妨クルノ恐アリ按ニ依氏書大麥條大麥粉製ノ方アリ枯瘦ノ者ニ用シ参考スヘシ

密藻

功用 胃寒咳嗽嘶嘎小便淋瀝ニ用ウ軟化ノ功アリ

山田靖
宮寄覺
同校

結城敬

醫家必携卷之二終

醫家必類卷之二

醫家必類卷之二

醫家必類卷之二

醫家必類卷之二

醫家必類卷之二

醫家必類卷之二

醫家必類卷之二

醫家必類卷之二

醫家必類卷之二

醫家必類卷之二

諸症

富善堂

山田

例大

限用

醫藥

胃

醫

醫

Kitasato Memorial Medical Library