

王

五

卷之二上

全三卷

F
1-37

疫症二
寒症一
氣病一
病疾一
中風一
解冒一
寒症二
寒症二
苦頭一
苦臉一
眼一
頭一
病一
病一



吉慶書畫

乙卯年

偏頭三
 中熱ニテ
 瘫瘓ニテ
 腹疾ニテ
 脚氣ニテ
 痢疾ニテ
 働風ニテ
 涕瀉ニテ
 內傷ニテ
 紕結ニテ
 中風ニテ
 脾胃ニテ
 痛症ニテ
 細症ニテ
 癥風ニテ
 黃疸ニテ
 中暑ニテ
 奎症ニテ
 腹脹ニテ
 中暑ニテ
 腹脹ニテ



北里記念医学図書館蔵

T328

490.9
IK-10

傷寒二 中熱二十三
瘟疫一十 瘟疾二十三
脚氣二 痢疾二
傷風二十三 淚瀉二六
內傷二十三 痘結二十一
中風二十六 脾胃二十五
癥症二十二 索症二十九
癰風二十一 黃疸二十三
中溼二十三 黃腫二十七
瘡症二十七 臟脹二十九
中暑二十八 水腫三十一



1358

大成

小川先生訓點

王泰宇先生著



醫鏡

卷之二

側聞闕地知水。御前辨女。瞞坦以洞肺腑。視神而悉精微。醫直通神。鑑
推鑑鏡。金沙王宇泰先生博攬羣書。精研脈理。不拘内外。大小男女。
雜症與夫。疑似真假類例。忌宜。辨晰綦精。方藥至當。名爲醫鏡。直前勝
之金匱。駐顏之壽光也。及死張玄暎先生。靜對神怡。由施參岐。生元
開頭授受。再競岐黃。骨育窟裡。生涯雙達。盧華展堪濟世。允
獻良言。以弘上降。

魏里香雪林主人識

醫鏡叙

觀夫醫之爲道全憑遠識在心。輝爛
病理審悉幽隱。酌和湯味。顧醫之上
者。理於未然。其次在毫毛間。至於投
藥副膚。為最下已。而秦越人以此名
聞諸侯。繇是相沿術彌賤者譽彌工。

也世之為醫者無論未識膏肓不辭男女縱使厥證顯白如賊之已誠夫賊敵之已露方夫而醫之庸者或眩為疑醫之劣者遽敢其錯人命至重天子欲刑一人先鞠犯狀審得其情猶畀司憲察究法寺論罪會府奏達

核垣參詳悉無異辭然後獄成而聞其有抵於深辟者制可既下所司猶三十五覆奏庶或宥之萬難求生與衆棄市曩古聖以愛惜人命一至於此彼業志醫者門懸王公之壺室張貴人之額號為生人司命乃十九校而徵

病驟傾一伎奏而安穀安逝人猶餉
之傘錢尊如明神鄉黨不知誰有司
莫敢問而斯亦歡然安其蒙瞽夫
豈獨無不忽之良者哉無柰讀書中
疲理未決於聖贊授師未幾名遂挂
于醫籍夫聖人以緒餘治天下以精
意理身緒餘之理既闇十塵況精意
乎則夫智之不足非仁之絕遠也余
沙王宇泰先生痛懲此弊蹙然傷懷
謂醫理精微戰師難學醫宗博浩庸
師莫辨從經綸餘暇取古昔聖賢以
至漢唐迄今鴻術中譽巍秀人講論

淵源無不探究纂為一書命曰醫鏡

使覽求有盡旨趣無窮說病因繇其

方活法苟能勾讀診視病形歸繙草

句何異焰王度之碧光百邪莫匿鑑

法善之如水滯物悉明者哉秘之極

中不輕洩示而我友張子玄暎為茂

范名士髮未燄聲蜚執林長而好道
淵識通微偶顧謁先生辭論水乳輒
手茲編授之彷彿漢時淳于意其人
聖儒能傳禁方於陽慶師也玄暎受
其布以試輒效時譽爲國工余幼

嬰滯疾時師固治會玄暎相携入山

書案藥鑪幽窓靜對爰出此秘用相
研閱於竹露風葩夕霞晨月之下諸
所攻療靡不立痊固是益嘆先生之
術之鴻妙并服先生能識玄曠為知
人惜其書未廣於天下余慨然謂玄
曠曰子研工此道良既厥心凡所講

遇無不生活設苓巖隱匿猶有納溝
亦必動子惻然之憲襲青囊之陋轍
如蒼生之鞅望何也玄曠曰諾我界
爾壽之梨棗今其書具在原辯而清
變折第當方核而正用化而奇文廉
而無逆濫之辭旨深而風襲霄庸之

見條備而不遺軼漏之譏俾讀而習之者探道精微瞭若明鏡焉余嘗謂已多疏觀而素成方以按病者撫雲和之瑟而膠鳴柱以為鼓墮笑容之鍔而鶠畫欄以相求心繁小慧不本經術而為醫者施絢采以畫脂而欲

見雲煙花鳥淬鎔刀以鏤水而欲求麗崎人物是有方不效無方亦不效也間有一二秘聞何得如孫思邈獲禁方三十首於深渚之宮而益擅陰陽之理又有旁搜雜異何得如葛仙翁抄奇方一萬卷尊為金匱之書而

益深秘密之思是寡方未徧而多方
又難理也因斯以譚既富良方尤湏
較識未嘗灼而不敢握火者見其有
灼也未嘗割而不敢操刀者見其有
割也識奸臣之必亡其國雖昏庸如
夏桀亦且疾之如仇知皓齒之必喪

其軀雖好色如登徒亦且去之若免
人未能以此識鏡國鏡身烏能以鏡
醫理顧欲求時師殺人權不加于天
子不可得矣鏡之為道醫之為道也
崇禎辛巳三月朔旦臺善後學蔣儀

儀用氏謹叙



醫鏡凡例

一宇泰先生。發明醫理。著述行世。式從已久。門下
一訂疑問難。蓋多其徒。但理學淵微。卷帙浩森。學
者苦無津梁。先生手示此編。指其大要。令一披
覽。而曉然於辨症用藥。真昭微。如鏡。遂以醫鏡。
名編。

一醫業先於辨症。凡陰陽寒熱虛實與夫內因外
因之別。相去一線千里。苟審之未當。湯藥誤投。
殺人最速。先生論列症形。瞭若指掌。學者詳究。

之庶無舛錯疑似之害。

一治須明於宣藥。古人比之用兵。示其難。其慎之意。是編惟傷寒一科。姑存古方。餘皆酌其宜。而列以爲君。爲佐。見多寡緩急。各有攸當。且總其凡。曰例。槩其宜。曰類。要在變通活法。不拘成案。神而明之。存乎人之知機也。

一先生詳於辨症。用藥而脉。且畧焉。蓋因諸集備載。此不復贅。各條下。闡論及之。亦其槩耳。如傷寒一門。自有脈要指法。其中奧理。不可具述。勿

以傳經所言。遂該其全也。

一先生矢心利濟。知無不言。間有丹方經驗者。卽于藥例後。一一開示。更有藥非對症。反致傷害者。必明其禁忌。學者其識之。

一大小內外。古人視爲一道。蓋以科雖各別。總不外乎六氣所感。七情所傷。與夫十二經絡所繫屬也。後世懼傳而不精。未免以人命嘗試。始有耑門。先生資性敏達。學力淵深。此道一悟百了。故於雜門瘡瘍。婦人小兒。無不著論。立方。確有

所見其爲後學筏度功豈小補云。

一是編原本。余得之茂苑張玄映。玄映得之字泰先空。授受益不輕矣。往余與玄映讀書余峯搃管之餘漫加輯訂爰付梨棗懸諸國門。凡我同人寶茲囊秘。

蔣儀用識

醫鏡目錄

卷一

內科

傷寒

附痧疹

瘟疫

腳氣

傷風

內傷

中風

附癥症

癭風

中濕

附瘧症

中暑

附中熱

癰疾

卷二

內科

痢疾

秘結

蟲症

洩瀉

脾胃

黃疸

附黃腫

三消

吞酸

臌脹

附水腫

噎膈

嘔吐

附番胃
吐酸

霍亂

頭痛

附頭眩

心痛

腹痛

腰脇痛

股痛

附脊痛

卷三

腹痛

頭痛

附頭眩

內科

麻木

痞塊

諸氣

癆瘍

附遺精
益汗

骨蒸

痴氣

諸血

咳嗽

附痰症

雜門

眼疾

齒痛

喉痺

口舌

瘡瘍

醫經 卷之四

瘡疽兼内外

疔毒

瘰癧

廣瘡

內臓外臓

泡瘡

疥癬

濕陰瘡

卷四

婦人

經閉

月事不調

血臌

血癰

血風

崩淋

帶下

熱入血室

胎前諸症

臨產諸症

產後諸症

小兒

胎熱胎寒

臍風撮口

重舌驚口

丹毒

中惡天吊

客忤

夜啼

咳嗽

瘡疾

痢疾

吐瀉

驚風

癆症

痘疹

附舊刻

急救丹方 計六十四條 諸症戒宜 計一十八條

醫鏡目錄 終

醫鏡卷之一

金沙王肯堂宇泰父著

茂苑張曠垣玄暎父叅

武水蔣儀儀用父較

傷寒

傷寒爲諸病之魁。死生係于數日之內。苟識病不真。
用藥一名錯。則變異立見。古人有七日不服藥之說。非。
謂傷寒不可服藥。謂藥之不可輕試也。故見之未審。
寧不用藥。豈可妄投之以速其死耶。治傷寒者必先。

辨其六經之形症而後可也。如初發于一上一日間便

覺頭項痛。腰脊強而發熱惡寒乃足太陽膀胱經受

病也。而診之則尺寸俱浮焉。以其脈上連風府故頭

項痛。又下至尾間故腰脊強以寒邪在表而不得泄

故發熱惡寒也。而太陽症可辨矣。太陽病已以次而

傳經必傳于胃。發于二三日之間便覺目疼鼻乾不得眠日晡潮熱不惡寒而反惡熱乃足陽明胃經受

病也。而診之則尺寸俱長焉。以其脉絡于目故目疼

又挾于鼻故鼻乾不得眠以邪在肌肉之中故不惡

寒而惡熱也。而陽明症可辨矣。陽明病已以次而傳

經必傳于膽。發于三四日之間便覺胸脇痛而耳聾往

來寒熱乃足少陽膽經受病也。而診之則尺寸俱弦

焉。以其脉循于脇故胸脇痛又絡于耳故耳聾以邪

在半表半裏故往來寒熱也。而少陽症可辨矣。少陽

病已以次而傳經必傳于脾。發于四五日之間便覺腹

滿而嗌乾身無大熱自利不渴乃足太陰脾經受病

利不得乃足太陰脾經受病脉尺寸俱沈細焉

病脉尺寸俱沈細焉

太陰半表半裏

傳膽三四日間胸脇痛

耳聾往来寒熱

足少陽膽經受病

脉尺寸俱弦焉

太陰半表半裏

傳經必傳于脾四五日間

腹滿嗌乾身無大熱自利不渴乃足太陰脾經受病

脉尺寸俱沈細焉

傷寒初二日間頭項痛

腰脊強發熱惡寒

足太陽膀胱經受病也

脉尺寸俱浮焉

大陽

傳胃三日間目疼鼻乾不得眠日晡潮熱不惡寒

反惡熱足陽明胃經受病

脉尺寸俱長

陽明

傳胃三日間目疼鼻乾不得眠日晡潮熱不惡寒

反惡熱足陽明胃經受病

脉尺寸俱長

少陰傳于腎五六日間口燥舌乾而渴身不熱乃足少陰腎經受病也脉尺寸俱沈焉

厥陰傳于肝六七日間煩滿囊縮身冷如冰乃足厥陰肝經受病也脉尺寸俱微緩焉

渴也。而太陰症可辨矣。太陰病已。以次而傳經。必傳于腎。發于五六日間。便覺口燥舌乾而渴。身不熱。乃足少陰腎經受病也。而診之。則尺寸俱沉焉。以脈貫脊。而絡于肺。繫舌本。故口燥舌乾而渴也。以邪入于陰分。故身不熱也。而少陰症可辨矣。少陰病已。以次而傳經。必傳于肝。發于六七日間。便覺煩滿而囊縮。以邪身冷如冰。乃足厥陰肝經受病也。而診之。則尺寸俱微緩焉。以其脉循陰器。絡于肝。故煩滿而囊縮。以邪入陰分。既深且固。故身冷如冰也。而厥陰症可辨矣。

宜汗之
大陽陽明表症也
大陽半表半裏宣和解之

太陰寒邪入于裏也
宜下之
少陰邪入裏尤深也
宜下之

手足厥冷自汗亡陽者
宜溫之不可輕下也

厥陰病寒氣固結
非大熱之劑不能除
承氣之類不可用也

陽症易治
陰症難治

少陰為尤難也

况于兩感傷寒

太陽受之。卽與少陰俱病。則頭痛。口乾。煩滿。而渴。二

太陽與少陰俱病
頭痛口乾煩滿而渴

二日

陽明與太陰俱病

腹滿身熱無食詰語

三日

太陽與厥陰俱病

耳聾囊縮迂厥
水漿不入不知人者

六日死

日、陽明受之。卽與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食。詰語。三日，少陽受之。卽與厥陰俱病，則耳聾囊縮，而厥逆。若水漿不入，不知人者，六日死。兩感所以不可治者，以其一臟一腑同受其邪。表症裏症，一齊而發。兩邪相迫，陰陽俱病。救其表，則裏益急。救其裏，則表益劇。猶外寇方獮，而內又反。既不能安其內，又無以攘其外，必致兩敗。而俱傷，豈能兩全而無害。此兩感之所以不救也。然其間亦有輕重之差焉。表重于裏者，宜先救表。而後及于裏。裏重于表者，宜先救其裡。而後及于表。此又求一，生于萬死之中。而不忍坐視，故不得已而施其治也。其不兩感于寒，更不傳經者，至七八日間，六經之邪漸退。十二日，則精神清爽，而自愈矣。然傷寒傳經，亦有不同。未可視為一定不易之序。有始于太陽，以次傳入陰經，而終于厥陰者。或太陽不傳陽明少陽，而卽傳少陰者。或不繇陽經而直入陰經者。或始終只在一經而不傳者。或二陽二陽同受，而爲合病者。或太陽陽明先後受，而爲併病者。種種不一，審而治之，可也。然真正傷寒，與感冒傷

寒及似傷寒而非傷寒者。何以辨之。蓋寒者。冬月嚴

自霜降以後春分以前皆屬冬令。而即發者為正傷寒。

至春分後發者

名曰溫病

冬傷于寒。春分不病。至夏而後發者

名曰熱病

必此時感寒而即發者為正傷寒。至春分後發者名

日溫病。冬傷于寒。春亦不病。至夏而後發者名曰熱

病。夫溫熱二病既皆得之。冬月所傷之寒。宜亦以傷

寒名也。而反曰溫病。熱病者。何耶。蓋所傷者必不甚重。故不即發而延于春

于冬。而諒其所傷者必不甚重。故不即發而延于春

夏也。春氣溫。夏氣熱。則時令之氣已甚。而冬月之氣

無權。所傷之寒。反從春夏而變爲溫熱。故以溫熱名

也。其有不因冬傷于寒。而春自傷于風。夏自傷于暑者。則自有傷風。傷暑之別。而又不可以溫熱並論矣。或有感于天行時氣。而沿相同者。謂之溫疫。或足膝等處忽然紅腫。發熱頭痛者。謂之腳氣。皆似傷寒。而非傷寒也。其餘傷中之雜症。頗多不能枚舉。要皆諸病門中所有者。但雜症一兼寒熱。卽謂傷寒雜症。醫者以意求之。則不言而自喻矣。

藥例

太陽症頭項痛。腰脊強。發熱無汗。宜以麻黃湯爲主。大陽症頭項痛。腰脊強。發熱無汗。宜以麻黃湯爲主。而汗之。大陽症頭項痛。腰脊強。發熱無汗。宜以麻黃湯爲主。而汗之。

或有感于天行時氣。而沿相同者。謂之溫疫。足膝等處忽然紅腫。發熱頭痛者。謂之腳氣。其餘傷寒之雜症。頗多不能枚舉。

大陽症頭項痛。腰脊強。發熱無汗。宜以麻黃湯爲主。而汗之。

麻黃湯

麻黃一兩桂枝一兩

甘草五錢杏仁五十粒

醫金

治而汗之

麻黃一兩五錢

桂枝一兩

甘艸五錢

杏仁五十枚

春分後忌之

陽明症目疼鼻乾不眠
發熱乾嘔有汗宜

桂枝湯

赤芍藥桂枝各六錢

甘草四錢

春分之後忌之

陽明症目疼鼻乾不眠發熱乾嘔有汗宜以桂枝湯

桂枝湯

赤芍藥桂枝各六錢

甘草四錢

爲主治

赤芍桂枝各六錢

甘草四錢

每服五錢加姜三片棗二枚煎服須臾啜稀粥以助藥力若小便數及飲酒人不宜用恐其不喜甘草

而中滿作嘔也春分後忌之

少陽症胸脇痛而耳聾
往來潮熱宜以小柴胡湯爲

小柴胡湯

柴胡一兩半夏八錢

黃芩甘草人參各七錢

人參一味亦宜斟酌

邪氣不退不可輕用也

主治

柴胡一兩

半夏八錢

黃芩

甘草炙

人參各七錢半

各七錢半

少陽症身熱不大便
邪氣不退不可輕用也

若邪氣未退不可輕用也

少陽症身熱不大便
不惡寒邪在半表半裏宜以大

柴胡湯爲主治而和解之

少陽症身熱不大便
不惡寒邪在半表半裏大柴胡湯
主之宜和解之

大柴胡湯

柴胡二兩 黃芩七錢

芍藥三錢 半夏六錢

枳實四枚 大黃五錢

加姜末 煎服

右作三服。每加姜棗煎服。

太陽陽明症不惡寒反惡熱。大便秘詰語嘔噦。宜以

語嘔噦。宜

調胃承氣湯

大黃一兩酒浸

大黃一兩 酒浸 甘草五分 芒硝九分

每服五錢水一碗。先煎大黃甘草至七分。去渣入

稍煎一沸溫服。

太陽陽明症六七日不大便。腹脹滿無表症。汗後不惡寒。後不惡寒。潮熱狂言而喘。

宜小承氣湯

大黃一兩 厚朴五錢

枳實六枚

水煎溫服。以利為度。

大黃一兩 厚朴五錢 枳實六枚

右作二劑。水煎溫服。以利為度。

太陰症自利不渴。脉沉。身痛。宜以四逆湯爲主治。

大黃一兩 乾姜七分 附子半個 黃連五錢

右作二劑。水煎溫服。弱人用大附子。加乾姜三錢。

本方乾姜加至一兩。名通脈四逆湯。治厥逆下利。

脉不至。每服五錢。加葱白九莖。加生姜。腹痛。加

桔梗。利止脉不出。加入參。本方去附子黃連。加入

治厥逆下利。脉不至。每服五錢。或葱白九莖。加生姜。腹痛。加利止脉不出。加入參。本方去附子黃連。加入參。

理中湯 治自利不渴

寒多而嘔腹痛鴨塘

蛇厥等症治病之效

雖不可誣而用藥之時

亦宜斟酌大補大熱

二劑必害其真而後用也

少陰症舌乾口燥及胃

寒詎語五六日不大便

腹痛煩渴宜

大承氣湯

大黃五錢 厚朴一兩

枳實五個 芒硝五錢

以利為度

少陰症舌乾口燥及胃實詎語

五六日不大便腹痛

煩渴宜以大承氣湯主治而下之

大黃五錢

厚朴一兩 枳實五個

芒硝五錢

水二錢半先煎厚朴枳實至一錢入大黃煎至七分去渣入硝煎一沸溫服以利為度不可過服

少陰症惡寒手足拘急或心中悸而煩脈微細者宜

者宜

小建中湯溫之

桂枝甘草各二

芍藥三兩

生姜三片東四枚

去粗入錫飴一合

嘔者不用飴

厥陰症舌卷囊縮惡

寒宜

桂附湯

桂枝一兩附子三

青皮甘草柴胡各一錢

生姜三大片

兩感傷寒宜大羌活湯

雙解之

參白朮名理中湯專治自利不渴寒多而嘔腹痛

鴨塘蛇厥等症治病之效雖不可誣而用藥之時亦宜斟酌大補大熱

亦宜斟酌大補大熱之劑必審其真而後用也

少陰症舌乾口燥及胃

寒詎語五六日不大便

腹痛煩渴宜

大承氣湯

大黃五錢 厚朴一兩

枳實五個 芒硝五錢

以利為度

少陰症舌乾口燥及胃實詎語

五六日不大便腹痛

煩渴宜以大承氣湯主治而下之

大黃五錢

厚朴一兩 枳實五個

芒硝五錢

水二錢半先煎厚朴枳實至一錢入大黃煎至七分去渣入硝煎一沸溫服以利為度不可過服

少陰症惡寒手足拘急或心中悸而煩脈微細者宜

者宜

小建中湯溫之

桂枝甘草各二

芍藥三兩

生姜三片東四枚

去粗入錫飴一合

嘔者不用飴

厥陰症舌卷囊縮惡

寒宜

桂附湯

桂枝一兩附子三

青皮甘草柴胡各一錢

生姜三大片

兩感傷寒宜大羌活湯

雙解之

大羌活湯

羌活二錢

細辛五分

獨活防已

黃芩黃連白朮川芎

知母各二錢

水煎溫服

春分後感冒傷寒宜

九味羌活湯

代桂枝麻黃湯

羌活二錢

蒼朮一錢

甘草三分

白芷一錢

川芎一錢

生地一錢

黃芩一錢

細辛三分

姜葱水煎去蒼朮加木召渴知母石羔

此方通治六經傷寒無有不驗

作二服加姜三片葱一莖水煎熱服覆熱取汗原
有汗去蒼朮加白朮渴加知母石羔

此方通治六經傷寒無有不驗乃四時傷寒之聖
藥也何以言之蓋羌活治太陽肢節痛大無不通
小無不入乃揆亂反正之生也防風治一身盡痛

聽君將命令而行隨所使引而至蒼朮雄壯上行
之氣能除濕氣下安太陰使邪氣不傳脾經甘艸
緩裏急和諸藥白朮治陽明頭痛在額川芎治厥

陰頭痛在腦生地治少陰心熱在內黃芩治太陰

矣未有不治而生者也宜以大羌活湯主治而雙解之

羌活二錢

防風一錢

黃芩一錢

黃連一錢

白朮一錢

川芎一錢

細辛五分

生地一錢

知母二錢

水煎服

春分後感冒傷寒宜以九味羌活湯爲主治

代桂枝

麻黃湯用

羌活二錢

防風一錢

蒼朮一錢

甘草三分

白芷一錢

川芎一錢

生地黃一錢

黃芩一錢

細辛三分

姜葱水煎去蒼朮加木召渴知母石羔

此方通治六經傷寒無有不驗

肺熱在胸。細辛治少陰腎經苦頭痛。此方乃易老所製。凡見表症。悉宜服之。不犯二陰禁忌。實解利之神方也。

小結胸症。胸膈迷悶。乃邪熱結于上焦而生痰也。宜宣

小陷胸湯。
半夏六錢 黃連三錢

小陷胸湯。
半夏六錢 黃連三錢

半夏六錢 黃連三錢

瓜蔞一個連皮取四分之一

作一服水二鍾。先煮瓜蔞至一鍾半。下餘藥煎至一鍾。溫服。如沫效。再服。得口出黃涎即愈。

大結胃症。胃前脹滿煩悶。不進飲食。乃渴多飲水。有停飲在上故也。

大胷陷湯
大黃一兩 芒硝一兩 甘遂二錢五分

停飲在上故也。宜大陷胸湯。

大黃一兩 芒硝一兩 甘遂二錢五分 得快利止後服

作二服。水二鍾。煎大黃至一鍾。去粗入硝煎一沸。次入甘遂末。溫服。得快利止後服。

附瘳疹

瘳疹之症。惡寒發熱。頭疼腹滿。恶心嘔吐。遍身如紅雲推出俗名瘳子。卽傷寒發班也。發班雖是熱症。然

瘳子即傷寒發班也。宜解毒發散。

羌活防風白芷紫薑各一錢
甘草加葱姜煎服

喉痛玄參桔梗僵蚕各一錢
柏葉犀角地黃服硝枳壳
陳皮蒼朮厚朴

班有紫色熱極也加

黃連連克赤芍藥

心

霍香木香

班不出者

單用帶根葱頭搗取汁
一盞入酒漿一盞調和服之

此症嘔血者重以邪氣
逆上也

聲啞者危

無聲者死

以班毒入肺中故也

醫門金鏡

如羌活防風白芷紫蘇以發散大劑生甘草以解
毒。加葱姜煎服。喉痛。加玄參桔梗。嘔血。加地榆側

柏葉犀角生地。腹滿。加枳殼陳皮蒼术厚朴。班毒。

紫色熱極也。加黃連連克赤芍。惡心。加藿香木香。

班不出者。單用帶根葱頭搗取汁一盞入酒漿一

盞調和服之能飲者再飲一二盞其班即發出至

妙。此症嘔血者重以邪氣逆上也。聲啞者危無

聲者死。以班毒入肺中故也。

附瘟疫

瘟疫之症乃天行時氣。
發熱詒語衆人病一般
者是也。
又有大頭瘟、蝦蟆瘡、痘瘡、痘瘡
並用十神湯為主治。

川芎 甘草 麻黃
紫蘇 升麻 白芷
陳皮 香附 芍藥
各四錢
各四錢
乾葛 一兩

生姜三片

未效再服

瘟疫秘方

人中黃五錢 羌活 蒼朮各三錢 煎服立愈。

大頭天行病濕氣在高
顴之上宜用此方

黃芩大黃羌活

黃芩

酒炒

大黃

酒蒸

羌活

各二錢或三錢

煎服

蝦蟆瘡

遍身如蝦蟆之皮

皆屬風熱宜

踈風散熱之

散熱之樹宜主治之

蝦蟆瘡

遍身如蝦蟆之皮

皆屬風熱宜

踈風散熱之

散熱之樹宜主治之

羌活

防風

荆芥

黃芩

甘艸

各二錢

煎服

羌活

防風

荆芥

黃芩

甘艸

各二錢

煎服

星醋磨敷

附脚氣

腳氣之症惡寒發熱有類傷寒但發時足膝之間先紅腫作疼而後發寒熱乃濕熱留于肌肉之中故也

脚氣之症惡寒發熱有類傷寒但發時足膝之間先

熱有類傷寒但

發時足膝之間

先紅腫作疼而

後發寒熱乃

留于

肌肉之中故也

也

急宜治之若不早治其氣上行至心卽死矣
蒼术 黃柏 赤茯苓 牛膝 木通 木瓜
甘艸 黃連 烏藥 防風 水煎空心服

蒼术

黃柏

赤茯苓

牛膝

木通

木瓜

甘艸

黃連

烏藥

防風

水煎空心服

右各二錢量輕重投之水煎空心服其紅腫處用朴硝大黃寒水石牙皂爲末鷄子清調傅甚妙或用入中黃爲末芭蕉汁調傅亦妙

附傷風

傷風之症乃風邪客于腠理洒淅惡寒噴嚏呵欠頭痛發熱類于傷寒但見風卽怕其寒亦不太甚以此

傷風

醫錄

傷風

川芎 紫蘇 川活
防風 蒼朮 香附
甘草

爲辨耳。

川芎 紫蘇 川活 防風 蒼朮 香附

甘艸

甘艸

丸松子曰感冒風濕兼癰
散金正氣散或風
寒合敗毒散或風濕合
五積散

右各二十錢。加葱白十莖。姜三片。煎服。以被覆之。微汗爲度。若以爲小疾而不治之。風入于肺。必成咳嗽。卽費調理矣。凡感風邪。忌用茯苓。以其味淡。善于滲泄。表症服之。則引邪入陰經。而邪無繇發矣。
▲青囊曰。若依醫谷而已。引邪入陰經。則以柴胡弓吸陽出之。
○感冒表熱甚。參蘿飲加蜜。則有表出。灰松子曰。不當用參蘿飲。而用蜜。則有
癰斑者。用升麻葛根湯。或消毒飲解之。

內傷

傷寒家以外。感風寒爲外傷。內傷飲食爲內傷。固矣。然內傷而專指飲食。言者其言猶未盡也。飲食所傷。固可以爲內傷。或傷于血。或傷于氣。或傷于精。皆非外得也。獨不可以言內傷乎。內傷之病。各有症辨。惟飲食所傷。亦身發大熱。類于傷寒。但不惡寒。而獨惡熱。頭不甚疼。骨節不痛。而中脘飽悶。見食卽惡。與傷寒大同小異。故傷寒家有內傷外傷之辨。辨以此耳。至若好勇。闘狠。奔走負重。恃壯使力。蹊跌輕生。必傷

于血。血積于上。則胸脇痛。血積于中。則中脘痛。血積于下。則小腹痛。傷重。則行其血。傷不重。則活其血。血既行。則養其血而已。或忿恨冲心。暴怒頓發。爭言鬭舌。叫號罵詈。必傷于氣。氣積不散。則兩脇脹滿。胸膈悶塞。甚至發爲臌症。飲食不進。而病斯劇矣。宜大劑伐肝化氣之藥治之。或恃強壯。不惜氣力。縱情于女色。耗其真精。則小腹氣併。其冷如冰。其堅如石。痛連陰器。小便秘。而不通切不可以精虛之故。妄加補劑。又不可悞以爲霍亂。妄投鹽水。要當以活血爲主。

而調氣次第。待其痛止。氣和方可漸加帶補之劑也。

內傷于食。視其所傷者何物。各以主治之藥消之。

藥例

內傷于食

傷于魚肉

山楂蓬术三稜

傷于米食

神曲麦芽枳实陳皮

桔梗竹葉

傷于麪食

茱萸子大黃木香朴

深皮香附子

傷于生冷

肉桂木香乾姜

必兼用白朮甘草

內傷于血

胸前痛

紅花赤曲降真香丹皮

桔梗引經枳壳氣開

兩脇痛

蘇木紅花官桂

桃人青皮柴胡引

調氣木香

中脘痛

當歸大紅花蘇木

我木三稜引經甘草

芍藥厚朴暖安

腹痛

小腹痛

施人大當歸蕘山查

薑木蓬木

引經青皮官桂

破氣橘子

痛甚者

凡血併不行劑中加川山甲麝香

水酒同煎送下

大黃丸二三錢

重者可用也

內傷于氣宜以伐肝破氣之藥治之。

用醋炒青皮爲君。醋炒芍藥便浸香附。烏藥枳殼木香官桂之類爲佐。水酒同煎服之。

內傷于精宜以養血調氣之藥治之。

用紅花爲君。桃仁丹皮當歸生地牛膝赤芍之類爲佐。少加甘草稍炒鹽一撮。酒煎入童便熟服。痛連陰器者必有血滯于莖中。礙其道路甚至小便

紅花大桃人丹皮當歸
地黃牛膝赤曲各中
甘草炒鹽一撮

青皮大芍藥香附子
烏藥枳殼木香肉桂

醫錄

內傷于血視其所傷者何處分上中下而治之。

如胸前痛則用紅花赤芍降真香丹皮之類而以

桔梗引經枳壳氣開

如中脘痛則以當歸爲君。佐以紅花蘇木三稜蓬

如小腹痛則以桃仁爲君。佐以當歸稍紅花山查

蘇木蓬木之類而以青皮官桂引經。檳榔破氣痛

甚者加玄胡索乳香沒藥。凡血併不行劑內加川

芍藥厚朴暖安

小腹痛

引經青皮官桂

破氣橘子

痛甚者

正胡索乳香沒藥

凡血併不行劑中加川山甲麝香

水酒同煎送下

大黃丸二三錢

重者可用也

山甲射香水酒同煎送下大黃丸二三錢。此惟傷

不_レ通_ス宜_レ頭髮燒灰爲末。童便酒調下四五錢爲妙。
 凡此特其大畧耳。若夫斟酌損益。非言所能示也。
 一切內傷之症。有似于傷寒者。遂以爲傷寒而悞用。
 發表之藥。如麻黃升麻之類。則內氣升發。勢不可遏。
 有食吐食。有血吐血。吐而不已。面赤咽乾。火皆奔上。
 汗出不休。陽亡氣耗。當此之時。無藥可救。其死必矣。
 慎之慎之。若外傷誤服內傷之藥。亦有大害。不可輕
 投。若內傷既重。或溺水涉深。則寒氣入內。血與食併。
 而不運。必死無疑。雖有良藥。竟何益乎。

中風

中風
 夫人似乎無恙。而卒然中風者。豈一朝一夕之故哉。
 其受病久矣。蓋肉必先腐也。而後蟲生之。土必先潰
 也。而後水決之。木必先枯也。而後風摧之。夫物且然。
 而况于人乎。經曰。邪之所奏。其氣必虛。風豈能中乎。
 人亦人之自受乎。風耳。使其內氣充足。精神完固。則
 榮衛調和。腠理緘密。雖有風將安入乎。惟其不戒。暴
 怒不節。淫慾或饑不暇予食。或寒不暇予衣。或嗜酒
 而好色。或勤勞而忘身。或當風而沐浴。或大汗而行。

房。或畏熱而露臥。或冒雨而奔馳。以致真元耗傷。氣血消盡。大經細絡。積虛補腫。平時無甚痛苦。而不知榮衛皆空。徒存軀殼。正猶無心之木。將折未折。無土之墻。欲頽未頽。其勢已不可支。而方且自謂無恙。迷昧。而不知戒焉。一旦爲賊風所襲。如劇寇操刃直入。無人之境。勢若破竹。不移時而皆潰。則盃酒談笑之間。舉步轉移之頃。卒然顛仆。頓爲廢人。不亦重可駭哉。由是觀之。雖由外風之中。實因內氣之虛也。然人之一身。表裏上下。未必皆虛。惟積虛之處。氣多不貫。

中風

若以臟腑言之。則又各有

形症焉。

中臟多滯九竅。故有

唇緩失音。鼻塞。耳聾。眼瞀。便秘。

中腑多着四肢。故有半身不遂。手足不隨。左癱右瘓。

中血脉。惟口眼喝斜。肢不能舉。口不能言。而更無別症者。乃中經。

中臟者宜下。中腑者宜汗。中經者宜補血。

中經者宜補血養筋。中血脉者宜養氣。

中腑者宜汗。中臟者宜下。中經者宜汗。

中血脉者宜養氣。

以養筋中血脉者宜養血以通氣此皆可治之症也。

而亦有難易于其間中臟爲難而中腑次之中經又

次之中血脉又次之其或初中于血脉藥之而愈苟

不守禁忌必復中而必在經或初中于經藥之而

愈苟不守禁忌必復中而必在腑或初中于腑藥

之而愈苟不守禁忌必復中而必在臟中于臟藥

之而愈苟不守禁忌必復中而必在腑中于腑藥

中風口開者爲心絕

手散者爲脾絕

眼合者爲肝絕

遺尿者爲腎絕

聲如鼾睡者爲肺絕

汗出如油者爲無氣

肉脫筋痛者爲無血

髮直指而頭上竄

面赤如枚

汗綴如珠皆所不治之症

初中血脉藥之而愈不守禁忌復中而必在經同藥之愈復再牛在腑中一次則虛一次虛一次則重一次故中腑雖可治中脉中任而後及于腑則干腑則難治矣中臟本難治也中腑而後及于臟則不治矣若中腑而兼中臟與傷寒兩感者何異豈有可生耶

喝邪之邪字
當作斜字

杯酒未乾片言未盡而魂魄先亡矣縱有起死回生之藥亦何所施乎大法中風諸症總屬風疾初中之時不論在表在裏必先以攻寒祛風爲主待其甦醒然後審其經絡分其氣血而治之不可因其內氣之虛而驟用補劑蓋一中之間道路已爲風痰阻絕雖欲補之孰從而補之若其病的係太虛口眼不喝邪手足不偏廢便溺不阻澁但汗出不休眩運不定四肢軟弱氣息短促方可用獨參湯而猶必佐以去白陳皮加以姜汁竹瀝始可服也若無監制一時或可

以愈疾而痰邪不洩終當爲患他日或發癰疽必無藥可治者切宜慎之卽腦麝牛黃等藥初中時亦不宜驟用恐引風氣入于骨髓又不可用大戟芫花甘遂以泄大腸之經大抵於行痰祛風劑中日淺則加以順氣日久則惟活血爲要耳

藥例

初中風不省人事風痰壅盛迷其胸膈也

天花粉荆芥二三兩水煎加姜汁竹瀝磨

唐柏實沈香各一錢或一錢灌之若牙關緊卽以姜

枳實沉香各一錢或一錢灌之若牙關緊卽以姜

下開脣急

姜製南星同射香ナ
擦之自開

製南星同射香少許擦之自開灌此藥直待其醒
再進此藥然後以他藥進之

中腑 為在表
法當汗之

麻黃 大羌活防風荆芥

甘草

南星半夏瓜蔞仁
順氣陳皮枳壳紫蘇梗

甘草

南星半夏瓜蔞仁
陳皮枳壳紫蘇梗

中臟 為在裏法當下之

大黃 大棗半夏朴甘草

甘草

猪牙皂角川山甲木通
菖蒲

甘草

杏仁蕕子防風
荆芥 姜汁竹瀝

中腑 為在表法當汗之
宜以麻黃爲君。羌活防風荆芥。甘草之類爲佐。以
發其表。南星半夏瓜蔞仁之類。以逐其痰。陳皮枳
殼紫蘇梗之類。以順其氣。加姜汁竹瀝服之。

中臟 為在裏法當下之

宜以大黃爲君。枳實厚朴甘草爲佐。以通其秘。猪
牙皂角穿山甲木通菖蒲之類。以開其竅。瓜蔞仁

杏仁蕕子防風荆芥之類。以逐其風痰。加姜汁竹
瀝服之。

中經 為補血養筋爲主

四物湯 大木瓜薏苡威靈
羌活獨活防風細辛

甘草

南星半夏茯苓黃芩

中血脉 為補血通氣
中血脈 養血通氣

四物湯 大紅花 養血
枳壳烏藥香附陳皮

宜四物爲君。佐以紅花而養其血。兼以枳殼烏藥
香附陳皮而通其氣。加姜汁竹瀝服之。

口眼喎斜外攻之法

皂角五兩去皮子爲末
以醋和之左喎

左喎塗石牛心

右喎塗左手心

口眼喎斜外攻之法。以皂角五兩去皮子爲末。以陳醋和之。左喎塗右手心。右喎塗左手心。以緩水一盞安向手心。須臾便止。卽洗去藥。并抽掣中指。

左邊半身不遂。屬血虛與死血。宜于四物湯中加紅花桃仁煎之。以姜汁竹瀝調服。

右邊半身不遂。屬氣虛與濕痰。宜于四君子湯中加半夏南星陳皮枳殼煎之。以姜汁竹瀝調服。

左邊右瘓四肢不舉。風痺等疾。

麻黃一斤白芷桑皮蒼术甘松浮萍各二

右邊半身不遂。屬氣虛與濕痰。宜于四物湯中加紅花桃仁煎之。以姜汁竹瀝調服。

四物湯 紅花桃人

左邊半身不遂。屬血虛與死血。

四物湯 紅花桃人

右邊半身不遂。屬氣虛與濕痰。

四物湯 紅花桃人

左邊右瘓四肢不舉。風痺等疾。

麻黃一斤白芷桑皮蒼术甘松浮萍各二

左邊右瘓四肢不舉。風痺等疾。

麻黃一斤白芷桑皮蒼术甘松浮萍各二

兩 川芎三兩 苦參三兩

水煎成膏。調酒中服之。服一日停一日。如此數日

手足自然輕快。又治小兒驚風。

中風痰壅昏不知人口眼喎斜半身不遂。

附子去皮 南星各一 木香半兩

每五錢生姜九片煎服。

附癰症

癰症。發卽顛仆眼瞼口吐痰沫或作羊鳴不省人事。此乃因驚恐而得之。

治癰瘍

礞石 硝煅 朱砂

射香 南星 半夏

天麻 天竺黃

蛇含石 各等分

姜汁竹瀝 和蜜為丸

童便磨下半丸服

三五丸全愈

加銀粉益佳

醫書

礞石

硝煅

硃砂

天竺黃

麝香

南星

半夏

天麻

蛇含石

醋煅

等分爲末。以姜汁竹瀝和于蜜中。煉熟。丸如龍眼。大童便磨下半丸。立止。服二五丸全愈。

若治癰瘍。卽于此方中加銀粉。即黑鉛鎔化投水銀和作一處傾冷研細是也。

附癰風

癰風手足皮膚迸裂。麻木不仁。甚至四肢踰攀。眉脫。鼻倒。乃惡風沿入臟腑。血肉皆死。肉生細蟲食人。

治厲風

死人身上蛆最妙

多取毒蛇打死晒乾切片。作粉和糯米蒸熟。作酒飲之。能起死回生。

或用白花蛇全蝎大風子。益母艸。胡麻。猪牙皂角。

治厲風

白花蛇全蝎大風子

益母草胡麻防風

猪牙皂角荆芥羌活

獨活白芷川山甲

當歸川芎白姜參

各等分為末蜜丸
如龍眼大每服一丸

一日三丸好酒磨
下仍隨量飲以

醉為度

防風荆芥羌活獨活白芷當歸川芎穿山甲僵蚕
等分為末蜜丸如龍眼大每服一丸一日三丸好
酒磨下仍隨量飲以醉為度

中濕

濕者。天地鬱蒸之氣也。方其升騰于上。氣猶籠結而
未開。雖寒天值之。亦覺溫煖。此濕氣之熱者也。及其
布濩于下。氣將流演而舒散。雖暄月值之。亦覺其清
涼。此濕氣之寒者也。濕氣之熱者。多中于氣虛之人。
則發為濕熱之症。頭面如裹。而四肢浮腫。身體重着。
而轉側不便者是也。濕氣之寒者。多中于血虛之人。
則變為寒濕之症。四肢酸疼。而關節不利。筋脉拘攣。
而行履重滯者是也。其有不因鬱蒸之氣而得者。必

其見雨而行涉水而走或露臥以取涼或汙衣而不解漸漬于肌肉之中添于骨髓之內流溢于脾胃之間牢纏于腰腎之處則肌肉冷而骨髓疼脾胃薄而不覺動乎火邪則腫痛而難忍隨其所感而病癰癧焉醫者審其濕之或寒或熱人之或虛或壯病之或上或下感之或淺或深因其病而藥之亦庶乎其近之矣。

藥例

八

頭面如裹濕熱上蒸

蒼朮黃芩各大升麻

防風薄荷甘草

加葱姜

四肢浮腫

蒼朮羌活各大升防風

防己腹皮烏藥

黃芩甘草姜葱

也

頭面如裹乃濕熱蒸于上也

此宜以蒼朮黃芩爲主佐以升麻防風薄荷甘草加葱姜酒煎溫服之微汗出卽愈矣

四肢浮腫平素原無脾胃之症者乃濕熱滯于肌肉

也宜以蒼朮羌活爲主藥佐以防風防己腹皮烏藥黃芩甘草加姜葱酒煎溫服之微汗出卽愈矣

身體重着轉側不便者乃濕熱滲入而將深也

宜以蒼朮白朮爲主藥佐以靈仙烏藥枳殼羌活

南星半夏生姜

身體重着

蒼朮白朮各大升烏藥

靈仙枳壳羌活防風

南星半夏生姜

防風南星半夏加生姜酒煎服之。微汗出即愈。
凡此三症皆因濕熱不散故宜微汗雖病人氣虛亦宜先治其濕而不宜先補其氣先補其氣則腠理皆密濕無繇而散矣必待浮腫能消重着能脫而後參芪之類可服也。

四肢酸痛
虎骨當歸各大蒼朮白朮肉桂烏頭茯苓防己木通牛膝桑條威靈仙加車前竹汁

四肢酸疼關節不利乃寒濕入骨節也。
宜以虎骨當歸爲主藥佐以蒼朮白朮官桂烏頭茯苓防己木通牛膝桑條靈仙之類水煎加車前子艸汁服之小便利則愈矣。

筋脉拘攣

四物湯 大茯苓澤瀉

木瓜牛膝防己白朮

甘草 薏仁

附子肉桂 各少

大法濕在上 升麻引經

濕在下 茯苓同

濕在中 白朮甘草

濕在遍身 羌活烏藥

濕在兩臂 桑條

濕在兩股 牛膝

筋脉拘攣行履重滯乃寒濕滲于血脈也血得寒濕則阻滯而不流脈得寒濕則牽制而作痛宜以四物爲主藥以養其血佐以茯苓澤瀉木瓜牛膝防己白朮甘草薏仁以去其濕少加附子官桂以溫其經則愈矣。

凡此二症皆因寒濕所中惟血虛者得之夫濕病宜燥而反不用燥劑爲主藥者以燥劑太過能乾其血故也血一乾而病終不可愈矣故寧以養血爲主治而佐以利濕溫經之藥使寒得熱而除濕

得熱而散也。太法濕在下以升麻引經濕在下以茯苓引經濕在中以白术甘艸引經濕在遍身以羌活烏藥引經濕在兩臂以桑枝引經濕在兩股以牛膝引經濕熱與寒濕皆以此爲準此其大畧也。

寒濕疼痛宜外治之法
以膏藥貼之

生姜半碗米醋一盞
廣膠四兩熬成膏入
肉桂元胡牙皂川烏
草烏各五六錢射香一錢攬和
銳香一枚搅和撫于
擦患處先以生姜
擦患處烘熱貼上

寒濕疼痛宜外治之法以膏藥貼之

生姜汁半碗米醋一盞廣膠四兩熬成膏入肉桂
花椒牙皂川烏草烏末各五六錢射香一錢攬和
攏于絳絲上先以生姜擦患處烘熱貼上甚效又

有湯洗法見股痛門

骨節疼痛

白术一兩土炒酒三盞煎一盞頓服如不能飲酒以水代之服後畧飲幾杯以助藥力

腰脚疼痛

黑牽牛大黃各二兩白术一兩爲末滴水爲丸如相予大每服三四十丸食前生姜湯下如要利加至百丸

濕傷腎經腰重冷痛小便自利

督覺

中濕

附子白木杜仲

生姜水煎

附子泡去皮臍各一
白术兩半兩
杜仲半兩

每服五錢。水一盞。姜七片。空心服。

脾濕太過。四肢腫痛。腹脹喘逆。氣不宣通。小便赤澁。

草庵四兩防已二兩

茯苓一兩

木香半兩

草庵四兩

防已二兩

赤茯苓一兩

木香半兩

右爲末。棗肉爲丸。如桐子大。每服三十丸。食前桑

皮湯送下。

風濕相搏。

風濕相搏。手足掣痛。不可屈伸。或身微腫。

羌活

附子

白术

甘草等分

諸濕腰痛

甘遂一兩當歸

陳皮各五錢

為末酒送下

附瘧症

瘧症

引經

人參主藥
白朮 茯苓 甘草

桔梗潤肺

黃芩 山梔子

瓜蔞子通肺

麥冬 五味子

木通升麻

升麻 提肺氣

則可以收全功矣

諸濕腰痛。四肢腫滿。及酒傷。胸脇刺痛。口乾目黃。不能統攝。一身之氣。故成瘧也。

宜用四君子。以補其氣。桔梗引火。肺經。黃芩。山梔子。以清肺熱。瓜蔞子。麥門冬。五味子。以潤肺焦。通脫木。以通肺竅。少加升麻。以定肺氣。則可以收全功。

矣。

中暑

暑者。夏月炎蒸之氣也。丙子當權。祝融用事。威焰酷烈。鑠石流金。柔脆之軀。不堪燔炙。而中暑之病。有不免矣。夫暑卽爲熱。熱卽爲暑。初無異也。而昔人有中暑中熱之分。豈暑之外。又別有所熱耶。蓋暑與熱。本無所異。而人感之。則有異焉。今夫富貴之人。避暑于涼亭水閣之中。脩竹遶欄。而成蔭。清泉漱玉。而生寒。偃冰簾幕。以收涼。揮羽扇。以驅熱。浮瓜沉李。以消其渴。鮮菱脆藕。以解其煩。自謂可以無暑矣。而不知虛之。

所在邪。必奏之而暑之所中。繇其內氣之不充也。蓋富貴必生驕奢。驕奢必生淫慾。粉黛爭妍于枕簟。嬌羞含笑于簾帳。凡可以快心遂意者。罔不畢致。則戕命之斧斤日進于前。而追魂之鬼使日隨于後。雖藉肥甘之奉。形體不覓其虧。而不勝淫慾之私。元氣已消。其半積虛彌久。肌理必疎。坐談之頃。卒然爲暑風所傷。邪氣直入。霎時昏曠。精神俱失。迷不知人。甚至有角弓反張。此昔人所謂靜而得之爲中暑者是也。貧窮勞苦之人。無日夜之安息。戴星而出。乘月而歸。

憐念妻孥。奔走衣食。饑不及飯。渴不及飲。竭力于畎畝。而汗血成漿。驅馳于道途。而咽喉似炙。赤日方爲。魃而清風不來。熱地已成爐。而寒泉難覓。精神瘦而欲絕。筋力困而不支。卒然傾仆。不省人事。四肢不動。氣息短促。此昔人所謂動而得之爲中熱者是也。中暑中熱之分。特因動靜而名之耳。豈真謂暑熱有不同耶。治此症者。當視其所處之貧富。所爲之勞逸。所稟之虛實。所感之輕重。而斟酌以藥之。斯得之矣。

中暑昏曠不知人者急以
香薷飲灌之即甦

香薷大厚朴白扁豆
黃連甘草生姜水煎

氣虛
四君子湯 人參白朮茯苓
陳皮

有疾
二陳湯 半夏茯苓甘草
加五味子天門冬葛根天花粉

有熱 柴胡黃芩

頭痛 川芎

中暑身熱小便赤澀
少便不利木通淡竹葉

柴胡黃芩頭痛加川芎

中暑身熱小便不利加木通淡竹葉

中暑身熱小便赤澀
少便不利木通淡竹葉

伏暑引飲脾胃不利

半夏 醋炙一斤

甘草 生 茯苓 各半
姜糊丸五十九

伏暑發熱嘔吐惡心

半夏一斤
醋炙 茯苓各半
甘草 生 茯苓 各半
姜糊丸五十九

半夏

醋炙

甘草

生 茯苓

各半

姜糊丸五十九

甘草 生 茯苓 各半
姜糊丸五十九

甘草 生 茯苓 各半
姜糊丸五十九

甘草 生 茯苓 各半
姜糊丸五十九

甘草 生 茯苓 各半
姜糊丸五十九

中熱忌冷物得冷
昂允

中熱在路發昏不省人事

急以地漿灌之則醒切勿以冷水與飲飲之即死

用新胡麻一升炒黑碾爲末新汲水調下二十錢

中熱在路發昏不省人事

中熱在路發昏不省人事

若輕者以新汲水滴入鼻孔以扇搘之。

中熱顛仆不醒。

急以蚯蚓糞填脣中令小兒撒尿其上自醒然後

扶在陰涼處將一味天花粉煎湯頻頻飲之或用

香薷飲渴加茯苓麥冬五味虛加人參小便澀加

麥門冬虛者加人參

小便澀車前子木通

冒暑煩渴飲水過多心腹脹滿小便赤少

肉桂赤茯苓各五兩爲末蜜丸每兩作十九丸每

為末蜜丸作十九

胃暑煩渴飲水過多心腹脹滿小便赤少

用肉桂赤茯苓各五兩爲末蜜丸每兩作十九丸每

服一丸細嚼白湯冷水任下

瘡疾

瘡者殘虐之意從病從虐故名曰瘡是病也多發于秋以夏傷于暑故至秋而發也有先寒後熱先熱後寒單寒無熱單熱無寒太寒太熱微寒微熱之異分而言之先寒後熱者先得于寒先熱後寒者先得于寒大热者邪必深微寒微热者邪必淺又有久寒久熱經幾月而不愈者必其不守禁忌兼以元氣虛弱故也合而言之不專于外傷寒邪亦平日飲食不節

及七情六慾所傷。乘之以脾累痰而不散。與內之飲食外之暑氣相結。交固流聚于少陽之分。少陽位人身之半爲陰陽往來必繇之路。又在半表半裏之間。瘡久而不愈則成瘍母。藏于脇下者少陽之分也。治此病者以引經藥引至少陽之分而以消食化痰陳風調氣之劑。瘡下者少陽之分也。或陰陽交會則寒熱交作久而不愈則結成瘍母藏于脇下。脇下者少陽之分也。治此病者以引經藥引至少陽之分而以消食化痰陳風調氣之劑。量其輕重而投之無不應矣。然同一瘍也。有一日一發。有間百日一發。有三日一發者。何也。蓋病之所繇來者有遠

近也。冬傷于寒不即病直至明年之秋而後發者。則間日一發春傷于濕不即病至秋而後發者。一日一發夏傷于暑不即病至秋而後發者。一日一發受病幾半年間日一發受病幾三年。一日一發受病幾三月。一日一發得之于寒。一日一發得之于溫。當以辛溫之藥散之。涼藥清之。當以清暑之藥治之。然必見

當以清暑之藥治之。

無汗。發汗散邪為主。

有汗。止汗正氣為先。
然散邪正氣而病不退者。
須分利陰陽治之。

其症有相合者。方可投也。如無汗要有汗散邪為主。
有汗要無汗。正氣為先。然散邪正氣而病不退者。須
分利陰陽治之。至于有食則消食。有痰則化痰。有風
則散風。有寒則攻寒。有熱則驅熱。有氣則開氣。新病
則去其病。久病則補其元精。而明之。則在乎其人也。

藥例

清熱 柴胡黃芩芍藥甘草連翹山梔子

治寒 乾姜桂枝麻黃

定寒熱 羌活防風柴胡芍藥炙甘草

芳藥

消暑 香薷黃連

扁豆厚朴甘草

消暑如香薷薄荷連扁豆厚朴甘艸之類。

消食 枳實黃連檳榔艸果三稜蓬木神曲麥芽山

天花粉黃芩桑白皮桔梗甘草

治疾 橘紅半夏貝母枳壳

桔梗甘草

定喘 杏仁蘋子馬兜苓

桔梗甘草

散風 防風荆芥紫蘇葱白生姜之類。頭痛加川芎

頭痛川芎白芷

骨節痛 差活無汗 蒼朮

無汗蒼朮

化氣 青皮香附烏藥枳殼木香砂仁之類。

枳壳木香砂仁

補虛必分氣血。氣虛以人參爲君。白朮炙甘草大棗之類爲佐。大劑芍藥以定寒熱。禁用茯苓黃芪。以

茯苓能引邪入陰經而不得出也。黃芪補表太過。

邪不能去也。血虛以當歸爲君。川芎熟地炙甘草大棗爲佐。大劑芍藥以定寒熱。津液少加門冬花粉之類。

久病新病皆用柴胡。但久病用少。新病用多。以瘧乃少陽經之病居多。而柴胡又少陽經之引藥。且治寒熱有功也。

瘧母在脇下非煎劑所能愈

生鱉甲醋炙浮石

半夏白芥子大治疾

蓬木枳榔枳實山查

艸菓治食香附青皮

木香開氣白朮陳皮

助脾共爲末以醋或

酒爲丸人參柴胡湯下

瘧久不往或三四日一發

掌山檳榔烏梅肉各四錢。炙甘草二錢。酒水各一

鍾隔夜煎露一宿。次早溫服。微吐即效。

常山根榔子烏梅肉各四錢。炙甘草酒水各一鐘隔夜煎露一宿。次早溫服。微吐即效。

次早溫服微吐即效

或用掌山一兩。剉碎。以好酒浸一宿。瓦器內煮乾。
爲末。每服二錢。水一盞。煎至半盞。去渣停冷。五更
初服之。不吐。不瀉。效。

或用知母貝母掌山檳榔等分。水酒各一盞。煎至
一盞。綿覆一宿。五更面東服之。卽效。不可令婦人
煎。

瘧疾發于春夏冬三時者。非其時而有其氣。乃似瘧
而非瘧也。或一日兩發。或一日三發。其寒熱無定
時。醫者不可以瘧治之。必其陰血不足。兼感外邪。

四物湯信加酒炒芍藥

柴胡羌活防風

甘草以去外邪

陳皮枳壳香附子
以調其氣

有痰
姜汁竹瀝

有食
檳榔子竹葉

故也。

宜于四物湯中。倍加酒炒芍藥爲主治。佐以柴胡
羌活防風。甘艸之類。以去外邪。陳皮枳殼香附之
類。以調其氣。有痰加姜汁竹瀝。有食加檳榔艸葉
之類而已。

醫鏡卷之二下

金沙王肯堂宇泰父著

茂苑張映垣玄映父叅

武水蔣儀儀用父較

痢疾

痢者。卽下利之病也。從病從利。故名曰痢。然其爲病。豈一朝一夕之故哉。其所繇來者漸矣。蓋因平日飲食不節。油膩生冷。恣嗜無忌。或饑飽不時。或冷熱不釋。停蓄于中。久而不化。又或外感暑濕。內傷七情。行

房于既飽之餘。努力于過飽之後。所積之物。煅煉稠粘。有赤有白。有赤白相雜。與純黃色之異。不見其糞。而惟見其積者。爲藉氣血而變成也。傷于血。則變成爲赤。傷于氣。則變爲白。氣血俱傷。則赤白相雜。若赤白兼黃。則脾家亦傷。而純于赤白者。亦未必非傷脾所致也。使無赤白。而其色純黃。則專傷脾土。而氣與血猶未甚動焉。至若下利如黑塵之色。及屋漏水者。皆不治之症。或大孔如竹筒。唇如硃紅。皆死候也。而噤口者。亦多死。以其無胃氣。而邪熱獨結于上也。太法

初起當先推蕩。而後調理。病久則帶補兼收。切不可驟用滻藥。初痢一滯。積聚不去。多致死亡。又不可因久痢之人。氣虛不攝。妄投黃芪升麻之類。下痢若服黃芪。卽發脇脹。若服升麻。則小便與積皆升。至上焦。此速死之道也。但傷血。則調血。傷氣。則調氣。傷脾。則養脾。當寒而寒。當溫而溫。當燥而燥。當清而清。因病用藥。其可以執一乎。

初痢裡急後重者。濕多也。必先于燥濕。

初痢裡急後重者。濕多也。必先于燥濕。

蒼术防風大黃連

桔梗子木香

初利腹痛甚者食積多也必先于消食積

大黃大厚朴枳實檳榔蓬木甘艸待其利

當歸白术茯苓芍藥

調理之

下利化黃必先消食養脾

蒼朮厚朴茯苓名大

白术枳實陳皮蓬木

橘梗山楂神曲甘艸

赤利必先于清血

當歸大黃連山楂子

麦芽桃仁甘艸

白利必先于調氣

木香大陳皮厚朴

白术茯苓神曲麦芽

芍藥甘艸

赤白相雜必先調氣養血

當歸木香名大桃仁

山楂子麦芽陳皮白术

黃連甘艸

血利久不愈者帶補兼收

當歸芍藥川芎地黃

白术地榆烏梅五味子

甘艸及黃連

宜以蒼朮防風爲主佐以黃連檳榔木香之類使之快利

初痢腹痛甚者食積多也必先于消食積

宜以大黃爲主佐以厚朴枳實檳榔蓬木甘艸之類待其利後方以當歸白术茯苓芍藥之類以調

理之

下痢純黃必先消食養脾

宜以蒼朮厚朴茯苓爲主佐以白术枳實陳皮檳

榔蓬木山楂神曲甘艸之類

赤痢必先于清血

當歸大黃連山楂子

麦芽桃仁甘艸

白痢必先于調氣

類

宜以當歸爲主佐以黃連山楂麥芽桃仁甘艸之

宜以木香爲主佐以陳皮厚朴白术茯苓神曲麥芽芍藥甘艸之類

赤白相雜必先調氣養血

宜以當歸木香爲主佐以桃仁山楂麥芽陳皮白术黃連甘艸之類

血痢久不愈者帶補兼收

宜以當歸芍藥川芎地黃爲主。佐以白术地榆烏梅五味甘艸之類及黃連。

白利久不愈者帶溫補

白木人參茯苓甘艸

肉豆蔻肉桂調子烏梅

大棗煨姜

赤白相雜久不愈者帶補氣血兼溫

當歸白术芍藥人參

肉豆蔻烏梅甘艸栗壳

大棗

久利不愈至九十月間者

大補兼溫

人參白术各大黑姜烏梅肉豆蔻肉桂各甘艸大棗

久利不愈至九十月間者大補兼溫

宜以白术人參茯苓甘艸爲主。佐以肉荳肉桂調子烏梅大棗煨姜之類。

甘艸栗殼大棗之類。

下利純血不稠粘者乃傷

血也必消導其血

宜以大劑人參白术爲主。佐以炒黑乾姜烏梅肉荳肉桂炙甘艸大棗之類。

下利純血不稠粘者乃傷血也必消導其血

當歸桃仁紅花山楂子

楂木赤曲牛膝地黃赤芍

甘艸

此病在大人多難愈在小兒則惟以食積治之

休息利經年累月不愈

休息痢經年累月不愈或愈後不時復發者是也此

當歸地黃人參白术各

川芎芍藥茯苓甘艸肉桂

烏梅肉豆蔻

不用煎劑。即以此爲末。
用大棗煮熟去皮核成
膏。加生姜汁拌和爲丸。
空心米湯送下。一丸。

噤口利絕不飲食食
即隨吐蓋爲邪熱在
上焦。脾土不能爲主。
故患此病者多死。
白芍木香黑姜等劑。

乾山藥細茶。各大人參
蓮肉。黃連。石菖蒲。茯苓。

噤口痢絕不飲食食。卽隨吐蓋爲邪熱在上焦。脾土
不能爲主。故患此病者多死。若治得其道。亦或有
可生者。宜用白芍木香黑姜等劑。

宜以乾山藥細茶爲主。佐以人參。石連。黃連。石菖
蒲。茯苓之類。水煎。加生姜汁。徐徐呷之。任其吐出。

胸次一開。自然思食。

仍與飲之。又吐。又飲。終至不吐。即可生矣。再與二
三服。卽愈。以後不必再服。胸次一開。自然思食。何
噤口之有。故宜用石菖蒲。

疫利增寒壯熱。解表
蒼朮。大羌活防風。

解表。發散。

人中黃芩藥。黃芩
黃連。姜葱水煎。

宜以大劑蒼朮爲主。佐以羌活防風。人中黃芩藥
黃芩黃連之類。加葱白生姜服之。

泄瀉

泄者如水之泄也。勢猶緩徐瀉者如水之瀉也。勢已直下微有不同而爲病則一故總名之曰泄瀉要其致病之繇皆因內傷飲食外感寒濕脾土受傷不能運化以致陰陽不分偏滲太陽而病斯作矣然亦有先感怒氣而後傷飲食者有先傷飲食而後感怒氣者有適值飲食之時而忽暴怒者有憂鬱內結而含悲以食者有飲食後卽入水洗浴者有飲食未久復飲食者凡此皆足以成此病善調攝者不饑不食不

渴不飲。喜怒有節。不使太過。何致有泄瀉之患哉。太抵泄瀉與下利皆脾家之疾。而受病之新久不同。故勢有輕重。而治之亦有難易也。然果何以知之。蓋宿食停于中。得濕熱而始變。則有赤白諸般之色。而爲泄下利。此受病已久。故有積而無糞也。飲食過飽。挾寒濕。而不盡化。則大便通利。無裏急後重之苦。而爲泄瀉。此受病未久。故有糞而無積也。此瀉與痢之別也。如是用藥者。其可以槩施乎。然諸痢多熱。而寒者少。諸瀉多寒。而熱者少。或有少。惟完穀不化。屬於客熱。

在脾火性急速。不及傳化。而自出也。然亦有脾寒不能運。而完穀不化者。此其掌也。治此病者。當視小便之赤白。察其脈之洪數沉遲而已。小便赤脉洪數。則爲熱。小便清脉沉遲。則爲寒。醫者不可以不辨也。

藥例

暴泄者。皆因生冷油膩。恣食無節。或飲酒無忌。適觸寒邪。故成暴泄。其瀉出者。皆是水。乃陰陽不分。偏滲大腸。而小便必短澁。治者以利小便爲先。小便利。則大便止矣。

泄瀉以利小便爲先。
一味車前子炒爲末
以水湯送下四五錢
後
白朮大蒼朮厚朴
茯苓陳皮神曲山楂
麥芽炙甘草姜枣

用一味車前子炒爲末以米湯送下四五錢或六

七錢其瀉立止然後以白术爲君蒼术厚朴茯苓

陳皮神麴山楂麥芽炙甘艸爲佐加姜棗煎服

寒瀉者腹中悶悶作痛痛久而後下者是也溫脾爲先

肉桂大白术乾姜陳皮茯苓炙甘艸大枣

寒瀉者腹中悶悶作痛

痛久而後下者是也溫脾爲先

脾爲先

用肉桂爲君白术乾姜陳皮茯苓炙甘艸爲佐加

大棗煎服

熱瀉者肚腹常熱而痛口乾舌燥小便赤澁所下之糞皆

之糞皆深黃色臭穢不可近者是也宜以清熱爲先

可近者是也

生芍藥大白术茯苓
黃連甘艸山楂麥芽
神曲

用生芍藥爲君白术茯苓黃連生甘艸山楂麥芽

神曲爲佐

食瀉者腹中絞痛痛一陣下即稍寬少頃又

頃又痛又下者是也宜以通利爲先

大黃枳實厚朴甘艸

版此藥後猶未愈者

白术枳實山楂麥芽
神曲陳皮甘艸

氣食兼併而瀉者兩脇

中院皆痛

青皮木香香附砂仁
桔梗竹葉山楂麥芽

神曲

氣食兼併而瀉者兩脇中脘皆痛腹中嘔瀉亦不

甚通利者是也宜以行氣消食爲先

後調理之

蒼术白术茯苓
陳皮厚朴甘草宿食不消作瀉者
飽悶作痛

如傷肉食

山楂大三稜枳木枳實
黃連

如未傷

麦芽大神曲陳皮三稜
莪朮蒼术厚朴枳實
黃連

如傷麪食

茱萸子大枳實黃連
麥芽神曲枳實茱萸子

如傷冷

肉桂大乾姜檳榔草菓
茱萸子陳皮枳實

如傷油膩

蒼术大滑石茯苓陳皮
厚朴甘草白术神曲

如傷酒

葛粉菉豆粉天花粉
黃芩山梔子

傷酒

傷酒

用回藥

用青皮木香香附砂仁之類。以行氣。檳榔艸菓山查麥芽神麪之類。以消食。先服一二劑。後以蒼术

白术茯苓陳皮厚朴甘草之類。以調理之。

宿食不消。作瀉者。飽悶。作痛。或時。噯酸臭之氣。太便。溏滑。不甚通快者。是也。專以消宿食爲主。不必治其瀉。審其所傷之物。而以所治之藥消之。

食如傷肉食。宜以山楂爲君。佐以三稜蓬术枳實黃連之類。

如傷米食。宜以麥芽爲君。佐以神麪陳皮蒼术厚

朴蓬术三稜枳實黃連之類。

如傷麪食。宜以茱萸子爲君。佐以枳實黃連麥芽

神麪檳榔草菓之類。

如傷生冷。宜以肉桂爲君。佐以乾姜檳榔草菓茱萸子陳皮枳實之類。

如傷油膩。宜以蒼术爲君。佐以滑石茯苓陳皮厚

朴炙甘草白术神麪之類。

如傷酒。宜于消食藥中。加酒之藥。如葛粉菉豆

粉天花粉黃芩山梔之類。傷火酒。用酒麪。傷濁酒。

用酒藥必各從其類。

直腸自下者名曰洞瀉。

直腸自下者名曰洞瀉。
白术大五味子訶子肉荳牡蠣粟殼之
壯蠅栗壳

太劑白术爲君。佐以五味訶子肉荳牡蠣粟殼之
類。

每朝登廁溏滑者名曰脾泄。

久瀉腰痛者名曰腎泄。
每朝登廁溏滑者名曰脾泄。
白术大煨姜大棗茯苓炙甘草之類。
杜仲大白术茯苓人參
肉豆蔻訶子五味子

久瀉腰痛者名曰腎泄。

久瀉腰痛者名曰腎泄。
杜仲大白术茯苓人參
肉豆蔻訶子五味子

一說宜腎爲先。

破胡參 茴香

每朝登廁溏滑者名

曰脾泻
白术大煨姜大棗茯苓炙甘草之類。
甘草

泄瀉兩脇痛者名曰肝泄。

泄瀉兩脇痛者名曰肝泄。
太劑芍藥爲君。佐以白术茯苓蒼朮厚朴青皮甘草之類。
此得之于憤怒。

芍藥大白术茯苓蒼朮厚朴青皮甘草之類。

禁用姜橘以其補肝也。

當泄瀉時又閉而不下及所下者多白沫而有聲乃
風泄。閉而不下所下者多白沫而有聲乃
防風大蒼朮厚朴

陳皮甘草白术茯苓

芩之類。

宜以防風爲君。佐以蒼朮厚朴陳皮甘草白术茯

完穀不化者其病多危蓋因純寒純熱而無胃氣以

完穀不化者其病多危

白术大热者

黃連山梔子

連翹大枣糯米

有寒者

肉桂肉豆蔻煨熟附子

乾姜大枣糯米

運化平不必用消食之劑。但以白术爲君。審其熱

加姜炒黃連山梔連翹之類。入大棗糯米煎服。審

其寒加肉桂肉豆蔻乾姜煨熟附子甘草之類。入大

棗糯米煎服。

凡瀉本屬濕多因飲酒不節致傷脾胃而作治者當分利小水爲上。而補脾燥濕消食次之。須知初瀉補脾久瀉補氣。又有久瀉腸胃虛滑者宜以升提收澁之藥爲主治。此大法也。

私結

秘者氣之秘也。
結者糞之結也。

秘者調其氣
結者潤其血

魂當

秘者氣之秘也。結者糞之結也。氣秘則攻擊于腸胃而瘀塞于魂門。欲下不下。雖努力以伸之而難于通暢。甚至有肛下者。糞結則乾澀堅硬。多轉失氣而小腹結痛。欲下不下。甚至有肛門燥烈而瀝血者。秘而不結。雖不通利。而不甚難。難結而不秘。雖不滋潤。而不甚費力。惟秘結兼至。難中之難也。少壯之人多患秘。以其氣有餘。而不及轉運也。衰老之人多患結。以其血不足。而大腸乾燥也。又有所謂風秘者。嘗欲轉

失氣而氣終不洩。肛門壅塞，努力伸之，則有聲如裂帛，而糞又不下者，是也。其根始于傷風咳嗽，咳嗽將愈，而此病卽發。以肺與太陽相爲表裏，風入于肺，而傳病于大腸故也。脈經曰：尺脉見浮風入肺。太陽乾澁，秘難通，非此之謂乎？太法秘者，調其氣結者潤其血，而秘之得于風者，卽于調氣潤血藥中，加去風之劑，則得之矣。

藥例。

氣秘不通，以調氣爲先。

氣秘不通，以調氣爲先。

木香、枳殼、檳榔、青皮、陳皮、蘇梗、加玄明粉三四錢，長流水煎。

宜以木香爲君，枳殼、檳榔、青皮、陳皮、蘇梗之類爲佐。長流水煎，加玄明粉三四錢，量大小虛實用之。
玄明粉乃朴硝所成也。其法以提淨朴硝入罐，大火煅成沙，傾在淨地上，待冷，每硝十兩加甘艸二兩，爲細末，卽成粉矣。

糞結不下者，以潤血爲先。

當歸、大知母、麥門冬、桃仁、麻仁、蘇子爲佐。長流水煎，加蜜數匙，結甚加蜜一兩，熟猪脂半兩，謂

和服之。

秘結兼至者，以調氣潤血爲先。

秘結至者以調氣潤血爲

木香當歸大枳壳桃仁

知母麥門楡梗麻仁

加玄明粉生蜜

長流水

風秘者以去風爲先

防風大荆芥紫蘇葱白

木香當歸枳壳桃仁

煎法如前

風秘者以去風爲先

防風大荆芥紫蘇葱白

木香當歸枳壳桃仁

煎法如前

老人黑瘦血枯而不通者

四物湯倍加當歸地黃

兼以麻仁麥冬

煎法如前

老人黑瘦血枯不通者以生血爲先

宜于四物湯中倍加當歸生地兼以麻仁麥冬

之類長流水煎加生蜜服之

內熱秘結者以清熱爲先

黃芩大石羔山梔子黃柏

麥門冬桃仁

煎法加減微前

熱結甚者

大黃大厚朴枳實桃仁

甘草大忌巴豆

後重不下者以抑火爲先

黃連大木香檳榔大黃

當歸

或加炒熟黑牽牛子

宜以黃連爲君木香檳榔大黃當歸爲佐煎服之

或用黑牽牛炒熟每斤取頭末四兩爲細末和

生蜜搗如泥丸。如桐子。每服三錢。白滾湯下。善飲者。好酒送下。

統治一切秘結

桃人 蔘子 各五枚

統治一切秘結。

用桃仁去皮。蘇子淘淨。各五錢。搗爛。入水一碗。再研和。以布絞去渣。調生蜜一兩。服之。

生蜜一盞。滾湯一碗。調和。加玄明粉二錢。調和。加玄明粉三錢。

或用生蜜一大杯。滾湯一碗。調和。加玄明粉二錢。服之。卽時通快。不損脾胃。此聖藥也。

脾約丸
若人胃強。脾弱。約束津液。不得四布。但輸膀胱。而小便數。大便難者。用脾約丸。

潤腸丸

若人陰血枯槁。內火燔灼。肺受火邪。土受木傷。肺脾失傳。而大便秘。小便數者。用潤腸丸。

五臟之有脾胃猶五行之有土也。天一生水得土之五而成六。地二生火得土之五而成七。天三生木得土之五而成八。地四生金得土之五而成九。天五生土復得土之五而成十。五行無土不能成五行。五臟無脾胃不能資五臟。脾胃者五臟之本也。心肝肺腎不能容飲食能容之者脾胃也。飲食入于脾胃而精氣行焉。味之鹹者先入于腎。所謂水得土而成水也。味之苦者先入于心。所謂火得土而成火也。味之

酸者。先入于肝。所謂木得土而成木也。味之辛者。先入于肺。所謂金得土而成金也。味之甘者。本官受之。而實所以調和五臟。所謂土得土而復成也。夫然後腎水掌足。心火寧靜。肝木條達。肺金清潤。而周身脈絡。無不貫通。病無自而作矣。故善保身者。惟養脾胃而已。不節勞則傷脾。而四肢于是乎倦怠。不節食。則傷胃。而中脘于是痞塞。濕土之氣鬱而不發。則臌脹黃疸之疾成。濕土之氣潰而下注。則痢疾泄瀉之病作。而脾胃之症。此其極矣。不但已也。脾胃一傷。則五臟皆無生氣。繇是爲腰痛。爲煩惱。爲膀胱脹滿。而腎始病矣。爲恍惚。爲怔忡。爲煩躁。而心始病矣。爲呑酸。爲吐酸。爲脇脹。爲多怒。而肝始病矣。爲咳嗽。爲喘急。爲呃逆。而肺始病矣。五臟之病。亦有自爲病者。朱可皆歸罪于脾胃也。而病之始于脾胃者居多焉。人可以不調理脾胃乎。要而言之。飲食勞倦。皆宜有節。而二者之間。又以節飲食爲主要。蓋胃居脾下。飲食之所聚也。而化之權。則在于脾。脾覆乎胃。運閼闈之機。無一時而不動。胃火上升。脾火下降。氣掌溫緩。是

以飲食易消。若嗜味而過飽。則玄塞胃口。上碍于脾。脾雖欲動。不能動矣。其能以尅化乎。此所以調理脾胃。又莫先于飲食之節也。

藥例

大抵肥白之人。多濕。一有脾胃之症。必濕淫于內也。宜大劑。蒼朮爲君。白术半夏爲佐。以燥之。而久兼。以茯苓澤瀉。猪苓木通之類。以利其濕。使從小便而出可也。

黑瘦之人。多血少。一有脾胃之症。必脾虛不能裏血。

肥白之人。多濕。蒼朮 大白术半夏 茯苓澤瀉 猪苓木通

黑瘦之人。多血少。人參白朮

四物湯合四君子湯
即八珍湯

胃弱不知滋味。用胃氣藿香木香檀香。人參白朮。砂仁甘草。佐加烏梅酸氣入鼻。最能開胃。

脾虛作瀉

人參。白朮。茯苓蓮子

薏仁。荳子。訶子。烏梅。肉荳蔻五味子

胃弱。不知滋味。飲食厭倦者。宜鼓動其胃氣。必以芬芳藥開之。如藿香木香檀香之類。君以人參白朮。

三個。酸氣入鼻。最能開胃。此捷法也。

脾虛。作瀉。氣不收攝者。宜大補其脾。畧加收澁之劑。

婦人脾胃不和胸膈痞

滿

白术 大枳實 陳皮 各

杏附子 一斤 作丸

宜人參白术爲君。茯苓蓮肉薏仁之類爲佐。而以
調子肉菓五味烏梅之類。則收澁之劑也。

婦人脾胃不和胸膈痞滿

老人脾胃不和大便乾澀

雉腿木 大枳實 陳皮

當歸 一斤 甘草 半

老人脾胃不和大便乾澀

宜以白术爲君。枳實陳皮爲佐。每藥一斤。配便浸

香附一斤。作丸服之。

老人脾胃不和大便乾澀

宜以鷄腿木爲君。枳實陳皮爲佐。每藥一斤。配歸

身一斤。少加甘草。作丸服之。

統治脾胃之劑。

統治脾胃之劑

白术 大茯苓 大枳實

陳皮 甘草

有寒 肉桂 有熱 薑連

扶疾 半夏 桔梗 茯苓 木

血不足 當歸 地黃

氣不足 人參 黃芪

有食 神曲 麦芽 莱菔

有蟲 檳榔 川楝子 針砂

使君子

有氣 木香 香附子

青皮

宜以白术爲君。茯苓陳皮枳實甘草爲佐。挾寒加
官桂。挾熱加黃連。挾痰加半夏。挾濕加蒼朮。血不
足加歸地。氣不足加參芪。有食加神曲麥芽萊菔
子之類。有蟲加檳榔川楝子針砂使君子之類。有氣
加木香香附青皮之類。要在斟酌用之不可執泥。
其餘泄瀉下痢。臌脹黃疸之症。雖皆屬于脾胃然。
自有本條開陳。此不復贅。

蟲症

蟲。動物也。艸木水土之中。宜有之。何爲而有于人之腸胃中乎。蓋蟲者。亦得天地之氣。以成形者也。而形不自成。必假物而後成。如艸腐而生螢。雀死而成蛇。魚肉爛而生蛆。皆藉有形之物。感陰陽之氣。而後形體成焉。人身小天地。而人之氣。卽天地之氣也。然則蟲之生于腸胃中者。亦豈無所假而成哉。飲食入胃。不能消化。如魚鮓肉醢。生麪硬飯之類。停積于中。濕熱相感。稠粘膠固。資熟血以相裹。得生氣以陶鎔。則

不動之物悉能成動之形。頭尾皆兵而渾然一蟲類矣。其始也因飲食而變其既也賴飲食以養。綏擾蟠結食人精氣飲人膏血壞人臟腑。殃人壽命蟲之爲害可勝言哉。大凡難化之物皆能生蟲不但如酢醤麴飯之類而已。若誤吞頭髮羽毛尤爲易生者也不特此也。雖無質之物亦能生焉。如濃茶濁酒本無質者而所澄之脚最能成病故有茶癬酒積之症久之亦變爲蟲。成于茶者掌思食茶成于酒者必酷嗜酒一日不遂所欲則一日不能暫安此其症也又有所

謂癆蟲者又何所自而生耶。蓋癆蟲卽尸蟲也。癆疾之人多瘀血。瘀血不消得火煅煉遂成細蟲其色多赤無翼而能飛或隱或見其來也不測皆血之所化也。以其爲血所化故比諸蟲則甚靈焉。血統于肝而肝則藏魂故此蟲者魂之所依也。病人旣死魂隨蟲出好覓同氣同氣之親不幸而染之則成傳尸癆焉。此又蟲之最可畏者也。然蟲病久恒有之。醫者何以灼知其眞而藥之耶必有形症可見也。蟲病之人面黃肌瘦唇白毛枯容顏不澤臉多白印時覺惡心口

吐清水或心腹絞痛飲食不爲肌膚或頭髮猙獰酒
浙惡寒或額面生瘡濕癰沿連皆其症也知此則可
以用藥矣若夫癆蟲之形症必其人之父兄伯叔先
患癆症而死而其人復有是症乃可以決之耳又豈
與諸形症同哉

藥例

口中吐蛔者乃胃火上升蛔不能安故隨火而起也
宜先以烏梅黃連安之使其降下然後以殺蟲之
劑投之可也然殺蟲之劑切不可用花椒花椒雖

蛔者乃胃火上升

烏梅黃連安之

能殺蟲而其味本辣若干吐蟲之時而驟用之必
跳躍而起寧不絞壞心胸乎醫者不可不知也縱
使欲用必先去其核溫湯浸浮令其口開空朝以
好酒送下亦治法也此不惟可以治蟲而患寒症
者亦能治之

大便去蟲者當在其自出若去蟲太甚者不可專治
其蟲也

宜以白术等藥安其脾佐以檳榔川棟使君子之
類以除其根斯文補兼施之道也

白术等藥以安其脾
檳榔子川棟子使君子
斯攻補兼施之道也

蟲病腹滿作痛必下之

黑牽牛一斤大黃四兩

丸飲時好酒送下

三錢大下諸蟲然後

人參白朮陳皮茯苓

甘竹大棗補之

蟲病腹滿作痛必下之

用黑牽牛一斤取頭末四兩用生大黃四兩再研

極細蜜水爲丸如桐子大餳時好酒送下三四錢

大下諸蟲然後以人參白朮陳皮茯苓炙甘艸大

棗補之

蟲食下部肛門痒甚乃大腸受熱生化細蟲爲害也
雖服丸散煎劑道路甚遠不能奏功必當其處取
之方可

用猪肝一大塊切作圓穩一條長可五六寸煮熟

四圍刺作眼如簪脚大者三四百孔蘸糖塞進肛
門其痒益甚少頃痒止其蟲已入肝中徐徐取出
另換新者塞之如此數次即愈亦治婦人陰戶有
蟲痒不可忍者甚驗不可視以爲迂也

好食茶者謂之茶蟲酷思酒者謂之酒蟲欲飲油者
謂之油蟲至于小兒多好食生米壁泥皆蟲所使
也

皆當以殺蟲之藥如鉛灰雷丸檳榔川棟使君子
之類爲丸卽以所好之物送下直至蟲處而殺之

殺蟲之藥

鉛灰雷丸檳榔子

川棟子使君子
丸以所好之物送下

一法不必服藥。但使病人禁食所好之物。苦忍之。忍至四五日。其蟲不得所食。則饑而上升以求食。口中覺饑甚。將病人鄉縛檻上。令其覆臥。然後以所好之物。近其口邊引之。香氣入喉。必湧躍而出矣。

癰蟲爲病。面黃骨立。肚腹臌脹。小兒多有之。

宜用大蠍墓幾隻。將砂仁入其腹中。令滿。以線繫其足。倒掛當風處。陰乾。炙脆爲末。同人參白朮。枳實。檳榔。使君子。黃連。針砂。麥芽。山楂。陳皮之類。共糖拌服之。

研細爲丸。如米粞大。或爲散子。糖拌服之。大有奇效。

凡治蟲病。當于每月上旬服藥。乃能奏功。若非上旬。多有未效。蓋諸蟲每月上旬。頭皆向上。故服藥逕至其口中而殺之。此亦但論治蟲之日期耳。不可執以爲一定之法。若病勢已急。豈能待其上旬耶。尸蟲方。已見瘧瘧門。此不復贅。

黃疽

黃疽之病。皆濕熱所成。濕氣不能發泄。則鬱蒸而生。熱。熱氣不得宣暢。則固結而生濕。濕得熱而益深。熱因濕而愈熾。二者相助而相成。愈久而愈甚者也。然求其濕熱之所繇生。未有不繇于大醉大飽。及醉飽後。食睡久臥。與努力行房而得者。或醉飽後入水洗浴。寒氣欬束。密其腠理。汗不得出。以致濕熱相感而成此病焉。外不得汗。內不得瀉。薰蒸濡染。滲入皮膚。上達面目。下至足膝。中及手臂。前腹後背。皆如釜金。

小便赤如姜黃。猶之。雖麴醬因濕熱而成其色也。太法上半身黃甚。則宜發汗。下半身黃甚。則宜利小便。以分消其濕。而佐以退熱之劑。然又必觀其所傷之物。而消化之。非徒治其濕熱而已。此不易之論。若久而不愈。還宜救脾與血也。欲知其不治之症。何以斷之。曰。黃疸變黑如烟塵者死。小便如膏者死。腹脹者死。飲食太少者死。渴者難治。不渴者易治。若眼漸白。小便長者。病將退也。

藥例

黃疸因中酒而成者

宜大劑葛根爲主。佐以天花粉山梔子茯苓甘艸梢木通車前子之類。以利小便使濕從下行。蓋酒本

無質之物。只宜利小便而已。

因食傷而成者。審其所傷者何物。

如肉食則山楂阿魏。穀食則麥芽神曲。麴食則萊菔子陳皮。宿食則枳實黃連。暴食則檳榔艸朮之類。佐以利小便之劑。

因水色而成者。每曰勞疸。亦未有不繇于醉飽者。

穀疸
肉食山楂阿魏
穀食神曲麥芽
麴食萊菔子陳皮
宿食枳實黃連
暴食檳榔子艸朮

酒疸
葛根大天花粉山梔子
茯苓甘艸梢木通車前子

黃疸死訣
變黑如烟塵者
小便如膏者
腹脹者
渴者難治
飲食太少者
不渴者易治
眼漸白小便長者
病將退也

女勞疽 活血為先生血次

梔人紅花丹皮

並以四物湯

加消食消酒之劑

並利小水

若不醉不飽。雖行房亦未必成黃色。治此瘍者。以活血為主。生血次之。如桃仁紅花丹皮赤芍之類。兼以四物湯佐。以消食消酒之劑。并利其小水而已。

大黃 三錢 厚朴 二錢
官桂 一錢 甘草 五六分
麻黃 一錢 或單用

得病後全無汗者

因傷食既久。服消食藥不效者。勿以不效而遂止之。宜多服幾貼。浮動其根。待腹中絞痛。即以大黃三錢。厚朴二錢。官桂一錢。甘草五六分。下之。

蒼朮白朮。葱白。紫蘇。
羌活。又無汗。再加桂枝。

得病後全無汗者。乃腠理痏密。濕不能散也。宜以發汗為主。如蒼朮白朮。葱白。紫蘇。羌活之類。又無

汗。再加桂枝。麻黃。甘草。或單用。浮萍。艸煎。濃時時飲之。亦能取汗。若有食則消其食。有酒則消其酒。當消息之。不可專于發汗。若身壯熱而無汗。則用麻黃。勿用桂枝。

身面皆黃。又發熱者。熱多于濕也。

茵陳 君 山梔子黃連

若服寒涼之劑。而熱不退。宜加幾

退。加人參。連翹。芍藥。麥冬。服之。

若純用寒涼之劑。脾不能堪。多有發半脹者。慎之。慎之。

甘草 生
麦冬
若純用寒涼之劑。脾不能堪。多有發半脹者。慎之。慎之。

但于劑中加生姜幾片。則藥有監制而功可奏矣。
凡黃疽之病。其原必起于脾虛。不能運化。轉輸不及。濁氣拂鬱而然。是脾虛爲本。濕熱爲標。又有傷寒熱病。陽明內實。不得發越。亦令發黃。治法不可一例而施也。

統治黃疽。久不愈者。

用桃樹根束行者一束。洗淨切碎。煎。二至三碗。令病人空朝服之。約人行二十里許。卽欲大便。下盡黃水。卽愈矣。然不可謂全妥。又必調理脾胃。庶不生。

他症也。

附黃腫。

人有病黃腫者。不可誤以爲黃疽。蓋黃疽者。遍身如金。眼白皆黃。而面無腫狀。黃腫之黃。則其色帶白。而眼自如故。雖同出脾胃。而病形不同。醫者當審而治之。黃疽之起。繇于濕熱蒸染。而黃腫之症。則濕熱未甚。而多蟲。與食積之爲害也。或偶吞硬食過多。碍其脾家道路。經久不消。脾家失運化之權。則氣上騰。故面部黃。而且浮。手足皆無血色。其有蟲者。必宜黃水。

毛髮宜指皮膚不潔，且好食生米茶葉之類，甚也。若腫及四肢者難治，腫及腹者不治。飲食減甚，亦不治。以其無胃氣也。

藥例

黃病
治蟲
使君子 檳榔子 銀灰
雷九川棟子
治食
枳實 黃連 阿魏 山楂子
蓬木艸葉
去其濕熱
白朮 蒼朮 茶芩 澤瀉
刺萍 鈎砂 又可少
其功尤多

作丸藥而劑中又不可無針砂。有針砂則其功易奏。此皆王道之藥也。若欲收霸功，則巴霜硝砂礞石之類爲末，以棕角搗爲丸，其功尤速也。如其不然，則但以消食殺蟲之劑先服，幾貼浮動其根，然後以承氣湯下之亦妙。

臓脹 水腫

臓脹之所以得名者。以其肚腹脹緊。彈之有聲。有初乎鼓。故名曰臓脹。然果何自而致此哉。蓋臓脹之作。有得于食者。有得于氣者。有得于氣食兼併者。有先得于色。而後傷于食者。有先得于食。而後傷于色者。傷于食。則食不消。而胃氣已窒。傷于氣。則肝經受病。而痞塞不通。傷于氣食。則肝益有餘。脾益不足。以有餘之肝木。克不足之脾土。則氣愈結。而食愈不化。繇是臓脹緊急。而病日益深矣。先得于食。而後傷于色。

則脾先受病而腎繼之。中脘先脹而後及于小腹。先得于色而後傷于食。則腎先病而脾繼之。小腹先脹而後及乎中脘。若氣與食色三者皆備。則一齊而發。中脘小腹兩脹盡脹。此病之尤重者也。腹脹不愈而眼下忽如臥蠶狀者。必發水腫。然水從何而得耶。蓋人之一身血與肉而已矣。食入于胃。則游溢精氣。可以生肉。飲入于胃。則灌漑百脉。可以生血。飲卽水也。飲既生血。則血之所成。成于水也。自出母胎以至成童。自成童以至壯盛。其所飲既多。則其所生亦多水。

卽未成之血。血卽已成之水也。使其善于調攝。不爲氣與食色所傷。則血不受病。何水腫之有。惟夫外傷于氣。內傷于食與色。則內氣交結。而血帶不流。又中挾脾濕。下連腎水。水土混淆。滲于皮肉。則一身之血復變爲水。與脾腎二經之邪統而爲一。且旁達于四肢。充滿于上下。其狀如匏。其冷如冰。其堅如石。而病斯極矣。欲知其死生。何以斷之。曰。臌脹之病。脅滿者重。脅突者死。飲食太少者死。水腫之病。委足心平滿者死。面黑者死。此斷死生之大訣也。大法治臌脹者。

以資脾去濕實，利水爲主。治水腫者，以行水爲主，而後補之。

鼓脹

傷于食者

桔榔艸菓 枳實陳皮

茱萸子山楂子麥芽

白朮蒼朮 厚朴大腹皮

茯苓猪苓車前子澤瀉

青皮枳殼木香烏藥

傷于氣者以開氣爲主

其餘藥與前同用

藥例

傷于食者，以消食爲主，而佐以扶脾利水去濕寬脹之劑。如檳榔艸菓枳實陳皮萊菔子山楂麥芽之類，以消食。白朮以補脾，蒼朮以去濕，厚朴大腹皮

以寬脹。茯苓猪苓車前澤瀉以利水。

傷于氣者，以開氣爲主，而佐以扶脾利水去濕寬脹之劑。如青皮枳殼木香烏藥之類，以開氣，而其餘

藥與前同用

氣食兼併者，以前消食開氣之藥爲主，而所佐之藥。

如去濕寬脹利水之劑，亦與前同。

先傷于食而後傷于色者，以消食爲主。如前所用之類，而兼用當歸紅花蘇木桃仁以活血，其餘所佐之藥，亦與前同。

先傷于色而後傷于食者，以活血爲主。如當歸之類，而消食之劑，亦同于前。其餘所佐之藥，亦同前可也。若氣食與色兼備，皆以前藥參用。又當分其緩

當歸紅花蘇木桃仁

活血

急而次第施之。

婦人亦有氣臌。食臌而血臌併多。以其多起于經閉。及產後惡血不出所成也。方與論俱見婦人門而氣食所成者亦以前所用者爲準也。

凡治此病切不可用其艸。而諸藥之中必多用生姜皮煎服。

水腫之病有因臌脹而得者。有不因臌脹而得者。皆視其眼下高起如臥蠶者必發此病也。論大法亦宜實脾利水寬膨去濕順氣。然病勢至此則水氣

必多用生姜皮

用事真氣無權。正如一國之中已爲大寇所據。而爲之君者既失其地方。且以君子之道勸之。徒激其怒耳。于事竟何益哉。必以大兵臨之。乃能濟事。雖城郭宮室之美。人民庶物之富。不無大壞而猶不失其故土。亦可以招集叛士復其舊業。而宗社血食或可保也。何以異。于是乎故實脾利水之劑。雖曰穩當。而未能速應。必先用甘遂。芫花葶苈大戟之類。開通水道。使從大小便一齊而出。如大禹治水。掘去壅塞順流而下。始能底續。待其水下之

以攻擊之藥水下之際時與米湯飲之

醫錄

際時時與米湯飲之則病人不至眩。運水既下盡然後更以八物湯作丸子服之則庶乎其可也。然此亦求一生意于萬死之中耳。至于死生存亡猶未可知。醫者以活人爲心故不能不曲爲之所。豈眞以是病爲易治而輕試其手哉。

水腫病不問年月遠近

大戟當歸陳皮各一
水二升煮七分頓服

又治血臌

水腫病不問年月遠近

用大戟當歸陳皮各一兩剉碎水二升煮七分頓服當利下二三斗至重不過再服此方亦治血臌。

水氣遍身浮腫氣促坐臥不安

用牽牛二兩微炒搗末以烏牛屎浸一宿平旦入葱白一握煎十餘沸去渣空心分爲二服水從小便中出。

總治水腫看何經加藥

葶苈川椒雄黃澤瀉芫花醋浸大戟甘遂赤芍芩桑白皮穿心巴戟各一爲末每用一兩水浸煎入

分空心溫服小便多爲效加藥之法須看何經從陰腫起其根在腎加澤瀉一兩從腹腫起其根在

從口唇
從陰腫起加澤瀉一兩從腹腫起加川椒一兩
加巴戟一兩

總治水腫

葶苈山梔雄黃澤瀉芫花醋浸炒大戟甘遂赤芍芩桑白皮穿心巴戟各一兩

爲末每用一兩水浸煎八分空心溫服小便多爲效

從口唇
從陰腫起加澤瀉一兩從腹腫起加川椒一兩
加巴戟一兩

從面腫起 脾

桑白皮

從脇腫起

甘遂

從項腫起

茯苓

脾當作肺

醫錄

肚加川椒一兩。從口唇腫起。其根在小腸。加巴戟一兩。從面腫起。其根在脾。加桑白皮一兩。從脇腫起。其根在骨。加甘遂一兩。從項腫起。其根在膈。加茯苓一兩。仍審其虛實。加減忌食雜物。所謂加藥者。一劑之中再加一兩也。須活法用之。



通脉丸解
桑白皮
桂枝
甘遂
茯苓

附註

用加川椒一兩。從口脣腫起。其根在小腸。加巴戟
一兩。從面腫起。其根在脾。加桑白皮一兩。從脇腫
起。其根在肝。加甘遂一兩。從頸腫起。其根在膈。加
茯苓一兩。仍審其虛實。加減忌食雜物。所謂加藥
者。一劑之中再加一兩也。須活法用之。

附註

卷之二十一
一
起其根在腹。桑白皮一兩。甘草
一兩。杏仁一兩。加蜜。大便通。急
者。一劑之中。再加一兩也。須滑法用之。
一
一

