

醫心方卷第十一

✕
i 109-1

F 10
1-70

寶心方卷第十一

治霍亂吐下并絞痛者

治霍亂吐者

治霍亂吐心腹脹者

治霍亂吐腹脹者

治霍亂吐心腹痛者

治霍亂吐者

治霍亂吐心腹脹者

治霍亂吐者

治霍亂吐心腹脹者

治霍亂吐者

治霍亂吐心腹脹者

治霍亂吐者

治霍亂吐心腹脹者

治霍亂吐者

治霍亂吐心腹脹者

490.9
Is-3
10

No. 2256
12 i 109-1



富士川支庫
1409



醫心方卷第十一

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治霍乱方第一

治霍乱心腹痛方第二

治霍乱心腹脹滿方第三

治霍乱心痛方第四

治霍乱下利不心方第五

治霍乱吐瀉不止心方第六

治霍乱嘔噦方第七

治霍乱于瀉方第八

治霍乱煩渴方第九

治霍乱轉筋方第十

治霍乱手足冷方第十一

治霍乱不語方第十二

治霍乱欲死方第十三

治中熱霍乱方第十四

治欲作霍乱方第十五

治霍乱後煩躁方第十六

治霍乱後食法第十七

治下利方例第十八

治雜利方第十九

治冷利方第二十

治熱利方第二十一

治赤利方第二十二

治血利方第二十三

治赤白利方第二十四

治久赤白利方第二十五

治白滯利方第二十六

治膿血利方第二十七

治水穀利方第二十八

治休息利方第二十九

治泄利方第二十九

治重下方第三十

治疝利方第三十

治盡注利方第三十三

治不伏水去利方第三十四

治噓逆吐利方第三十五

治利魚渴方第三十六

治利魚腫方第三十七

治利後虛煩方第三十八

治利後不能食方第三十九

治利後噦方第三十九

治利後逆滿方第四十

治利後穀道痛方第四十二

治霍乱方第一

病源論云霍乱者由人温凉不調陰陽清濁二氣有

相干乱之時其乱在於腸胃之間者日遇飲食而

變發則心腹絞痛其有先心痛者則先吐先腹痛

變發則心腹絞痛其有先心痛者則先吐先腹痛

者則先下利心腹並痛者吐利俱發挾風而實者
 身熱頭痛體疼而復吐利虛者但吐利心腹刺痛
 而已二三有飲食肉腥ナニナニ生冷過度ナニナニ曰居處不節或
 露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦
 傳於脾胃二二得冷則不磨二二則水穀不消化点
 令清濁二氣相干腸胃虛弱便致吐利水穀不消
 則令心腹脹滿皆成霍乱二二有三名一名胃反言其
 胃氣虛逆返吐飲食也二名霍乱言其病揮霍
 之間便致繚乱二也三名走哺言哺其食變逆者也養生

方云七月食蜜令人暴下發霍乱也
 千金方云論曰源夫霍乱之為病也皆因食飲非
 開鬼神夫飽食アチチ肚膈復冷乳酪海陸百品無所不啖
 眠卧冷席多飲寒將水胃中諸食結而不銷陰陽
 二氣擁而反虞陽氣故昇陰氣故降陰陽永障
 變成吐利頭痛如破百節如解トケル遍體諸筋皆
 為迴轉論時雖小卒ニ分九病之中最為可畏雖臨
 深履危不足以喻之也養生者宜遠其指趣庶
 可免於交橫者矣極要方云得吐利者名濕霍

乱不吐利者名于霍乱得多致人往有湿霍乱不有性命之憂

集驗方云欬而吐利此為霍乱也

葛氏方云凡所以得霍乱者多起於飲食或飽食

生冷物雜以肥鮮酒膾而當風履湿薄衣露坐或

夜卧失覆之所致也治之方初得之便致令温煖

以火灰布其所卧床下大契減並並被絮若衣絮

自抱冷易契者又方可燒地令契水洩數蔣席卧

其上厚覆之又方可作的尔契湯著中漬之冷

至膝并銅器若凡器盛湯以著腹上衣藉之冷

復易湯又方可以熨斗盛火著腹上而不靜者

便急灸之但明索次第莫為乱灸須有其

病乃随病灸之霍乱艾丸苦不大壯數苦不多

本方言七壯為可四五壯无不活便火下得眠

方凡患霍乱灸之或時雖未
老終无死憂不可不送灸

千金方云凡諸霍乱忌米飲胃得中米即吐不

吐但得与厚朴葛根飲今案葛氏方云可送備厚
朴每向秋月便賣自隨之

又云凡霍乱醫所不治方童女月衣合而燒酒服方

寸七秘方

今素小品方云湯藥條周
通不若服之立愈

范汪方治霍乱吐下不止理中湯方人參干

薑白朮甘草各一兩水三升煮得一升半分二服今素小品方藥各

三兩水六升煮取三升分三服醫門方白朮三兩人參三兩甘草二兩干薑二兩水七升煮取二升半若胃滿腹痛吐下者如當

歸厚朴各二兩若博者寒者渴者並主之

錄驗方治霍乱虛冷吐逆下利理中丸方

人參甘草各二兩干薑白朮各二兩凡四物搗下蜜丸如

彈丸取一九內煖酒中服之日三今素本草菽教注

如梧子得四十六丸如彈丸一枚又方單煮厚朴飲三升有効

又方煮梨葉服之

今素醫門方云取梨枝葉一大握以水二升煮取升頃服立効

効驗方治霍乱吐下理中散方甘草二兩人參

二兩干薑二兩朮二兩

凡四物治節酒服方寸七日三

小品方扶老理中湯治羸老冷氣惡心食飲不

化腹虛滿物急短氣及霍乱欬逆四支冷心

煩滿氣閉流汗患主之人參五兩干薑六兩

朮五兩麥門冬六兩附子三兩伏苓二兩甘草五兩

凡七物下節節作散臨病者三合白湯和方寸

一服不効セシ又服常將者モト蜜丸酒服如梧子廿九
 又云霍乱吐下汗出实冷轉筋飲逆煩悶欲得ホレ
 冷水者方可与厚朴葛飲進沾喉中而已慎勿ホレ
 与米飲及粥但与此单行飲以代米飲水漿
 水也又方取霍香一朶以水四升煮取一升頃服三
 愈イモ今素本草云一朶重二兩為正又方煮青木香汁飲至佳又云治
 卒道中得霍乱无有方藥危急方 蘆蓬
 肯大朶煮令味濃頃服二升即是有効イモ
 醫門方治霍乱吐下不止者方煮百沸湯細

添生水ソ契飲之アツク今素那繁論云熟水一升
 又方或者

高良薑或者煮木朶汁飲之カハネクモ 通玄經云治霍

乱方木朶煮作飲服之一名ハカマク今素本草陶注云
 若子并枝煮飲

救急单驗方療霍乱方桂三兩煮汁取一盞

頃服驗 陶景本草注云霍乱吐下方楠材削

作楠煮服之治霍乱心腹痛方第二病源論

云霍乱而心腹痛者是風冷之氣容於府藏之

間冷氣相擊或上攻心或下攻腹故心腹痛也葛氏

方治霍乱若腹痛急似中惡者方

構生昌蒲根飲汁少シヒハ多ク令下シヒハ多ク即イニ老イニ又云卒得霍

乱先腹痛者方灸齊上カア一夫十四壯名大倉若繞脊痛

者灸齊下シモ三寸四壯名開元今案千金方云一夫者以四指為一手夫即當大倉謹要方療

霍乱心腹激痛方當歸ヤチセリ三兩桂心三兩干薑三兩甘草

一兩右以水七升煮取二升分三服小品方治心腹暴

痛及宿食不消或宿冷煩滿成霍乱方作塩湯三升

使極臑シカラ熱飲一二升刺吐令宿食盡不吐復服吐訖

使極臑熱飲シカラ復飲三吐乃佳須靜乃上勝諸湯

丸今案廣濟方塩一升水三升煮取一升三合温服八合又云霍乱腹痛吐下方

刺也
刺也
刺也

取桃葉冬三四字注天用皮統ホリ按取汁一服一杯立愈イニ可濃煮

飲三升者婆方治霍乱先腹痛方煮生薑熱飲之

又方厚朴汁飲之僧深方治霍乱腹痛而煩方

高良薑カネクモ四兩以水五升煮取二升分二服名スルカア蘘敬本

草注霍乱絞痛方粟米泔汁飲數升立老トコロイニ

廣濟方療霍乱心腹痛煩ムカク臨不心方厚朴四兩

橘皮二兩人參カクネクモ二兩當歸ヤチセリ二兩霍香一兩高良薑カネクモ

四兩切以水七升煮取二升五合分温三服名スルカア忌生冷

粘食通玄方治霍乱先腹痛方好驗酢細飲トキ

一盞許ハカリ又方用火炙腹及背得汗アセ即愈イユ

治霍乱心腹胀脹滿方第三 病源論云霍乱而心腹

脹滿者是寒氣与蔵氣相搏ハ真耶相攻不得吐利

故令心腹脹滿ム

葛氏方治霍乱心腹胀痛煩滿短氣未得吐下方

半薑モシハ若干薑一二升以水五六升煮三沸頓服若不即

愈更可作イヒ又云治若煩悶湊滿者方ハ

灸心下三寸七壮名上管又方以塩内齊中灸上二七

壯又云治煩噎腹脹厚朴湯方厚朴四兩桂二兩枳カ

實ア五枚生薑三兩以水六升煮取二升分三服

耆婆方治霍乱煩悶湊滿方厚朴二兩多以水三升

煮取一升半分三服老人小兒モ旦佳 范汪方治霍

乱腹中脹滿ハ惡毒悶絕不通氣息急危方生薑一

累クチナシ支子十四枚桂心一兩香豉クシ五合四物イ搗以酒二升解之

去滓頓服七ハ今素録驗方生薑累數以其一支是義為累取服肥大

為小品治方霍乱腹痛脹滿短氣不得坐ハ下灸不効ハ

者契伏心蔵中煩悶鬱ハ者方可取白粉水和如糜汁ハ

傾之頓飲一升許即吐者便愈不吐者刺吐之永不吐者

皆危也クタイアハラモチ无粉者折シ粉米取汁シ僧深方治霍乱腹胀

滿不得吐方梁米粉アハラハルシホコ五合以水一升半和如粥頓服セ須臾

吐若不吐難治痛端目錄作痛字

治霍乱心煩方第四

病源論云霍乱而心煩者大吐大利府藏氣暴極

故心煩必有未吐利而煩者是冷氣入於腸胃

逆上故名煩

醫門方療霍乱心煩方

香豉七合綿裹支子人三兩厚朴三兩炙

又水五升モ煮取二升去滓分温三服セ重者不過再必愈イ

通玄經云霍乱心煩悶不已方

用粟米汁飲之半升即愈アハラハルシホコ

又方服粟米粉和水服一合立愈アハラハルシホコ

又云霍乱吐下已止菱熱心煩欲飲水方

可与少秫米粉汁佳若不止可与葛根七方年著七方年蔗飲也膾赫二音

治霍乱下利不心方第五

病源論云霍乱而下利不止者是腸胃俱冷而換宿虛

穀氣不消故也

小品方治霍乱洞下腹痛方

以艾一把以水三升煮得一升頓服之良

又古霍乱卒吐下不禁者人參湯主之方

人參二兩 伏苓二兩 葛根二兩 橘皮二兩

麥門冬二兩 甘草二兩

凡六物以水五升煮取二升分三服

葛氏方治霍乱下利不上者方

灸足大指本節內一寸側白完際左右各七炷名大都

又古霍乱吐下不止方于薑菜黃各一兩水二升者取一升一服

又古灸兩乳邊里外近腋白完際各七炷

今案治霍乱吐利理中湯理中丸主之在上條

又古先洞下者灸齋邊一寸男左女右十四炷

又古吐而下不止者灸齋下一夫灼中七炷

治霍乱噓吐不心方第六

病源論云霍乱而噓吐者冷氣入於胃氣變乱冷耶

既成穀氣不和胃氣逆上故噓吐也

葛氏方治霍乱噓吐不心方

生薑五兩水五升煮取二升半分三服

僧深方治霍乱煩痛嘔吐不心并轉筋方

生香葉一把握桂心二兩生薑三兩三物以水七升煮取二

升分二服甚良

又云霍乱嘔吐水藥不下茱萸湯方胃氣逆者以公羅

茱萸一升黃連二兩附子一兩甘草一兩生薑三兩

凡五物以水七升煮取三升分三服

小品方治霍乱嘔吐及暴下方

半复三兩干薑四兩人參三兩桔梗三兩附子四兩

凡五物下節臨病和之若吐下不心者以苦酒和之飲

服二丸如梧子大

范汪方治霍乱嘔吐附子湯方

大附子一枚甘草六銖蜀椒二百粒三物水三升煮取

一升半分再服

治霍乱嘔吐方第七

病源論云霍乱而嘔吐者由吐利後胃虛而逆則嘔氣逆

遇冷折之氣不通則嘔之

范汪方治霍乱嘔吐氣厥不得息方

香豉一升半复一兩甘草一兩生薑二兩

人眾一兩 カニノミ 苡胡一兩 アヲシ 六物以水五升煮取二升半

服七合日三 セウ

又方半复二兩 生薑二五兩水三升 煮得一升合分

再服

葛氏方霍乱若宛者 セウリ丸

灸手腕第一约理中七壮名心主當中指也

小品方治霍乱欬厥吐逆良久不心方 三升水三升煮

灸巨闕並大倉各五十壮

今案巨闕穴在去鳩尾骨端一寸大倉者中管穴在上管下一寸

治霍乱于鹽方第八 オシヒ丸

病源論云霍乱而于鹽者吐下後脾胃虛冷三焦不

理氣不結於心下氣時逆上故于鹽者謂故鹽 オシヒ丸

而无所出也

小品方治霍乱或引飲之輒于飲方 オシヒ丸

生薑五兩以水五升煮令得二升半久再服良

又去治干欬逆喘半足厥冷橘皮湯方

橘皮四兩 生薑半斤 煮令得二升半服之

凡二物以水七升煮取三升一服 オシヒ丸

一升湯下咽即愈 オシヒ丸

葛氏方霍乱干瀉者方

灸手梳後三指大兩筋間左右各七壯名間使

又方取薤一席口以水二升煮令得一升半服之

不過三作

治霍乱煩渴方第九

病源論云霍乱煩渴者大利津液竭

則渴也煩渴不上則引飲之則利点不止

葛氏方治霍乱吐下後大渴多飲則斂人方

可以黃粟米五升水一斗煮之得三升

澄稍飲之勿飲餘飲之

醫門方霍乱熱心煩渴者方

以糯米水漬研之以冷煎水混取米泔汁恣意飲

之即定極効

僧深方霍乱吐後煩而渴方

紫蘘子一升水五升煮取二升分二服无子取生蘘

一把水四升煮一升半分二服

小品方治霍乱煩渴者方

染米汁泔飲數升立瘳

又方取新汲冷水飲之

集驗方云治霍亂而渴者理中湯主之

治霍亂轉筋方第十

病源論云霍亂而轉筋者由冷氣入於筋故也

葛氏方霍亂轉筋者方

灸臍心下五六壯名涌泉

又方灸大指上爪甲際七壯

又方苦酒和粉塗痛上

又云轉筋入腹痛者方

令四人捉手足灸脊左一寸十四壯

又云若轉筋入腹中如欲轉者方

燒編蘆索三指撮酒服之

又方釜底墨末酒服之

又云腹中已轉筋者方

當倒檐病人頭在下勿使及地腹中平乃心

又云若兩臂脚及胷脅轉筋者方

取塩一升半水一斗者令執清手足在胷脅者湯洗

之轉筋入腹中若劇者引陰縮必死猶在倒檐

之可糞也

千金方霍乱轉筋方

藜一把去兩頭水二升煮取一升頃服之

又方內塩香中灸二七壯并治腹脹

又方以車轂中脂塗足心下

又方灸少腹横骨中隨年為數

又云轉筋在兩臂及胸中方

灸手掌白肉際七壯又灸臍中府巨關胃管

小品治霍乱轉筋方

以苦酒煮布裹瀉之冷復易又方可以白截煮
音奄漬也 截側更及 本書誤字 玉酢并但載夏茶汁也

龍門方治霍乱轉筋方

取木瓜子根莖煮湯服驗

醫門方治霍乱轉筋方

取契煨灰以驗醋和令微温炒令極契青布裹
及契熨筋上冷易之隨手消散也

又云霍乱遍身轉筋入腹不可奈何方

多作塩湯内舂槽中令温暖漬之佳小品方

云大驗

桂要方霍乱轉筋方凡九

生薑一斤 右水七升煮取二升分三服

刑繁論霍乱轉筋方凡九

取絮巾若綿炙暖以傅筋上今案范汪方轉筋在脚纏脚入腹纏腹厚温煖已向火也

范汪方治霍乱轉筋方

鼠壤土水和塗其上愈又方取麴凡一名苦酒合粉小温之塗于麻之凡九

廣利方治霍乱轉筋入腹方

取塩三合以水五升煮取三升以青布浸湯中用拭轉

勸上

陶景本草注云治霍乱轉筋者

但呼木依名及書上作木依字皆金愈

治霍乱手足冷方第十一

病源論云霍乱大吐下其腸胃俱虛乃至汗出其脉欲

絕手足皆冷名為四逆者謂陰陽卒厥絕也

葛氏方先手足逆冷者方各足內踝上一夫兩足各七壯

又云治下不止手足逆冷方

枳百枚附子一枚 水三升煮取一升一服

醫門方霍乱吐利不止心煩四支逆冷方張

厚朴甘草人參カクニク白朮各二兩生薑三兩以水六升煮取三升分三服

小品方霍乱多寒手足寒厥脉絕茱萸四逆湯主之方

吳茱萸二升カラハシカア當歸三兩ヤトセリ夕藥二兩モヒククリ桂心四兩アラウネウセ細辛二兩

生薑半升ワシフハシカア通草二兩ヤトセリ甘草二兩

凡八物以水四升清酒四升合煮取三升分四服

録驗方霍乱吐下而汗出小便復利或下利清穀裏外无

契脉微故絕或惡寒四支拘急手足厥逆四逆湯主之方

人參三兩カクニク干薑三兩附子二兩甘草三兩

凡四物以水六升煮取二升半分三服轉筋完モラカリハヒ

出歐跪者良。小品方同之

治霍乱不語方第十二

葛氏方治霍乱欲死不能語方

生薑一斤切水七升煮取二升分三服

又方飲竹瀝少許又方蘆蓬芽大把濃飲二升

即差イヒマ又方干薑三兩甘草一兩附子一兩水三升煮取二升

分三服

治霍乱欲死方第十三

病源論云霍乱而欲死者由飲食不消冷氣内搏或米

得吐利或雅吐利冷氣未歇致真耶相干陰陽交爭

氣厥不理則煩悶逆滿^{困乏}之故欲死

撻要方療霍乱隘而煩悶脹喘垂死經日不解方

厚朴四兩桂心四兩枳實三兩生薑十兩以水八

升煮取三升分三服

葛氏方治霍乱衆治不效煩躁欲死脹氣急方

燒童女月經衣血末以酒服少立差

又云治霍乱神秘起死灸法

以物橫度病人口中屈之後心鳩尾度以下灸度

下頭五壯橫度左右復灸五壯此處先灸中央

又方灸脊上以物圍令心心厥又夾脊左右一寸

各七壯是腹背各灸三處也

又云華他治霍乱已死上屋喚魄者諸治皆至而猶不

老者方

捧病人覆卧之申臂對以繩度兩肘頭依繩下

夾背脊大骨中去脊各一寸灸之百壯无不活

者已試數百人皆即

越坐他以此術傳其子度世秘不傳也

又去注利不心而轉筋入腹欲死方

生薑三累柏破以酒半煮三四沸頓服之

治中契霍乱方第十四

小品方治中契暴下利霍乱變契心煩脉數者方

飲新出井水一升立愈飲多益善此治是胃中

多契者也无契者慎之不可与也

又云蒼朮湯治先有石契因霍乱吐下服諸契藥

吐下得止目空虛仍變煩干足契口燥欲得水飲遲迷

悶脉急數者及時行契病後毒未盡日霍乱吐下仍

發契煩胸悶欲破裂者方

蒼朮二兩人參二兩厚朴二兩知母二兩桔樓二兩

葛根二兩枳實二兩犀角二兩藍子二合桔梗二兩

橘皮二兩伏苓二兩黃芩二兩甘草二兩

凡十四物以水八升煮取三升分五服

治欲作霍乱方第十五

耆婆方治人腹脹欲作霍乱方

厚朴二兩以水三升煮取一升半分三服即差

最善老人モ三佳シ夏秋月恒量此藥在家有志即煮

服ヲ

醫門方療心腹脹滿カク堅痛煩悶不安雖未吐下欲霍亂方

取塩五合水一斗ヲ煮令消頓服之當吐食出即定セ如不吐

更宜服

今葉葛氏方塩二斗以水五斗煮取二斗頓服

葛氏方治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方

生薑モシハ若干薑一二斗以水五六斗ヲ煮三沸頓服

小品方治霍亂煩擾未得吐下方

煮香葉汁ホク飲之

今葉葛氏方去取藜若香葉細切二斗水五煮再三沸頓服

第汝海反

治霍亂後煩躁方第十六

病源論云霍亂之後而煩躁卧不安者由吐下後府

藏虛極陰未理陽血虛氣亂フセ血氣之行未復常度内乘

於府藏故煩躁不安卧也

葛氏方治霍亂後煩躁卧不安方

葱キ白キ廿枚オ大棗オ廿枚オ水二斗煮取一斗頓服之

治霍亂後食法第十七

醫門方云若霍亂吐利定之後胃氣虛弱不可強食

便更作病ナ俟待須食仍ヤ薇ヤ与稀飲勿令至飽其飲

宜炒粟米者之為佳

千金方云凡此病定已一日不食為佳仍須三日少

与粥三日已後乃恣意食息也仍七日勿雜食為佳

又云諸霍乱忌米飲胃中得米即吐不止但得与厚朴葛根飲

治下利方例第十八

千金方云論曰凡利有四種論冷熱甘盪冷則白熱則

赤甘則赤白而雜盪則純痰血熱則多益黃連去其干

薑冷則加其熱藥甘則以藥吹灌下部盪則以盪

法治之

又云古今利方千万不可具載此中但據其効者七

八而已雖然弘之在人也何則陸厘丸烏梅丸松皮散

等暴利服之何有不差其温脾湯建脾丸久下得之

焉能不愈也

醫門方云辨曰比見下利者因多觸熱飲水或夜露坐

卧冒霜雪風寒耶氣客於皮膚流傳入於藏府隨其

冷熱腹胃不調或因食肥膩而生或因食冷熱而發

生於風而復生溇泄者未詳其理

又云下利故飲者為有熱利而不渴其藏有寒下

利後更煩按其心下軟者為虛煩也

識
識

又云下利有不欲食者有宿食宜下 下利甚時
復發此為不盡宜下下利腹滿不減不足言當
利而識語必有燥屎當下利脈遲滑實者為未
止宜下下利脈數而滑者有宿食急下 腹痛而利
但當溫之

又云下利甚者手足痺不仁下利而反發熱身形
汗出者自愈下利脈數而渴故飲自愈下利熱汗出
者自愈

又云下利手足无脈灸之不溫後喘者死下利後脈絕

手足厥冷平時脈還手足溫者生脈不還手足冷
者死又云凡人久下利或熱或暴下兩日即有蠶虫口唇生
瘡口中舌上唇並生瘡如粟瘡裂者心中懊悶唾
血此為虫在上食人五藏下唇内生瘡者食人下部
欲卧宜以蠶虫藥療之
葛氏方云下利手足逆冷灸之不暖或无脈後喘者死
利舌萎煩躁而不渴者死下利不禁腸垢出者死今案
下利人可食物

- 赤小豆 孟詵云 止痢
- 小麦 本草云 止利
- 青梁米 本草云 止洩利
- 黄梁米

本草云 丹黍米 本草云 梗米 本草云 檣 本草云 柚 本草云

梅 本草云 柿 本草陶注云 石榴 本草云 通草 崔禹云 赤白下利

椽實 本草云 雉 本草云 雲雀 崔禹云 赤白下利 鷓鴣 孟詵云 患 利人可和

生薑 崔禹云 雀 崔禹云 赤白下利 鷓鴣 崔禹云 赤白下利 鮒魚 本草云 赤白利

鮒魚 崔禹云 赤白下利 鮓 崔禹云 赤白下利 鯨 崔禹云 赤白下利 鮓 崔禹云 赤白下利

海鼠 崔禹云 雀 崔禹云 赤白下利 小羸 崔禹云 赤白下利 董葉 崔禹云 上冷利

蜀枳 本草云 下利人可忌物 千金方云 九利病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪蘊

乾脯醬粉 所食諸食皆大須 乾爛為佳 亦不得傷

飽此將息之大經也 養生要集云 腹中有冷患 飲乳汁 令腹痛泄利 食

經云 杏人不可多食 令人契利 治雜利方第十九

病源論云 雜利 謂利色無定 水穀或膿或血或青或

黃或赤或白 變雜 无常或雜色相兼而利也 契

契則黃赤契甚則變膿血也 冷則白冷甚則青

黑皆由飲食不節 冷契不調 胃氣虛故易變

小品方治雜下方 第一下赤 二下白 三下黃 四下青

...

...

五下黑六固病下ハ如痰赤面七久下八下不可止
九連年下十卒下十一下少面ハ數十二霍乱而下十三
下如捨水十四下已則煩十五息下ハ一作一止十六而不
欲食十七食无ハ數但下者十八下但欲飲水十九重
下廿下雜錯不可詔字合廿種下江复大守以此
法治是下盡愈方

黃連カクテクセ一兩 黃蘗キクク一兩 乾姜ヤクセ一兩 附子ツク一兩 甘草イリク一兩

干薑カクテクセ二兩 烏梅ホシメ廿枚七ホシメ去核取完イシ熬之

凡七物合ホシメ鳩下モ後蜜和丸如大豆飲セ服十九漸セ

至廿九日三

今素葛氏方云治千万種雜下集驗方
号烏梅丸一醫門方治一切利无不老云

范汪方烏梅丸治万種下利方

干薑カクテクセ黃連キクク黃芩ヒニキ艾各一兩 烏梅ホシメ廿枚ホシメ取ホシメ

右六物丸如梧子服十九日三老少半良驗

又云治下利日百行師所不治方

麴末カクテクセ脹サ一方寸匕三以食愈為度當以粟米粥アハルルシチウカ服之

令李方治下利一日百起黃連散方

黃連カクテクセ二兩 甘草二兩 凡二物治節酒脹方寸匕

日三立愈

槌要方療冷熱不調或滯或水或五色血者方

醋石榴セロロ五枚合ナカラカア穀子コメ搗絞取二升汁服五合

廣濟方療百千種雜痢黃連湯方

黃連カクテク一兩 干薑一兩 熟艾ヤイモ一兩 附子ツ一枚炬 蜀椒セヒカア

十四粒阿膠アルカハ如手大セ切以水五升煮取二升五合絞シホリ

去滓セケル內膠イシ更上火煎膠アルカハ烱トケテ溫三服忌生豬肉

真蘇ヒル

傳信方云一切痢神効方ナル

阿膠
出東阿以多之

黃連二兩半 黃蘗キハク一兩半 零羊角半兩 伏苓フツボト半兩

右四味為散蜜和丸用薑蜜湯下クダセ

灸諸利方

經心方云灸脊中稍至二三百壯又灸關元三百壯

并治冷腹痛フマ 關元ツ香下三寸是也

新録方云灸脊中十三百壯從大推度至窮骨中折則是也

又方灸脾俞百壯第十一推兩旁名脾俞

又方灸腸俞百壯第十六推兩旁名大腸俞

今案石論云金液丹十種水穀赤白等利此丹皆治瘕

治冷利方第廿

病源論云腸胃虛弱受於寒氣腸胃虛則泄故
為冷利也凡利色青白黑皆為冷也色黃赤是熱
也故利色白食不消謂之寒中也

千金方駢車丸主大冷洞利腸滑下赤白如魚腦
日夜无節度

腹痛方

黃連六兩 干薑三兩 當歸三兩 阿膠三兩 四味以
大酢五合 洋膠和之併手丸如大豆服之大人服卅

丸小兒百日以還三丸暮歲者五丸四五服

葛氏方下色白食不消者為寒下方

干薑赤石脂各等末以白飲和丸如梧子曰十九日
服

三夜一

又方酸石榴皮燒末服方寸匕

又方生薑汁二升蜜合煎取二升頓服

又方豉一升薤白一朶水三升者取二升及漿頓服之

有大棗肉七枚良

又云有心患冷者淳下白如鼻涕治之方

龍骨タツノホネ 干薑附子分等イ 搗蜜丸服如梧子五丸ウチカカリ
至十九日三ニ

范汪方治寒冷下利方

干薑四兩 人參カクニホク三兩 桔梗アリのツヒキ四兩 附子セウ四枚炮半ホウダク

复三兩洗 凡五物下篩和丸平且服五丸如梧カカリ

子日再漸加之物勿禁食フタヒ

又云四順湯治逆順寒冷飲食不調下利方ル

甘草三兩 人參カクニホク二兩 當歸ヤトセリ二兩 附子一兩 干薑

三兩 凡五物水七升煮取二升半分三服今案傳

深方加龍骨二兩

又云四逆湯治下利清穀身及惡寒手足逆冷此為ル

四逆之湯主之相視病人与方相應便与之方ル

甘草二兩 附子一枚 干薑一兩半

凡三物以水三升煮取一升二分合分二服

小品方黃連湯治春月暴熱解脫飲冷或眠湿地ル

中冷腹痛下青黃汁疲極欲死方ル

黃連カクシクセ四兩 當歸ヤトセリ三兩 干薑三兩 厚朴二兩

凡四物切以水七升煮取三升分三服今案經方无厚朴有石榴皮

秘迹方温中湯治寒下飯臭出方

甘草一兩炙干薑半兩炙蜀椒八十枚去同者附子一枚四破

凡四物以水二升煮取一升分再服若飲內擣皮

半兩老少者皆取服良

廣濟方療冷痢青白色腹內常鳴行數踈出即

大多調中散方

龍骨一兩炙人參一兩炙黃連一兩炙阿膠一兩炙黃蘗一兩炙

兩搏節為散煮米飲服忌猪魚蒜炙肉粘食等

集驗方治久新寒冷下利腹內不安食輒注下令人

生肉烏梅丸方

烏梅三百六十枚去核附子四兩炙乾薑連

十二兩乾薑曰

凡四物搗下篩密丸飲服如梧子十九日再服方

治契利方第廿

病源論云腸胃虛弱風邪挾契乘之腸虛則泄故

為契利也其色黃若契甚黃而赤也

秘驗方青雲結腸丸治契毒下不絕不同久新患治

之方

若參橘皮阿膠ニカハ獨活ツクダ夕藥エヒスクスリ黃連カククダ藍青カククダ一

方干薑四曰ク代鬼又クア曰ク黃蘗キハク甘草四各ク曰ク九ク十物

合搗下篩蜜烱膠和之併手捻ネリ作丸如カク藎子干

以飲服十九日三ク不和ク稍ク增ク格

不和ク稍ク增ク

經心方烏梅湯治熱毒下有濕方枳果ク七ク十ク日ク再ク枳ク

黃連カククダ二兩烏梅ホニク枳果ホカハ阿膠ホカハ一兩支子ク枳ク黃蘗キハク一兩

五味以水五升煮取二升半ク分再服ク

新録方治熱利者方

干桑ク枳ク水三升煮取一升頓服ク

又方ク枳ク二升水三升煮取一升半二服ク

耆婆方黃連九治中熱下利方

黃連カククダ十二分干薑ク八分當歸ク八分右三物ク搗ク篩ク

和丸如梧子ク服二丸不知ク加之ク

葛氏方下色黃者ク協毒ク熱下也治之方ク

支子ク十四枚去皮ク搗蜜ク丸如梧子ク服三九日三ク

又挾熱者多下赤膿或難血治之方ク

薑連カククダ竈突中塵末ク酒服二方寸七日三ク

又方薤一把握オホカラ鯉魚鱗シロ鱖魚鱗シロ內林米食之多久差イシ

千金方治五利熱諸治不差方シモト

烏梅ホクニ實一升シ熬シ黃連カククキ一升シ金色者二味蜜和モ如梧子カカリ

脹シ廿九日三夜一神良 僧深方同之

廣濟方療熱毒痢甚數出不多腹中刺痛方セカコト

生犀角末三兩セコウカハ石榴皮三兩カククキ枳殼三兩カククキ

搗為散飲服兩方寸七日再忌熱食

治赤利方第廿二

病源論云腸胃虛弱為風邪所傷則挾熱乘於ルトスヤフラ

血之流滲入色滲入腹腹与利相雜下故為赤利

醫門方療赤利腹中絞痛下部疼重方セリ

黃連カククキ當歸ヤクセリ黃蘗キクク乾薑シラカ各二兩 右搗篩為散者カカリ

烏梅一升シ汁服方寸七日二

如意方治下赤利術

金色黃連カククキ一升シ去毛去毛黃蘗キクク一升シ犀角二兩シ凡三物

切以水五升煮取三升去滓七カカ內白蜜一升又煎三升

平且服至日中令盡勿間食也ハカシ

救急單驗方治赤利方

黃連カククシ三兩 黃蘗キククシ三兩 支子シキ人二兩 凡三物以物以

水九升者煮取三升分三服

又方搗黃連末和水服一匙以差為度

治血利方第廿三

病源論云血利者熱毒折於血入大腸故也身熱者

死身寒則生

千金方治大熱毒純血利治不可老者方

黃連六兩一味水以七升者煮取二升半夜露著

日星下且空腹頓服之卧息即止

槩要方療血痢方

真生犀角末五兩 阿膠四兩 干薑三兩 艾葉

三兩 黃蘗四兩 右五物搗篩為散服方寸匕

廣利方理血痢方

酸石榴一顆和皮搗取汁蜜一大匙和煖頓服之

治赤白利方第廿四

病源論云其利而赤白者是熱乘於血也深腸內則

赤也氣入間搏腸間津液滯則白也冷熱相交也則

赤白相冷雜重者狀如膿涕而血雜之輕者如膿上

有赤脈薄血狀如真之世是ナキ謂之真腦利也ナキ

本草經治赤白痢方卿真作鱸食之

錄驗方鴈蜜丸治赤白痢方

朴消二兩ヒシキ黃芩一兩ヒシキ大黃一兩オホシ代甘草一兩オホシ黃連二兩

豉一兩シキ鴈巴豆一分出邑郡似大豆名巴豆右七物丸如梧子カカリ空腹服シ三丸

日三

又云赤白痢赤多多熨方

犀角六分屑多不黃芩六分ヒシキ地榆六分ヒシキ黃連八分カシク

甘草四分炙切以水二大升煎取八合七升力丸去滓七升力丸空腹分三服

千金方治赤白利黃連湯方

黃連三兩ヤシク甘草一兩ヤシク當歸二兩ヤシク黃蘗三兩ヤシク干薑

二兩ヤシク石榴皮三兩ヤシク阿膠三兩ヤシク七味水ヤシク七升ヤシク煮取三升

分二服

集驗方治暴下赤白方

香豉一升是義及薤白一把オホシ凡二物以水三升取二升煮取一升今檢

云草一札者重
二兩為心

傳信方療赤白痢如鵝鴨肝方

黃芩ヒシキ黃連各八分カシク右二味以水二升カシク煎取一升

分二服

廣利方治赤白痢白多冷痛方

黃連八分厚朴五分炙當歸四分伏苓六分乾薑

薑三分切以水一大升七合煎取七合者滓空腹

分兩服忌猪肉生冷

又云赤白痢赤多熱方

犀角六分屑黃芩六分地榆六分黃連八分

甘草四分炙切以水二大升煎取八合去滓空腹分服

醫門方療赤白利腹中絞痛无問遠近方

黃連八分五色龍骨十分黃芩六分石為散以清飲空腹服方寸匕

崔禹食經赤白利方

鷓鴣雀鴨等任意食之又方通草子食之

龍門方治赤白痢方

煮薤空腹頓服一椀不過再驗

又方羊鮫按烏豆服一大抄不過二三

又方取鬣尾草花曝于末服方寸匕驗

治久赤白利方第廿五

病源論云赤白利是冷熱不調熱乘於血濕腸
間与腸間津液相雜而下甚者腸虛不復故赤白
連滯久不差也

千金方治下久赤白連年不上及霍乱冷實不消温
脾湯方

大黃四兩 人參二兩 甘草二兩 干薑二兩

附子一枚大者 五味水六升者煮取二升半分三服

又云治積卅年常下神方

赤松樹皮去上蒼皮一升為散麴粥和升服之日

三不過服一升不差更服之秘方卅年利

千金一百日服之

錄驗方治久赤白下利補黃二錢上方

補黃二錢上干薑二錢上二物合以酒一升煮服

不過四五服新良堅

槎要方卅年痢不心方

黃連五兩 厚朴二兩 干薑二兩 阿膠二兩 石榴皮

三兩 艾葉三兩 右以水七升煮取二升分二服

隨時方治赤白痢連年不差腹中如刀攪或血行下

無問赤白穀痢並主之

白伏苓四大兩 黃連四大兩 黃蘗四大兩 零羊角屑

三兩 石搏節蜜和丸如梧子冷酒服之五十九漸

至百九日再

治白滯利方第廿六

病源論云腸虛而冷氣客之搏於腸間津液凝成滯

白故為白滯利也

千金方治白滯利方

倉米三升水六升煮取三升米爛絞取稠汁服亦

稠也多也

范汪方治赤白滯下晝夜數十行方

烏梅木七文割取皮三兩 大熬令干千七黃連三兩 九二物合下篩

和蜜丸如梧子晨服十丸不知稍增可至三十九丸

晝夜可六七服若猶不差可增服七八十九其間欲

食勿与服藥相近无黃連可用干薑三兩代之

小品方治冷微赤白滯下不断變成赤黑血汁如爛臭腸

腹痛枯瘦不能飲食方

黃連四兩 吳茱萸三兩 當歸三兩 石榴殼二兩

凡四物以水三升漬黃連一夕明旦更加三升水煮

取三升分三服

僧深方治赤白滯下久不断穀道疼痛不可忍方宜

服温藥熬塩壓之 又方炙枳實壓之

葛氏方治赤白雜痢下方

赤石脂一升 烏梅^木十枚 干薑三兩合粳米一升水七

升煮取米^丸就^七去滓^カ一服七合

又方龍尾草濃煮煎如薄粘服五合至二升日三

赤下用^井赤花者白下用^井白花者佳 今案救急單驗方飛末服方寸匕

治膿血利方第七

瘧疾 赤痢也 又言帶瘧 下病也 病源論有 瘧下病

病源論云夫春陽氣在表人運動勞役腠理則開血氣虛者傷於風至夏又熱氣乘之熱蘊結而化為膿故成膿血利也所以夏月多苦膿血利膿胃虛也

范汪方治膿血利黃連丸方

黃連^{カク}三兩 黃芩^{ヒツキ}三兩 龍骨^{カク}四兩 黃蘗^{キハタ}三兩 丹麻

三兩凡五物搗下篩蜜和丸如梧子白飲服

卅九日三

又云治下利赤白膿血桃華湯方

赤石脂二兩

搗篩

干薑二兩 附子一兩

凡三物以水五升煮得三升服一升日三

一方有梗米
无附子

廣濟方療白膿痢方

甘草六分

厚朴十二分

干薑八分

枳殼八分

伏苓切以水五升煮取一升六合分温三服

忌生冷油膩小豆粘食海藻

治水穀利方第廿八

病源論云由體虛溼理用血氣虛春傷於風耶氣

留在肌肉之内後遇脾胃大腸虛弱而耶氣乘之故

為水穀利也

葛氏方治水下積久不差腸垢已出者方

赤石脂桂干薑附子各等傷未密丸如小豆服

三九日三又方石榴皮一枚黃蘗一兩干薑二兩

半以水三升煮取一升二合內膠頓服

醫門方療水穀利腹痛久不差方

厚朴

黃連

各三兩

水三升煮取一升空腹服之

救急單驗方治水利方

煮蕪空腹頓服一匙不過再驗

治休息利方第廿九

病源論云冷熱氣調其飲則靜而利也伏也腸胃
虛弱易為冷熱其邪氣或動或靜故其利宜葢
或上謂之休息利也

僧深方治休息下方

煮小豆一升和臈三兩頓服驗

又方煮薤空腹一碗熱服不過再驗

范汪方治息下休下方酸石榴合皮搗取汁服之

陶景本草注柿火薑者食之又方拳樹皮煮汁

服之

葛氏方若久下經時不愈者名息下治之方

龍骨四兩鴉如小豆水五升煮取二升半冷之

分五服又方黃連如鴨子大一枚膠如掌大一枚

熟艾一把水五升煮二物取二升去澤內膠洋

分再服但濃煮干艾葉飲之亦佳又方

常者煮忍冬飲之

治泄利方第卅

集驗方云黃帝日人苦澀泄下利者何對曰春

傷於風復生澹泄腸澼久風為澹泄
 論曰澹凡有五種各不同胃泄者飲水不化色黃言
 所食飲之物皆完出不消也脾泄者腹脹滿澹注食
 即斂逆言下利猶如注水不可禁上也大腸澹者食已
 窘便白色腸鳴切痛食訖即欲利言痛如刀切其腸也
 小腸泄者而便膿血少腸痛也小腸處在腹故令少
 腸痛大瘕泄者裏急後重數至而不能便莖中痛
 也瘕者結也小腹有結而復下利者是也
 范汪方治腹痛消穀心利服大豆方

取大豆擇身好者服一合所日五服一日中四五合
 後飯服非飯後可投間服趣盡四五合欲服時
 手接豆令烟光明若苦堅難小減豆
 醫胃門方治澹利或白赤不止腸滑洞泄困極欲死方

酸石榴皮三兩干地黄二兩黃蘗三兩阿膠二兩
 水五升煮取二升去滓分温二服

千金方建脾丸主虛勞羸瘦體重胃冷弱不消飲
 食雷鳴腹脹澹利不止方

鍾乳二兩赤石脂二兩好麴二兩 大麦蘗二兩當

片二兩黃連二兩 人參二兩 細辛二兩 龍骨兩

干薑二兩 伏苓二兩 石斛二兩 桂心二兩 附子二兩

蜀椒分

凡十五味白蜜丸如梧子酒服十五丸日三稍加至

卅丸弱者飲服此方通治男女凡此方治利之

方神驗者也

小品方云泄利食不消不作肌膚多脾俞 隨年壯泄注便膿血五

色重下多小腸 俞百壯泄利不禁少腹絞痛灸丹田穴百壯在香 下三寸今素千金

方云 三報

治重下方第卅一

葛氏方云重下此謂今赤白糜下也今人下部疼痛

故名重下去膿血如鷄子白日夜數十行繞香治之方

熬豉令小焦搗服一升日再三

又方烏梅廿枚打破以水二升煮取一升頓服

又方赤石脂一升 烏梅卅枚 干薑 三兩 粳米

一升水七升煮取米熟去滓一服七合

龍門方治重下方取鬮尾草花曝干未服三方寸

七豎又方末黃連和水服之

令李方治下利重下方

干薑二兩 蜀椒二兩 桂心二兩 凡三物治下後以漿

許從下部中內半點治毒

范汪方治重下方 藜滿一席口以水三升煮取一升類

服不過再神良

錄驗方治下腹中絞痛重下赤白當歸散方

當歸二兩 黃蓮二兩 黃蘗二兩 干薑一兩

凡四物合下後以烏梅汁服方寸匕日三若腹

中絞痛加當歸下赤加黃蘗重下增黃連白

下增干薑

治疝利方第卅二

病源論云甘是人嗜甘味多而動腸胃間諸重致

令侵食府藏此指是蟲也從腸裏上食唯啣齒

斷並生瘡下至穀道傷爛下利膿血

要急方治赤白疝利方

頭髮灰如鷄子大水服立驗

龍門方治蚘積并出無禁心者

韭兩手握細切豉一升酒三升煮取一升頓服不

過三劑差イ支

治盡注利方第卅三

病源論云歲時寒暑不調則有濕毒之氣傷人隨漸至於藏府大腸虛者毒氣乘之毒氣挾氣与血相搏則成血利毒氣侵食於藏府如盡注之狀利血雜膿瘕黑有片如鷄肝与血雜下是也

小品方治時歲盡注毒下諸湯煎不能治欲死者方

方干薑二兩附子二兩炬イ伊レ黃連二兩檉石二兩九四

物為散酒服方寸匕日三二可以飲服

又方黃連カクククセ一分麴クク二分治未蜜丸水服如梧子

葛氏方若時歲盡注毒下者方

黃連キククセ黃蘗キククセ各等鴉カククセ藍汁丸如梧子服六七丸至

十四五日九ニ二ニ三ニ又方秫米イククセ一升燒成炭水三升和飲之

治不伏水本利方第卅四

病源論云夫四方之氣溫涼不同隨方嗜欲因以成性若移其舊去多不習伏必因飲食以入腸胃不習便為下利故名不伏去利也即以小穀利是也僧深方治諸下利胡虜之人不習食穀下者方用

白頭公二兩 黃連四兩 秦皮二兩 黃蘗二兩 九四

物以水八升煮取二升半分三服

本草拾遺云舊著鞋履下土主人適他方不伏水

去刮取末和水服之不伏水土与諸病有異者是也

治嘔逆吐利方第卅五

病源論云嘔逆吐利者腸胃虛耶氣并之藏府

之氣自相剋也

新錄方治利兼吐逆及嘔者

葱白豉 水五升煮服一升六合分三服

又方干薑末方寸匕飲日二

僧深方治胃脇有契胃中支滿嘔吐下利方

黃芩二兩 人參一兩 甘草一兩 桂心一兩 九芻

水八升煮取四升分四服日夜一

治利兼渴方第卅六

病源論云夫水穀之精化為血氣津液以養藏

府以虛受風邪入於腸胃故利則津液空竭

藏虛燥故利而兼渴也

僧深方治少陰泄利不絕口渴不可食虛而兼煩

方附子一枚干薑半兩甘草二分葱白十四枚丸四

物以水三升煮取一升二服先渴後飲者心有傳

水一方加犀角一兩

又方厚朴ホカハハクキ冬搗末酒服方寸匕日五六

治利兼腫方第卅七

病源論云利兼腫者是利久脾虛水氣在於肌肉

之間所為也

新錄方治利兼腫者

素根クハクハク白皮切一升水四升煮取一升去滓ホカ內糖ハチ三合

和洋トカシ丸三服又方大麻子三升水一斗研取白汁ホク煮

赤小豆爛散豆飲汁良

治利後虛煩方第卅八

病源論云利後虛煩者由府藏尚虛而氣內搏之

所為也

小品方大烏梅湯治被下之以後虛煩燥不得眠

劇者山巔倒心中懊懣ホド方奴道及

大梅ホド十四枚擘ホド好豉七合ホド凡二物以水四升煮梅

令得二升半內豉令四五沸得一升半分二服

千金方治下後煩氣暴上ツル香薷湯方

香薷兩五イ又五生蘊一名乃良表一把冬用子ツル三兩ツル凡二物水五

升ツル煮取二升頓服

僧深方治大下後虛煩不得眠劇者顛倒懊懣

欲死方ツル支子ツル十四枚ツル摩好豆豉ツル七合凡二物水四升先

煮支子令餘二升半汁乃內豉二三沸去滓ツル

服一升ツル一服ツル安者勿復服若上氣欬逆ツル加檣皮

二兩ツル一点可加生薑ツル

治利後不能食方第卅九

病源論云利後不能食者由脾胃虛弱氣逆ツル間之所為也

千金方治大下後腹中空竭胃中虛滿不得下食方

芍藥ツル一兩甘草ツル一兩ツル當歸ツル二兩生薑ツル五兩ツル桂ツル

厚朴ツル二兩ツル半ツル藜ツル兩ツル九ツル七ツル物ツル水ツル八ツル升ツル

病源論云下斷ツル之後脾胃虛氣逆遇冷析ツル之其

氣不通則令噦ツル

范汪方治大下之後下上臨噦胃中滿塞水漿

不下方

橘皮一兩人參一兩 曾鼓一升一方一兩 桂心二

兩生薑五兩半夏三兩甘草一兩九七物切以

水九升煮 豉取七升去滓內諸藥燉火上煮

取二升半分三服

治利後遂滿方第卅一

病源論云利後而心下遂滿者猶藏虛心下有停

飲氣遂乘之所為也

范汪方治中寒下以後心下遂滿上衝胃中起

欲頭眩方

伏苓四兩桂三兩 白朮二兩甘草二兩九四物以

水六升者取三升分三服

治利後穀道痛方第卅二

病源論云利久腸虛耶容於肛門耶氣與真氣

相搏故令疼痛也

新錄方利穀道疼痛方

炒塩熨下部

又方燒蒜去皮內下部良

范汪方利穀道痛方

灸和實尉之アツリカクヤクヤク

集驗方治赤白滯下久不斲穀道疼痛不可忍宜服温藥熬塩尉之チリカク

醫心方卷第十一

淡菴古傳是宜文蘇言
蘇合論云白之類也唯谷許門邪廣也其原
亦除對味直許六葉廿二
木六本益頭三和之三眼 補上種青中越
水本四兩對三兩 白本二兩 甘草二兩 凡四

醫心方卷第十一背記

陟厘

小品方云水中廣苔也范東陽云水中石上生如毛綠色者藥對云河中側梨也陟厘聲相近也
又案藥對云河中側梨此是勅聖音非厘音也

以上第廿一葉

集驗方治赤白帶下久不愈道疾痼疾

可忍宜服滋陰藥交按服之

以上卷第十一藥

醫心方卷第十一

以上卷第十一藥

又卷第十一中藥法也

起重

醫心方卷第十一

醫心方卷第十一札記

三頁上 五行 永障千金永 四頁上 便賣今本肘後賣作買

賣即齋 俗字 九行 燒酒千金燒下 一行 秘方千金方 八行

注 淫去仁和寺本 九行 病者外臺者 六頁上 又

方仁和寺本 下九 又方云仁和寺本 七頁下

能 飲和仁和寺本 六頁上 薑累仁和寺 本薑下

有一 行 六 腸胃仁和寺本 九頁上

消故仁和寺本 七字 病源同 行 葛氏方仁和寺 本此一

條在 今案 九行 又云仁和寺本 四字 一行 遶里

醫心方卷第十一

仁和寺本道下有連字外十一頁穢之仁和寺本無

臺引射後道下有連仁字十七行穢之仁和寺本無

行下三二五兩仁和寺本行八巨闕仁和寺本行十上

行一虛冷仁和寺本行下六霍亂煩渴者仁和寺本行九黃藥外臺引射

由大吐逆上焦虛氣不調理氣行九黃藥外臺引射

乘於心則煩悶十五字病源同行九黃藥外臺引射

上十三頁稍飲之勿飲餘飲仁和寺本行下稍字不塗外

行九染米仁和寺本行十四頁薤索射後作行下三服

之千方作梨此下有一行八胃管千筋此下有天沢并治

十五頁下已向仁和寺本上十六頁霍亂大吐下仁和

寺本亂下有後字行六四逆仁和寺本行下二三

兩仁和寺本行五甘草二兩仁和寺本行十七頁而欲

無而字行二雅吐仁和寺本行三故欲死仁和寺

有也字行五論冷千論行甘盞千盞行而

病源同行五論冷千論行甘盞千盞行而

雜千相而行七加其千其行大須千須行而

下五頁五合千合行眼之千乾行二味千味行燒末外

為燒作下二行利千利行二味千味行燒末外

行六枳殼外枳行入腹病源腹行下九日星千

作星月行枳殼外枳行入腹病源腹行下九日星千

一升千金作下廿七頁宜菝或上病源作下廿一行

一升千金作下廿七頁宜菝或上病源作下廿一行

卷十一 才言

人隨病源隨下有經

行挾氣病源氣

下世五行者猶

此病源者下有

此字猶作由

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	十三	十四	十五	十六	十七	十八	十九	二十
...

