

醫心方卷第十五

109-1

490.9
TS-3
14

No. 226°
内 | 109-1



富士川文庫

1413



醫心方卷第十五

從五位下行 鍼博士兼丹波介丹波宿称康賴撰

說癰疽所由第一 治癰疽未膿ウカ方第二 治癰疽有膿ウカシル方第三
治癰發背方第四 治附骨疽方第五 治石癰方第六
治瘻カタチ癰方第七 治熛疽方第八 治久疽方第九
治緩疽方第十 治甲疽方第十一 治腸癰方第十二
治肺癰方第十三

說癰疽所由第一

劉涓子方去九江黃父問於岐伯曰余聞腸曾受穀

上焦出氣以溫分安而養骨筋通腠理中焦出氣如露上注谿谷而滌孫脈津液和調變化而赤為血和則孫脈先滿乃注絡脈々皆盈注乃於經脈陰陽已張固息乃行々有經紀周有道理與天令同不得休心切而調之從虛法去實寫則不足疾則氣苗未虛補實則有餘血氣已調形神乃持令已知血氣之平與不平未知癰之所從生疽成敗之時死生之期々有遠近何以度之可得聞乎

岐伯曰經脉單行不心與天同度與地合紀故天宿失度

日月薄蝕地經失紀水道流溢草蘆不成五穀不植經絡不通民不往來菴聚邑居別離異處血氣七猶然然

請言其故夫血脈營衛周流不休上應星宿下應經數寒氣客於經絡之中則血七淡七則不通七則氣歸之不得復返故癰腫焉寒氣化為熱七勝則安

腐九宗九則為膿九不寫則爛九爛則傷骨九傷則髓消九不當骨空九不得泄寫煎枯空虛筋骨肌宗不相親經脉敗漏內薰九於五藏九傷故死矣

又云黃父曰夫子言癰疽何以別之岐伯答曰營

衛督留於脉久則血滯；而不行，則衛氣從之；不通壅遏，不得行大變，不心契；勝之。

則安；腐，為膿，尤不能陷肌膚，枯於骨髓；不為焦，枯五藏，不為傷，故曰癰。

黃父曰：何謂疽？岐伯曰：熱氣淳盛，當其下筋骨，良安無餘。故命曰：疽，上皮妄以堅上如牛領之皮，癰者上薄以澤，此其候也。

黃父曰：乃如所說，未知癰疽姓名。蓋起處，色詭形，復治與不治死活之期，顧事以聞之。

歧伯曰：癰疽，可不寫十餘日死。其五日刺也。其膿赤多血，死未有膿可治人。年廿五廿一六十九十五百神皆在頸，不可見血，死者死也。禽疽，如輒者數十處，其四日腫合，牢核，痛欲瘡。如是十五日死也。

杼疽，若兩耳下，不寫十六日死。其六日可刺其色黑，見膿而腐者死，不可治人。年廿十九廿三廿五廿九廿十一五十五六十一八十七九十九神，在兩耳不可

見々血々者死

釘疽發兩肩此起有所逐惡血結留內外營衛不通發為釘疽三日身腫痛甚口瘻如瘻狀十日一曰可刺不治廿日死。羨背起心俞若肩隅廿日不寫死其八日可刺其色赤黑膿見青死不治入年六十八廿四卅五十六、十七、六十二九十八神皆在肩不可見血者死

陰疽發髀左腹及腰及臂及股若陰股始發腰強而不能自止數歟不能多五日堅痛如此不過三歲死

刺疽起肺俞若肝俞不寫廿日死其八日可刺發

而亦其上安如核子者死不可治入年一九廿五卅三卅九五十七六十七十三八十一九十七神皆在背不可見血々者死

脈疽發環頭

一方如痛身隨而熱不欲動

作頸不欲動悄々

或不能食此有所大畏恐蹶而不精上氣欬逆氣絕其發引耳不可以動廿日可刺八十日死

龍疽發背起胃俞若腎俞廿日不寫死九日可

刺其上赤下黑若青膿黑死發血膿者不死

首疽發之熱之八十日一方云大熱汗頭引身盡如癩身熱同之如沸者擇皮頗腫處淺刺之不刺入腹中廿日死

胡類文入腹中廿日死

俠桀疽發脢腸若起兩肘頭廿五日不寫死其九日可刺發赤白間其膿多白而無赤可治也入年一十六廿六廿二冊八五十八六十四八十九神皆在脅不可見血者死十一六十二十三八十一六十九督脊不可見血行疽發如腫小兒或復合相往來可要退其所在刺之即愈芻疽發股起大陰若伏鼴廿五日不寫死

其十日可刺

芻疽發股清膿赤黑死白者尚可治入年十一十五廿卅一冊三冊六五十九神皆在尻七十五九十一神皆在尻毛不可見血之者死

通瘡文標外疽發熱同之耳聾後六十日腫如裹水狀

如此可刺之但出水後及有血之出即除也入年五十七六十五七十三八十一九十七神皆在背不可見血之之者死

安光文瘡疽發足趺足下廿日不寫死其十二日可刺

癆疽發赤白膿不_死及大多其上白_癆赤黑膿

死不可治不黑可治入年十三十九世五六十一七

十三九十三神皆在足不可見血者死

衝疽發少腹痛而振寒熱四日可刺五日博六日

變而可刺之不_死之五十日死

敷疽發兩手五指頭若足五指頭十八日不_死死

其四日可刺其發日而黑癰不甚未過節可治也

疥疽發腋下若臂兩掌中振寒熱而盜乾者者

飲多即歎煩心涓涓或六十日軒汲有合者如此

可汙不汙入腹內死勸疽發背俠脊兩邊

大筋其色蒼八日可刺也有癰肥膿中九

十日死

陳乾疽發兩臂三四日痛不可動五十日身熱而赤六十日可刺之如刺肺無血三四日病已無膿

者死

金疽發手足五指頭起過節其色不變十日之內

可刺也過時不刺後為_死有癰在腋三歲死

外疽發身腫窄核而身熱不可以坐不可以行不

可以屈申成膿劑之即已除

白疽荳脾若肘後癰目痛傷精乃身熱多汗
五六處死心主有腫心癰在股脛六日死荳膿
血六十日死

黑疽荳腫居臂大骨上八日可刺也過時不刺
為骨疽、疽、膿出不可心碎骨六十日死

腸少陽有腫癰在頸八日死荳血膿十日死
創疽荳身先癢後痛此故傷寒氣入藏萬
荳為創疽九日可刺不刺九十日死

尻腰大陽脉有腫交脉屬於陽明癰在頸十
日死荳膿血七十日死

尻大陽脉有腫癰在足心陽明少陽八日死荳
膿血八十日死頭陽明脉有腫癰在尻六日死荳
膿血六十日死

股大陽脉有腫癰在足大陽十七日死荳膿血
百日死

肩大陽大陰脉有腫癰在胫八日死荳膿血四百
日死

足少陽脉有腫癰在脇八日死。蓑膿血六百日死。
半陽明脈有腫癰在腋側一歲死。蓑膿血二歲死。
黑疽蓑肩不死可治。黑疽蓑缺盆中名曰伏癰死不治。
或本赤字
黑疽蓑會可治。黑疽蓑肘上下不死可治。
赤疽蓑陰股堅死。濡可治。赤疽蓑脾樞。六日可治。不治出歲死。
赤疽蓑掌中可治。髀解際指本黑頭赤死。
赤疽蓑陰死不治。黑疽蓑肥腸死。胞腸死。
黑疽蓑膝臍堅死。濡可治。黑疽蓑缺上堅死。
腹次

蓑附骨者或未覺內ナシ矣已殃ヤハラヒ者癰疽ナラ之
甚カク也蓑背外皮薄為癰皮堅為疽ナラ如此者多現ナラ
先兆宜急療皮堅甚大者多致鴉矣

甚也。荅背外皮薄為癰，皮堅為疽。如此者多現先兆，宜急療。皮堅甚大者，多致穢矣。
太素經云：黃帝曰：願盡聞癰疽之形。与忌日名。岐伯曰：癰荅於器中，名曰猛疽；不治化為膿；不寫塞咽，半日死。其化為膿者，寫已則愈。豕膏母冷食三日而已。今素劉涓子方，癰疽極者十八種云：則是也。
荅於頸，名曰发疽。其癰大以赤黑，不急治，則勢氣下入，側腋前傷任脉，內薰肝肺，三十餘

曰而死矣

陽氣大蒸消朏而項名曰朏鑠其色不樂項

又刺及心者死不治

荅於肩及膚

人汗出至是不害五

燭之此
火發於後下赤緊

七字無言水於一亦豎名日先症治之用
細而長數砭之塗以豕膏六日已勿裹之

其癰堅而不潰者為馬力ツバメ一俠醫要急治之

叢於胃名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治

下入腹不治七日死

荅於骨名曰敗瘻ハリ者女之病也灸之其病
大癰膿治之其中乃有生肉大如赤小豆剉蕎
翹草根各一升水一斗六升煮之竭為三升即
強飲厚衣坐釜上令汗出至足已

荅於股脇モモ名曰脫疽其状不甚變而癰膿搏骨
不急治卅日死

荅於尻名曰充疽其状赤堅大急治之不治卅日
死矣荅於股陰ウツ名曰赤施不急治六日死在雨

股之内不治六十日而死

荅於膝名曰疵疽其状大癰色不變寒熱而
堅勿石ハレ之死湏アマ其柔乃石ハレ之者ハラカム生ハラカム之者准例皆取之ハラカム此唯言石之或以冷石

熨之所以堅而不石以其
寒聚結其處柔乃石也

諸癰疽之荅於筋而相應者不可治也

荅於陽者百日死荅於陰者卅日死也

大夫陰器曰陽婦人陰器曰陰

荅於蹠名曰走緩其状赤至骨急治不治害人也
荅於踝名日走緩其状色不變數石其輸而止其

寒不死

石其輸者以冷石
熨其研由之輸也

癩於足上下名曰四溼其狀大癩不色變不治百日死

足上下者足趺上下也

癩於足傍名曰厲疽其狀不大初如小指發急治之去其黑者不消輒益不治百日死發於足指名曰脫疽其狀赤黑死不治不赤黑不死治之不衰急斬去之活不斬則死矣

又云身有五部伏莞

一伏莞在膝上六寸起肉禁不可灸又不言得刺此要禁為第一部故生癩疽者死也

二腓者 踵也

都詮文
腓音肥筋一名蹠腸一名直腸禁不可刺故瑞為要害之處生癩疽者死也

三脣

自要用輸巴上廿一推兩箱自要背去藏膚甚近死皮肉至薄若生癩疽陷而必死也

四五藏之輸

五藏手足廿五輸

當於輸穴生癩疽者死也

五項

頭之前白項後曰項三陽督脉在項故項生癩疽致死也

五部有癩疽者

死

癩疽害甚故主人之要處必死

又云楊上善日癩生所由凡有四種也

喜怒無度爭氣聚生癩

一

也飲食不依節度

二

寒溫為癩

三

也藏陰氣虛府陽氣

四

實火盛生癩

一

也邪客於血聚而不行生癩

二

也癩疽一也癩之久者敗骨名疽也

又云夫積石成山積氣成癩

不從天下不從地出

青韻文

皆由不去脆棗故也

病源論云癩者由六府不和所生也疽者五藏

不調所生也

凡腫一寸至二寸癰也二寸至五寸癰也五寸至一天
癰疽也一天至三天者竟體膿成九孔皆出諸
氣憤鬱不遂志欲者血氣畜積多發此疾

病之急者
詩云
瘡猶瘡也
凡發腫高者瘀源淺腫下者瘀源深大熱者易
治小熱者難治

凡五月勿食不成核葉及桃棗荅癰疽癰
凡人汗入諸食中食之則作丁剝癰疽

未入肉
凡銅器蓋食汗食之令鼓惡劇肉疽

凡鷄冥鱠合猪肝肺食荅疽

凡醉強飮食不革發疽

醫門方云凡癰腫發於背欲得高昴腫浮淺
在外綻結膿者久多差腫不高沉在肉裏者其
腫深膿潰向內必死

范汪方云經言五藏不調致疽六府不和生癰疽
急者有十一日勦疽者急二三日斂人緩者十餘
日二日癰疽急者十餘日斂人緩者一月三日緩
疽急者一年斂人緩者數年四日水疽所發多

在手足數羊瘡可治疽者有數十種要如此
齋之疾所發緩地不致入所發若在峻地宜
令即消若至トモ小膿瘡可治至大膿者致トモ禍矣
一為胞乃道也戶在玉枕下一寸二為舌本三為懸齋四
為頸筋五為胡脈六為五藏俞七為五繫八為
兩乳九為心鳩尾十為兩手魚際十一為腸屈之
間十二為小道之後十三為九孔十四為兩脇腹十
五為神主之舍而或本二字以下并十二字无曲五處不可傷而況於齋乎若
齋發此地遇良醫能令不及大膿者可救至

大膿者害及矣

齋疽脉洪皮膚月便也難治脉炭滿者易愈諸浮數之
脉應當發熱而反惡寒齋也

齋起於肺解過遇頑腎不能即消令至大膿者
豈膏藥七十可得生復

治齋疽未膿方第二

醫門方云偏鵠日癰腫癰疽風腫惡毒腫等
當其頭上灸之數千壯無不善者四畔廿灸三二
百壯此是醫家秘法小者灸五六處大者灸七八處

療癰疽腫一二日未成膿取伏龍肝下節 醋和
如渥塗爛布上枯腫燥即易無不消 今棄葛氏方和
劉涓子方云癰疽之甚未叢之兆飢渴為始々
叢之始或叢白疽似若小瘡或復大痛皆是叢
候宜善察之欲知是非重案其處是便隱痛復
案四邊比方得失審定之後即灸第一使灸其
上二三百壯又灸四邊一二百壯少者灸四邊中者灸
六處大者灸八處壯數處所不患多也灸應即
枯即薄令得即消內服補暖湯散不已脈冷導
湯藥

外歸冷薄不已用熱薄枯之法當開其口
泄熱氣也

治癰疽始作腫不赤而熱長甚速非薄枯所

制犀角榆湯方

犀角三兩 大黃三兩 牛麻三兩 黃芩三兩芍子

三兩 黃連三兩 甘草三兩

右七物切以水一斗二升煮取六升使極冷以故
練而重入湯中榆腫處小燥易恒令退一日

一夜數百過

治癰腫黃耆桔治癰腫瘰癧及欲發背覺痛方

黃耆一兩 黃芩一兩 芎芻一兩 當歸一兩 黃連一兩

白荳一兩 夜藥一兩 防風一兩

右八物搗下筛以鷄子白和塗故布上以桔腫
上搽復易患熱者加白荳患痛者加當歸
各一兩

千金方亦几癰疽始發或似小瘡或復大痛或
復小痛或發米粒大白膿子此皆緩候宜善察之
見有少異即湏大驚忙急治之及斷口味速張諸

湯下去熱毒若無醫藥即灸當頭百主其大重
者灸四面及頭二三百壯數不必多也復薄冷藥
帖種之救療必羌速也之當頭以大針入四分即
差

凡諸異腫種不同者無問久近皆服五香湯刺
去血小豆薄之其間數以針刺去血若失治已潰
爛者猶服五香及漏蘆湯下之以外麻湯擦洗
之熨升麻膏若生息定者白蘆茹散付之青黑
宗去盡即停之好肉生付升麻膏肌不生付一物

黃耆散若付白蘭茹青黑惡寒不盡者可以涼

頭蘭茹半錢和三錢白蘭茹散稍付

今棄五番湯在丁腫方漏蘆湯

外麻湯丹麻膏左治丹之方
黃耆散蘭茹散在緩疽之方

內消散凡是癰疽皆宜服之方

赤小豆一升

熬內酢中入生還七個

人參二兩

甘草二兩

瞿麥二兩

白芨三兩

當歸二兩

黃芩二兩

賛芩二兩

防風一兩

黃耆三兩

薏苡仁三兩

外麻四兩

十二味酒服方寸匕日三夜二長服取瘥

今棄廣濟方同之但范汪

汪方云內消散治癰疽不潰白芷十八克、白芨十八克、白芍十八克、當歸七八克、干薑七八克、七物下桂圓十八枚七合干薑七八克當歸七八克茴草七八克八物治令以酒服五

治癰疽痛煩困方

八日再又今李方內消散治癰疽不潰方用白芷十八克藥十
八克、白芍十八克、白芨十八克、當歸七八克、干薑七八克、七物下桂圓十八枚七合干薑七八克當歸七八克茴草七八克八物治令以酒服五

方有白芨一斤

生椒葉十重枯之以布帛裹綬勿令急日二易止
痛消腫食膿勝於衆枯冬以先于者臨時塗湯

洗潤用之

葛氏方劉涓子方同之

廣濟方犀角丸治一切毒腫癰乳癧背脹之止痛化
膿為水遂大小便出神妙方

犀角十二分

外麻一兩

大黃五分

黃芩五分

防風一分

兩當歸一丸 黃耆 交子火 乾薑 薑連人參

甘草各一兩 已豆廿三枚

去心皮熟

大黃半兩

芍藥半兩

桂枝半兩

九十三物治下篩以密和凡如梧子大空腹以飲
服十九丸取二三行快利常服為峻痢

忌生菜熟翅膀玉竹
酢蒜海藻

効驗方治卒癰腫白苔枯方

大黃三丸 黃芩三丸 夜藥二丸 白苔三丸 赤石

硝一丸

凡五物治合下篩以鷄子白和如泥塗紙以薄

腫上燥易之

錄驗方治癰腫運赤痛及已潰

免

松脂方

成練松脂一斤 蟬蜜半斤 猪脂四斤 當歸

二兩 黃連一兩 黃芩一兩

丸六物咬咀三物盡合煎三沸三下候枯色

變故紫色者藥成絞去滓若初腫未有

膿者塗紙枯腫上日三易夜再若以潰

有口者穿紙出瘡口枯四邊令膿聚

不食傍宗速差今案諸方松脂方

已多但剝浦子方松脂二斤黃連一兩

附子一兩 黃芩一兩 夏藥一兩 細辛一兩

石膏二兩也 又効驗方杏仁一兩 腊寧一兩

松脂一兩厚朴一兩也

千瘡萬病霜膏治金木劇癰疽諸惡創若
始得癰摩腫上五百過即消若以潰者著瘡中
食膿去具在本方小品方言經言寒氣客於
經脈之中則血氣渙濛不行壅結則為癰疽也
不言壅之所作其成癰久寒化為熱之感則寒

腐爛大九為膿也依經訴復之由人體中有熱被
寒冷搏之血脉渙濛不行熱氣擁結則為癰疽
也是以治癰疽方有灸法者治其始大九中寒
未成熱之時也其用火薄者治其熱已成以消
熱使不成膿也今人多不悟其始不用溫治及灸
法也今出要方以治其成形者耳赤色腫有尖頭者
根廣一寸以還名為瘻其廣一寸以上者便為小癰
也其如粒大為疣豆

治作癰令消方

取鹿角就磨力石上水摩之以汁塗瘡復塗

則消也內宜服連翹湯下

又方生春ナガラ小豆下篩鷄子白モモ和如泥塗之

治始作癰已赤熱痛方

單燒鹿角作末苦酒和薄之乾復塗之自

消又方單擣大黃ホウチク苦酒和薄之溫則易

治癰及癰始結腫赤熱方

水摩半夏ホソクハ塗之擦更塗得暎使消也

山草中自可掘取生半夏乃佳神驗

葛氏方治諸癰疽發背及乳房初起焮ホトトギ亦急痛不早治致入使速消方但灸其上百壯

又方釜底去鴆以鷄子中黃和塗之

又方鴆行ヨウ根薄之

又方鴆黃ホウチクハ下篩以鷄子白和厚塗于瘡

易立愈

治癰疽背腹陰處通身有數十方

取千牛矢燒鴆細重繃篩下以鷄子白和塗

千瘻易秘方

范任^汪方治癰腫初腫痛急方

以冷鐵熨溫輒易

又方取粢殼令正黑未作屑以鷄子白和之
以塗練上傅腫上小穿練上作小口以泄氣癰
毒便消當數易之此藥神秘方

今棄葛氏方治
諸癰疽並背

及乳房初起灼赤急痛使速消
爾稚云粢稜也和名文義乃毛知

本草拾遺云水蛭人患赤白遊癰及癰腫毒腫取
十餘枚令噉病處取入皮破肉白無不差者冬月無

蛭注中極取暖湯令動先洗入皮膚以竹筒盛蛭置
之湏臾咬血滿自脫更用飢者

今棄經心方云以
水蛭食去惡血

僧深^方治癰方

梁上塵燒葵末入苦酒和傅之燎復傅治
乳癰即愈

治癰疽有膿方第三

病源論云凡癰若按之都牢斬者未有膿也按
之半軟者有膿也又以手掩腫上不熱者無膿若
熱甚者為有膿凡覺有膿宜破之不尔侵食筋骨

醫心方卷十五

廿四

劉涓子云癰大堅者未有膿半堅半薄半有膿當上薄者都有膿便可破之之法應在下達上破之令膿易出用鉗針_{枝眉穴}膿深難見上宗厚而生內大針若外不別有膿可當其上數案之内便隱痛者宗殃堅者未有膿也葉更不痛於前者內膿已熟也膿泄去熱氣不爾長連々則不良

雍審知有膿者案之屢陷不復者無膿案之即復者有膿初腫大案乃痛者病深小案便消者病淺也凡破癰之後病人便綿惙欲死便內寒熱腫自有似

癰而非者當以手按腫上無所連是風毒可勿針可服外麻湯外麻膏破癰口當令下流三穴近下一穴令針極熱々便不痛

夫癰壞後有惡寒者當以猪蹄湯洗去其穢次傅食肉膏散惡寒盡乃傅生肉膏散乃摩四邊令善安速生當絕房室慎風冷勿自勞動湏筋脉復常乃可自勞耳不爾新寒易傷々則重發慎之

治癰疽洗癰猪蹄湯方

猪蹄一具黃連五兩芎藭三兩當歸三兩甘草

三兩 夕藥三兩 壤葛一斤 又方代大
黃三兩

右七物以水二斗煮沸取一斗內諸藥復煮取四斗

洗之

治癰疽食惡寒蘆茹散方

蘆茹一兩

沫頭

樊石二八

雄黃二八

流黃二丸

右四物下篩著免頭內割口中

今案錄驗方

雄黃一兩

樊石一兩

蘆茹一兩也

治癰疽荳背已潰未潰生寒排膿散方

當帰二兩 桂心二兩 人參二兩 芎芻一兩

厚朴一兩

防風一兩 甘草一兩 白芷一兩 桔梗一兩

ヨリヒナ

右九物搗下篩溫酒服方寸匕日三夜再割未合可

長服之

今案僧深方治癰疽自潰

長

安

排

膿

蜀

方

治

癰

疽

自

愈

桂心甘草半薑芎當帰各一兩九六物研法如上又

方治癰疽排膿散方

黃耆四八

夕藥二八

白銀二八

赤小豆一八九五

倍

下

服

如

上

治癰疽食惡寒膏方

松脂五兩

シカチヨヤニ

雄黃二兩 錐黃二兩

治萬皮一兩

沫頭

蘆茹三兩 巴豆百枚 猪膏一升

シカチヨヤニ

巴豆

百枚

猪膏

一升

右七物煎松脂消下諸藥燬火上煎三上三下

膏成絞去滓著免頭內割中日六七食惡寒初

用病當更腫赤但用如葷度惡寒盡心勿使

過也

治癰疽發皆已潰生寒膏方

甘草二兩當歸二兩白芷二兩爲喙六枚寒絳

容二兩蜀椒二兩蛇銜一兩細辛二兩薤白二兩干地

黃二兩

右十物切以好酒半升和漬弃宿以不中水猪
肪三斤煎一沸下餘心復三上三下膏成急
手绞之今系錄於方治癰疽生寒膏方甘草二兩生地
黃五兩當歸二兩續斷一兩黃柏二兩白芷三兩甘草二兩薤白二兩猪膏一升大黃四兩
凡十物绞咀煎三上三下膏成傳之

治癰疽臭膿洗大黃湯方

大黃二兩黃芩一兩白芨一兩

右三物合鶴下蕊以水一升二合煮一沸绞去滓

適冷暖以洗瘡日十過

范汪方治癰創熟已退膿血不心瘡中空虛
疼痛排膿內塞散方

散方

防風一兩伏苓一兩白芷一兩桔梗一兩遠志

此散方藥一粒
尚落次又五字誤

欽可本草本書

一兩甘草一兩桂心二八人參一兩芎芻一兩

當歸一兩 附子二枚 炮厚朴二兩 龍骨一兩
黃耆一兩 赤小豆五合 粟米五十粒 牛膝酒服

方寸二日三夜一

汗金方同之有下發背茶

集驗方治癰瘡膿血不心瘡中空虛疼痛排膿
內補散方

防風一兩 遠志一兩 當歸二兩 黃耆一兩 白芍
一兩 蒜草一兩 桔梗一兩 通草一兩 厚朴二兩
人參一兩 桂心一兩 附子一兩 赤小豆五合 粟米三兩
伏苓一兩
凡十五物治合篤未食溫涓服方寸二日三夜

此方治癰瘡膿血不心瘡中空虛疼痛排膿內補散方

令李方治癰內補排膿散方

黃耆二兩 當歸二兩 赤小豆卅枚 茄窮一兩
夕藥二兩 大黃一兩

凡六物治合下篤以粥清服方寸二日三

此方治癰瘡膿血不心瘡中空虛疼痛排膿內補散方

黃耆六八夕藥四八桂心一八

凡三物治下篤酒服方寸二日三

錄驗方洗癰疽并惡創毒氣猪蹄湯方

當歸四兩 甘草四兩 茄子藥五兩 芫荽第二兩

白芷四兩

芍草二兩 黃芩四兩 狼牙四兩 猪一具

蕷薇根一兩

大黃四兩

凡十一物先以水二升半別煮猪蹄取一升半去
蹄內諸藥煮得再沸下來灰汁一升又煮取
一升半湯成稍所教又漸也以洗刷癰結初腫時去狼
牙內灰汁瘡既潰用狼牙除灰汁

僧深方治癰疽瘡夏蠟名洗瘡青木香湯方青
青木香一兩 夏藥一兩 白蔹十十五一兩 蒜窮十五一兩

凡四物水四升煮取二升去滓溫洗瘡日三
明日以膏內瘡中日三

醫門方瘡癰腫已膿懼針令膿自出方

右取麻角刮取細末和醋聚安腫上經宿

膿自出若膿深者先爵生栗薄之撮膿向

土極妙

瘡癰腫不消已有膿不能針自令穿潰方

空腹脹葵子一枚一宿即穿出膿

神妙

葛氏方治癰已有膿當使速潰壞方

雀矢以苦酒和塗上如小豆 又方吞薏苡子一枚勿多

新終本草云癰膿使速潰方

吞蕷實商伊子一枚破癰腫

蕷散本草注云吞惡實一枚治癰疽頭

千金方治癰潰後瘡不合方

燒鼈皮一枚作灰封孔中 又方塗牛干易

又方燒破蕷席灰和猪脂內孔中

救急單驗方療頭癰曰即骨陷方

陷半監及墮入地也

先燒杏人令黑磨丸塗後取棗木紫葛蕷及
乾禹燒灰和薑黃臘月猪脂塗神驗

治癰發背方第四

病源論云癰發背者多發於諸府俞也六府不和
則生癰諸府俞皆在背其血氣結絡於身六府氣
不和腠理虛者經絡為寒所客折於血則癰不通
故結成癰發其俞也熱氣加於血則肉敗化而為
膿癰初結之狀腫而皮薄以澤背上忽有赤腫而
頭白搖之連根入應ヨタク竇裏動是癰也發背若數手

不可得近者內先服平不當行散外摩發背膏
大黃桔若在背生破無苦良不得濃以食肉膏散
着尤頭內癰口中火體熱氣歇服木散五日後
癰欲聚者服排膿內塞散之

千金方云諸目凡發背皆由服五石寒食更生散所
致亦有單服鍾乳而發者又有生平不服石而
自發者此是上世有服之者

其候寧多於背兩甲間起初如粟米大或痒仍
作赤色人皆初不以為事日漸長大不過十日遂

至不救其臨困時方圓徑三四寸瘡有數十孔以
手牽之諸孔之中膿皆乃出尋即失音不言

所以養生者小兒背上痛痒有異即取淨水和
作泥捻作餅子徑一寸半厚二八以蘆薈作炷灸泛上灸
之一炷一易餅子若粟米大時可灸七炷即差若如榆
英大灸七七炷即差若至錢許大日夜灸不住乃差
并服五香連翹湯及鐵檠諸藥攻之乃愈

又恒冷水射之瀆冷石熨之日夜勿止待差住手
此病忌酒禁五年等

凡腫起於骨胛中頭白如粟粟四邊相連腫赤
黑令人悶亂者名發背不灸治即入內炎當針創
上七八百壯

又方飲鐵漿三升下利為度又方鹿角灰酢和
塗之

桃脯上音天內塞散主大瘡熟已退膿血不必瘡中安虛

瘡痛方

防風一兩伏苓一兩白芍一兩桔梗一兩遠志一兩
甘草一兩桂心二丸人參一兩芎藭一兩當歸一兩

附子二枚厚朴二兩黃耆一兩赤小豆五合
龍骨一兩

十五味為散酒服方寸匕日三夜一今案范注方云非酒
則藥勢不宣

廣洛方療鍾乳及五石等菱背毒熱方

黃芩三兩白鷺屎五合白荳一梔香豉五合
切水六升煮取二升分溫三服

經心方療發背方

以冷石熨腫上驗又方馬糞付于易之婦人

發乳之法

范汪方治發背及諸癰腫已潰未潰方

搏或小和水令如強泥作餅可厚三分研若

有劇孔空遺之勿覆今汁。若得以艾羅灸或

鼓上使溫火之氣下徹或欲燎若熱則易令

大熱利爛皮也癰痛尋當轉減使得安為灸

或有一日二日三日割孔中當汁出

年金方

治癰腫王不流行散

王不流行二升成末甘草五兩治葛二兩桂心四兩

當歸四兩凡五物治合下薑以酒服方寸日三夜一

葛氏方治癰癩背腹陰邊處通身有數十方

取干牛一矢燒鴆細重絇篩下以鷄子白和

以塗之干復易秘方以下六字與二字合本在醫局李本等劉涓子方同之

又方用鹿角桂心鷄矢、當別燒合之鴆以

鷄子白和塗之秘方

又方生桔梗根細鴆以苦酒和塗上干復

易之又方赤小豆塗之良

劉涓子治癰發背癩房初起赤方

其上赤處灸百壯

又方鴆竹根少水解以薄上

又方竈黃芩子白和塗上

又方樹上不落桃子未以好苦酒和傳上良
又云欲使速潰方水研半夏鷄子白和塗之必能令
消

治附骨疽方第亜

病源論云附骨疽者由體熱當風入骨解風与
熱相搏復遇涼濕或秋夏露卧為冷濕所折風
熱伏結壅遏附骨成疽喜大蔚解問丈夫及
產婦女人喜著覬腰額頭腔膝間嬰孩嫩兒之
是脾肺之本也

直某文

著髀肩胛也肘背也其大老子著急者則先覺痛不得
轉動按博之應ヨリハ骨痛絃日便便覺皮肉微急洪充如肥充
狀則是也其小兒不知字名抱之裁近其身便啼ヒル
變則是丈蔚有痛處便是其候也大老子著緩
者則先覺如肥洪充耳經日便覺痺痛不隨也其
小兒則覺四支偏有不動搖者如不隨狀者之
蔚解中則有肥洪充變其若不知是附骨疽ト云
至令身成瘻不潰至死皆舉體變青黯也其
其大老子必有不別是附骨疽呼急者為賊

風其緩者謂為風腫而已皆不悟是疽乃至於死

小品方云附骨疽一名瀉疽以其無頭附骨成膿故也又名癰疽以其廣大竟體有膿故也附骨急疽与賊風實相似也其附骨疽者由人體盛有熱又當風冷入骨解中風與熱相搏其始候為欲眠沉重忽耳急者熱多風少緩者風多熱少也賊風者其人體平無熱中舉風冷則骨解深痛附骨疽久者則腫見

結膿賊風久則枯瘠或結瘰癧以此為異也是附骨疽而作賊風治則益其病深膿多也是賊風而作附骨疽治則加其冷風增遂成瘰癧偏枯
亥等又瘡也枯也
牽曲之疾也

附骨急疽者其痛處狀熱體中下寒乍熱疼アル、惡寒不用熱小便或赤大便或難無汗也即得治下去熱使得消也緩不消盡亦得浮淺近外易壞潰其不復附骨也賊風之證但仁本書無此言但痛應骨不可按抑痛處不壯熱體不下寒

〔寒也此字无本書〕

乍勢但覺體癱以冷砍得勢々熨痛處即小
寬時有汙也即得針灸熨服治風溫藥使
効アリ也初得附骨疽即服漏蘆湯下之傳小豆
薄得消也下利已虛而腫處未消者可除
大黃用生地黃及于地黃也勢漸退餘風未歇
者可服五香連翹湯除大黃也餘勢未消可傳
升麻膏佳若失時不消成膿者用火針膏散
如治癰法也今案漏蘆湯升麻膏在第十七卷治丹之方五香連翹湯在第十六卷治惡核腫方皆出小品方

千金方云僕附骨與賊風為異者附骨之始未腫

但痛而已其賊風之痛不熱附骨則其上弘勢
凡初得附骨疽即湧急脹漏蘆湯下之付小豆
散得消可服五香連翹湯

治骨疽方

又方未蕪菁子付帛裹キヌメ一日一易

葛氏方治久疽骨疽以積年一合一叢汁出不差

不方火烊餡以灌瘡中日三

又方以白楊葉屑傳之

治石癰方第六

病源論云石癰者乃是寒氣客於肌肉折於氣血
結聚所成其腫結確實至牢有根核皮核相親
不甚熱微痛熱時自歇此寒多熱少斬如石故謂
之石癰也又、熱氣垂之乃有膿イフ
垂シテノ

小品方云有石癰者始峻堅皮肉相親著不赤
頭不甚尖峻トカララ痛、漸自歇便極堅如石故謂石
癰難消又不自斬、皆可百日中也

初作便脹ル防已連翹湯白針氣寫之傳練石

薄積日可消若失時不得治不可消已有膿者

勿用此薄則連潰膿淺易為火針諸癰潰
後用膏散依治癰法初作即以小豆薄塗
之久消也

治癰結腫堅如石或如大核色不變或作石癰不
消者方

麻屑八兩燒作灰白荳二兩十丁カニ藤理黃色可作磨ナル
石行一斤燒石極令赤內五升苦酒中アキ後燒
竟復更內苦酒中令減半止鳩石作末并
麻屑肩白荳屑苦酒和如泥厚塗癰上

裁乾更塗取消也

千金方治石癰堅如石不乍曬者方

生章陸根鴆付之燎則易又治漏癰醫門方同之

又方酢或李有此二味和荳蔻子未付根之得

凡發腫至堅而有根者曰石癰

又方當上灸百粒石子當安

又方梁上塵葵莖灰丸等酢和塗

又方蜀新名來根白皮陰干鴆未消膠以酒和來

皮付上付上即拔出

治座癰方第七

病源論云座癰者由風濕冷氣搏於血結聚而成也腫結如梅李也

養生方云人汗入諸食中食之作癰癰

又云五月勿食不成核菓及桃桑發座之

大素經云汙出見濕乃生座疽注云座癰之類然小

也俗謂之癰子

小品方治癰及癰始結腫赤熱者

水摩半夏塗之擦更塗得腥便消也山草

中自可極取生半夏乃佳神驗

山草

千金方治癰子方

凡癰無頭者吞葵子一枚多服頭多又方半錢封之

徐伯方治癰瘍方

鵝商陸根和糟薄之

又方鵝百合根薄之食之亦得

又方鵝苦苣菜薄土又生倉食苦苣

孫伯方云鵝商陸根和糟薄之又方鵝生牛膝根

薄之

范注方云癰瘍初生即灸其頭數百壯即愈
又云癰瘍初生尚嫩者取如鵝子研石若凡十餘枚
燒以布帛裹熨之重安令極熱；嫩者輒易二
三十枚則消

刑繁論云治癰瘍方

鵝生疔根以薄腫土乃止

救急單驗方療初患似疖後破無癰痕痛不可

忍名膿

附單驗方

瘡方

燒

膿鼻作灰

附立差

陶景本草注伏龍肝

鵝篩合葫塗

甚効

劉消子方治癰瘍虛腫方

當歸二兩 茵草二兩 赤石脂二兩 外麻四兩

白斂四兩 芒硝四兩 大蒜四兩 千玄參三兩

右八物下筛鷄子白和如婆_法故布上隨腫所大

小作枯_火燎復易之

治瘰疽方第八

病源論云瘰疽之狀肉生小點點小者如粟豆大者如梅李或赤或黑乍青乍白有竇核捺痛應心或著身體其著手指者似代指人不別者呼為

代指不惡治毒逐_火脉上入藏則致入南方得此疾皆斬去指忌其毒土攻藏故也

又五十指端忽生菜_築痛入心不可忍向明望之晃

黃赤或鑿_{鳥嘴及青黑色也}青黑是瘰疽直斬後第十有一並

又云風癱痛不可忍者瘰疽也

疽叢五歲愈第解相應通洞瘰疽也諸是瘰

疽皆死又齒間臭熱血不心瘰疽也七日死治_{火走}

所不差以灰棗覆其血不爾著人

又云諸是瘰疽皆唯痛取利十有一活耳此皆寒

毒之氣容於經絡氣血而生寒毒變所生

小品方云 麻疽者肉中忽生一墜子如豆粒小者如米
粒粟アマコ者如梅李大或赤或黑或青或白其墜状
實腫アツツク有根而不浮腫也痛癥應心其根極深達
肉肌也小久不治使四面患腫疮黯紫黑色能爛
壞筋骨也毒流散逐脉走入藏府則致人南方
人名為瘧著毒得著厚肉處皆即割去之燒燬
令赤燥疮上令進如皮二灸置疮上百壯為佳
單春シキ叢アマツ摹葉薄其四面以防其長也飲葵根

汁藍青汁犀角汁外麻汁竹瀝汁黃龍湯諸軍
治能折其勢耳內外治法依治丹毒方也

千金方云標疽祕方世不傳神良無比方
夜干二兩 甘草二兩 大黃十八 麝香二錢 干地黃
二兩 枳實二兩 犀角六分 前胡三錢
八味木九味 蒸取三升入腹卷止不限劑

治癰疽著手足肩背累々如米起色白刮之汁出 愈カケル
良傷氣カクエキ 擦也カケル

復發方

發方

黃耆カハニモイケ 六丸ヤナフギ 款冬花ナツフヨウ 二丸ヤナフギ 升麻トリコロアレクモ 四丸ヤナフギ 赤小豆アカシマメ 一丸ヤナフギ

附子オウ 一丸ヤナフギ 苦參クンニチハ 一丸ヤナフギ

六味下筛酒服半錢上漸々增至一錢日三

又方熒蕪菁子熟ナガラ 鴉帛聚裏轉ナガラ 其上勿止

又方葵麻子末摩土日五

又方鷄糞ナガラ 亂髮ハカル 如鷄子大猪脂二升トロハナ 塗塗ハカル

之

錄驗方治癰疽方

燒鐵令赤爍之ヤナフギ

又方蛭噉尤佳

又方飲葵根汁ナガラ

又方飲藍青汁

又方飲犀角汁トホル

又方飲黃龍湯

龍門方治癰疽徹骨痛方

取狗糞當戶根前燒作灰塗之燒時勿令患

入知驗ノル

治久疽方第九

病源論云凡疽發諸節解及府藏之愈則卒急也其文疽者發身臍閑處故經久積年致膿汁不盡則創內生虫而變成癰

范注方治文疽衆醫所不能治方

沸鰥灌割中三灌即愈

葛氏方同之

治文疽惡創連年不差方

黃連二分赤小豆二分附子半分炮

凡三物搗為屑合藥之若創有汁以屑傅之無汁皆以猪膏和屑銅器中火上使一沸以傅之

千金方治文疽方

取鱉_子剪破其腹勿損腸脬_子內上白鹽未以針縫合於銅器中火煎令干未著創中無膿者以猪脂和付小疼痛勿恤也

今李方治文癰疽漏夕藥散方

夕藥三分大黃三分白芨三分莽草二分

凡四物治令下逐和調之以酒服半錢上日二不知可稍增至方寸匕

治緩疽方第十一

四
胡羅丸
諸寒四轉也
傳曰諸秋發
圓毛
冰毛
說文水堅
也

病源論云緩疽者由寒氣客於經絡致榮衛渙濁氣
血壅結所成其寒氣盛者則腫結痛深而圓無頭
尾大者如拳コラシ小者如桃李冰與皮肉相親著熱氣少
其腫ヒダリ與肉色相似不甚赤積日不漬又乃變紫黑色而皮
毛大者如肉俱爛如牛頸創漸至通體青黯不作頭穿
潰膿劣是也以其結膿積久而其肉腐壞トモル故名緩疽
腫或布
十元
名肉色疽也

小品方治緩疽方

初作宜服五香連翹湯セイカクヤクタウ去面以小豆薄塗之其間
數以鏃針去面又薄之取消良也不消色未變針色

青黓者以鍊石薄之若失時不得消已爛者猶
服五香連翹湯及漏蘆湯下之隨熟多少投方
也外以升麻湯滌洗之傳升麻膏若生鳬惡肉者
可以單行下物白蘭茹散傳之青黑肉去盡便傳也
好肉熟生但傳升麻膏良矣不生傳單行一物
黃耆散也若傳白蘭茹散積日青黑肉不盡者
可以涼顧赤皮蘭茹散取半錢上和雜ハセガタ三大錢上白
蘭茹散中合治之稍以傳之惡肉去盡還淳ヨウジン用白蘭
茹散也視好肉欲生可傳黃耆散也

白蘭茹散 涂頭蘭茹散 黃耆散

右三方並一物單行隨多少春下肺用耳

治甲疽方第十一

病源論云甲疽之狀割皮厚甲錯剥起是也其創
久癢恒欲搔凡之汁出其初皆是風耶折血所生而
創裏久有虫也

醫門方療甲疽其傍甲際生怒肉痛不得著
繩血不心方

右取石曇火上燒令烟盡研末傅瘡上消痛

不過三五度必差極効宜保愛之

隨時方治甲疽方曰割甲傷肌作瘡瘻浸淫相染
膿盡如火燒火瘻日夜漸引名醫不能療者此方必差
如神

綠樊狀似朴消綠色炭燒沸盡候者色赤停
於筒取好者搗篩為散麻石不堪弃之勿用
右若患前件瘻者先以鹽湯淨洗以綠樊散厚
傅之用帛纏裹經一日體膿水即干若覺瘻干
急痛即塗藥取潤每一兩日一洗厚傅之病

初患瘡尚小，膿小未多之時，只取少許散藥和蕩如軟麵十九年五月用傅一兩日即差。此要方同之。

此方與守後本在醫心方等

治腸癰方第十二

病源論云：腸癰者，寒溫不適，喜怒无度所致。邪氣與榮衛相干，在腸內遇熱加之，血氣蘊積結聚成癰。熱積不散，血肉腐壞化而為膿。其病之狀，少腹堅強，小便似淋。惡寒，身皮甲鑄，腹皮急如腫狀。甚者腹脹大轉側，聞水聲或繞脊生創而穿膿出。又大便膿血似赤白下，而實非者，是腸癰而不曉治。

之錯者則敏人

千金方腸癰之為病，小腹重而極躁，則痛小便數。似淋時，汗出復惡寒。其身皮甲鑄，腹皮急如腫狀。又云：繞脊有創如粟皮，熱便膿血似赤白下必死。治之方：

屈雨肘カギメ灸肘頭銳骨各百壯，則下膿血即愈。
又方：大黃四兩，牡丹皮三兩，桃仁五十枚，冬瓜仁一升。
芒消二兩，五味水六升，煮取一升，盡服當下膿血。

集驗方治腸癰湯方

薏苡人一升 松丹皮三兩 桃仁三兩 冬葵入升

凡四物以水六升煮取二升 久再服

范汪方治腸癰方

大黃一斤 金色者 大棗十六枚

凡二物以水一斗煮取三升宿勿食能一服湏臾
攻痛如火燒之癰瘍而即隨大便出

醫門方療腸癰方

甘依子一升 碎牡丹皮 大黃別浸 芒消各三兩

桃仁去尖 甘草炙各 水七升外煮取二升半下大黃

更煮二三沸絞去滓內甘消八溫三服當
下膿血

治肺癰方第十三

病源論云肺癰者由風寒傷於肺其氣結聚所成
也肺癰之狀其狀逐日內滿隱隱痛而戰寒又肺癰
有膿而滯者不須治其滯也膿止自愈

又云咽干口內燥逐日而不渴時逐日出濁唾腥鳴冬逐日膿
如梗米粥者難治

又云癰膿吐如粥始萌可救膿成則死

又云肺癰者在鼻中歟有血也

千金方云歟鼻中滿而偏振寒脉數咽乾而不渴時渴唾腥臭久之吐膿如梗米粥是為肺癰桔梗湯主之

桔梗三枚 甘草一兩

九二物㕮咀以水三升煮一升校去滓適寒溫入為再服朝飲暮吐膿血即愈葛氏方同之

范汪方治肺癰方用

薏苡一升㕮咀漚苦酒三升煮得一升通寒溫

一服有膿血當吐之

葛氏方同之
此法本在醫古本草

百濟新集方治肺癰方

黃耆一兩以水三升煮取一升入二服葛氏方同之

僧深方治肺癰經時不差桔梗湯主之方

桔梗三兩甘草 薏苡人敗醬 干地黃各

二兩 當歸一兩 来根皮一升

凡八物切以水一斗五升煮大豆四升取七升汁去豆內清酒三升合藥煮取三升半去滓服七

合日三夜再禁生菜

醫門方療肺癰 端氣急卧不得安者方

亭歷子三兩 焚搏如渥 大來卅枚 破水二升

大來二沸去滓內亭歷暗一兩煎取一升

又以布濕頓服之忌猪肉 酸

醫心方卷第十五

光康 加見

醫心方卷第十五札記

二頁上

黃父

外臺引集
驗作黃帝

下五

當其下

外臺作下陷肌
膚筋髓骨肉連

五行

五藏血氣竭盡為

其雍下十九字

六皮交

外臺作皮
犬瘡三字

五行

六十

八歲十八

四頁上

二行

一九

病源作十
九外臺同

五行

如痛

病

下一發之契

病源作發
背發契

九伏鼈

病源作伏
伏鬼

五行

五

下九

六十日軒及有合

病源此七字
作牽脛二字

六頁上

殊疽

作赤

行二脾若

病源作
腫若

行心碎

病源心下
有出字

行陽明

病源無
此二字

行肥腸

病源作
腓腸

四行

九頁上

瘋癱

作痴疽
外臺同

行四五逢端

病源五下有日字
作端外臺同

行朱疽

源病

作米疽 下二敗疵 痘源作改 行治之 外臺無
外臺同 行 賦外臺同 行治之 此二字 小

豆 外臺此下有 瘡之方三字 蔴翹草根 外臺 蔴翹作連 行脫疽

療之方三字

根外臺根下有皮字

行脫疽

外臺作 十貞下 如小 痘源同外臺 七行 又不言延
股疽 三行 作從一字 治之此二字 小

卒人 作卒又 得針 鍼訛

八行 肺音肥 外臺無

行 肺音肥此三字

上一

前白 外臺作延慶本

行 三者竟體膿成 痘源作名曰竟

字外 外臺同

十四頁黃耆枯案枯即帖之俗訛字外臺引刪

防風共 七味

下一行黃耆枯案枯即帖之俗訛字外臺引刪

蓋為此類方 上一行百主 千金作

十五頁百壯 千金作

行

六其問 千金作其間

七行 擶洗之熨 千金作搘

行

溪溫 外臺引素

七行 宰斬 痘源作

行

行 擶洗之摩

十八行

千金作上留

上五行結絡 痘源作經

行 四散之病源無

古九貞

腎臍病源作

行 散之之字

下九行 腸臍

病源作

行 其黯狀實

病源作看支

上四行一薰

病源魚作異

行

腋 千金作其狀

不寃四字

行 燰疽秘方

行

味 行 一包白色

千金作

行

