

醫心方卷第十六

✕
i109-1

治下痢方第一
 治風濕方第五
 治風濕方第六
 治風濕方第七
 治風濕方第八
 治風濕方第九
 治風濕方第十
 治風濕方第十一
 治風濕方第十二
 治風濕方第十三
 治風濕方第十四
 治風濕方第十五
 治風濕方第十六
 治風濕方第十七
 治風濕方第十八
 治風濕方第十九
 治風濕方第二十

490.9
 IS-4
 15

No. 2261
 12-109-1



富士川支庫
 1414



醫心方卷第十六

從五位下行賦博士魚丹波介丹波宿祢康賴撰

治丁創方第一

治犯丁創方第二

治毒腫方第三

治風毒腫方第四

治風腫方第五

治熱腫方第六

治氣腫方第七

治氣痛方第八

治惡脈腫方第九

治惡肉方第十

治惡脈方第十一

治編病方第十二

治瘰癧方第十三

治瘰癧方第十四

治瘤方第十五 治諸瘻方第十六

治狼瘻方第十七 治鼠瘻方第十八

治蜈蚣瘻方第十九 治蜂瘻方第二十

治蜂蟻瘻方第二十一 治蟾螬瘻方第二十二

治浮浪瘻方第二十三 治瘰癧瘻方第二十四

治轉脉瘻方第二十五 治曉頭瘻方第二十六

治蚯蚓瘻方第二十七 治蟻瘻方第二十八

治蝎瘻方第二十九 治蝦蟆瘻方第三十

治蛙瘻方第三十一 治蛇瘻方第三十二

治蛇瘻方第三十三 治雀瘻方第三十四

治石瘻方第三十五 治風瘻方第三十六

治内瘻方第三十七 治膿瘻方第三十八

治冷瘻方第三十九 治丁創方第一

病源論云丁創者風邪毒氣搏於肌肉所生也初如

風癩搔破青黃汁出裏有赤黑脉亦有全不令人知

忽以衣物觸及手著痛亦有肉突起如魚眼赤黑久結

皆變爛成創下有深孔如火針穿之狀初作時突

越如迴厨蓋故謂之丁創令人惡寒四支強痛創便
 變雄黑色腫大光越根鞞酸酸痛皆其候也在手
 足頭面骨節間者最急其餘處則可也毒入腹則
 煩胸不佳或如醉如此者二三日便死也
 養生方云人汗入酒食內食之作丁創
 凡有十種一創頭為而強二創頭白而腫實三創
 頭如豆塗色四創似葩紅色五創頭內重脈六創頭盡
 而浮虛七創頭葩而黃八創如薄色九創頭如茱萸
 十創頭似石榴子

黃帝八十
 難經云血為
 營氣為衛
 云

千金方云論日夫稟形之類須存攝養將息共所百
 病萌生故四時代謝陰陽逆與此之二氣更相擊怒當
 時也必有暴氣共果氣者每月之中必有卒然大風
 大霧大寒大熱若不將避人忽遇之此皆人人四體
 頓折皮膚淡濕經脈逆使淡理擁障結滯陰陽
 之氣不得宣寫變成癰疽丁毒惡瘡諸腫至丁腫若
 不預識令人死之不匝辰若託乃欲求方其人已入木
 矣所以養生之士若早識此方凡是瘡瘻無所逃矣
 又云一麻子丁其狀空上越頭大如黍米色少為中

四邊微赤多瘡忌食麻子及衣布并入麻田中

行今案錄驗方云大小如黍米一粒頭里有部漿完色不異

二石丁其狀皮宗相連色為黑如為豆其甚鞭刺不入

穴內蔭之微疼忌凡廐埽石之屬今案錄驗方云頭下瘡加堅

有部漿四畔小法并粟

三雄丁其狀宛頭為廐黑四畔作瘡泡漿起色黃大

如戲孔忌房今案錄驗方云連根加頭黑

四雌丁其狀瘡頭少黃向裏廐黑似茶瘡四畔泡漿

起色赤大如戲孔忌房今案錄驗方頭赤四畔黑黃泡漿有汁无粟

五火丁其狀如火瘡頭為廐黑四邊有泡漿以有如

赤粟忌火炎燂今案錄驗方頭黑廐肉色赤粟

六爛丁其狀少里有白斑瘡中有膿水形大小如匙

面忌契食爛物今案錄驗方大小如杖面膿血俱有四畔无赤粟

七卅六丁其狀頭為浮起形如為豆四畔起大赤今日生

一明生兩三乃至十若滿卅六藥所不治不滿者可

可治俗名黑點忌瞋喜愁恨今案錄驗方頭黑兩

患者即死

八蛇眼丁其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼體

忌地毒

至篇云牛更交堅也亦作硬

八 大忌惡眼人見之及嫉妬人者之今案驗方頭黑麩條四畔有部漿赤

九 塩膚丁其狀大如匙面遍瘡皆赤有黑粟起忌鹹食今案驗方頭赤麩大如小豆赤粟廣多无部漿

十 水洗丁其狀大如錢形或如錢孔大瘡頭白裏黑麩今案驗方頭白麩无部漿有赤粟

十一 刀鑷丁其狀瘡間狹如薤葉長丁側內黑燒爛忌今案驗方頭三角有

十二 浮飢丁其狀瘡體曲圓少許不合長狹如薤葉大今案驗方頭

內黃外黑白今案驗方頭 刺不痛裏黃裏刺痛今案驗方頭

十三 牛狗丁其狀完內汜色指不破今案驗方名曰羊丁

右一十三瘡初起必先癢後痛先寒後熱之定寒多

四支沉重頭痛心驚眼花若太重者嚙逆之者難治其

麻子一種始未唯瘡所録之忌不得犯觸之者難治其浮飢牛狗兩種無所禁忌縱不治亦不致人又云有此病者忌房猪鷄魚牛韭蒜葱薑胡蘆酒

玉篇云口冷及一梳也仇按曰

漿赤

高肉四上出四畔无部漿赤粟忌丁鐵

今案驗方頭

酢麵葵等又見豹即死大忌今至錄驗方云七日不得食

得帶赤者有毒 唯用純白色者

又云凡治丁腫皆刺中心至痛又刺四邊十餘下令血出去血付藥氣入針孔中往若不達瘡裏則不相得力也

又云治一切丁腫方

蒼耳根茎子葉皆得燒作灰酢汁和作泥塗上不過十易枝根出

又方塗雄黃末五愈神驗

本草拾遺曰石黃 注云雄黃素今人誤 取中精明者為雄 黃黑者為黃黃

瘰

山錦 瘰癧也

又方苟杞煮汁冷飲一二盞弥佳

錄驗方云有釘毒瘡中安匙如魚眼狀赤黑疼痛徹骨是寒毒久結及在此疾也其爛成瘡下有深孔如火針穿也初作突匙狀如細釘蓋故謂釘之毒者焉初作即服湯及諸單行治丹方法便差也北方饒此疾也江東時有作者喜著口裏頰邊及舌上也者之正黑如珠子合服湯針刺去血如治丹疽法也

諸治也

小品云治小兒誤吞鐵珠子如大豆云

癰疽方治丁瘡方

以甘刀割十字以銅鐵楮燒火令赤創上置臈少燒

刺名曰為藥一二邊セツク元毒タビ實時自熱ヤム止燒ヤク鼠矢クニ作ナシ

灰末著創シ穴滿アツシ之即ス老オシ
今系經心方燒
錐赤刺頭上

又云治惡瘡丁腫五香湯方者婆方同之

青木香 薰陸香 沉香 丁子香 藿香 各二兩

水三升煮取一升半分三服得麝香二分去藿香

槎要方治丁創方

搗カハシキ芫蔚カハシキ莖菜薄腫上服汁令丁毒內消也一名益母草

百濟新集方治丁腫毒氣已入心故困死方

取菊菜カハラヨモギ合差ナカフ搗ツキ絞取汁三升頓服之ニカカ

醫門方療丁毒腫不問雄雌麻子等一切毒腫毒氣入腹救人方

頻ヒシ煮芍杞根汁飲之

又云治丁腫方

白蠟カヒコ蟹白カヒコ僵石末和封之最佳

又方水研白僵石服一盞并針開瘡傳上自消

經心方治丁腫新方

末附子カネクハ酢和カネクハ鹽土カネクハ煆カネクハ復塗之

陶景本草注治丁瘡方

斷不尿乾者燒之烟絕水漬飲汁名破棺湯

蕪敬本草注丁瘡方

末自瀼螿封上根當自出極効

崔禹賜食經丁瘡方

搗相莖菜根傳之瘡根即拔

耆婆方治一切疔瘡神方

以磴磧末少付即老

又云治人契毒疔瘡在口中方

凝水石搗末研之少以付瘡上日三四付即老

今案以冷水洗之

治犯丁創方第二

病源論云犯丁創者謂丁創故老更犯觸之若大瞋

及食猪魚麻子并梳臭人氣燻創皆能犯之則更刻

乃甚於初更令創契所腫先寒後契四支沉重頭痛

心驚驚遠煩悶則不可治之

千金方云微知犯狀但脊強瘡痛極甚不可得忍

是犯狀治之方

多搗蒼耳汁飲并塗上

又方水四升煮地腕皮如鷄子大三四沸去滓服立

愈

又云若犯者

取芍朮根切三升以水五升煮取一升取滓研一

上和汁一盞服之日二三服并單飲冷汁一二

盞亦佳

醫門方療犯丁腫故死者方

搗菊葉取汁服之冬月取根神驗

錄驗方治患丁瘡犯故死方

取慈石和酢封五枚根出

又方石流黃燒臙者之

又方酢練磨碯石遍傳之立差

又方取冬葵子服方寸匕日二黃八分

救急單驗方療犯丁瘡之根入腹故死方

取東行猪母真和水絞汁飲一升差

又云已死者

取大黃龍湯一升煖之以木拗口灌即活甚驗

本草替穀日人屎
取芍朮根王諸毒
卒惡熱黃悶欲死日
新者和水服治毒腫
一升最好陳
久者名黃龍湯
名佳

昔法言於絞及手檢

黃龍湯
本草和名曰
陶一云明中
積羊得汁
甚思而苦若
也黃一名玄

病源論云毒腫之狀与風腫不殊時令人壯契其

耶毒甚者入腹斂人風動不斂部令人身寒其

經心方治毒腫五香湯方

沉香 青木香 薰香 丁香 各一兩 麝香 半兩 五

又云味以水五升煮取一升半分三服

劉涓子方五香丸治惡氣腫毒方

薰陸香二分 霍香二分 青木香三分

鷄舌香二分半 鬼臼二分 大黃八分 當歸五分

升麻三分 朱沙一分半 牡丹二分 雄黃一分

右十一物搗下篩蜜和為丸清白飲一服四九如

小豆大日再

又云五毒膏治惡氣毒腫方

蜀椒二兩 當歸二兩 朱沙二兩 烏頭一分

苦酒一分半 猪肪六行 巴豆一分 雄黃二兩

右八物吹咀以苦酒淹一宿內猪肪合煎微火三

上三下藥成向火摩腫上日三

集驗方治風契毒腫結去夜于膏方

夜于二兩 常陸切一分 防已四兩 升麻三兩

四物切以猪膏三升微火並常陸小雄黃去滓

以摩病上

葛氏方治卒患毒腫起稍廣急痛方

燒牛屎末以苦酒和傳上煖復搜

又方搗荏子如泥塗上煖復搜之

又方以苦酒升麻及青木香紫真檀合磨以指

塗痛處良

又方但以甘刀破上泄去毒血乃傳藥亦佳

今系取水蛭令啗去惡血其方在治癰疽之方

千金方治惡毒腫或著陰卵或偏著一邊疼急痛變

本草曰紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒

牽入少腹不可忍一宿斂入方

取迴香草搗取汁飲一升日三四服滓薄腫此外

因神方從元嘉末來用之起死人神驗

救急單驗方療一切惡腫疼痛不可忍無問冷熱大

小方取葇若子三枚檢熟按勿令破吞之驗

孟詵食經毒腫方

末赤小豆和鷄子白薄之立差

陶景本草注毒腫方

煮青木香浴大佳 又方服藍汁

葇若子於係美留久佐

治風毒腫方第四

病源論云風毒腫者其先赤痛癰契腫上生瘰癧漿

如火灼是也

小品方云有風熱毒相薄為腫其狀先腫癰契上生瘰

瘰如大礫者名風熱毒也治之如治丹毒法也

葛氏方若風毒兼改通身漸腫者方

生苦參昌蒲根三白根剉各一斗以水一石五斗煮

取一斗去滓內好酒一升溫服半升日三次洗身

槌要方療風毒初腫令消方

大黃二兩 亭歷子二兩 葵通草二兩 莽草二兩

右為散水和傳腫上煖易之神効

耆婆方治人風腫在皮上發有時方

升麻三兩 夜于二兩 夕藥二兩

三味切以水三升煮取一升分三服

治風腫方第五

病源論云風腫者腫無頭无根浮在皮上如吹也不

赤不痛移无常處而兼癢由腠理虛而逢風所作

葛氏方云凡毒腫多痛風腫多痒按之隨手起或非

小品云似
瘰癧亦象
癰疽云

小品方云有洪爛

瘰癧身上
忽生瘰癧如
瘰癧

三白草
加多
久佐

瘦カハチ交々一也隱カセヨ軀皆風腫治之方

但令人痛以手摩將拵按數百過自消

又方炒蜚矢并塩布裹熨之

又方苦酒摩桂若獨治以傳之

又方楸葉浸水中以裹腫上

又方以斲刀决破之出毒血便愈

經心方白斲カハチ治風腫毒核癰疽方

白斲二兩 黄芩半兩 茵草半兩 夕藥一兩

黄耆一兩 當歸一兩 大黃半兩 赤石脂二兩

八味為散以鷄子白和如粥塗紙帖上捺復易

第例格又
息也
厭也

本草云ハハチ又セメチ笹草麻子油塗之

治契腫方第六

病源論云其契毒作者之無政頭但急腫色赤而特惡

寒甚契煩胸不安

搗要方療契毒腫秘之不傳方

皂莢カハラフシ刺一握去兩頭

右以水一大升煮取半升去滓頓服之取痢其腫

如湯汶雪

又云療一切契毒腫忽發頸項脊背上即封不成膿
方 生地黄二升 香豉半升 芒消五兩

右搗令契以傅腫上厚二分日五六付消也
救急單驗方療契毒腫方

取栗樹東南根下土和水作泥餅安腫上以艾灸
之取契應即心男女並同

廣濟方療契毒腫方
取牛腸骨燒為灰以酢和如泥塗上乾易

耆婆方治人契腫疼痛方
升麻三兩 夜干二兩 大黃二兩 芒消二兩
青木香一兩 艾子一兩 甘草半兩
七味剉以水六升煮取三升內芒消攪令調分
三服得下利即差

治氣腫方第七
病源論云氣腫病者其狀如癰無頭虛腫色不變皮
上忽手纒著便即痛是也此風耶搏於氣所生也

小品方云有氣腫病其狀如癰無頭虛腫色不變皮上

急痛手裁著使覺痛此由體契當風復被暴冷涼折之結成氣腫也

宜服五香連翹湯イタチハセ又イタチクモ白麩氣寫之傳疾梨薄亦用小豆薄並得消也今至五香連翹湯在治惡脈之方中

疾梨薄方
疾梨子二升下篩以麻油和如泥熬令焦黑以塗細

故藥布上剪如腫大勿用頭濟之無疾梨可春本書此字小豆下篩鷄子白和塗腫上乾復塗之並得

消也集驗方同

治氣痛方第八

病源論云氣痛者人身忽然有一處痛發作有時痛

發則小契痛靜便如水霜所加故云氣痛也由體虛

為風邪所侵遇寒氣而折之耶氣不出故也鳥果元

小品方云有氣痛病身中忽有一處痛如打探之狀不

可堪耐亦左右走身中發作有時痛發時則小契痛靜

時便覺其處如冷水霜雪所加此皆由冬時受溫風至

春復暴寒涼來折之不成溫病乃變作氣痛也

宜先服五香連翹湯數劑及竹瀝湯摩丹參膏及

白濁者イ楊柳樹皮アチロ暖熨之有赤氣點ル見處ハ宜鑿以去ル

血也其間將七十白薇散ハ

小竹瀝湯治氣痛方

淡竹瀝二升夜于二兩 杏仁二兩 茵芋半兩

黃芩半兩 白朮二兩 木防已二兩 防風二兩

秦膠二兩 伏苓二兩 麻黃一兩 獨活二兩

枳實二兩 夕藥二兩 甘草二兩

凡十五物カ咀以水九升カ煮藥折半カ乃可カ內竹

汁カ煮取三升カ分四服カ少嫩カ入カ作五服

嫩カ 雙困及カ 弱也カ

白薇散治風契相搏カ結カ氣痛カ左右走身中或有

惡肢起者カ積服湯餘契未平復カ宜此白薇散カ以消

餘契方

白薇カ六分 萎蕤カ四分 當歸カ四分 麻黃カ三分

秦膠カ五分 天門冬カ四分 蜀椒カ二分 木防已カ四分

紫胡カ三分 茵草カ二分 獨活カ四分 枳實カ四分

烏頭カ二分 木カ六分 人參カ四分 夜于カ六分

山茱萸カ四分 青木香カ四分 防風カ六分 白芷カ三分

凡竹物カ搗下カ絹篩カ以酢漿服方寸匕漸至二匕

日三少嫩人隨長少減服之毒殺者可用酒也

已上集驗方同之

治惡肢腫方第九

八十難經曰注曰

病源論云惡核腫者肉裏忽有核累音義并備委皆勒果後如梅李音義并備小有如

豆粒皮內癢痛左右走身中卒然而起此風耶栝毒八七三

所成其只似射工毒初得無常處多側之痛不即治

毒入腹煩肉惡寒即斂人也久不斂則變作癩

小品方云有惡肢病者完中忽有肢累之如梅李核

狀小者如豆粒皮肉中癢痛左右走人身中壯熱癩

射功小品方曰射功三名瘻其虫似如甲虫云因水勢以射人云云

瘻畏寒是也與諸瘡痕癰癧結筋相似其瘡痕癰

癧要目瘡而生是緩疾无毒其惡肢病卒然而起

有毒不治入腹煩肉則斂人南方多有此疾皆是冬

月受温風至春夏有暴寒冷相搏氣結成此毒也

宜服五香連翹湯以小豆薄塗之得消也死者五香

湯去滓時之洗漬之消化之後以丹參膏傅餘

脉令消盡不消盡者還傅小豆薄也

五香連翹湯治惡脉及惡肢癧風結諸肢腫氣痛方

青木香二兩 麝香半兩 沉水香二兩 薑陸香兩

即果又

病源論云江南有射工毒虫名短狹名蠅水肉

鷄舌香一兩 連翹子二兩 夜干二兩 升麻二兩

獨活二兩 寄生二兩 大黃三兩 甘草二兩

淡竹瀝二升

凡十三物 咀以水九升 煮藥計水減半許 可內竹

瀝汁又剋取三升 分三服

丹參膏治惡脈及惡脈癰瘰風結諸脈腫痛方

丹參二兩 薊藿根二兩 茵草半兩 秦膠一兩

獨活一兩 躑躅花半兩 蜀椒半兩 白芨一兩

牛膝一兩 菊華一兩 木防己二兩 烏頭一兩

凡十二物 細切為善 以苦酒二升 漬之一宿 復月

半日 急疾即煎之 以猪膏四升 煎令苦酒竭

勿令暴燥 熬也 去滓 以膏塗諸疾 上日五六至

良

葛氏方治惡核腫結不肯散者方

烏髮根升麻 各二兩

以水三升 煮取半升 分再服 以滓熨上

又方燒白鴉矢 以水服三方寸匕 以肉薄腫上

又方苦酒摩由跋塗之 鴉小蒜薄之

錄驗方治惡核腫毒入腹五香湯方

董陸香射香射沉香射鷄舌香 青木香各二兩

凡五物以水六升煮取二升半適寒溫分作三服

不寒復作云令香可盡五香各一兩水四升煮

取三升分爲二服又滓薄腫腫上神良

僧深方凡得惡腫皆果率初始大如半梅桃或有核

无核或痛或不痛其長甚速須申如鷄鴨大即不治

之腫契爲進頰肉物牽毒內侵填塞血氣息不

通一每宿便教人初覺此病便急宜灸當中央及繞腫

邊灸之令相去五分使周匝腫上可三七壯腫感者多多

壯數爲老腫進者逐灸前際取任乃止

又方鯽魚本草云音即薄腫上

天方取鯽魚膾蒜即蒜及博薑蒜以醋和之蒸

劉涓子方治惡核腫毒湯方

烏扇二兩 升麻二兩 艾子人十四枚破

右三物切以水三升煮取一升半分再服以滓薄

腫上甚良

張仲景方治消核腫黃耆枯方

黃耆三兩 真當歸三兩 大黃三兩 芎藭一兩

白朮三兩 黃芩三兩 防風防字本作三兩 夕藥二兩

鷄子十枚 黃連二兩

凡十物搗ツキ後フルク以鷄子白和塗紙上ハク腫上ハク搽易

又方搗カラシ菜カミ莢カミ以囊盛ヤシ薄ハク豚上ハク可令連ア消ク用

多得効驗

治惡肉方第十

病源論云惡肉者身裏忽有肉如赤豆粒イタカシ突出細ホソク

長乃如牛馬乳大亦如鷄冠之狀イタカシ不痛也イタカシ久不治長不

已ヤ春冬被カク惡風カク所傷ヤ風入肌肉結カク瘰カク血積カク而生也カク

小品方云有惡肉病身中忽有肉如赤豆粒突出便長カク

推出カク不カク懸カク如牛馬乳亦如鷄冠狀也不治其為自推出カク

肯心カク亦不痛癢也此由春冬特受惡風入肌脉中變カク

成此疾也

治之宜服漏蘆湯外燒鐵カク燥之日カク稍燥令雄カク盡カク

也カク燥カク竟カク以外麻膏傳之積日乃耄耳カク今案漏蘆カク

在治丹之方

治惡脉病方第十一

病源論云惡脈者身裏忽有赤絡盧各及縛也脉起竈聚如

死蛇刺狀者如似有二水在脉中中長短皆逐其絡脉所出

見是也由春冬受惡風入絡脉中其血瘀結所作也九

小品方治惡脉病方

宜服五香連翹湯及竹瀝湯鑿去惡血傳丹參膏

積日則著亦以自雄雞屎塗之集驗方月之

劉涓子方治惡脉腫毒方

烏扇二兩外麻二兩生者用兩艾子十四枚碎破

右三物切以酒三升煮取一升半分為再服薄

腫上甚良

又去外麻湯治惡脉毒腫方

外麻一兩 吳茱萸一兩 薑陸香二兩 鷄香各一兩

雄黃一兩 鱉甲一兩炙 甘草一兩 烏扇三兩

青木香一兩

右九物以水七升煮取二升半適寒温分三服相告

一里治脉腫神良今葉外麻湯又有小此治丹方藥種与此不同

治漏病方第十二

病源論云漏病者由勞役支體熱盛因取風冷而為

肺筋肉也

涼濕所折入於肌肉筋脉結聚而成也其次赤脉起如

編繩急痛壯熱其發於脚者喜從鼯篠起至踝赤

如編繩故謂編病也其發於臂者喜腋下起至手

也不即治取其潰去膿則筋牽縮也其著腠者不

治不消復不潰其熱散氣不散變作死脈緩相薄

腫膈已成膿

小品方治膈病方

宜服漏蘆湯自下外以鋒針數斲去血氣針寫其結

脈處傳小豆薄則消皆可依治丹法消之且用

范汪月中
神所在法
云十九日神
在鼻樑
陰氣街
華他亦在
膝腔

時况及是腫痛也所力及不消也

治瘻三物甘焦薄也及至潰成膿火針傳膏

散之治癰法之千金方

葛氏方治皮肉平腫起夾長赤痛名曰編方

鹿角一兩 白朮一兩 杜厲四兩 附子二兩 炮

右四物搗下篩苦酒和塗帛以粘之于復搜之

治瘻瘻方第十三

病源論云風邪毒氣容於肌肉隨虛亂而停結為瘻

瘻或如梅李棗等核大小兩三相連在皮間而特發

寒熱是也久則變膿潰成瘻也

錄驗方云療瘰癧瘰唯須以針之毛十廿八之小者即消大者

即斂ウツム然後出膿便差一日一針重五其間四部

千金方云一切瘰癧在頂上及陰處但有完結發似

作瘰及癰痛者方カクキ子結及癰也瘰也

以獨頭蒜截兩頭却心心大作艾炷之式及燈也蒜大小拈

瘰子上灸之勿令上破ヤハラ但取契而已七蒜三

壯日之灸之取消心夫身之瘰癧各日論也

又方白強蠶為散水服五分モ七日三十日モ

又方干猫舌末付瘡上至

又方狼矢灰付上去

醫門方治瘰癧方

尖針丸ト丸之瘰子令穿通ホリトホシク以石流黃如豆大針中

燒針ヤク筋令赤燥之藥流入瘡中其瘡差即

消極驗也

小品方治卅歲瘰癧方於部及頭腫也

海藻一斤消裏盛好清酒二斗漬之ヒクヒ春夏霜

服二合絹晝復以酒二斗漬之飲如上法此酒

盡爆海藻令焚末服方寸匕日三藥无所禁

瘰癧人近定治瘰癧
在曲領前一寸二分

一劑不愈更作不過三劑也今案葛氏方治頸下瘰癧累如梅李

宜使速消

劉涓子方治寒熱瘰癧在頸腋下皆如李大方

人參四分 甘草四分 白芷四分 干薑四分

九四物皆同分治合蒜先食服方寸匕日三少力多如

小服半方寸匕良一方以酒服龍門方令速消云

范汪方治瘰癧朝夕菽契龍骨散方

龍骨七分 牡蠣三分 一方分等

凡二物治各下蒜先食服五分匕日三龍門方令速消云

王子年拾遺云方丈山東龍場地方子里有龍皮骨如山阜布散百餘頃

小方云人年六歲以上為小十八以上為少之

僧深方治諸瘰癧因瘡壯契方

白銀一斤二升

右一物沸湯和如糜契掩其上甚良

廣利方療瘰癧成瘻作孔方

露蜂房二枚 和臘月猪塗孔上

治瘰方第十四

病源論云瘰者由憂恚氣結所生亦由飲沙水沙

隨氣入於脈搏於頸下而成之初作与瘻核相似而

當頸下也皮寬不急垂腿音格然是也恚氣結成瘰者

瘰於頸也

但垂腿之无脉也飲沙水成癭者有核痛之無根浮動在
 皮中又云有三種癭有血癭可破之有息肉癭可
 割之有氣癭可具尉之養生方云諸山水單土中
 出泉流者不可久居常食作癭病動氣增患
 小品方云有癭病者始作与癭脉相似其癭喜生頸
 下當中央不偏兩邊也皮寬不急垂腿然則是癭
 也中國人患氣結癭者但垂腿之无脉也長安及襄陽
 蠻人其飲沙水喜病沙癭有脉癭之耳无根浮動在
 皮中

治諸癭良方

小麦一斗以薄苦酒一斗漬小麦令糲漉出曝和名須

令燥カ分セ之復漬之苦酒盡曝麦煇擣下菴以海蒸

三兩別擣末合治之温酒服方寸匕日三禁塩生

系生真猪宗生菜數用有驗也今案龍門方加昆布三兩范汪方云治卅年

癭及瘰癧

千金方治癭方

昆布二兩切如指大酢漬令咽汁盡則愈

又方灸風府穴百壯又灸太推百壯

小品方曰風府一穴在頂後髮際下小入髮中當兩筋中央陷中是也

大推兩

又方冬大推兩邊相去各一寸半少下垂各卅注

葛氏方治頸下平結果漸大欲成癭方

海藻一斤酒二斗漬一宿稍と合一二合咽之酒

盡取滓末服方寸匕日三

范汪方治癭昆布丸方

昆布八兩洗海藻八兩洗

凡二物搗下篩和以蜜丸先食合如半棗大稍

咽之日五服不知稍增以知為度

効驗方治癭昆布丸方

昆布二分 松蘿二分 海藻五分

凡三物治合下篩以白蜜丸如李子合咀嚼

咽其汁日三夜二

槎要方治癭海藻散方

海藻十分 昆布一兩 海蛤一兩 通草一兩

松蘿一兩 干薑一兩 桂心一兩 一方无干薑代白益一兩

右七物下篩酒服方寸匕日三

耆婆方治人氣癭方

松蘿二兩 海藻三兩 通草二兩 半復三兩 洗一

文選上林賦 一美梅

咽其汁日三夜二

才與及 疾略及 力三八ム

小方 大推兩 上屬 崇清 相模 取其 也

桂心二兩 海蛤三兩 昆布三兩 干薑六兩

伏苓二兩 細辛三兩 桔梗二兩

右十一味治本依物子醫方本草依味搗篩為散以酒服一方寸七日三

又方炒塩薄之

玉箱方治卅年癭及瘰癧方

海藻八兩 貝母二兩 五夜根二兩 麥麩二分

四味作散酒服方寸七日三 經心方同之

廣利方療癭結氣方

昆布二大兩 暖水洗去鹹味寸切 小麦三大合

以水二大升煮取小麦熟擇取昆布空腹含三五

斤津液細嚙之日再含 忌生冷油膩

治瘤方第十五

病源論云瘤者皮肉中忽腫起初如梅李大漸長大不

瘡不痛又不結強言瘤結不散謂之為瘤不治乃

至極大則不復痛不能斂入亦慎不可輒破之

范汪方云發腫都軟者血瘤也發腫狀如既雖極大

此宗瘤非癰也

千金方治瘤病方

本草拾遺 日極花梳也 本草十有餘 類一名鼠短 古色布文

愚案及蟻 蚘蟻也 宮本森云在蟻 蟻在淵 蟻蟻

蝨 蝨也 蝨也

煆石 芎藭 當歸 大黃 黃連 芍藥

批宗白殿 黃芩 各二分 吳茱萸 一分

九味為末鷄子黃和之塗細故布上隨痛大

不以薄帖之干即易著藥當熟作膿脂細

從孔出也按却膿血盡著生宗膏若膿不盡復

起故也

又云生宗膏主癰瘤潰漏及金瘡凡百瘡方

當歸一兩 附子一兩 甘草一兩 白芷一兩

芎藭一兩 生地黄五兩 薤白二兩

七味切以猪脂二升半煎白芷黃付之日三僧深方

又云凡宗痛勿治之致人慎之

僧深方治血瘤方

煆宗割炭火灸令契掩上榆之冷渡灸令宗

燒燂可四灸四易之若不除灸七至便足也

玉箱方楊樹酒治瘤癭方

河邊水所注楊樹根并竹葉洗細柱以水一石煮取

五斗用米三斗麴三斗釀之酒成服一升集驗方

治諸瘻方第十六

病源論云瘰癧之生或因寒熱不調致血氣壅結所
 作或由飲食乖昂狼臯之精入於府藏毒流注脈變
 化而生皆能使血脈結聚寒熱相交久則成膿而
 潰漏也生身體皮肉者亦有始結腫与石癰相似所可
 為異者其腫之中按之壘有數脈喜發於頸邊俱起
 便是瘰癧也亦發兩掖下及兩顛頰間初作甚不痛
 不熱若失時不即治生寒熱也所發之亂而有輕重
 者有兩一則支口上脰有結核大小見之或如桃李大此
 虫之窠窟正在其中二則發口之下元有結核而穿

動也

潰成創

又云虫毒之居或府藏無定諸瘰癧發身體亦有數處
 其相通者多死其瘰癧形狀起發之由今辨于後章

養生方云六月勿食自落地五菓經宿蚘蟣蜈蚣蟻
 上喜為九瘰十二月勿食狗鼠殘肉生創及瘰出頸項

及口裏或生咽內也

又云決其死生者及其目視之其中有赤脈從上下貫

瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲

死見三脈半二歲半死見三脈三歲死赤脈而不下

貫瞳子可治也

又云方說九瘻者是狼瘻鼠瘻蟻瘻蛇瘻蜂瘻虺瘻

瘻蝮瘻浮疽瘻瘰癧瘻轉脉瘻此頸之九瘻也

又云復有卅六種瘻方不次第顯其名而有既蝦蝨

刺等諸瘻非九瘻之名此卅六種瘻之數也

小品方云有瘻者始結腫与石癰相似所可為異者

其一種中板之壘有數版便是也

初作喜不痛不契即以練石薄傳之內服防已連

翹湯下之便可得消若其特不治結膿者亦以練石

薄之令速乾之用火射膏散如治癰法初作即以小

豆薄塗之之消

又云桐君說赤小豆白菴黃芩黃耆牡蠣凡五物分等

下篩酒服方寸匕

治癭瘤諸瘻昆布丸方

昆布八兩炙海藻七兩洗小麦一升熬海蛤五兩

菘藿四兩 連翹二兩 白頭云二兩

右七物搗下篩和蜜丸如梧子服十九日三稍加

丸

千金方云凡瘻有似石癰壘然作癰子有核在兩頸

及腋下不痛不契者皆練石散付內服五香連翹湯

下之已潰者療如癰法 今案五香連翹湯有治惡服方

凡項邊腋下先作瘰癧者故作漏也宜禁五辛酒麪

及諸契食

又云灸漏方

搗生章陸根抄作梓子步于及作製器名也置漏上以艾灸上梓子契易

之灸三四升艾任心方同之

又方亭歷二合豉一升二味合搗令契餅字也作麪如大

錢厚二分許取一枚當剗孔之作大艾炷如小指

大灸麪上三炷一易三麪九易日三障三日度一

香矣

又方灸瘻周四畔即老

又云治漏方

搗土依根薄之燥復易不限時節

又方燒死蹠頭末酢和塗之

又方死蛇灰酢和付之

葛氏方通治諸瘻方

取地中潛行美鼠イナクネネ一頭破腹去腸干之火炙イナクネネ令可成屑末以鴈月猪脂和傳瘡上

又方燒驢脂作屑猪膏和傳之

又方治諸瘻又方白犬骨燒末以猪膏和傳之看口裏齒頰間者方

東行女練根細剉三四升以水濃煮取汁含之

數吐易勿咽之

耆婆方治人卅年瘻瘡方

取葫蘆根カハシ令カハシ上煨カハシ槌去土大釜中以水煮令乾

去滓置大瓦中カハシ枝取清汁カハシ煎之若盛復カハシ煎小器

中カハシ藥令如薄糊カハシ內器中カハシ若有カハシ痂去之內カハシ藥若病

深以鷄毛取カハシ藥冷暖カハシ軟以內中カハシ老乃以取カハシ藥葫

蘆津カハシ舉著其人老而不報カハシ是者取津燒還カハシ菝瘻

也カハシ秘之

廣濟方療瘻久不カハシ瘻方

巴豆一兩カハシ大棗一升

石以水五升煮取一升カハシ絞去滓更煎如稠カハシ錫傳瘻

工日三

蜀涓子方治瘻衆方不カハシ老劫駁方

蜀涓子方治瘻衆方不カハシ老劫駁方

蜀涓子方治瘻衆方不カハシ老劫駁方

蜀涓子方治瘻衆方不カハシ老劫駁方

本草和名曰
牡蒙一名馬莖
生山谷陽處

取牡蒙數兩搗之湯和適寒溫取一升許薄瘡
上冷復易經日益佳

新蘇方治諸瘻方

露蜂房末酒服方寸匕

又方菟皮灰付之

又方芥子末付之

又方桃葉搗如泥封之不津其音用新法

救急單驗方療諸瘻瘡方

奠楸枝葉淨洗瘡內孔中大驗

又方石留黃末量瘡孔中以艾灸三驗

陶景本草注諸瘻方

玄參酒漬飲之良

又方鼯鼠蹄燒末酒服之

蕪敬本草注諸瘻方

本草拾遺曰莧
及馬齒陶以馬齒
与莧同類

馬莧搗指之

馬莧
新從本草云布地生實至嫩
細俗呼為馬齒莧亦可食小酸

又方食雉完良

雀鳥錫食經諸瘻方

食一兩竹葢終身不病也

治狼瘻方第十七

病源論云狼瘻者年少之時不自謹慎或大怒氣

上橫骨陷者

上不下之所生也始發之時在於頸項有根出缺盆上

轉連耳本根在肝

劉涓子方治狼瘻為病始發於頸腫有根起於缺盆

上轉連耳本此因憂恚氣上不得下

空青二分 蝟蝟胎二分 蝟蝟胎肝一具 芎藭半分

獨活一分 女婦草一分 黃芩一分 鼈龜甲一分

斑苗一分 乾薑一分 當歸一分 蜀椒一枚

斑苗
本草云甲上黃
黑斑色如巴豆大

迴香一分 煨石一分 地膽一分

十五物搗下篩酒服方寸許匕酒勿令大醉日三

十五日服之

治鼠瘻方第十八

病源論云鼠瘻者飲食之時不擇虫蛆之毒而變化

入於藏出於脉不去使人寒熱其根在肺出於頸項

千金方療鼠瘻瘡差後復發及不愈出膿血不止方

以不中水猪脂吹咀生地黄內脂中令其脂与地

黃足相淹和藥六七沸棄灰汁淨洗瘡去惡汁以

地黄膏塗上日一易

又云鼠痿腫核痛未成膿方

以栢菜傅著腫上熬塩著菜上熨之令契氣

下即消神良

又云治風痿及鼠痿方

赤小豆白飯黃耆牡蠣

丸四味等分酒服方寸匕日三

今素小品方加黃耆治諸痿

葛氏方治鼠痿方

取槲白皮カシハクキ濃煮取二升服一升當吐鼠子

又方鴉車前オホコ草ハ薄之

又方巴豆ヒナ去心皮ナカ以和艾アモキ作炷灸瘡上

又方取小鼠子ハキ剥去皮アフリ令煖鴉末オホコ以臍月猪

膏和傅之

又云若已有口膿血出者チ以契牛矢ウツキ塗之ク日三

范汪方治頸鼠痿方

貝母二分 干薑一分 桂心一分 蜀椒一分

吳茱萸一分 高カセモノ本一分

凡六物治下節先食以酒服一撮良

錄驗方治鼠瘻及癰卅年為頭瘻方為頭一兩黃蘗二兩
凡二物治下節酒服一升日八夜四起令藥熱相繼初得癰即服良

劉涓子方治鼠瘻方

又方死蛻蝦燒作屑苦酒和塗之

經心方治鼠瘻方

燒地黃葉枯上得差

又云鼠子瘻結核未破者用大針之无不差

治蜈蚣瘻方第十九

病源論云蜈蚣瘻者食菓芥子不避有虫即便取

食之有毒不去變化所生也在於頸上狀如鴨形隱瘻

而出其根在大腸

集驗方治蜈蚣瘻方

取蜈蚣脰二七枚酒和傳上

千金方有蜈蚣瘻方

柵菜灰先以泔漬煮柵菜取汁洗拭干內灰

創中

劉涓子方治蜈蚣瘻始發於頸狀如腫此得之時食菓子

菘實毒不去核

龍骨半分 桂心一分 干薑一分 桔梗一分

樊石一分 附子二兩 獨活一分 芎藭半分

蜀椒一百枚

右九物搗下篩別取干棗廿枚去核合搗之取

酢漿和之便得丸日服五丸如大豆湯漿服之

治蜂瘻方第卅

病源論云蜂瘻者食飲勞倦渴之多飲流水即得

蜂毒之不去變化所生也茲在頸癭三四處俱腫以

潰生劇狀如癰形老而後移其根在脾

劉涓子方治蜂瘻始茲於頸癭瘰三四處俱腫連

以潰移此得之多飲流水有蜂餘毒不去

中百蜂房一具 螫甲一分 迴香子一分 茱萸一分

淋二百枚 干薑一分

右六物搗下作散傅創孔口上日十度

千金方有蜂瘻方

人矢馳脫天獵月猪膏和付孔中

又方蜂窠天臘月猪膏和付孔中

葛氏方云若著鼻內外木豆瘤膿血出者是蜂瘻取

醫心方卷十五

廿

Kitasato Memorial Medical Library

軌軌或本草和名
軌軌字未詳
亦加比尤古

軌軌蜂房火炙焦末温酒服方寸匕日一

治軌軌瘰方第廿一

軌軌古胡文論語云軌
軌軌也非日軌
軌軌力復及
軌軌苦軌
軌軌公復及軌軌王依

病源論云軌軌瘰者曰寒腹中臌脹所得寒毒不去

變化所生也始發之時在其頸項使人狀若傷寒有

以疥癬婁之孔出其根在肺口工日十藥

劉涓子方治軌軌瘰始發於頸初得如傷寒此日食

中有軌軌毒不去

桃白皮一分 白朮四分 知母一分 雌黃一分 干地黄分

桃白皮一分 白朮四分 知母一分 雌黃一分 干地黄分

本草拾遺曰
青黛味鹹寒
無毒云從波斯
國來亦太原
作

青黛一分 斑蝥一分

白芷一分 栝脂一分 夕藥一分 海基一分 當歸分

石十五物合搗作散下篩服一匙上日三病在裏

空腹服在外先食後服之又方无斑苗木

治躄躄瘰方第廿二

病源論云躄躄瘰者恐懼愁憂思慮哭泣不止餘毒

變化所生也始發之時在其頸項無頭尾如棗核或

移動皮中使人寒熱心滿其根在心

劉涓子方云治躄躄瘰始發頸无頭尾如棗核潰之

醫心方卷十

在人皮中使人寒熱心滿此因喜怒失泣

空青二分 當歸二分 細辛一兩 干薑一分 一方用皮

芍藥根一分 斑苗一分 去 地膽一分 干為脂如大豆

地膽
本草曰狀如大馬蟻
有小翼字偽者即
舞苗所化狀如大豆

右八物合治下節作散服方寸七日三以酢漿下

散病在上倒輪卧在下高枕使藥流下

治浮沮瘻方第廿三 病源論云浮疽瘻者日晝結馳思往反變化所生始發

之時在於頸頂亦掖下如兩指无頭尾使人寒熱欲坐

其根在膽

劉涓子方治浮沮瘻始發於頸如兩指使人寒熱欲卧

得之目思慮憂滿其根在膽地脈主之甘草為佐方

石流黃一分 干薑一分 龍膽草二分 細辛二分

地膽一分 去 石决明一分 去 續斷一分 大黃半分

陰蘆根一分

右九物下節傳瘡上日四五

治瘰癧瘻方第廿四

病源論云瘰癧瘻者因強力入水坐湿地或新沐浴入

頭中流在頸上之所生也始發之時在其頸項恒有

膿使人寒熱其根在腎
劉涓子方治瘰癧瘻始發於頸有根令人寒熱此得之
新沐汁入頭中下流於頸

伏苓一兩 續斷一分 煨石二分 干地黄一分

空青一分 礬石一分 練干薑一分 桔梗一分

蜀椒一分 恒山皮一分 斑苗一分 烏朮一分 葵

附子一合 干薑一分 于狸宗一分

右十五物 搗合下篩以白蜜和酒服如大豆十九

醫心方卷之六 醫心方卷之六

懼
徒角又
聲
腸中水之

治轉脈痿方第十五

病源論云轉脈痿者因飲酒大醉夜卧不安驚悸故臨

轉側共枕之所生也始發之時在頸項濯之脈轉身始振

使人寒熱其根在小腸

劉涓子方治轉脈痿始發於頸濯之脈轉身始振寒

契此得之驚臥共枕

茯苓二分 人參二分 當歸二兩 升麻一分

麥門冬一兩 去心 大黃二分 鍾乳二分 桂心二兩

甘草半分 防風一分 白朮一分 地膽一分

續新一分 麝香一分末 礬石半分生 用之

右十五物合搗下篩麝香末 篩合更搗令調白

蜜和如大豆温酒服十九日三勿食生菜生魚

胆如大豆温酒服十九日三勿食生菜生魚肥

完忌房內滿百日令得都老

治蛻頭瘻方第廿六

病源論云蛻頭瘻者由飲食居處有蛻頭之毒氣入

於藏府流於經脈所生也初所生之時其狀如鼠

乳直下腫如覆手而癢搔之疼痺至百日有七八

孔入三寸中生蛻頭成尾乃有百數蛻頭自覆判人大如盃升至三

年斂人

千金方治蛻頭瘻方

牛矢灰和臘月猪膏付之

十又方集牛夫塗之

治蛻刺瘻方第廿七

病源論云蛻刺瘻者由居處飲食有蛻刺之氣或因飲

食入腹內流於經脈所生其根在大腸其狀腫核潰

漏之

集驗方蝨刺瘻方

取蜈蚣胎六十枚酒和傳瘡上六十其

劉涓子方治蝨刺瘻方

鴨膏和胡椒傳瘡已靈上

千金方有蝨刺瘻方

蝨刺矢鷄矢末之以二月牡脂下領髓和付

治蟻瘻方第廿八

病源論云蟻瘻者由飲食有蟻精氣毒入於五藏流

出注脈多者頸項戴阻創小腫核細而乃遍身身

集驗方蟻瘻方

半复一果搗作屑以鴨膏和傳瘡上

千金方蟻瘻方

蝨皮肝心灰末酒服一錢上

天方雄鷄灰未付之

天方鼠灰付之

葛氏方若瘡多而孔少者孔クナキ是蟻瘻

燒燒陵鯉鯁甲猪膏和傳佳

治鷄瘻方第廿九

本草曰取似龜形短小又似狸更有四足能陸能水

病源論云蝮瘻者飲食居處有蝮之毒氣入於藏
流於經脈或生掖下或生頸邊腫起如蝮虫之形
寒熱而潰成瘻久則創裏生細蝮

千金方有蝮瘻五孔六孔皆相通方

搗茅根汁著內孔中

治蝦蟆瘻方第卅一

病源論云蝦蟆瘻者飲食有蝦蟆之毒氣入於藏
流於經脈結腫寒熱因潰成瘻服藥有物隨小便
出如蝦蟆之狀

千金方有蝦蟆瘻方

五月五日馳脰及野猪脂付水衣付三佳

治蛙瘻方第卅二

病源論云蛙瘻者飲食居處有蛙之毒氣入於藏
流於經脈而成瘻因服藥隨小便出物狀如蛙形

千金方有蛙瘻方

馳腹中蛙灰付之

治蛇瘻方第卅三

病源論云蛇瘻者居處飲食有蛇毒氣入於藏流

於脉寒熱結腫者，亂无定，因潰成瘻，服藥有物隨小便出如蛇形。

千金方有蛇瘻方。

十八 蛇脫灰臘月猪脂和付之。

余雅云王... 似體者... 在穴中有毒

治螻蛄瘻方第廿三

今河北人呼為扶場

病源論云：螻蛄瘻者，由居亂食飲有螻蛄之毒氣。

入於藏流於經脉，所生初得之時，如粟核許，或滿百日。

或滿周年，走不一亂，或孔膿汁潰漏。

千金方有螻蛄瘻方。

本草拾遺云：螻蛄有毒，云云，似珠，珠亦去毒。

鳩依根付至老填口味。

治雀瘻方第廿四

病源論云：雀瘻者，居亂飲食有雀之毒氣，入於藏。

流脉，致无定亂，因潰成瘻，服藥有物隨小便出，如雀齧。

千金方有雀瘻方。

母猪矢灰和臘月猪膏付，虫出如雀。

治石瘻方第廿五

病源論云：石瘻之初，狀起兩頭如梅李核，斬實案。

之強如石而寒熱然レ後潰成瘻

千金方有石瘻從兩頭出者其狀堅實令人寒熱方

以丈馱針破之鼠粘草二分末和鷄子一枚付之

又方搗槐子和并華水付之

治風瘻方第卅六

病源論云風瘻者由風邪在經脈之結聚所成也

心方治風瘻鼠瘻方

乘白皮七八斤細剉水二斗煮取汁一斗更煎汁

取二升半頓服下レ虫是

本草拾遺
并
華水味甘平無
毒

又方燒地黃葉拓上得レ卷

又方杏仁一升レ熟搗和生猪脂傅上

千金方風瘻及鼠瘻方

赤豆白飯黃耆牡蠣

四味等分酒服方寸七日三

治內瘻方第卅七

病源論云內瘻者人有發創色黑有結內有膿久乃

潰出侵食筋骨謂之內瘻

龍門方治內瘻方
取槐白皮十兩搗丸綿裹內下部驗

天方藥楸葉作藥稠堪丸以竹筒內下部射

文選云洪州
專車注日洪州似
蛤大者置丈獨
丸車故云專車

痔瘻老老

雙冬及瘻汁也

治膿瘻方第卅八

唐韻平談及蚌屬狀如蛤
圓而厚外有理縱橫即射
射也

病源論云諸瘻皆有膿汁此獨膿為名者是諸創
久不^レ老成瘻而重^{カセテ}為^レ契氣^ニ所^レ乘^ル毒氣^ヲ停^ト積^リ生^レ膿

常不^レ絕故謂之膿瘻

千金方有膿瘻方

桃花末和猪脂付之

天方塩麴和燒灰付之

龍門方瘻膿出方

石流黃末置瘡孔中以艾冬三^ト駮^ト

本草瘻膿出方

楊盧木水煮葉汁洗之^ニ老

治冷瘻方第卅九

病源論云冷瘻者亦是諸創得風冷久不^レ老因成

瘻膿汁不^レ絕故為冷瘻

千金方凡一切冷瘻方

燒入吐出^ト蚶^ト虫^ト灰^ト先^ト甘草湯洗瘻後著灰^ト無

玉篇云蛭
同字

醫心方卷十六

宋韻云蛇人腹中長蟲
養生抄之食野饋
昂勿飲水生蛔虫

不老者慎口味

醫心方卷第十六

商煎論之金部音切要論陽壽因公之不美因煎
 治令藥方集卷之
 本草註釋卷之
 醫心方卷第十六
 醫心方卷第十六

醫心方卷第十六札記

二頁上 反手 病源反 九火針 病源火 下一 迴釘 病源

無迴 八頭葩 延慶本頭 薄色 病源作 三頁上 失

累 千金共 八若早 千金作 下一 多瘡 千金作 二

注 不異 延慶本此下 四凡 亂 千金作 瓦礫 柴甌玉篇

甌也 爾疋 甌甌 謂之甌 郭注 甌甌 也 江 四頁下 大

忌 千金大下 六 跡出 千金作 七 鑱丁 千金作 側

內黑 千金作 八 行 有粟 延慶本 九 浮甌 千金作

三行 五頁上 牛物 千金作 牛 泡色 千金作 三行 三角

醫心方卷第十六

延慶本 行七 始末唯瘡 千金作始 行九 胡葵 千金作 四下

行中 往 往 往 六頁上 癰疽方 延慶本 癰上 行九 鐵楮 箸

之 七頁上 白澶石 種 種 行九 丁療 療 忍 瘡 案 新 修 本

但云破丁腫無治丁 九頁上 碇石 碇石未詳 壹 十頁

行 疾 急 痛 變 痛 急 疼 十一頁 療 疔 瘰 癧 瘰 癧 之 俗 火 礫

礫 訛 行六 蕪 改 延慶本 九行 傍 記 天 非 友 夫 訛 天 夫

行 二 摩 將 將 訛 十三頁 政 頭 正 頭 作 色 赤 以 下 十

此 大 病 源 與 行八 取 刺 刺 訛 十四頁 七 昧 昧 訛 十五

傍 記 戶 監 友 戶 怨 行四 茵 芋 延慶本 十六頁 下 貫 珠

皂 皂 怨 十七頁 瘰 瘰 千金廿二載 十八頁 小 蒜 蒜

蘇 蘇 一頁 下 寵 寢 延慶本 作 寵 寢 病 行二 出 見 病 源 作

本 傳 行三 結 段 似 作 疑 行七 氣 容 容 訛 行下 二 陽 日 慶

上 三 頁 針 筋 延慶本 行下 八 一 方 分 等 延慶本 作 一 方

下 分 五 行 注 灸 末 延慶本 行下 一 脛 下 无 脛 也 病 源

無 脈 行三 里 土 黑 病 源 同 行八 癰 下 外 臺 引 小 七

頁 上 復 痛 病 源 痛 行下 六 故 也 如 故 也 下 五 頁 壘 下

病 源 作 行八 支 口 上 脛 病 源 作 發 見 定 病 源 作 九

累 行 八 支 口 上 脛 病 源 作 發 見 定 病 源 作 九

頁下練石薄案練石未詳是爛石草陶注馬先高曰

八行急呼為標千金治蜂蟻有解案灰先以甘莫練石

取汁洗拭千金治創中方所云練石薄即是一曰練石

蓋陵為葛氏方治鼠瘻有獨車前草莊子至樂云生於陵屯則

石薄即夏姑世頁下有治惡核方在記七梓子千金

作餅世一頁灰酢和付之燒作灰末之內乳中

世三頁女婦草外臺引千金同方後云劉涓子古今錄驗

不可世四頁虫虵虫蛆作世五頁下四起起怨

世六頁劉涓子方外臺引集驗有淫子一分共十

頁上海臺外臺作海藻注一云海行九劉涓子方外臺

驗有白朮礬石各一分共十味下注三去翹翹行五

倒輸外臺作行八欲坐病源作吐上世九頁地核外臺

同金陰蘆根外臺引集驗行八汁入病源作下二

劉涓子方外臺引集驗有雌黃芍藥虎指各一干薑

一分四字蓋行三汁入外臺汁世頁上濯病源作

行五劉涓子方外臺引集驗有班苗白芷各一分共

始振外臺始世一頁戩病源作戩上世三頁蛇脰

千金作付水衣付千金作同世四頁搗依千金作

蛇頭行九新寶病源新行下一然後病源然

行九新寶病源新行下一然後病源然

九頁上 石寄 外臺卷十七首篇引素女經有頤項

則石之為 疆石彌明矣

下廿八頁 練石 薄 載練石草味苦寒無毒主五癰破

石淋 膀胱中結氣利水道小便陶注云一

名爛石草又云即馬高拈此則前說可

一令 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十

二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十

三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十

四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十

五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十

六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十

七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十

八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十

九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

一百一 一百二 一百三 一百四 一百五 一百六 一百七 一百八 一百九 二百

二百一 二百二 二百三 二百四 二百五 二百六 二百七 二百八 二百九 三百

三百一 三百二 三百三 三百四 三百五 三百六 三百七 三百八 三百九 四百

四百一 四百二 四百三 四百四 四百五 四百六 四百七 四百八 四百九 五百

五百一 五百二 五百三 五百四 五百五 五百六 五百七 五百八 五百九 六百

六百一 六百二 六百三 六百四 六百五 六百六 六百七 六百八 六百九 七百

七百一 七百二 七百三 七百四 七百五 七百六 七百七 七百八 七百九 八百

八百一 八百二 八百三 八百四 八百五 八百六 八百七 八百八 八百九 九百

