

醫心方卷第六

✕
i 109-1

490.9
Is-3
6

No. 2252
12 | 109-1



富士川文庫

1405

普心方卷第六

普心方卷第六

普心方第一

治肺病方第一

普心方第二

治腹痛方第二

普心方第三

治心腹脹滿方第三

普心方第四

治心腹脹滿方第四

普心方第五

治心腹脹滿方第五

普心方第六

治心腹脹滿方第六

普心方第七

治心腹脹滿方第七



醫心方卷第六

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

胃痛方第一

治脇痛方第二

治心痛方第三

治腹痛方第四

治心腹痛方第五

治心腹脹滿方第六

治卒腰痛方第七

治緊腰痛方第八

治腎著腰痛方第九

治肝病方第十

治心病方第十一

治脾病方第十二

治肺病方第十三

治腎病方第十四

醫心方卷第六

大腸病方第十五

治小腸病方第十六

膽病方第十七

治胃病方第十八

膀胱病方第十九

治三焦病方第二

治氣病方第二十

治脈病方第二十二

治筋病方第二十三

治骨病方第二十四

治癩病方第二十五

治皮病方第二十六

治完病方第二十七

治胃痛方第二十八

病源論云胃腸痛者由膽都致及与肝及腎時思及之支脈虛為

寒氣所乘故也此三經之支脈並備行胃腸耶氣乘

於胃腸故傷其經脈耶氣之与正氣交擊故令胃

腸相引而急痛也

葛氏方治胃痺之病令人心符部及腹内結病也中緊痞急痛肌中苦

痺絞急如刺不得倪作其胃前皆痛手不得犯胃

滿短氣咬唾引痛煩悶白汗出或徹引背脊不知治

之數日教人方

橘皮一升 枳實四枚 生薑半斤 水四升煮取二升分

為弄服 今素小品方枳實 三兩水五升

又方若已老復更衰者 取葶根五斤ヲノネ搗キ絞取汁飲之
五愈

千金方云胃痺之病令人心中心中堅痞急痛肌中苦痺急
急如刺不得視仰其胃中痛盈滿自如滿咽塞習ノムト痺カニシ喉中

乾燥時欲嘔吐胃及背引痛手不得犯胃滿短氣
咳唾引痛煩悶白汗出或徹背引痛忽不知治致人方

枳實四枚 厚朴三兩 蘆白一斤 桔樓子一枚

桂心一兩 五味水七升煮取二升半分再服

錄驗方治胸痛達背不得卧方

大桔樓實一枚馮 蘆白三斤切 半夏半升洗 生薑六兩

切 凡四物切以清白漿一斗煮取四升一服一升

極要方療胃滿氣築心腹中令方

半夏一升洗 桂心八兩 生薑一斤洗

右以水七升煮取二升七分合日三服

醫門方療冷氣胃中妨滿或痛方

半夏四兩 生薑五兩 厚朴四兩 枳實六升煮取二升

去滓分温二服相去八九里頓服二三劑

治脇痛方第二

病源論云耶氣容於足少陽之絡令人脇痛

葛氏方治脇卒痛如得打方以繩橫度兩乳中間屈

繩從乳橫度以起痛脇下灸一繩下屈度卅壯

小品方治脇下偏痛發熱其脈弦此寒也當以溫藥

下其寒大黃附子湯方大黃三兩附子二枚細辛兩

凡三物以水三升煮取二升分二服

千金方治冷氣脇下注來膈痛引脇背當歸湯方

當歸二兩 吳茱萸二兩 伏苓一兩 桂心二兩

干薑三兩 枳實一兩 人参二兩 芍藥二兩

大黃二兩 甘草二兩

十味以水八升煮取二升半一服八合日三服凡注

心佳今素極要方有干地黄無干薑夕藥又之治兩脇下痛方

熱湯漬兩足冷則易

治心痛方第三

病源論云心痛者風冷耶氣乘於心也其病發有

死者有不死成痲者心為諸藏主而藏神其心經不

可傷之而痛為真心痛朝發夕死夕發朝死心

有支別之絡脈其為風冷所乘不傷於心經者亦令

心痛則乍アハハ間ヒヤリ下シ甚故ナセモ成痲不死

葛氏方治卒心痛方

當力ト以自坐若男子病者令婦人ト以一坏水与飲

之若婦人病者令男子ト以一坏水与飲之得新液并

承尤佳カラハヒカタ又方吴茱萸五合 桂一兩 酒二升

煮取一升分二服又方吴茱萸二升 生薑四兩

豉一升酒六升煮取二升半分三服 又方切生薑

若干薑半切升以水二升煮得一升去滓頓服之

又方取竈中契アハヒ灰フヒ去アク炭ノ燔ノ慰ノ心上ヒ冷復易カク

録鈴方治卒心痛方 並大豆若煮之以囊盛更燔以

熨心上冷復易之已熨之豆不可令畜生火等食之即

死 又之治人心痛於報又懊於縁及黄困又懣音竹惛トキハ築トキハ引トキハ雨乳トキハ立トキハ或如

刺困極桂湯方 桂心半兩 茱萸二升 名藥三兩

當歸二兩 生薑半斤 凡五物切以水一斗二升煮取四

升服一升日三夜一有驗无生薑用干薑五方代

備急方治心痛方極ミハナシ醜ミハナシ作塩湯飲三升吐則即老

耆婆方卒心痛欲死方

吴茱萸三兩 夕藥三兩 桂心三兩

吳茱萸右以淳酒大一升生煮之令有半升在瓶服

僧深方治卒心痛方當歸二兩夕藥一兩桂心一兩

人參一兩支子廿一枚五物吹咀以水七升煮取二升半

眼五服又治卅年心痛附子丸方人參二兩桂心二兩

干薑二兩蜀附子二兩巴豆二兩六二七二

陝田丸五物下蒨蜜丸如大豆先食服三九日一神良

新錄方治心痛方飲井花水二升又方以契湯漬手

足以老為度又方燒秤錘令赤投二升酒中分二服

又方水服米粉一匙集驗方治卒心痛方

桂心八兩以水四升煮取一升半分再服鑿真方治心痛

方大驗酢半升切葱白一莖和煎頓服立愈

范江方治卒心痛一物桂心散方桂心一兩為散溫酒

服方寸七日三不飲酒以米飲服之

又云備急丸方巴豆一分大黃二分干薑二分枳實異

治巴豆合丸如大豆有急取二三丸以水服之

如意方治卒心痛術書地作五字撮中央以水一升

攪飲之小品方解急蜀椒湯主寒痛心痛如刺繞

吞笑痛腹中盡痛白汗自出欲絕方蜀椒三百枚

醫心方卷六

一方二百枚 附子一枚 粳米半升 干薑半升 大棗廿枚

半夏十二枚 甘草一升 凡七物以水七升煮取三升

湯成契服一升不覺復服一升數用治心痛最良

千金方九痛九主九種心痛一虫心痛二淫心痛三風心

痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八契心痛

九生來心痛方悉主之并治冷腫上氣落馬墮車方

附子二升 巴豆人五生狼毒一兩 令極香秤 人參一兩

干薑一兩 食茱萸一升 六味蜜和空腹服如梧子三

九卒中惡腹痛口不言二日一服連年積冷流注心胃

者止服之好持息亦驗 又方桃白皮汁煮空腹服

之 又云凡暴心痛面無色欲死方以布裹衣塩如

彈丸燒令赤置酒中消服之 又云灸心痛方

心懊懣微痛煩逆 心痛如刀刺氣結 心痛如

心痛旬痺 心痛冷氣上 心痛暴絞急絕欲

死 心痛惡氣上脇急痛 心痛暴惡風 心痛刺脇滿

年法心痛緊煩氣結 心痛暴惡風 心痛刺脇滿

救急單驗方冷心痛方 吳茱萸一升桂心三兩

當歸

三兩搗末蜜丸如梧子酒服廿九日每漸加卅九以知

為度 又云細心痛方 取蚰音曲是演又蟻三糞燒令赤末之酒

服驗 又云一切心痛方 生油半合温服立愈

又方服當歸末方寸匕和酒服老 孟詵食經治心痛

方 酢九研青木香服之

治腹痛方第イタナ四

病源論云腹痛者由府藏虛冷熱之氣客於腸胃

募原之間莫故又結聚不散正氣与邪氣交爭相擊故痛

其有冷氣搏於陰經者則腹痛而腸鳴謂之寒中

葛氏方治卒腹痛方書舌上作風字。又方搗桂下

篩服三方寸匕苦參クマキ佳干薑亦佳 又方食塩一大

握多飲水送之當吐即差 又方堀土作小坎以水滿坎中

煎攪取汁飲之 又方令人騎其腹滿六リ下リカケヨ香中之

又方米粉一升水二升和飲之 如意方治卒腹痛術

書帛作兩蜈蚣相交吞之 今案葛氏方用之

醫門方治腹痛方 桂心三勺切以水一升八合煮得八

合去滓預服元桂心煮干薑三佳范汪方云當歸湯主寒

腹痛方 當歸ウツセ三勺桂心三勺甘草二兩干薑三兩

凡四物水八升煮得三升服一升日三又云當歸

九一治寒腹痛如刀刺方七品當歸二分七品芍藥三分七品黃

芩四分桂心一分凡四物治而和蜜九如梧子服九

先食日三セイヤク

千金方温脾湯治腹痛俾移反膈下繞結遠ホシノ膈不止方ヤ

當歸五两干薑五两附子三两甘草二两大黄五两

人参三两芒消三两七味以水七升煮取三升分三服日三

又云多腹痛方灸巨闕穴在鳩尾下一寸

又方灸承穴在膈上一寸又方灸中極穴在膈下四寸

治心腹痛方第五

病源論云心腹痛者由府藏虛弱風寒客於其間

故也耶氣發作与正氣相擊上衝於心則心痛下攻

於腹則痛上下相攻故心腹絞痛氣不得息葛氏

方云凡心腹痛若非中惡霍乱皆是宿結冷契所

為也治心腹俱脹痛短氣欲死或已絕方桂三两タケノ

切以水一升八合煮得八合去滓頓服无桂者干薑三佳

千金方治心腹卒絞痛如刺兩脇支滿煩悶不可堪忍

方高粱薑五两原朴二两多當歸三两桂心二两

四味切以水八升八合煮取一升八合分爲三服一服容

日二若一服痛止便停不須更服若人強者一服一升

爲再服日二 大レチモ 小品方治寒疝心腹痛方夫寒疝腹中

痛逆冷手足不仁若一身疼痛灸刺諸藥所不治者

桂支湯加烏頭湯主之 不覺痛瘥名之 桂肉三升生薑三升甘草

二兩夕藥三升大棗十二枚 烏頭五枚 附子一名九月採之 破之以蜜一升煎 取五合湯成肉之

凡五物以水七升煮取二升半內蜜煎分服五合日三

搯要方療心腹久寒卒發絞如鬼刺欲死湯方吳茱

萸二升 香豉三合生薑四升石以好酒五升煮取二

升分服之下唯杯未去口病便心令咽水 又云療在

心腹痛不可忍方 右取桃東引枝削去蒼皮取白

皮一握以水二升煮取半升服之 醫門方療卒

心腹痛方 厚朴二兩桂心二升以水三升煮取一

升服之若卒痛如刺者但煮桂汁飲之佳 僧深方治

惡氣心腹欲死方 夕藥一升甘草二升桂心一兩

當歸二升 凡四物水五升煮取二升分再服

耆婆方治人心腹絞痛不心方 生薑十兩桂心三升

甘草三升人參二升 四味切以水一斗煮取二升分服

治心腹脹滿方第六

病源論云心腹脹者脾虛而邪氣客之乘於心脾故也

葛氏方治卒苦心腹煩滿一又胃力背痛欲死方

以契湯令的ハタカカラ尔ヒタヒ漬手足冷復易秘方又方灸乳下一寸

七呔 又方搗香葉汁服一二升

又方判ハク薏苡根イヌアラスキ煮取汁服三升 桂要方備急丸療

忽然心腹脹滿急痛氣絕大小便不通方 大黃五兩

干薑二兩 巴豆三兩 去心去心焚芒消三兩

右蜜丸平曉飲服四九不利七ハセ更加一二九取得四五

度利モシ如不心取醋トナラ飲心之新録方治心腹煩滿方

桃人去皮搗如泥契酒服如棗二枚日三 又云煩滿吐

逆方小キル生薑一斤 合皮切搗取汁温服之 又方生薑搗

取汁服一合二合 醫門方云凡患ハシラシ脹滿煩以利

藥下之心腹中痛妨害也不去氣又築心者緣胃中虛氣

上衝心故也 人參三兩 甘草三兩 橘皮職名及心動也二兩 棗

顆水七升煮取二升半去滓去温三服若心松加伏苓二兩

又云腹脹滿不能服藥導之方 取獨頭蒜ヒトガシ燒令熟

去皮及契以薄綿裹イヨシ內下七ハ部佳冷易之 又方暖生薑

削綿裹內下部中冷易之佳 耆婆方治人腹脹痛方
 厚朴三兩 高粱薑クノハシカニ三五 切以水三升煮分取一升半少
 契飲之乃止 僧深方云厚朴湯治腹滿數十日脈浮
 穀食飲如故方 厚朴半斤 枳實カラクチク五枚 大黃四兩
 凡三物以水一斗二升煮取五升內大黃一微火煎令
 得三升先食服一升日三
 本草云可梨勒水摩ルチ或散水服之 蕪敬本草注
 云檳榔子搗末服之 孟詵食經云薤可作宿道ニヤキ
 空腹食之

治率腰痛方第七

病源論云腎主腰腎經虛損風冷乘之故腰痛也
 又耶客於足大陰之絡令人腰痛引小腹ホソコ不可以作息フキヤルム
 凡腰痛有五一日少陰二腎也十月万物陽氣皆傷ヤブル
 是以腰痛二日風痺風寒著腰是以腰痛三日腎虛トキニ
 俟用傷腎是以腰痛四日聚腰墮墜傷腰是以腰
 痛五日寢卧濕地是以腰痛 養生方云飲食勿
 即卧之作氣病令腰痛疼 又云寒多則腎轉
 腰痛 千金方杜仲酒治五種腰痛方桑寄生杜

仲庶カノホカノ茸桂心セナカヒ四味セナカヒ分等末服方寸匕日三

又方治腰脊疼不隨方庶セナカヒ角去上皮取白者

葵黃末酒服方寸匕日三特禁生食餘不禁新者

良陳者不服角中黃ナル蒙亦不中服アカラカス大大神良ナリ今今華葛代方

唐茸 尤佳

錄驗方治腰脚疼不可忍不能立胡麻散方取胡

麻イリ葵令香於臼內搗碎即以紗羅篩之フルス數之フルス篩之

若不數セ篩即脂出不可篩合皮日一服每服小升服

盡藥斗三升ツルニ末無腰脚之疼此藥辟穀不飢多

服即減食任以酒及飲蜜湯羹汁亦並得服且无禁

小品方之灸腰痛法 令病人正ツタテ踏ツタテ立ツタテ以竹杖ツイ注地

度至音以度注地背正灸脊骨上隨年壯灸竟藏カシヒ

竹勿令人得之灸丈夫痔下面及脱肛不入及息

下長泄利婦人女子月崩去血アルトキハ乍アルトキハ發及滯下

淋瀝長去赤白雜汁皆灸此 又使兩傍各一寸復

灸之為橫三穴間一寸也 又灸腰目小耶在尻上左

右陷クホリ處是也 葛氏方治率腰痛不得俛アフラク作方

正倚於義及立竹以度其人足下至音斷竹又以度之背

後當脊中灸竹上頭處退年壯畢歲竹勿令人
 得之 又方去窮脊上一寸灸七壯其左右各一
 寸灸七壯 范汪方治腰卒痛物急不得喘息若
 醉飽得之欲死大豆紫湯方 大豆一斗佳子五七熬令
 好酒二斗二物合煮令熟沸隨人多少服令醉
 醫門方療卒腰痛不得轉側方 鹿角一枚長五六
 寸截之燒鹿角令赤內酒中浸之須臾又燉還內酒
 中如此數度破碎便即浸之一宿平晨空腹飲令醉也愈
 治腰方第八

病源論云緊腰者謂卒然損傷於腰而致病也此由
 損血搏於腰脊所為久不已令人氣息少而元氣
 損腎之故也 葛氏方云概腰者是及腰忽動轉
 而梳之治概腰痛欲死方 生葛根削之カスノム嚼其汁
 多ク蓋佳 又方生地黃搗絞取三升剪得二升白蜜
 一升日三服不差更作 又云治及腰有血痛方 搗
 桂下篩三升許以苦酒和以陸痛上ヒレ干復塗 又方
 炙足躡白實際三壯 范汪方治概腰方 寄生來
 上者鹿茸桂心牡丹分等為散服方寸匕日三又方灸

足跟白肉際三九 又方冬腰目十九

治腎著膏痛方第九

病源論云腎經虛則受風冷內有積水風相搏漬

於腎之氣內著不能宣通故膏痛其病之狀身

體冷腰腹重如帶五千錢狀如坐於水形狀如水不渴

小便自利食如故久變為水病

千金方云腎著之為病其人身躄重膏中冷所以如

水洗火又不渴小便自利食飲如故是其證也

作勞汗出衣裏冷濕久之故得也腰以下冷痛腹重如

帶五千錢腎著湯主之 甘草一兩 干薑二兩 伏苓

四芍朮四芍 四味水五升煮取三升分三服膏中即

温今案集驗方无本 僧深方伏苓湯治腎著之為病從

腰以下冷痛而重如五千錢腹腫方

飴膠八兩 白朮四芍 伏苓四芍 干薑二芍 甘草二芍

凡五物以水一斗煮取三升去滓內飴令泔分四服

治肝病方第十

病源論云肝氣盛為五有餘則病目赤兩脇下痛

引小腹善怒氣逆則頭眩耳聾不聽頰腫是為

肝之實也則寫之肝氣不足則病目不明兩脇物急

筋牽不得大息凡甲梳面青善悲恐如人將捕之是

為肝氣之虛也則宜補之 千金方治肝虛寒脇下

痛脹滿氣急眼昏濁視不明檳榔湯方

母薑七兩附子七兩檳榔廿口伏苓トホホト三兩桔梗四兩

檮皮三兩白朮四兩吳茱萸五合桂心三兩九味

以水九升煮取三升去滓分三服 又主治肝實契目

痛胃滿息塞フセカレトヤル寫肝前胡湯方 前胡三兩秦皮

三兩ミラノネクセ細辛三兩 支子人三兩 黃芩三兩蜀升麻三兩

薤拔三兩碎 決明子三兩トモクセ 苦竹葉一升切 車前子オホク切一升

芒消三兩 十一味以水九升煮取三升去滓下世消三

服 錄驗方補肝湯治肝氣不足脇下滿筋急不得

大息凡厥逆凡槍心脚中痛兩目不明面青方半黃一兩

烏頭オウトウ四兩栝子ヒノク四兩 大棗オホク廿枚龍膽四兩 凡五物切以

水五升煮取一升去滓一服令盡

僧深方寫肝湯治肝氣實目赤モシハ若黃脇下急小便

難方 人參三兩生薑五兩 黃芩二兩半ホソク夏一升洗

甘草二兩 大棗十四枚 凡六物切水五升煮半夏令三

四沸内藥後内薑イロ炙取二升去滓分二服ハシ羸人ハシタリ三服

治心病方第十一

病源論云心氣盛為邪有餘則病ハシ胃内痛脇支滿

膺背ハシ膵解間痛兩臂内痛善コム嘔不休ハシ是為心氣之

實也則宜ハシ寫之心氣不足則胃腹相引痛驚悸ハシ恍惚

惚少ハシ顏色古本強善憂悲是為心氣之虛也則宜補之

千金方治心虛寒心中滿脹悲憂或夢山坂平澤半

夏補心湯方 半夏六兩ホソク洗宿薑三兩 伏苓三兩

白朮四兩 防風二兩 桂心三兩 遠志二兩 檮枝三兩

九味切以水一斗煮取三升分三服

錄鈐方治心上虛契胃中时痛口生瘡四大羸ハシ少

氣方 苡苳四兩 升麻三兩 黄芩三兩 生地黃

八兩 芍藥四兩 地骨白皮五兩 枳實三兩 生

薑三兩 竹葉二兩

丸九物切以水八升煮取二升七分三服

耆婁方治人心中寒風見鬼来親合陰陽且便力乏

黃瘦不能食日轉羸方

龍膽三分 苦參三分 右二味為散以白米飲一服一錢

醫心方卷六

日二服忌猪完酒麴

治脾病方第十二

病源論云脾氣盛為形有餘則病腹脹使不利身

重口苦飢足喜食不收行善擊七六脚下痛是為脾氣之實也

則宜寫之脾氣不足則四支不用後泄食不化飪逆

腸鳴是為脾氣之虛也則宜補之

那繁方療脾虛寒勞損氣脹噫滿食不下通噫一叔及飽滿

食方 猪膏三升 宿薑汁五升 吳茱萸一升 白朮

一升 搗茱萸等二物為散內薑汁膏中更取六升燻酒

進方寸匕日再服 千金方治脾實契台本強直或

夢歌樂而體重不能行寫契湯方 苤胡七三升

伏苓三升 玄參八十七二升 大青八十七二升 龍膽三升 細辛三升

杏人四升 芒消三升 苦竹葉切一升 九味水九升

煮取三升分三服

搗要方療脾熱內熱瘡瘻渴多腫身重方生地黄

五兩搗之以水絞取汁漬梅蜜和服之

又方取芥菜汁一升一服 又方麥門冬子汁服之

廣洛方主脾胃中契渴欲得飲冷水不下食方

伏苓四兩 甘草二兩 石膏五兩 地骨白皮三兩

第根切一升 切水八升 煮取二升 五合 絞去滓

分温三服 忌 契 麩 契 肉 海藻 猪 蒜

僧深方 温脾湯 治脾氣不足 羸弱 下利 上入下出方

干薑三兩 人参二兩 附子二兩 甘草三兩 大黃

三兩 凡五物 以水八升 煮取二升 半分 三服 應

得下去 毒實甚良

治肺病方第十三

病源論云 肺氣盛為氣有餘 則病喘 效上氣 轉背痛

汗出 尻陰 股 膝 踠 胫 足 皆痛 是為肺氣之實也 則宜

寫之 肺氣不足 則少氣 不能報息 耳聾 嗌乾 是為

肺氣之虛也 則宜補之

千金方 治肺虛寒 之 小腸 物 急 腰痛 羸 瘠 百病 大建

中湯方 大棗 十枚 干薑 三兩 芍藥 兩 甘草 三兩

桂心 三兩 五味 承 八升 煮取 三升 去滓 內 枳 八兩 煮 三

沸 分 三服

又之 治肺實 則 胃 滯 作 息 泄 氣 除 契 方

枸杞根皮 二升 白前 三兩 石膏 八兩 杏仁 三兩 橘皮 五兩

白朮五兩 赤蜜七合 六味水七升 煮取二升 去滓下蜜

煎兩三沸分三服

治腎病方第十四

病源論云腎氣盛為志有餘則病腹脹食泄體腫

喘效汗出面自黑小便黃是為腎氣實也則宜寫之

腎氣不足則厥腰脊冷胃內痛耳鳴苦龍耳是為腎

氣之虛也則宜補之 千金方治腎虛寒陰萎脊

腰痛身重緩弱言音混濁陽氣頓絕方

生地黃五斤 縱容八兩 白朮八兩 巴戟天八兩 麥門

冬八兩 伏苓八兩 甘草八兩 牛膝八兩 五味子八兩

車前子五兩 杜仲八兩 干薑五兩 十二味為散

食後酒服方寸匕日三

又云治腎實契脹滿四支正黑耳聾夢腰脊離解夢

伏水等氣急寫腎湯方 大黃二兩 漬碎如雀頭大

生地黃五兩 甘草二兩 伏苓三兩 葱白八兩 昌補五

兩 黃芩三兩 玄菘四兩 細辛二兩 芒消三兩

十味以水九升煮八味取二升五合去滓別漬大黃

內藥中更煮取二升三合去大黃滓下地黃汁

大煎一兩沸下芒消分三服

耆婆方治腎氣虛則夢使人見舟船溺人冬時夢見

伏水中及在水行若有恐畏惡人見腎氣盛則夢見

腰脊兩解不屬不連失迷名厥故是寒氣客於小腹則夢聚邑街衢

方秦膠唐石斛唐澤馬防風人參各一分伏苓黃苓

干地黄唐遠志各八分

十味切搗篩為散以酒服方寸匕日二

治大腸病方第十五

病源論云大腸氣盛則為有餘則病腸內切痛如錐

刀刺無休息血胛背寒痺力專及是為大腸之氣實也

則宜寫之縮也大腸氣不足則寒氣客之善世

是為大腸氣之虛也則宜補之

千金方治大腸虛寒利下青白ハシ腸虛鳴相逐黃連補

湯方黃連四兩伏苓三兩シムナカ芍藥三兩シキ酸石榴皮

五具正レル地榆五兩カサ伏龍肝カサ鷄子一枚大六味切水七升カキ煮

取二升五合去滓下伏龍肝屑攪シカキ調分三服又治

大腸實契腸脹不通口生瘡生薑泄腸湯方

宿薑三兩ハシカ橘皮三兩大棗十四枚青竹茹三兩

生地黃十兩 桂心一兩 黃芩三兩 艾子人三兩 伏苓二兩 白朮三兩 芒消二兩 十一味切水七升 煮取三升 去滓下芒消分三服

治小腸病方第十六

病源論云小腸氣盛為有餘則病小腸契雄竭于 澀少腹脹是為小腸之氣實也則宜寫之小腸不 足則寒氣客之而腸病驚跳不言アルキハ 去是 為小腸氣之虛也則宜補之

千金方治小腸虛寒痛下赤白腸滑腹中懊憹アウタウ

補湯方 干薑三兩 當歸四兩 黃蘗四兩 地榆皮ニヒル子

四兩 黃連三兩 阿膠三兩 石柏皮三兩

七味水七升 煮取二升 五合 去滓下膠 煮烱トイニ分三服

又治小腸實契脹口瘡紫胡寫湯方

紫胡其ノセリ三兩 橘皮三兩 黃芩三兩 澤芎ナニ井三兩 枳實三

兩 旋伏花三兩 升麻三兩 生地黃切一升 芒消三兩

九味切以水斗一 煮取三升 去滓下芒消分三服

治膽病方第十七

病源論云膽氣盛為有餘則病腹內冒不安身軀干也空也 去迂難也

習シ是為膽氣之實也則宜寫之徒瀉及水瀉又動也此九ノラ合下膽氣不足其氣上

溢シ而口苦善太息カクイ臨宿汁心澹カクイ如人時補之物塞喉也益中

之穀シ是為膽氣之虛也則宜補之カクイ

千金方治膽府實契精神不守シ寫契シ半夏千卑水

湯方ホソクア半夏三兩カクイ酸棗カクイ五合カクイ黃芩一兩カクイ遠志二兩

伏苓二兩カクイ宿薑三兩カクイ生地カクイ黃五兩カクイ凡八物細切取長

流水五斗カクイ先煮秫米令蟹目沸揚之三千過澄清

取六升カクイ煮藥取二升カクイ半升三服

治胃病方第十八カクイ

病源論云胃氣盛為有餘則病腹臏脹氣滿是為

胃氣之實也則宜寫之胃氣不足則飢而不食穀

食泄臨送是為胃氣之虛也則宜補之

千金方治胃虛冷少氣口苦身ニカク體無津カクイ補胃湯方

防風二兩カクイ栝子人二兩カクイ吳茱萸三兩カクイ細辛兩カクイ甘草

兩桂心二兩カクイ橘皮二兩カクイ芎藭二兩カクイ人參三兩カクイ凡九味

切以水一斗カクイ煮取三升カクイ分三服カクイ又治胃實カクイ寫胃熱湯

方支子人カクイ三兩カクイ夕藥四兩カクイ白朮五兩カクイ伏苓二兩カクイ生地

黃汁一升カクイ夜干三兩カクイ升麻三兩カクイ赤蜜一升カクイ

八味切以水七升煮取一升五合去滓下地黄煮兩

沸ヒシ次下蜜音光取三升分三服老小以意

治膀胱病方第九

病源論云五穀五味之津液悉歸於膀胱氣化分入

血脉以成骨髓也而津液之餘者入肥肥補受及則為小便不通

小腹偏腫痛是為膀胱氣之實也則宜膀胱也寫之勝

脱氣不足則寒客之胞滑小便數而多也面黑是

膀胱氣之虛也則宜補之 千金方云旁光

病者少腹滿腫而痛以手按則欲小便而不得

又云治旁光腎冷飢不欲食面黑如炭方慈石六兩

黃耆ヤハラクセ三兩 枳ハシトリア中四兩 白石莫五兩 五味セカカラ四兩 伏苓三

兩 木五兩 七味水九升煮取三升分三服又云治旁光

實セル契方支子セネ人三兩 石膏八兩 伏苓三兩 淡竹葉

切一升 生地黃切一升 蜜一升 知母ヤトコロ三兩 七味水七

升煮取二升去滓下蜜煮兩沸分三服須臾加些消

三兩

治三焦病方第十

病源論云三焦盛為有餘則脹氣滿於皮膚內輕然

而不カクカラ窄或小便シラリ澀或大便難是為三焦之實也則宜寫之カクカラ三焦氣不足則寒氣客之病遺尿或泄利或胃滿或食不消是三焦之氣虛也宜補之

千金方之三焦病者脹氣滿小腹九堅不得小便カクカラ窘急也

急溢則為水トキハ面則為腹脹又治上焦虛寒短氣

語聲不出黃耆理中湯方 黃耆二兩桂心二兩

丹唐參四兩桔梗三兩乾薑三兩五味子三兩伏苓

三兩甘草三兩杏仁四兩芎藭三兩十味切以水

九升煮取三升分三服 又治上焦實熱腹滿

而不欲食或食先吐而後下肘後臂痛麥門冬

理中湯方 生ヤチルケ麥門冬一升 生薑四兩 甘草二兩人參

三兩 伏苓二兩 橘皮三兩 竹茹一升 生下シノネ蘆根切一升

葶心スナハ五合 麩米一升 白朮五兩 萎蕤三兩

十二味切水一斗五升煮取三升分三服

又治中焦實熱閉塞上下不通障絕開格不吐不

下腹薄庚及一多食又不得休息也膨薄庚及一多食又不得休息也急薄庚及一多食又不得休息也大黃寫熱開格通障絕九味湯方

蜀大黃三兩切水一升黃芩三兩澤馬三兩升麻三兩

零羊角四兩 支子人四兩 生地黃汁一升 生玄參八兩

芒消三兩 九味以水七升煮八物取二升三合下大黃更
煎數沸オカイ去黃滓キナルカ下芒消分三服

又治中焦虛寒洞泄下利或因霍亂後寫黃白無

度腹中虛痛黃連煎方 金色黃連四兩黃蘗三兩

當歸三兩 厚朴三兩乾薑三兩 酸石榴皮四兩 地榆チユ

四兩 阿膠四兩 八味以水九升煮七物取一升去滓下

阿膠更煎取烱分三服 又治下焦虛寒損或

便轉後見血此為近血或利下或不利好日勞冷而

發續新止血湯方 續新三兩 當歸三兩 干薑四兩

甘草一兩乾地黃四兩桂心三兩 六味切以水九升煮

八物取三升五合去滓下阿膠更烱取膠洋盡下補

黃分三服 又治下焦契大小便利不通紫胡世

通塞湯方

紫胡三兩 黃芩三兩 橘皮三兩 澤馬三兩

支子人四兩 石膏六兩 零羊角三兩 生地黄

切一升 香豉一升 葵 芒消三兩 十味以水一斗

煮九物取三升去滓下芒消分三服

治氣病方第廿一

千金方治氣極虛寒皮毛焦津液不通羸勞百病

氣損黃耆湯方 黃耆四兩 人參二兩 干棗十枚去核

生薑八分 白朮二兩 桂心二兩 六味切以水八升煮取三

升分四服 又主理氣丸治氣不足方 杏仁二兩 益

智子二兩 廉薑二兩 桂心一兩 四味丸如梧子未食服

三丸以知為度

治脈病方第廿二

千金方治脈虛驚跳不定躍也乍來乍去主小腸府寒補

調中防風丸方 防風十二分 桂心十二分 通草十二分

伏神十二分 遠志十二分 甘草十二分 人參十二分 麥門冬

十二分 白石莫十六分 九味檮蒯為散白蜜和丸如梧子

酒服十九日再加至亦為劑 又主治脈實滿主心契

病升麻湯方 蜀升麻三兩 艾子人三兩 生地黃切一升

子芩三兩 澤馬三兩 淡竹葉三兩 芒消二兩

七味以水九升煮取三升去滓下芒消分三服

治筋病方第廿三

刪繁方治筋虛實暴損絕極或因霍亂轉動腹

滿並轉痛或因服藥吐利過寒脚平虛轉腹轉痛

醫心方卷六

二二

一握也
席口者

人參湯方 人參二兩 厚朴二兩 葱白一席口 白朮四

兩 藜一把 長三寸 五物切以水五升煮取二升去滓分再服

又云治轉筋霍亂後因而筋轉方 取絮巾若綿矣 息擾又

煖以縛筋上 又云胞轉筋急方 白朮四兩 香豉

一升 葵子人二兩 榆白皮三兩 子芩三兩 通草二兩

伏苓二兩 七物切以水七升煮取三升去滓分三服

又云治轉筋陰囊殫縮入腹中絞痛後交接極

損所為方

取化子一頭 杖撞廿六下 放於中 逐之使喘極刺腸

下取五升以酒一升共和飲之若無酒單面只好勿令

冷澁也 又云治交接損縮殫縮方 燒婦人月經

衣服方寸匕 已上千金 方固之 又云治轉筋十指筋牽急不得

屈伸別法 灸手踝上七炷大良 又云治轉筋脛骨

痛不可忍方 灸脛下廉橫筋上三炷

又云轉筋方 灸湧泉 在脚心下當母

指大筋是灸七炷 又方灸大都 在足母指大

節內側白肉際七炷 又云腹脇轉筋方 灸脊上

一寸十四炷 又云治筋絕方 蟹脰足髓 灸內瘡中

醫心方卷六

二八

筋即續矣ガカル

千金方治筋實極手足爪甲或青或黃或黑或赤筋急

煩シラカ地黄煎方地黄汁三升シラカ生葛汁一升シラカ生玄參汁オシクシ升

大黃二兩シラカ艾子三兩シラカ升麻三兩シラカ石膏五兩シラカ夕藥四兩

麻黃三兩カシノク犀角三兩シラカ十味水七升シラカ煮七物取二升シラカ去滓下

地黃汁兩沸次下葛汁等煎取三升シラカ三服

治骨病方第卅四

那ナ繁方ナ凡骨虛實之應主于腎膀胱若其府藏

有病從骨生熱則應藏寒則應府ナ凡骨虛者疼痛与玄及骨節疼也

不安好倦骨實者苦煩熱ナ又治骨實苦煩熱

鷄子白ナ煎方ナ通ナ四ナ時ナ用ナ鷄子七枚ナ和ナ用ナ取ナ白ナ生ナ地ナ黃ナ汁ナ一ナ升

麥門冬汁三合赤蜜一升ナ凡四汁相和攪ナ調ナ盛ナ火ナ上

煎之ナ三沸ナ分ナ三服ナ桂ナ要ナ方ナ療ナ骨ナ虛ナ勞ナ冷ナ骨ナ節ナ疼ヒシキ

痛ナ無ナ力ナ致ナ二ナ升ナ地ナ黃ナ八ナ兩ナ再ナ遍ナ蒸ナ曝ナ乾ナ從ナ食ナ後ナ以ナ酒

一升服之ナ再ナ治ナ虛ナ熱ナ

治髓病方第卅五

那繁方ナ凡髓虛實之應主于肝膽若其府藏有

病從髓生熱則應藏寒則應府ナ凡髓虛者病

惣不定ヤ髓實者勇 又方治髓實勇 驚悸心

肝熱紫胡菽泄湯方 紫胡セリ三兩 升麻トク三兩 黃芩ヒヨウキ三兩

澤馬ナク四兩 細辛アラノネ三兩 枳實カヲタチ三兩 淡竹葉アハタケ切一升 支子

人セネ三兩 生地黄シヨウジヨウ切一升 芒消マウシヨウ 凡十物以水九升煮取三

升去滓下芒消分三服 千金方治髓虛骨節疼也物心不

安膽府中寒心羌活補髓九方 羌活キョウカク三兩 桂心ケイシン三兩

芎藭シムカク三兩 當歸トウキ三兩 人參ニンジン四兩 棗肉サウ一升 研為脂

大麻子テマコ人二升為 羊髓ヤウズイ一升 蒜ヒル一升 牛髓ウズイ一升 十味

前カ鴛ホ五種干藥為散下来膏麻人更鴛相カ瀉ホ為一

家下二髓内銅鉢中湯中煎之取好為丸カ如梧子カ酒

服卅九日再加至卅九

治皮病方第卅六

那繁方凡皮虛實之應主肺也干肺大腸其病カ義カ於

皮毛熱則應藏寒則應府凡皮虛者寒皮實者熱

又主治皮虛主大腸病寒氣用格カク菴藿並湯方

菴藿根ソク莖切三升 桃枝菜ツク三升同固也 細糠コメ一斗 米コメ五升

昌蒲根菜コ三升 凡五物水一石五斗煮取米カ為度

大瓮器貯カ瓮上作少竹床カ于カ置カ瓮人身坐床中四面

周迴將麿席圍身上以衣被蓋覆若氣急時用孔對
中泄氣取對通才接汗可作兩人食久汗如中三日差還
焮葉足汗用之若氣裏不過熱氣下置炭火也非但
治寒法是皮膚一切勞冷並皆治之

又云治皮實主肺病熱氣所加支子藥方

支子七ノ人三兩 生地黃切一升 枳實カラク三兩 石膏八兩 大青ハクク

三兩 杏人三兩 淡竹葉切一升 紫胡三兩 生玄參五兩

芫消三兩 凡干物切以水九升煮取三升去滓下芫消

平且分三服 已上千金方同之

治完病方第七

那繁方云凡完虛實之應主脾胃若其府藏有病從
肉生契則應藏寒則應府

凡完虛者坐不平席身危動完實者坐平不動需氣

又云治完虛坐不平席好動主胃病寒氣所加五茹酒

方 通四時用 五茹皮二升 芍把皮二升 干地黃八兩 丹參八

兩 枳仲一斤 干薑四兩 附子三兩 炮鍾乳イシノ一斤 研

藥 凡八物吹咀橙アタタ子貯之清酒二斗漬之三宿一服七

合日再服又云治完實坐平席不動喘急主脾病熱

吹咀吹咀藥藥之義也又之義也又擗擗之如大擗之如大豆也豆也

氣格半夏湯除常方通四叶用半夏八兩洗宿薑八兩

細辛三兩杏仁五兩檮皮四兩麻黃三兩石膏七兩

碎夜干二兩凡八物切水九升煮取三升去滓分三服

須利下加芒消三兩

醫心方卷第六

醫心方卷第六

醫心方卷第六

醫心方卷第六

醫心方卷第六

醫心方卷第六札記

二頁上 胃痺 仁和寺本 九頁 再服 仁和寺本 三頁 下行

行 膈痛 仁和寺本 四頁上 病發 仁和寺本 下七頁 行

三服 仁和寺本 此下有又方三升湯一斗以塩一升 合攪飲之若無火以作湯仍可用水平二十六字

又方切生薑 原本五字塗抹 五頁下 人參一兩 仁和寺本

此以 七頁上 有年壯 有恐隨 廿五頁下 石斛 斛即解 下缺 八行注 之壞字 五行 之俗案

同斛 斛並斛之或體 廿六頁 大少便 千金少 廿八頁上

行又方 據前後文方 八行 服腸 腸字 廿九頁 九髓虛

者病惚不定髓實者勇幹 十金作髓虛者腦痛不安髓 實者勇悍業幹即幹之俗體

此蓋假幹

下九頁

芒消

乳兩缺干

行五

瘡惣

干金作

注七行

為脂

干金作

七世頁上

桃枝菜

菜菜

上世一行頁

牙危動

干金作身

入卷一

入卷一

入卷一

入卷一

入卷一

入卷一

入卷一

入卷一

入卷一

入卷一

入卷一

入卷一

入卷一

入卷一

入卷一

