

醫心方卷第九

✕
i109-1

F^o
イ-70

490.9
Is-3
8

No. 2254
12; 109-1



富士川支庫

1407



醫心方卷第九

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治效^{シハヤキ}嗽方第一

交束二音

治喘^{ハキ}息方第二

充塞及

治短氣方第三

治少氣方第四

治氣^{ハク}噎方第五

於若及咽痛也

治賁^{ヤト又ヤトヒ}徒方第六

癰飲水漿便令停滯不能行更遇寒氣即聚而成癰也
又癰者治淡飲方第七

治癖食方第八

脾胃為水穀之食不消滿癖一處故名為癖也

治胃^{モウハク}反吐食方第九

治宿食不消方第十

治寒^{サムイ}冷不食方第十一

治上^{ウヘ}熱下冷不食方第十二

治穀^{コメ}勞^{ハタラシ}欲^{ホシ}卧^{ヨミ}方第十三

治惡^{クワシ}心方第十四

治噫^{コロヤケ}酢^サ方第十五

於逆及飽出氣也

治嘔^{モウハク}吐^{ハク}方第十六

於口及

治干^{カラシ}嘔^{ハク}方第十七

治噦^{エツ}方第十八

於越及

治效^{シハヤキ}嗽方第一

醫心方卷第九

音次 廢金之精也

病源論云欬嗽者肺感於寒殺者則成欬嗽也肺主氣合

者肝心脾肺腎也

於皮毛耶之初傷先客皮毛故肺先受之五藏與六府為表

者大腸小腸膽胃三藏

裏皆稟氣於肺以四時更王五藏六府皆有效嗽各以其時

感於寒而受病故欬嗽形證不同 五藏之效者乘秋則肺

吐衄及

先受之肺效之狀效而喘息有音甚則唾血乘夏則心受之

者火之精也

介唯中氣如咳之

入物塞心欬之狀則心痛唯中令之如哽甚則咽腫唯痺乘春則受

負中也

肝之肝效之狀則兩脇下痛甚則不可以轉兩脚下滿乘至

俾移及去之精也

陰則脾受之脾效之狀效則右脇下痛痞引於臍背甚

音

博立作臍背也

則不可動之則效乘冬則腎受之腎效之狀效則腰背相引

時思及水之精也

而痛甚則欬逆此五藏之效也五藏效久不已傳與六府脾效

不已則胃受之胃效之狀效而嘔甚則長虫出肝效不已

方延口液出也

則膽受之膽效之狀嘔膽汁肺效不已大腸受之太腸效

又云才ホネク

之狀效而遺屎心效不已則小腸受之小腸效之狀效而失氣

ホネホネク

者与效俱腎效不已膀胱受之膀胱效之狀效而遺尿久效

奴不及

上腫中腫下腫

謂之三腫不已三腫受之三腫效者而腸滿不欲食飲此皆聚於胃

謂胃為五

於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也

音

千金方云問云欬病有十何謂師曰有風效有寒效有支

效有肝效有心效有脾效有肺效有腎效有膽效有

木之精也

俾移及

時思及

厥陰效 問日十效之語目效言不證以何為異師日

欲語目效言不得竟謂之風效飲冷食寒目之而

效謂之寒效心下堅滿效則引痛其脉及遲謂之

支效引脇下痛謂之肝效而吐血引手少陰謂

之心效如涎出瀆沫下引少腹謂之脾效引頸項

而唾涎沫謂之肺效而耳無所聞引腰脊謂之腎效

而引口中頭痛口苦謂之膽效而引舌本謂之厥

陰效

僧深方云熱效唾粘而如粉冷效唾清澄如水醫門

方云夫酒客效者其人必吐血此為坐極飲過度所致難療

槎要方云此病有數種有冷熱效嗽有肺萎嗽有肺癰

嗽有水氣嗽若有本性非熱遇諸冷緣而得嗽觸冷

便發熱即可此是冷嗽也若有本性非冷遇諸熱緣

而得嗽觸熱便發遇冷即可此是熱嗽也若有本性

又久熱將息更劇冷將息無効每唾無多濃淡

但唾白而稠物是细小泡沫此是肺萎嗽也若有本性

冷熱將息無効每嗽所出皆是濃淡如臃瘡中膿或寒

或熱此是肺癰嗽也若有非冷熱非經久患嗽上氣喘

自單液也

瓊成居并二反

項在後

頸在

息腹滿悶甚者頭面有氣過久重者身軀皆腫此是水

氣歎也 葛氏方云上氣喘嗽肩息不得卧手足逆冷

及面浮腫者死 僧深方紫莞丸治咳上氣喘息多唾

方紫莞 歎冬花 細辛 甘草 干薑 各二兩 右五物

九如梧子三九先食服日三又方如櫻桃大含丸稍咽其

汁日三新久咳晝夜不得卧因中水鷄聲歎死者治之甚良

今案者婆方為散 錄驗方小紫莞丸治上氣夜咳逆多濁唾

方 干薑二兩 甘草二兩 細辛二兩 紫莞三分

歎冬花二兩 附子二兩 凡六物下篩蜜和丸如梧子

先食服五丸日二

大紫莞丸治上氣歎逆方 紫莞二兩 五味子二兩

橘皮二兩 香豉二兩 干薑二兩 桂心二兩 杏人二兩

細辛二兩 甘草二兩 歎冬花二兩 食茱萸二兩

凡十一物搗篩蜜和丸如梧子一服五丸日二夜哈一丸如杏

核大咽汁晝更含 並祖方治上氣咳喘杏人丸方

杏人一升 葵一升 干薑二兩 細辛二兩 紫莞二兩 桂心二兩

搗下篩杏人別如脂合和以蜜丸服如棗核一枚日三廣

浴方療咽喉乾燥歎軟語無聲桂心散方

醫心方卷九

桂心六兩 杏人三兩 檮節以綿裹一棗大含細咀汁日

三夜二忌生葱油膩 范汪方治效紫莞牙上丸方

紫莞一分 乾薑一分 附子一分 桂心一分 欬東花分

細辛一分 凡六物治後和蜜丸 如小豆先食以二丸著牙

上稍咽日再不知稍增 又云授杯湯治久效上氣口中寒

冷不能得食飲卧不安床牽繩而起咽中如水鷄聲方

欬東花卅枚 細辛一兩 紫莞二兩 甘草二兩 麻黃

五味半升 杏人卅枚 半反半升 桂心二兩 麻黃

二兩 干薑二兩 凡十物吹咀以水八升煮得二升先食適

咳咀 二兩 一方 上扶兩及下才与反

合味也

水鷄 似鴨也 恒在中 見人即入 後即出 也又名 鴈鴨也 其鳴聲 似鷄也

寒温再服温卧汗出即愈 今案錄驗方麻黃三兩甘草

水六升煮取二升 五合未食分三服

小品方治嗽上氣呼吸攀繩肩息欲死覆杯湯方

麻黃四兩 甘草二兩 干薑二兩 桂肉二兩 貝母二兩

凡五物以水八升煮取二升再服即愈 今案范汪方云苗詭士孫栗

湯治上氣不得息卧喉中如水鷄聲氣欲絕方麻黃

細辛二兩 五味子半升 干薑四兩 半反 桂心二兩 凡六物

以水一斗煮取三升分服一升授杯即得卧一名授杯湯令

醫心方卷九

得汗多喜不得眠汗者一服消息後服

今案經心方云麻黃四兩
五味半介桂心三兩杏仁

三兩細辛三兩生薑十兩
半復四兩七物以水
一斗煮取三升分三服亦可
五合服漸加

千金方云夫酒客

飲者必致吐血坐極飲過多所致厚朴大黃湯主之厚朴

一尺大黃六兩枳實四兩 三味水五升煮取三升分再服之

本草云欬逆庶髓以酒服之甚良 又古德王膏酒和

崔尚作綿音他端及

三合服之曰三 又去食鯉魚肉也

孟詵食經云一療卒咳味方 梨一顆刺作五孔每孔

中內一粒枳以麵裹於熱灰中燒令極熟出停冷割食

之 今案經要方梨七果取汁白錫一兩
徒當及飽嚼之 又方梨去核內蘘蜜麵

裹燒令熟食之太良 又方割梨肉於蘘蘘中煎之停冷

食之 今案朱思簡食經云凡用梨治
疾皆須待冷食之契食及成欬 葛氏方治卒得欬味方

皂莢 一名猪牙 干薑桂心分小鳩丸服三九日三又方生薑汁百部汁

和煎服二合集驗方治忽暴氣東奔驚坐卧不得并

唯裏喙聲氣欬絕方 麻黃三兩 杏仁四兩 干薑

葉二兩 紫胡四兩 橘皮二兩 切以水六升煮取三升半

分三服 張仲景方治肺年欬大棗丸方 大棗百枚 杏人

百枚 鼓百枚 凡三物或杏人鳩令相得乃內棗鳩令乾

和調丸如棗核一九含之稍嚼汁日二漸增之常用良

者婆方治卅年咳喘方 细辛紫壳 麻黄甘草干薑

各四五味為散白飲服一方寸匕日三

劫驗方款冬花瓜丸治卅年效上氣欬逆面腫方杏仁

三分 干薑三兩 甘皮一兩 麻黄三兩 甘草二兩 款冬

花二兩 凡六物治下節以蜜和丸如梧子先食服三九日

僧深方治新久咳 羌花煎方羌花二兩 乾薑二兩

白蜜二升 凡三物內於蜜中微火煎服如棗核一枚日三

董效咳法 録鈴方治久咳動法 蜡紙一張熟艾薄

布遍紙上動 黄末一兩款東花末二分前遍布艾上著一

葶筒卷之寸列以繩繫之燒下頭款烟取三寸烟亦

可吐咽款計老款盡刮一百日斷 塩及酢 今案本草雄

千食方治效董法 细熟艾薄 布紙上廣四寸度以黄

末薄布艾上務令調 荻杖如紙長卷之截作十枚先

以燒紙下去荻烟從孔出口取烟之取吐心明日復董作

日餘者後日復董之三日心自然差得食白糜餘皆禁之

灸效咳法

僧深方云灸近兩乳下黑白突際灸百壯即日愈 注 花

又方以繩當乳頭圍周身令前後平正當乳脊

骨解中灸之九十壯又方橫度口中折繩從脊灸繩兩邊灸八十壯三日報畢又方從大椎數下行第五節下第六節上穴間中一處灸隨年壯并治上氣秘方小品方云灸肩井穴百壯在肩上陷解中大骨前又方灸大杼穴隨年壯在項第一椎下兩旁各一寸半陷者中又方灸肺俞隨年壯在第三椎下兩旁各一寸半又方灸風門熱府穴百壯在第二椎下兩旁各一寸半又方灸天窗穴五十壯在結喉下五寸宛之中又方灸玉堂穴百壯在紫宮下一寸六分又方灸臍中穴五十壯在玉堂下一寸六分兩乳間陷者

中又方灸雲門穴五十壯在巨骨下氣戶兩旁各三寸陷者中橫去旋旁六寸又方灸中府穴五十壯肺募也在雲門下一寸又方灸巨闕穴五十壯在鳩尾穴下五分又方灸期門穴五十壯在去巨闕五分奉臂取之又方灸輸府穴在旋機旁各二寸又方灸或中穴在輸府下一寸六分又方灸氣戶穴在去旋機旁各四寸

才木七
 葛氏方云度手毋指中折以度心下灸三壯即差治喘息方第二

病源論云肺主氣耶乘於肺則胎脹則肺管不利也則

臆前骨
岐下寸
為鳩尾
骨下
更取委
為鳩尾

氣道濕故氣上喘逆鳴息不通也 葛氏方治卒上氣

鳴息便欲絕方 鳩莖絞飲汁一升許立愈 又方未人參服

方寸匕日三 又方桑根白皮細切三升 生薑切半升 吳茱萸

半升酒五升合煮三沸去滓盡服之入口則氣下此千金秘

方 槿要方療上氣逆滿喘息不通呼吸欲死救命湯方

麻黃八兩 甘草四兩 大棗卅枚 夜干如博子三枚石以井

花水一斗煮麻黃再沸內餘藥煮取四升分四服入口即愈

醫門方治上氣喘息不得卧身面腫小便澀方 亭歷

一兩 大棗卅枚 水三升煮取一升內亭歷煮五六沸

頓服微利者 効驗方遊氣湯治上氣一來一去无常後

急不足不得飲食不得眠方 生薑八兩厚朴四兩 人參二兩

伏苓四兩 桂心五兩 半反一升 枳實子五枚 甘草二兩

黃芩三兩 凡九物切以水一斗煮取四升服七合日三

錄驗方大棗湯治上氣胃寒咽中如水鷄聲方

欬冬花卅枚 細辛四分 桂心四分 麻黃四兩 大棗廿枚 甘草罍

杏人卅枚 紫莞四分 生薑十兩 半夏三分 十味以

水八升煮取二升頓服卧令汗食糜粥數日餘皆禁便愈

新錄方治上氣 喉中水鷄鳴方 桑根白皮一升 生薑合

皮切一升以水四升煮取一升六合二脹又方冷水漬足溫易之ハツ子ヲ
 又云上氣身面浮腫小便澀喘息不得卧方高麗子十八ハツ子杏仁ハツ子
 四分オホクサ大棗肉五分三物合搗三四千杵可丸飲漿如梧子七丸日二ハツ子
 加至十九以小便為度此方大安穩兼去水腫滿者又方以棗根ハツ子
 汁一斗煮赤小豆三升豆熟散豆飲汁又方大豆三升以水一斗ハツ子
 煮取五升去滓內棗根白皮切一升煮取一升六合二脹腫煩ハツ子
 消當利三行又方以水一斗研麻子三升取煮赤小豆三ハツ子
 升豆熟散豆飲汁又云乏氣喘息方桃人七皮一升搗為ハツ子
 泥分以酒若湯服之ハツ子

治短氣方第三

病源論云短氣者平人无寒熱短氣不足以息者ハツ子實也實ハツ子
 則氣盛則氣逆不通故短氣也又肺虛則少氣不足之ハツ子
 令短氣則其人氣微常如少氣不足以呼吸也ハツ子

僧深方治短氣欲絕不足以息煩撓益氣心煩竹根湯方ハツ子

竹根一斤ハツ子麥門冬一斤甘草二兩大棗十枚粳米一升小麦一升ハツ子

凡六物水一斗煮麥米ハツ子熟去之內藥煮取二升七合服八合日三ハツ子

不能飲以綿滴口中醫門方治胸中痞塞短氣膈者ハツ子

或腹急痛方伏苓四兩甘草二兩半夏三兩ハツ子

醫心方卷九

生薑三兩 杏人百顆 水七升 煮取二升半 去滓 入温三服

相去八九里 泄氣 若氣不下 加大黃 檳榔 人取利 為佳

千金方治短氣 不得語 方 艾子二十七枚 豉七合 水二升 煮豉

取一升半 去豉 內艾子 煮取八合 服半升 又云 卒短氣者 方

鴉菲取汁 服一升 立愈 又云 冷氣 短方 枳五兩 絹袋盛

酒一升 漬三七日 服之 任性

治少氣方第四

病源論云 少氣者 此由藏氣不足 故也 肺主氣 而通呼吸 藏氣不足 呼吸微弱 而少氣也 胸痛 少氣者 水在藏府之故也

水者陰氣也 陰氣在內 故少氣也 廣濟方 療腹冷氣 不

能食 及少氣 調中丸方 人參五兩 茯苓五兩 甘草五兩

白朮五兩 干薑四兩 鴉菲蜜和為丸 空腹温酒服 如梧子

卅九日 二夜 一有益 盡更合 不飲 酒煮大棗 飲下 不利 忌

海藻 桃米酢 千金方治之氣方 芎藭 藜蘆 生薑

二兩 以水三升 煮取一升 頓服 葛氏方治 卒之氣 不復

又方 度手 毋拍 析度 心下 灸三壯 即差 又方 麻黃三兩

先以水五升 煮一沸 去沫 乃內甘草 二兩 杏人六十枚 煮

吹咀 應細切

醫心方卷九

取二升半三服

治氣噎方第五

病源論云氣噎由陰陽不和藏氣不理寒氣填於胸

羣故氣有阻塞不通而謂之氣噎令人喘悸胃背痛

也又云噎者一日氣噎二日憂噎三日食噎四日勞噎五日

思噎雜有五名皆由陰陽不和三焦障絕津液不行

憂患嗔怒所生所以謂之五噎者噎塞不通也

新銹方治氣噎胸塞不達方 水脹塩末一大匙又方合

咽羨酒取羌心酢之得又方蘇蜜合葉令相得細之含咽

之又方鳩韭取汁服五合又方冬置中穴又方冬第五

推又灸內踝上三寸

集驗方通氣噎湯方半夏八兩 洗 桂心三兩 生薑八兩

凡三兩物以水八升煮取三升服半升日二

千金方治噎氣不通求不得食方杏仁三兩 桂心三兩

二味丸如棗核稍咽之臨食先含弥佳 樣要方

治責狂方第六

病源論云夫責狂氣者腎之積氣也起於驚恐思憂思所出也

若驚恐則傷神心藏神也憂思則傷志腎藏志也神志傷

動氣積於腎而氣上下遊走如狂之責故去責狂其氣

乘心若心中踊之如車所驚如人所恐五藏不定食飲輒臨

氣滿胸中狂癡不定妄言見此驚恐責狂之狀也若氣

滿支心之下煩亂不欲聞人聲休作有時乍是乍變吸之短

氣手足厥逆內煩結痛溫之欲臨此憂患責狂之狀也

醫門方云論曰奔狂病者從少腹起上衝喉咽發作時欲

死皆從驚得之療奔狂氣方

生葛根クハネ廿分 甘李根クハネ白皮クハネ切クハネ一分 水九升クハネ煮クハネ三升クハネ分クハネ溫クハネ三服クハネ

相去八九里クハネ 療奔狂氣在心胸中不下支滿者方 生薑

五兩クハネ半夏クハネ四兩クハネ 桂心クハネ人參クハネ 吳茱萸クハネ甘草クハネ 茯苓クハネ 各クハネ三兩

水七升クハネ煮取二升クハネ分クハネ溫クハネ三服クハネ之相去八九里クハネ 又云クハネ奔狂法

宜灸氣海丹由開元皆當其穴灸之穴在臍下一寸三分三寸

是也隨年灸之 小品方云師曰病有奔狂有吐膿有驚怖

有火灸耶此四部病皆從驚得之不言如奔狂之狀者是病

人氣如狂奔走氣息喘迫上逆之狀也湯方用贖猪者謂

雄花クハネ崔氏食經作豚音徒昆又猪長不滿三尺者曰豚也

雄花クハネ狗牙子クハネ是先逐之使奔之然後斂取面及藏合藥也

葛根クハネ太猪湯方クハネ葛根八兩クハネ 生李根クハネ一分クハネ 人參クハネ三兩クハネ 木

二兩クハネ半夏クハネ一分クハネ 洗クハネ 灸クハネ 夕藥クハネ三兩クハネ 當歸クハネ二兩クハネ 桂クハネ五兩クハネ 生薑クハネ一斤

甘草二兩 凡十物以花汁二斗煮得五斗温服八合日三牝屬奔

牝湯方 牝屬三兩 桂肉八兩 李根一斤 甘草三兩 凡四物

煮牝令熟取汁一斗七升煮李根得七升汁内藥取三升

服五合日三夜再 廣洛方療實氣在胸心迫滿支寄

方生薑一斤 半夏四兩 洗 桂心三兩 人參二兩 吳茱萸

萸一兩 甘草二兩 右以水一斗煮取三升絞去滓以温三服

忘生菜麵粘食 集驗方實牝伏苓湯治虛氣五藏不足寒主厥逆腹

滿氣實衝胃障發作事欲絕不識人氣方羸劣小腹起

騰踊如牝子起下方 生葛八兩 甘李根白皮切一升 生薑

五兩 伏苓四兩 半夏一升 洗 人參三兩 甘草三兩 當歸二兩

芍藥二兩 牝牝一頭 升者逐走令口中沫出刺取血治牝

如食法以水足淹牝之熟出之澄取清汁吹去上肥得一

斗二升酒二升并血合煮諸藥取五升服八合日三升金方氣

治上下否塞不能休息破氣丸方 桔梗三分 胡椒七分

枳椇十卜 橘皮三卜 干薑三卜 枳六分 烏頭七分

人參五分 桂心四分 厚朴三分 心殼三分 附子五分

甘草八分 細辛三分 亭歷四分 大黃八分 檳榔八分

...

伏苓トホト四ノ 前胡ツクク四ノ 木ノ六ノ 防葵フセイ四ノ 芎藭コウキウ四ノ

當歸オホセリ七ノ 吳茱萸カラクシカク六ノ 甘草カンカク丸如梧子又作防葵 凡服十九日二有トラス

熱者モソハ空腹脹之 又云治氣上不得卧神秘方 橘皮

生薑 紫蘇イヌヒ 人參カクニノクケ 五味子セネカウラ 五味各等ノ 五兩水七升

半ノ 决取三升ノ 三服 又云治氣滿腹脹下氣湯方猪高及腹滿也 半夏ホハクク

生薑一升 人參カクニノクケ一兩半 橘皮三兩 四味切之以水七升

煮取三升ノ 分三服一日令盡

治淡飲方第七

病源論云淡飲者由氣脈閉塞津液不通水飲氣停

在胸府結而成淡又其人素盛今瘦水走腹間浦矯及 漚ニ 有滌 腹腹内 下下 自自

聲謂之淡飲其為病也胸脇脹滿水穀不消結在腹内 雨雨

肋水入腸胃動作有聲身體重多唾短氣好眠胸

背痛甚則上氣欬逆倚息短氣不得卧其形如腫是也

南海傳云若覺淡飲聞曾口中垂數鼻流清水禪 糍糍

開戶滿槍ノ 准語ノ 聲不轉飲食已味動ノ 歷ノ 一旬如ノ 此ノ 之ノ

流ノ 飽食便ノ 差ノ 不ノ 勞ノ 灸頂ノ 無ノ 假ノ 據ノ 咽ノ 斯ノ 乃ノ 不ノ 漸ノ 湯藥ノ

而能蠲疾即醫明之大規矣氣不得卧其形如腫

是也

取孟神韵云
禪糍滓
也上徒感及
下柔感及
以未和羹
亦作糍糍
厄陳稜
羹不堪

糍 作搽
息也
雜也

醫心方卷九

力の及瀝也滴
瀝水下

千金方云夫飲有四其人素盛今瘦水走腸間瀝
 有聲謂之淡飲下後水流在脇下欬唾引痛謂
 之懸飲水行歸於四支當汗出而不汗出身體以重謂
 之溢飲其人欬倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲
 淡飲者當以藥和之懸飲者干棗湯主之甘草四兩
 大棗廿枚干薑二兩三味水一斗煮取二升分三服溢飲
 者青龍湯主之麻黃六兩桂二兩甘草二兩
 石膏二兩杏仁廿枚大棗十枚生薑二兩凡七物以水九升
 煮麻黃減二升乃內餘藥得二升去滓服一升溫覆令汗

少者溫粉之汗止勿復服

支飲者木防己湯主之木防己三兩石膏鷄子大十二枚

桂心二兩人參四兩四味水六升煮取二升分再服又云

伏苓湯主胸葦淡滿方伏苓四兩半夏一兩生薑二升

桂心八兩四味水六升煮取二升半分四服又云治卒

頭痛如破非冷又非中惡其病是胸葦飲二三升

許適冷暖飲二升須臾極吐畢又飲如此數過劇

者須吐膽乃心不損人又云冬留飲冷瀝法灸通

谷穴五十壯在幽門下一寸幽門在巨闕旁半寸錄驗方

治胸葶淡飲食散經日併吐シカシテカラ出方單服生薑汁一升

欲吐ムク之不吐ハカチ自向シ下出去クモセテトシ葛氏方治胸中多淡頭

痛不欲食及飲酒人瘵瘵及身體焦枯被病也僻道淡方恒山二兩甘草

一兩トシラコト松蘿十兩ニカウリヲホフ菘蒂三七枚以酒水各一升半煮

取升半初服七合取吐ク不盡餘更分二服後可服半

夏湯又方先作一升湯投一升水名為生熟湯乃食

三合塩以此易送須臾欲吐ムク便擗出未盡更服二合

又云若胸中常有淡冷水飲虛羸不足取吐者方注范

方号半复ホソクア半复一升洗生薑半斤伏苓三兩水七升煮取

一升半分再服小品方茱萸湯治胸中積冷心下淡水煩

滿汗ハ不下シ飲食心胸應背欲痛方生薑三兩ホソクア半夏三兩ハシ

桂心三兩カクシ吳茱萸三兩カクシ人參一兩カクシ大棗一枚甘草一兩カクシ

凡七物以水九升煮取三升内白蜜五合分三服今案集驗

方生薑五兩胡洽方治淡冷癖氣癖氣白如聚積甘方生薑八兩附子四兩セ

二物以水三升煮取一升半分再服葛氏方僧深方治五飲酒癖方

术一斤ツケラ桂半斤干薑半斤三物治下篩和蜜丸如梧子ハカリシ服

十九知イ不稍增初服當取下先食服日再ヤムト集驗方治胸中淡

飲腹中水鳴食不消臨吐水湯方大檳榔シ卅口今手半夏ホソクア

八兩洗アム生薑四兩カラムシ杏仁四兩イナホ白朮四兩イナホ茯苓五兩イナホ橘皮三兩キレ切水一

斗モテ煮取三升ハカ分三服ハカ効驗方甘草九ハカ治雷飲方甘草ハカ二ハカ

葎蒂ハカ一分凡二物治下篩蜜丸ハカ如梧子ハカ欲下病服三九日ハカ三

丸不下ハカ增之以吐為度ハカ又云新葎散治淡百病常ハカ

用驗方ハカ七月七日葎蒂二枚赤小豆二兩ハカ參人二兩ハカ凡三物ハカ

治合下篩以温湯和服方寸匕當吐病愈ハカ今案新録方ハカ一ハカ五ハカ赤小豆ハカ一ハカ五ハカ

一ハカ又云新葎丸治腎羸間有澹水方蜀附子ハカ一分ハカ梨蘆ハカ

一下ハカ甘草ハカ一下ハカ赤小豆ハカ一下ハカ凡五物治合下篩蜜丸ハカ

如小豆ハカ一服ハカ五丸當吐青黃ハカ不知稍增ハカ范汪方病支飲不得ハカ

支飲謂飲水過多停積ハカ

於胃事ハカ息亭ハカ歷太乘ハカ寫肺湯主之方ハカ亭歷ハカ熱冷ハカ紫色ハカ治令ハカ大素ハカ

支飲其病令人咳ハカ吐水ハカ枚以水二升煮棗令得一升半ハカ去棗ハカ內藥ハカ一九復煎得ハカ

一升盡服之ハカ極要方療淡氣方ハカ橘皮二兩ハカ右以水三升ハカ

煮取一升ハカ二合為一服ハカ間日服之ハカ新録方治淡飲方ハカ苦瓠ハカ穰ハカ

赤小豆ハカ一分ハカ搗篩蜜丸ハカ飲服如小豆ハカ三九ハカ大佳ハカ又方ハカ瓜丁ハカ

赤小豆各一兩ハカ搗篩蜜丸ハカ飲服如小豆ハカ七九ハカ吐淡ハカ老ハカ

治癰食方ハカ第八ハカ

病源論云夫五歲調和則禁衛氣重ハカ禁衛氣重則ハカ津液通流ハカ稚復多飲水漿不能為病ハカ攝養市方ハカ三ハカ

支飲謂飲水過多停積
於胃事
息亭
歷太乘
寫肺湯主之方
亭歷
熱冷
紫色
治令
大素
支飲其病令人咳
吐水
枚以水二升煮棗令得一升半
去棗
內藥
一九復煎得
一升盡服之
極要方療淡氣方
橘皮二兩
右以水三升
煮取一升
二合為一服
間日服之
新録方治淡飲方
苦瓠
穰
赤小豆
一分
搗篩蜜丸
飲服如小豆
三九
大佳
又方
瓜丁
赤小豆
各一兩
搗篩蜜丸
飲服如小豆
七九
吐淡
老

唯否之澤立雖不澤則腸胃不能宣行因飲水漿便令

停滯不能行更遇寒氣即聚而成癖者謂癖側在於

兩脇之間有時而痛是也通玄絃癖之疾不專於一絃

病者肝之所生癖病者脾之所成絃生於左癖成於右絃者

如弓之絃肝之所生肝與膽為清淨之府不受外邪故知自

生病也癖者脾胃為水穀之海食不消偏僻一邊故名

為癖令一絃癖同為一疾實難矣

龍門方治絃癖病腹堅如石方

取苦瓠開口盛大嚴醋滿中密塞口釜中煮令

極熱出瓠以熨堅處冷即更煮一時即作慈散

湯食之每熨時皆以衣襯身

極要方治癖瘕方 鱉甲六分一名鱉甲白朮六分一名白朮枳殼六分一名枳殼生薑

八分一名生薑大黃十分一名大黃前胡四分一名前胡右以水六升煮取一升六合分溫

三服忌猪魚 千金方治心上淡蔭僻氣吞酸

半夏湯方 半夏三兩一名半夏生薑六兩一名生薑附子一枚一名附子吳茱萸

三兩 四味水五升煮取二升半分三服

葛氏方治腹中冷澀水穀癥結心下停淡兩脇痞滿

案之烏轉蓬宮飲食方大黃三兩一名大黃甘草二兩一名甘草蜜一升二合

平凡及痛也

棗廿七枚以水三升煮棗取升內諸藥煮取一升七分

再服又方伏苓一兩茱萸三兩 搏蜜丸如梧子服五丸三

醫門方療疝氣冷痛吐酸水或目出熱契水得

此病方木乾薑各二兩 橘皮細辛 吳茱萸各一兩伏苓

人參各二兩半右搏篩蜜和為丸空腹煖水下十九丸加至

廿九日二

廣利方理癰氣腹痛兩肋腸脹滿食少方紫胡六分

桔梗八分通草八分 伏苓六分 赤芍藥四下 栝李人四下

龍甲四分 切以水二大升煎取九合食後分溫三服如人行七

切又作莞 似蘭而八里進一服忌生冷人覓 廣洛方療癰結心下硬痛巴豆丸方

陶器小注云巴豆出巴郡 似大豆 梧七丸日一服

治胃及吐食方第九

病源論云胃及者營衛俱虛其血氣不足停水積飲在胃

管則歲冷而脾不磨則宿穀不化其氣逆而成胃及也

則朝暮吐暮食朝吐心下窄大如杯往來寒熱甚者食

已即吐也

醫門方云食已吐其食者胃中虛冷所致

醫心方卷九

効驗方干薑九曾治又大吐逆胸痛羸瘦不得食飲温中

下氣使人進食方 吳茱萸二兩 小麦二兩 杏仁二兩

干薑二兩好豉二兩 蜀椒二兩 凡六物搗下篩去皮

和蜜丸如梧子服七九日三 葛氏方治胃及不受食之畢

輒出方 大黃四兩甘草二兩水三升煮取一升半分再服之

本草注云
陳者謂
三年五年者之

三物枳朮黃合治為散以水二升半煮取三

甲沸液去滓汁著銅器中乃內散如鷄子攪合和合頓服之

羸人再服 經心方伏苓湯治胃及而渴方 伏苓四兩 澤瀉

四兩桂心二兩半夏四兩甘草二兩五味以水一升煮取二升半服

八合日三又云治胃及食輒吐方 粳米令極白搗篩下作丸

楮子大熟者稍吞得下便愈 范汪治胃及不受食已欬吐

四物當歸湯方 白蜜一升 當歸二兩人參二兩半夏一升凡

四物咬咀以水二斗合蜜揚百卅過內藥銅器中煎得六升分

再服加至一時復服盡又云橘皮湯治嘔吐及逆食飲不下方

人參一兩橘皮二兩白朮一兩生薑三兩甘草二兩 凡五物切

以水一斗煎取三升先食服一升日三

千金方治大虛胃及食下唯便吐方 人參一兩 澤瀉二兩

醫心方卷九

伏苓甘草二兩四兩 橘皮三兩 桂心三兩 干薑三兩 青竹茹五兩 大黃オホキ

六分 九味水八升 煮取三升 服七合 日三夜一 已利者去者セキ

大黃 又方 蘆根アシノネ茅根チノネ以水四升 煮取二升 頓服 下得

食今案新録方切各一升水六升 又云 灸胃及食吐方治胃熱臨下送久不下食者

灸兩乳下各一寸 以差為度 又方 灸脊上一寸 廿

壯 又方 灸胃管穴 十壯 在鳩脊中央 握要方 療吐不

得食并胃反 飲送食 即吐方 甘草一兩 橘皮一兩 生薑冬

八兩 葱白キノネ干四枚 右以水六升 煮取二升 半升 三服 不心

更作今案廣濟方葱白十莖橘皮八分甘草八分生薑十兩水八升 醫門方 療口及不受食之

訖 臨吐方 半夏人參 生薑各三兩 橘皮二兩 大棗十二枚 白

蜜五合 以東流水七升 煮取二升 半 去滓 內蜜 更詳 三百下

煎三五沸 久溫三服 相去八九里 救急單驗方 療及胃方

鳩生葛根シホリキ絞汁 二升 服驗今案新録方取六七合日二三

又云 方 灸兩乳下三寸 扁鵲云 隨年壯 華他云 吐壯神驗

治宿食不消方 第十

病源論云 宿食不消者 由五藏氣虛弱 寒氣在於脾胃之

間 故使穀不化也 舊穀未消 新穀又入 脾氣既弱 故不能磨之

則經宿而不消也 令人腹氣急 噎氣 酸鼻 時復煎寒

醫心方卷九

壯熱是也或頭痛如癭之狀 集驗方治凡所食不消方

取其餘類燒作末イロ服方寸匕便吐去宿食即差イナヌ陸光錄

說有人食棗有不消作病時已晚クハ無棗ハ燒樹間得燒棗子カレハ

燒服之登吐ハ出病即差ハ南海傳云若疑腹有宿食カレハ

又刺膈胃宜頃恣飲熱湯指剔セシキ喉中痰吐令盡ハ

更飲更決ハ以盡為度或飲冷水理ハ无傷或干薑

湯斯甚妙也其日必須斷食明朝方始進食ハ

范汪方治腹痛消穀心利服大豆方

取大豆ハ商擇兒好者ハ服一合ハ所日四五服一日中ハ五合飯後

輒服ハ雜非飯後可投ハ間服ハ趣盡ハ四五合ハ飲服時手ハ按豆

令烟ハ光明若苦堅難小減豆ハ

范汪方治食生冷之物或寒時衣薄當風食不消或夜食以

卧不消化心腹煩痛脹急或連日不化方燒地令熱ハ薄席ハ

布上卧上厚覆取汗愈ハ葛氏ハ新錄方治宿食不消方ハ韭白ハ

切一升ハ豉一升水四升ハ煮取二升ハ分二服又方主薑五太兩ハ搗取汁ハ濕

服之又方ハ鳩絲如泥ハ酒服如棗日三又方ハ麴末干薑末一升ハ酒

服一方寸匕日二又方ハ茶大倉ハ二三百ハ壯又方ハ冬膈ハ左右相去

三寸名魂舍並依年壯ハ准多益佳又方ハ冬第ハ五椎并左

醫心方卷九

右相去一寸五分

錄驗方治宿食不消大便難練中丸方大黃六分オホシ亭歷子ハツカナ

四兩オホシ 杏人四兩オホシ 苳消四兩オホシ 凡四物下節蜜和食已服如オホシ

梧子七九日三不知オホシ稍增オホシ

千金方消食丸主數年不能食方オホシ 麥蔞オホシ 一升オホシ 薑四兩オホシ

烏梅四兩オホシ 麴オホシ 一升オホシ 四味蜜和服十九日オホシ 再至丸寒オホシ

在胸中及胃オホシ 番心者皆差オホシ 槎要方治宿食不消オホシ

心腹妨滿脹痛須利方訶梨勒皮八卜オホシ 桔梗オホシ 六オホシ 檳榔オホシ 今オホシ

夕藥オホシ 六オホシ 大黃オホシ 十オホシ 八オホシ 右為散空腹煮生薑飲服三錢上日オホシ

二服

葛氏方治脾胃氣弱穀不得下遂成不復受食方

大麻子オホシ 一升オホシ 大豆オホシ 黃卷オホシ 二升オホシ 并オホシ 葵オホシ 令オホシ 黃香オホシ 檇オホシ 蒨オホシ 飲オホシ 服オホシ

一二方オホシ 七日オホシ 四五オホシ 今オホシ 案オホシ 僧オホシ 深オホシ 方オホシ 大オホシ 麻オホシ 子オホシ 人オホシ 三オホシ 升オホシ 大豆オホシ 二オホシ 升オホシ 調オホシ 中オホシ 下オホシ 氣オホシ 調オホシ 冷オホシ 熱オホシ 利オホシ 水オホシ 穀オホシ

治寒冷不食方第十一

千金方消食斷下丸寒冷者常將之方オホシ 麴末オホシ 一升オホシ 大麥オホシ

蔞オホシ 末オホシ 一升オホシ 吳茱萸オホシ 四兩オホシ 三味蜜和服十五丸如梧子日三オホシ

又云消食丸主數年不能食方オホシ 小麥オホシ 蔞オホシ 一升オホシ

干薑四兩オホシ 烏梅四兩オホシ 麴オホシ 一升オホシ 四味蜜和服十九オホシ

醫心方卷九

日再至卅丸寒在胃中及胃反番心者皆差

范汪方治久寒不欲飲食數十歲方 茱萸八合 生薑一斤切

消石一斤 凡三物清酒一升水五合煮令得四升絞去滓カ

温飲二升病即下去勿復服也 葛氏方治胃中虛冷不能

飲食輒不消羸瘦中懈乏中四支中羸弱百疾目此牙生方カ薤白オ

斤枳實三兩 橘皮一兩 大棗十二枚 粳米二合攷七合以水

七升先居薤得五升內諸藥煮取二升分三服日々依之カ

廣洛方療冷熱不能食及少氣調中丸方人參五兩伏

苓五兩 甘草五兩 白朮五兩 乾薑四兩 枳實以蜜和丸空

腹温酒服如梧子卅九日二夜不飲酒者大棗飲下ツ

錄驗方治惡食人參湯方 人參四兩 生薑三斤厚朴二兩

枳實二兩 甘草二兩 凡五物切以水六升煮取二升分三服

集驗方治久寒胸脇逆滿不能食吳茱萸湯方吳茱

萸一升 人參一兩 生薑八兩 小麦一升 甘草一兩 桂心一兩

半夏一升 大棗枚 凡八物咀以清酒五升水三升煮

取絞去滓適寒温飲一升日三

治上熱下冷不食方第十二 耆婆方治人上熱下冷淡飲凡氣虛勞方 獨活伏苓

白木澤クハシ厚朴ホクシ黃耆ワウキ丹麻タンマ高本カウホン紫菀シオン甘草カンサウ人參ニンジン黃芩ワウキン集金丹シツキン及

各二カクニ生薑シヤウキヤウ三兩サンリウ橘皮キヒ一兩イチリウ右ミナ四味シイミ切キレ以水ミヅ一斗イツト并ナド煮取ニヂク

三升サンシヨウ去滓クニシ分三服フンサンボク又云マタヒトク目飲メノク酒上サケノウヘ熱下ネツゲ冷不能ヒヤニシヤク食クハ方人參ハツト三

甘草カンサウ二升ニシヨウ并ナド麻マ二兩ニリウ干藍カンラン二兩ニリウ粟米アハル一合イツカウ凡五味ニツク切キレ以水ミヅ六升ロクシヨウ

煮取ニヂク米去コメニシ滓シ分三服フンサンボク又方マタハツト平且ヘラニシテ空腹クハダマダ服ツク真酪マコ一合イツカウ即愈ツク

又方マタハツト常食ヘトク粟アハル食クハ及粟粥アハルカユ之ノ又云マタヒトク治虛上熱チヨウジョウネツ下冷ゲヒヤ氣上キノヘ頭痛ツホリ

痛ツク胃煩イノイラ人參湯ニンジンカユ方ハツト人參ニンジン二兩ニリウ伏苓フツク三兩サンリウ麥門冬マクモントウ一兩イチリウ

粟アハル二兩ニリウ凡四物ニツク水ミヅ七升シチシヨウ煮取ニヂク四升イツシヨウ分三服フンサンボク日三夜二ニツク

又云マタヒトク治內虛上熱チノウチヨウネツ下冷ゲヒヤ氣不下キノゲ頭痛ツク胸煩ムネノイラ頭眩ツク致ツク

湯方カユハツト 致ツク一升イツシヨウ水ミヅ二升ニシヨウ一方イツハツト三升サンシヨウ令小沸コノケ內致ウチノケ令三沸ミツノケ頃

服有驗ツク 僧深方ソウシナハツト 茱萸丸シュウユウワ治羣上冷チヨウジョウヒヤ羣下熱チヨウゲ宿食ヤルル滯ト

飲積インシツ聚食クニシ不消クニシ寒在胸中ヒヤニシテムネノナカ或及胃マタハツト害食クハダマダ痛ツク疲方ヤルル 茱萸

二兩ニリウ 枳シ一兩イチリウ 半ハツ 黃芩ワウキン一兩イチリウ 前胡ゼンコ一兩イチリウ 細辛サイシン六分ロクブ 白英ハクエイ二枚ニマキ 人參ニンジン

三分サンブ 伏苓フツク一兩イチリウ 半ハツ 附子ブシ一兩イチリウ 干薑カンキヤウ六分ロクブ 半夏ハツア一兩イチリウ 凡十一物ニツク

下蒨丸ゲセンワ以蜜ミツ服ツク如梧子ニツク三九サンク日三ニツク不知シラズ稍增之シヤウゾウシ 廣濟方クワウキヤウ療臍上

熱臍下冷ネツシゲヒヤ日西ニツク身體熱シヤクニツク寒ヒヤ食不下クハダマダ夜卧不安ヨノイラ方苦參ハツト

六分ロクブ 龍膽リウタン五分ゴブ 夕藥セキヤク四分シフブ 黃連ワウレン六分ロクブ 枳シ四分シフブ

青葙子セイキヤウシ五分ゴブ 大黃タイカウ二分ニブ 黃芩ワウキン四分シフブ 枳シ二分ニブ 芒消マウシヨウ二分ニブ

醫心方卷九

轉節蜜丸每食後以飲服丸如梧子十四九日二

治穀勞欲卧方第十三

病源論云穀勞者脾胃虛弱不能傳消穀食使府藏氣

否眠是也葛氏方治飽食竟便卧得穀勞病令人面

艾塞也其狀令人食已則卧艾體煩重而嗜眠是也

葛氏方治飽食竟便卧得穀勞病令人艾煩重且

欲卧食畢輒甚方大麥蔞一斤枳一兩干薑三兩鳩末

服方寸匕日三四服今案范汪方大麥蔞一斤枳二升干薑三兩也又云治食過飽煩胸

但欲卧而腹脹方熬麥麵令微香鳩服方寸匕得麥大

麵益佳無麵者蘆可用

新錄方治穀勞食竟即目而睡方以酢二升煎杏仁

五十枚取一升服之覆取汗又方食傷飽為病胃

脹心滿者方冬胃管七枚又方十沸湯生水共三

升飲之當吐食出

治惡方第十四

病源論云惡心者心下有停水積飲所為則心裏澹澹然

欲吐為惡心

千金方治惡心方

苦瓠瓤并一升切酒水三升煮取一升

徒益徒敢二及水搖也謂水中水搖動也

煩服頃更吐并下如^{オホコ}瓠^{ハコ}衣^イ三升葛氏方治人忽惡心不

已方^ヤ薤白半斤柴萸一兩豉半升米一合棗四枚枳實三枚

塩如^カ彈丸水三升煮取一升半分三服又方但多^カ爵^カ薑^カ殺

子及散^ク檳榔亦佳孟詵食^ク經惡心方取懷香華葉

煮服之^ヤ新録方治惡心方生薑合皮^カ鴉^カ服五大兩汁

又方檳榔人未^ル寸匕生薑汁服之日二又加^ク橘皮更佳

槎要方療^ク冷淡氣在胸腹脹不能食吐水沫^ク嗽^ク惡心方

吳茱萸^カ升^カ橘皮二兩杏仁三兩生薑汁三合右以水五升

煮取一升六合去滓^ク內^ク檳榔人散方寸匕分再服得一兩行

利大快三五日服一劑病都除乃傳亦可加厚朴三兩薑

治噫^ク酢方第十五

病^ク臣論云噫^ク酢者由上^ク雖有停淡脾胃有宿冷故不能

消穀^ク不消則脹滿而氣逆所以好噫而吞酸^ク氣息酸

臭^ク葛氏方人食畢噫^ク酢及酢心方人參二兩茱萸半

升生薑三兩大棗十二枚水六升煮取二升分再服

千金方治食後吐^ク酢水方干薑二兩食茱萸半升二味

涌^ク服方寸匕日二立^ク驗醫門方療食噫^ク或酢^ク响方萸^ク半兩

人參二兩吳茱萸二兩生薑三兩大棗十二枚橘皮一兩半切以

水六升煮取二升去滓分温二服又云療食後吐酢水食養

飯粥並作方 厚朴オホクシハク 吳茱萸カラスヒシカ 桂心ケイシン 橘皮各二 白朮各二 二兩

右搗篩為散空腹服方寸匕甚効

廣濟方療吐酸水每食即變作酸水吐出方

檳榔人十二六分人參六分茯苓八分 橘皮六分 畢拔

六分 搗篩為散平晨空腹取生薑五大兩合皮 搗絞

取汁温内散方寸匕攪調頓服之日一服漸加至一匕

半若利夕減以歲洩為度忌生冷油膩猪魚

効驗方治食後吐酢水洗一寒涼自 如酢漿食養即劇為胃冷二ヒ光

干薑散方 柴萸一兩 干薑一兩 朮一兩 甘草一兩 凡四

物治下節用酒若湯服方寸匕日三

治臨吐方第十六

病洩論云臨吐者皆由脾胃虛弱受於風邪所為也若風

邪在胃則臨暈間有停飲胃内有久寒則臨而吐其

伏長太息心裏澹然或煩滿而大便難或溏泄並其作故

養生方云八月勿食被霜菘向冬發熱及温病食飲或

心停不消或為反胃槎要方療臨吐此病有兩種一者積

熱在胃臨送不下食二者積冷在胃臨送不下食若是積

熱在胃^{ヤシクハ} 瀉^{ヤシクハ} 宜依合生薑根等五味飲^{アハシクハ} 昨之生薑根切^{アハシクハ} 一升

生麥^{ヤシクハ} 門冬^{ヤシクハ} 各一升 青竹茹^{アハシクハ} 并生薑切^{アハシクハ} 五合 伏苓^{アハシクハ} 五兩 右切以

水八升 煮取^{アハシクハ} 二升半 去滓^{アハシクハ} 加竹瀝^{アハシクハ} 六合 攪調^{アハシクハ} 分三服

博洛安衆方 治瀉^{アハシクハ} 逆不食方 厚朴^{アハシクハ} 三兩 去皮薑^{アハシクハ} 一兩 人參^{アハシクハ}

一兩 橋皮^{アハシクハ} 一兩 右水三升 煎取^{アハシクハ} 一升 分作三服 飯後服

僧深方 生薑湯 治食已吐逆方 生薑^{アハシクハ} 五兩 伏苓^{アハシクハ} 四兩

半夏^{アハシクハ} 一升 橋皮^{アハシクハ} 一兩 甘草^{アハシクハ} 二兩 五種水^{アハシクハ} 九升 煮取^{アハシクハ} 三升 七合

分三服 廣洛方 療脾胃中冷 氣每食即瀉吐方

人參^{アハシクハ} 二兩 甘草^{アハシクハ} 一兩半 橋皮^{アハシクハ} 一兩半 橋皮^{アハシクハ} 一兩半

葱白^{アハシクハ} 三兩 生薑^{アハシクハ} 三兩 切以水七升 煮取^{アハシクハ} 二升 三合 飲去滓^{アハシクハ} 分

溫三服 忌生冷油膩猪魚海藻 范汪方 半麥湯 治胃中乏

氣而欲飲死方 人參^{アハシクハ} 二兩 伏苓^{アハシクハ} 二兩 生薑^{アハシクハ} 三兩 白蜜^{アハシクハ} 五合

半復^{アハシクハ} 三升 凡五物以蜜^{アハシクハ} 內六升 水中^{アハシクハ} 燒之百過 以餘藥合

投中 煮得三升 分四服 禁冷食 治干飲^{アハシクハ} 之用此 醫門方 治

瀉^{アハシクハ} 逆 變吐 食飲不下 方 橋皮^{アハシクハ} 二兩 木^{アハシクハ} 二兩 生薑^{アハシクハ} 三兩

人參^{アハシクハ} 二兩 甘草^{アハシクハ} 二兩 右切以水七升 煮取^{アハシクハ} 二升半 溫三服 相

去八九里 止飲 橋皮湯方 橋皮^{アハシクハ} 二兩 干薑^{アハシクハ} 二兩 人參^{アハシクハ} 一兩半

以水六升 煮得二升 服七合 日三 新錄方 治瀉吐不下 食方

録驗方治熱區方蘆根茅根切各一升以水六升煮取二升

分三服 葛氏方治卒區宛又厥逆方生薑斤切棗

四兩水七升煮取三升適寒温服一升日本元日三千金方云諸飲

減心下堅痞葶藶間有水淡眩悸者小半復湯主之半復

一升生薑八兩伏苓三兩三味水七升煮取二升半二服又云凡

飲者多食生薑此是飲家聖藥也又云飲飲食九方生薑

湯二升頓服即吐又云冬飲吐法灸心俞百壯又方冬

葶俞百壯又方冬胃堂百壯又方原關五十壯又方冬

胃管百壯三報ツル又方冬脾募百壯三報

治干區方第十七

病源論云干區者胃氣逆故也但區而飲吐分而無所出

故謂之干區 僧深方治胃逆乾飲吐無所去人參湯方

人參二兩干薑 干薑四兩 澤クハ二兩 桂心二兩 甘草二兩

伏苓四兩 大黃一兩 八物以水八升煮取三升服八合日三

又云茱萸湯治干飲吐吐煩心頭痛方茱萸半升

大棗十枚 人參三兩 生薑六兩 凡四物以水六升煮取三升

五合日三服又方茱萸一升大棗十二枚以水七升煮取三升半分

三服又方半反干薑八等為散服方寸匕又方生薑

醫心方卷九

一種落款
可尋

汁五合蜜四合二物先煎蜜減一合竟投薑汁復煎

數沸稍クク啖之勿クク久クク則口強不可啖

范汪方治卒干欲煩悶方用甘蔗搗之取汁温服一升且

集驗方治于飲或干歲手足逆冷方橘皮四兩生薑

六兩切以水六升煮取三升服一升葛氏方治干嘔

不息方搗葛根絞汁一升許又方灸兩手腕後兩筋

中一夫名間使各七壯針灸經間使二穴在掌後三寸內兩筋間為腕及掌後節也

又千金方治干嘔歲厥方飲新汲水三升又方煮豉

三升飲汁又方濃煮三斤蘆根飲汁又方空腹飲

持思經曰夫者以四指為一升夫又以肌肉文理為解發會宛印之中

生薑汁又云灸干嘔方灸心主尺澤亦佳今葉明雲云在肘中縫上

又方灸乳下一寸廿壯

治歲方第十八其越及

病源論云歲者脾胃俱虛受於風邪故令新穀入

胃不能傳化故穀之氣與新舊相干胃氣則逆

氣逆目遇冷析之歲也其越及

葛氏方治卒宛不上方飲新汲井水數升今葉新

脹井華水二升又方但閉氣枳實一斤水二

又方好豉二升煮取汁飲之又方枳實一斤水二

煮取三升再服又方煮蘆根之佳今葉千金方濃煮三升飲汁

又方以物刺鼻中若以少許皂莢內鼻中令嚏即嚏カハラキキキイ

録驗方治欬歲橋湯方生薑四兩橋皮二兩甘草兩凡三物シシハカ

以水六升煮取二升一服七合日三新録方治宛方

單脹十沸湯任多少又方生薑五大兩合皮搗取汁服セヨ

又方茯苓根切二升水四升煮取一升五合稍回之

又方橋皮五兩以水三升煮取一升二三服又方冬核セヨ

下一寸又灸胃管穴ルセクリ服セリ 蕪菽本草注治宛方千歲アキラ

藜汁雀禹錫食經暑頰為粉和藜汁作粥食之小一名山羊

品方治宛方冬腋下叢毛中五十壯又方冬石閉

穴五十壯千金方治宛方冬兼一漿炷如麥七壯ヤシキ

又方冬各下四寸七壯又方煮豉三升飲汁カリヌ

又方空腹飲姜汁一升ハシカ

醫心方卷第九

光康

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

醫心方卷第九背記

病源論云夫飲酒人大渴而飲水與酒停聚胃中之上
蘊積不散而成癖也則令嘔吐宿水色如雞汁小豆汁之類酸
苦者故謂之酒癖類疾也

以上第十六葉

楮

陸法言云刃呂及釋氏之穀樹也惡木也
即身危之山多雜檀生孫插云木名
似穀子可以為藥也又名通天木
倫取為紙孫由之或作柠

以上第廿一葉

醫心方卷九背記

以上第六一書

合... 天木茶

... 煉樹也

以上第六一書

...

...

...

醫心方卷第九

醫心方卷第九札記

一頁下 引於轉背 此從下仁和 二頁下 如涎出瀆

八行 沫下 千金作刻而涎 五頁上 苗詭 詭訛 行下一汗

者 下今錄驗文異義同 行咳味 草體之 行一汗

寸列 外臺列古今 欲烟 外臺欲作欲下二欲 行三千

食方 仁和寺奉 行一 又方橫度 此法未詳其為灸何 行

推据其連前文恐不謂也 三行標記 喘食 息訛 行六

乏海 之訛之仁 寺 廿一行 慈白干 案于蓋幹之略

廿三頁 烟 仁 和寺 同 廿四頁 又云消食丸 仁

...

醫心方卷之十

寺本無此方案此三行以別紙補足始自廿六頁咀

後增之此方又為前條所載則無者似是

咀字加筆似黑廿九頁生薑根等生薑根切寺和

仁和本寺本作黑廿一行又方橋皮此以下缺

二董字共作廿七頁又方橋皮此以下缺

蓋宜後改廿七頁又方橋皮此以下缺

廿七頁又方橋皮此以下缺

廿七頁又方橋皮此以下缺

廿七頁又方橋皮此以下缺

廿七頁又方橋皮此以下缺

