

医則

坪井信良著

富士川文庫  
X  
490.15  
I & - Z



490.15  
I

No. 909

三則類言

方今至學而誠人各有著述。翻譯之著。皆以經卷題。  
其後開榜更起諸書。繁多不傳。唯長安本藥論。  
本圖有文甚可謂之大成之作。近復南歸本外史  
刺史水頭成無以爲足。故以爲序。非是空論也。而其失傳者  
或猶存之不傳。故曰。不能。治門。故李氏曰。反  
其道而行之。其理固當。蓋雖不能傳。而其說平  
和。若能合。則合。若不能。則不。故曰。隨復。是全。有諸多獨在。最去  
地。而之者。論復。謂此。作此。皆非太。有。力。客。人。不。能。  
此。亦。全。之。才。劣。何。致。然。其。從。微。是。今。所。深。喜。之。要。



篇文

卷

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

一百十

一百十一

一百十二

一百十三

一百十四

一百十五

一百十六

一百十七

一百十八

一百十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百九十一

一百九十二

一百九十三

一百九十四

一百九十五

一百九十六

一百九十七

一百九十八

一百九十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六</p



吉士川文庫

238



医則顯言

方今医学漸盛、人各有著述翻譯之書、務以啓、卷愚  
蒙、尤闡涉医更之諸書、槩無所不備、唯恨蒙法總論  
未聞有其書、可謂一大厥典也。若彼蒲串渥<sup>ナツクニ</sup>氏、昆  
私貌尔原氏、虽有著書、亦是各論也而已。夫各論者  
魚知鶴之不洞識、總論則不能活用也。故某氏曰、蒙  
法總論者、医学之基礎也、基礎不成、何以謂修医乎  
若知總論則各論者可隨領矣。余有意焉、竊企蒙法  
總論之著、而復謂、述作其書、自非大有力之人、不能  
也、知余力乏、才劣、何敢堪其任哉、且今方原書之委  
譯之則適、希望者亦不少也、仍撰其最可賣者而得

此斯布欽傑爾氏之書、所譯者即是也。其篇則「医学總論」中之弟六篇也。既而方譯其書，塗医校都講艾君難之曰：「其書也，其說僻理，其文過簡，恐誤初學矣。而全聞其難也，譯將過半，故不忍休止。」其業乃簡者，詳記之畧者，揭示他篇以增補之。改革其並，編成其書矣。

蓋原書中所記，浮血又徵，文意太簡，初學謬惑者，或有其人乎？夫浮血者，施之適度，則其奏功甚偉，若誤施之，則招大害固可知也。貌爾烏私洎乙氏派廢棄之貌，永運氏派過信之，同是偏倚，大害治術，故令竊增衍原文，蓋是非以臆度，非羨貌外而求各譽也。皆

名哲扶歌蘭度氏記一千八百二十四年 日記中所載者  
鳩爾萬斯布欽傑爾先生之名譽，其以著書之多也，  
普知之，固不贅余言矣。

村落僻邑之医輩，乏師友，又無誓，不能直讀原文者，  
熟讀其書，於識更滋之要領，不無少補也。

和蘭紀元一千八百二十四年十一月七日 我文政

護鳥達 剥鳥爾誌

卷之二 教導周氏醫學

序

卷之三

卷之四

医則總目次

第一 學医

第二 理研医術諸件

第三 察病

第四 良能治力

第五 對徵反徵總論

第六 對徵反徵精義

第七 撰藥總論

第八 對徵區別總論

其一 痘係補益機者對徵

其二 痘係觸動機者對徵

其三 痘係知覺機者對徵

第一 網 变化變解

一 痘收斂方

第二 痘發和方

第三 痘變化生力調護

四 大進退方

五 轉換方

六 鎮靜方

七 消癥方

第三 綱 變化流弊

八

誘導方

古謂血液又行

九

解癥方

十

排洩方

艾一 泻血

艾二 排除第一道汚物

復胃液 碎阻石 化毒物

驅凡氣 殺諸蟲 進化熟

艾三 涌吐方

艾四 泻下方

艾五 利尿方

艾六 呕瀉方

其其七 祛瘀方

十一 克制諸液失宜之運行

艾一 閉失血

艾二 止脫液

艾三 開閉血

目經閉 停血閉

十二 復治諸液失宜之泌別

第4綱 致穩死之法

医則卷之一 目次

弟一 医學 第一章

弟二 痘瘍医術諸件 第十二章

弟三 察病 第十七章

弟四 良能治方 第二十四章

弟五 對微反徵總論 第三十一章

弟六 對徵反徵精義 第四十八章

弟七 檢葉總論 第六十章

弟八 對微區別總論 第六十七章

其一 癥係補給機者對徵 第六十八章

其二 痘係觸動機者對徵 第七十章

貞三 痘原知覺機者對徵 第七十二章

医則卷之一  
大目的ノ大病ノ治ス・ト云「今許多外疾  
夫レ疾癥ヲ排除シ健康ニ回復セシケルハ医ノ  
病医業ニ據ラスニテ自テ治スル者アリト全皆  
医則ニ倣ハサル者十ニ此医則ヲ知ルノ學之ア  
テラヒト云而大ニ般ノ別アリ曰ク諸病ヲ總  
記シ其治則ヲ述ル者之ア處法總論ト云又直チ  
ニ各病ヲ細論シ其治法ヲ記スル者之ア處法各  
論ト云是ナリ又別メジキナリニカナル者ア

オ二章

非是其一箇々人患者ニ臨テ各自ニ其處法ヲ託  
タルア云々論述ノ文書也。」  
此學ハ藝術ノ基礎ニ大猶度學ノ壬近舟子ニ於  
テル力也。之ヲ領解スルニ非サ。ハ治法ヲ企  
立スルノ能ハス。故ニ運ノ病ヲ治スルハ此學ニ  
依頼セサル可ラス。是賣菴子ト異ナル所以ナリ  
賣菴子或病ヲ治スルトアリ。雖モ自ラ其何ア  
以テ治セシヤア知ラス。是他ナシ。其則ア知レト  
知ラサルトニ由ル。」  
故ニ治ヲ覆スルニ方テ先ツ以則ア知ラサル可  
ラス。上虽然レニ病性病因憶伏シテ知ル可ラサ

オ三章

「首ニ於テハ曾ニ試験スル所ノ菴岳ア以テ其  
功害ヲ計リ或ハ未久曾テ武ニサルノ新法ヲ以  
テ其心否ア見ルヨウ。他十二年テ疾痛古來十キ  
有ニメ。今始メテ現ル者アリ古哲亦詳説アリ。又  
病性知ルハシト區各人必ス固一般ナルア滑ス  
牽因誘因相異ナルヲ以テ處法隨テ異同十キア  
滑ス故ニリクテル氏ハ世人ノ下剤ヲ過用スル  
ア葉止スレ。肝液熟ノ脈大疾ナル者ニハ刺絡  
ア武ハヘシ土ス。」  
凡ソ百般ノ疾痛必シモ医菴ア要スルニテラス  
實ニ人カソ及ス可ラサル。際ニ於テ人医菴徒ニ

効十キノミナラス更ニ害ヲ貽スアリ又輕患ニ  
テ良能ノ力自テ治スル事足ル者ハ芸品ヲ要  
セス然ルニ妄ノニ莫用スルキハ却ア妙機ヲ偉  
碑ニ許多ノ惡症ヲ誘起スルキ至ル故ニ良能ニ  
依頼スルキハ病治スル者甚々漫レ古語ト曰ノ  
医首良能ノ臣僕ナリ  
貴要ノ諸機変調スルカ若クシ生力衰憊スルノ  
病ハ医学ノヨク救ノ所ニ非ス之ア治セムトス  
ルハ害ア十スノニ故近名哲依ト氏曰病及極度  
者医術非可治也ガニス瓦列氏曰今夫高貴ノ人其病終  
末可疑者人慮其及不治則受汚名シテ無敢施治者無

然是里精細注意我烏不治以所辨之患者而賣芸  
子或能治之則是受汚名也故ニ病治ス可ラサレ  
者ニ臨テハ唯仁愛ア以テ患者ノ意志ヲ慰勞シ患  
苦ヲ救フヘシ依ト曰二件ノ戒アリ曰救生曰勿  
害危急ノ疾苦ヲ除キ痛モテ鎮止スル者ハ生力  
ノ景况病性病因ニ注意セヌメ徒ニ本病ア治セ  
シトスル者ニ勝ルト常ニ多ニ病危篤ニメ術イ  
及フ可ラサル者ニ臨テハ患者友ニ看侍者ニ明  
ラカニ之ヲ説典ニ徒ラニ空望ア企テ、氣力ヲ  
賣サシケルト勿ルヘシ病之ヲ自然ニ委スルキ  
ハ危險ニテ必死ナリト矣新法ア施スカ或ハ

曾テ偶ニ効アルノ試法ニ由テ始テ治ヲ得ル者アリ是蓋シ常法ヲ以テ治ス可ラサル者アリ「水銀ノ用法不知ノ際タハ梅毒未タ全治ヲ得ス猶吉邦ノ用法ヲ知テ后頑固ノ間歇熱始テ治ヲ得ルカ當ニ又儀膜咽喉瓶衝ハ古未危険ノ病ナシ得レ者多シ故ニ古未不治トメルノ病今時始テ治ヲ得ル者アルカ如ク今時ノ后世ニ於ケルモ木奴ノ如クナルヘシ是ヲ以テ幼年ノ輩ト翁或ハ実驗シ未ルノ妙法アル可キア以テ猥リニ之ヲ輕侮スルト勿ルヘシ

ア碰ア不全治法ア行フヘキノニ

章

夫レ病者ニ對シテ法ア震スルノ前先ツ医治ヲ  
建立スヘシ而メ病變異セサルノ間ハ務テキノ  
諸ア違背スルト勿ルヘシ但シ茱西ハ或ハ轉ス  
ルトナリ蓋シ病ノ由テ起ル所ヲ知レ中々殊  
此則ニ依ルヘキト理固ヨリ然リ敢テ諸症ニ眩  
惑スルト勿レ庸医ハ一症ノ新發スル者アレハ  
確ア其法ヲ変スルニ至ル是依ト氏ノ所謂試法  
ナク以ア何レ力益何レ力損ヲ試ルノ迄毛列氏曰医  
法一立則常賴<sup>ト</sup>之不<sup>ト</sup><sub>轉カ</sub>變者謂之修医也医ノ確正  
トハ他十シ其一立スルノ考ニ依テ假令茱物ノ応

否ハ必シモ適ナラスト金他路ニ往歩スルトナ  
カレ常ニ正路ヲ踏ム者トニ医法一立スル時ハ  
敢テ変スルトナク到底之ニ依ルト福弗滿氏毛  
亦賞讃セリ「新發ノ諸症疼痛等ニ時日スルト勿  
テ茱カノ頭眩原病ヨリ甚シカラサル者ハ又自  
テ治込茱茗ノ頭眩甚シテ本病ニ比スルニ更ニ危險  
ナル者ハ速テ其品ヲ退クヘシ蓋シ医ノ目的公  
健康ニ復スルニ下リ」  
大ヒ全治法ヲ施スハ先ツ其疾病ノ部ニア  
シ夫常如何原因此何ツ計リ后軀負外何ヲ察シ

而メ始メテ速法ヲ定ムハシ毛鄭氏曰以一法不可施諸患者若夫軽負兩人則異况於諸人乎今凡土病ト虽各人必ス一般丁ラス其固有ノ軽負ニ従テ后其サバ許ノ別サキト能ハス依ト氏曰勿不勞勿預定ト是明言ト云ヘレ医常ニ服膺シ病者ノ諸行ヲ熟考ニ蓋レ基礎成テ而メ后始テ治法ヲ定ムハレ

毛氏曰治方今之症傍后未之症故ニ病治スヘキ所以ノ證候分利アレニ取レハ諸症治スルニ寧意又ヘキニ取ス毛鄭氏曰此其病不善亦夫レ簡法ア以ア病疾ア速治スルハ寔ニ費スヘシト是病必ス各般ノ時期ア經過セガル可ラス其時期ハ短端ス入キ者ニアレス之ヲ障止スベハ必ス塞ア賜スナリ「今諸般ノ熱病ニ於ア小懈ス未熟期ト烹熟期ト分利期アリ皮膚病ニ在テハ尤顯著ナリ豈ニヨク之ヲ短端スヘケシヤ他病ニ於アモ亦然リ故ニ速治法ヲ求ムレキ無ク緩治法ア施シテハ諸力ヲ補佐ニ一ニハ終

帰ヲ全クスルヲ以テ侵サレリトス故ニ發府臨テハ密カニ其病状及セ終帰ヲ知ルニ未レハ忘リニ劇薬ヲ投スルヲ勿レ依ト氏曰医尤要知時期薬尤要適時期毛列氏曰以速治法或弊患者不苦以緩治法費時日也

還里ノ患者ノ意ニ逆スルヲ勿ル入レ患者シテ安寧適意ナルニムルハ則仁術ナリ医ヲ信シ医ニ懷ク是仁術ノ面目ナリ」依ト氏曰凡叟要適患者之意居室衣衾食品飲料專要清潔其害不甚者隨嗜好飲食之可也」耳ツ医ノ患者ニ對スルハ居止舉動言語等專ラ溫和ナルヘシ是古來ノ定規

トス」某氏アスクレピオテスハ患者ノ意志ヲ寧靜スルハ以テ医ノ専務トセリ「依ト氏曰医危懼則知其術之拙疎暴則見其學之不習故ニ宜ク過懼スルヲ勿ルヘシ又徒テニ信用ヲ望ケタ勿ルヘシ

第十三章  
第三 疏闊医術諸件

第十三章九ソ治法ヲ覆スルニ方テ医術ヲ疏闊スルハ大難也トス件貞美甚ダ多シ悉ク之ヲ記スルハ大難也トス良能ノ機力不給ナルハ論ナシ医者及ヒ患者ノ癒新固有ノ時頃等ニ由テ医牛之ヲ排斥シ能ハサル者亦甚ダ多シ今其教件ヲ記ス

其尤ビ大ナル者ハ則其地君長ノ政令嚴正ナルカ故ニ民間賣菜子ヲメ病者ニ施治セレムル是ナリ某氏ノブ曰使非脩医者司世命实爲危険矣而民屢多安受之者可長難息也今有人自称医者則不察其術之巧拙舉世信之於他術則不然

也其無醫之法又無刑医之律医或置人命於危  
險以脩我學殺人以為我試或誤治至殺人亦曾無  
變形者可謂医得大免許者也」医術缺等ノ理手ニ  
屬スルア以テ我道愈<sup>卓</sup>卑ノ病治ア得サル者愈多  
シ而ノ民心甘ニメ庸輩ア信シ却テ学術齊練  
医ア尊敬セサルニ至ル今一患者アリ始メ治ア  
脩医ニ清テ其處法ノ速功オサア見テ謂ノ其医  
我力病ア治シ得スト乃チ庸医ニ託スルニ其輩  
偶然ト無害ノ菜品ア投シ或ハ害アルモ甚レカ  
ナルキハ良能ノ機力之ヲ償フニ足テ病治ア得  
是ニ於テ拙牛益信ア得ルトアリ」又菜品ア誤施

ス・ト・魚・良・能・ノ・妙・機・ヨ・リ・之・ア・制・杜・シ・以・ア・病・ア・海  
ス・ル・ト・ア・リ  
民心ノ通弊医術ヲ妨クルトアリ則疎忽ニシテ  
学更不答智慮不明ノ輩アリ曰メ造化メ賦生於  
人身固有逮限非人刀以可增減遂乎惡得能增加  
之乎又新奇異聞ア嗜好スルノ僻習アリ今有人  
曰我能以一滴之菜水一匕之菜末瞬間治癒瘡  
疾或曰我唯驗尿以能察病性病固或有預言病之  
終歸吉凶<sup>上</sup>何者此等ノ輩ア尊信シテ却テ空言  
ア吐ク十ノ脩業十ルノ医ア信セサルニ至ル  
又曰ノ各病必ス各自ノ妙効菜アルヘシト彼患

者ノ体貞病曰ア論スルトナク甲者ニ偶功アリ  
シ西ア取テ直チニ乙者ニ服セシメント欲スルニ  
至レ夫レ各土ノ通弊ニメ民心ノ愚昧ニ原スル  
者固ヨリ貞地岩長タル者ノ失業タルヲ以テ我  
輩ニ關涉ナシ故ニ黙止ス

又患者各般ノ誤憲アリテ以ア医術ア妨タル者  
毎ニ少ナカラス蓋シ其原惑ハ意識ニアリ或ハ  
体貞ニアリ或ハ外物ニアリ」医者志意鉢暗ニメ  
痛目ヲ探ラス又學度ナリ患者固ヨリ無智ニメ  
審ニア内外ノ原因ア説カス」又患者鉢暗其説ノ  
所詳十ラス何レカ患部タル疼痛ノ狀如何ア明

カニセス婦人ノ如キハ恥テ其病收ア隱ス者ア  
」尤ノ梅毒脱腸等平病タヒニ患者恥テ之ア説  
クナク大ニ治術ヲ妨ケルウアリ」思慮ノ謬誤  
害ヲ十スリ亦少ナカラス患者ノ嬉好アレト短  
慮ナルト是ナリ今服薬スリニ其効驗甚速ナラ  
サレハ乃チ曰此薬終ニ効ナシト或ハ后服ア止  
ム又苦楚疼痛アルハキア憲リ敢テ残術ア經ナ  
レメザルアリ」又丸ア懼レ、1甚シノ以テ諸刃  
ア沉襄セシムルアリ」又衣服飲食葉宜ア論セサ  
ルアリ」病寔ニ復固既伏シテ医薬効ナキアリ」又  
看侍者踰暴ニシテ捲生適ナラス服薬度ナシ却テ

病アシテ益頑惡ニ陷アシケルアリ  
医ノ殊拙ナルト思慮ナキト亦治法ア尋ノルト  
アルフ以テ黙止スルトヲ得ス」疾痛ア誤察レ  
皆隨ア誤ル者多ニ是ヲクハ思慮足ラサルト察  
病ノ疎ナルト學更習僻アルトニ原ス」又尋較清  
寃スタル所ノ理學ノ如キハ我術ア潤色スルニ  
足ルト余ニ或ハ其說偏偉テメ即ち実变ニ翻詰  
スル者アリ」医或ハ徒ラニ外貌ア銳リ片言以テ  
病ヲ察セントシ訂閑セサル者トウ」医業効ア知  
テス數方唐ア轉シ又配合宜ア失スルアリ又好  
テ新菜ヲ用サント欲スル者アリ」夫レ新菜合未メ

其功害ア審カニセスシテ妄投スレハ害アルヘキ  
ト固ヨリ知ルヘレ」又徒ラニ名譽ニ走リテ虚温  
知彼法ア賞揚シ却テ良能ノ妙機ア竊ノル者ア  
リ又毒菜ア妄投シ害ヲ招クトアリ」尤ニ卑ニム  
ヘキハ医ノ無聰トス則チ底方處ソルニ定則十  
ノ日、菜法ア轉シ或ハ多種ノ菜品ア併用ス」此等  
ノ輩ハ良能ノ妙機ア妨害スルヨリ他十<sub>萬</sub>萬  
ソ能ノ病ア治スルトヲ得ニヤ

## 第三 察病

医患者ニ臨エ且治法ヲ企ツルニ方テ先ツ其病  
 ノ原因ヲ探索スヘシ是レ醫ニ學術ヲ弘メルノ  
 云ニアラス実ニ病ヲ治スルニ最尤要務トスル  
 許ナク其狀ヲ探索スヘキ人與ハ死ノ如レ  
 痘者人說ク所テ聽キ其緊要人者ト無要ノ者ト  
 ヲ別別シテ容体如何。聽クハ尤モ鄭重知ル蓋シ我臆度ヲ以テスル勿れト甚矣  
 シ且ソ患者ノ說ク所固ヨリ緊要ノ者ト無要ノ  
 者トヲ混出スレバ免カレス故ニ宣ノ鄭重ニ  
 聽取シ其如何ヲ判スヘシ医ノ顏色容貌專ラ溫  
 柔ナルヘシ患者ヲシテ穏靜。詳說細詰セシム

ヘシ動モスレ人危懼シテ黙止スル者アリ其説  
ク祈詳悉セサレハ再復訂問スヘシ医宜ク寛柔  
仁愛ナルヘシ患者淳薄ナルモ卓恵セシムルノ  
勿レ無禮ナルモ妄トニ徳戒スルト勿レ煩定ノ  
詰問ヲ以テ一診シテ病性ヲ確定セバト  
誤トス再一診察シテ而メ后始メテ其病性ヲ知  
ルトヲ得ル者アリ又患者ノメシモ諸件ヲロ  
演セシメントスルト勿レ顔色容貌嗜好嫌忌等  
ニ由テ推察スヘキ者アリ而ルニ強テ患者アメ  
能力シハルハ之ヲ恥カレタルモ故ニ余年探  
テ其脱肠ヲ知リ望テ其陰部ノ腫瘍ヲ察セハ更

ニ又何ヲカ詰問シヤ  
又其復問スルノ次序ハ古來諸家同シカラス或  
ハ先ツ年齢ヲ問フ者アリ或ハ先ツ原因ヲ問フ  
者アリ又先ツ失常機触如何ヲ聴ク者アリ余カ  
見ヲ以テスルニ先ツ患者家父最此苦意スル處  
如何疼痛何ノ部ニアリヤ發症時何ヲ問フヲ以  
テ最一急務トス斯ク質問スルキハ病者ニ近接  
信スルト甚々切ナリ蓋シ病者ノ医ヲ招ノハ專  
テ當今苦酸スルノ疾患ヲ免ケントスル力有  
ナリ而レニ病状ニ臨テ直ナニ其年齢ヲ問フキ  
ハ婦人人也キハ或ハ恥テ其医ヲ嫌忌スルニ至

ル故ニ先ツ疼痛苦楚何ノ部ニイルア問フ氏ハ  
病者自テ對フルト能ハサル片ハ首侍者代言ス  
ヘシ由テ患状如何ア知リ體テ之ヲ鄭重詰問ス  
レハ病性乃干知ルヘシ又患者ノ容顔顏色眼目  
起居動靜等ニ注目スヘシ由テ諸力ノ景<sup>光</sup>神<sup>氣</sup>性<sup>活</sup>  
因ヲ察スルノ一助ト為スヘシ上ノ諸件ヲ探索シテ后諸癥症ニ及フヘシ之ニ  
由テ患部及ニ原因ヲモ知ルニ至ルナリ但シ其  
一病タ見テ以テ病性ヲ確定セントスルト勿レ  
宜久悉ク諸癥症ヲ參考レ始テ之ニ及クヘシ且  
凝流ニ軀ノ景光及ニ神全機能如何ア察スヘシ且

ツ其諸症發作如何間歇スルカ智當スルカア問  
スヘシ又病ノ起ル所ト終ルトア問<sup>ク</sup>且ツ其初  
起始何時何處何時問フ機系ニ係ル者ト自ラ別アリ但シ許多ノ病疾皆此三機系  
ニ關係セサル者十ニ其主ト失常トト不  
ト交感ニ由テ波及シテ失常スル者ト判然差異  
ナキト能半ス<sup>大體必</sup>ナ<sup>ニ</sup>憑音ノ言葉ニ附  
義症ヲ参考スル片ハ或ハ知ルヘシト雖又別ニ

注目ヲ要スル者亦是在リ在ニ弁別又ヘキハ諸力ノ壓抑ヨリ来ルノ衰弱ト真ノ衰弱ト是ナリ疑似ノ間ニ於テハ必スレモ患者ノ言語ニ拘泥スルト勿レ病者父兄苦楚ノ甚シキ力為メニ真ニ衰弱セリトキトキ其原ハ却テ血液貴重シ歟積タルカ若クハ疼痛痙攣ノ甚シキ力為ナリ者アレハナリ」女ノ假衰弱ナ眞衰弱トハ外貌景狀其他相近似スト虽其原ハ骨壊相爻スルナリ宜ク患者ノ年齢攝生体質及ニ原因諸症等ヲ参考シテ之ヲ弁別スヘシ

以テ年齢ヲ問ノ老人少年各艾固有ノ疾患アシ但シ婦人ニハ直ニ口演セレメサルビ他ノ容貌諸状ア以テ察スヘシ

又摄生生業所務ヲ問フ生業所務ニ由テ病性ヲ知ルヘキ者アリ例スルニ白粉近ハ鉛毒ヲ患クル者多ク磨工ハ胸患ア得テ下多ク讀書生ニ下肢痛受キ力也ニ

又家務活計ハ病ノ發起スルト轉移スルト  
關係アル者タリ

又其習僻好惡ヲ問フヘシ

又其父母ノ軀體如何ヲ問フヘシ病或ハ先天ニ由ル者アリ殊ニ痛風結石腺病等遺傳ス

又患者一異國有ノ躰膚下リテ整少ノ刺戟物タ  
レニ非常ノ大抗拒ヲ發スルトアリ今彼葉スル  
ニ其効功人必シモ一般ナラス亦以テ躰膚ノ  
異同アルヲ知ルヘン  
最後ニ注意スヘキハ誘目トス又其地方固有ノ  
風土病アル知ルヘシ又流行病性ヲ知ルヘシ是ニ  
田テ童ニ其病性ヲ知リ愚ルノニアラス又預  
メ其終帰如何ヲ知リ以テ治法ヲ企ツルノ一日  
的フ得ルナリ

第四 良能治方  
丸ノ医患者ニ臨ミ將焉治法ヲ定メントスル前  
此ス先ツ患者ノ生力ヲ察スヘシ生力ナハ則チ  
人身常ニ存スル所ノ自然治病ノ良能ナリ医者  
若シ能ク其妙機ノ嚮々所ノ方ア得ヘシ所謂坎ノ  
ムルヰハ則チ最勝方安ノ方ア得ヘシ所謂坎ノ  
自然治病ノ良能ト云他ナレ彼平日飲食運動等  
シ百骸ノ營養シ一身ヲ保持スル人生力則干是  
ナリ而メ良能ニ般ノ機能アリ又一ハ外物ノ刺  
衝ヲ感受シ其刺衝ニ由テ自ラ一種ノ運営ヲ起  
スナリ其ニハ刺衝物ヲ變化シ自己ト同質ノ物

ト十シ又其意ニ変化スヘカラサル者ハ之ヲ併  
外ニ排除ス是ニ依テ常ニ能ク異病ヲ消化也某。將ニ破壊セトスル者ア防拒ス。余体中一部缺

良能ヲ失ス叶ハ則テ其人斃ル改ニ之ヲ生カト名シ病ナル時ハ則テ其人斃ル故ニ之ヲ生カト名シ病ナル時ハ良能非常人刺衝物ヲ得テ以テ變機ヲ起ルト相抗拒レ貞自然常態ニ復セントシテ發スル所ノ者ナリ諸般ノ症候皆凡ルニ由ル疾病各増進減退分利之期アリ其理體テ知ルヘン故ニ病ヲ治セバト欲ス此者ハ必ス良能ノ力ニ由アサルヘカラス。医若ニ之ヲ外ニメ病ヲ治セント欲スル時ハ多方之ヲ攻ルニ竟ニ寸験ヲ得

不思レ先哲ノ爻復討論スル前ニメ万古不易人道ナリ

テ廿六章急姓病ハ某ア服セヌメ自テ治スル者多シ是レ病勢急劇ニメ良能ノ戰抗スルノ力餘アレハ丁山緩姓病ハ脹某又ト無氏難キ者多シ是レ病性緩慢ニメ良能ノ力ヲ用フルト隨テ微弱トレハナリ尤ツ病ヲ治セント欲スル者先ツ其斯能ヲ知ラサル可ラズ否ラサレハ則テ某皆妄役トス。其初限ニ在テハ則テ良能ノ力未タ病毒ヲ驅除スルト能ハサル者多シ必ス先ツ諸般ノ證候ヲ續巻シ病毒溶解烹熟シ而メ后始テ分利ス

ヘキノ時ニ至ル然レニ病毒至烈甚ナルカ若クハ  
身軀至脆弱ナレハ則千枚時ニ至テ生力全ク衰  
弊シ元復又振フト能ハス病毒分利ノ期ア得ス  
終ニ死ニシ医者若レ此ノ死半症ニ逢ク亦ハ必  
ス十全細心精察スヘシ何士十レハ病末期亦紀  
爵シテ恰ニ直襄弱ニメ復又振フト能ハサルカ  
如クニメ而メ其究良能憤懣シ忽チ分利ノ疾ア  
博テ一生ヲ万死中ニ得ル者アリ此症真ノ衰弱  
ニアラス軍々卒カニ之ア必死ト為シ並視スル  
コト勿ヘシ

諸般ノ癥症ハ良能瓦常態ニ復セシト欲メ矣ス

ル所ナリト虽其勢大過ナレハ却テ身軀ニ害ア  
リ军ク之ヲ抑損シテ以テ其軍ニ適セシムヘシ或  
ハ貞勢不及ニレテ以テ病毒ヲ制尅スルニ足ラナル  
セノアリ军ク之ヲ補助シテ以テ其度ニ達ゼン  
ムヘシ  
医者須ク良能治病ノ趣向ア察スヘシ第一患者  
ノ好惡如何求ム以所人飲食衣被坐臥ノ狀脉  
時瞬目举手動足ノ状ヨリ言語ノ輕重疾徐等ニ  
及フ延審ヲカニ之テ察スヘシ是處法ア宗ケル  
ノ助久ルナリ腐敗熱ノ酸物ヲ嗜ム神呈然ノ酒  
ア欲スル皆能妙機ニ由アサル者ナシ然レヒ

モ黒胆液病ノ將ニ狂疾ニ罹テシトスル者ノ妄  
 タニ異味ヲ嗜ムハ其論アラタニ是レ胆液ノ變  
 性酷厉トナルノ致ス所ニナ以テ治法ヲ定ムル  
 人則トナスヘカラス  
 良能ノ病ノ良スルニ又一種ノ病アリ允得  
 ハ刺衝物生弊又侵襲スレハ則チ生力噴起シテ  
 一旦狂發スルカ或ハ靜息スル人時ナリ是レ自  
 然人常則ナリ諸疾病人自取治スル者アレ不理  
 亦タ知ルヘシ從前急張スルノ生力一旦弛緩ス  
 ル時ハ則チ体中存スル所少分療機能方ニ困難  
 ル者隨テ一変シ閉塞スル者自ア開通シ游滯  
 スル者ハ自ア漏利ニ是ニ於テ分利ノ候ナクハ  
 過度ノ勞心アルカ若クハ連宵寢子サルテ久則  
 千躰中ノ諸液一種ノ變化ヲ受ケ因テ熱若クハ  
 痘瘡ヲ發シ於ニ臭汗ヲ漏泄シテ諸症解散スル  
 ワ得ルトアリ是レ勞心不寐ニ由テ液性變化シ  
 熱若クハ症事等ノ症ヲ發シ正邪相戰ニ成第  
 此時ニ於テ之医者ノ務々ヘナ所ハ唯患者ノ身  
 体ヲ休息シ其心思ヲ安靜ニシ其液性ヲ緩甘シ  
 其アメ分利易カレシハレニアリ夫人分利之道

路ハ之ヲ良能ニ委任スルア可トス之ヲ医者能  
ノ承領於良能ト云  
又良能病ヲ治メルノ一法アリ則チ一身ノ病ア  
度シテ一部ノ症十十<sup>ニ</sup>能ク一身ヲメ疾苦ヲ免  
カレシムル有ノ如キ是十カ今一患者アリ病  
全身ヲ侵襲シ百器ヲ衝撞シ充ニ諸般人症候経犯ス  
ルノ后忽テ一部ノ病癒シ復動シ諸般人症候経犯ス  
若ノハ體瘍ヲ表シ一身ノ痛楚一旦脱然トシテ  
鮮數ス医者若ニ此ノ如キ症ニ臨テハ宜ク其一  
部ノ症ヲ助ケ長シ一身ヲメ速カニ其痛苦ヲ免  
カレシムヘキナリ然レニ良能ノ運営未々其止

ヘル所ヲ知ラス一身ノ病症方ニ盛ナルノ間ハ  
宜ク謹テ弃リニ方策ヲ以テ一部ノ刺戟スル  
勿ル入シ或ハ却ア妙機ノ響ノ所ヲ擾動シ分利  
アシア終ニ其所ノ得サテシムニ至ル叢汗方  
吐下剂若シクハ痰泡膏等皆宜ク此方ニ從フ  
シ此時ニ在テ之医者ノ務ハレ所唯患者ノ飲食  
ア節シテ輕媛ノ菜ヲ投シ腑中存ヌル所ソ極微  
ニシテ秤量ス可カラサルノ物實見温寒等の相  
激迫スルヲ減靜シ其全身ニ分賦スルノ平等十  
テサルヲ调理シ以テ諸液ノ泌別ヲ協和シ病毒  
ヲシテ分利シ易カテシムニアク依ト氏曰溶化

流利、毛列氏曰稀釋鮮散、ト共ニ諸嘗ヲ開達シ凝  
液ア溶解スルア云スル  
又良能交感對衝ノ法ア以テ病ヲ除スルコトアリ  
故ニ病毒本一部ア刺衝スル者新ニ他ノ一部ニ  
於テ一種ノ刺衝ア得ル時ハ則チ艾初メ博  
研ノ疾患自テ解散スル者アリ今耳腺<sup>導肺</sup>微衝<sup>ア</sup>惡  
フル者新ニ陰部ノ微衝<sup>ア</sup>博<sup>ア</sup>叶ハ則チ本患隨  
テ愈フ然レニ医者女症ニ於ル當時流行ノ病性  
及ヒ良能ノ妙機專ラ其ニ傾クノア察スルニア  
テサレハ卒カニ術ア以テ之ア催進スルコト  
勿レ

又覺機ノ分配不齊ニメ却テ舊病ヲ治スルトア  
リ是亦夕良能ノ一種ノ法ナリ故ニ患者胃ノ麻痺  
ニ由テ消化機衰弊ニ金錢缺損スル者新ニ痛風  
ヲ得ア文節疼痛若ノハ症辛ア發ニ此ニ由テ消  
化機辛カニ復シ食欲頓ニ進ム者アリ患者坎  
窪レテ常トナル者八患者宣久術ア以テ貪痛甚  
症辛ア誘起スルヘシ其法ハ則チ神至久池護  
禪シ血行ノ遲慢ア催進スル等是ナリ  
又良能創傷ヲ治スルノ一法アノ大ニ上ノ諸法  
ニ異ナリ創ナ創傷ノ部ニ於テ一種ノ微衝ヲ生  
シ以テ凝液ア分泌シ若クハ農計ヲ漏洩シ創口

自々愈合スル者是十り然レヒ全身ノ諸症

寒熱

全ク退キ唯創ヲ受ケノ一部ニ火毒焮衝醜膿等

ノ症ヲ遺シ而メ后始メテ功ヲ奏ス是他十日知

覓機ト補給機トハ盛衰相互ニスル者タルア以

テ全身ノ諸症未タ退カサルノ間ハ一昇ハ知

機尚盛ニメ補給機之外同時ニ振フト能ハサレ

ハナク改ニ医者創傷ヲ治スルニハ軍ノ兵士ニ

隨テ全身ノ諸症ヲ鎮靜スヘシ若シ其焮衝ノ度

不及ナル者ハ軍ク之ヲ催進シテ以テ醜膿瘍愈ロ

ノ勢ヲ助クヘシ

又良能止ムトア得スメ時ニ之ヲ用ル一法アリ

末世四

其法体中一部病毒ノ至盛ナルカタメニ鉛養度

ヲ失レ或ハ其常ア変シ終ニ其舊ニ復スヘカラ

サル者ハ良能噴起シテ其未タ全ク死痱セサル

者アハ竟ニ腐敗壞セシメ其ニニ腐壞スレ者アハ

隨テ之ヲ攘除ス故レ寒熱壞疽及ニ腐骨疽ニ於

テ數々目擊スル所十り蓋シ此症ニ於テハ医者

精細ニ注意太詳カニ其可否ヲ察スルニ非シハ

矣リニ薬品ヲ用テ其腐壞ノ勢ヲ助クルト勿レ

何者病勢アシテ其適度ニアラヘルトハ医手

ノヨク十ス衍ニ非テス唯當ニ其近部ノ生力ア  
保持シ其ニニ変性スルノ部分ト離持シ易カア

シムヘナノモ但ニ良能虛弱ニメ其功ヲ遂クレニ  
ミテサルカ若クハ死肉ノ攘除ヲ妨クル人曰タ  
ル者ハ医者斯然トメ格鉄ヲ以テ燒絶ニ或入快  
刀ア以テ切除スヘシ然ル。医者察セス往ラニ  
輕創緩方可テ投レ悠々日ナ消スルキハ竟ニ大患  
トナリ復タ救フヘカラサルニ至ル

三十九

弟七 對徵又徵總論  
元ノ疾病ア治ニ平常ニ復スルカ為ニ撰定スル  
ノ定法之ア對徵ト云能ノ以定法ニ道ア治ヲ復  
タル者之ア直医ト云ノ其定法ア棄テ、施治規  
律十、十者之ア賣茶子ト云則ハ百工ニ異ナルトナ  
シ此法ハ依ト氏ノ撰定スレ所ノ法ナリ毛列氏  
曰論對徵者必先領會其宗範而后始可通各種  
對徵

對微之  
凡ノ對微之ヲ明白実驗上ニ得テ更ニ審思明辨  
スル所ハ則千莫施之所走定法的実万安ナリ之  
ニ及シテ之ヲ私知穿鑿シテ得ル者ハ則千危疑

乖戾ニメ信大可ラス要スルニ実驗ニ本ツヤ義

理ノ存スル所ニ依ルヲ主トス

病卓絶者アリ合併ノ者アリ故ニ對微亦久此

四別十カル可ラス然レ比對微愈卓单一ナレハ則

愈明了ニメ從ニ易ニ故ニ其標定スル所務テ卓

一ナルヲ要ス

今夫レ疾病各般人諸症ヲ悉スルハ固ヨリ其原

目各般ナルニ由ルト虽又一同原曰ニメ而ノ其

之ニ感滲スル諸益人性能各同ニカラサルヲ以

テ其發スル所ノ症候亦々百種雜出ニ相背馳ス

ルカ如キ者アリ医者若シ其本ア葉テ徒ニ其標

# 補

ヲ求ムルキハ施ス所定期十ノ猶夙ア補ニ影ア  
逐フカ如シ故ニ之ヲ治セント欲メ却テ之ニア  
害スルトアリ對微豈ニ施ナルサル可ニヤ今一  
患者アリ神經熱ニ罹リ兼テ肺嗽衝ア患者而メ  
其本一曰ヨリ未ル者ハ神經熱ト肺嗽衝ト同一  
法ヲ以テ治スヘシ是レ神經熱ア患者テ覺機常調  
ヲ失シ肺ノ一部ニ於テ旺盛スルカ故ニ致ス所  
ナリ故ニ平病ヲ治スルノ劑中ニ覺機ノ妄動ア  
鎮靜スルノ品ヲ加テ以テ其常調ニ復ゼシムレ  
ハ則チ隨テ治スヘシ故ニ曰治其本則其標末隨  
而治

然レ此症若シ病ノ本性ノニ拘泥シテ毫モ體  
器ノ異質ニ注意セサルキハ亦又大簡ニ失ニテ  
謬誤十キ一ヲ得ス故ニ先ツ其本性ヲ識リ又其  
異質ニ由テ發スル所ノ症候フヰシ而メ症治法  
ア定ムハレ故ニ合複對微ノ目アリ而メ合複對  
微ニ於ル自然ノ順序ヲ失フト勿ルヘレ今患者  
胃中胆液様ノ汚物アリテ軀中煩衡諸症ヲ發ス  
ル者ハ先ツ胃中ノ汚物ヲ排除シ而メ后其過度  
ノ運行ヲ鎮靜シ以テ尤貴要部ヲ侵襲スルヲ防  
止スヘン

本病對微ノ外其複症ア治スル力為ニ別ニ他ノ  
一方ア儀セ進ヌント缺スル者常ニ先ツ顧慮ス  
ヘレ今進メシト缺スルノ一方病ノ本性能久之  
ヲ許スヤ否ヤ又此方ノ興ルノ后軀中何等ノ景  
狀ヲ為スヘキヤト医若シ減運方ヲ行テ血液ノ  
資粟部ヲ逼迫スルヲ靜止セント缺セハ當サニ  
預メ處方ノ發スル所ノ變候如何ア慮ルヘシ若  
シ危疑スル所ノ者アラハ當サニ后害ヲ預防ス  
ヘキノ方ア求ムヘシ  
對微數種又別名リ是外藥本草書卷之二  
一日治原病之對微者是レヨノ固有ノ目ト發  
在目トテ除キ者ア云今鉛毒病ニ於ル軀中

新在ノ酸化鉛ヲ泄餘レ或ハ其酸素ト鉛トヲ分  
析レ本質ニ復セシメ若クタハ肺，脆弱ナルヲ強  
健ニシテ以テ病ノ是ヲ侵襲セントスル者ヲ預  
防ス故ニ此對微一二預防對微ノ名

二曰ノ治現病之對微者是レ其今已ニ發現スル病  
ノ病ア治スルナリ

三曰ノ既往症之對微者是本病已ニ治スルノ既往チ  
將ニ發セントスルノ症ア治スルア云

四曰ノ衛生對微者是レ病性ト原因ト索知又可テ  
サル者ニ於テハ能ク其生力ヲ衛護シ以テ或ハ其  
病ア治スルヲ得セシメ或ハ病勢ニ堪ヘ易カ

テシム或ハ其病性ト原因ト能ク索知スヘビト  
墨トモ医業決メ之ヲ治スルト能トサル者若ク  
ハ之ヲ治スルノ業アルト墨氏一二ノ妨碍アル  
カ為ニ之ヲ行可ラサル者ハ医始ヨク此對微ニ  
從来スヘキ

五曰ノ治症之對微者是レ功用最広ニ症

病性及ニ病目皆明認シ難半者宜ク治病ノ對微  
ア以テ先ソ其発症ヲ治スルニ非<sup>サレ</sup>以本病治ス可ラサ  
ル者及ニ癆症等油スル半人生力衰弊シテ其完  
復タ振フト能ハサル者ハ先ソ其發生ヲ治スル

ヲ要ス服水ハ先ツ漏水管針ア以テ且傳水ヲ世  
除スルニ非レハ吸收管及諸腺ノ閉塞治ス可カ

ラス

タ四十四

諸般ノ疾病中生力抑壓セラル、者ハ病尤ニ治  
モ難シ若シ治症ノ對徵ア以テ其抑壓セラル、  
ノ生力ヲ發揚シサレハ病速カニ治セス  
僵症或ハ草病ヲ變シテ合併病トナラシム故ノ  
若キ者ハ其僵症ヲ治スルヲ要ス神圣熱ノ初起  
ニ頭痛甚シキ者若シ先ツ之ヲ治セサレハ終ニ  
脳噉衝ニ陷ルヘシ若シ咳嗽甚シキ者ハ之ヲ治  
セサレハ竟ニ肺噉衝ヲ發スヘシ

タ四十五

タ四十六

神全熱壞疽若クハ麻痺ヲ兼ル者先ツ之ヲ治ス  
ニ非レハ本病久シク治セス

諸病兼ル所ノ久利ハ早ク之ヲ治セサレハ生力  
漸々衰憊シ患者アメ竟ニ起ツト能ハサラシム  
ルナリ

タ四十七

第十六 診微反微精義

ニ四十八  
医者患者ニ臨ニ彼故ノ方業ヲ慶せントスルニ  
ハ必ス先ツ之ヲ慶スル所以ノ理ノ誠ルヘシ之  
ア對徵ト云又一ニノ妨碍ナリテ撫業方ヲ慶ス  
ルヲ得サラシム者之ヲ又徵ト云フ  
模方ニ通常方ト各異方上ノ別アリ通常方ト今常  
ニ本病ニ係在ス故ニ草一十り各異方ハ百種ノ  
景況ニ隨テ各貞誠ヲ異ニス故ニ多岐ニシテ一  
途ス可ラス医者診察ノ際此ノ先フ又通常方ヲ  
識テ而メ后各異方ニ及フヘシ何者通常方ハ治  
癥人常側ニメ各異方ハ其変法ナリ今思性神主

然ニ於ア血液ノ費部ニ逼進之ルク減殺スル者  
ト揮發策ノ以テ不整大運營ヲ鎮靜スル者ト自  
ラ異ナリ然レバ其運營ノ順整スルト覺機ヲ調  
理スルトハ則チニ通常撰方ハ病ノ正證ニ由  
テ之レア定メ各異撰方ハ患者体质ノ不同ナル  
ト矣スル所ノ證候各異ナル所アルア以テ之ア  
定ハ今夫レ患ノル所不同ニク是レ神全熱タリ  
ト愚<sup>氏</sup>游蕩無賴妄房虛損ノ人之ニ係ルト攝生老  
庚平生健全ノ人之テ患ノルト次メ一般ナリス  
又深閨處女ト山谷擔辛ト同ニク痛凡ク患ノル  
ト金丸発スル所ノ證候必ス殊ナリ故ニ之ヲ臣  
スル治亦體ノ異ナカルア得ス  
元ノ疾病ト卒軀病目、身体ヲ襲フノ実況及ニ病証  
ト正傍主客既解不可アサル者之アリ故ニ對微  
確矣トラサル者參之アリ安時ニ於テハ審カニ  
之ア臆度シ其尤比理ニ近キ者ノ以テ撰方ニ先  
ツヘ<sup>レ</sup>元ノ各異撰方ハ常ニ實驗上ヨリ之ヲ擇ル  
トス何者各異撰方ハ常ニ實驗上未成議論ヨリ之  
ヲ構成スルニ由レハナリ<sup>此非文也</sup>此非文也<sup>此非文也</sup>  
標方常ニ權ヲ貴ノ尤比患者外生力ヲ較計スル  
ノ要ス又一定不動ナリ者アリ故ニ身軀一處

腐壞スル所ハ其体貧ニ拘ラズ共ニ之ノ功除ス  
ヘシ間歇熱人他症陽胃ア合係スル者尤當ニ先  
ツ其他症ヲ治レテ而メ自發那ノ興テ以テ間歇  
熱ヲ治スル是ラ通常撰方トス然ニ此患者ノ生  
力ノ沈衰タル者ハ他症ニ拘ラス直ナニ義群ア  
以テ生力ヲ揮發スヘシ又間歇熱ニ泰那ノ興ア  
之ヲ治スルハ常時タリ然ニ此貧弱ト病症トニ  
隨テ他藥ヲ換用スル之ヲ權法変トスハ  
病目属性共ニ尋索ス可ラス叢症ノ主客并ス可  
ラサル首ニ於テハ医者常ニ憂患ニ疑惑スル所  
ナリ唯寔脩明辨ノ医ノミ能ク試藥方ヲ施ス十

リ其疾氣ノノ有ニ由來以テ其功害ノ計リ而メ  
撰方ヲ定ムルトタ得ルナリ然ニ義理ア尋究  
諸症ス較計ニ而メ后始メテ従更ス否レ  
ハ賣藥子ト別ツトシニ是レ諸般ノ天行病風土  
病及セ創見ノ疾病ニ於テ曼ク見ル所ナリ  
又微トハ已ニ一定ノ撰方アト之ノ處スヘキ  
者ニメ。一二人妨碍アリテ之ノ處スルト得サ  
ラシメ必ス他方ア進メサル可ラサル者是ナリ  
故ニ對微アリテ而メ又後アリ  
又微モ亦久多種ナルト對微ニ同シ故ニ確実ノ  
者疑似人皆真ナル者偽ナル者成ナル者未成ナ

者通常ノ者各異ノ者アリテ、故ナリ。明年ニ  
医者患者ノ体質ノ異ト病状ノ不同ナラ、明年ニ  
而メ後始メテ又微タ得ルナリ故ニ又微ヲ求ム  
ルキハ則チ医者アメ能ク心ア用ニルト填密ニ  
大疎漏ナカニテ、凡フ能ク此ニ従支スル者ハ  
必ス浮舍人常套ヲ解脱シ而メ真実不虛ノ道ア  
求ムル者ナリ。

能ク又微ヲ得ル者ハヨク撰方ヲ棄ツ情医ハ患  
者外貌ノ假況ヲ誤認シ若クハ方策ノ殊能ア裏  
レテ妄ナニ又微ヲ求ム是レ唯患者ヲ殺スノ名  
ア免シト叙スルノニ原ト学術ノ精シカラサル  
ニ至シ。

ト察病ノ切ナラサルトニ由ル何者始テ一診ス  
ルニ反微アルカ如クニメ而メ又復熟察スレハ  
竟ニ一個ノ撫方ヲ妨碍スル所以ノ者ナキト常  
ニ至シ。

間歇熱ノ胃腸汚物、挾ム者甚者若シ實症ノ先后  
主客ヲ察セサレハ則チ撫方ヲ行クト能ハズ而  
ルニ必ス先ツ吐下剂ヲ以テ胃腸ヲ清潔セント  
スルハ是誤トス何者以病ニ挾ム所メ汚物ハ本  
病ノ久シク治セサルカ為ニ胃腸ノ纖維大ニ弛  
緩シ由テ生スル所メ者ナク故ニ保固強壯ノ剤  
ア典ヘテ胃腸ヲ健運スレハ治ア得ル者尤モ多。

對微ニ後変スルノ前先ワ其反微ニ除キスルト  
ハ医家ノ要務トス又微或ハ寳主菜ノ妨テ之ヲ  
施スルヲ得サラシムル苟アリ然レビ未大其撰  
方ヲ拒カサルキハ医唯此菜品ヲ変スヘシ但  
貞法ヲ轉ス可テス  
諸種ノ躰質動モスレハ其對微ヲ妨ケ或ハ其撰  
方ヲ拒キ或ハ其主菜ヲ妨久此症則平幼兒老  
人妊孕經 生業常習等萎菜ノ適用ヲ妨クルヲ  
以テ或ハ之ヲ変セサルトヲ得ス本來野處樂未ハ  
治則ハ之ヲ變スルトヲ得ス本來野處樂未ハ  
す

## 第7 構菜

九ツ疾病ヲ治スル力為ニ要スル所ノ菜剤方術  
共ニ之ヲ構菜ト云フ故ニ意思ノ抑揚生力ノ增  
減生業動靜及ヒ大氣等允テ患者ヲ圍繞シ耳目  
ニ觸ル、首之ヲ用テヨク其里キニ適スル代ハ  
一モ構菜十ラザル者十シ  
食餌攝生ヲ節ニシ大氣火溫涼ヲ適度ラシムル  
等ハ緊要寔トス諸般之病疾唯飲食ヲ謹節ニス  
ルニ由テ自エ治スル者少ナカラス菜品如其功  
應必ストス可テス或ハ意外ノ害ヲ生スルトア  
リ是啻ニ輕惡微恙ニ在テノニ然ルニアラス經

年ノ訖病ト虽時ニ時ニ能ク飲食ヲ第ニ攝生  
ア嚴ニシ若シ久ハ旅行スル等ニ由テ自ラ治ス  
者亦收ナカラス故ニ若諸般ノ疾病皆悉ク必ス  
先散湯液ヲ要スルト云フハ実ニ大ナル惑トス  
医ノ患者ニ蒙スル人一方必ス良方意ヲ詳カニ  
スヘシ無益ノ薬及ヒ能力疑ハシキ者又或ハ大害  
ヲ招クハ恐レア此者公決義之ヲ蒙スルト勿レ  
又作剤ハ務メテ草方ヲ要ス同時ニ多方ヲ應ハル  
ノア歎セス但シ合併諸病一薬ノヨク治スル所  
ニ非ル者ハ以論ニアラス

内人者ヲ撫ムヘシ又々新近斐明スル所ノ若田  
未習用スル者ト其力相齊キ者ハ則チ習用スル  
ノ品ヲ取ルヘシ世人好テ新薬ヲ用井ヘト歎ス  
ル者アリ蓋シ学術ノ精シカラサルニ由ル  
尤ソ内外病毒ノ未テ人身ヲ襲フニ三種ノ別ア  
第一曰墨加危設ニ曰費失設及ヒ舍密設三日実  
那実設是十日医若シ之ヲ明ラカニセサレハ投  
棄的寔ナレヲ得ス

医者諸部交感ノ性ア明知スヘシ之ニ由テ貴部  
ノ病ヲ無害ノ部ニ導クトス得ヘシヘラ

ハ則千甚シク其功アリ所以ノ現如何ア解スル  
 ヲア要セス譬ハ今水銀ハ其功力ヨク吸收營ア  
 刺衝ニ閉塞ヲ開達スル者タルヲ知レハ其然ル  
 所以ノ理如何テ此ノ如クタルヲ知テサルモ  
 可ナリ已ニ其刺衝ニ開達スルノ功力ヲ知レ  
 其運用極リナルニシテ此ノ實力之有無  
 九ノ菜ヲ投スルニ方テ注意スヘキ者甚タ多シ  
 患者天稟ノ不同ト諸器ノ稟性異ナルヲ以テ菜  
 功自ラ別アリ又一菜タリト虽製法異ナレハ其  
 功隨テ別ナリ分量ノ量寡最モ其功ヲ異ニス又  
 身外ノ諸物ニ小同異アレハ菜ノ功ヲ体申ニ矣  
 スル亦タ異ナラア得ス

オ六十六  
 又精神ノ柳楊及ニ艾專ラ傾ク所ノ者大ニ病ノ  
 休作ア助ク故ニ医ノ病者ニ於レ或ハ之ヲ勸喻  
 シ或ハ之ヲ勉励スヘシ又精神ノ專ラ傾ク所医  
 者之ヲ知テサレ可ラサルナリ

茶ノ類向此ニ由テ生ス但シ合併諸病ハ之ヲ知  
ルト尤ニ難シ  
已ニ三機能ノ中何ノ機力最モ先ツ病ヲ得ルヤ  
ヲ識ルハ則チ他ノ二機傳誥シテ何等ノ変態ヲ  
ナスヤラ寃尋スヘシ変態已ニ明カニゾ而メ后

卷八 對後區別總論

卷六十七

小則守舊大則貢助不無所以人觀如何ヲ解之則  
下船來也大壁外今永艤於其地也日久吸乾水ア  
利衝突開塞ノ開墻又將著矣ルノ知也然則  
所以力理加得何以方攻ノ如夕久川ノ知テ十九日  
可有夕也ニ定利衝突開墻始ルノ即次ヲ知也  
及晚而極少十分

稚天撰某ノ定ム入シ今穢瘍ヲ患スル者アルニ  
其病ハ補給機ニアルヲ知ルト虽ニ未タ觸動  
知覺ニ機ノ変態加何ノ知スサレハ則チ櫻菜ヲ  
定ムルコト得サルナリ

夫一病係補給機者櫻菜  
オル所以ノ者ハ專テ成形力惣機ニ係在ス而メ  
成形力ノヨク一身ヲ榮養シ百器ノ消耗セ  
其能ノ良能ノ常則ニ達ハサルニ由ル故ニ尤ワ  
一身形匱ノ病ハ皆成形力ノ常則ニ背クニ由ル  
是成形力ハ良能ノ製スル所ナレハナリ故ニ成  
形力失常アレハ良能隨テ之ヲ復ヌ一身形匱ノ  
病皆良能ノ治スヘキ所ナリ

然レニ補給機ノヨク形匱ヲ復治スルハ必ラス  
養液ノ分泌ヲ要ス而メ人身ノ養液分泌ハ知覺  
機ノ助ヲ博ルニ非テサレハ能<sup>ス</sup>之植物及下等故  
ニ逐ノ術ヲ以テ形匱ノ病ヲ治セントスル者必  
又覺機ヲメ貰常度ヲ保タムヘシ覺機過不支  
イヒハ其ニ養液ヲ分泌シ形匱ヲ復治スルコト  
得サルナリ

形匱ヲ復治スルノ法三則アリ  
一二曰位置ア復シ硬軟ヲ復シ接合ノ離折スル

者ヲ常度ニス  
ニ曰覺機ヲ常調ニ復シ養液スルノ其常路ヲ得  
セレハ

三曰液眞ヲ淨潔ニス若シ液中異物ヲ含ム者ハ  
之ヲ誚除スルヲ要ス又傳毒ノ發生ヲ防止ス  
ヘシ傳毒ノ發生スルハ大ニ榮養復治ニ害ア  
リ然レバ之レヲ防止スルノ術ハ務テ其本病ア  
治スルニ在リ梅毒惡性熱等皆十然ラサルモノ  
オシニ

蘇普其ニ病係觸動機有機茶

觸動機トハ擴張收縮ノ兩力相對抗スルナリ而

メ其裏ハ諸般元素ノ求極力を起ル故ニ動機ノ  
病ア治スルハ此兩力ノ失常ヲ復シ元素求極ノ  
力ヲノ各其平均ノ得セシムルニアリ然レモ覺  
機十ヶレハ動機獨立スルト能ハ久給機常則ア  
得サレハ動機獨立故ニ復スルト得ス是ヲ以  
テ給機而機治セサレハ動機モ亦久治ア得サル  
ト知ルヘシ故ニ張縮ノ兩力アノ各其宜ア得動  
機アノ故ニ復セシムレト欲セハ常ニ后則ニ從  
支スヘシ

又一血行アメ其常度ア得セレメ動靜二脈アノ  
平均ア得セシメ諸脉ト貴要ノ畧械下人關係ア

節ニシテ以テ健康不得ル者又メ各其平均ヲ得セ

シムルナリ則チ血行大過ナル者ハ放血シテ之ヲ靜止シ其壅慢ノ者ハ之ヲ催進シ其一部ニ逼迫スル者ハ之ヲ他部ニ誘導スル等皆軍久機用ス入シ若シ覺機旺盛ニテ動機隨テ衰弊スル者ハ覺機ヲ抑制スルハ動機叢揮又其二栄養ヲ調理シ以テ纖維間ニ分泌スルノ養液ヲメ宜シ得セシメ對抗力ヲメ其常ニ復セシム纖維衰弱及シ痉挛諸症ニ小宜シ淡泊ノ食料ヲ與ヘ健胃茶ヲ蒙スヘシ

其三非常ノ刺衝物ヲ防拒シ貴要ノ機能ヲメ其

均度ヲ失ス1匁ヲシト傳毒氣腐敗液腐敗諸物等ハ務シ之ヲ避ケ動機ヲ害セサテシム

其三病係知覺機者撫茶

其四諸部ノ覺機ヲ調和シ動機ノ失常ヲ復ス知覺機トハ人身ニ在ニ常ニ能ク外物ヲ感受シ

且ツ諸液之分泌ト諸器ノ運動トノ主宰スル者

是ナリ故ニ覺機失常ニレハ視聽嗅味爻ニ諸般

ノ感受諸器ノ運動諸液ノ分泌等皆其常路ヲ失フ故ニ此等諸病症ノ覺機ノ病上考ス而メ之

フ治スルノ法覺機ヲ常理ニ復スルニアリ其法

其三ノ条ト  
其四ノ条ト  
前後シ見ル  
才七十二

第一則 医者先ツ動覺兩機何レカ直ニ病ア受  
ルヤテ察シ又病ア受ルノ状如何ヲ詳スヘリ凡  
ソ動機ト覺機トハ互ニ相盛衰スル者ニシテ動  
機衰弊スルハ覺機旺盛シ動機旺盛スルハ覺機  
衰弊久医菜ノ力亦タヨク之ヲ爲ス故ニ覺機ヲ  
鎮靜スル者ハヨク動機ヲ進運シ動機ヲ減退ス  
ル者ハ能久覺機ヲ増進スルモノ  
第二則 覚核一部ニ於テ偏勝レ他部ニ於テ之弱  
シ各部平均ヲ得サル者ハ軍ノ前聞ヲ疎解レ極  
微ニメ秤量ス可ラサル物貞溫素越列フレテ一  
處ニ留滞スルヲ勿ラシムヘシ給機ヨク覺機ア  
補佐久故ニ久病ニ由テ覺機衰弊スル者ハ軍ノ  
滋養ノ食餌ヲ撰ニ動作ヲ節ニシ清淨氣ヲ受容  
スル等ニ由テ以テ給機ヲ補フヘン  
第三則 諸器ノ覺機感腦ノ覺機識ト其平均ヲ失  
フキハ諸般ノ精神病ヲ發ス故ニ先ツ諸器ノ感  
覺ヲ調和スルハ精神病自テ治スル者多シ  
第四則 覚機ハ給機ヲ順整スル者ニメ給機亦タ  
ヨク覺機ア轉成スル者ナリ故ニ諸般ノ覺機亦タ  
ニ於テ血行ヲ節ニ分泌ヲ調理スルハ大ニ其  
治愈ア速カニス少年ノ諸機將ニ始テ達セント  
スル片在毛此治法ヲ要ス何者此時ニ在テハ一

身ノ覺機偏勝壅滯シ以テ病ア致又者多ケレハ

ナリ又或之妄想火象火候也故斯也此中之  
第五則若人淫意太甚ナレカ若シクハ七情妄  
動スル代ハ則ナヨクノ諸般ノ意識病ア誘發ス故  
ニ之ヲ治セント欲スル者ハ先ツ之ア柳節スヘ

之ノ解者莫不以蘇軾疏自後雖云通於醫學  
亦有八論者著於蘇軒傳本卷之十二考之諸醫之應  
變之圖甚多之筆亦殊妙於其解之為  
大君之憂又非不深矣大解又謂開以鍼解  
經委又資酒食導之而消渴無能御食最之之者  
此則卷之一也脉之由表熱發蒸微汗者氣短火

之則卷二也脉之

之謂之通化極體之說

之謂之

之謂之

之謂之

之謂之

之謂之

之謂之

之謂之

之謂之

醫則卷之二 目次

第一綱 变化凝体之實

收斂方 第一

收斂方 第二

功理 對微 又微 擬茶

緩和方 第二

功理 對微 又微 擬茶

第二綱 变化生力

強壯方 第三

功理 對微 又微 擬茶

各個

功理 對微 又微 擬茶

卷之三

卷之三

卷之三

卷之二

卷之三

卷之三

卷之三

清江先生集

醫則卷之三

第一綱 变化擬体之貞

卷之三

功理爲實驗之指標，則以「以少數

凡タ幹中何レノ部ニテモ其形質ヲ集成セル多

子愈密接之。由是其部人張力卜聚力卜增加

久而久之其形質人體隨之增加又然之以分子

各個人間ニ留滞セル、流動物驅除セラル、ニ非

サレハ冬子密接スルト能ハ又故ニシテ直人冬子  
愈密接シ愈懶剛トナル所ハ其間ニ留滞セル流

動物自ラ減除シテ其部愈乾燥大苦シ然ル片ハ  
 其形質多子ヲ造成セル遠城分モ自ラ密合メ容  
 易ニ離散セス腐敗落崩ノ患ナクメ抗力モ永隨  
 天旺盛ニ草近ノ歎葉ノ製スル樹皮ノ多シ羅ニ  
 負卸卓寧<sup>ナシ</sup>植物<sup>ハ</sup>收斂復入食者<sup>ハ</sup>施ノ其質ヲ密接  
 セシム收斂茶人身ニ功ヲ成ヌモ之主相似タリ  
 然ニ此生活軀ニ在テハ生力之ヲ主宰スル力故  
 =羅ニ貯メ死軀ニ於ケルト頗ル徑庭アリ  
 收斂茶ノ生活軀ニ入テ生力人<sup>主</sup>宰ヲ受ケ其能力  
 死軀ニ於ケルト一樣十テサル<sup>一</sup>其功遠隔部ニ  
 文木スラ見テ昭<sup>ニ</sup>タリ<sup>羅ニ貯メ死軀ニ於ケル</sup><sup>ハ</sup>之レ一部ニ施セハ  
 ホス<sup>1</sup>及今微量<sup>ノ</sup>收斂茶<sup>ヲ</sup>患者ニ服<sup>シ</sup>  
 ハレ少時<sup>ノ</sup>出スメ已ニ功ヲ遠隔部ニ奏<sup>ス</sup>是  
 葉中ニ在テ其功早シ他部ニ及本<sup>ノ</sup>者ニ  
 メ子宮出血<sup>ニ</sup>收斂茶<sup>ヲ</sup>共<sup>ヘ</sup>テ生力感傳<sup>ノ</sup>致<sup>ス</sup>  
 所ニ<sup>シ</sup>他才半日知<sup>ル</sup>一  
 諸害人實能止血力保特<sup>ス</sup>又為<sup>ニ</sup>其部裏負分  
 子ニ接續疎密<sup>ニ</sup>遍<sup>スル</sup>要<sup>シ</sup>今軀中何レ  
 一部ニ<sup>シ</sup>也<sup>シ</sup>實負分子ノ接續疎鮮メ其部弛緩<sup>ス</sup>  
 ハ片小抗力實能相共<sup>ニ</sup>廢<sup>ミ</sup>委<sup>ス</sup>之ニ收斂茶<sup>ヲ</sup>与  
 ハル時<sup>ハ</sup>實負分子則<sup>シ</sup>大密接シ生力尤起シ抗力  
 実能隨天復治<sup>ハ</sup>故ニ收斂茶ハ保固強壯茶<sup>ノ</sup>功

力ヲ助久則リ危ニ着明ナリ者ナシ保固懶壯葉  
ノ最有力ト称スル尙例スルニ義那ノ如キニハ  
其負中已ニ收斂ノ功分有テ又苦味ニメ薦壯ス  
ル越巻斯分ノ併有スル者ナリ造物主ノ伎倆以  
テ医家ノ鑑トスルニ足ル然レバ医者收斂茶ア  
用井八軍ク其度ノ慎ムハレ若シ其度ニ過久ル  
ヰ人癰鱗纖維緊縮拘急メ流弊運行ノ力之ニ歛  
スル力能ハス諸器ノ運用廢止スルニ至ル  
患者衰弱ノ疑体人瘦踈薄十九首十餘疋諸<sup>部</sup>弛緩  
セス却ニ急張スル者丁リ故メ此半者八患者裏  
弱又ト虽ニ卒力ニ收斂某ヲ以テ之ニ興ヘ難シ若  
レ誤テ之ヲ典フルキハ諸部ノ急張愈甚シノ観  
機人已ニ度ニ過クル者愈銳敏トナリ病ヲメ愈  
陰思ニ進ニシム然レバ体中一部急張スル所ア  
リト虽他ノ諸部皆弛緩セル者ニ收斂方ヲ施ス  
キハ生力ノ擴張不齊ナル者ヲ復治スル故ニ之  
ヲ用テ良功アリ然レニ之ヲ用サル者必大戒慎  
スヘレ且ツ諸部ノ弛緩ヲ收斂レ一部ノ急張ニ  
害ヲ十サハル而ヲ撲用スル日ア要ス  
收斂茶ノ流体ニ功ヲ奏スルハ之ヲ用井テ凝体  
ノ弛緩セル者ヲ復治シ凝体ノ流体ア化成スル  
作用増進スルニ由ル首十リ

鐵維接續ノ際ニ係シセル膠質收斂葉ヲ得テ  
固ニ鐵維淮密接シ凝体強剛トナリ諸部ノ生力確  
广増進シ心肺動脈ノ血氣化成スル機能大ニ進  
ニ血色ノ淡薄ナル者度ルテ鮮色トナリ艾將ニ  
溶崩腐敗セントスル者ヲ遏止ス  
凝体弛緩スル血液隨行遲徐シ通滯ス故ニ於手部諸ノ  
腺質閉塞シ自然ノ泄液閉止シ或ハ其弛緩開啓  
セル管端ヨリ血液漏洩ス故ニ收斂葉ヲ与フル  
市八脉管ノ運営又健運スル故ニ血液循環行催  
進セラレ諸腺ノ閉塞自ラ開キ自然ノ泄液閉止  
セル者再び發泄レ開喉セル管端ヨリ洩漏スル  
所ノ血液ハ自ラ休止ス

對徵

故ニ收斂方八部ニ凝体弛緩メ鐵維ノ張力減衰  
シ動覺兩機共ニ廢弛シ血液ノ運行遲徐スレ者  
ニ施メ良功丁ノ鐵維脆薄ノ症其新ニ登スレ者  
及ヒ震性ノ粘液涌滯ア兼メル者ニ此方ヲ佳ト  
之例スルニ粘液性ノ咽喉癰衝懸壅水腫产氣又  
ル寄ニ明善功ヲ奏シ又水氣浮腫陰囊水腫一症  
答ニ由テ治スル力甚キ是ナリ妙方又鐵維薄弱  
ニシテ諸液蜂窠体中ニ留滞シ諸管弛緩腫脹シ疼

痛ア兼又レ者ニ良効アリ

小兒ト薄弱ニメ惡液貯ナル者閨簾及ヒ被覆勒  
帶ノ弛緩ニ由テ発スル所人脫臼肛門括約筋  
弛緩ニ由ル脫肛臼帶下ノ刺症若クハ難產ニ由  
テ発スル所<sup>腔</sup>脱肛ニ妙方的當ス幼童又運動少  
ナノ安坐間居ア恒上スルニ由テ体貯薄弱十  
者ニ發スル諸種ノ負傷應ニ良効アリ動靜脉瘤  
ノ襄弱弛緩ヨリ起因スル者ニ局部ノ收斂方ア  
施メ奇驗ア得ル者支シ

行不及ヨリメ血液各部ニ留滯シ其部腫脹シ  
若クハ諸液漏泄シ之ニ兼又ルニ脈管破裂ラ以  
連行不

テスレ者收斂方ア要ス若シ打撲等ノ外因或ハ  
經久ノ弛緩ヨリ發スル者ハ殊ニ妙方的當ス齒  
牙拔去后人失血婦人長ク白帶下ア患ソル者ニ  
癰スル子宮失血婦人陰具ノ广瘻弛緩ヨリ未ル  
自帶下男子尿道及ヒ其線貯ノ广瘻弛緩ニ起因  
セル后淋頑固ノ溶崩下利姪久赤痢刺痛ア癰子  
サル者承割<sup>延</sup>既發スル刺ニキ吐涎若クハ弓  
部ノ弛緩ニ由ア叢スル所ノ吐涎失荀尔陪苦性  
ノ痰眼鏡固ナル者及ヒ腎人弛緩襄瘻ニ起因ス  
ル承崩等都ア收斂方列的當トス允フ右ノ諸症  
各其症ニ的當セル收斂方ア用テ偉効アリ

瘻瘍性若クノ失芍尙苦性ノ腺負頑固ノ敵  
衝共ニ收歛方ニ由テ治ス失芍尙苦性ノ眼瞼  
衝及ニ之レト同性若クノ未割過用ニ延長セル頑  
固ノ潰瘍並ニ其周圍弛緩知覺頑鈍海綿様負ニ  
メ水腫様ニ腫起スル者ニ收方ヲ用井ル片ハ或  
少或外速ニ治シ假令治セサルモ之ニ由テ良膜  
醸シ漸次ニ治ニ趣シ經名ノ皮病即疥癬頑癬等  
ノ皮表ノ弛緩知覺頑鈍ヨリ起因スル者間此方  
ニ由テ治愈又久部ノ壞疽周圍广癩ニ或ハ知覺  
甚々遲鈍ナル者收歛方ニ由テ奇驗ヲ得ル者甚  
多シ當此之類之處ニ於此方之效也

## 反微

アハ十五

老人ニハ用ルト稀ナリ何者老人ハ体痕ノ組織  
スル所ノ纖維自然拘急ノ関節ノ屈伸モ自由ア  
テス内部諸器ノ運営ニ亦ニレニ準スニ收歛  
方ヲ施太半其己ニ拘急スル者益シ拘急諸器  
ノ運営益滞滯大レハナリ故ニ老人ノ痛風、收  
歛性ノ健胃初キナ人委テ興入シト欲せ心ス  
謹慎メテスルト要云或奉全シ之シ禁ス又  
硬腫及ニ至久ノ間塞血液其部ニ逼迫スルノ弊  
アル者ニハ收歛方ヲ禁ス何者多時彌漫セル諸  
液ノ殆ドト度性スル者收歛糞ノ刺歎ニヨツテ

アハ十六

愈變敗スルノ恐アリ且ツ多時闭塞メ已ミ硬結  
セル諸管收斂矣シ得ニ愈硬結スレハナリ  
患部脆弱ニシテ緊張疼痛シ痉挛シ魚ヌル者ハ收  
斂方シ禁ス急性病ノ初起病毒未輕ノ間ハ決メ  
此方シ既フルトナシ諸種ノ失血ト虫初起ニ在  
テハニシ禁ス其刺戟催進ノ業性ノ害アレハナ  
リ若シニシ用ノト欲セバ必ス先ツ其病毒シ除  
本セサル可ニス子宮病ノ患者服部ノ諸部ノ諸  
管閉塞シ知覚遲鈍体真軟弱ニメ痉挛シ鱼ヌル  
者亦此方シ禁假令已ムト得スメニ用ユル  
モ亦謹慎シ要凸諸種ノ癰腫瘍急張シ痛アル

有皆收斂荼害アリ諸般ノ潰瘍消耗熱ヲ養子  
周縁緊張疼痛スル者ハ坎方ア禁ス又經久ノ潰  
瘍却テ体中人津徐益ト成リ体中ノ思液常ニ之  
ニ由テ漏泄スル者ニ收斂荼ク用ヰテ之レノ閉  
止スルキハ必又害アリ畢レ居恒見レ所ナリ  
諸種ノ漏液失血若クハ血液貯滞スル者其固全  
身或ハ膝蓋置度人運動ヨリ發シ又之ニ由テ誓  
留ス以市ハ收斂方ヲ禁ス故ニ諸熱病ニ發スル  
前ノ下利子宮失血ノ類共ニ坎方ア用ユルトア  
得ス若シ坎ノ如キ症ニ遇ハ、勉テ艾刺戟毒ア  
排除シ久の当人療法ア以テ其熱症ア復治シ過

度ノ運行靜止スル后始メテ此方ヲ用エルヲ

得ヘシ

壠案

化ノ收斂葦ト称スル者種类甚多久其性能モ  
亦大ニ異ナリ之ヲ用ル者宜久謹慎メ誤ツ取ル  
ナ勿ルヘシ例又此ニ諸種之酸液ヲ用井テ効ア  
ル症ニ植物部委人收斂葦ノ美必ス害アリ又在

灰水効アル症ニ鉛製ノ收斂葦宜シカラサルカ  
ナシ收斂葦ヲ大別メ下ノ二種トス一曰單一善  
城方ニ曰ヒセセオルガニセ三曰セニセナニ  
セ是ナリ

單一器城法ノ第一トスル者ハ螺旋壓定器所謂  
トル子ト縛帶撒汞捻子紗捻子撒絲球按定中螺  
旋重疊壓定中ノ疊重ノ際又ニ鉛枚若クハ銅錢  
一片ヲ紗山者  
動脈瘤ニトル子ケットヲ施シ若シクハ銅板ヲ以  
テ久シク之ヲ壓柱スル中ハ屢奇効ヲ奏ス又靜  
脈瘤ノ脈管裹弱ヨリ起因スル者ニ縛帶ヲ施シ  
久シ久其部ヲ緊札スル所ハ自ラ治ス是レ衆医  
ノ常ニ知ル所ナリ木林刺愈外傷科  
又腸ノ良萎而ス烈ム後縛帶ヲ以テ胶輪ヲ壓  
柱メ再び脱出スルヲ勿ラシム水様腫及ニ創傷

若クハ搦挫ニ經るスル所ノ血班及ヒ峰景眞中ニ渡ノ溢出スル者ニ縛帶ヲ施シ其部ヲ緊壓スレキハ自テ消散ス水様腫負ノ瘻瘍ニ周圍巣定申テ施ス片ハ瘻管内面自テ愈着メ治ス又久經久虛性ノ瘻瘍就中足部ニアル者ニ其部ニ鉛板ヲ置キ縛帶ヲ以テ之ヲ緊縛シ又抜キヒイグコウセニ縛帶ヲ施シ緊シ名廢收スルヰ屢捷効フ得」印東氏至久ノ瘻瘍ニ硬膏ヲ貼メ治スルニ此ニ功ヲ奏スル者ナリ

又一種ノ器械法アタ摩擦是ナリ上ニ所謂ヒセセオル力ニセ此ニ由テ竪ニ弛緩セル体直ヲ收斂スルノ也

ラス神經及ヒ諸筋人生力ヲ奪起ス古人ヨリ摩擦法ヲ称用スルハ此ヲ以テノ故ナリ依ト氏曰摩擦法能强壮筋肉又能扶助其成育並私苦列比亞泥私氏曰体直弛緩者摩擦法能收敛之硬結者能軟解之前積者能分散之脱弱者能強固之捲爾株斯氏曰摩擦法能治四支之广癰又能卷揮生力之沉伏ト但ニ熱ノ方ニ增進スル者ニ於テハ之ヲ禁ス此法動脈ノ末梢ト神經ト人生力ヲ増進シ其部ノ知覺ト滋養トア役治ス故ニ此法痛風及ヒ腰広質腫ニ奇効ヲ奏ス又广麻ノ初發ニ良驗アリ若シ其ニ溫度ヲ催進スル茱萸ヲ兼スル

ナハ殊ニ捷効アリ其品ハ香水居室ア撒スル薰スル水液ニ名  
酒精刺賢塙尔精其他都ア精氣多キ愈創水ナリ  
第三種人收歛藥品所謂セニセニハ寒冷人大氣冷水  
冰雪等是ナリ溫素ハ能夕物体ヲ膨脹スベ如ク  
寒冷ハヨク体腹ヲ收固強壯シ覺機ヲ抑ヘ動機  
ヲ揚起ス故ニ涼氣ハ急性熱殊ニ惡性熱ノ初起  
神經熱腐敗熱ニ良効アリ尤ノ此症ハ覺機不齊  
ニ偏勝シ抗力衰弱スル者ナレハナリ抗力ナリ  
寒水浴ハ僅嘔メ之ヲ施スベハ皮膚人全久衰弱  
ヲ役治シ諸部ノ張カク催進ス最寒ニ由ア始ト  
廢絶セル生力雪若クハ水碎テノト以テ患部  
ヲ摩擦スルキハ生力再ヒ旺盛スルナリ然レニ  
寒冷氣冰雪等之ヲ誤用スルキハ却テ諸症ヲ催  
登ス何者之ニ由ア害ニ不齊過度ノ收歛ヲナス  
ノエラク又動モスレハ覓機ヲ暴奪メ役治ス可  
カラサラシムレハナリ故ニ患者ニ妙方ヲ施サ  
シ欲セハ先ソ動覺兩機相對持スルノ景況ヲ詳  
ニ索知セサル可ラサルナリ  
九ノ草木收歛藥ノ早寧ト固有ノ沒食子酸ニ由  
テ鐵錐ノ接際ニアル所ノ流体ヲ驅逐シ其部ノ  
形復ア收歛スル効アレ者ノ中ニ就ア沒食子標

皮吉訥等尤に外用ニ称譽セラ。吉納水楊樹等ノ如キ苦味收敛莢ハヨク内服ニ供用ス。此类ノ島ハ其腹中食ム所ノ苦味ノ部多ト揮発油十二由テ凝体ヲ刺斡シ胃腸ヲ健運シ消化機ヲ盛ニス。故ニ此諸品ハ胃腸ノ覺穢衰弱ニ若クハ粘液膚品スル者ニ与ヘア奇効アリ。又右ノ茱島中ニ於テアルビヌスハウル。ノ如キハ甚々小便ヲ驅出シ。粘液ヲ驅逐シ且ツ肾脏胱ト胃トノ感傳ノ機ニ衆メ結石病ニ良効アリ。

精氣菜モ亦收斂ノ効アリ。凡ノ此类ノ收斂ハ皆其刺戦ノ力ニ由ル者ナリ。此諸品ハ内服ニ供ス

ルト稀ニメ多クハ外用ニ供ス即チ骨頭軟解搦性及腕肘ニテ弛緩セル部分ニ施メ捷効アリ。就中酒精ト抱合ノ成ル所ニメ清凉收敛ノ功較著ナリ。之ヲ患部ニ塗擦スル時ハ多クハ溫素ト酒精ト抱合ノ成ル所ニメ清涼收敛ノ功タ奪却メ速カニ罷散スレハナリ。故ニ貞儂俗ニ絶メ奇験アリ。

諸種ノ酸类殊ニ山物酸ハ凝流ニ躰ノ貯ア收敛保固シ温素ヲ除東スルノ効アリ。硫酸硝酸塩酸憐酸等是ナリ。急性病慢性病共ニ之ヲ用エヘキ者甚多シ。薑ニ凝流ニ躰ノ貯ア收敛固スルノ

テラス又ヨク生氣ノ偏勝スル者ヲ役治シ夫ヲ

ノ全軀ニ遍滿セシムノ効アリ  
生石灰ノ水ニ溶化スル者ハ急ニ炭酸ヲ吸收ス  
ル故ニ鐵錐ノ犯後セルテ收斂スルノ効アリ改  
ニ粘液体中ニ漏滲スル者經久下利及ニ内外潰  
瘍ノ鐵錐犯後メ久シク治セサル者ニ之ヲ用テ  
峻効アリ其法石灰水一斗另ニ苦味芳香ノ呑若  
クハ驟乳ヲ加ヘテ之ヲ与フ  
明登ハ硫酸ト一種ノ半夏ヲ含有スルニ由テ收  
留凝固ノ効アリ故ニ點眼水ト為メ湯乙様眼藥  
衝ニ施メ奇効アリ又之ヲ内服メ鐵錐犯後ヨリ  
起ル白帶下等ハ粘液漏泄ニ殊効アリ  
硝砂モ亦收斂人功少シトセ又故ニ外部人創傷  
ニ用テ良効アリ之ヲ内服セシムハ腹部諸管  
ノ刺戟シ能ク其部ノ閉塞を開達ス  
諸種人金瘞人中ニ就テ鉛劑即チ鉛醋鉛糖人如  
ヒハ尤ニ強キ收斂兼ト不然モ唯犯後ヨリ起  
外用メ危害十々常ニ奇驗アリ能久其部ノ脈管  
ヲ收閉シ膨脹ヲ防キ創傷ア強壯ニス若シ之ヲ  
内用スル時ハ十分ノ謹慎ア加フルニ非サレハ  
動モスレハ危害ヲ招クニ七葉又心ニ御遠御見

ドラス又ヨク生气ノ偏勝スル者ヲ復治シ夫ノ  
 ノ全軀ニ遍満セシムノ効アリ  
 生石灰ヲ水ニ溶化スル者ハ急ニ炭酸ヲ吸收ス  
 レ故ニ鐵椎ノ犯後ゼンス收斂スルノ効アリ故  
 ニ粘液体中ニ遇沸スル者經久下利及ニ内外嘔  
 痘ノ鐵椎緩メ久レタ治セサル者ニ之ヲ用テ  
 噴効アリ其法石灰水ニテ芳ニ苦味芳香ノ島若  
 クハ驢乳ヲ加ヘテ之ヲ与フ  
 明礬ハ硫酸ト一種ノ土貯ヲ含有スルニ由テ收  
 留凝固ノ効アリ故ニ點眼水ト為メ物乙様眼疾  
 術ニ施メ奇効アリ又之ヲ内服メ鐵椎緩ヨリ  
 起ル白帶下等ハ粘液漏泄ニ殊効アリ  
 硼砂モ亦收斂人功少トセヌ故ニ外部ノ創傷  
 =用テ良効アリ之ヲ内服セシムレハ腹部諸管  
 ノ刺戟シ能ク其部ノ閉塞ヲ開達ス  
 諸種人金瘞ノ中ニ就テ鉛劑即チ鉛錠鉛糖人如  
 ナハ尤ニ強キ收斂葉ト不然レバ唯緩ヨウ起  
 ル眼病各部脱垂搦挫諸液溢外ニ溢シスル者ニ  
 外用メ危害十久常ニ奇驗アリ能ク其部之脉管  
 ノ收閉シ膨脹ヲ防キ創傷ア強壯ニス若ニ之ヲ  
 内用スル件八十多ノ謹慎ヲ加スルニ非サレハ  
 動モスレ小危害ヲ招ク

硫酸銅モ亦強キ收斂某ニメ兼ヌルニ腐蝕性ヲ  
以テス故ニ潰瘍人患部弛緩メ齶肉多キ者ニ外  
用メ捷効アリ又止血ノ良効アリ』銀剤モ亦同効  
アリ即チ開達ヨルクスマルチスノ如キ至久ノ  
諸液漏泄ニ大効アリ』  
允ノ收斂方ノ用テ勝功ヲ收メシト缺七八患者  
ノ機生ニ注意スヘシ諸禪ノ羹汁飲液生果実等  
都テ穢雜ヲ弛緩セシム者八宜久之ヲ禁スヘ  
シ之ニ艾レテ肉食乾果美蒸餅佳酒殊ニ赤蒲萄  
酒ボウルゴムノトニヘテ常ニ良効アリ古人快症  
ニ於テ皮膚ノ蒸氣ヲ開達スルノ称譽ス』身體過  
度ノ運動及ヒ温水浴温灰浴共ニ其効ヲ称ス』セ  
ルレニス氏發行乾浴法ヲ称用ス』寒浴法ハ之ヲ用  
ルト必ス謹慎ヲ要ス温浴ハ全ノ之レア禁止ス

物理  
凝体及ヒ流体其実直分子太々密接ニ遇クルキ  
ハ則干諸器ノ運営及ヒ諸液ノ運行自由ナル  
能ハス以テ生活機能ヲ遂クルトヲ得ス凝幹ニ  
在テハ之ヲ拘急ト謂ヒ流幹ニ在テ之ヲ稠羣  
ト云之ヲ治スルノ法之ヲ緩和滋潤方ト云一ニ  
幹中鍼損スル所人稀淡流動物ヲ增加スルニア  
リ  
然ニ比緩和滋潤某ノ幹中ニ入ルヤ其形直テ以  
テ変セスノ直干ニ其四末ニ達シ効ヲ致ス者ニ

感之大故。漢高祖感而起拔劍爲肉多於外  
用以提劍者。又此年夏正月，武陵人共  
有九人，同聞達道，得度脫生死。平居人  
皆謂達子大妙也。又漢高祖與樊噲、樊  
噲以救數方力，用天陽功，收人氣，與俱  
還，悉有奇遇。及至，謂樊噲曰：「銅渡生  
都所傳錄，力絕彼等，不亦奇乎？」樊噲笑  
曰：「平生不識此間事，豈能盡知其禁耳？」  
高祖笑曰：「樊君，汝亦勞矣。吾素聞汝  
好之，今以汝為勞也。」樊噲曰：「臣愚陋，  
處於聖朝，蒙君厚恩，誠如天雨粟也。其後

アラス何者入人軀中ニハ剋化機能ナル者アリ  
 テ元ノ体中ニ入未スル所ノ者ヲメ能ク之ア変  
 化割制シテ其本形ヲ存スルト能ハサランム然  
 リ而メ其菜ノ能ク功ヲ四末ニ奏スル所以ハ一  
 ニハ交感ノ機能ニヨリニシム其寒張乾燥硬結  
 之部ヲ弛緩シ諸液ノ運行ヲ流利シ諸種ノ外汎  
 フメ適度ニ復セシムニ由ルナリ  
 又一種ノ方アリ其所用所謂緩和滋潤菜ニ非ス  
 メ而メヨク緩和滋潤ノ功ヲ奏スル者ナリ医者  
 若シ緩和滋潤方ヲ行ハント欲セハ宜ク先ツ丈  
 痘ノ由テ末レ所ヲ審ニスヘシ若シ其部厥衡メ  
 拘急スル者ハ消瘀方ヲ施シ又其部痙攣メ拘急  
 スルキハ則チ鎮痉菜ヲ典スルニ若クハテン又タ  
 進逼衝動ノ呂ヲ匪テ以テ其部ヲ刺戟シ其拘急  
 ヲ軟和シ其硬結ヲ解散スル者アリ之ヲ要スル  
 ニ菜ノ内服ト外用トヲ論セス患者ノ体中ニ入  
 テ元運ヲ一變シ多吸収ノ機能テメ其脊整常  
 度ヲ得セシムルナリ則チ其功勝天言フ可ガラ  
 ス水ノ滋潤菜タル眾人ノ知ル所ナリ然レヒ元  
 運一變シ蒸氣開達スルニ非サレハ則チ其功ヲ奏  
 スルコト得ス

凝軀ノ強急拘攣スル者概スルニ坎方ニ宜シ凡  
凝軀緩急スルハ則脈管ノ運管自由ナラス流体  
活潑流利スルト能ハス血中鐵維質ヲ生スルト  
テク貯質粘凝運行遲慢シ諸器ノ感觸隨テ遲鈍  
ナル則チ黒祖液病老人ノ關節強急及ヒ搬衝  
后人一部強急ノ者ニ於テ屢視ル所十ノ坎ノ諸  
症共ニ以方ニ宜シ  
若シ軀中自然ノ滑液ヲ失スルアルキハ其部  
拘急メ其機能ヲ遂クルト能ハス老人ノ便秘是  
ナリ此症若渭茶汁ア以テ吉利私翁トシ施ス

誠誰賢張甚シク覓機過敏若クハ其齊整分離ア  
失スルキハ則疼痛率痺ヲ起ス妙方之ヲ至十九  
此ニ由テ津液增加シ管乳開弛スルキハ則緊張  
スル者軟和シ覺機均度ヲ得故ニ急性癥ノ初發  
ニ之ヲ用サルキハヨクノ莫大利ヲ促シ大効アリ  
熾盛病壯熱煩渴シ蒸氣壅閉スル者共ニ妙ノ方  
ヲ要ス胸膈衝及ヒ咳嗽ニ妙方ヲ用エルキハ吐  
痰ヲ催進シ大ニ利益アリ

痙挛熱ヲ兼乎サル者亦以方ニ宣シ疼痛草ニ温  
洛法ヲ用テ治ヲ得ル者屢之アリ  
猪心全養者  
腸中燥屎懸留シ甚部痙挛緊張スル者又以テ用

ア効アリ。諸毒病由ア酷厉ナル者諸酸化金萎若ク  
ハ諸毒物ア服シ胃腸拘急短窄スル者亦妙方ヲ  
用テ良十ノ。又微ニ。此方ノ行フ者特ニ鐵淮人。猛烈ア軟和セ  
ルノ。此方ノ行フ者特ニ鐵淮人。猛烈ア軟和セ  
ルノ。ト欲メ而メ覓機人。寥懶ニ注意セサムハ  
則ナ誤用トス何者鐵淮本ト犯後ニ唯覓機妄動  
ノ為ニ却テ拘急痙挛スル者アリ。医若シ誤認メ  
真誠惟強急ナリトノ草ニ緩和方ア与フル。牛ハ  
則利益ナレ。此症之ニ配スルニ鎮痉藥ア以テメ  
始メア効アリ。熱病中發スル所ノ痙攣及ニ搐掣  
病熱ア兼子サル者屡々症ナリ。  
鐵淮拘急スル者概メ此方ヲ行ハント欲スル者  
ハ誤トス。医者當ニ先ツ宜因ア詳ニシテ而后ニ  
此方ヲ企ツヘシ。毒物諸種ノ酷厉物及ニ其有形  
刺戟物懸苗メ拘急タ起ス者アリ。若レ然ル者ハ  
往ニ此方ヲ用ヰア之ア包覆セント欲スルヨリ  
ハ不レ。若其刺戟物ア除去シ若ノハ之ア制刺スレ  
ニ油类ア用テ之ア包覆ヒト欲スルヨリハ碗  
化加尔基若クハ硫化剝焉亞利ヲ与ヘテ速カニ

之ヲ制刺スレニハ若カ又諸種之毒物ヲ服ス  
ル者ハ須ク其毒性ノ察シ速力ニ之ヲ制刺スレ  
ノ菜ヲ与ヘ若クハ吐下剤アキテ速力ニ之ヲ抹  
除スヘシ乳汁ヲ多用シ之ヲ甘和セバト飲スル  
ハ竜ニ峻功ナリ

又病緩和剤ノ症人如クニシテ却テ收斂方若ク  
ハ進運剤ニ由テ覺機發、毒病頓ニ今利スル者  
アリ此症庸医察セス徧ニ緩和剤ヲ与ヘ悠<sup>日</sup>で日  
ア送ル<sup>曹</sup>ニ貰拘急症率ア解散スルア得サルノ  
三十<sup>ア</sup>ス却テ良能多利ノ道路ヲ塞キ病アメ益  
治ア得サラシニ加之是時緩和方ヲ与フルニ由  
テ諸器大ニ犯弱シ状ニ於テ力諸症交起リ其究  
救治ス可ラサルニ至ル故ニ緩和剤ヲ用ヰルニ  
ハ必ス謹慎ア加フヘシ胸膈衝ノ如キ謹テ緩和  
滋潤剤ヲ与フル片ハ一時吐痰ア催進シ大ニ其  
令利ア促スナリ然リト萬医者顧慮十<sup>ク</sup>取ク之  
ヲ与テ息マサレ代ハ則之ニ由テ大ニ肺氣管ア  
犯弱シ竟ニ患者ヲメ不治ノ胸病ニ罹ラシイ是  
他十シ緩和方福胎ア貼スノ常ニ漸除ニメ他ノ  
攻擊品ア誤用スルノ害ヲ起スノ急暴ナルカ知  
クナラス逐者之ヲ輕侮スレハナリ

腸胃病ニ緩和方ヲ行ス久シケンハ其部終ニ

弛弱シ消化排除人機ス失シ却ア其病根ヲ培養  
スルナメ道ニシテ亦速効スルハ固ヨリ論十  
夫レ緩和法ノヨク厥衡ア治スルハ固ヨリ論十  
シ然リト虽ニ虚性症久人厥衡ハ刺戟品若クハ  
收斂品ニ非サレヘ治セズ諸種疼痛痺率亦緩  
和剤ノ治スル所方リ然レニ覓機ノ不整分離ニ  
由テ之ヲ得ル者ハ必ス難此劑フ要ス  
瘡瘍癰膿ノ期ニ緩和剤ア与ヘテ之ヲ促スハ医  
家ノ常套トス然レモ生力ノ吐氣ア較レア以ア  
治法ノ第一義トス若シ生力微弱ニメ以テ良膿  
ヲ釀成スルト能ハサル者ハ進運方ニ非レハ効

夫レ緩和滋潤剤ア与フルニハ尤モ攝生ニ注意  
スヘシ凡ソ摄生適宜ナルキハ茶剤ニア得ルト  
能ハサルノ効ア奏スルト少ナカラス殊ニ精神  
ア安靜ナラシメ温摩中ニ安卧シ蒸氣ア開達ス  
ルキハ大ニ良効アリ之ニ反メ身神疲勞ハ大ニ  
疑体ア強硬ニメ諸力ア費耗ス  
病弱室ノ急ハ勉メア温後ナルヘシ痛風諸症閑節  
諸品ノ過硬ニ恩スル諸症ニハ遂氣洛ノ大効アル  
1誰カ疑ア客ニヤ尤モ費用ス入キハ新獲數肉

ノ蒸氣トス妙ニ由テ「ア」ルレキ氏拂郎斯ノ軍將  
ラニ子ス氏ア癒シ大ニ名譽ア得タリ強硬ノ部  
ハ緩和温蒸剤ア良トス之ニ由テ膿瘍及ニ強硬  
ノ部軟緩解散スルトア得ルナリ

下古八  
温浴ハ華氏ナセ七十度乃至九十度ニ過ル勿レ  
以テ物急ク軟緩レ強直ア緩和シ諸力ヲ平均レ  
疼痛ア鎮靜シ血行ア通宣ニシ蒸氣ヲ開達ス  
之ヲ施スト過宜ナルキハ直ナニ脉軟緩シ症半  
ア鎮靜シ頭部爽快眼目清亮疼痛消散スアシテ  
イリエス氏温浴ヲ施スヘキ三則ヲ定ム曰諸般矯  
撫鍼衝固形部強硬ナリアカテイニス氏之ニ附

言メ曰許多費力后ノ疲憊ナリ是終日旅行者毎  
所驗知ニ又病者生力費憊シ症半大熱煩渴皮膚  
牽縮及ニ諸般ノ皮病蒸氣閉止スル者ニ皆良ナ  
リ

更ニ緩和ノ力ヲ増スニ分疏黄石鉢胡蘆子錦葵  
等ヲ加フ兼テ諸力ヲ表揮スルニハ酒姜ヲ加フ  
瓦ノ浴<sup>ア</sup>ハ更ニ温煖ニ保護シ發汗セムヘ  
浴后直干ニ寒冷ニ觸冒スルキハ令弛緩スル所  
ノ皮膚ノ細管急ニ收縮シ蒸氣閉塞シ血液内部  
ニ逼迫シ以テ大害ヲ招ク又温浴ヲ施スト過度  
ナルキハ甚シノ弛緩セシムア以テ許多ノ害

ヲ生ス

葵葉葵

根ノ煎剤糊剤トシテ内張外用ス。榅桲子ハ  
眼疾ニ外用ス。葫芦巴子ハ糊剤浴剤トスアラビ  
アコハ達利侃寫護膜同効十」凡ノ植物膠動物  
膠ハ共ニ丈効相似タリト墨氏動物膠ハ蜜煮ア  
合ムトモニ鳥卵及ニ乳汁ノ如ニ蜜砂糖滿那及  
ニ糖飯ヲ含ムノ諸品其酸化ニ由ア緩和人効ア  
リ油頭呂石欽脂肪膏蠅阿列穢油斯百兒广根谷  
ハ外用トシ扁桃油草方油ハ内用トス  
内部ア緩和滋潤スルニハ吉利私的兒ア以テ大  
便通利ヲ適宜ニスヘシ其剤ハ上章ノ諸品及ヒ  
別ニ和胸剤ノ名ア」然レバ此諸法ニ亦過度ナ  
ルトカレ后害ア遺ス

強壯方トハ直チニ諸力ヲ奮起シ動機ヲ發揮シ  
以テ諸部ノ機能ヲメ皆其宜ニ適セシムル諸品  
ヲ云今此方ノ用ヲ知ニト致セハ先ツ諸力ガ適  
度ニアルキハ諸機能皆其平全ヲ得ルトア知ル  
ヘシ故ニ動覓ニ機過敏ナラス過鈍ナラヌニ核  
ノ對称適度ヲ得テ共ニ過不及ナク隨意不隨意  
ノ而運動共ニ適宜ニメ器機諸力及ニ意藏モ亦  
過不及ナク滋養多必排泄ノ諸機各其宜ニ適ス

第二編 變化生力  
强壮方第三

卷十

強壯方トハ直チニ諸力ヲ奮起シ動機ヲ發揮シ  
以テ諸部ノ機能ヲノ皆某且ニ適セシムル諸品  
ヲ云今此方ノ用ヲ知ニト致セハ先ソ諸力其適  
度ニアルキハ諸機能皆其平全ヲ得ルトア知ル  
ヘシ故ニ動覓ニ機過敏ナラス過鈍ナラスニ機  
ノ對称適度ヲ得テ共ニ過不及十ク隨意不隨意  
ノ兩運動共ニ適宜ニメ器機諸力及ニ意識モ亦  
過不及十ク滋養分泌排泄ノ諸機各其宜ニ適ス

第二編 變化生力

程壯方第三

功理

強壯方トハ直チニ諸力ヲ奮起シ動機ヲ發揮シ  
以テ諸部ノ機能ヲノ皆某且ニ適セシムル諸品  
ヲ云今此方ノ用ヲ知ニト致セハ先ソ諸力其適  
度ニアルキハ諸機能皆其平全ヲ得ルトア知ル  
ヘシ故ニ動覓ニ機過敏ナラス過鈍ナラスニ機  
ノ對称適度ヲ得テ共ニ過不及十ク隨意不隨意  
ノ兩運動共ニ適宜ニメ器機諸力及ヒ意識モ亦  
過不及十ク滋養分泌排泄ノ諸機各其宜ニ適ス

ル之ヲ十全健康ト名ノ故ニ上ノ諸機能其平ヲ失スル之ヲ一身若ノハ一部ノ衰弱ト云<sup>一</sup>脳或八肺ニ血液貯積シ以テ諸力ヲ抑遏シ或ハ全身流布平均十又八歳ハ隨テ各種人神至諸忘<sup>二</sup>登ス則胃中焼ク力加ク<sup>三</sup>登熱惡寒等ナリ<sup>四</sup>又覺機ハ衰弱ハ動機ノ衰弱ト趣ア異ニ<sup>五</sup>兩機ノ衰弱又神給機ノ衰弱ト異ナリ<sup>六</sup>動機沉伏スレハ覺機隨テ尤起<sup>七</sup>久起<sup>八</sup>補機減殺<sup>九</sup>スレハ覺機旺盛<sup>十</sup>水腫等<sup>十一</sup>病察覺<sup>十二</sup>機減<sup>十三</sup>ハ補機増<sup>十四</sup>斯地雙腫ノ如キ<sup>十五</sup>知覺頑鈍<sup>十六</sup>長育<sup>十七</sup>然レニ此諸力各自立スル者ニ非又彼坎相關係

スル者トス故ニ個機虛偽スレハ那機一時奮起スルセ貞定相共ニ衰憊シ兩機衰憊スレハ補給機モ亦終ニ況衰スルニ至ル

補力ノ機能ヲ障害スル所以ノ者又排除スルノ品概メ之ヲ強壯方ト云者可ナリ例スルニ下剤浮血鎮痙<sup>一</sup>菜ノ如キモ各其障害スルノ原因ヲ除シ機能ヲ回復セシムルキハ則強壯スルナリ且ツ<sup>二</sup>識能ノ強後<sup>三</sup>ア保固強壯スルアリ又補給校ア滋養<sup>四</sup>以テ篤壯<sup>五</sup>スルアリ又兼テ覺機ヲ催進スルアリ其不整ア回復スルアリ故ニ強壯方ノ名稱甚<sup>六</sup>々廣闊ナル者十又

凡ソ強壯方ハ直ニ諸力ヲ奮起強壯スル者ニ  
非ス先ツ鐵維ヲ保固シ以テ諸力ニ及フ者トス  
而メ所謂強壯品モ久ハ周陽ノ運営ア悠  
テ良性氣糜ノ生ニ良血液ノ釀レ筋筋ヲ滋養レ  
分必吸收ノ諸機ア適宜ニシ而メ其費耗ア補給  
スルニ至ル」凡ソ強壯方ハ吸收方進運方トハ自  
然ノ別アリ吸收方ハ唯鐵維ノ凝聚ア増妥スル  
ノ三進運方ハ覺機方奮起活陰十ニシハル首十  
リ強壯品ノ兼テ覺機ア奮セシヘル者之レア  
鐵維強壯品ト云

## 對徵

一身諸力ノ缺損則真衰弱ナル者雖強壯方ヲ處ス  
ルノ一大目的トス何ヲ以テ真衰弱ヲ辨知スヘ  
キヤ曰ク許多ノ書録ア讀ニ疾病ノ原因流行ノ  
病性及ニ顯登ノ諸症ヲ比較シ之ヲ知ルヘシ病  
已ニ失血若クハ諸液脫泄ヨリ未ル者ハ則血液  
費耗ヨリ未ル者ニメ真衰弱ニ属スヘレ  
覺機ノ流注一身平均十ラス一部ハ尤起シ一部  
ハ沈伏スル者ハ直ニニ強壯方ヲ与フ可ラズ以  
テ真衰弱ト年別スヘシ  
動機衰弊シ覺機墮テ遲鈍ナル者貞羅運氏派之  
ト延年衰弱ト名ケ其原過強ノ運動ヨリ未ル者

ト云此症強壯方ニ草用スルトナク宜ク進運方  
ヲ配用スヘシ是他ナニ覺機役スルニ非レハ衰  
弱治セサレハナリ「病后ノ人殊ニ此兩方ヲ配用  
スヘシ但ニ病后却テ覺機過鈍ナル者ハ進運方  
ヲニフルト勿レ」

補機ノ衰弱強壯方ニ宜シ覺機或ハ一時尤起ス  
ルモ終ニ費耗ノ鑄フニ迄ラサルヲ以テ亦若ニ  
衰憊ス宜ク強壯方ト進運方トヲ配スヘシ且ツ  
滋養ノ食餌ヲ与ハ腸胃及ヒ皮膚ノ吸收ア促シ  
良血液ヲ醸成スルヲ最要トス

全身衰弱スト虽熱ナク又貴要ノ部ニ於テ著キ

妨害ナク変性ナキ者人死ニ至ラス宜ク覺機ヲ  
發揚シ熱ヲ誘起シ諸器ヲメ一異ノ運営ヲ發セ  
シメ而後始テ強壯方ヲ与フヘシ  
上ノ諸說ヲ以テ強壯<sup>壯</sup>方ヲナフヘキノ大概ア知ル  
ヘシト雖比今更ニ之ヲ細論申明スヘシ茲ニ間  
歇然アリ此症草飼ニメ歛衝若クハ腸胃ノ汚物  
等ノ合併ナキ者ハ強壯方ヲナフシ又胃腸汚物  
アリト雖比其原胃腸ノ弛緩若クハ穢氣水素氣  
等ニ由テ諸力衰弱ヨリ生スル者ハ又強壯方ニ  
軍シ以テ脛部神經ノ機能ヲ平均スルヲ得ヘ  
シ又熱ノ營造スル力爲ニ生スル所ノ汚物ハ亦

此方ニ里ニ都テ熱病后地變若クハ腸胃汚物ニ  
原スル后病共ニ妙方ニ由テ治スヘシ而レニ後  
ニ鮮疑方ヲ以テ分鮮セシメントスレハ終ニ其  
原ア排去スルト能ハス地張然ニ於テ適時ニ妙  
方ヲ施ス時ハ其効寡少ナラズ然レニ惡性熱ノ  
初期及ニ覺機暴動スル力若クハ不聖ナルカ或  
ハ已ニ先ニ瀕スル者ニ妙方ヲ處スレハ其害甚  
大ナリ故ニ凡ク此方ヲ處スルハ勤機覺機ノ艾  
ニ沉衰スルヲ以テ適時トス則チ熱頭シノ減退  
シ脉軟弱身休怠惰眼目委衰等ノ動機沉衰ヲ微  
スル時是ナリ但ニ大湯刷痛吸呼困難澹安内熱  
煩悶眼色陰惡等ノ症ヤム者ニハ妄投スルト勿  
ヒ又四支振掉ハ兼發ノ諸症覺機ノ暴動ヲ徵セ  
アルハ示此方ニ宜シ

其性ノ急慢ニ論ナク血液腐敗ニ傾ク有ニハ此  
方偉効アリ蓋シ血液ノ腐敗スルヤ其原生カノ  
衰憊ニアリ生カニニ衰憊スルニハ循流ノ調化  
皆亘ラ失ス而メ其生カノ衰憊スルヤ或ハ直ナ  
ニ傳染毒若クハ惡性食膾ニ由ル者アリ故ニ傳  
染惡性病強壯方ヲ以テ防禦スヘキ者屢々之ア  
リ然レ正保固強壯品ヲ以テ腐敗ヲ防禦セント  
欲ムルハ寃機ノ六瓣人動機ノ沉衰ト併發ス

ルヲ以テ大日的トス。脉小徐軟弱。眼目委衰。声音振搖。立神ノ感覺遲鈍。嗜眼精神疲倦。脱汗下利尿。崩等是アル。レ止煥肉譫妄。不眠。内部疼痛。脉強矣。等ノ症アル者ハ強壯方ヲ施スノ前必ス先ツ覓機ヲ興。靜スルヲ要ス。

凡ソ厥衡諸症。強壯方ヲ興スル時。ハ却テ増進セシム也。テ以テ害アリト。但シ一種ソ厥衡アリ。其原衰弱ニ由リ虛弱ノ人ニ發シ終ニ壞疽。若クハ慢性臍瘍ニ陥ル者ハ強壯諸方ヲ施スヘレ老人虛憊。思液煩ノ久ノ厥衡寒痛ナク大熱ナキ者ハ生々速カニ費耗スル。以テ亦此方ニ宜シ皮スヘレ。

膚病其癰班青黑色。皮膚滲澹寒冷。且リ眩暉頻發。シ脉小遲。諸力沉衰スル者等。示此方ニ宜シ。内部ノ慢性厥衡。臍瘍熱ナク。或ハ之アルモ。其瘦輕微ニメ。諸液脫洩。昏眩嗜睡。覓機視テ等。此方ニ宜シ。房療。ノ局部。臍瘍ラ無シ者。少滋養剤及ヒ滋養ノ食餌ヲ要スル者多キカ故ニ強壯方ハ謹慎メ施スヘレ。

慢性疼痛直ケニ此方ヲ与フ可ニ非スト。魚若レ械器損傷。胃腸ノ力乏サ内藏衰憊至久不治ノ者ハ此方ヲ要ス。痛凡諸症癰作定期十日且ツ劇痛十日者ハ此方ニ宜シ尤モ根生ニ注意スヘレ單

ニ 固性強壯方ノミヲ服スルニハ却テ貴要ノ部  
 ニ 向テ諸液ノ遍進ヲ生ス」慢性倭亢貞亦此方ト  
 滋養方トヲ併セ行テ治ス  
 痘季諸症補益機及ヒ覓機衰憊し癰作間歇スル  
 者強壯方ニ非レハ治セス子宮病ノ如キ一時鎮  
 痘方鯖ク効ヲ致スト鯖<sub>諸</sub>効カヲ挽回レ内臟諸機  
 ラ画復スルノ強壯方及ヒ良半滋養方ニ擾ラサ  
 レハ根治スルノ鯖ハス是レ癰痼ノ諸茶効ナキ  
 者ヨリ吉那獣皮ヲ以テ治スル者アル所以ナリ  
 諸失血寒原脉管弛緩覓機減退ニアル者ハ強壯  
 方收斂方ヲ以テ治ス然レニ此方却テ血液ノ遍  
 進ヲ增加スルアルヲ以テ注意シ与フヘリ慢

壯下利寒瘡症季已ニ銷去シ下利止スアル者此  
 方及ヒ保固強壯方ヲ以テ治スル有少シ  
 施綏ヨリ未ルノ閉塞益甚シ。自此方ヲ用テ治スヘ  
 レ殊ニ胃腸粘液動モスレハ蛔虫ヲ生スルモノ  
 ニハ此方兼テ殺虫ノ効アリト云フヘシ皓石モノ  
 亦此方ヲ以テ消散分碎スヘキアリ

反微

上ニ論スルカ如ク此方良効アリト。余諸カ抑壓  
 ヨリ登ス心諸病共ニ此法ヲ與フルノ勿レ凡ソ

真衰弱ト假衰弱諸才壓抑セラレテト其外見諸

スル

衰弱ナリテ

カ

衰弱ナリテ

カ

衰弱ナリテ

カ

衰弱ナリテ

カ

症甚夕相似タリト免宜ク精意ニ注目弁別スヘ  
シ若シ血液逼進鬱積シ之夕烏ニ衰弱ノ侯、ラ見  
ハス者誤テ強壯方ヲ与ヘシニハ更ニ益血行フ  
催進シ衰弱ヲ増加ス故ニ此方ヲ處セレト欲セ  
ハ先ワ其衰弱スル所以ノ原因発症ニ弁識シテ  
而后之ニ更ノヘシ胃腸ノ汚物原分利人鳥ニ發  
スル積血ニ由ル者瘡医誤認テ真衰弱トサレ  
妄リニ強也ラ与ヘレト欲ス是大ニ否ラス却方  
テ吐剤下剤泻血ヲ以テ速治不ヘキ者ニ又真衰  
弱ト魚氏胃腸汚物便秘積血アル者ハ先ワ其汚

物積血ヲ排除シ後強壯方ヲ与ヘン否レハ益  
其積血ラ<sup>増</sup>積血ニ害ヲ招クナリ

第百九章

寃械ノ元起ト不整トハ此禁方ノ最一トス誓函  
急牲廻衝若クハ凝体拘急スル者ニ記スル  
ノ對徵第百二章アルニ非レハ妄リニ此方ヲ與フ  
レフ勿レ痔血痛凡子宮病等皆此方ヲ禁、  
スブテウン汎從ノ誤治往々目繫スル所ヘ  
良能病毒ス分利スレク為ニ諸々壓抑ヲ以テス  
ルアリ例スルニ疼痛痉挛卷熱等良能ノ一大運  
官トス此際猥リニ強壯方ヲ与フレハ唯至妙ノ  
極能ツ障害スルノニ患者痛凡及ヒ痙挛ノ發伏

第百三十章

ニ由テ諸カ慎発揚堯スルコ強壯方ノ比ニ非也  
慢性病一身衰徳ニ游化機缺損服某ニ堪卫可ル  
者アリ曾ヨテ一婦人不食常ニ痙孪者ノ患ヒテガ  
許ノ茱萸ヲモ服不心フ能ハズ然レバ六十歳ニ  
至ル者アリ此症宜ク良能ニ委仕ニ其劇症シ鎮  
靜スヘキナモ妄リニ強壯方ヲ与ヘテ之ヲ治セ  
トスルハ大訣トス

換茶

共一食山根生

諸般ノ疾病皆根生法ニ注意スヘント既安強壯  
方ヲ行フニ<sup>モ</sup>嘗テハ尤ニ緊務トス

第百三十九章

第百三十三章

凡ソ食餌ノ強壯ノ名アル者悉ク諸患者ニ与フ  
ヘキニアテス但シ淡薄ニメ游化レ雅半岳ヲ授  
ミ胃腸ラメ消化機能ラ労セレムレ勿ビ久ク游  
化レ進半岳ハ健全ノ胃腸ニ非レハニ<sup>モ</sup>渴ヘス  
然レ民人皆生未竹習ノ常食アレハ概論レ難シ  
依ト氏曰凡食山隨其習慣可定之也事父曰夫之  
所慣者不適於深閨處女深閨處女之所常食者非  
田丁野人ノ竹適又曰凡所適ノ者則為良善山故  
ニ患者自テ嗜好スニ竹ノ者ハ大害アル木屋ニ  
非レハ之ヲ許メ可ナリ蓋し食山ノ性能茶効ト  
相激スルヲ勿ルヘシ水銀剤ヲ服スル者ハ莫矣

反し酸塩ヲ禁ス又善良苗ト牛一頭ニ飽食スル  
ハ害アリ宜ク少量フ、数回与フヘシ。越菜味  
滋養苗其植物ト動物トノ異ニ遁テ性能亦同レ  
カラス凡ソ内麦、少膏敗ニ易ク又消化ニ易シ故  
ニ熱病患者ニハ肉苗肉羹汁鳥卵等害アリ熱愈  
誓而スル者ニ肉麦愈害アリ唯大麦煎蕊麦煎ノ  
ミヲ良トス其用法ハ病性ニ隨フ然レニ些已ニ  
減除レ諸々衰憊スル者ニ滋養苗ヲ飮用スヘシ  
此症ニ稀冷ノ食ヲ進マレハ治瘉ヲ妨ケルヲ硬  
勦難化ノ苗及ニ精氣腕烈ナル者ハ用サルノ害  
ニ同シ又植物常ニ良トリト僻スルヲ勿ニ夫レ

植物苗ハ速タニ酸敗スルヲ以テ虛弱ノ胃之ヲ  
消化スルト鯛ハス莫寔ハ殊ニ速カニ酸敗シ凡  
氣ヲ生スルカ故ニ冒弱症ニハ肉麦ノ消化ニ易  
キニ如カス又患者ノ好嗜ニ依ルヘシ譬ハ肉食  
ヲ嫌フ者ニハ肉麦果メ害アリ酒ヲ飲スル人ニ  
ハ酒則良ナリ其消化ニ易キカ為ニ病后ニハ植  
物ヨリハ肉羹汁ヲ優リトス

肉呂中亦多シノ別アリ病后ノ人ニハ炙熟肉炙  
鳥肉ヲ以テ最良トス咀嚼ニ鯛ハアル若ニハ煮  
肉汁鶏羹汁ヲ食トス宜ク稻米精麦精正人參洋  
安馬齒覓地榆等ヲ配用スヘシ。病后若クハ長

病后ノ人ニハ動物膠ヲ良ト入牘内膠鹿角膠ニ沙糖列印設酒燈汁ヲ和用入葢餅鹿角砂糖ノ美汁亦良ト」水陸共ニ住スル所ノ動物殊ニ蝶、蜥蜴、蟆ハ諸謨尼亞ヲ含蓄スル丁冗多ナルメ以テ利尿發汗ノ功アリ故ニ血液損敗体軀衰憊ハル者ニ良ナリ」勞瘵病ニハ蝸牛肉ヲ雖推シ乾梅ヲ加ヘア滋養ノ一良品トス夫レ急性諸病ニハ塩藏肉薰肉共ニ害アリト魚氏慢性諸病ニハ呴呑ヲ良トス夫レ乳汁ハ滋養品中ノ最大タルヲ以テ労瘵ハ尤モ良ナリ就中人乳驴乳ヲ止淨トス告ニ卵

白貨ト同量糖貯ヲ含有ス人乳ハ勉テ乳房ニ就テ温飲スヘレ駄乳ハ其貯重タ消化シ難キヲ以テセルチユル水炭酸<sub>ヲ含ケ</sub><sup>ラ</sup>杏竈單煎ヲ配用レ且ツ消化ヲ進ムル為ニ新氣ヲ吸納レ兼テ動作セシム心ニ酸餘乳清芝ニ良品タク殊ニ乳清ニ明礬ヲ和スル者ハ收斂ノ功アルカ故ニ諸出血ニ欲用ス諸鳥卵殊ニ鷄卵ハ其貯乳汁<sub>ノ如シ出</sub><sup>生</sup>飲シ若クハ微烹メ用エ滋養ノ良効アリ喜赫<sub>馬名</sub>卵ハ人擧テ賞スルニ油貯冗步アレハ病者ニ透セス熟烹ノ卵ハ其貯剛堅ニシテ消化シ易カラス奥炎ハ腐敗シ易ケレハ病者ニ透セス有熱ノ

者ニハ殊ニ害アリスアトシベレヒリバ  
ノルズホルニホレヒカベルヤアウ名喚  
ノ麦ハ良性ノ呂ナタカニベルフテセシエルフ  
止マリヒクノルハナシハリニタアリヒリヒ  
ルラムブレ鳥ノ麥ハ多精ナシハ良ナラズ  
諸大隻海魚魚ノ肉強硬ナルカ故ニ禁スヘ  
植物中良善滋養人物ハ穀类ト久就中ハ前ヘル  
バルトゲ大ブロウキトトガラズ  
タルウニ小ロツヘブロリ止裸文並餅等ハ良品也  
裸麦粉ニテ製ハシメ食鹽ソルト方療患者モニタ良  
ナリ又沙護及モニ其煎汁ニ砂糖橙皮桂皮シロス配ス  
ル者或小橙汁酒モニ肉羹汁モニ者亦良ナリ  
沙列布並亦禦性諸病ニ良ナリ  
アトモドアツペモニ鮮類ノ糊貯ラ含ムトダケ  
レハ食スルヲ勿レ唯緩病ニハ或ハ之ヲ許ス  
ベウーン豆类入タル者バウ子ニユルウテシド  
アカルウテン豆类ノ等ノ未タ過熟ニ至ラアリ時有  
ハ糖貯ノ瓶液ラ含ムトダキテ諸患者ニ通  
用スヘント魚其過熟ニ及ニテハ糊貯卵白貯愈  
增多シ糖貯隨テ減ニシ凡氣ヲ生スレシ以良  
ナラス

諸根类、蘿葡萄、蔓菁、糖根、等ハ柔軟美味ノ者ナリ是

糖類ト粘液質トノ併有スモ改米之ヲ食レテ澁

化ラ助ケ便通ヲ宜クシスベシギース」ホツアコロ

アリラデウイルデコモトニウムテフリトニ等亦此

ニ属スヘシ「テメアヌトヒアリトムコトニ等亦

シタクアリシニコトニウムアリエコト此ウツテコ

トヒトアリシニコトニウムアリエコト此ウツテコ

テレイオルトル」ベテルセリトスビナキ」等、

全ク之ヲ禁ス慢性患者ニハ或ハ之ヲ許ス

諸果実中乾櫻矣梅李再無花莫蒲桃覆盆子委

ハ止等ノ者トス他ノ菓矣例スルニ梨アベルコ

ゼ亡ベルキケニ等ハ凡氣ヲ蒙シ醜索ア奪却ス

コロイクスベシイニアールベシトニハ滋養ニメ

收斂ノ性アリ」此呂平人或ハ諸患者ニ通用ヘト

魚諸カア奮起セシメント欲スル者ニハ妄ニリ

与フル」ナカレ

凡ソ身体シ強壯スルノ飲液ハ消化器ラ軽ト刺

戟シ分必ラ催進スル者ナルヘシ既烈酒类ハ水

ヲ和シ稀クナシテサ許ツ、与フルヘシ佛郎新酒

良善香竈酒ハ強壯人良効アリ」果矣、砂糖香竈酒

等ヲ和融スルノ酒ハ美味ナレハ飲ミ易シ支酒

ハ良善ナラアレ者ハ尿ト共写利シ難レ且ツ些

已ニ消除スル者ニ非レハ謾用スルノ勿レ

諸カラ發揮スルニハ新鮮氣最要トス故ニ病室ノ窓戸ハ頻々開閉ヘシ患者已ニ能ク養離山得心者ハ晴朗溫和ノ日ニハ開闊天地ニ散歩スヘレ山林人氣ハ殊ニ良ナリ又寒冷乾燥透亮人氣ハ溫暖溫潤多霧ノ氣ニ比スル亦要功害相反而人氣之變也

身體動作ハ神至及之脉管ニ大効アリ其諸動作強固ニ消化ヲ増進ニ血液酸化ヲ增加スルノ人共ニ知心竹ナリ而メ夏動作ノ法ハ衰弱ノ輕重體質習慣根生半齒男女病性等ニ隨テ一般ナテ久病后<sup>虚</sup>憲德大甚ニキ有ハ未年ソ良トス騎

馬ハ諸カラ奮起レ精神ヲ復活ニシ且ツ零氣ニ觸ル、丁度キラ以テ其効更ニ大ナリ舟遊亦慢性病ニ良ナリ開達ノ氣中ニ於テ逍遙鍊兵田獵奔踏遊戲等皆良ナリ学者ハ高邑ニ詠唱スヘン凡ノ喜怒哀樂大甚ナルカ烏ニ發スル疾病ケナカテス故ニ病者ノ意思ハ勉メテ勃起活潑ナラレハヘシ医ノ前言スル尤モ謹慎ヲ加ヘテ妄言以テ病者ヲ危懼悲哀セレム勿レ更必死ノ一枚フ能ハアルノ患者ニ臨テハ宜ク之ヲ慰労スヘシ又其好ハ所ノ音曲ヲ以テ精神ヲ發揮スヘシ古人音曲ヲ以テ病ヲ療セシ者アリ他ナレ

神思ヲ諭慰スルノミアスクレピアテス氏ニ般  
ノ音曲ヲ以テ精神ヲ治ス則其鬱憂悲傷スル者  
ハ之ヲ勉励発揚シ其狂躁暴厉ナシ者ハ之ヲ鎮  
定安息ス

## 其二篇

凡ノ強壯藥品中ニ於ノ最有力者ハ鍼劑ナリ  
但ニ有<sup>佐</sup>ノ患者ニ投スルモノ勿シ唯慢性惡液貧  
人衰弱ニ与フヘキノミ其鐵淮大弛緩ヲ強固シ

溫度ヲ增進シ血液<sup>瘦</sup>ヲ調和シ赤分ヲ增加スル等  
ニ於テ誰々ヨク鍼劑ハ右ニ出ル者アラニヤ就  
中鍼序ヲ良トス毎腹<sup>三日</sup>三回至八回香竈品シ配用スヘ  
シ否ラアレハ胃腸ノ温ヲ奪去シ凡氣ヲ鴨生<sup>シ</sup>  
酸化鍼ハ凡氣ヲ生スルコナク且ツ消化シ易キ  
メ以テ更ニ良トス<sup>同</sup>用<sup>量</sup>鍼序硫酸鍼ハ消化機能夫  
宜粘液鬱滯スル者ニ非<sup>サ</sup>硫鍼華ハ兼テ解疑  
ノ効アリ子宮病ニハ神至丁鍼<sup>ベスチウス</sup>法ニ據<sup>テ</sup>賞  
用ス毎服<sup>十日</sup>滴日此他藥鋪製スル所ノ鍼剤品  
委少々ラスト魚甚効彼此サ異同アルノミ  
鍼劑ニ次<sup>ス</sup>者六苦味越歲斯品ト不就中鍼須互

那瑪焉里草零陵香案董薦蒲公英依蘭苦桔失豆  
安孫斯默刺皮格論僕等ハ胃腸ヲ健運シ胆液ノ  
変性ヲ後治シ閉塞又躁通ス故ニ覧機メ不整粘  
液尙滯虫病等共ニ通用ステ  
裏弱太甚シ久凝体弛緩シ彈力ヲ失スルモノ  
ハ拔尔撒謨貟收斂品竹謂強壯良藥アリ殊ニ吉  
那ラ最一トス又是裏弱ノ度ニ隨テ水揚媒七葉  
樹皮榆皮等ヲ接用スヘ  
礦酸動小覓械ヲ減退スルカ故香心臟脉宣ト運管  
機ヲ增進ス蓋シ是効酸素ヲ全身ニ分配スル  
由ニ其岳參多レト魚葷用ニ候不入者ハ硫酸

塩酸硫酸等ナリ其量一日一克

乃至ニ一克半

医則卷之二尾

支屋氏  
藏書印

