

一本堂行餘醫言

六下  
疥癬癩瘡  
癰痔

i 97

F 7  
4-87


490.9  
12-2  
7

No. 2199  
12 / 91



富士川文庫

1375



一本堂行餘醫言卷之六下

疥古拜功

香川修德太沖父著

疥者。謂手指間生小瘡。甚痒。遂及周身也。即邦俗所謂肥前瘡。是已。肥前。西海道州名。其始自肥前州傳來。猶云廣東瘡也。或以謂徽瘡爲華瘡。故未至華瘡。已成肥前瘡之意也。大要有痒痛二様。即俗所謂痒疥。痛疥。是也。其痒者。手指間始生細粟瘡。甚痒。搔之水出。漸延腕臂。遂及周身。有時苦痒。則至爬搔委頓。難爲忍耐。以其瘡在水分。故搔。

行食西言 卷之六下

一才堂藏書

之止步水耳。若搔破較深，則入血分而出血。如是必覺小痛。以其水安，故謂之濕疥。又有小瘡痒，搔之白屑起，皮頑厚而勒，每作乾痂。以其氣分故，不步水。若搔破甚深，徹步血水，故謂之乾疥。其痛者始痒，瘡漸多延，大如豆，大小不一。包膿水如痘瘡，焮赤腫起，疼痛潰爛甚者，與濕疥一般。或有遂成癥瘡者，以其血分故也。膿淋漓，古云馬疥者，即是也。

出神農本草，柳葉條云：馬疥痴瘡。又見名醫別錄、馬勃條。

此證專稱痒疾，雖痛者亦痛痒相半。但痛而有膿者易愈，唯痒而步水者難治。如其無水，唯痒，搔之白皮起，稱乾疥者，至難治。有延及十年餘者。若用外敷藥愈之，或浴冷泉，取速效者甚，則直成暴水脹而死。不死者，陷成結毒，猶癥瘡結毒諸證，蜂起終身不可除治。輕者至成諸結，每發漏可不慎畏乎。

如揚州多田，冷泉為最，及但州城崎溫泉，稱瘡湯者，諸州呼為愈瘡溫泉類皆同。

間有生蟲者。此其末耳。按靈樞稱痴疥。

見經脉篇

神農本草稱疥瘡。馬疥。痴疥。疥蟲。

生石灰、冬灰、五色石脂、青琅玕、藜蘆、羊蹄、敗醬、扁蓄、牙子、莽草、松脂等條。馬疥見上痴疥。見雌黃、薑草、鐵落等條。疥蟲見蕷茹、羖羊角等條。云殺疥蟲。又按草蒿條云、泉條云、疥瘡痂癬蟲、蛇甲條云、瘡疥、棟實條云、疥瘍水銀條云、疥瘍痂瘍○名醫別錄及已條云、疥瘍瘍蝕、柳華條云、痴疥、白及條云、白癬疥蟲、防己條云、諸蛔疥癬蟲瘍、青葙子條云、疥蟲、雄黃、石硫黃、鈎吻等條云、疥

蟲○千金方云、惡瘡其大如錢、名曰馬疥者、謬名也。

病源候論稱大疥。馬疥。水疥。乾疥。濕疥。

云疥者有數種。有大疥。有馬疥。有水疥。有乾疥。有濕疥。多生手足乃至遍體。大疥者作瘡。有膿汁。嫩赤痒痛是也。馬疥者皮內隱嶙起作垠塘搔之不知痛。此二者則重水疥者。瘡癟如小瘰。搘破有水出。此一種小輕乾疥者。但痒搔之皮起作乾痴。濕疥者。小瘡皮薄常有汁出。並皆有蟲。人往往以針頭挑得狀如水內病蟲○水

疥又見外臺祕要所引延年論

千金方稱風疥

云寒熱瘡及風疥諸雜瘡又本艸綱目、墨大豆條云、風疽瘡疥而引千金方。

又云癟疥

云癟疥百療不瘥又云久癟疥濕瘡浸淫日廣癢不可堪搔之黃汁出瘡後復發○千金翼亦云癟疥百瘡○

按古稱今癟疥者不知何疾意是疥類故連稱癟疥邪病源候論云癟疥者由膚腠虛風濕之氣折於血氣結

聚必生多著手足間遙相對如新生菜蔓子痛痒抓搔成瘡黃汁出浸淫生長折裂時癢時劇變化生蟲故名癟疥又云燥癟疥若濕氣少風氣多者其癟則乾燥但痒搔之白骨出乾涸折痛此蟲毒氣淺在皮膚故名燥癟疥又云濕癟疥若風氣少濕氣多其瘡痛痒搔之汁出常濡濕者此蟲毒氣深在於肌肉內故也又有久癟疥候○千金方亦有燥癟濕癟方○千金翼方疥癬門有癟疥癟疥方○外臺祕要癟疥久不瘥門所引劉涓

子療久癟疥癬諸惡瘡毒方又乾濕癬門所引淡師方  
療癟疥方等癟疥元名醫別錄黃理條已上皆是疥癟混舉難得  
分明又稱痘癟見名醫別錄蘿蔔條疥痘見千金方及千金翼方由是觀  
之疥與癟非有大異癟亦疥類不可別立門條故今併  
而論之列載考證如前

久疥

見證治準繩又千金方及千金翼方俱云久疥癩

五疥

醫學入門云五疥乾濕蟲砂膿又云砂疥如砂子細箇  
萬病回春亦同○明醫指掌圖云疥有五乾疥濕疥蟲  
疥砂疥膿窠瘡之別醫學綱目作膿胞瘡又萬病回春云疥後膿疮又祕方集驗云疥

瘡膿窠  
肥瘡

暴疥

見證治準繩

手疥

見醫學綱目

細疥瘡

牛祕方集驗

牛疥

見證類本艸魚脂條云牛疥狗瘡

牛皮疥癩

萬病回春

赤黑丹疥

見本艸綱目白朮器條

馬瘍瘡

見本艸綱目魚歟條

蠶瘍

同上體腸條

錄補證治要訣云瘡癬疥此雖皮膚小疾不足爲害然瘡有惡瘡癬有頑癬疥癬疰疰尤爲煩擾甚至經年累月不能脫油凡病此者不當專用外敷藥須內宣其毒可也此言尤得要領故舉載焉

行餘醫言

卷之六下

一本堂藏書

附字辨

疥者。痒疾也。故說文云。搔也。韻會舉要。韻會小補。康熙字典等。俱引說文作癩。按今說文作搔。三書恐誤。說文元有搔。無癩。周禮天官疾醫夏時有痒疥疾。後漢書鮮卑傳。蔡邕議。邊垂之患。手足之疥癩。中國之困。胷背之瘡疽。此皆手爬搔刮之意。而劉熙釋名云。疥。齶也。癢。搔之篇。或作療。字彙云。癥同疥。正字通云。癥。癥並俗疥字。今皆勿用。正字通引鮮卑傳其下云。韻會引入疥註。改作蚧。謂

疥通作蚧。集韻亦作疥。篇海別作癬。並非。以是爲斷極佳。癥音戈。字彙云。疽瘡。又云。禿瘡。康熙字典云。同疽而疽下。云。王篇瘡也。集韻秃也。一曰創也。正字通云。癥有戈科瓜三音。方俗異讀。其爲癥創一也。而皆未見有似疥義。此由字書之不詳于醫事耶。併考諸醫書可自知也。○又按肘後方云。但是腰腳已下。名爲癥。此言可疑也。以其與病源以下云多著手足間者異也。

癬

蘓典切  
音鮮

癬亦疥類。痒疾也。故古連稱疥癬。太槩有二種。一種瘡作圓文。如錢形。邊高中低。邊生細粟瘡。甚痒。搔之汁出。漸展連生。二三瘡。四五瘡。大者作斜形。扁形。大小無定。粟瘡中間有細蟲。多生面頰。肩項。兩手間。有生腹背兩脚者。以其似錢形。故俗呼爲錢瘡。此證易治。一種瘡生陰股。始如粟粒。甚痒。難堪。搔之汁出。或唯白屑。起漸延。自陰毛中及膝下少腹。至膝上。或自會陰左右。展兩臂。上腰。下足。遍體無

所不至。皮漸頑厚。色淡黑。殆如牛領皮。有至苦痒。終夜不寐者。以其陰股特多甚痒。故俗謂之陰癬。多著男子婦人。至稀。此證極難治療。若因其痒急用外敷速愈藥。則不徒瘡不癥。或發暴水脹。或毒氣內攻。致卒死。者比比而有。不畏乎。此證為終身之滯患。末奈之何而已矣。但在其陰。股始痒之時。就早用藥。或浴溫泉。則可以免至蔓延矣。既及數月者。決不可治也。不可不畏慎而速施療術也。併舉濫名。開示無益。如白癧。

見神農本草。蘿蔔條。○又名醫別錄。白及。吳茱萸根條。○又見病源候論云。白癧之狀。白色確確而痒。

### 乾癬

病源候論云。乾癬但有匡郭。皮枯索痒。搔之白屑出。是也。風沈入深。故無汁。為乾癬也。其中亦生蟲。○又見外臺祕要。所引崔氏方。○又稱燥癬。見外臺祕要。炙引肘後方。

### 濕癬

同上云濕癬者亦有匡郭如蟲行浸淫赤濕痒搔之多汁成瘡其裏亦有蟲○又見千金方及外臺祕要炙引

古今錄驗

燥濕癬

出千金翼方○又見外臺祕要炙引淡師方○又稱乾濕癬見外臺祕要及炙引淡師方崔氏方

風癬

病源候論云風癬抓搔頑癥不知痛痒其裏亦有蟲

圓癬

同上云圓癬之狀作圓文隱起四畔赤亦痒痛是也其裏亦生蟲

久癬

同上云久癬是諸癬有蟲而經久不瘥者也○又出千

金翼方

細癬

見千金方又出本艸綱目羊蹄條

子余醫言

癬

十

一本堂藏書

雀眼癬。

病源候論云雀眼癬其文細似雀眼故謂之雀眼癬搔之亦痒中亦生蟲。

惡癬。

古本艸綱目良岩條引千金翼今考千金翼無此名

頑癬。

同上銅青條引筆峯雜興方○又見祕方集驗

陰癬。

見丹臺玉案

痴癩。

少名醫別錄有石未用羊實條

花癩。

古本艸綱目巴豆條

梅花禿癩。

同上胡麻油條引普濟方

吹花癩。

證治準繩云、面上風癬初起、瘡癟或漸成細瘡時、作痛

痒發於春月、名吹花癬

錢癬

出本艸綱目木槿條引王仲勉經驗方

荷錢癬瘡

同上、巴豆條引邵以正經驗方

苔癬瓦癬荷葉癬

見三因方○苔癬又出壽世保元

小兒胎癬

本艸綱目桑蠶蟲糞條引聖惠方云、小兒頭生瘡手爬處即延生、謂之胎癬

奶癬

外科正宗云、奶癬兒在胎中、母食五辛、父食炙燭、遺熱與兒、生後頭面遍身、發爲奶癬、流脂成片、睡卧不安搔痒不絕○祕方集驗、作乳癬

五般瘡癬

子余醫言

癬

見肘後方附方中經驗方○本艸綱目韭條亦引經驗方

五癬。

醫學入門云五癬濕頑風馬牛又云風癬即乾癬馬癬又曰狗癬○又明醫指掌圖云癬亦有五風癬頑癬濕

癬馬癬牛癬

杖癬。

見先醒齋筆記

血癬。

出本艸綱目煙膠附方引積德堂方

廣癬。

見證治準繩亦名千層癬

楊梅癬。

見丹臺玉案○此二名與徽瘡混尤過泛濫勿用

蟲癬癬蟲

出本艸綱目絲瓜條引攝生衆妙方又水銀附方、癬蟲輕粉條引陳藏器又名醫別錄有名引外臺秘要、癬蟲

牛癬。狗癬。刀癬。

病源候論云俗云以盆器盛水飲牛用其餘水洗手面即生癬名牛癬其狀皮厚抓之勒強而痒是也其裏亦生蟲狗癬俗云狗舐之水用洗手面即生癬其狀微白點綴相連亦微痒是也其裏亦生蟲刀癬俗云以磨刀水用洗手面而生癬名爲刀癬其形無匡郭縱斜無定是也中亦生蟲

牛皮癬。

出本艸綱目明礬條引直指方○又出睿府禁方牛皮風癬。

同上木槿條引扶壽方又黃牛肉附方引直指方牛皮頑癬。

同上雌黃條引直指方

牛皮惡癬。

同上輕粉條

馬皮癬。狗皮癬。

子余醫言

癬

十四

一木堂藏書

外科正宗云馬皮癬微痒白點相連狗皮癬白斑相簇  
松皮頑癬類是也。

赤水玄珠云風癩松皮頑癬久不瘥  
古連稱疥癬或謂疥與癬或混稱不分。

千金方千金翼方及外臺秘要所引廣濟方近效方劉  
涓子方等以下皆同。○本山名醫別錄斑猶條

或云疵疥或云疵癬互稱無別

疵疥出千金方疵癬出千金翼方

雖其同痒疾至相近似故連混無所別而其辨則如前所  
舉而不可亂也故重論及焉。

錄補鵞掌瘡

多著手掌足底輕者掌中見小白星微痒用爪搔破去之  
則皮也以似蟲蝕津所爲故俗稱蟲重者多生小瘡甚  
痒搔破流膿水皮拆裂太似鵞掌故稱鵞掌瘡或致久不  
愈足痛膿潰不可步履如陳實功所謂是也。

外科正宗云鵞掌風火熱血燥外受寒涼所凝致皮枯

槁。又或時瘡餘毒未盡亦能致此。初起紫斑白點久則皮膚枯厚破裂不已。

但風字大不當。故今用瘡字。又如龔信云鵝掌癬頗佳。優於風字大遠矣。

古今醫鑑云楊梅瘡已服輕粉愈後手癬或手掌上皮退一層又退一層生生不絕者名曰鵝掌癬。又萬病回

春云鵝掌風癬。

又如王肯堂云千層癬手心毒者亦此類也。

證治準繩云輕則發廣瘡亦名千層癬多生手心足底重疊不已。

又云病穿掌貧子孟穿窟天蛇亦皆俗名愈少愈鄙陋竟

是杜撰之濫名也。

坐板瘡。香齋晏少翁外傳。○又云東垣本驗云。腎腸風坐板瘡。八角刺瘡。

本中眉癬。煉癬。

子余醫言

癬

不生。○又危子條引保幼大全云。眉中煉癬。○又云。眉煉。  
儒門事親云。夫小兒在面曰眉煉。又云。夫小兒甜瘡。又不  
瘡者俗呼曰香瘡。是也。多於面部兩耳前。○又云。煉眉。本  
艸類纂必讀云。煉眉即鍊銀瘡。○又云。煉眉瘡。本草綱  
目百藥煎附方引外科精義云。小兒面溼瘡。又名鍊銀瘡。  
乃母受胎時食酸辣邪物所致。○又云。瘞窩瘡。本草綱目。  
肥皂炭附方引摺玄方云。頭耳諸瘡。眉癬。瘞窩瘡。又牡鼠糞附方

云。小兒瘡。○又云。月食瘡。見病源候論。本草綱目。  
窩生瘡。○又云。食作割。○又云。  
皰。嘔瘡。千金方云。凡炊湯經宿用。洗體成癬。洗面無光。洗  
脚即疼痛。以上諸瘡皆是疥癬類也。故併錄焉。

附字辨

癬或作癰。音同。癬劉熙釋名云。癬徙也。浸淫移徙處日廣也。故青徐謂癬爲徙也。此說亦幾乎鑿乎。从徙則可言人。鮮則不可言。史記越世家云。吳王伐齊子胥諫曰。吳有越腹心之疾。齊與吳疥癩也。又俗省作疥。正字通云。俗作蠣者。恐非也。玉篇云。蠣蟲名。由音同爲此說耳。決不可用也。又康熙字典云。瘡得案切音。且癬病此亦不可取也。

瞼瘡

離鹽切  
音廉

瞼瘡者。謂脚腔生瘡。多痒少痛。搔破出血汁。膿水淋漓。經年不愈。偶愈復發。不可根治也。或有乾燥皮厚。皮肉紫黑者。此證頑固。數年不瘥。陷成結毒者。間有之。若用外敷藥。速愈。方或浴冷泉。如攝州多田  
冷泉是也。求速効。則陷成暴水脹而死。若不急死。滯成結毒。與徽瘡結毒不異。又俗用故油紙。或故敗筆。紙圍裹脰外。此雖與敷輕粉藥大惡法異。而亦不得不惡。唯非在其始崩之時施法。則不可治也。已成頑。

瘡者常食發物魚鳥辣茹類以排毒驅瘀活致新血。擯出陳膿候勢差減而後浴發瘡溫泉如但州城崎溫泉、多日歸新湯者是也。長洗及四五回則自然可得瘀去毒拔終致全愈慎勿性急謂不能治而迷甘言貪速効以招大害也間有上及膝上内外腿者甚者下足趺至穢爛若夫肘瘡

千金方云有久癰餘瘡敗爲深道者在脇腔間喜生瘡中水惡露寒凍不瘥經年成骨疽亦名肘瘡淡爛青黑四邊堅彊中央膿血汁出百藥不瘥汁潰好肉處皆虛

腫○按古無臘瘡名此條雖有少異稱肘瘡者始于此也故舉載焉○又見何填本艸類纂必讀

骭瘍

詩經巧言篇既微且鱉朱傳骭瘍爲微孔氏曰郭璞云骭脚脰也瘍瘡也膝脰之下有瘡腫是涉水所爲

腰瘡

宋莊綽雞肋編云瘡發于足脰骨傍肉多難合北人謂之腰瘡南人呼爲骭瘍其實一也

臘瘡。

見儒門事親

裨口風

見魯府禁方

裙邊瘡。

見壽世保元又出祕方集驗

裙風裨口瘡。

見證治準繩云婦人名裙風裨口瘡

裨口瘡。

出醫學入門

蛀腳臘瘡。

見本艸綱目馬齒莧條引海上方

血注腳瘡。

同上木耳條引奇効良方

脚肚瘡。

見醫學入門

子余醫言

臘瘡

二十

一本堂藏書

脛瘡。

同上。馬齒莧發明。又楓香脂條引神珍方云。久近脣瘡。

血風瘡。

外科正宗云。血風瘡發則搔痒無度。破流脂水日漸沿開。年久紫黑堅硬。又云。風濕流注腿脚致生血風頑瘡。紫黑癩痒。○又本艸綱目銀朱條所引簡便方云。血風瞼瘡。又萬方回春云。血風瘡癩瘡蟲瘡及坐板瘡疥癩等瘡。

腎臟風。

證治要訣云。癩風因精未調外為風濕。火襲從陰囊濕汗。作痒起流注四肢。手足白色。悉生瘡癩。俗謂之腎臟風。按仁齋直指腎臟風癩條云。囊附濕痒謂之腎臟風。世以共知也。祕方集驗囊癩下云。腎腸風癩痛。景岳全書云。凡腎囊濕痒。扒破成瘡。俗名腎上風也。醫學入門云。腎臟風瘡此非瞼瘡。亦非外腎風瘡。乃腎虛有火。血燥。或患色精不出而內敗。初起兩足時。熱脚跟作痛。多

於內脛或臙上痒極抓破成瘡又則能漸延開失治延及腿股遍身者有之觀以上所說則似非臙瘡而證治集繩云兩臙如癬搔痒又則膿水淋漓或搔起白皮者名腎臟風古今醫統云臙腿生瘡經久不愈類風癬名腎臟風瘡名醫類案腎臟風瘡條云按腎風屬腎虛風邪乘於臙脛以致皮肌如癬或漸延上腿久則延及遍身外證則搔痒成瘡膿水淋漓眼目昏花內證則口燥舌乾腰脚倦怠吐痰發熱盜汗肌瘦今審此元俗稱且

濫名雖致駭辨竟是臙脛之瘡而非他何得非臙瘡乎三因方舉癲風條云男子精血不調外爲風冷寒襲致陰下濕痒搔之不已流注于脚遂生瘡瘍名曰癲風世謂腎臟風者乃認癲爲腎也癲屬宗筋系於肝胃陽明養之陽明主肌肉循經流入四肢故使四肢生瘡正謂之癲風非腎臟風也此元囊瘡故謂癲風雖使元是囊瘡苟已流在腳脛如尋常疮有臙瘡則此亦謂臙瘡不爲不可也且指陰囊濕痒謂腎臟風固大非也又指足

脛瘡爲腎臟風亦益謬矣要之濫名之所以致誤之又誤有不須言者讀者宜擯此等之杜撰而可也

裙風瘡。

本艸綱目頭垢條引簡便方云婦人足瘡經年不愈名裙風瘡。

驢眼瘡。

祕方集驗云驢眼瘡生脚胫骨週圍如謙瘡樣

過老瘡。

見醫林集要

爛腿瘡類。

見景岳全書

鴈瘡以鴈來時則發鴈去時便瘡故稱鴈瘡究竟謙瘡之有發止者雖瘡時亦自止耳其實非長愈也發時甚痒搔之延是腿脣或膿或乾皮厚作臼全與謙瘡一樣但以其有發止姑異名耳後有終年發不止者乃即謙瘡也巢元方始言之

病源候論云。鴈瘡者。其狀生於體上。如濕癬癰瘍。多著四支。乃遍身其瘡大而熱。疼痛得此瘡者。常在春秋二月八月。鴈來時。則發鴈去時。便瘻。故以爲名。亦鴈過荆漢之域。多有此病。

後世又稱鴈瘡。又謂春生者稱燕瘡。

正字通引類篇云。

漫喜多名。華人之習弊。故作種種浮華之稱。却致拘名迷實之害。

附字辨

謐字彙云。脛謐。康熙字典。引集韻。脛謐也。蓋以脛似物莖之義。脗可以行之。義謐有廉稜之義。自可解釋。而無所不通。而正字通云。謐俗字。舊註音。廉。脣謐泥。此說似亦已甚矣。當從字彙字典爲脛義可也。先醒齋筆記等作廉。非也。康熙字典云。音謐。廣韻。癰瘍病也。集韻。喉病也。又音廉。腥。疾俱與謐不相干涉。其誤可見也。

瘻

即豆切  
音漏

瘻。即瘰癧也。古者云瘻。又稱瘰癧。後世多不言瘻。唯稱瘰癧。但瘻者已潰之名。而瘰癧者未潰之稱。又呼其始小者爲結核。雖同一疾。所見異狀。故稱謂隨別而究之。其實則一也。只有久逆大小。潰不潰之異耳。夫瘻之爲病也。頸邊始結核。或左或右。或左右俱生。上及耳後。下延缺盆。前至頤後。亘項。按之粒粒可知。其小者如大豆。如銀杏。大者如桃栗。大小圓扁。縱橫不齊。或二三。或五六。或十餘顆。累累。

相連疊歷，可計數小時不腫大，則必腫初無痛痒，間有痛者。又有久不起發，經年無何異者。及已腫大，色紅赤，又或痛，或不痛，已潰出稠膿，或生黃汁，淋漓多年，久難收口。或惡寒發熱，或上下前後牽引拘急甚者，上頰車耳前旁及腋下。若生稠膿者，可治；唯生黃汁者，極難治。若膿汁多，年出不休者，後成勞瘵而死。又有小兒十一二之時，頸邊生一二小結核者，後多成勞瘵。已試十數人皆然，可畏之甚也。又有頰車耳前左右生硬腫，經年月漬開細孔，黃水

出不休者，俗呼爲氣腫，數年不愈，後必至死。元是瘻中之一證，必死不治之疾也。間有開三四孔者，即蟻瘻也。又觀近時世人所患之瘻，多是徽瘡結毒之所發漏也。雖膿汁多漏不止，故調治中竅，能得全愈。予常言令人之瘻，全是徽毒之發漏，太類便毒，故可謂頸便毒者，非戲言也。蓋頸之爲體，猶兩山之間，溪澗挾處，亦與腹腿合縫之處，彷彿近似。又其所患自結核，至發漏亦同，所以謂彷彿便毒者，不亦宜乎？此吾門之所發明，而世之所不知也。故古之瘻

多少而令之瘻不以。以其徽毒發漏雖久出膿不至少足以徵知也。靈樞說鼠瘻瘰癧似未的切。

寒熱篇云寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣使生曰此皆鼠瘻寒熱之毒氣也留於脉而不去者也曰去之奈何曰鼠瘻之本皆在於藏其末上出於頸腋之間其浮於脉中而未內著於肌肉而外爲膿血者易去也曰去之奈何曰請從其本引其末可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往徐來以去之其小如麥者一刺知三

刺而已曰決其生歟奈何曰反其目視之其中有赤脉上下貫童子見一脉一歲歟見一脉半一歲半歟見二脉二歲歟見二脉半二歲半歟見三脉三歲而歟見赤脉不下貫瞳子可治也目中赤脉之說大可怪也今試看之未嘗有之所以爲不的切也而其爲瘻者此疾之本名取瘡已潰漏形如鼠穴塞一復穿一之義而瘰癧者狀腫核未潰累累相連歷歷可見之貌則明白無爽惑也又邪氣藏府病形篇云肺脉微濶爲鼠瘻在頸支

腋之間下不勝其上其應善疫矣

素問曰鼠瘻寒熱還刺寒府寒府在附膝外解營骨空  
鼠瘻又出神農本草黃耆葛根假蘿蛇含連翹夏枯草  
膽等名醫別錄磁石條云鼠瘻頸核又石膽特生礬石  
條通草王瓜常山側子鼠尾草虎骨等  
病涼候論千金方千金翼方外臺祕要及所引范注方  
淡師方救急方集驗方劉涓子方張子仁方備急方古  
今錄驗張文仲方以下皆同○千金方千金翼方並作  
鼠漏

瘰癧又出神農本草鹿藿條又連翹假蘿內條云鼠瘻  
李條云  
瘰癧瘡名醫別錄淫羊藿條病涼候論千金方千金翼方外  
臺祕要及所引甲乙鍼經廣濟方肘後方范注方文仲  
方集驗方劉涓子方救急方延年方經効方經心錄崔  
氏方以下皆同

又云馬刀俠瘻

經脉篇云腋下腫馬刀俠瘻汗出振寒○甲乙經千金  
方並稱馬刀瘻○按壽世保元云形長如蛤者爲馬刀

又醫燈續焰云馬刀蛤蠣之屬癰形似之挾癰者發于  
結纓之處大逆之下頸側也二癰一在腋一在脰常相  
連絡故俗名歷串又張介賓曰馬力瘰癧也挾癰挾頸  
之瘤屬也一曰結核連續者爲瘰癧形長如蜑蛤者爲  
馬刀又曰腋肋下者爲馬刀俱出類經注○辨曰馬力蚌屬  
此貝較長似馬之刀故命名也今瘰癧形長似之故亦  
以馬刀呼之耳蓋蛤雖蚌蛤連稱此乃其辨也襲潘張三氏似  
蚌圓者曰蛤雖蚌蛤連稱此乃其辨也襲潘張三氏似

未的知馬力故致其解不明又挾癰亦瘰癧之別名而  
非贅瘤按字彙正字通康熙字典俱云挾傍也竝也韻  
會舉要云集韻或省作夾書懷爲夾註近也韻會小補  
亦同或胡頰切音協或古洽切音甲言瘰癧形如馬刀  
竝傍近癰故連稱馬力挾癰也

筋癰脰腫

經筋篇云頸筋急則爲筋癰脰腫

神農本草以下其名尤煩如頸下核

出海藻條、又名醫別錄玄參條云散頸下核、又磁石條云鼠瘻頸核。

五漏。

同上見地榆條○又有疽瘻痔孔公  
孽條疥瘻痴瘍條水銀等名俱不分明故不舉。

蟻瘻。

見名醫別錄雉肉、鰣鯉甲條○千金翼方作蟻漏馬力爛瘡。

同上藜蘆條。

瘻乳。

同上王不留行條。

馬刀瘻、頸瘻竈。

並出甲乙經○千金方云寒熱酸痛、四肢不舉、腋下腫、馬刀瘻、又云胷中滿腋下腫、馬刀瘻、又云腋下腫、馬刀肩腫、吻傷此專言腋下核腫爲馬刀。

九瘻。

病源候論云諸瘻者謂瘻病初發之由不同至於瘻成形狀亦異有以一方而治之者故名諸瘻而方說九瘻者是狼瘻鼠瘻蠅瘻蜂瘻蚍蜉瘻蠍蟲瘻浮疽瘻瘻瘻瘻轉脉瘻此頸之九瘻也狼瘻者年少之時不自謹生也始發之時在於頸項有根出缺益上轉連耳木鼠瘻者飲食之時不擇蟲蛆變化所生也使人寒熱蠅蟲瘻者食果蓏子不避有蟲即使噉之外絕於網內絕於腸有毒不去變化所生也始發之時在於頸上狀如蠍形癰膨而出也蜂瘻者食飲勞倦渴乏多飲流水即得蜂毒不去變化所生也始發之時其根在頸歷歷三四處俱腫以潰生瘡狀如癰形瘻而復移蚍蜉瘻者因寒腹中臚服所得寒毒不去變化所生也始發之時在其

頸項使人壯熱若傷寒有似疥癬妻婬孔出蠍蟲瘻者恐懼愁憂思慮哭泣不止餘毒變化所生也始發之時在其頸項無頭尾如棗核或移動皮中使人寒熱心滿浮疽瘻者因恚結馳患徃反變化所生也始發之時在於頸亦在腋下如兩指無頭尾使人寒熱欲嘔吐瘰瘻瘻者因強力入水坐濕地或新沐浴汗入頭中流在頸上之涉生也始發之時在其頸項恒有膿使人寒熱轉脉瘻者因飲酒大醉夜卧不安驚慄嘔轉側失枕之所生也始發之時在其頸項濯脉轉身如振使人寒熱復有三十六種瘻方不可次第顯其名而有蟻娘蚯蚓等諸瘻非九瘻之名此卽應是三十六種瘻之數也但瘻病之生或因寒暑不調故血氣壅結所作或由飲食垂節狼鼠之精入於府藏毒流經脉變化而生皆能使血脉結聚寒熱相交久則成膿而潰漏也其生身體皮肉者亦有始結膜與石癰相似可異者其腫之中按之累累有數脉喜發於頸邊或兩邊俱起便是瘻證也亦

發兩腋下及兩顴間初作喜不又有蟻瘻蠅瘻鷗鳥痛不熱若失時治即生寒熱也

鶴瘻尸瘻風瘻鞠瘻蟻瘻骨疽瘻蚯蚓瘻花瘻蠍瘻蛇瘻脛瘻腦瘻癰瘻蠍瘻蟲瘻石瘻蛙瘻蝦蟆瘻蛇瘻蟻瘻赤白瘻內瘻雀瘻膿瘻冷瘻久瘻已上二十七名合前九瘻爲三十六

即三十六種瘻數也鞠瘻又曰石鞠瘻○諸瘻病狀詳見本書文

多故不盡載○千金方云論曰夫九漏之爲病者寒熱瘰瘻在於頸腋者何氣使生此皆鼠瘻寒熱之毒氣也堤留於脉而不去者也何謂九漏一曰狼漏二曰鼠漏

三曰蠟蛄漏四曰蜂漏五曰蚍蜉漏六曰躄螬漏七曰浮蛆漏八曰瘰瘻漏九曰轉脉漏又有漏冷瘻風漏蟻漏蟻娘瘻蚯蚓瘻蠍瘻蝦蟆瘻蛇瘻蛙瘻馬刀瘻頭當瘻雀瘻膿瘻石瘻○外臺祕要所引集驗方有九種瘻目同病源候論又廣濟方雀氏方並云瘻有九種又引千金方皆作瘻○醫學入門云九漏肝主狼漏胃主鼠漏大腸主蠟螬漏膽主浮蛆漏腎主瘰瘻漏小腸主轉筋漏萬病回春等皆同如是則五藏四府有漏而膀胱何因不主漏乎三焦何因不主漏乎此皆由強事配當而然其可笑可斥無復過之者又明醫指掌圖云夫瘻

癰之病者、即古所謂九漏也、形狀不一、生頸項者、曰瘰癧、生乳技者、曰馬力、而亦作蠻蠣漏、又作浮蛆漏、文字異同、或當○名醫別錄、地榆、蝮蛇肉等條云、諸瘡、又驛有二誤○鼠條云、諸瘡、鈍、惡瘡、消石條云、瘡、鈍、瘡、

瘡。

見靈樞、邪氣藏府病形篇、千金方、千金翼方、外臺祕要、及所引肘後方、廣濟方、集驗方、必効方、備急方、劉涓子方、崔氏方等同、千金方、千金翼方俱或作漏○按允名醫別錄、昆

布條云、瘡、瘡、鰐、  
鱉、魚、條云、瘡、瘡、

漏、九漏

並見上

結核

頸漏

見千金方、及外臺祕要所引廣濟方

見千金翼方

鼠瘡、漏瘡

並見本事方續集

陰瘡

子余醫言 瘡

三十三

一本堂藏書

本艸綱目牡狗陰莖條引日華子

五瘻。

同上鴛鴦條引食醫心鏡又芥子條引廣濟方云五種瘻疾。

三十六種瘻。

見上又本艸綱目馬齒莧條引食療云三十六風結瘻

土蜂瘻。

同上烏鵲頭主治引聖惠方

野雞瘻瘡。

同上土撥鼠肉主治引陳藏器

蛇盤瘻瘻。

同上海藻條引危氏得効方云蛇盤瘻瘻頭項交接者又蕎麥條引阮氏方赤水玄珠云瘻瘻生於頭項上交接名蛇盤瘻

蟠蛇瘻。

醫學綱目云瘻瘻多生肩項或赤或白或沈或浮初生如豆久似核年月浸久其大如梅或如雞卵排行爲列

或生二三或生六七俗云蟠蛇瘻是也

又見壽世保元

流注瘻

又云流注瘻婦人多有之其性急躁其氣怫鬱其心執着初生在項破後膿注四肢遍體結毒如梅李狀不療自破孔竅相穿寒熱疼痛或流膿汁是名流注瘻也又

名千歲瘻

癰子瘻

見丹溪心法附餘

單窠瘻蓮子瘻重臺瘻燕窠瘻

醫學綱目云單窠瘻者生一箇也發於頸項最難治蓮子瘻一胞裏十數枚生於項之左右重臺瘻生於項頸或左或右初則單窠結在上或在下重疊見之是名重臺瘻燕窠瘻形似燕窠不可治

瓜藤瘻惠袋瘻蜂窠瘻

壽世保元云延及肩前連腋下者名曰瓜藤瘻左耳根腫核者名曰惠袋瘻右耳根腫核者名曰蜂窠瘻○此

就左右改名者尤杜撰之甚也

風癰。熱癰。血癰。痰癰。氣癰。鼠殼癰。

醫學入門云風癰尖而小熱癰焮腫赤色又名血癰痰癰推動滑軟氣癰圓而動又有鼠殼癰大小不一

錐銳癰

類經圖翼云錐銳癰右邊生起

蹉漏

醫說云有人脚肚上生一瘡久遂成漏凡經二年百藥

不效自度必死一村人見之云此蹉漏耳以石灰二三升百沸湯泡薰洗如覺瘡痒即是也病者如其言用灰湯淋洗果痒竟用此洗不三兩次遂乾

馬老鼠瘡

外科精義云療癰馬老鼠瘡

疽瘻

千金方云小兒疽瘻○此元出神農本草孔公孽條云

疽瘻痔已見上

鼠漏。蟻漏。蟠蛇。蛇瘻。蜂瘻。蛇蛭瘻。蟎瘻。蟎瘻。浮疽瘻。瘰癧瘻。轉  
脉瘻。狼瘻。鵝瘻。鵝瘻。鵝瘻。鵝瘻。鵝瘻。鵝瘻。鵝瘻。鵝瘻。鵝瘻。鵝瘻。  
蛇瘻。花瘻。蟎瘻。蟎瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。  
蟎瘻。蛇瘻。蟎瘻。蟎瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。  
蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。  
蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。  
蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。  
蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。  
蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。  
蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。蛇瘻。

以上皆見上○風漏。蟻漏。又見千金翼方。蟎瘻。又見本

艸綱目半夏條。引聖惠方云。蟎瘻五孔相通者。蜂漏。又

同上。蟎蠍條。引陳藏器。  
結風氣腫。

千金方云。小兒無故寒熱。強健如故。而身體頸項結核  
瘰癧。及心腹脅背。裏有堅核。不痛。名爲結風氣腫。又外  
臺秘要所引文仲方云。亞肉惡核。惡脉瘰癧。風結腫氣。  
金頸瘻。食。究竟此亦瘻耳。

本艸綱目雞肫脰裏黃皮條。引聖濟總錄云。金頸瘻。食  
初生如米豆大。則穿蝕。頸音腮。

附字辨

瘻說文云頸腫也。一言以蔽之矣。但瘻即漏之義。元是同音。故孫思邈換漏字云九漏鼠漏是也。見千金方正字通云。六書故。瘻當作漏。漏不止一處。瘻瘤不差。久則成漏。漏即漏也。說文漏屋穿水下也。玉篇與漏同。屋穿水入而自結核。至膿潰總謂之瘻。故說文之說盡之矣。但以瘻漏音同。瘻專漏義向。所謂瘻已潰之名者為是也。又作漏字彙云。音漏竊瘞亦作瘻。正字通云。亦通爲竊。周禮馬黑脊而瘻。

臂、蠻、內則作扁。乃扁疾。此雖瘻與扁通。同漏疾而於頸腫。則不可通。故不可用也。瘻、瘻、瘻之未潰之時。結核兩三。或五六。累累相連重疊。可計數。故由其形狀。謂之瘻。瘻。向。所謂瘻。瘻。未潰之稱者。可以見也。瘻。曾水切。音。瘻。即狄。切。音。脣。正字。通云。本作瘻。俗省。作瘻。又作瘻。字彙。正字。通。俱云。俗。瘻。字。康熙字典。云。廣韻。同瘻。正字。通云。瘻。本字。通。作。蟲。云。同瘻。康熙字典。云。廣韻。同瘻。正字。通云。瘻。本字。通。作。蟲。瘻瘻瘻。三字。俱僻難。不易通。不可用也。

痔

痔之爲疾也。其證多端。或有肝門痛。而瀉下血者。或有止。肝門痛者。或有由大便祕結。堅大燥屎。出肝門。破痛血出者。或有止。肝門。腫痛者。或有肝邊。左右前後。生鼠乳痛者。或有肝邊。腫核疼痛者。或有肝邊。乳腫。如指頭大痛。難忍。後破出膿血者。或有頻痒。難堪者。或有肛口痒。而復痛者。或有外面無何異。肛內痛。覺似腫。雖裏急。而大便不通苦。痛發熱。欲死者。俗謂之內痔。或有無痛。下血數升者。或有

乳腫破。膿水。膿少。黃汁多。晝夜不止者。或有肛之左右。前後開穴。黃汁常出。不止者。或有瘡孔至四五穴者。此即痔漏也。凡痔久不愈者。皆成漏。又有肛門出而不入者。謂之脫肛。脫肛即是痔中之一證。而非別疾。多由堅大燥屎難出。強自努責。而肛門遂脫出。故小兒痢疾。多致脫肛。以其皮腸未固。柔軟易脫也。凡一脫肛者。遂成熟路。每大便必出。輕者推入之則收。中者不得輒入。多方纔得復本甚者。脫肛腫大。痛不得入。不能坐。唯側卧。待愈用藥加治。

而後得水出。腫消。繩納原穴。至重者。脫肛腫大。終不復納。坐立俱不能。只側臥以俟腫消而已。腫消而後強推入。纔可以納。腸中形狀萬變。不可縷舉。究其所因。皆是由飽食過飲之所為耳。或饕餮厚味。多啖糖果。或沈湎醇酎。常帶酒氣。或好喫炙燙焦香之物。其食飲真秀精純之氣。潤養周身之外。大過有餘。直下腸中。其勢壯強。席卷長驅衝突肛門。外出成痔。腫痛瀉血也。故痔元盛候有餘之氣。自內推出。而然也。猶食飲有餘之氣。上逆成喘哮也。故痔與哮。

俱是穀氣有餘之疾。但有上逆下衝之異耳。由其且痛苦。且瀉血爲虛不足者。固多有之。雖然以其有餘之疾。故雖疾甚而不死者多。又有虛弱之人。患此疾者。此亦同因。蓋以虛弱之人。常食當減少。以爲適。而常食與平人之食同。則在常人則非過。而在虛弱之人。則既已過矣。且其所減。以爲適者。亦謂已過矣。况與常人之食齊乎。所以有有餘之氣下墜成痔也。後世觀由其瀉血膿水致虛不足。乃謂此疾屬虛。如薛已以下明醫皆然皆由不知本因也。又由努責脫出。

肛門即是自內推出之勢強。可以見也。如小兒痢疾。婦人產後與痢疾裏急。是也。若飽暖。小兒雖非痢疾。亦脫肛。此由過愛多食也。又非痢疾裏急。與婦人產後而脫肛者。此非努責而然。即是向所謂有餘之穀氣。且夕下衝。自內推出。而然亦可以見也。素問已論。因飽食可據取也。但其說不十分明。切耳。其他靈素。唯稱痔者。不過四五條。

素問云。因而飽食。筋脉橫解。腸澼爲痔。生氣通天論。又云。其女子不孕。癃痔。遺溺。嗌乾。骨空論。

又云癰、疹、瘡、癰、疽、痔、瘻、痔、瘻，發至真要大論。

靈樞云：腎脉微濇為不月沈痔。邪氣藏府病形篇。

又云膀胱是主筋所生病者，痔瘻、狂癲疾、經脈篇。

又云寒熱痔、熱病體重、腸中熱、熱病篇。

五痔之名始出神農本草。猶未列其目。

見神農本草。

黃耆、槐實、柏皮、龜甲、謂皮、蟲魚、文蛤、豚懸蹄等條。

○又見名醫別

錄、榧實、鰐鱣魚、蜜陀僧等條。

或云疽痔。

同上。五色石脂、雄黃、石硫黃、扁蓄、敗醬、蛇含、漏蘆等條。○又見名醫別錄。羊蹄根、

疽瘻痔。

同上、孔子。

牙子、醇子條。

瘻痔。

同上、牙子、醇子條。

腸痔。

同上。蘗木、露蜂房、蛇蛻等條。

痔核。

同上  
龜甲  
條

痔蟲

同上  
石灰條云、又見名醫別錄  
殺痔蟲、肉、  
一條

痔蝕

見名醫別錄  
青葙子、  
條

脫肛其名漸多

見神農本草  
蛇蠍、  
○又見名醫別錄  
卷柏、蝎牛、生鐵等條

及巢元方雖備五品以諸痔稱之至孫思邈全從巢氏目

稱五痔舉之後世多祖據焉王燾又引溪師集驗崔氏等  
五痔泛濫之弊之所來不獨後世為然也

病源候論云諸痔者謂牡痔、牝痔、脉痔、腸痔、血痔也牡  
痔、肛邊生鼠乳出在外者時時出膿血者是也牝痔、肛  
邊腫、生瘡而出血者牝痔也脉痔、肛邊生瘡痒而復痛  
之血者脉痔也腸痔、肛邊腫核痛發寒熱而血出者腸  
痔也血痔因便而清血隨出者血痔也又有酒痔、肛邊  
生瘡亦有血安又有氣痔大便難而血出肛亦出外良

久不肅入諸痔皆由傷風房室不慎醉飽合陰陽致勞擾血氣而經脉流溢滲漏腸間衝發下部有一方而治之者名爲諸痔非爲諸病共成一痔痔久不瘥變爲瘻也

千金方云論曰夫五痔者一曰牡痔二曰牝痔三曰脉痔四曰腸痔五曰血痔牡痔者肛邊如鼠乳時時潰膿血岔牝痔者肛腫痛生瘡脉痔者肛邊有瘡癢痛腸痔者肛邊核痛發寒熱血痔者大便清血隨大便汙衣又

五痔有氣痔寒溫勞濕即發牡痔生肉如鼠乳在孔中頗出見外妨於更衣牝痔集驗作酒痔從孔中起外腫五六日自潰出膿血腸痔更衣挺出久乃縮脉痔更衣出清血又云槐子圓治燥濕痔痔有雌雄皆主之○千金翼方立腸痔門載五痔下血等又論曰凡人大便有血即是痔病勿得慢之慎乾棗油膩豬魚夫患痔在身所服名藥皆不得力徒棄功夫一無所益欲服餌者當斷之乃可服也

外臺祕要所引淡師療五痔數年不差槐子丸主燥濕  
痔痔有雌雄爲病苦暴有乾燥腫痛者有崩血無數者  
有鼠乳附核者有腸中煩痒者三五年皆殺人忌飲酒  
及作勞色犯之即發千金翼同文集驗療五痔有氣痔溫寒  
濕勞即發牡痔生肉如鼠乳在孔中頗見外妨於更衣  
牝痔從孔中起外腫五六日自潰出膿血腸痔更衣挺  
出久乃縮脉痔更衣出清血千金刪繁文仲同又崔氏論曰凡  
痔病有五若肛邊生肉如鼠乳出孔外時時膿血出者

名牡痔也若肛邊腫痛生瘡者名酒痔也若肛邊有核  
痛及寒熱者名腸痔也若大便輒清血出者名血痔也  
若大便難肛良久有入者名氣痔也此皆坐中寒濕或  
房室失節或醉飽過度不得當時不爲患久久不差終  
能困人肘後集驗同其他廣濟方小品方刪繁方必効方等  
同稱五痔

惠民局和劑方云五腫腸風漏血糞前有血名外痔糞  
後有血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面努肉如豚

名舉痔頭上有孔名瘻一本瘻下有瘡內有蟲名蟲瘻七字下○王璆百一選方亦同但云穀道四邊有努肉如乳頭名鼠跡痔有穴腸出血名漏

本事方續集云大凡五痔皆因虛憊恣食五辛五味雞魚而成熟毒壅入大腸津液不通氣血凝滯久坐久忍不糞水冷入河水洗酒後行房及暑月行路坐諸熱地又移坐冷種種能成斯病一者肛腸生肉腎痔鼠跡或似櫻桃或大豆時時出血又如出膿名曰鼠跡痔二者

肛邊大乳痛腫無膿血名酒痔飲酒便發三者肛邊努核疼痛難忍糞則有血或因憂愁患慮冷熱不調無時而發名曰氣痔或大便澀難氣結不通下血面黃食少無味名曰口痔四者大便後下諸膿血更加痛澀肛腸努出名曰脫肛痔五者氣攻兩腎肺大便不通糞血色下赤黑毒熱不消肛門濕痒一似蟲行名曰風熱內痔陳言三因方云經云腸澼為痔如大澤中有小山突出爲痔人於九竅中凡有小肉突出者皆曰痔不特於肛

門邊生亦有鼻痔、眼痔、牙痔等。肛門中證狀不一方，書分出五種曰牡曰牝曰脉曰腸曰氣。牡痔者，肛邊腫痛，突出一枚，五六日後潰出膿血，自愈。牝痔者，肛邊發癟數箇，如鼠乳狀。脉痔者，无頭脉中逆，小竅注下清血。腸痔者，生在腸內，更衣時非按揭不入。氣痔者，遇憂怒則發，肛門腫疼，氣散則愈。治之之法，切勿用生砒毒氣入腹，反至奄忽。近見貴人遭此痛不忍言，因書以戒後學。○後世稱五痔者，或以牡牝脉腸氣萬病，或以牡酒腸回春。

血氣韓保昇云舉皆就病源，千金及局方本事中牡牝脉腸血氣酒氣之目，易一二來充其數耳，不足論也。

凡如牡痔、牝痔、脉痔、氣痔、血痔、酒痔、燥濕痔、舉痔、鼠姤痔、瘻漏口痔、脫肛痔、風熱內痔。

已見上

及外痔、內痔。

外臺祕要云：許仁則曰：此病有內痔，有外痔，內便即有血，外有異外痔，下部有孔，每出血從孔中出，內痔每

便即有血下，血甚者，下血擊地成孔穴，血過多，身體無復血色。有痛者，有不痛者。內痔外痔○千金方亦已見上。有外痔。

腸痔已見上，又見外臺祕要、所引肘後方、刪繁方、備急方、張文仲方、崔氏方、古今錄驗云、肛出下血，如雞肝此脫肛已見上，又見病源候論、千金方、千金翼方、外腸痔、脫肛、臺祕要及所引肘後方、范汪方、刪繁方、集驗方、小品方、方、急方等。

蟲痔

仁齋直指云：臟腑本虛，外傷風濕，內蘊熱毒，醉飽交接，多慾自戕，以故氣血下墜，結聚肛門，宿滯不散，而衝突，

爲痔也。諸痔出血，肛門間別有小竅，下如血線，不與便物共道。痔久不愈，必至穿穴瘡口不合，漏無已時。此則變而爲瘻矣。前乎治法之外，抑猶有說焉。腸風臟毒之與痔瘻同出，而異名也。歲積月累，淫蝕腸頭，濕爛可畏。此虫何物致然哉？虫是也。其間執劑又當爲之化蟲。不然古書何以謂之蟲痔？○按本艸綱目，雞肉條引陶弘景曰：同生葱食，成蟲痔。未見本書不知然否。而據神農本艸，名醫別錄俱有痔蟲字，則知蟲痔之稱亦當古矣。

故併記以備考○又見本事方。又見本艸綱目、檳榔條。

熱痔

同上

肉痔

見本事方續集

又見本艸綱目、鱗魚  
魚條引便民食療。

糞花漏。合官漏。涪涪珠漏。榮漏。腸風

同上

食痔。羊蜍痔。

山醫壘元戎

腸風痔。雌雄痔。

見外科精義

又見錦囊秘錄。

濺血痔。

見奚囊便方

筍漏。

熊宗立醫書大全云。又有無痔者。肛門左右別有一竅。流出膿血。名為筍漏。

反花痔

見病機沙篆。又作翻花。明醫指掌圖、醫學正傳、古今醫鑑等皆同。

風痔

見本艸綱目。白僵蠶條引勝金方云、  
腫痛發歇不定者是也。

鼠痔

同上。穿山甲條引直指方。  
又見蜘蛛絲條。

野雞痔

醫學綱目云。野雞痔下血腸風。

外野雞痔。野雞內痔。五野雞病。

本艸綱目。烏爛死蠶條引陳藏器云。外野雞痔。又獮候桃實條引陳藏器云。野雞內痔病。又鰣條引孟詵云。五野雞病。又綿條同。按仁齋直指。腸風門云。大人小兒大便下血。日久多食易飢。腹不痛。裏不急。名曰野雞。

雞冠痔

同上。黃連條引斗門方。又見醫學正傳、古今醫鑑等。

久痔

見證治準繩

蠟蛇痔

見古今醫鑑

牛奶痔

出祕方集驗

七痔

明醫指掌圖云古人有七痔之目牡痔者發露肉珠狀如鼠乳時時潰爛膿血牝痔者肛邊生瘡腫痛出血其

頭反陷入脉痔者腸口頻頻發癟且疼且痒出血淋漓腸痔者腸內結核有血寒熱往來登圊脫肛血痔者每遇大便清血隨下不止蟲痔者肛門浸淫濕爛內有蟭蟲蝕其腸為瘡氣痔者大便難強力努之則肛出不收○按古人未有七痔之目雖巢氏於五痔之外舉氣痔酒痔而未嘗稱七痔孫氏以下亦然此以蟲易酒亦好出新奇誇多名之所為耳末又以瘰疬瘻與痔瘻混訛謬莫甚焉

二十四種痔

古今醫鑑云。古方分爲二十四種。名狀不同。究其所以。亦不過久嗜辛熱炙燭。新酒及房慾憂患。蘊積熟毒。憤鬱之氣所成也。或藏於肛門之内。或突於肛門之外。大如雞冠。蓮花。核桃之狀。小如牛奶。雞心。櫻桃之形。云云。而舉二十四證痔歌曰。痔證分三八。憑君仔細看。莫交年月久。見者膽心寒。菱角看形怪。蓮花不可觀。穿腸并鼠乳。酒色兩相干。莫聽翻花怨。蜂窠亦不寬。雌雄同氣。

血子母及腸盤。玄珠尤可怪。勾腸痛若鑽。核桃與流氣。見者便心酸。粟子於中大。雞心在外安。珊瑚形可惡。那便脫肛難。內痔紅不出。搭腸裏內盤。垂珠更難治。日久有雞冠。切莫輕刀火。令君性命殘。用功無半月。去病更除根。

菱角痔。穿腸痔。蜂窠痔。子母痔。腸盤痔。玄珠痔。勾腸痔。核桃痔。粟子痔。珊瑚痔。搭腸痔。垂珠痔。雞心痔。蓮花痔。色痔。見上。○醫學正傳云。其爲變見名狀種種不同。曰牛妳。

曰鼠婦曰雞心曰雞冠曰蓮花曰翻花曰蜂窠曰穿腸  
曰外痔○古今醫統作蜂窩

痔瘻

見外臺祕要所引廣濟方

本艸綱目蠶紙條引  
奚囊備急方作痔瘻

痔漏

見千金方

腸漏

見醫學綱目又出明醫指掌圖

三十年痔

見外臺祕要所引古今錄驗又云五痔十年又千金方  
云五痔十年又外臺祕要引千金云五痔五十年不差  
今考千金方有十年無五十年千金翼方亦作十年

歷年脫肛

同上引集驗方千金方

截腸病

醫學綱目云大腸頭出痛苦乾又落落又出名截腸病

行醫錄

痔

五十三

一本堂藏書

腸盡則死。○究竟此亦脫肛也。

運氣痔。

證治準繩云。運氣痔發。皆屬寒。

酒毒腸風下血。

少百一選方。

溫毒下血等。

古今醫統云。便後下血。腹不痛。名溫毒下血。  
及謂是濕熱風燥四氣而合。

蘭室祕藏云。受病者燥氣也。為病者胃濕也。胃刑大腸。  
則化燥火以乘燥熱之實。勝風附熱而來。是濕熱風燥  
乘四氣而合。

或謂木秉火勢而侮金。

同上。云飽食行房忍泄。前陰之氣歸於太陽。木秉火勢。  
而侮燥金。

或謂痔屬肝脾腎三經。

薛已云。

行餘醫言

痔

五十四

一本堂藏書

其他亦皆肺大腸表裏合邪之說。

劉完素張元素以下至明諸醫流皆同

若非煩眩濫名必是生剋配當鑿空之妄談無要領無明鑒。遂增後世無見識者之迷惑終啓冥搜妄投之端何可不歎乎又有腸風臟毒之稱按自唐以前未見其名蓋在宋以後與或云腸風痔病劉完素或云腸風下血張果或云臟毒下血張果或云腸風瀉血王璆或云腸風臟毒與痔瘻同出異名楊士瀛或云腸風臟毒李徽或云

疾陳言或云血清爲腸風血濁爲臟毒許叔微以上諸說紛紛不歸一定蓋謂腸風者言腸中受風邪遂成下血也。臟毒者言臟腸蘊毒遂成瀉血也素是俗稱無深義究竟痔疾下血之異名耳今皆畧書以備考證

玄明論云夫腸風痔病者必發手太陰手陽明經以應動脈謂肺與大腸爲表裏主爲傳道以行糟粕腸風痔病有五種其證亦異痔門痔瘻總論

醫說云痔腸風臟毒一體病也極難得藥亦緣所以致

疾不同雖良藥若非對病固難一槩取效常人酒色飲食不節臟腑下血是謂風毒若釋子輩患此多應飽食久座體氣不舒而得之乃脾毒也○又云予外兄劉向爲嚴椽子過之畱飲訥其瘦瘠問之荅曰去歲臘毒你凡半月自分必死得一藥服之至今無苦問何藥不肯言再三扣始言只這卓子上有之乃是乾枳燒灰飲下二錢本艸曰枳治腸澼解熱毒消宿血有病者宜求之素問腸澼爲痔泊宅編○又云人患腸風下血者何也

人腸皆有脂墨之厚則腸實而安腸中本無血血緣有風或有熱以消其脂腸遂薄滲入身中初患者必服冷藥而愈服之過當則腸寒而脂愈不生其血又再作凡熟者其血鮮冷者其血青黑醫餘○又云臟毒下血洛陽一女子年四十六七耽飲無度多食魚蟹攝理之方蔑如也後以飲啖過常蓄毒在臟日夜二三十度大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不妨又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿凡如

此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熟藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥則泄注氣羸粥愈減服溫千藥則病不知將暮歲醫告術窮垂命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服之才一服知二服減三服膿血皆定自此不十服其疾遂愈後問其方云樗根白皮人參各一兩爲末二錢匕空心溫酒調不飲酒以溫米飲代衍義○風寒之門其謂風毒脾毒亦濫也且謂腸中無血者見死腸故也人身何不有血此由不知血

之以爲神氣也又人參散治女病亦可謂惑矣

李事方云頃年有一人下血幾盈盆頓爾疲憊諸藥皆不効予曰此正腸風令服玉屑圓三服止予苦此疾三十年蓄下血藥方迄五十餘品其間或驗或否或始驗而久不應者或初不驗棄之再服有驗者未易立談大抵此疾品類不同對病則易愈如下清血色鮮者腸風也血濁而色黯者臟毒也肛門射如血線者蟲痔也腸風瀉血痔瘻臘毒門

仁齋直指云：腸胃不虛，邪氣無從而入。人唯坐卧風濕，醉飽房勞，生冷停寒，酒麪積熱，以致榮血失道，滲入大腸。此腸風臟毒之害也。由作也挾熱下血，清而色鮮，腹中  
有痛，挾冷下血濁而色黯，腹內畧痛，清即爲腸風濁，則爲臟毒。有先便而後血者，其來也遠；有先血而後便者，其來也近。世俗糞前糞後之說，非也。抑猶有說焉：腸風之與蟲痔，特介乎毫芒之間。腸風之血，自腸中來，蟲痔之血，肛門邊傍別一小竅，射如血線是也。迨夫肛門既

脫腐血浸淫於其間，則俱化爲蟲蠹蝕。腸口清血淋漓，自此又不能約而收之矣。○或云：腸風不正，腸風門、腸風論。下血、腸風五痔、腸風臟毒，久癥、腸風痔瘻、腸風瀉血、脫肛、腸風臟毒痔，其稱不同。又云：腸風臟毒之與痔瘻同出，而異名也。歲積月累，淫蝕腸頭濕爛，可畏。此果何物？致然哉？蟲是也。其間孰剝，又當爲之化蟲？不然，古書何以謂之蟲痔？諸痔門、

三因方云：夫有五痔人，奏圃則下血，或點澑，或洴澼，或清，或濁，面黃唇白，心忪，脚弱，頭目眩暈。此因飽食坐久，

腸癖亦有飲酒房室過度以致世醫多指此爲腸風臟毒然腸風臟毒自屬滯下門臟毒即是藏中積毒腸風即是邪入藏純下清血謂之風利今五痔下血乃是酒痔脉痔其血自肛門邊別有一竅如針孔大瀉淋而下與洩物不共道不可不知辨腸風論○其門有脉下血久羊腸痔下血治方若爲腸風臟毒屬滯下門則何以此門載治五痔腸痔等方乎矛盾特甚

證治要訣腸風臟毒門附痔漏云血清而色鮮者爲腸

風濁而黯者爲臟毒或在糞前或在糞後此乃因登圊糞中有血却與瀉血不同臟毒者蘊積毒氣久而始見腸風者邪氣外入隨感隨見此三因方五痔臟毒腸風辨之甚詳臟毒腸風之血必於腸臟間五痔之血必於糞門蝕孔處治各不同無擇翁烏連湯治脉痔外無形而亟下血一線如箭或點滴不能已此由脉竅中來也又云痔漏證狀頗多自屬外科不復繁引既血自內出不可全仗外傳

古今醫統云、腸風下血、乃痔漏之源、大便下血、先哲有糞前糞後遠近之說、此一端也、大抵此則大腸已受濕、熱之傷、而但未形於外也、此其以爲內痔者是也、人不知覺、悉謂腸風復齋論、演得病情、可謂詳切著明矣、明醫指掌圖云、挾熱下血暴發者、則血色清鮮、腹中有痛、若挾寒而下血、兼積久者、則血色凝濁、而色黯、腹內微痛、故暴病、則爲腸風、蓋腸風者邪從外入、隨感而隨見、是也、積久始發、濁者爲臟毒、蓋臟毒者久積、其毒而

始發是也有先血後便者、其血來也近、先便後血者、其血來也遠、俗謂糞前糞後非也、

其他若證治準繩、景岳全書、證治大還錦囊祕錄、醫通、皆是依樣葫蘆、無甚發明、不暇一一舉載、或以痔脫肛與腸風臟毒爲二門。

三因方

或以痔漏與脫肛爲二門。

萬病回春

或以痔漏脫肛。腸風臓毒爲三門。

仁齋直指以下醫書大全。明醫指掌圖。錦囊秘錄等同。

或以脫肛屬瘻中。痔屬外科。

證治要訣

以上諸說總皆由不知脫肛即瘻中之一證。腸風臓毒即痔血之俗稱。故致費辨強解。屑屑焉爲鑿空之贅言。亦皆以不曉知諸患證狀雖多。終歸一因一病之綱要也。

附字辨

痔說文後病也。正字通康熙字典。並引增韻。隱瘻也。韻會俱作隱創。說文爲穢。釋名云。痔。食也。蟲食之也。此說不可從也。陳言曰。痔如大澤中。有小山突步爲峙。人於大窓中。凡有小肉突步者。皆曰痔。不特於肛門邊生。亦有鼻痔。眼痔。牙痔等。見三因方。此或一說也。蓋峙山屹立貌。字彙。正字通。康熙字典。皆同。又山獨立貌。韻會。舉要。即像乳腫突出謂从痔省之意也。又正字通云。同文舉要。別作痔篇海。作瘻竝非。按詩小渚也。康熙字典云。唐韻集韻。並眞里切。音雉。水中高土。此亦似

焉但不可用僻字耳。脫肛謂肛門脫出也。而有用症字者。  
大非也。玉篇云：症，下病也。字彙以下云：脫症，下部病。正字通康  
熙字典，若以症爲脫肛病字，則當單用症一字足矣。何可俱同？  
更加脫字乎？而今謂脫症，則似謂症病脫去也。其爲剩字  
背義，何有甚焉者哉？字學者已如此，醫人不知症非肛門  
之肛，空乎？盧和於脫症下云：俗作肛非也。丹溪纂要，其以不學  
無術，反爲妄作贅說，雖不足深責，亦多見其不知量也。此  
由全不曉文字也。

一本堂行餘醫言卷之六下畢

