

新訂
增補

和蘭藥鏡

自卷四至卷六

⊗
○ 28-1

⊗
499.2
Orc
2

499.2
04
2

No. 3234

19 0 28-1



富士川文庫

3342

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷四

遠志 麝香

遠志驅水散

遠志驅水酒

遠志山藥

遠志解疑煎

清肺遠志煎

薊菜草

遠志昆^{コン}設^セ爾^ル弗^フ

水楊梅

薯草

薯鐵鎮痙丸

薯鐵解疑丸

金薯蒸餾油

連錢草

清肺和胸飲

豁痰潤肺飲

洞庭藍

清肺定嗽飲

曾丁口筒英覽

卷四

標目

風雲堂藏

乙切草 淨汚清肺飲

乙切草油

金花草

茜草

茜根煎

經閉。茜根經驗說

自第一至第十九

附經閉。用薩毘那那經驗說

自第一至第五

龍茅草

山蘿蔔

草零陵香

芸香

芸香水

苦薏

新訂增補和蘭藥鏡卷四

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

遠志

ホレイガウ。セ子ガ蘭セ子ガ○按ニ藥舖

者ナリ○此一種、羅甸名ホレイガウ。アマ

○榕按ニ嘗テ和蘭本草ニ就テセ子ガノ形狀氣

味ヲ考ルニ唐遠志ニ髣髴タリ近來洋船ノセ子

カヲ得テ其氣味形質ヲ徴シ始テ遠志ニ確當ス

ル下ヲ得タリ江戸藥舖大坂屋四郎兵衛清雅云

志ト呼ブ尋常遠志是ナリ其二ハ肉遠志ト呼ブ

利ナリ然^レ在昔年ヨリ取ク^レ禁ス其三八朝鮮
遠志ナリ朝鮮ヨリ舶來ス唐遠志ニ比スレバ太
クノ硬シ此即遠志ノ大葉ノ者ナルベシ其
四ハ和産遠志ナリ是ハ藥舗ニ出ル^レ少シ

試効

根ヲ藥用トス。但^レ其中心ハ木様硬固ニシ味ナ
ク又効用ナシ是ヲ去リ其表ノ疏脆淡黄ノ肉ヲ用
ベシ是ニ灰色ノ粗皮被^レ其味初^レ微酸ヲ帶ビ。後辛
熱侵蝕ノ刺戟シ微苦ヲ帶ブ。著キ香臭ナシ○衝動
疏解ノ粘液ヲ驅泄シ。汗ヲ發シ。小便ヲ利シ。虛症、癩
衝ノ凝血ヲ疏解ス。但^レ過服スレバ吐シ或^レ瀉下ス○
此藥。水脉ヲ衝動ノヨク小便ヲ利シ汗ヲ發ス。故ニ
水腫ニ殊効アリ此根一弓ニ水一斤ヲ加^テ煮テ半^ヲ

減シ。半時^ヲ毎ニ三匙宛服ス。又左ノ二方水腫ニ峻効
アリ

遠志驅水散

遠志 半錢
海葱 四片

孕礬酒石 一錢
杜松實油 十滴

右件三味各別細末^ニ調和シ。油ヲ研合シ。分^テ四服
トシ二時^ヲ毎ニ一服宛用^ス

遠志驅水酒

遠志 細剉
二弓

右硝子壘ニ内葡萄酒一斗ヲ加^テ浸^ス三日。漉^テ滓ヲ

去リ一時毎ニ一匙宛服ス○北亞墨利加洲ニハ常ニ遠志ヲ採リ貯テ「ライテルスランガ」一種毒及蝮蛇ノ咬傷毒ヲ解スル奇藥トス。其咬傷ヲ被レバ患者全身ノ血忽々凝固シ。發熱。脉數。呼吸不利。促迫。欬ノ痰唾ニ凝血ヲ交ル等。宛モ肺焮衝。胸脇焮衝ノ症ノ如クニノ死ヲ免ル者殆ト希ナリ。然レニ此藥ヲ與テ吐下發汗スルニ至レバ速ニ其毒ヲ驅泄シ。凝血ヲ疏解ノ愈ザル者ナシ。即チ此根ノ細末。一ノヨリ半錢マデ一服トシ數服ス。或ハ水煎シ一時半毎ニ三匙宛服ノ諸症全治スルニ至ル。或ハ是ヲ嚼テ其汁ヲ服シ。或

其創ニ外敷ス○此藥ハ右ノ如ク凝血ヲ疏解ノ胸脇焮衝ニ用テ一種ノ解凝藥トシ其凝血ヲ疏解ノ大効アルヲ發明シ死ヲ瀕キ幾多ノ患者ヲ救活セリ。然レモ斯如キ辛熱衝動ノ藥ハ總テ壯實多血ノ焮衝病ニ小害アリ。唯患者虛憊シ諸管纖維ノ運營弛弱怠慢ナレバ因テ焮衝ノ諸症淹滯メ治セザル者幾應効アリ。即チ煎劑トシ用テ試驗多シ。假令バ後方奈如シニ公一肺ノ焮衝半錢ニ或ハ水煎スルニ此

遠志解凝煎

遠志

三三

水 三北

右煮減又三分、一トシ一時半每ニ三匙宛服ス。但此劑辛熱、患者ニ害アルベキ症ハ遠志一ト水ニ比テ加、煮減又三分、一トシ與、ベシ或、細末、シ對症ノ劑ニ加、丸藥トシ用モ良○或云、胸脇焮衝等ニ此藥未用、レハ能、痰ヲ咯シメ胸中ヲ疏潤シ其諸症ヲ緩解ス。又云喘急、膠痰壅盛、呼吸不利、促迫苦悶スル症ヲ治スト。但此藥ハ胸肺ノ汚液ヲ驅除シ粘痰ヲ疏解シ凝血ヲ稀釋スル故ニ右ノ諸症ニ優効アルコト固ヨリ論ナシト雖モ血液焮衝ノ稠厚トナリ或

焮衝ノ膿様ノ質トナル者ハ此藥適應セズ。凡此藥ヲ久服スル患者ニ刺絡ヲ施セバ其血厚膜ヲ被ヘバナリ焮衝ノ稠厚ナル候トス○或云此藥辛熱衝動ノ性力アル故ニ肺焮衝、胸脇焮衝等ニハ他ノ解凝藥及、清涼下劑ヲ加用テ多ク効ヲ得○肺焮衝後、勞欬トナリ或吐血後其血肺ニ殘留、勞欬トナリ焮衝ノ症ナキ者此藥ヲ用、小便多ク利ハ汗減シ吐痰増進ノ輕快ヲ致ス者多シ或云此藥勞欬ニ大効ヲ稱スレハ肺ニ膿瘍アリテ焮衝ヲ兼ル症ハ必ス害アリ○粘痰多キ勞欬、焮衝ノ諸症ナキ者ハ

此藥ニ依蘭苔ヲ加用テ効多シ○或云勞欬様ノ症
 此藥ヲ用テ悉ク良効ヲ得ルニ非ズ勞欬ニ効功
ナキニ非ズ
 ト雖モ熱多ク嗽衝ヲ帶ビ脉強盈ナル症ニハ適應
 セズ故ニ此症殊ニ審察ヲ加用ルヲ專要トス原註
 唯痰唾ニ膿様物ヲ雜甚夕膠粘ナルガ爲ニ咯出シ
 易カラズ且食欲ヲ失症ハ左ノ煎劑或遠志昆設爾
 弗ヲ依蘭苔和胸劑共ニ次ニ加用テ多良驗ヲ得タリ

清肺遠志煎

遠志 二弓

甘草 六錢

右遠志ニ水一斗半ヲ加煮ルヲ八分時ニシ甘草ヲ
 加浸ヲ十六分時瀝テ滓ヲ去リ聽用ス

遠志昆設爾弗

遠志 細末 一錢半

甘草 舍利別 一弓

右調和シ一時半或二時毎ニ一錢宛服ス是ヲ服ノ
 吐瀉多尿等ヲ發スルヲナシ

甘草蘭苔飲

卷二十七ノ 二十四葉

是依蘭苔和胸劑ナリ

方名 依蘭苔ノ條ニ出ツ

○遠志ハ解疑ノ殊効アリテ能痰ヲ豁ノ咯出セシ
 △故ニ粘痰多キ胸肺病ノ嗽衝ナキ症ニ良効ヲ奏
 シ又傷冷毒ノ咽喉焮腫ニハ此藥ノ泡劑ニ民埜列
 利精ヲ加服ノ殊効アリ○冒寒傷冷毒ノ嗽衝熱解

散スレバ其他諸症淹滯ノ治セザル者或遷延性ノ傷冷毒痛。痛風。脚痛風等ニ是ヲ用レバ其解凝ノ効ニ由テ發汗利尿痰唾等ヨリ病毒ヲ排泄ノ治ス○赤斑熱。痘瘡。麻疹等夥ク發見スレバ其脉虛弱ニメ元運力充張セズ。動スレバ潜伏内攻ノ危篤トナルベキ症ニ此藥ヲ水煎シ用レバ能其鬱毒ヲ宣發メ諸竅ニ排泄ス○服量。末ハ半ヲヨリ一ヲマデ日三四次或一時毎ニ用フ煎劑ハ此根一ヲニ水十ヲ或一比ヲ加。煮テ半ヲ減シ滓ヲ去リ桂露等。香竈ノ飲液ニ一匙宛加。服ノ一晝夜ニ一劑ヲ盡ス。是ニ由テ

吐瀉等ノ眩暈ナシ然レ尚其味ヲ惡ム者ハ此劑ニ水二比ヲ增加ヘ煮テ用ベシ。或其症ニ隨ヒ幾那ヲ加用ベシ。通例煎劑。尤効アリ或細末トシ蜜ヲ加テ煉膏トシ一二ヲ宛用フ或對症ノ煉膏ニ加用ルモ

良(依)(福)(括)
(僕)(叔)(叔)

水楊梅

ダイコンサウ俗稱カレイヨヘ
イルラタ羅ナイゲルコロイト蘭

試効根ヲ藥用トス。辛温芳香收瀉。氣味丁香ノ如シ。其收瀉質ニ亞的兒樣油及苦味鹽ヲ含リ○神經。心胃ヲ温壯强健シ稍發汗利尿ノ効アリテ壯神ノ一

良藥トス○痙攣ノ運動ヲ鎮メ諸管纖維ノ弛虛緩弱ニ因ル諸症ニ良効ヲ奏シ風氣ヲ驅リ疝痛ヲ治ス○強壯スル効力ヲ以テ神經熱ニ効多シ又腐敗熱ニ用ヒ或間歇熱ノ良藥トシ多ク治驗ヲ稱ス總テ幾那ノ的當スル諸病其他發歇往來定期アル諸症ニ殊効アリ○經久下利及赤痢ノ虛症ヲ治シ婦人崩漏白帶下嘔血等失血過多ヲ止ム○瘰癧毒諸症失苟兒陪苦及大ニ潰爛セル膿瘍等ニ試効多シ○服量細末ハ半錢ヨリ一錢ニ至ル或丸藥煉藥ニ加用ヒ或此根一弓ヲ燒酒八弓ニ浸メ藥氣ヲ出シ

一匙宛服スル一日三四次或此根一弓ニ沸湯八弓ヲ加泡劑トシ服ス或此根一弓半ヨリ一弓許ヲ水十六弓ニ煮テ半ヲ減シ滓ヲ去半時毎ニ一匙宛服ス此藥多ハ揮發強壯劑ニ加用テ良効ヲ奏ス

依叔 叔福

薯

ハゴロモサウメドキノコギリサウ俗稱
レホリウム羅テウイセンブライド蘭

試効 莖葉花共ニ藥用トス稍香氣アリ温煖強壯ニシ惡液ヲ淨刷ス○鎮痙止痛ノ一良藥トス故ニ痙攣ノ運動ヨリ發スル諸症心腹痛風氣痞滿疝痛產後腹痛及經閉ヨリ發スル痙攣諸症ニ殊効ヲ奏ス○

腹部諸藏ノ壅塞ヲ開達シ其壅塞ヨリ發スル痙攣
 諸症及結石壅塞ヨリ發スル痙痛ヲ治ス○脾病依
 剥昆垓兒^{ホコシデ}神志鬱憂病等ノ痙攣諸症ハ此藥極テ効
 驗アリ○肺藏虛弱ヨリ發スル遷延ノ欬嗽喘急ニ
 善良驗ヲ稱ス但嗽衝ヲ兼ル症ハ害アリ○此藥收瀰
 ノ効アル故ニ諸失血及諸竅ノ脱泄ヲ止ム○婦人
 處女孕婦産婦ノ崩漏ヲ止ルニ多ク用フ是ニ腹内
 諸藏ノ壅塞ヲ兼子或子宮衝逆様ノ痙攣諸症ヲ兼
 ル者ハ殊ニ的當トス○處女月經調順セズ或過多
 或稀少ノ症ハ此藥ニ加^カ密列^{ミツ}默栗^{モク}薩^{サク}捲^ク垓兒^{ゲイ}等ヲ加

用テ適應ス○吐血ノ症體稟薄弱或各部虚損シ或
 神經攣急ヨリ發シ或痔血月經壅滯ヨリ發スル者
 ハ皆此藥的効アリ嘔血下血赤痢等亦是ニ同シ○
 打撲壓傷等ノ外因ヨリ發スル吐血亦良驗アリ殊
 亞兒尼加^アヲ加用^カレバ^バ脉管外ニ泛溢セル血ヲ管中
 ニ^ニ喻收^ユメ其傷消散ス○痔血過多ニ用テ亦良驗ア
 リ或廬會及解凝鹽類^キ下劑^リ吉利詞^キ參兒^サ等ヲ過用
 ノ痔血大ニ脱泄スルヲ治ス痔血過泄^ハ止^マサレバ
 患者漸ク虚衰シ終ニ萎黃病水腫^トナリ治シ難キ
 ニ至ル○白帶下漏精淋疾ヲ治ス○下利屢發^メ止

不宿疾ノ如クナル症ニ此藥驗多シ○著越幾斯劑
トシ製法蒲公英越幾用之
斯劑名ト同シ用之
前說以諸病ニ良効ヲ稱
ス殊ニ痙攣様ノ諸症ヲ兼ル病ハ鎮痙強壯藥ヲ加
テ尤驗アリ假令ハ後方ノ如シ

著鐵鎮痙丸

著越幾斯劑 四錢

阿魏 一錢

格碌屈私末爾扶斯 四錢

鹿角鹽 二錢

右各別細末シ調和ノ三匁ヲ一丸トシ其時毎ニ二
丸宛服ス○脾病神思鬱憂病。痙急内藏壅塞。蟲症ヲ
兼ル等ハ左ノ丸藥奇効アリ

著鐵解凝丸

阿魏 三錢

撒兒末爾扶斯 各一錢

盧會

著越幾斯劑 各一錢

右各別細末ノ調和シ六匁ヲ一丸トシ十丸宛服ス
ル一日二次又諸蟲ヲ殺シ驅泄ス。諸蟲症ニ用テ峻
効アリ○此藥水煎。泡劑。散劑トシ用テ皆良○衄血。
斷。出血ヲ止メ或斷ノ痙腫及潰瘍ヲ治シ或齒痛ヲ
止ルニ水煎若ハ泡劑トメ含漱シ或末トシ患處ニ
摻ノ良○外敷ノ諸創傷潰瘍ヲ愈シ。出血ヲ止ム汚
穢腐爛ノ瘡瘍惡厲ノ創傷潰爛甚キ症或寒熱壞疽

等ハ對症ノ藥草ニ加^ム蒸湯劑トシ或^ハ琶布トシ貼メ殊ニ良

著蒸餾油此油殊ニ花ニ多シ。製法薄荷油ト同シ。此油數滴ニ沙糖及^ヒ酒石英少許ヲ研和シ服メ痔血過多ヲ止ルニ捷効アリ

依福伍 叔叔

連錢草

ガキトヲシ俗稱「ヘデラテル」
レストリ「アイルドヘイル」

試効莖葉共ニ藥用トス。温煖開達強壯ニシ稍收瀦シ。創瘍ヲ愈シ。殊ニ粘稠惡液ヲ淨刷ス。膠固ノ粘液ヲ淨刷ス。性功大抵洞庭藍ノ如シ。○内藏壅塞ヲ疏解シ。肺腎

等ノ汚液ヲ祛ク。○冒寒欬嗽。痰欬濕喘等ノ肺病ヲ治ス。○勞欬様ノ胸病。欬嗽肺傷勞欬ニ殊効ヲ稱シ。肺瘍ニ用^ヒテ敗液ヲ除キ創瘍ヲ愈シ治ス。和胸藥草ニ加^フ泡劑或^ハ煎劑トシ或^ハ細末トシ用^ヒ或^ハ一味泡劑トシ沙糖若^シハ白蜜ヲ和シ甘美トシ與フ。○乾欬勞嗽ニ此藥ヲ葡萄酒ニ浸シ長服ノ驗アリ。黥失刺護及^ヒ洞庭藍ヲ加^フテ殊ニ良。○熱病及^ヒ勞瘵様ノ患者。血中酷厲毒アリテ肺ヲ侵刺シ欬嗽荏苒トメ休マズ或^ハ肺瘍ノ欬嗽呼吸不利等ハ後方ヲ良トス。是^レ技爾撒謨様ノ性効アリテ創瘍ヲ愈シ。内熱ヲ涼解シ汚

液ヲ清刷シ且、大小便ヲ通利ノ殊効ヲ奏ス

清肺和胸飲

連錢草 二握

甘草 剉 二寸

右大麥煎ノ沸湯八比ヲ加、浸下一時半ニノ滓ヲ去

次ノ藥ヲ加フ

白蜜 六寸

消石 六錢

右攪和シ日常飲料トス。是ヲ服メ下利スル者ハ消石ヲ去ル○久効痰血及肺瘍等ニ左ノ方亦効多シ

豁痰潤肺飲

連錢草

洞庭藍

龍牙草

乙切草

各等分

右調勻シ泡劑トシ日常飲料トス○小兒虛羸勞瘦
偃僂等ハ先、輕キ下劑ヲ與ヘ胃腸ヲ淨刷メ後此藥
一味細末トシ半錢ヨリ二片許。毎朝空心ニ用テ亦
良効ヲ稱ス○痛風脚痛腎痛等ニ是ヲ煎劑或泡劑
トシ多服メ其惡液ヲ排除シ治ス○赤痢ニ効多シ
下利下血吐血等亦良○肝脾等ノ壅塞ヲ疏解シ黃
疸ヲ治スルニ水煎シ服メ効アリ

物 伍 伍 伍

洞庭藍

江戸花戸稱

ハ

マトラノヲ俗稱

イ

ス蘭

試効葉ヲ藥用トス。微苦收瀋シ茶味ヲ帶ブ。然レ此香氣ナシ。○淨刷。清血。發汗。利尿。止痛ノ性功アリ。○胸肺汚液ヲ淨刷シ。弛弱ヲ強壯シ。創ヲ愈ス。對症ノ劑ニ加。泡劑或水煎シ服ス。○欬嗽喘息吐血勞欬等ノ初發ニ左ノ方甚ク驗アリ。

清肺定嗽飲

連錢草 二握
 依蘭苔 一握
 蕁麻葉 各半握
 土木香 四錢

甘草 一弓

右件到。調和シ一撮宛取テ泡劑トシ一二碗宛服スル。一日兩三次。○痛風。傷冷毒ノ諸症及頭痛等ニ泡劑トシ服メ血液ノ衝動ヲ抑制シ頭ヲ清爽シ鬱毒ヲ排除ス。○内藏壅塞。脾病黃疸等ニ良効ヲ奏シ惡液病。疥癬等ヲ治ス。是皆血中ノ惡液ヲ排除スルニ因ル。○内外汚穢。潰瘍創傷ヲ淨刷シ治ス。○乾葉ヲ水煎或泡劑トシ或散劑トシ服シ或細末ニ舍利別。若ハ蜜ヲ和シ煉膏トシ或蒸餾ノ露水ヲ取り或舍利別トシ服メ前說ノ諸症ヲ治ス。

乙切草 俗稱「イッヘリコム」羅「シントヤンスコロイド」蘭

〔試効〕花穂ヲ用フ温煖疏解シ技爾撒謨様ノ油ヲ含
收斂ノ劑ヲ愈シ凝血ヲ散ス○酷厲液ヲ緩解シ和
胸ノ良藥トス。欬嗽聲嘎肺傷勞欬ヲ治シ吐血下血
等諸脫泄ヲ療ス葡萄酒ニ浸シ服メ殊ニ良○勞瘵
様ノ欬嗽及肺瘍ニ後方間良効アリ

淨汚清肺飲

乙切草 穗

山蘿蔔

點失刺越

甘草

各一握

一弓

右泡劑トシ適意ニ飲服ス○内藏壅塞神思鬱憂病
依剥昆堙兒子宮衝逆等ヲ解散シ又是ヨリ發スル
精神錯亂ヲ治ス○小兒搐搦ニ花ノ末十匁ヨリ十
五匁マデ毎日兩次乳汁等ニテ用ヒ治驗多シ○胃
腸ノ疣蟲ヲ殺ス此藥水煎メ服シ或搗爛ノ腹部ニ
貼ス○乳汁凝固ヲ稀釋シ婦人乳房結核ヲ消ス○
利尿ノ効アリ故ニ間黃疸水腫ニ殊効アリ○花穂
ヲ細末トシ一錢ヲ服ス或一握ヲ取リ沸湯ニ泡出
シ或水煎シ或麥酒或葡萄酒ニ煮テ服ス
乙切草油 製法 花穂ヲ採陰乾メ製ス其法加密列煎

油名ト同シ。此油血紅色カ。試効外敷メ秀偉ノ愈創藥トス。技爾撒謨様ノ効アリテ創傷潰瘍ヲ愈シ膿ヲ排ヒ肉ヲ生シ。又凝血ヲ散シ打撲傷殊ニ神經傷。肢節顫振ヲ治シ或痛風脚痛等ニ擦テ痛ヲ止ム

依物 叔叔

金花草

又「秋ノキリンサウ共ニ花名」ソリダゴヒルガアウレア羅 キルデシルデ蘭

試効葉温煖開達微收瀘ス○愈創ノ殊効ヲ稱ス。内外創傷潰瘍癩瘡並ニ斷ノ腐壞咽喉口中潰爛等ヲ淨刷シ愈スニ用フ○吐血下血赤痢下利ヲ止ム○

利尿ノ効アリ。小便閉ヲ通シ腎膀胱ノ結石ヲ碎キ。腎痛石淋ヲ療ス○肝脾ノ壅塞ヲ疏解ス○水煎泡劑或細末トシ服ス叔叔 伍

茜草

アカ子和名 キトリ名 羅 リッピアティン メイカラブ蘭

試効根ヲ藥用トス又赤色ノ染料トス○性温味帶苦。收瀘解凝利尿ノ効アリ。故ニ肝脾腎子宮ヲ淨刷シ脾病。黃疸水腫諸腺腫ニ用テ一種ノ疏解開達ノ良藥トス肝脾壅塞ノ諸症ニ此藥水煎或泡劑トシテ治驗ヲ稱ス○打撲損傷及内部創傷ニ用テ凝

血ヲ散シ痛ヲ止メ捷効ヲ奏ス。水煎シ或葡萄酒若
 ハ麥酒ニ浸シ或燒酒ニ浸シ（フインキ）丁幾劑下シ用フ○或
 云。此根ヲ内服スレバ小便及婦人乳汁赤色トナリ
 終ニ諸骨亦赤色トナル。是ヲ以テ諸骨病ニ用テ奇
 効アリ（或云是ヲ久服スレバ諸骨軟柔）○小兒拘攣
 病ニ此根ヲ試用テ四年。總テ殊効ヲ得タリ即後方
 經驗ノ良劑トス

茜根煎

茜根 二錢

橙皮 乾者 十片

茴香 搗碎者 十五片

右細剉ニ磁罐ニ内水六比ヲ加、煮減ノ二比トシ。冷
 定ノ上清ヲ取、硝子壘ニ收メ、一日ノ服量トス。小兒
 諸骨漸柔軟、痿弱ノ舉動シ難ク或諸骨既ニ彎屈ス
 ト雖他ノ惡症ナキ者ハ是ヲ用テ回復ス。宜此煎劑
 ニ蜜ヲ適意ニ加與ヘ且乳母モ亦服セシムベシ。若
 大便秘閉或下利腹脹等ノ患アルキハ各其對症ノ
 藥ヲ加ベシ但此劑數月連服セザレバ良効ナシ。羅
 ○經閉。茜根經驗說。茜根ハ經閉ニ峻効アル
 藥トス。數是ヲ試用ルニ性効尤平穩ニ。他ノ通經
 藥ノ如キ攻撃驅泄ノ害ナシ。即其質驗說ヲ左ニ舉

第一 一婦人十八歲。經閉二個月。發熱。惡心。腹部風氣痞脹。腕脚疼云。顫振シ。脉八十八動。脉動說因幾那條ニ註ス。脉力平常ニ異ナラス。此症先吐劑ヲ與、吐セシメテ胃ヲ淨掃シ。茜根末半錢宛用レ日四次。連用六日ニ月經來リ止ザルレ二日。

第二 一婦人三十四歲。經閉七個月。子宮衝逆ノ諸症ヲ發シ又時々神思憂悶ノ症ヲ患テ精神錯亂ヲ兼因テ孕鹼酒石ヲ用ヒ。次ニ阿魏ノ丸藥ヲ與ルレ都テ十八日ニノ顯功ナシ。乃茜根末二刀宛用ルレ日三次。連服三日ニ月經來ルレ四日。是ヨリ諸症漸

退キ爾後月經調順ナリ

第三 一婦人二十三歲。寒氣ニ冒觸レ經閉ヲ患レ既ニ五年。其症頭痛。惡心。胃部痞滿。拘痛。渴アリ。肋中疼。肢體懈惰。白帶下。大便秘結。不寐。稍勞動スレバ呼吸短促ス。脉七十動ニ弱。此症先吐劑ヲ與、テ胃ヲ淨掃シ。茜根末半錢宛用レ日四次。次ニ一錢宛用ス。是ニ由テ脉進マス。渴増サズ。連用十日ニ月經來ルレ四日。翌月亦月經前月ヨリ多シ。

第四 一婦人二十二歲。寒氣ニ冒感レ經閉ヲ患レ一ヶ月。頭痛。惡心。胸腹痛。欬嗽。脚冷ヲ兼ヌ。此症先吐

劑ヲ用ヒ次ニ通經ノ數方ヲ投スレモ皆効ナシ。終
ニ茜根末ヲ與ル一日四次。連用十四日ニ月經來
ラス。然レモ諸症盡ク解散スル故ニ患者服藥ヲ厭ヒ
治療ヲ休ム。第五一婦人二十一歳。二年以來月經甚ク稀少。二個
月以來經閉シ。頭痛惡心。頭眩暈。噫氣。胃中酸敗液
ノ症ヲ兼子渴アリ。因テ先吐劑ヲ與テ吐セシメ。次
ニ幾那及撒兒末爾扶斯名ヲ用ル一日數日ニ患症
荏苒。是ニ於テ茜根末ヲ與ル一日四日ニ患症解散
ス。然レモ月經通セズ。

第六一婦人二十六歳。經閉一年許。胃中疼ミ是ヲ按
ハ増劇シ。效甚ク又吐血スル一日二十日許。脉八十動
頗ルカアリ。因テ先刺絡ヲ施シ。胃部ニ吸角ヲ貼シ。
次テ答末林度ヲ用ヒ調治八日許ニ患症漸ク退キ
宛用一日四次。漸ク加テ一錢ニ至リ諸症漸ク退キ
是ヲ連服スル一日九日ニ患症子宮ノ部疼ミ頭痛ヲ發
ス。翌日月經來リ二日連綿ス。第七一婦人三十六歳。經閉ヲ患テ四個月。小腹脹
嘔噦。大便秘結。子宮衝逆ノ症ヲ兼子。脉百動。因テ阿
魏ヲ與ル一日數日ニ効ヲ得ズ。是ニ於テ茜根末半

錢宛用_レ一日三次連服三日ニメ月經來ル

第八 一婦人三十一歲。産後月經ナク二個月許ノ後。劇キ熱病ニ羅_カリ頭痛惡心。胃部痞硬。背及左肋劇痛。シ夜中脚痛浮腫。白帶下。肢體顫振。脉百六動。因テ茜根。末半錢宛與_レ一日四次。漸ク加_テ一錢ニ至リ。連用七日許ニメ右乳房刺痛ニ堪_ズ。因テ此劑ヲ休メ刺絡ヲ施ス_テ五回。十日許ヲ經テ再ビ右ノ劑ヲ用ヒ連用十日許ニメ毎_{イッ}次月經前ニ患_ル諸症發見ス。然_レ此時劇キ嘔吐ヲ發メ藥劑ヲ服スル_レ能_ザル故ニ此劑ヲ休ム

第九 一婦人二十八歲。經閉三個月。頭痛惡心。冷汗。脚

ニ水腫ヲ發シ。背腕疼ヲ兼子。脉力平常ノ如クニノ百四動。薩毘那_名末ヲ用_テ十日ニメ効ナシ。次茜根末一錢宛用_テ一日四次亦効ナシ。又甘汞。鐵屑ノ丸劑及健_シ質亞_ア那_ナ越_エ幾_キ斯_ス劑等ヲ用_テ數日。總テ寸効ナシ。第十 一婦人十八歲。經閉五個月。頭痛。耳鳴テ聽_ヘ難ク子宮部疼_ク。脉八十四動。乃刺絡ノ瀉血スル_テ九_ノ許。其血焮衝ノ候。血凝固_メ勿_シノ_{アリ}。次ニ茜根。末半錢宛用_テ一日四次。其後二日宛與_ル一日五日ニメ月經來_レリ

第十一 一婦人二十三歲。熱病後。月經延滯二週許。是
ニ茜根末一錢宛用ル。日四次。連服十四日ニノ効
ナシ

第十二 一婦人二十一歲。體稟多血。經閉一年許。惡心
胃痛。痞脹。食進マズ。脊推疼之。右踝腫起シ肢體勞倦
ス。是ニ刺絡ヲ施シ其血。焮衝ノ候アリ。次ニ吐劑ヲ
與ヘ吐セシムル。一回。次ニ茜根末一錢宛用。日
四次。但時々嘔氣ヲ發メ服シ易カラズ。然レ是ヲ用
ル五日ニノ月經來ル

第十三 一婦人十九歲。經閉二月餘。且傷冷毒樣ノ遊

走痛ヲ發シ發汗甚ダシ。脉九十六動。是ニ刺絡ヲ施
ス。兩三次。其血質平常ト異ナラズ。乃茜根末半錢宛
與。日四次。其後一錢宛用。又其疼甚キ部ニ芫菁
發泡膏ヲ貼シ右ノ劑ヲ用。十四日ニノ月經來ル

第十四 一婦人三十六歲。經閉三年ニノ其間暫ク熱
病ニ罹レ。今既ニ回復ス。乃茜根末一錢宛與。日
四次。連用八日ニノ月經來ル

第十五 一婦人十八歲。經閉六個月。邇來搐掣ヲ發ス
ル。日兩三次。又子宮衝逆ノ症ヲ兼又。因テ亞的兒
ヲ取り四茶匙宛用。日四次。即搐掣並ニ子宮衝逆

ノ諸症解散ス。因テ茜根末二匁宛用_レ一日四次。翌日一錢ヲ一服トシ四服ヲ患者ニ與_テ四次ニ用_ルヲ示ス。然_レニ患者誤テ是ヲ一頓ニ服ス。然_レニ瞑眩ノ候ナク。其次日月經來ル

第十六 一婦人二十二歳。經閉一月半許。從前熱病ニ罹_リ脉百動。乃_チ茜根末一錢宛用_レ一日四次。連服十四日ニ_モ仍_ト月經ヲ見ズ。故ニ後服ヲ止ム

第十七 一婦人二十五歳。六箇月中月經一回來リ。且_チ焮腫眼ヲ患フ。因テ刺絡スル_ト兩次ニ_モ茜根末二匁宛用_レ一日四次。續用十日ニ_モ月經來ル

第十八 一婦人産後。其兒ヲ乳養スル_ト三年。其夏乳養ヲ絶_ト雖_モ仍_ト月經來ラズ_ノ季冬ニ至ル。因テ茜根末半錢宛用_レ一日四次。其後一錢宛用_レ一日八日ニ_モ月經來ル

第十九 一婦人二十一歳。經閉四個月。爾來毎月吐血スル_ト數日。因テ刺絡ヲ施シ綠礬精及消石劑ヲ用_レ一日八日。次ニ茜根末半錢宛用_レ一日三次。其後一錢宛用_レ一日四次。續用十四日ニ_モ月經來。爾後吐血止ム
○右、經驗說ヲ觀レバ患者十九人ニ_モ此藥ノ効ヲ得ル者十三人。其餘モ亦他ノ患症アルガ爲ニ全功

ヲ奏セザルガ如シ即第四 第五ハ經閉治セザレハ
 其患症悉ク治スル故ニ此藥ヲ止ム第八ハ此藥ヲ
 吐スル故ニ功ヲ成^ス了能ハズ第九ハ水腫ニ因テ通
 經藥ノ功ヲ得ズ第十一ハ熱病ニ因テ藥効ヲ妨ク
第十六亦既ニ熱病ヲ患ヒ脉仍數^{ナホ}ニ宛モ勞瘵熱
 ノ如シ故ニ右ノ三症ハ先其當時ノ病全治スルニ
 非レバ通經藥モ効ヲ奏スル了能ハズ然レ唯是ヲ
 右ノ患者ニ歷試シ其症ニ隨ヒ當否アル了曉了
 セシメン爲^メノニ○又右經驗說ヲ考ルニ經閉ノ年
 月久キ者及病性險重ナルガ如キ症ハ却テ其藥効

切實ニノ治シ易キガ如シ即第一 第十三ハ經閉二
 個月第七 第十九ハ四個月第十 第十五第
 十七ハ六個月第二 第六 第十二ハ一年第
 十四ハ三年第三 五年就中第六 第十九ハ吐血ノ
 症アリ然^ルニ其効驗ナキ症第十一 十二週 第十六ハ
 一月半第四 第五 第八 十二個月 第九 三個月經閉
 ス○患婦ノ體稟ニ隨テ^テ燃衝性ト粘液性ノ病アリ。
 凡^レ燃衝性ノ症ハ酷厲ナル通經藥ハ大害アリ薩那
 類故ニ通經藥ハ病性ヲ辨識ノ用ニ非レバ効ナシ
 然^ルニ茜根ハ病性ニ拘ラズ投メ効アリ即第六 第十

〔第十七〕〔第十九〕ハ皆焮衝性ノ甚者ナリ故ニ刺絡ノ功アリ〔第二〕〔第三〕〔第七〕〔第十四〕〔第十五〕ハ焮衝性ト相反對ノ粘液性ノ症ナリ。然レ皆茜根ヲ用テ全功ヲ得タリ其他不治ノ症〔第八〕ハ焮衝性ノ病ニ屬ス

〔第四〕〔第五〕〔第九〕ハ毫モ焮衝性ノ候ナシ其餘ハ皆右兩性ノ中間ニ屬スル症トス凡、經閉ハ焮衝ナキ者多シ○茜根ハ焮衝ヲ兼ル症ニ用レレ是ヲ増劇セズ。脉ノ數勢ヲ進起セズ。曾テ焮腫眼ヲ兼ル經閉ニ人ニ是ヲ試用ニ毫モ其焮衝ヲ増加スルナシ○

〔第六〕〔第十九〕ノ如キ失血アル症ハ熱性酷厲ノ通經

藥ノ類薩那ハ的當セズ。然レ是ニ茜根ヲ與レハ吐血

止ニ並ニ發熱渴等ノ症減ノ月經通ス。或、經閉治セザル者モ兼症退テ必モ患者ニ損害ナシ。即チ〔第四〕

〔第五〕ノ症ノ如シ。故ニ此藥ハ焮衝ヲ増サズ減セズノ効ヲ爲スト知ベシ○或云。茜根ハ收瀉ノ性能アルニ由テ通經ノ殊効ヲ致ス。猶鐵劑ノ如シト。然レ此說。著實ナラス。此藥ハ唯刺戟衝動ト收瀉トノ兩効ヲ兼ル者ナリ。試ニ茜根浸劑ニ撒兒末サレマ爾扶斯ルテスヲ加ルニ黑色ヲ見ス。ナシ是甚キ收瀉ノ質ナキ候ナリ○此藥。焮衝ヲ兼ル諸症ニ用テ妨害ナシ故

ニ強壯スル効ナキコト明白ナリ。然レニ**第五ノ症ノ如**キ幾那ヲ用テ効ナク茵根ヲ與テ諸症解散スルハ是強壯藥ノ如シ。是ヲ考究スルニ茵根ハ脉管質ニ効ヲ爲サズ。又通泄ノ諸器ニ一ニ變化ヲ爲サズ。唯神經質ト諸液質ニ其効ヲ致シ。殊ニ子宮神經ヲ衝動メ月經ヲ通スル一種ノ奇藥トス。是猶吐藥ハ胃ヲ刺戟シ下劑ハ腸ヲ衝動シ利尿藥ハ腎ニ侵入スル等。各部一處ニ限リテ殊効ヲ見ス者ノ如シ。若然ラズノ全軀諸器一般平等ノ効力ヲ致スハ右ノ**第六第十九ノ症ニ用テ必ズ肺胃ノ諸管ヲ刺戟**

シ逾其吐血ヲ増發スベキナリ。然レハ體中他ノ諸部ニ効力ヲ爲コト甚緩慢ニメ獨リ子宮ニ雄偉ノ變化ヲ致シ駿速ノ排除ヲ爲スコト殊ニ奇異ナリトス。○
 處女未ダ月經ヲ見ズメ久ク經閉スル者ハ間險症アリ。是或生涯月經ナキ者アリ或天賦ニ因テ子宮腔等通經ノ道路生合閉塞シ或子宮ノ形體常資ニ違或體中諸器惠害アルヨリ來コト數屍體ヲ剖解ノ見聞スレバナリ。○通例細末半錢宛日三次。二日用次ニ二夕宛日三次與ヘ。兩三日連用メ効ナキ片ハ一錢宛日四次用ベシ。是ニ由テ胃中ニ重滯セズ。泡

劑煎劑ニ比スレバ簡便トス。○此藥的當スレバ大抵服後第三日ヨリ第十二日マデノ間ニ月經通ズ。是ヨリ遲延スル者稀ナリ。○薩毘那^{サビナ}モ亦專ラ子宮ヲ衝動スル通經ノ峻藥ナレ。凡^レ茜根ニ比スレバ性味酷烈ニシテ大ニ刺戟シ。過用スレバ崩血ヲ發シ孕婦ハ墮胎ス。然^レ凡^レ半錢ヲ一次ニ用^レバ妨害ナクノ經閉ニ捷効アリ。但^シ甚ダ刺戟衝動ノ血ヲ驅逐シ功ヲ成ス故ニ茜根ノ性功ト同ジカラズ。因テ其經驗說ヲ左ニ舉テ參攷ヲ資ク

第一 一婦人二十二歳。經閉二個月。肢體顫振及子宮

衝逆ノ症ヲ兼ヌ。因テ刺絡ヲ施シ吐劑ヲ與ヘ。次ニ芸香末ヲ用^テ衝逆快治ス。然^レ凡^レ月經來ル^トナシ。因テ縛股法ヲ施シ。股動脈ヲ壓止ス。凡^レ半時許縛股ニヲ施シ脚ニ循行スル動脈ノ血ヲ阻遏ノ是ヲ子宮動脈ニ循行セシムルナリ是ニ由テ眩暈。呼吸促進。背及子宮ノ部。擊急疼痛ノ煩懣シ。脈百三十動許。次ニ薩毘那^{サビナ}末半錢宛用^テ日ニ兩次續用四日ニ月經來リ二日連綿タリ。○自^レ得^ル症^ニ對^シテ

第二 一婦人二十三歳。經閉六個月。頭痛。腹部風氣痞脹。食消化シ難ク。且^シ酸敗液ノ症ヲ兼子。脈六十八動ニ弱。先^ニ吐劑ヲ用^ヒ次ニ鐵屑ト健質亞那^{ケンシテアナ}越

幾斯劑ノ丸藥ヲ用ル日十日ニノ効ナシ。因テ薩毘那末一ノ宛與下日兩次。續服三日ニノ月經來ル

第三一婦人十五歲。未夕月經ヲ見スト。雖モ經閉ノ諸症アルヲ以テ是ニ鐵劑。縛股法前ニ出ツ自餘通經諸藥ヲ投スレモ寸効ナシ。因テ薩毘那末半錢宛用下

日兩次。續服八日ニノ効功ナク。唯每次腹痛ヲ發スルノミ

第四一婦人三十一歲。經閉八個月。惡心。嘔噦。胃痛ヲ兼子。脉八十二動。乃縛股法ヲ施メ服ノ上部及子宮部脹痛シ背疼ム。因テ薩毘那末一ノ宛日兩次。次ニ

半錢宛日兩次用ル下五日。少腹痛甚ノ嘗テ通經前ニ發セル痛ノ如シ然レ月經來ラズ。因テ數回刺絡ヲ施メ竟ニ全功ヲ得タリ

第五一婦人二十五歲。經閉六個月。乃縛股法ヲ施ス下兩次。即子宮部。攣痛ヲ覺ル下嘗テ通經前ニ患ル痛ノ如シ。又頭痛。惡心。呼吸不利ス。因テ薩毘那末一

ノ宛用下日兩次。漸ク加テ一錢宛與ル下八日ニノ月經來ル。右ノ試說ヲ以テ觀レバ薩毘那ハ通經ノ峻藥タル下知ヘシ但第三ノ症ハ子宮等ノ常資ニ違フ者タルカ。諸方法ヲ施セモ毫モ効驗ナシ。凡

ニ違フ者タルカ。諸方法ヲ施セモ毫モ効驗ナシ。凡

ニ違フ者タルカ。諸方法ヲ施セモ毫モ効驗ナシ。凡

此藥ハ甚々多血ノ症ニハ的當セズ故ニ第四ノ症
 ハ刺絡ノ功ヲ得茜根モ亦獨リ子宮ヲ衝動メ通經
 ノ捷効ヲ奏スト雖モ各其性効ノ殊異ナルヲ屢試
 以審ニ察スベシ依羅貨伍
 龍芽草 ギンミヅヒキ 俗稱 アグリ
 モニア羅 アグリモイ蘭
試効葉ヲ用テ收瀋愈創淨刷排膿ノ効アリ○血中
 ノ敗汚惡液ヲ清掃シ腐壞ヲ攘除ス○痰効勞嗽吐
 血下血下利肝崩白帶下經久淋疾小便頻數等ニ驗
 多シ○咽喉口中膿瘍潰爛ニ漱藥トシ膿ヲ排ヒ痛

ヲ止メ良驗ヲ稱ス○洗藥トシ汚穢ノ潰瘍創傷ヲ
 乾愈ス○肝脾壅塞ヲ疏解シ脾病ノ諸症ヲ治ス○
 水煎或泡劑トシ用フ叔淑伍
 山蘿蔔 マツムシサウ 俗稱 スカビヲ
 サロハス キルストコロイド蘭
試効莖葉花片ニ用テ汚液ヲ淨刷シ血中ノ惡液
 ヲ排泄シ粘稠ヲ稀釋ス○清血淨刷愈創解凝發汗
 ノ効アリ○内部ノ膿腫潰瘍ヲ療シ膿穢敗液ヲ小
 便ヨリ排除ス○效救胸脇痛肺瘍勞效等ニ用テ能
 胸肺ノ痰ヲ豁メ咯出セシメ咽喉膿瘍ヲ淨除シ愈

スニ用フ。胸病ニハ水煎シ蜜ヲ攪和シ服メ良○疥
 癬。白禿瘡。小胞汗。煎瘡。痒及腐穢潰爛ノ膿瘍等一切
 皮膚病ヲ治ス○水煎或泡劑トシ内服シ或洗藥ト
 シ外用ス

草零陵香

「ギハギ」花戸名
 「メリロ」タス羅
 「メリロ」上蘭

○試効花穂ヲ用フ○香竄ニノ開達。緩和。止痛。疏解。驅
 風ノ効アリ○加密列等ヲ加ヘ水煎シ用テ心腹痛。
 疝痛。内部。炊衝痛。赤痢痛。腎痛ヲ緩解ス○傷冷毒痛
 ニ是ヲ内服シ或外敷メ良効ヲ稱ス○接骨木花。加

密列等ヲ加ヘ泡劑或水煎シ。若ハ吉利詞。參兒。蒸湯
 藥。琶布。等トシ外用メ疝腹痛ヲ和消シ。寒熱壞疽ノ
 生肉ト死肌ヲ分離セシメ或炊腫眼。胸脇痛。腫瘍等
 ヲ消散シ疼痛ヲ止ム

芸香

「ベン」ルダ花戸名
 「ル」タガラヘ
 「ク」レインス羅
 「ク」レインルイト蘭

○試効葉ヲ藥用トス○香竄質ヲ以テ健胃。利尿。通經
 ノ偉効ヲ稱ス○神經病。癩症。昏睡。小兒搯搦。蟲症。子
 宮衝逆痛。頭痛。疝痛。神思憂悶病等ニ殊効ヲ稱シ風
 氣痞滯ヲ驅散ス○泡劑トシ或露水ヲ取水眼洗藥

トノ視力乏弱ヲ復シ淚眵漏泄スル症ニ大効ヲ稱
 ス○虛弱ノ肺嗽衝ハ芸香ニ加密列薄荷ヲ加ヘ煮
 テ毳布トシ燒酒少許ヲ加テ胸ニ貼シ尚危險ノ症
 アル者ハ龍腦ヲ加施メ超羣ノ効ヲ稱ス是皮神經
 ニ竅透メ衝動シ疏散ノ功ヲ爲スニ因ル故ニ此症
 ニハ大ナル發泡膏ヲ胸ニ貼メ尤良トス

芸香水

製法主治
名ニ出ツ

前說ノ諸病ニ良驗アリ此露水ハ

精氣淡薄ナル故ニ芸香ノ生葉ヲ數回加蒸餾スヘ
 シ是ニ由テ醇厚トナル否ラザレハ殊効ナシ或
 其症ニ隨ヒ苗香水薄荷水等ヲ以テ是ニ代用ノ可ナ

リ
 依叔
 淑伍

苦意

アギク又センボンキク俗稱
 アパルテニウム羅「ムドコロイド」蘭

試効 花穂ヲ用フ○温煖開達シ竅透刺戟ス纖維弛

緩ノ粘液壅鬱セル諸病即處女病萎黃病粘液腫等
 ノ諸症ニ良驗ヲ稱ス○纖維弛弱粘液質ノ經閉ヲ
 驅泄シ産後腹痛ヲ除キ惡露ヲ下ス○或云體中粘
 液壅鬱多眠ノ經閉ニ加密列ヲ用テ効ナキ者苦意
 ヲ加ヘ泡劑トシ與テ捷効ヲ得ル多シ○小便ヲ
 利シ水腫ヲ療ス泡劑或水煎シ用フ○結石腎痛等

ノ壅塞ヲ疏解ス○此藥温煖ノ功アル故ニ總テ炊
衝性ノ病ニハ害アリ○蒸湯劑。琶布等ニ製シ外敷
ノ諸寒腫或乳房結腫ヲ消シ又偏頭痛ヲ治ス

新訂增補和蘭藥鏡卷四終

此藥温煖ノ功アル故ニ總テ炊衝性ノ病ニハ害アリ○蒸湯劑。琶布等ニ製シ外敷ノ諸寒腫或乳房結腫ヲ消シ又偏頭痛ヲ治ス

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷五

大黃

掃腸挂黃飲 藥黃消英散 定痛消毒飲
蝟蛄消黃散 芫黃驅水丸 加羅疏肝丸
解疑黃鹼丸 加羅荷黃丸 黃霸健胃散
加羅薑黃散 大黃浸劑 大黃丁幾劑
消酸解毒飲

大黃越幾斯劑

大黃舍利別 大黃丁幾劑
薄荷雙黃散 大黃越幾斯劑

土木香

土木香越幾斯劑 土木香舍利別
土木香越幾斯劑

菖蒲

菖蒲浸劑 壯神菖橙飲 菖蒲丁幾劑
菖蒲越幾斯劑 菖蒲蒸餾油

增訂和蘭藥鏡卷五
風雲堂藏

白芥子 薑芥健胃丸

半夏 半夏健胃散

蜀羊泉 排毒羊泉湯

山牛蒡 牛蒡排毒煎

金盞花 大黃合

堇菜 堇菜舍利別黃

蘆根 排毒蘆根煎

石長生 蘆根越幾斯劑

白芷

羌活

芥子泥
半夏黃石散
同越幾斯劑
羊泉硫荷飲
安質羊泉丸

新訂增補和蘭藥鏡卷五

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

大黃 「ラバルバル」又「ウム」羅 「ラバルベル」蘭

撰品 上品ハ其質充實ノ乾輕。外面深黃。雜腹蘭色。裏

淡黃或、白黃色ニメ黃赤ノ紋理及白斑アリ。嚼テ粘

著セズ響ヲ爲シ。黒斑ナク蛀刺ナシ或、正中。眼ヲ窺

者アリ藥舗コレヲ魯西亞大黃ト稱ス姦商動スレ

ハ土大黃。羊蹄根ヲ雜販ク。然レ是ヲ横斷スレバ車

輻紋アルヲ以知ベシ 眞品ハ必ス車輻紋ナシ ○大黃ハ支那及支

那ニ屬ル韃靼地方ニ産ス。其他是ヲ産スル處ナシ。
 [試効] 大黃ノ質ニ麤謨ト華爾斯アリ。麤謨質尤多シ。
 又香竄揮發ノ質ト收瀋ノ質アリテ相混合ス。香竄
 揮發質ハ刺戟衝動ノ瀉下シ。收瀋質ハ收固強健ノ
 効ヲ爲ス。○胃腸鬱滯ノ粘穢汚物。敗液粘液留飲。膽
 液質。惡液ヲ疏滌シ日常瀉下ノ要藥トス。○胃腸ノ
 諸管纖維縱緩セルヲ強壯シ小便ヲ疏通ス。是ヲ服
 スレバ其色小便ニ浸洩ノ黃赤ナルヲ以テ知レシ
 但胃腸ノ感觸甚キ人。是ヲ服スレバ痞氣腹痛惡心
 嘔噦ヲ發ス。○凡、病毒鬱滯セル諸症ハ大黃闕ベカ

ラザル要藥トス。假令バ下利赤痢發泄。胃腸熱。間歇
 熱。黃疽。脾病。依利昆堙兒。處女病。白帶下。疝痛。胃腸酸
 敗液。小兒遷延熱。腸間膜ニ膠粘液壅滯ノ腹滿スル
 等ノ如シ。○瀉下ノ効ヲ取レハ左ノ方服シ易クノ
 捷効アリ。

掃腸桂黃飲

大黃 剉 二錢

煎沸湯

五勺

桂精 一勺

右罐ニ入蓋閉シ浸ス。六時ニノ瀘過シ桂精ヲ攪
 和シ二三匙宛數服ス。○左ノ方亦良。殊ニ熱症及水

腫様ノ症ニ尤^モ効アリ ○式ハ亦身殺ニ換ルル公

葯黃消英散

大黃 葯刺巴

消石 精製者 酒石英 各等分

右細末トシ調和ノ散劑トシ一乃ヨリ二乃マデ服

○惡厲ノ痢疾初發下劑ヲ與テ治セズ漸ク血ヲ交
ヘ下シ患者逾^レ憊困スル症ハ後方奇効アリ

定痛消毒膏

大黃 細末 十匁 的里亞加 半錢

右和調シ適宜ニ舍利別^セ名ヲ加テ煉膏トシ一次ニ

服ス其症ニ隨ヒ一晝夜ニ四五次モ與フベシ此劑
的里亞加ヲ以テ腸ノ劇盛ナル運動ヲ靜止ノ其孿
急絞痛ヲ緩解シ大黃ヲ以テ鬱滯ノ粘穢汚物ヲ導
泄シ且酸敗ノ侵蝕毒ヲ驅逐ノ腸ノ淤衝ヲ防ナリ
○胃腸ノ病毒鬱滯ヲ驅除スルニ後方亦良

蜷蛄消黃散

大黃 芒消

蜷蛄石 或雜卵殼 各等分

右散劑トシ一乃ヨリ半錢マデ服ス此劑或噫氣吞
酸嘈雜惡心痞悶ヲ治シ或間歇熱暫留熱ノ初發ニ

用テ胃腸ヲ清掃シ熱毒ヲ驅除ス。或、風氣痞滯ノ諸症ハ橙皮末少許ヲ加、尤効アリ。疝痛ニハ甘消石精。舍電阿芙蓉液（固）二十滴マテ加テ速効アリ。淋疾ハ此散劑毎日三四次與テ尿道、焮熱減シ其膿漸ク清稀トナル。片ハ此散劑ニ拔爾撒謨格洋霍三四滴宛加、毎日四次用レバ治ス。其膿盡ク消スレ片尚稀液出テ荏苒タル症ハ右ノ拔爾撒謨十滴許宛飲液ニ點服シ仍治セザル者ハ十五滴若ハ二十滴モ用テ全治スベシ。但時々右散劑ヲ兼用ノ大便ヲ通利スベシ。○大黃ハ腸ヲ收固シ強壯スル性効ヲ兼ル故

ニ是ヲ服シ瀉下ノ後大便澁滯ノ快利セズ。或、居恒大便閉ヲ患ル人常ニ大黃ヲ服スレバ是ニ慣テ通利セズ。久服スルニ隨ヒ逾、便閉ヲ患フ。此症ハ患者ノ體稟ニ隨ヒ旃那葉、盧會等ヲ用ヒ。或、大黃ニ白石鹼ヲ加用レバ能、通利ス。此劑凡、遷延諸病ノ大便閉ヲ患テ解凝劑ヲ處スベキ症ニ甚ダ適應ス。又腹内諸藏ニ粘稠液及膠粘汚物壅塞メ發スル諸症ニ極テ驗アリ。又右ノ諸病ニ於テ患者刺戟ノ藥劑ニ堪フベキ症ハ左ノ數方皆的効アリ

藥鹼錠

「ガホ・ヤラピヌス」
「セーフ・ハンヤラ」
「バ蘭」

藥刺巴ハルバ華爾斯スバ或藥刺ハルバ白石鹼名各二弓

燒酒 二十度者分量適宜 溶化スルヲ度トス

右二味ニ燒酒ヲ加ヘ煖處ニ置テ溶化シ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ熬乾シ丸藥トナル可ニ至リ。十日許宛服スル。一日三次

解凝藥鹼丸

大黃 勿擲祭亞者 各一錢半

藥鹼錠 前出 半錢

右研和シ三氏ヲ一丸トシ銀箔ヲ衣トシ三丸宛用。一日三次。但瀉下ノ多少ニ隨テ加減ス

解凝黃鹼丸

大黃 勿擲祭亞者 各一錢半

藥刺巴 半錢

右研末調和シ三氏ヲ一丸トシ三丸宛用。一日三次

○水腫ノ停水ヲ驅逐スルニ後方捷功多シ

芫黃驅水丸

大黃越幾斯劑 後出一錢 芫菁

甘草 各半刀

右細末ノ調和シ一氏ヲ一丸トシ二丸宛服スル。一日兩次。○肝藏虛衰ニ因テ膽液ノ分利虧損シ大便

閉。食消化セザル等ノ症アルハ左ノ方殊効アリ

加羅疏肝丸

大黃 十匁

加羅蔑兒カローメル 三匁或四匁

乾姜 三匁

右細末トシ調勻ノ丸藥トシ一服トス。七日ニ一服用フ。○蟲症或腸中粘液留飲。膽液鬱壅セル諸症ニ後方超羣ノ下劑トス

加羅姜黃散

大黃 六錢

加羅蔑兒カローメル 或甘汞 一錢

乾姜 半錢

右散劑トシ每服半錢。○後方亦良驗アリ

加羅荷黃丸

大黃 二錢

加羅蔑兒カローメル 半錢

薄荷丁幾劑カ 十滴

右調和シ蜜少許加テ三十丸トシ。毎日三丸。或三日毎ニ三丸宛服ス。○大黃ハ霸王鹽ヲ加テヨク疏解開達シ大便閉ヲ治ス。又體質虚弱。胃腸强健ヲ要ス此症ニ用テ一種ノ健胃劑トス。假令ハ後方ノ如シ

黃霸健胃散

大黃 五匁

霸王鹽 六匁

薄荷 少許

右散劑一服以シ用レ日二三次○小兒酸敗液ノ諸症或大便閉ヲ兼テ子其他小兒諸病ニ後方甚驗アリ

消酸解毒飲

母ハ大黃一斤五分ハ大黃一斤五分ハ麻一斤五分ハ白罌粟一斤五分ハ舍利一斤五分ハ一錢ハ三日

蒸餾水二斤ハ

右先三味細末トシ餘藥ヲ攪和シ每日一茶匙宛與レ一日四五次○傷冷毒失苟兒陪苦等ヨリ發スル齒齒痛ハ大黃ヲ嚼合テ其痛ヲ祛キ斷テ固ム

服量細末ハ一日ヨリ一錢ニ至ル桂末或肉豆蔻末ヲ加テ良○一歲ノ小兒ハ四分ヨリ十分ヲ與フ十歲マデハ十五分ヨリ一日マテ用フ○水煎泡劑浸劑ハ大黃二三錢マデ水八寸ヲ加製ス

大黃浸劑

散劑丸藥ヲ嫌フ者ハ此劑ヲ用テ良

製法

大黃一斤ハ沸湯一十六寸

右蓋閉シ浸ス一十二時ハ瀝テ滓ヲ去リ聽用ス

大黃丁幾劑

瀉下ノ良劑トス。虛冷ノ症殊ニ佳服

量一錢許適宜ノ飲液ニ點服ス

製法

大黃一斤ハ燒酒一十五度者ハ

右浸ス丁六日。滓ヲ去リ固封シ貯フ

又法 大黃剉 四錢 酒石鹽或剉 一錢

桂露六 燒酒六 蒸餾水八

右浸ス丁六日。滓ヲ去リ固封シ貯フ

又法 此方燒酒ヲ用ト 故ニ 水製丁幾劑ト名ク

大黃四 剉一 剉一 剉一

蒸餾水八

右硝子壘ニ内蓋閉シ爐邊ニ置テ浸ス丁四日。滓ヲ去

固封シ貯フ大人ハ一二匙小兒ハ一茶匙宛與フ

又法 是温煖瀉下ノ良劑トス。疝痛痞氣鬱滯腹

脹等ヲ治ス

大黃 十錢 益智 三錢

燒酒 十五度者 十勺

右硝子壘ニ内固封シ浸ス丁六日。滓ヲ去リ貯ヘ。一錢

ヨリ一勺マデ水等分ニ加用フ○胃腸虚弱。運化弛

慢ニメ風氣痞滯。食消化シ難キ症ハ幾那。乾姜。加カ密ミ

列ヲ加、浸シ用テ尤良○嘈雜懊惱。胸中燒カ如ク或

酸水ヲ吐シ心腹刺痛スル症ハ礮蓬鹽晶ヲ加用テ

速効アリ

又法 胃虚ノ諸症。飲食消化シ難ク或下利疝痛

等ニ甚ダ驗アリ頑固ノ間歇熱遷延熱等ハ幾
那ヲ兼用シ其効力ヲ補助スベシ

大黃

二弓

健質亞那

四錢

攝爾扁答或、額草

一錢

燒酒

十五度者
二比

右硝子壘ニ内浸ノ藥氣ヲ出シ滓ヲ去リ固封シ貯
一匙宛數用フ依

又法

脾病イボコシ兒レ子宮衝逆ノ諸症ニ用テ

大便壅滯ヲ通利ス○小兒冒寒傷冷毒ニ因テ

頸ニ發スル腺腫ヲ消散ス○凝體纖維ノ弛虛

緩弱ニノ粘稠液腸間膜腺ニ壅塞シ腹滿スル

等ニ大効アリ大人ハ一二匙宛用フ小兒ハ三

十滴ヨリ六十滴ニ至ル

大黃

二弓

乾葡萄

一弓

狗椽皮

甘草

各四錢

益智

二錢

葡萄酒

二比

右五味到合和シ浸ス下四日滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

土木香

越幾斯劑

二四錢

沙糖

三弓

右攪合メ溶化シ固封シ貯フ依

大黃越幾斯劑

此劑瀉下シ且強壯スル功アリ故

幾那煎ヲ用ル症ニシテ大便閉ヲ患ル者ニ適應
ス。殊ニ散劑煎劑ヲ嫌フ人ニ用フ。但シ瀉下スル
ニハ是ヲ丸藥トシ或散劑トシ或飲液ニ溶化
シ用テ尤良。服量一二匁ヨリ一錢ニ至ル強壯
藥トスルニハ十匁ヨリ二十匁ニ至ル

製法

大黃

對 一匁

沸湯

十六匁

右蓋閉シ浸ス。十二時。漉テ上清ヲ取り其滓ニ沸
湯八匁ヲ加ヘ浸ス。十二時。漉テ上清ヲ取り前ノ
液ト合シ熬乾メ錠ト爲ス

大黃舍利別

製法主治
名ニ出ツ

緩下ノ良劑ニシテ大便閉ニ用

フ小兒ハ甘味ニシテ服シ易シ。一卵匙宛與フベシ。○
大黃ハ服量少許ニシテ瀉下ナキ程ニ用レバ一種ノ
解凝藥トナリテ効驗甚々多シ。凡シ諸管纖維ノ弛屈
縱緩ノ粘液壅塞シ發スル黃疸。脾病。依剝昆埋兒。粘
液腫。鼓脹等ニ用レバ此藥ノ衝動。疏解ノ効力ヲ以
テ其弛緩セル諸管更ニ運動ヲ増發シ其壅滯セル
惡液ヲ推盪メ驅除スルナリ。然レ纖維ノ強硬牽張
ノ既ニ硬結腫トナル者ハ治シ難シ。○大黃ハ收瀰
メ胃腸ノ纖維ヲ強壯スル故ニ腸ノ運化弛弱怠慢
ノ諸症ニ用テ効アリ。但シ是ヲ強壯劑ト爲スニハ服

量甚少許用、ベシ。○腸ノ虚弱ヨリ發スル下利赤痢
ニ此藥少許宛用、テ良驗アリ假令ハ後方ノ如シ

護謨乙黃散

大黃剉 一錢半 乙百葛格安那末 半錢

右沸湯三勺ヲ加テ泡出シ。濾テ滓ヲ去、後藥ヲ加フ

亞刺比亞護謨 一錢 過爾託亞舍利別 三錢

右調和シ半時毎ニ一匙宛服ス。○大黃炮炒スレバ

瀉下ノ効減メ收固強壯ノ功多シ。故ニ病毒汚物ヲ

疏滌メ後下利止マズ。或腸虚弱ニメ下利スル症ニ與

テ腸ヲ強壯シ良驗ヲ稱ス。又赤痢白帶下等ニ効多

シ。此症後方殊効アリ

薄荷雙黃散

大黃 各半錢 炮大黃

薄荷油 三滴

右研末メ散劑ニ服トシ。飲液ニテ送下ス。其症ニ隨

阿芙蓉或阿芙蓉液少許ヲ加テ良。○凡、纖維弛弱ノ

愈難キ潰瘍ニ大黃末ヲ摻メ排膿生肉ノ功ヲ稱ス

叔福 叔華

土木香オホグルマ 俗稱 藥舖ニ官園木香ト呼フ

土木香オホグルマ 俗稱 藥舖ニ官園木香ト呼フ

試効根ヲ藥用トス性温苦味。香氣アリ健胃ノ良藥トス或云肺胃ニ効アル藥トス又蒸氣ヲ發シ小便ヲ利シ粘液ヲ稀釋シ汚穢惡液ヲ分利ノ排泄ス○胃虛烹釀ノ價乏ヲ復シ。風氣痞滯ノ諸症。疝痛腰痛ヲ治シ。脾病依剥昆蛭兒ヲ療シ。經閉ヲ通シ。蟲ヲ殺ス○効嗽痰喘等ノ嗽衝ナキ胸痛ヲ治ス○肺ノ粘液ヲ淨刷ス。故ニ傷冷毒ヨリ發スル痰効喘急等ニ良但患者虛弱粘液質ニノ粘液。肺ニ壅積スル症ニ尤驗アリ。此症ハ安質沒扭劑湧痰或龍腦ヲ加ヘ或其症ニ隨ヒ亞鉛華發汗或阿芙蓉ヲ加用テ殊効アリ○効嗽。胃

中ノ粘液鬱滯ヲ兼ル症ハ此藥ニ芒消或硃砂少許加用テ多ク驗アリ○喘急ノ症。肺ニ膠痰壅塞スルハ此根ノ越幾斯劑ヲ安質沒扭酒圖ニ溶化シ用テ大効アリ或左ノ丸藥モ亦良

越幾救喘丸

土木香越幾斯 甘草膏

硫黃華各一錢 菖蒲根半錢

越幾安質沒尼亞 圖 二錢

右研和シ二瓜ヲ一丸トシ甘草末ヲ衣トス。時々八丸或十丸宛服ス胸脇嗽衝。肺嗽衝ノ初發ニ此劑ヲ

與レバ其刺戟ニ堪ヌメ害アリ。然レ乍漸夕日ヲ經テ
虛憊ノ諸症ヲ見ヌニ至テハ此劑ノ痰ヲ豁シ惡液
ヲ分排スル効力ニ因テ偉効アリ○傷冷熱ニ因テ
痰效ヲ發シ連綿ノ治セザル症亦此劑ニテ多ク治
ス○纖維諸管弛緩ノ血中粘液過多壅滯ヨリ來ル
經閉ニ此根甚ダ驗アリ○此藥ハ血液ヲ淨除シ且
利尿ノ効アリテ水腫ヲ治ス。但レ諸管纖維緩弱ニ
粘液壅滯ヨリ發スル虛症ノ水腫ニ多ク的當ス○
水銀吐涎法ヲ施ノ水銀體中ニ滯著シ。各處ニ凝聚
ノ惡症ヲ發スル者ハ此根ヲ以テ一種ノ解毒藥ト

ス。其方此根二弓ニ茴香或云茴香根四錢ヲ加ヘ葡萄酒
或水二比ニ煮テ三分一ヲ減シ滓ヲ去リ數日服ス
レバ水銀漸次ニ諸竅ヨリ排泄ノ諸惡症解散ス○
服量細末トシ一二刀宛服ス。或對症ノ劑ニ加ヘ水
煎泡劑トシ或水葡萄酒麥酒等ニ浸シ用フ
土木香越幾斯劑製法名健質亞那前ニ舉ル諸病ニ
常用テ良効ヲ稱ス。服量一錢ヨリ五錢マデ對症ノ劑
加用フ

土木香丁幾劑製法名健質亞那同シ
鼠透衝動ノ藥ヲ與
ベキ諸病ハ此劑尤効アリ

土木香註別製法大黃合此劑。殊ニ前舉ノ胸肺諸症ニ用フ又甘味アル故ニ小兒服シ易シ㊦㊧㊨㊩

菖蒲

石菖泥菖同効
アロマチカ羅
アコリス又「カル」ス。
エルリケンデリス蘭

試効根ヲ藥用トス○香竄衝動シ。温煖強壯ニス。殊ニ健胃驅風ノ偉効アリ○諸遷延病ノ患者精力罷弱。胃虛ノ諸症。飲食消化シ難ク。痞氣腹痛頭旋ヲ治シ。虺蟲ヲ殺ス○内藏虛弱ヨリ發スル風氣痞滿。疝痛等ノ諸症ハ此根ヲ藥酒ニ加服シ或糖薑土木香根等ヲ加煉膏トシ與ヘ健胃ノ効ヲ以テ良驗ヲ奏スチリヤン

○此藥ハ劇病緩病共ニ虛弱ニ屬スル諸症ヲ治スル故ニ傷冷毒痛。痛風。及膽液腐敗ヲ兼ル熱病等ノ精力虛罷セル症ニ効アリ○凡熱病ノ患者虛憊ノ熾熱甚キ症。即傷冷毒熱。胃腸熱等ノ虛憊ヲ兼ル症ニ用テ効多シ○諸替留熱。往來熱ニ虛憊ノ諸症ヲ發シ若ハ血液溶解腐敗ノ候ヲ見ス片ハ必ス壯神衝動劑。防腐劑。並ニ此藥ヲ的當トス○肺炊衝ノ患者。虛罷ノ傳染熱ノ如ク膽液腐敗ノ諸症ヲ兼ル者ハ此藥ヲ用テ殊効アリ。其症ニ隨ヒ阿芙蓉。龍腦。亞的兒等ヲ兼用ノ驗多シ○或云。間歇熱ノ患者。精力

虛乏ノ病毒ヲ排除スルノ能ハズ且、虛罷ノ症ヲ見
 ス者ハ此藥効アルヲ幾那ニ勝リ或、幾那ノ功ナキ
 症モ是ヲ用テ治スルヲアリ又頑固ノ三日熱ハ此
 藥ニ阿芙蓉龍腦ヲ加用テ大効ヲ得ルヲアリ然レ
 間歇熱ノ熾衝ヲ夾ム症ハ此藥害アリ宜ク刺絡下
 劑等ヲ施メ治スベシ○失苟兒陪苦ハ此根末二刀
 ヲ一服トシ日六服或ハ服宛用ヒ專ラ良性ノ蔬菜類
 ヲ食料トシ與ニ由テ全功ヲ得ルヲ甚多シ○此藥
 ハ肝脾壅塞疼痛ヲ疏散シ虛弱ノ經閉ヲ通シ又經
 久ノ潰瘍腐骨疽等ニ用テ驗アリ○服量細末ハ半

錢ヨリ一錢マデ舍利別或葡萄酒ニ和シ一服トス
 或、其症ニ隨ヒ龍腦阿芙蓉ヲ加用フ○浸劑トシ或、
 泡劑トシ或、丁幾劑越幾斯劑蒸餾油トシ用テ右ノ
 諸病ニ良驗ヲ稱ス

菖蒲浸劑

製法 菖蒲根 剉一ヲ或、
 水一匕

右硝子燻ニ内浸ノ藥氣ヲ出シ滓ヲ去リ六時或十
 二時ニ服ス○或、此藥ニ揮發衝動藥ヲ加テ殊ニ峻
 効ヲ稱ス假令ハ後方ノ如シ十八日ニ至ルニ至

壯神菖蒲飲

菖蒲根 一多半

右水適宜ニ加、煮テ滓ヲ去リ十八ヲ取、後藥ヲ加

橙皮舍利別名 一多半

龍腦漿 龍腦一二名 研和スル者 十二名 亞刺比亞名 護漿

舍電阿芙蓉液名 十八滴

右和勻シ半時毎ニ一小茶碗ヲ服シ十二時ニ一劑

ヲ用フ

菖蒲丁幾劑

製法 菖蒲根 一多 燒酒 八多

右硝子壘ニ内浸ス₇八日。滓ヲ去リ固封シ貯ヘ六

十滴ヨリ百滴マデ適宜ノ飲液ニ點服ス

菖蒲越幾斯劑 製法 健質亞那越幾斯劑名 ト同シ此

劑ニ菖蒲蒸餾油ヲ合和シ用テ峻効アリ

菖蒲蒸餾油 製法 薄荷油名 條蒸餾油製法括套ニ記

ス如シ右諸製劑ニ此油數滴ヲ加用テ尤効アリ

異地ニ旅行メ水毒ヲ解シ腹痛下利等ヲ防グニ

菖蒲根ヲ水ニ浸シ服メ効アリ若水清潔ナラザル

片ハ此根ヲ其水ニ投シ醋少許加靜定メ其上清ヲ

取り用ベシ 依福叔 伍叔

白芥子 「シナピ」 羅「モステルト」又「モスタールト」蘭

試効 温煖衝動開達シ。粘液ヲ稀釋シ。小便ヲ利シ。月經ヲ通ス。○胃ヲ健運シ。飲食ヲ進メ。消化ヲ扶ク。○胃腸ノ運化。怠慢虚衰セルヲ醒起健運シ。大便ヲ順利ス。○粘液腫。萎黃病。處女病ニ用テ。胃腸ヲ開利シ。粘液ヲ分排シ。良驗ヲ稱ス。○疝不遂及昏睡病ニ内服シ。衝動健運メ。粘液ヲ排泄シ。卒仆ニ噫藥トシ。施メ。省復セシメ。舌疝言語蹇澁ニ含漱劑トメ。殊効アリ。○神思鬱憂病。脾病ニ用テ。良驗ヲ奏ス。○諸痰欬及喘息ヲ治シ。殊ニ胃欬ニ効多シ。○水腫ニ用テ。粘

稠液ヲ疏解シ。小便ヲ利シ。汗ヲ發ス。○胃腸虚衰メ。諸液健輸消化セザルヨリ。水腫若ハ黃疸ヲ發スル者多シ。此症ハ健胃解凝ノ劑ニ白芥子ヲ加用テ。的當トス。左ノ方尤効多シ。

芥薑健胃丸

健質亞那 各一錢

乾姜 盧會寶 各半錢

鐵屑 極細末 鹿角鹽 各半錢

金硫黃 各十五瓦 亞爾鮮越幾斯劑 或野艾蒿葉德

右各細末ノ合和シ。亞爾鮮越幾斯劑ヲ取リ製ス。其

法名蒲公英越ヲ適宜ニ加テ捏和シ二瓜ヲ一丸ト
 幾斯劑ト同シ
 シ朝夕十九丸或十二丸宛服ス○春ノ間歇熱ハ白芥
 子ヲ用テ効多シ。秋發頑固ノ間歇熱ハ幾那ヲ加驅
 熱ノ効ヲ扶ルニ非レバ功驗著實ナラズ○刺戟衝
 動ヲ要セザル症ハ此子ヲ搗碎ク一ナクノ胃虛ノ
 諸症ニ毎日數匙ヲ服ノ功アリ然レ通例此子ヲ搗
 碎キ散劑。泡劑或煎劑ニ加服ノ良。胃腸ノ感觸鈍ニ
 ノ粘液多ク。刺戟衝動スベキ症ハ是ニ由テ其功速
 ナリ○失苟兒シタウ陪苦ボイクニ用テ酸敗液ヲ消シ海鹽ノ酷
 厲毒ヲ抑制ス○咽喉腫ニ漱藥トシヨク其腫ヲ消

散ス○外敷ノ腫瘍ヲ消シ膿ヲ熟ス

芥子泥

製法主治 麻痺不遂或腕股痛ニ貼ノ其毒ヲ

外泄シ或痛風毒内攻ノ諸症及熱病ノ發狂譫妄ハ
 腓及蹠ニ貼ノ頭腦潛攻病毒ヲ下部ニ引降シ煩躁
 ヲ靜止ス或頑癩類總テ惡厲ノ皮膚病ニ貼ノ能酷
 厲毒ヲ皮表ニ引泄シ捷効ヲ奏ス 依 伍 物 散

半夏

アリウムトリホリウム羅 テ
 リーブラーダヘカルフスフ ト 蘭

榕按ニアリウムハ林娜私 名 第二十經第七緯ニ收
 ル一宗類ニメ其屬スル所ノ種類二十二名ヲ舉

グ。後進ノ名哲又是ニ六種ヲ加テ二十八名トス。
 其第一種ハ南星。第四種ハ半夏三葉アリ。第六種ハ青芋サトイモ。第十種ハムサシアブ三。第十二種ハ藥用ノ本種ニノ莖ニ蛇皮斑アリ。斑杖莖ノ如クニノ葉。斑杖ト異ナリ。和産未詳ナラス。第十五種ハ海芋。第十七種ハサゼンサウナリ。右件所舉數種中半夏ノ効最本種ニ近モ。因テ今是ヲ掲テ本條トス。

試効 乾根ヲ藥用トス或云莖葉亦効アリ。生根ハ苛發ニノ口舌ヲ刺戟ス。是其粘液中ニ精微ノ酷厲液ヲ含カ故ナリ。但此根水煎泡劑或燒酒葡萄酒等ニ浸スト雖モ

其効力ヲ含ル精微刺戟ノ質ハ融解シ難シ。故ニ其渣ヲ去テ上清液ノニ用レバ効微ナシ。然バ乾根ヲ細末トシ蜜或砂糖舍利別等ニ研合シ或對症ノ煉膏。乳劑其他粘滑ノ劑ニ攪和シ其刺戟ノ味ヲ包攝シ用ルヲ佳トス。○疏解。稀釋。利尿。發汗ノ効アリ。胃中粘稠敗汚ノ惡液ヲ驅除シ。食機虧損。其他胃腸ノ粘液壅滯。汚液鬱積ノ諸症ヲ治ス。○胸中粘痰壅塞。欬嗽痰喘其他頑固ノ胸病ニ良効アリ。○痰欬喘息ニ此根細末ニ砂糖ヲ研和メ服シ或乾葡萄ト蜜ヲ和シ水ヲ加。煮テ攪混シ服メヨク粘痰ヲ疏豁メ略

出シ治ス○肺癆勞效ニ是ヲ乳汁ニ煮テ用レバ吐
膿ヲ進メ肺ヲ淨刷ス○痛風傷冷毒痛其他潛結沈
滯ノ諸痛ヲ治ス○内藏壅塞ヲ開達シ月經ヲ通シ
粘液病。萎黃病。處女病。黃疸。水腫。間歇熱。依剥昆垤兒。
神思鬱憂病。失苟兒陪苦ニ良驗ヲ稱ス○胃ノ病患
ヨリ發スル遷延頑固ノ頭痛ニ此藥甚ダ驗アリ。此
症ハ舌苔アリ殊ニ舌本ニ多シ。後方尤良効アリ

半夏健胃散

半夏 二錢

菖蒲根

地榆

桂

各一錢

剥篤亞斯 一刃

右散劑トシ硝子壘ニ固封シ貯ヘ十匁ヨリ一錢マ
デ飲液ニ點服スル下日三四次○間歇熱ハ左ノ方
良驗多シ

半夏黃石散

半夏

孕礬酒石

或霸王鹽 各十匁

大黃 五匁

右散劑トシ一服トス。熱ナキ時。每半時。一服宛用フ
○服量細末トシ五匁ヨリ十二匁或半錢マデ適宜
ノ飲液ニ和シ用下日數次或云燒酒ニ和シ服メ發

汗ス○此藥外敷ノ腫瘍ヲ消散シ或膿熟シ潰瘍ノ膿ヲ排ヒ腐穢ヲ淨除ス即此末ヲ摻シ或水ニ溶シ洗藥トス又面部汚斑小胞赤疹ヲ消シ肌膚ヲ美澤ニス剥^{ハツ}鴛亞斯^{アス}少許ヲ加ヘ或酒石液^名一二滴ヲ加テ殊ニ良或此根ヲ極細末トシ蕃薇露ニ溶ノ粧顔水トス^依^叔

蜀羊泉

^ヒヨドリゼウゴ^{俗稱}テウルカマ^ラ羅^式

甘。生乾共ニ用フ生鮮ノ者ヲ一頓ニ過服スレバ惡^{試効}蔓ヲ藥用トス春秋ニ採テ氣味尤厚シ味苦微

心嘔吐ヲ起シ或頭眩暈顫動痙攣ノ諸症ヲ發シ或眼焮腫狂躁言語蹇澁麻痺搐掣ヲ發ス多血及諸脉强硬牽張ノ人焮衝性ノ諸症ハ總テ害アリ○温煖解凝稀釋發汗利尿通經微瀉ノ効アリ又酷厲毒ヲ皮表ニ驅發スル峻力アルニ由テ排毒淨穢清血ノ一要藥トス○發汗利尿微瀉ノ効ニ因テ肝脾壅塞ヲ疏解シ黃疸水腫ニ峻効アリ○稀釋發汗ノ効ニ因テ冒寒ヨリ發スル胸病欬嗽喘急及胸膈等ニ殊効アリ和胸煎劑ニ加用フ○肺焮衝胸脇焮衝等ノ初發ハ此藥ヲ與テ害アリ焮衝漸ク退キ病毒自

痰唾及小便等ヨリ排泄スル時。是ヲ用テ偉効ヲ奏ス。但傷冷毒熱ニ於テ肺ノ諸症ヲ發シ。虛憊ノ候ヲ見ス者ハ初ヨリ此藥ヲ用テ的當ス。○此藥能產後惡露ヲ通ス。○痛風傷冷毒痛。脚痛。歷節痛。或腺腫瘰癧或疥癬類。經久頑固ノ皮膚病ハ是ヲ用テ其毒ヲ疏解排泄ノ大効ヲ奏ス。此藥每日一勺ヲ取リ沸湯十二勺ニ泡出メ服シ。漸ク其量ヲ加テ惡心ヲ發スルニ至レベシ。是皆粘液壅塞ヲ疏解稀釋シ汗ヲ發シ酷厲液ヲ皮表ニ宣發スルニ因ル。○或微毒諸症ニ是ヲ多量久服メ治驗ヲ稱ス。是專ラ微毒ヲ療スル

藥ニ非レト總テ鬱毒惡液ヲ驅逐シ且發汗利尿ノ効力ニ因テ其皮表ニ發見セル微毒及疥癬ヲ兼ル等ハ此藥ヲ投メ卓偉ノ治驗ヲ致スナリ。○微毒ノ白帶下ハ土茯苓等ノ微毒劑ニ此藥ヲ加水煎シ用テ殊効アリ。但微毒ナキ白帶下モ亦惡性頑固ノ症多シ。是皮表ニ宣越スベキ酷厲ノ瘡毒内鬱セル症多キ故ニ此藥ヲ與テ其毒ヲ驅除メ殊効ヲ取ルナリ。○經久頑固ノ淋疾水銃藥ヲ尿道ニ施セテ治ガル症ニ此藥ヲ多服メ諸液ノ分利排泄ヲ進輸シ治スル者多シ。○痔痛ハ出血ノ有無ヲ論セズ此藥ノ細

末ニ硫黄ヲ加用テ其毒ヲ排泄メ驗多シ。殊ニ痛風毒。傷冷毒等ノ酷厲液ヲ兼子或痛淋疾等ヲ夾ム症ハ尤良。○服量。乾莖ハ一二錢用テ瞑眩セズ。生莖ハ半錢ヲ取水十六ろニ煮テ半ヲ減シ分テ六服トシ。毎日ノ服量トス。或嫩莖梢ヲ取り煎服シ。或葉ノ絞汁ヲ服メ瀉下藥トス。或根亦用テ開達清血ノ効ヲ稱ス。○凡此藥ヲ用ベキ諸病ニ後方効多シ。

排毒羊泉湯

蜀羊泉 四錢

右磁罐ニ内水二比ヲ加蓋閉シ文火ニ煮テ半ヲ減

シ滓ヲ去リ其液半盞ニ乳汁少許加一時毎ニ服ス

蜀羊泉越幾斯劑

蔓ヲ採リ製ス其法固健

前說諸病

ニ用テ良。或對症ノ劑ニ加用メ但煎熬シ製スルニ由テ効力減シ瞑眩セズ。故ニ他藥ニ合和スルニハ一二錢モ用ベシ。通例五匁ヨリ十匁マテ芳香ノ露水ニ溶化シ日數次用フ。○前說ノ諸病ヲ治シ且痰ヲ豁メ略易カラシムル貴左方甚驗アリ。

羊泉硫荷飲

蜀羊泉越幾斯劑

二ろ半

金硫黃

五匁

薄荷水

六ろ

過爾託亞舍利別

一ろ

右研和シ用ニ臨テヨク振蕩シ一時毎ニ一匙宛與
○或丸藥トシ右ノ症ニ用モ良。即後方大如シハ

安質羊泉丸

蜀羊泉 細末 蜀羊泉越幾斯劑

安質沒扭謨 細末 各半錢

右研和シ二瓦ヲ一丸トシ十五丸ヨリ三十丸マテ
服スル下日三四次 ○蜀羊泉ノ實ヲ取、搗絞テ汁ヲ
取、雨水ヲ等分ニ和シ眼ニ點ノ眼ノ斑翳ヲ消シ或
婦人、面部ニ擦テ肌膚ヲ美澤ニシ汚斑小皰ヲ祛ク
○蜀羊泉ノ葉ヲ取り琶布トシ乳房腫或打撲腫ニ

貼ノ腫痛ヲ消散ス （依）（福）

山牛蒡 又「グマボク」チ俗稱 ○普山、藤林氏是ヲ充ツ
ハ「グマ」タル「ダナ」又「アルカ」カ、ム、ラ、パ、羅、キ、リ、セ、ニ、蘭

○榕按ニ山牛蒡ハ牛蒡ノ一種ニメ花葉亦是ニ
類ス。商陸ノ「ヤマゴバウ」ト異ナリ。民間此葉ヲ採
テ發火ヲ製ス

試効 根ヲ藥用トス。輕疏ニメ水棉様。味微辛ニメ甘

ヲ帶ブ香氣微ナリ ○汗ヲ發シ小便ヲ利シ血液ヲ
稀釋シ血中惡液ヲ排泄ス ○冒寒傷冷毒痛。痛風。脚
痛並ニ微毒諸症。頑癬。瘡瘍類。頑滯ノ皮膚病。總テ發

汗ノ惡液ヲ驅泄シ治スベキ諸病ニ効アルハ朴窟ホツク福鳥篤ホツト土茯苓等ノ如シ。水煎シ多服ノ害ナク起熱ノ妨ナシ○右ノ諸病ニ多ク後方ヲ用フ

牛蒡排毒煎

山牛蒡根

二弓

舍利別

一弓

右山牛蒡根ニ水一比半ヲ加、煮テ一比ヲ取、滓ヲ去、舍利別ヲ攪和シ服ス。或此根ヲ土茯苓、杜松木等ニ加、水煎シ多服スルモ良○此根ニ土木香、乾葡萄ヲ加、水煎シ適宜ニ蜜ヲ攪和シ、嗽ニ用テ効アリ○山牛蒡子モ亦驅發利水ノ効ヲ稱ス

福叔華
淑依

金盞花

カレンデュラ 羅

ゴウドブルム 蘭

試効花及葉ヲ用フ○輕キ發汗藥トシ汗ヲ發シ小便ヲ利シ、疏解開達ノ冒寒傷冷ノ酷厲液ヲ驅發シ、嗽、頭痛、傷冷、毒痛等ヲ解散ス○風疹、癢、赤皰等ヲ排泄シ、疫毒、惡氣ヲ驅散ス○水煎或泡劑トシ服ス○喘急ニ乾花ノ末一錢、適宜ニ沙糖ヲ和シ服メ良効ヲ稱ス○花ノ露水ヲ、焮腫、眼ノ洗藥トシ施メ、焮赤腫痛ヲ消散ス

依叔
淑

董菜

スミレ和名 ヒヨラオドラタ羅
空ルリケンデヒヨールチイ蘭

○榕按ニ長葉圓葉アリ花色亦種々アリ香氣アルヲ擇ニ用ベシ銷鍊術ノ諸物質ヲ試ル此花ノ

舍利別ハ其最深碧色ナルヲ用ベシ

試効花葉共ニ藥用トス。或云葉ハ微吐下 ○酷厲液

ヲ緩和シ滋潤清爽シ汚液ヲ淨刷ス ○冒寒傷冷毒

痛。咽喉焮痛。欬嗽喘息。胸脇痛等ヲ清解ス ○瘞癩ノ

運動ヲ降鎮シ頭目ヲ清利シ頭痛不寐搖掣ヲ治ス

○末トシ砂糖或白蜜ニ研和シ服シ或泡劑トシ用

董菜舍利別 製法主治 名ニ出ツ前說ノ諸症ニ尤効ヲ稱シ又

粘液。膽液。過多ノ諸症及。癩急痛欬喘急ヲ治ス咽
喉口中ノ焮痛潰爛ハ漱藥トシ緩和止痛淨汚ノ殊
効ヲ稱ス 依叔物

蘆根

ヨシノ子俗稱 チリチキムレペン ス又ガラ
ミヌス又ガラメンカニヌム羅 ホンドスカ
ラス又カラスタルトル蘭

生根ハ白色。乾ケバ黃色ヲ帶フ香臭ナシ味甘ヲ帶

乾ケバ味淡沙糖様ノ質アリ。生根ヲ越幾斯劑トシ

是ヲ知レベシ舊根ハ輕虛硬脆枯敗ノ藥用ニ堪ヘズ。

宜ク新生柔潤重實ナルヲ分採ルベシ

試効 清涼。淨汚。清血。開達。利尿。ノ効ヲ稱シ。酷厲液ヲ
 和解シ。粘稠液ヲ稀釋シ。微收斂シ。凝結ヲ疏解ス。○
 解凝ノ良藥トス。内藏壅塞塊腫ヲ疏解ス。○肝脾腎
 膀胱等ノ壅塞ヲ開通ス。○肝壅塞結腫。黃疸。脾病。依
 剥昆堙兒ニ尤驗アリ。又膽液ノ凝石ヲ溶解ス。故ニ
 發歇アル黃疸ニ殊効アリ。○内藏壅塞ヲ兼ル羸瘦
 病ニ用テ。津潤滋養シ。酷厲液ヲ緩和ス。但下利アル
 症ハ適應セズ。○粘液壅塞セル頑固ノ諸病ハ此根
 ヲ越幾斯劑トシ。日五六ヲ宛用テ良。○此根解凝ノ
 効アルヲ以テ。稍衝動ス。然レ熱病毒ノ刺戟衝動ヲ

抑制シ。脉管纖維ノ充張力ヲ減損スベキ諸症。及熱
 病ノ稍燉衝ニ傾ク症ニ甚ダ効アリ。故ニ胃腸虛罷
 ノ下利シ易キ等ノ症ハ的當セズ。○間歇熱ニ用テ
 粘液ヲ稀釋シ。壅塞ヲ疏開シ。小便ヲ利シ。病毒ヲ驅
 散ス。○間歇熱等ノ内藏壅塞ヲ兼テ險重ノ症アル
 ニ用テ尤良。○胸肺咽喉ノ諸症ニ用テ緩和。疏解。清
 涼ノ良効ヲ稱ス。○遷延病ノ酷厲毒アリテ刺戟ス
 ル症。假令ハ痛風。流走痛。傷冷痛。及頑滯ノ瘡腫。疥癬
 類。或粘稠液壅塞ヨリ發スル黃疸等ハ此根ヲ煎劑
 ニ加。長服ノ殊効アリ。假令ハ後方ノ如シ

排毒蘆根煎

蘆根

山牛蒡根

各六分

右水適宜ニ加、煮テ藥汁六十分ヲ取り後藥ヲ加フ

接骨木傑列 名 三石 孕礬酒石 或、霸王鹽 四錢

右攪和シ適意ニ飲服ス。大便閉アル者ハ瀉下藥ヲ

加ベシ。○此根。通例水煎シ服ス。大抵其症ニ隨ヒ四

錢ヨリ二分マデ水適宜ニ加、煎服ス或、對症ノ煎劑

ニ加、服ス或、越幾斯劑トシ四錢ヨリ一分マデ用フ。

頑滯ノ病ハ其量ヲ加へ數週若ハ數月續服スベシ

蘆根越幾斯劑

生根ヲ採リ製ス其法 名 健質亞那越幾斯劑ト同シ。○海邊ニ採ル者ハ潮

水ヲ含テ鹹キ故ニヨク洗淨ノ製スベシ。或、春月生

但、潮氣ナキ原野山地ニ採ルヲ尤、佳トス。根一比ヲ取り搗絞レバ白汁五分出ツ是ヲ煎熬メ

蜜ノ稠ト爲ス此即、軟越幾斯劑ナリ或、乾根ヲ以テ

製ス 乾根ニテ製スレ 裴福物 叔依叔 バ徽生セズト云

石長生

ハコ子グサ俗稱 アヂアンテムムベダテムム 又カピルリヘ子リス 羅アロウエンハイイル蘭

試効 葉ヲ藥用トス。○和胸豁痰ノ一藥トス。酷厲液

ヲ緩和ノ發汗シ。微尿管ヲ收縮ノ粘液ヲ分利シ痰

ヲ疏豁ノ略易カラシメ。冒寒欬嗽。喘滿。咽喉痛。傷冷

毒痛。胸痛ヲ緩解シ或、胸膿ヲ排除スル等胸肺諸症

ニ良効ヲ稱ス○或云此草汁ニ石鹼質アルヲ以テ
 内藏ニ凝聚セル膠粘液ヲ疏釋シ酷厲液ヲ淨刷メ
 咯痰及小便ニ排泄シ壅塞ヲ開通ス故ニ内藏硬結
 肝脾腸間膜ノ壅塞脾病依剥昆垓兒神思鬱憂病ヲ
 治ス○子宮衝逆心動悸搖掣ニ此藥ヲ細末トシ稀
 麥酒ニテ送下シ効アリ○此藥泡劑トシ砂糖少許
 加テ服シ或對症ノ劑ニ加煎服シ或此葉一握ニ水
 四比加徐クニ煮テ終ニ甘草少許加火ヲ下シ滓ヲ
 去リ適宜ニ服用ス○舍利別トシ用テ殊ニ和胸ノ
 良驗アリ製法名ニ出○海州骨碎補鐵脚鳳尾草又
 リバシキジノヲシシガラオニシダガ

ルノセウガ等性功
 大抵石長生ト同シ
 依叔 依僕

白芷 アンゲリカ羅 エンゲルワルト蘭

試効根ヲ藥用トス葉及子亦効アリ華爾斯質ノ液
 多クノ香氣アリ○香竄揮發衝動ノ寒粘液ノ壅塞
 ヲ開達シ揮發強壯劑ノ的當スル諸症ニ用テ温煖
 強壯開達ノ要藥トス○蒸氣及汗ヲ發シ胃ヲ健運
 シ風氣ヲ驅散シ小便及月經ヲ通ス○風疝胃痛腸
 痛子宮病經閉ニ良効アリ○和胸劑ニ加テ稀痰ヲ
 化シ粘液ヲ疏シ欬嗽ヲ治ス○露水ヲ取り製法名
 薄荷水

ト同。布片ニ浸シ傷冷毒痛。脚痛ニ貼メ疼ヲ緩解ス。眼洗藥トノ曇暗。翳膜ヲ消ス。○葉ヲ取リ蒸湯劑トシテ諸寒腫ヲ消散ス。

羌活 イムペラトリア、オストル、ム、羅、メイストル、ウトル、蘭

○按ニ羌活ハ漢産或官園出ル者ヲ用、ベシ藥舖尋常和産ノ品ハ別種ニ用ルニ堪ヘズ。○温煖強壯ノ藥トス。効用大抵白芷ノ如シ。凡寒粘液壅塞ノ諸病。總テ揮發衝動藥ノ適應スル症ニ良驗ヲ稱

ス。○蒸氣及汗ヲ發シ粘液ヲ釋キ諸排泄ノ脉管ヲ開達シ。冒寒欬嗽。寒粘液性ノ水腫。三日熱ヲ治ス。○粘液性ノ痲不遂ニ用テ粘液ヲ排泄ス。○胃虚冷ノ諸症。痞氣鬱蓄。疝痛ヲ治ス。○粘液性ノ經閉ハ此藥ヲ對症ノ劑ニ加用テ殊効ヲ稱ス。○服量細末ハ二乃至一服トス。或水煎。○傷冷毒ノ齒痛ニ水煎ノ漱藥トシ良。○蒸湯劑。或布トシ施メ硬腫ヲ消散ス。

新訂増補和蘭藥鏡卷五終

增訂和蘭藥鏡

卷五

風雲堂藏

增訂補和蘭藥鏡標目
 卷六
 幾那煎 服量
 試効括套
 間歇熱
 間歇熱。幾那經驗說
 發作前後用幾那說
 發作前後用幾那說

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷六 藥鏡

幾那煎

服量

試効括套

間歇熱

間歇熱。幾那經驗說

發作前後用幾那說

發作前後用幾那說

苦味健胃飲
 健黃丁幾劑
 經驗自第一至第七
 經驗自第八至第十一
 經驗自第十二
 至第十四

發作前後間用幾那說

間歇往來諸症

鎮痙經驗說

自第一至第八

赤痢并諸用藥附失血

焮腫眼 癩疥 蛇蟲

酸敗液 痘瘡

瘰癧 疥癬 肺癆

潰瘍 壞疽

卷六 瘰癧

增訂和蘭藥鏡目錄

新訂增補和蘭藥鏡卷六

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

幾那 日コルテクスベルヒアニ羅

○幾那ノ產地形狀種類主治名ニ載ス唯

此編其遺漏セル試効及經驗說ヲ舉グ

試効括套幾那收瀋衝動ノ諸器脉管ヲ強壯シ血液

ヲ稠厚ニシ腐敗ヲ遏メ諸脫泄ヲ止メ虛憊ヲ回復ス

然レ在一切焮衝病多血壯實ノ熱病胃腸汚物鬱滯ア

ル症ニ用レバ其焮熱稠厚ノ血液ヲ逾稠厚ニシ牽

張セル脉管ヲ益強硬ニシ血ノ運行ヲ更ニ強盛ニ

シ。病毒ノ排泄ヲ壅過スル故ニ大害アリ。○此藥ハ
 總テ虛憊ノ諸病ニ奇効ヲ奏スレモ未ダ虛極危劇
 ノ諸症ヲ發セズ。胃腸ノ運營仍此藥ヲ消化ノ健輸
 スベキ精カアル者ニ非バ功ヲ成ラズト知ルベシ
 ○大約此藥ノ良効アル病ハ神經熱。腐敗熱。腐敗性
 咽喉潰瘍。諸脫泄失血。瘰癧腺腫。壞疽。虛症。痲衝。痲攣
 搐掣。感觸過甚。諸症。處女病。蟲症。發作定期アル諸症
 ナリ。○幾那ハ散劑トシ用テ尤モ効アリ。但患者其味
 ヲ惡ム者ハ薄荷水或甘草泡劑ニ加。或蜜沙糖等ニ
 調和シ。其他適宜ノ飲液ニ和シ與ヘ。或細末一弓ヲ

沸湯若ハ冷水或葡萄酒。六弓ニ浸シ重湯ニテ藥氣
 ヲ出シ滓ヲ去用フ。或水煎。越幾斯劑。丁幾劑トシ用
 丁幾劑ハ幾那ニ含ル華爾斯ヨク溶解スル故ニ効
 多シ。幾那丁幾劑單方名ニ出。複。○泡劑。沸湯若ハ冷
 方ハ後ノ神經熱ノ條ニ出。○泡劑。水ニ浸シ蓋
 閉シ。泡。ハ煎劑ニ比スレバ其精微質蒸散セズ。但水
 煎。後方ノ如クスレバ其精微質蒸散スルナシ

幾那煎

幾那 搗碎者 一弓

蒸餾水 三十弓

右磁罐ニ内ヨク蓋閉シ煮テ十密。扭篤。條註ス。滓ヲ
 去リ靜定メ上清ヲ取り服ス。○幾那ヲ服ノ胃中ニ

重滯シ心下痞滿。食進マザル等ノ症ヲ發スル者ハ其劑一服ニ乾薑末二三瓦加ヘ或、桂末五瓦許加用ベシ。○幾那ハ瀉下ノ効ナシト雖モ體稟感觸シ易キ人ハ動スレバ胃腸ヲ觸動ノ下利スルアリ。此症ハ香竄揮發ノ藥。若ハ阿芙蓉ヲ用テ治スベシ。或云、幾那ヲ服メ下利シ若ハ嘔吐スル者ハ其劑一服ニ阿芙蓉液三四滴宛加用レバ其症止ム。

服量 通例諸病ニ用ル服量 間歇熱服量 別ニ次ニ出散劑ハ一刃ヨリ一錢ニ至ル。煎劑ハ一ろヲ水ハろニ煮テ滓ヲ去リ半時毎一匙宛服ス。冷浸劑ハ二ろマデ取テ

水若ハ葡萄酒六ろニ浸シ漚テ滓ヲ去リ服ス。

間歇熱 日發熱。間日熱。三日熱ハ幾那ヲ經驗ノ奇藥

トス然レ其病毒惡液ヲ驅除セズメ用レバ治スレ再發シ其熱頑滯メ解シ難ク或、神思沈重。胸脇苦滿。心下困重。腹肚痞脹。便秘。子宮衝逆。痙攣搐掣。遷延内伏熱。黃疸。水腫等ヲ發ス是、幾那ニテ血液ヲ稠厚ニシ諸腺細管ヲ強固シ熱毒沸騰ノ銳勢ヲ抑遏メ其發動ヲ制服スル故ニ其毒鬱勃メ再ビ沸騰シ或、潛伏内攻メ諸部ヲ損害スレバナリ然レ胃腸及血中人汚液ヲ淨除メ幾那ヲ用レバ罷弊弛弱ノ脉管

ヲ收固ノ血液ヲ稠厚トナス故ニ微邪殘毒アレハ
 發動セズ是ニ來メ生氣ノ運行旺盛ノ其刺汚ヲ諸
 竅ニ驅逐ノ治ス○患者眼中黃色ヲ帶胸脇苦滿拘
 痛心下痞鞭或按テ疼食ヲ惡之或惡心嘔噦口中苦
 舌苔アリテ燥キ頭痛スル等ハ胃中熱毒鬱滯ノ候
 ニメ吐劑ヲ的當トス大便壅滯腹肚拘攣痞鞭腸鳴
 腰痛等ノ症アルハ腸中鬱滯アル候ニメ下劑ヲ的
 當トス小便濃赤ニメ短少汗亦少キハ病毒凝結ノ
 未_レ疏解セザル候トス清涼疏解稀釋ノ劑ヲ用_レベシ
 斯ノ如ク療法ヲ施メ大抵發作七八回ニメ治セズ

或患者罷勞ノ病勢險重ニ進ニ或發作ノ諸症劇盛
 ニメ長ク醒解シ難キハ皆法ノ如ク幾那ヲ用保護
 温煖ニメ蒸氣ヲ發スレバ治ス○患者脾病及腹内
 諸器壅塞塊結シ或多血ニメ瘀血諸部ニ凝聚シ或
 痔血月經壅滯スル者ハ先刺絡ヲ施シ或下劑ヲ用
 或對症ノ解凝劑苦味解凝鹽霸王鹽孕禁酒石ノ類或大黃ニ
 刺_ト篤_ト亞_ス斯若ハ酒石葉ヲ加用テ其壅塞凝結ヲ疏解
 ノ後幾那ヲ用_レベシ以上諸藥皆名幾那ノ條患者資稟及間歇熱ノ下ニ出○畢
 竟此熱病ハ自然良能ヲ以テ體中ニ潛蟄セル病毒
 ヲ汗小便痰唾等ヨリ驅逐シ除ガ爲ニ發スル故ニ

其數回ノ發作ハ卽_チ病毒ヲ除_クノ一療法ノ如_クシ早ク
是ヲ遏止スル_{コト}勿_レレ○或_ハ吐下劑ヲ須_ズノ幾那ヲ
用ル症アリ。是ハ初_ニ發作ノ熱烈ク。脉動齊ハズ。顔色
萎_シ。大_ニ煩悶ノ數_ニ昏眩冷汗出_テ或_ハ胃疼甚ク或_ハ發
作中昏睡シ或_ハ吐下休_ズ或_ハ大便ニ血ヲ交_ヘ或_ハ大_ニ
發汗スレ_ハ熱解セズ或_ハ大_ニ熱ノ發汗スレ_ハ惡寒休
ザル者ハ大_ニ危篤トス。速_ニ幾那ヲ用_{ベシ}。否_ラザ
レバ次ノ發作ニ死シ或_ハ四五發中ニ斃ル○或_ハ患者
疲勞甚ク或_ハ老人_ノ虛人_ノ孕婦_ノ如キハ病毒盡ク除_クマ
デ疏滌スレ_バ其疲勞ニ堪_{ザル}故ニ幾那ヲ用_テ治

スベシ○此熱頑滯ノ治セズ患者虛羸ノ水腫ヲ兼_テ
或_ハ其熱治ノ後。水腫ヲ發スル者亦幾那ヲ用_テ殊効
アリ○此熱病。幾那ヲ用_テ發作休_テ後。下劑ヲ投_メ多_ク
瀉下スレ_バ其熱再發ス。其故ハ數回ノ發作ニテ病
毒自_ラ汗。小便等ヨリ解散シ又吐下清解ノ劑ニテ
漸_ニ減スレ_ハ其熱仍_チ發作スル者ハ諸管血液充張健
運セズノ些_少ノ邪毒ト雖_モ制服スル_{コト}能_{ハズ}且_チ
從_テ前發歇往來ノ運動。舊滌因循ノ餘勢ヲ挽回スル
{コト}能{ハザル}ナリ。故ニ幾那ヲ用_テ精力健旺充足ス
ル片ハ微邪アレ_ハ萌發スル_{コト}能_{ハズ}。其熱熄_然ニ

下劑ヲ投メ其健旺ノ順機ヲ摧折スレバ餘邪復虚
 二乗ノ滾動シ其熱再發ス此症淹滯セル間日熱及
 三日熱ニ多シ或云此病幾那ヲ用治ノ後速ニ下劑
 ヲ與レバ幾那ニテ稠厚ニナリタル血液復稀釋ノ
 沸騰シ其熱再發ス○胃腸病毒鬱滯アル者ハ其症
 二隨ヒ吐劑或下劑ヲ用テ淨掃スルヲ勿論ナレ
 長ク疏滌スレバ胃腸虚憊ノ消化ノ機力ヲ失ヒ飲
 食重滯ノ復敗液粘穢ヲ生シ是ニ幾那ヲ用レバ消
 化セズノ停滯シ逾虚憊ノ險重ヲ致ナリ是ヲ以テ
 間歇熱其他諸病ニ於テモ胃腸消化ノ健力ナキ症

ハ幾那ヲ用テ害アリ故ニ先苦味健胃揮發香竄ノ
 藥ヲ與テ其消化ノ力ヲ復スベシ假令ハ葛爾儒健
 質亞那珊篤里亞爾鮮等ノ越幾斯劑ヲ薄荷水ニ溶
 用ヒ其症復スルニ至テ幾那ヲ用ベシ初ハ幾那ノ
 末ヲ薄荷水其他香竄ノ露水ニ加用或攝爾扁答
 額草等香竄揮發ノ藥ヲ加用テ殊効アリ○患者舌
 苔心下苦滿痞鞭等ノ症アルニ因テ吐劑ヲ與ヘ或
 數日下劑ヲ用テ胃腸虚憊シ是ニ由テ荏苒トテ治
 セザル者多シ此症ハ右ノ如ク消化ノ力ヲ復メ幾
 那ヲ用ニ非レバ治シ難シ殊ニ頑固ノ間歇熱ハ長

增言本草藥鏡 卷六

風雲堂

下劑ヲ用テ胃腸ニ汚滯大決ト雖則全身虛衰シ持
 ニ胃罷弊スル片ハ幾那ヲ用レ其消化セズ又効驗
 ナク終ニ水腫或羸瘦病ト大引テ危險ニ至ル者ア
 リ（紐）○凡、秋ハ間歇熱治セズノ替留熱トナルハ胃
 腸熱ノ性ヲ夾ム故ニ甚解シ難シ。此症既ニ吐下劑
 ヲ用テ胃腸ヲ淨掃スレ其熱仍頑固ニ退カレ
 者ハ幾那ヲ用テ良効アリ。斯如キ險重ノ症ハ幾那
 散劑的當セズ。浸劑若ハ煎劑トシ揮發防腐ハ衝動
 藥ヲ加殊ニ龍腦ヲ加テ尤効アリ。或龍腦ヲ亞刺比
 亞（アゴム）慈（ゴム）謨（ム）漿（名）ニ研和シ幾那煎ニ加レ不能混和ス燒

酒ヲ研和スル者ハ煎劑ニ融化シ難シ○間歇熱ニ

微毒ノ諸症或疥癬ヲ兼ル者ハ幾那末ニ甘汞ヲ研

和シ用テ効アリ（其）○幾那末ニ甘汞ヲ研

○服量間歇熱ハ幾那半時毎ニ一錢宛用ス患者ヨ

ク其量ニ堪ル間ハ効アリ。是ニ堪ル者ハ効ナシ

○幾那ヲ服スルト三日ニ胃腸ニ壅滯諸症ヲ

發スル者ハ吐劑下劑或加羅蔑兒君加此下劑又與

胃腸ヲ淨刷メ後幾那ヲ用テ的効又來○間歇熱ニ

幾那ヲ用テ治スレ其再發スルト多キ故ニ治後仍

服量ヲ減メ數日用ベシ（取）物（布）羅（協）利（二）幾（限）大（用）六

間歇熱幾那經驗說古今醫家間歇熱ニ幾那ヲ用テ
 奇効ヲ稱スルニ是ヲ用的當ノ時限ヲ辨セザレバ
 服量多ク功少ク或大害ヲ致シ且久其時限的當ス
 レバ服量少クノ捷効ヲ奏シ毫モ害ヲ貽下ナシ故
 其時限ヲ知テ緊要ナリ但是二三等ナリ即其熱ノ
 發作前發作後及發作後ヨリ次ノ發作前マデノ間
 ナリ發作中ハ用テナシ大害アレバナシ右三等時
 限ニ用テ功害各異ル經驗說ヲ左ニ舉テ考證ニ備
 ①發作前幾那ヲ用テ說テ幾那未ニ發作
 先哲幾那人細未ニ錢ヲ取發作ノ時前ニ用テ治

驗ヲ稱ス然レニ數是ヲ試用ニ或嘔吐煩悶シ或熱勢
 險重ニ進ニ或變又替留熱トナリ或一旦治スレニ
 再發スル等ニテ動輒バ頑固危篤ノ病トナル者ア
 リ舍電發謨斯微旬人名ニ共ニ既ニ是ヲ講明セリ○其
 害アル所以數件アリ其一ハ凡熱病人初發及惡寒
 中ハ全軀ノ脉管纖維悉ク痙攣様ノ運動ヲ發メ攣
 急牽縮シ胃及其傍圍諸器ニ於テ殊ニ甚シ故ニ稍
 重キ間歇熱ハ發作ノ初惡心嘔噦心下苦悶嘔吐等
 ノ症アルヲ以テ知ベシ是ニ由テ胃中ノ物消化セ
 ズ又是ヲ腸ニ傳送スルヲ能ハズ故ニ其服スル藥

其消化セズノ停滯ス○其二三ハ右ノ如ク諸脉管牽縮スル故ニ血液凝泣ノ行ラズ。諸液中分利排泄殆ト廢止ス故ニ口舌乾燥煩渴引飲等ヲ發シ胃中津液殊ニ減耗ス胃ノ裏面ノ諸腺牽縮ノ然レテ幾那ノ末ヲ服スレバ是ヲ溶化スベキ津液ナキ故ニ血中ニ運輸セズノ其効力ヲ百體ニ布化スル不能ハ故ニ發作中頑然トシ胃中ニ鬱滯シ。逾其熱及攀急ヲ増發ノ發汗ヲ阻遏ス。胃ノ感觸甚キ人ハ其症殊ニ劇盛ナリ○其三八發作前ニ幾那ヲ服スレバ吐スル者アリ。即次ニ舉ニ經驗說ノ

第二 第五 第十四

ノ如シ。是胃中ニ重滯ノ大ニ其攀急ヲ増發スルト宛モ發作中ニ是ヲ與ルガ如クナレバナリ發作後。是ヲ服スレバ曾テ嘔吐スル者ヲ見ズ。乃其經驗說ヲ左ニ舉テ考據トス

第一 一婦人二十三歳重複間日熱ヲ患ルト既ニ一

月。五月三日是ヲ診シ先吐劑ヲ與テ吐スルト一回。次ニ苦味健胃飲次ニヲ與ヘ。同六日夜發作ノ一時半前ニ幾那末一錢ヲ與ヘ。半時ヲ經テ又一錢ヲ與フ。然レ其熱發作ス。翌日モ亦前法ノ如ク一錢宛三服用フ。然レ其發作ス。但前夜ニ比スレバ差輕シ。其翌

夜モ前法ノ如ク用レレ作劇ク且胸脇痛ヲ發ス。

故ニ幾那ヲ休ム一錢 胡荽子半錢 銳烈燒酒四

手 水ヲ加浸ス右先三味ヲ暫ク燒酒ニ入固封シ貯

ハ一匙宛與レ此劑諸病ニ用同六日發熱ノ

第二十一男子三十一歲重複ノ間日熱ヲ患レ三週五

月十七日是ヲ診シ刺絡ヲ施ス一回吐劑ヲ用レ二

回次テ健黃丁幾劑註スヲ用ヒ同二十日發作ノ三

時半前ヨリ半時毎ニ幾那末一錢宛與ル第三服

ニ至テ盡ク其末ヲ吐ス故ニ其量ヲ減シ半時毎ニ

半錢宛用然レ第四服後發作ス但前日ニ比スレバ

差輕シ健黃丁幾劑 大黃二弓 健質亞那四錢 攝

爾扁答一錢 銳烈燒酒二北 右調勻シ浸

加用此劑胃腸ヲ健運シ粘液汚物ノ鬱滯ヲ疏滌ス

第三一婦人二十歲間日熱ヲ患レ三週五月十八日

是ヲ診シ先吐劑ヲ與ヘ次ニ苦味健胃飲前ニヲ用

六月朔日發作ノ二時前ヨリ半時毎ニ幾那末一錢

宛用テ四服ニ至ル然レ其熱發作ス同三日發作ノ

三時前ヨリ半時毎ニ其末一錢宛用テ六服ニ至ル

然レ其熱發作シ同五日モ亦發作セリ

第四一男子三十歲日發熱ヲ患レ七日二月十二日

是ヲ診シ先吐劑及下劑ヲ用テ胃腸ヲ淨掃シ同十

六日發作ノ三時前ヨリ半時毎ニ幾那末一錢宛用
 一四服。然レ其熱發作ス。但前日ニ比スレバ差輕シ
第五 一男子二十一歳。日發熱ヲ患レ三週。三月二十
 二日はヲ診シ先ツ吐劑及下劑ヲ與テ胃腸ヲ疏滌シ。
 四月朔日。發作ノ二時半前ヨリ半時毎ニ幾那末一
 錢宛用ル一四服。然レ其熱發作シ少間シテ嘔吐ス。
 但翌日ハ發作セズ。同三日劇ク發作ス故ニ爾後其
 時ニ拘ラズ其熱盡醒ル時。數幾那ヲ用テ全治セリ
第六 一男子二十五歳。日發熱ヲ患フ。十一月二十三
 日はヲ診シ。發作ノ二時前ヨリ半時毎ニ幾那末一

錢宛用フ。然レ其熱發作シ翌日モ亦發ス。但前日ニ
 比スレバ差輕シ。故ニ其後數是ヲ用テ終ニ治ス

第七 一男子三十六歳。初間日熱ヲ患テ日發熱トナ
 ル。正月二十三日是ヲ診シ。發作ノ二時前ヨリ半時
 毎ニ幾那末一錢宛用一四服。然レ發作ス。其翌日ハ
 發熱輕クノ惡寒ナシ。因テ其後數幾那ヲ用テ終ニ
 全功ヲ收ム。昔ハ專中點賣ニ賣賣賣賣ニ全良藥
 ○發作後幾那ヲ用ル說。諸君ノ此處處ニ發熱
 幾那ハ元來速効アル藥ニ非ズ。時日ヲ經テ漸功ヲ
 成者ナリ。其故ハ是ヲ服ノ胃液ト混和シ徐々ニ溶

化ノ血中ニ運輸シ百體ノ筋脉諸管ニ周布巡灌シ
 漸々融液浸潤ノ効功ヲ成セバナリ又其收瀦ノ効
 カヲ以テ諸筋及一切凝體諸器ノ弛虛衰頹ヲ強健
 スト雖モ其首功ハ專ラ神經質ニ竄透貫徹ノ全身脉
 管質ノ運動ト觸知トヲ資補強健スト知ベシ○故
 是ヲ用テ大抵七八時ヲ經ザレバ其發作ヲ遏止ス
 ルヲ能ズ其十分功ヲ成スニハ十五時若ハ二十時ニ
 至ルベシ○通例幾那末四錢ヲ取發作後直ニ用或其
 發汗ノ終ニ用或間日アル熱ハ發作ノ二十時前ニ
 用レバ能驅熱ノ功ヲ成ス是其醒解ノ長キ間ニ幾

那ノ効力ヲ遲發スレバナリ然ズノ發作前半時ヨ
 リ二時ノ間ニ用レバ服量多シト雖モ功少キヲ前
 ノ經驗說ノ如シ故ニ幾那ヲ用ニハ次ノ發作ニ遠
 ホド逾功多ト知ベシ是經驗說ノ第五第六第七ノ
 症ハ是ヲ發作前ニ用テ効ナク次ノ發作ヲ遏止ス
 ルガ如シ或發作ヨリ次ノ發作マデノ間ニ用片ハ
 多クハ即日ノ熱ヲ解セズノ次ノ發作ヲ遏止スル
 ヲ以テ知ベシ是間歇熱ノミナラズ凡幾那ノ功ア
 ル諸病ハ是ヲ用テ兩三日ヲ經ルニ非レバ其功ヲ
 見スヲナシ神經熱腐敗熱寒壞疽胃虛飲食消化シ

難キ症 重訂内科撰要第二章 等ニ是ヲ用ルガ如シ即

發作後ニ用ル經驗說ヲ左ニ舉グ

第八一男子二十五歲間日熱ヲ患フ十四日六月六

日はヲ診シ。苦味健胃飲 前ニ 旃那葉ヲ加倍シ用

フ四弓ニノ瀉下八行翌七日夜五更ニ發作シ。八日

午中刻發汗シ。殆ト醒解スル頃幾那末一錢ヲ用ヒ

是ヨリ半時毎ニ一錢宛用テ四服ニ至ル。其後少モ

發作セズ全治セリ

第九一男子十九歲間日熱ヲ患フ二週六月十二日

是ヲ診シ。吐劑ヲ與ヘ。次ニ苦味健胃飲ニ旃那葉ヲ

加用ヒ。同十七日發作後。速ニ幾那末二錢ヲ與ヘ。一

時ヲ經テ又二錢ヲ用フ。同十九日微惡寒スルノ

爾後再發セズ

第十一婦人三十六歲間日熱ヲ患フ三週二月二十

七日是ヲ診シ。吐劑ヲ與テ吐スルヲ二回。次ニ下劑

ヲ用フ一回。三月八日發作後半時毎ニ幾那末一錢

宛用フ四服。同十日些モ發作ハ候ナシ。爾後尚再發

ヲ防カ爲ニ幾那末與テ健康ニ復ス

第十六一婦人十六歲日發熱ヲ患フ三月二十三日

是ヲ診シ。吐劑ヲ與ヘ吐スルヲ一回。次ニ大黃劑ヲ

用之瀉下之。四月二日發作後。發汗止ムニ至テ速ニ
幾那末一錢宛。半時毎ニ用テ四服。翌日惡寒ナク唯
微熱アルノ之同。四日胸脇痛ヲ發ス。因テ刺絡ノ其
痛消散シ爾後其熱再發セズ回復ス。爾後再發
○發作前後幾那ヲ用ル說。其發作前ニ幾那ヲ用テ効ナキ患者ハ發作
後。是ヲ用ト雖モ亦同ク効ナカルベシ。或發作後幾
那ヲ用テ効アル症ハ發作前ニ是ヲ與ト雖モ亦同
効アルベシト。斯ノ如ク疑議スル者ハ一人ノ患者

ニ右、兩件ノ治法ヲ施スニ非レバ是ヲ明決シ難
シ乃此疑惑ヲ氷釋センガ爲ニ又其一二ヲ試說ス
左曰舉テ考據トス

第十七 一男子三十六歲。間日熱及日發熱ヲ患テ二
月餘。十一月二十六日發作ハ二時前ヨリ半時毎ニ
幾那末一錢宛用テ四服至ル。然レ其熱發作ス因
テ翌日發作後發汗終テ幾那末一錢宛半時毎ニ用
テ三服。是レ由テ其熱再發セズ平復ス。半前七時四
第十五 一男子二十五歲。日發熱及間日熱ヲ患テ五
週。五月十一日是レ診シ。同十九日發作ハ六時半前

二幾那末二錢ヲ與へ。半時後又二錢ヲ用フ。然レ其熱發作ス。但レ以前ニ比スレバ差輕シ。同、二十六日劇ク發作ス。故ニ同、二十三日發作ノ一小時半前ヨリ四分時毎ニ幾那末二錢宛用テ四服ニ至ル。然レ其熱發作ス。因テ暫ク幾那ヲ休メ。同、二十九日發作後發汗終ル頃幾那末二錢宛四分時毎ニ用テ四服ニ至。是ヨリ其熱發作セズ回復ス。此症ハ發作前ニ幾那四錢ヲ服シ又一ヲ服メ効ナシ。故ニ數日幾那ヲ休其熱ヲ發作セシム。然ラズ又直ニ發作後幾那ヲ用テ發作歇ルハ其發作前ニ用タル幾那人功

ナリト思フヲ恐レバナリ **第十二**ノ症モ是ニ同

第十四一婦人十六歲頑固ノ日發熱ヲ患フ三月十

日はヲ診シ吐劑及下劑ヲ與テ胃腸ヲ淨掃シ同、十

五日發作後幾那末一錢半宛半時毎ニ用テ四服翌

日其熱輕ク發作ス故ニ又幾那ヲ用テ前日ノ如ク

ス然レ翌日仍輕ク發熱ス因テ數日幾那ヲ休メ同、

二十五日發作ノ二時前ヨリ半時毎ニ幾那末一錢

宛用テ三服ニ至ル然レ其熱發作ス同、二十七日亦

發作前ニ幾那末二錢宛用テ三服然レ發作メ盡ク

其幾那ヲ吐ス是ニ因テ同、二十八日發作後幾那末

一錢宛半時每ニ與テ六服ニ至ル。是ニ因テ其熱發作セズ。然レ其後數日仍微熱アル故ニ幾那ニ攝爾扁答ヲ加用テ全治セリ。此症ハ初發作後幾那ヲ用テ二日。次ニ發作前ニ用テ二日ニメ効大シ。因テ暫ク幾那ヲ休メ。復發作後。是ヲ用テ發作休ム。然レ此症甚ダ頑固ニメ微熱尚暫留スル故ニ攝爾扁答ノ加功ニ因テ終ニ全功ヲ收ルナリ。

○發作前後ノ間。幾那ヲ用ル説。發作後ヨリ次ノ發作マデノ中間ニ幾那ヲ用テ古來醫家普通ノ善法トス。然レ其効大抵發作前ニ用

ルト發作後ニ用ルトノ中間ニ在ト知ベシ。發作後。用ルニ比スレバ發作ニ近キ故ニ幾那十分ニ消化シ難ク。胃中ニ重滯メ其効力ヲ遲發スルヲ能ハズ。故ニ多クハ即日ノ熱ヲ制伏セズメ次ノ發作ヲ遏止スルナリ。

間歇往來諸症凡熱病ノ毒體中ニ潛伏メ發スル病多クハ時日ヲ定テ發シ或初欠伸メ頭目鬱重或微惡寒シ終ニ發汗メ解シ發作ノ時通スル小便溼アリテ洩器ニ沈ム粉ノ如シ。或熱退キ減スルヲ多クメ幾ト間歇アル如キ症。或微惡寒アリテ發熱シ

時日ヲ定テ發シ荏苒トノ治セザル症ハ皆幾那良
 効アリ○一婦人隔日ニ眼焮赤劇痛ス一患者眼焮
 痛時ヲ定テ發ス皆幾那ヲ用テ治ス○一小兒隔日
 ニ劇キ衄血ヲ發ス一患者隔日ニ劇キ乾效ヲ發シ
 昏睡ノ發汗シ解ス一患者隔日ニ右脇疼痛ス皆幾
 那ヲ用テ治ス○毎日時ヲ定テ發スル齒痛其他斯
 ノ如キ諸症下劑ヲ用テ治セザル者或毎年同シ時
 候ニ發スル病ハ皆幾那ヲ用テ治驗多シ
 羅布物 斯物
 鎮痙經驗說 幾那ハ鎮痙ノ一藥トス痙攣擗掣ノ諸
 病ニ試用セル經驗說ヲ左ニ記ス

第一 一男子十八歲驚駭ニ因テ癩ヲ發シ淹滯ノ治

セザルヲ八年又二年以前ヨリ癡駭ノ症ヲ兼チツ子毎ニ

睡中ニ發シ傍人其頭ヲ擡アグ漸ク起坐セシムレバ

間醒解ス然レ患者是ヲ知ルナシ此症幾那ヲ用ルテ

一月許ニメ劇症大ニ減シ爾後唯罕ニ輕ク發動ス

ルノミ

第二 一男子二十一歲癩ヲ患ル二年幾那ニ纈草ヲ

加用ルテ十日ニメ諸症大ニ輕快ヲ得タリ

第三 一婦人二十四歲五月以前勞動メ體大ニ熱シ

又邊ニ冷氣ヲ被リ爾後上腹兩側疼ニ其後腹筋數

牽引ノ呃逆ヲ發シ。又下顎掣動ス。諸症發止時アリ。又發作中ハ脉駛數ニノ算ヘ難シ。稍神思ヲ擾動スレバ乍チ發作ス。但月經調順ナリ。此症麝香十瓦宛用_レ一日三次或加_テ十五瓦宛用_レ十六日。然_レ尺寸効ナク脉狀及肢體ノ冷暖少_シモ變動ナシ。又子宮衝逆ヲ兼發ス。因_テ幾那ニ益智及撒兒末爾扶斯(名)各少許ヲ加_テ散劑トシ用_レ三週ニメ全愈セリ。

第四 一婦人十八歲熱病ヲ患_テ後子宮衝逆ヲ發シ淹滯ノ治セザル_ト數週終ニ幾那ヲ服_メ回復ス。

第五 一婦人二十四歲生稟壯實四年以前左肋ヲ打

撲シ以來其部疼痛脇下苦滿困重。腹内風氣痞脹及子宮衝逆ヲ兼子腹内癥塊アリ。又三月以來欬嗽心下疼。痞氣脹悶殊ニ甚シ。月經ノ多少遲速定ラズ。又七日以來頭痛及劇キ呃逆ヲ發シ。心脇下疼殊ニ甚シク呃逆休時ト雖モ其疼止_リナシ脉初ハ差數ナレ尺其後平常ヨリハ遲緩ナリ此症先_ニ呃逆ヲ治セ_ンガ爲ニ麝香龍腦阿魏阿芙蓉纈草等ヲ内服セ_シメ揮發精的里亞加鎮痛膏等ヲ外敷シ。七週ヲ經_レ尺寸効ナシ。次_テ幾那ヲ用_レ五日亦微効ヲ得_ズ。終ニ刺絡ノ瀉血スル_ト九多。其血質平常ノ如シ是ニ

由テ呃逆止之諸症寛解シ五六日ヲ經テ回復ス

第六 一男子十八歳舞蹈病癩狂ノ一種重訂内科撰要癩癲拵拵篇第四百十三章出ヲ患テ既ニ三週乃、纈草根末半錢或一錢宛用
 一日四次五日連用ノ拵拵ノ諸症寛解シ步履穩靜
 言語分明飲食嚥下亦平常ノ如シ但、睡中拵拵休サ
 ルニ因テ仍是ヲ用テ數日拵拵筋惕動等大抵減
 スレ凡全治セズ終ニ幾那ヲ用テ平復ス

第七 一女子十五歳冒寒及驚駭ニ因テ舞蹈病ニ罹
 ルテ既ニ十四日纈草根末一錢宛用一日四次四日
 連服メ効ナシ終ニ幾那ヲ用テ全治セリ

第八 一少年十四歳卒然トノ昏睡シ肢體彊直此モ
 轉側屈伸スルヲ能ハズ時々醒解スレ凡復發シ治
 セザルヲ數週乃、纈草根末二刀宛用一日四次六
 日ヲ經テ又發シ前ノ發作ニ比スレバ甚々癩ニ似
 タリ因テ幾那ヲ用テ數週諸症大抵回復セリ

○凡、癩癲拵拵ノ諸症ノニテ他病ヲ兼子ザル者
 ハ幾那偉効アリ但、火モ焮衝ヲ兼ル症ハ甚々害ア
 リ右八種ノ症ハ些モ焮衝ヲ兼ザル者ナリ○或、刃
 傷骨傷打撲傷等ニテ癩ヲ發スル者ハ即、神經損傷
 ナリ即、破傷風此症ハ幾那ニ阿芙蓉ヲ加用ヒ或、幾那一

味用テ効アリ或阿芙蓉ヲ用テ増劇スル症。幾那ニ
テ治スル者多シ或幾那ノ煎汁ヲ吉利詞參兒トシ
施スモ亦驗アリ（依）

赤痢 惡性ノ痢疾。病毒酷烈ニ血液速ニ腐敗シ終

ニ腸壞疽トナリ虚脱ノ危劇ノ惡症ヲ發シ死スル

者多シ。此症ハ揮發壯神劑（後ノ神經熱ノ條ニ出シ）ニ幾那ヲ加

用テ腐敗熱ノ如シ且阿芙蓉劑ヲ兼用ノ治スベシ

失血 諸失血過多。患者虚脱シ必モ炊衝ノ候ナク或

血液腐敗崩壞ヨリ發スル症ハ幾那峻効アリ○刃

傷出血多ク。患者昏冒或搐掣等ノ危症ヲ發シ或一

旦出血止、（在時）迸出シ或潰瘍ノ水綿様肉ヨリ出

血スル者ハ幾那ヲ内服外用ノ殊効アリ（和）（底）

癩腫眼 頑固經久ノ癩腫眼ハ幾那ヲ内服外敷ノ大

効アルヲ先哲ノ經驗說多シ（和）

蛇蟲 幾那ハ殺蟲ノ良驗アリ一小兒六歲蟲症ヲ患

ヒ幾那ヲ與テ夥ク蛇蟲ヲ下シ治ス一女子十六歲

危篤ノ蟲症ヲ患ヒ諸藥驗ナシ終ニ幾那ヲ葡萄酒

ニ浸シ用ニ夥ク蛇蟲ヲ吐下メ愈ユ一女兒九歲蛇

蟲ニテ劇ク癩ヲ發シ諸藥効ナシ。幾那末一ヲ水銀

四錢ヲ蜜ニ研和シ每服一小刀尖宛數用テ治ス（和）

酸敗液 幾那ハ酸敗液ヲ消ノ腐敗ヲ止ム凡腐敗セ
 ル者ヲ幾那浸劑ニ淹セバ臭穢ヲ消スルモ一ハ制
 酸ノ効ニ因ル故ニ酸敗液ヨリ發スル經久胃腸ノ
 諸症ニ殊効アリ

痘瘡 痘見點スレハ起脹セズ或陷塌シ或灰白色或
 灌膿ノ黃熟セズ或黯黑ニシテ惡臭アリ或根脚青色
 ノ斑アルハ皆惡性ニシテ險痘トス幾那奇効多シ惡
 痘流行ノ時稟賦薄弱ノ小兒ハ預是ヲ用ヒ或見點
 起脹遲慢ノ症ハ始終是ヲ用テ惡症ヲ防グベシ○
 灌膿ノ腐敗甚ク膿熱劇キ症ハ幾那ニ綠礬精ヲ加

用テ大効アリ○見點ノ熱解セズ痘速ニ赭色或血
 色或黑色トナリ痘頂平陷界地赤色蒼色ノ線縷若
 ハ斑ヲ現シ痘中ノ液酷厲ニシテ傍圍ニ侵蝕シ或諸
 竅失血ヲ發シ痘ノ臭氣甚ノ汗大小便共ニ屍臭ノ
 如キハ皆腐敗熱ヲ兼ル者ニシテ其毒内攻シ危篤ニ
 至者多シ治法亦腐敗熱ト同シ○痘ノ暈圍紅色微
 ナルハ虛痘トス幾那ヲ饒多ニ用ベシ○小兒幾那
 ヲ嫌フ者ハ是ヲ細末トシ砂糖若ハ乳汁或舍利別
 ニ研和シ橙汁ヲ加用ヒ或幾那ノ濃煎汁ニ橙汁ト
 砂糖ヲ加テ煉膏ノ如クシ用ベシ○幾那ハ痘瘡麻

疹ノ餘毒ヲ解スル一良藥トス。○險痘治ノ後。勞瘵ノ如ク。欬ノ膿様ノ痰ヲ咯ク症ハ幾那牛乳ヲ與ヘ。輕キ下劑ヲ兼用スベシ。總テ痘後ノ勞瘵ハ此二品尤^E効アリ。但シ牛乳ハ毎日多ク用ベシ。○麻疹^E腐敗熱ノ大ニ煩悶昏眩譫語其他劇症ヲ發シ疹色淡白或紫蒼黑等ヲ見シ或ハ血色斑ヲ發シ忽チ消散内攻シ或ハ肺癆衝ノ酷厲液崩壞ノ忽チ失血ヲ發シ敗物ヲ下利ス其治法腐敗熱ト同然^E治スル者罕ナリ。○瘰癧瘰癧性ノ酷厲毒ヨリ頸領耳下腺唇等ニ腫瘍潰瘍ヲ生シ其毒血液ニ浸染ノ壞液ノ諸症ヲ發シ患者虛憊スル片ハ幾那良効アリ。先哲瘰癧ニ用テ治驗ヲ稱スルハ皆此症ナリ。

肺癆痰ニ膿ヲ交テ夥ク咯キ患者精力虚損シ。食後發熱シ食盡ク消化スルマデハ熱退カズ或熱少ク

ノ汗多ク小便澄清。或熱退テ小便ニ膿ヲ交ヘ通ズル者ハ其發汗中ニ肺癆ノ膿自ラ血中ニ混ノ小便ニ通スルナリ斯ノ如キ症ハ幾那ヲ用テ精力ヲ強壯シ膿ヲ排テ其腐敗熱ヲ治スベシ。或幾那ニ麗春花。玫瑰花。和胸劑ヲ加テ煎服シ或幾那煎ニ麗春花。玫瑰花。黥失刺^{トク}蓮^ゴ等ヲ加テ泡出シ温服ノ良効アリ。但膿ヲ吐^クナク及凝體纖維強硬乾燥スル者或ハ少^ク炊衝ノ候アル者ハ幾那害アリ。○^{省斷}

潰瘍 内部或外部ノ潰瘍或外傷潰爛シ患者精力虚損ノ其膿ヲ排泄スルヲ能ハズ内鬱ノ諸惡症ヲ發シ或其膿自ラ血中ニ濫流メ膿熱腐敗ヲ發シ或膿樣ノ汚物ヲ下利スル症ハ速ニ幾那ヲ用テ膿ヲ排ヒ其熱ヲ解スベシ○腫瘍及外傷凡ニ焮腫シ將ニ濃潰セント欲スル症ハ幾那害アリ○凡潰瘍ノ腐爛甚クノ患者虚損シ精力充張セズノ愈難キ症ハ幾那ヲ的當トス是ヲ用レハ弛軟ノ敗肉收固メ臭穢消シ良膿ヲ醸ス○大ナル外傷腐爛ノ惡性ノ潰瘍トナリ患者虚損メ血液腐敗スル片ハ瘡口ヨリ

稀キ敗血滲漏ス體中惡液多キ者ハ其腐敗殊ニ甚シ斯ノ如キ症ハ速ニ幾那ヲ用テ腐敗ヲ除キ精力ヲ補充メ治スベシ○瘡口淡白ニメ臭穢ノ稀膿滲出シ脉虚弱ナル症ハ熱甚ク舌燥クト雖モ幾那効アリ脉強數ニメ壯熱アル者ハ或刺絡ヲ施シ或酸收劑ニ消石ヲ加テ用ヒ幾那ヲ兼用スベシ○外傷潰瘍共ニ血液稀薄纖維弛緩ニメ水腫ヲ兼ル者ハ甚ク危險トス幾那良驗アリ○外敷ニハ此細末ヲ患處ニ搽シ或毳布ト爲シ貼シ或煎劑若ハ浸劑トメ蒸湯シ瘻瘡ハ水銃ニテ注入シ或水棉ニ蘸メ貼

シ咽喉口中ノ潰瘍ハ漱劑トシ斷舌等ノ潰瘍ハ幾
 那未ヲ玫瑰蜜布和シ塗テ皆良驗アリ布
 壞疽此病ハ内外所在ニ拘ラズ幾那ヲ内服外敷ス
 ルヨリ効アルハナシ。幾那細末一弓分テ十二服ト
 シ一時一服宛用ヒ生肉ト腐肉ト分レテ善膿ヲ
 成ス至至ルベシ或腐肉消スレ正膿稀クノ夥ク漏
 泄シ患者虛憊スル症ハ其服量ヲ増シ膿減メ白色
 稠厚トナルマデ用ベシ老人虛人は患テ大ニ潰
 爛スル者ハ腐肉除クト雖モ終ニ死スレバナリ
 壞疽枯燥セズ稀汁出ル症ハ幾那良驗アリ。乾テ濕

汁ナキ者ハ効ナシ此症ハ血液凝固ノ宛モ満ノ如
 ク諸管纖維モ燥テ牽縮スル故ニ幾那ヲ用テ逾凝
 固スレバナリ故ニ熱壞疽ノ炊衝性ノ症ニハ大害
 アリ但脈弱ニノ虚脱甚キ者ニハ症ニ隨ヒ用ル
 アリ○惡性ノ潰瘍及外傷大ニ腐爛ノ壞疽トナリ
 或出血ヲ兼子或炊衝ナク唯腐敗熱ヲ發スル者ハ
 幾那ヲ用テ治ス布○壞疽ノ性アル咽喉腫ハ幾
 那ノ煎劑或浸劑ヲ漱藥トメ尤効アリ布
 癌瘡幾那ハ癌瘡ノ臭穢潰爛メ熱壞疽様ノ症ニ先
 哲甚ダ効驗ヲ稱ス是ヲ歴試スルニ唯腐敗甚キ潰

爛癌ノ臭氣烈ク稀汁出テ劇痛焚クカ如キ症ハ幾
 那ヲ内服外敷メ漸ク劇痛退キ出血止ニ潰爛減メ
 淨潔トナリ善膿ヲ成ス者多シ然レ其自性ノ酷厲
 毒ヲ變化メ是ヲ全愈スルコト能ハズ（印）即知膿ハ
 毒血ノ兼取死懸諸世ニ印毒烈毒ヲ發メ善前ハ
 又レ○要封ノ貴藥又ハ代壽大ニ壽國ハ東取移ヤ
 此ノ時激毒共ノ息脈甚チ衰テ言ハレ難ニ難ニ取メ
 眼ノ下ハセ化結ハ殊難入ノ難治トモ云ラハ大壽
 新訂増補和蘭藥鏡卷六終

新訂増補和蘭藥鏡卷六終

