


新訂
增補
和蘭藥鏡

自卷十至卷十二



499,2

Or
4

No. 3236

12 0 28 - 1



富士川文庫

3344

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十

幾那

國

神經熱蛇蟲合併篇第五

蛇擾動症治

驅蟲乳劑

蛇潛蟄症治

幾那驅蟲飲

神經熱兼蛇蟲治例

攝縣纈草飲

緩和吉利詞爹兒

驅蟲蒸湯方

亞鈴驅蟲散

收斂散

神經熱衝熱合併篇第六

永乳散

亞的兒

吉利香

鎮痙

吉利

爹兒

龍齒

湯方

全體焫衝合併病原

全體焫衝合併症候

延吉

全體焫衝合併治法

刺絡

防焫衝劑

各部焫衝合併病原

三種區別

各部實症焫衝病原

蟲

蟲蒸

各部實症焫衝症治

肺

肺

肺

各部虛症焫衝病原

蟲

蟲

蟲

各部虛症焫衝症候

各部虛症焫衝症治

條信曾縣各部假症焫衝症治

新訂增補和蘭藥鏡卷十

孫齋先生譯述

男 宇田川 榕

榕菴校補

幾那

五

神經熱蛻蟲合併篇第五

由

一八

神經熱 = 蛲蟲ヲ兼レバ專ラ神經熱ヲ療スル強壯
薌ノ三用テ治スルト能ハズ○蛻ハ能、痙攣ノ諸症
ヲ誘發シ且、既、發セル痙攣、諸症ヲメ逾、增長淹滯

セシム。故ニ先、蛻ヲ治セザレバ本病モ治シ難シ○

蛻ヲ療スルニ二般ノ別アリ、一ハ蛻人擾動刺戟ヲ

治シ一ハ其潛蟄靜伏ヲ治ス。是ヲ察スルト一大要

務トス

蛻擾動症治

蛻擾動メ刺戟スルバ必ズ腹部劇症ヲ發シ。身體各部ニ連及メ痙攣ノ諸症ヲ見シ患者甚ダ感動シ易シ此症ハ驅蟲劑ヲ禁ス。是ヲ用レバ蛻逾擾動メ大ニ刺戟シ患者其劇症ニ堪ズ故ニ鎮痙攣劑及乳汁油類ヲ與テ最良トス。是ニ由テ一ハ蛻自ラ罷勞シ刺戟ヒズメ遂ニ死ス。一ハ感觸ノ敏銳ナル胃腸ノ裏面ニ蛻ノ口嘴吸貼メ刺戟シ劇症ヲ發スル者。今其藥液遍ク胃腸ノ裏面ニ塗布スルニ

因テ蛻嘴直ニ抵觸吸貼セズ刺戟ノ感動微ナシ。是未以テ數乳汁ヲ内服セシメ又是ニ鎮痙攣剤ヲ加煮テ腹部ヲ蒸湯シ又乳汁油沙糖ヲ調和メ吉利詞リス爹テ兒ルトシ施スベシ或左ノ乳劑ヲ内服ノ奇効アリ

驅蟲乳劑

甘扁桃油或ア利機油或亞

亞刺比亞麴膜漿適宜

香木水六弓

右調和シ左ノ品ヲ加フ

乳劑本篇卷十四清涼子條ニ出一弓

菲阿斯失亞密^{アミ}越幾斯劑^{キス} 八氏

右研合シ一時毎ニ二匙宛與フ或、亞鉛加爾幾^{カルキ}_補或番木鼈^{エヤス}越幾斯劑ヲ加テ殊ニ良。此二品殺蟲ノ奇効アリ○蛇蟲頑固ニメ危劇ノ症ヲ發スル者ハ草麻油ヲ内服セシメテ多ク殊効ヲ得タリ○水銀ヲ水煎メ其水ヲ内服スレバ胃腸ヲ刺戟セズノ能、蛇ヲ罷勞セシムル一良藥トス但尋常ノ水銀ハ鉛類ノ諸礦質ヲ染汚セル故ニ精製ノ用ベシ或云純粹水銀ハ煎煮スレハ水ニ融和セザル故ニ殺蟲ノ性効些モ其湯ニ出^ルナシ唯水銀ニ雜ル鉛質其煎汁ニ

溶和スル故ニ患者ニ害アリ。ト又云。水銀煎汁殺蟲ノ効アルハ水銀ノ外面ニ染汚セル汞質ノ渣灰^{カルク}溶和スレバナリ。ト然レバ水ヲ以テ水銀ヲ煎煮スレバ水銀其水質ヲ剖解ノ水中ニ含ル多少ノ酸質ヲ吸收シ水銀ト酸質抱合ノ渣灰^{カルク}ト爲ル試ニ純粹水銀ヲ硝子壘ニ入^ル水少許ヲ加^シ暫ク振掉スレバ忽^チ渣灰生スルヲ以テ知レベシ既ニ渣灰トナレバ能^シ煎煮スル所ノ水ニ溶化ス故ニ水銀ノ煎汁絶^テ効ナシト言ベカラズ

蛇潛蟹症治 蛇ノ擾動刺戟及^シ痙攣ノ諸症甚シカ

ラズノ感觸少キ症ハ直ニ驅蟲人峻劑ヲ用テ蛇夫

驅除スベシ。每常殊効ヲ得ル藥品。

攝絲施那(名)

傑膾弗魯伊皮(補)フリナメンラムト云品

用フ殺蟲ノ奇効アリ

纈草根

甘汞等ナリ。又後方多ク治驗ヲ得タリ

幾那驅蟲飲

幾那(未)一弓

攝絲施那(セシレナ)四錢

傑膾弗魯伊皮(ゲラフロイ)一錢

纈草根(未)二錢

澄皮舍利別(セイヒサリベツ)一弓

右水十二弓ヲ以テ煮減メ八弓トシ後藥ヲ加フ
纈草根(未)二錢
澄皮舍利別(セイヒサリベツ)一弓
右先纈草根(未)ヲ攪和シ渣ヲ去リ舍利別ヲ和シ一

時ニ二匙宛服ス。○此症油類ヲ吉利詞(スケル)翁兒トシ施

メ殊効アリ。或左ノ蒸湯法毎常奇効ヲ得タリ

驅蟲蒸湯方

歸咎答那(タナセラム)攝黑謨葉(カムラヌク)亞爾鮮(アルセム)

幣(ヒ)薄荷(タバコ)酒(セイ)加密列(カミリ)各一握

右乳汁(タマリ)煮テ日常腹部ヲ蒸湯シ冷^{リカヘル}更換ス。小

兒服藥ヲ嫌フ氏ハ此劑ヲ施メ危劇ノ諸症ヲ治シ

蛇ヲ驅泄スル^ト甚多^シ或菲阿斯失亞密油、石腦油。

牛膽答那(タナセラム)攝黑謨油ヲ適宜^ニ合和メ擦藥トシ常ニ

腹部ニ擦ルモ亦効同シ。右ノ諸劑ヲ施ス際ニ強

壯劑ヲ兼用ノ本病神經熱ヲ治スルト肝要ナリ
神經熱兼蛻蟲治例

一名哲頑固危險ノ蟲病ニ驅

蟲剤ト壯神剤ヲ合シ用テ良驗アル一考按ヲ舉テ
治例ヲ示ス

○一女兒六歳。六月十五日是ヲ診ニ水瀉數劇ノ疲
勞スルト既ニ八日。臍ヲ繞テ腹痛シ口味甚苦。舌上
稠苔アリ食ヲ嫌ヒ唯酸物ヲ好ミ殊ニ醋ヲ嗜ム。額
疼甚ク精神錯亂時譖語シ發熱熾盛。手掌殊ニ甚シク。
精力逾虛憊シ脉細數ナリ此兒以前蟲症ヲ患フ。因
テ先吐剤ヲ與テ吐セシメ次テ左ノ殺蟲剤ヲ與フ

正撮絲纈草飲

撮絲施那末三錢

纈草根末一錢

右水六勺ヲ以テ先撮絲ヲ煮終ニ纈草根ヲ如煮天
滓ヲ去リ後藥ヲ加フ。如亞麻油半合利別々六錢裝
甘消石精四十滴

右合和シ一時毎ニ一匙宛與フ。又琶布ヲ作テ腹
部ニ貼ス。附後服

驅蟲琶布

接骨木花

加密列各四兩

亞爾鮮アルヤン

蘇木病スムビ

菲ヒ

阿斯オス

失亞密葉シアミ

錢キン

各三

右乳汁ニ煮テ琶布トス○又次ノ吉利詞爹兒ヲ施

緩和吉利詞爹兒

赤各麗春花カツラ一錢イチモン加密列又各二錢ニモン

葵根クモリ一錢半イチモンハ

小麥粉コウモリ

云藻ウネ

二錢ニモン

亞麻油アマオ

三弓ミヨウ

加施カシ

又

右水六弓ニ煮減メ三弓半トシ滓ヲ去キモリ漿粉ヤクフ精製ヒョウジ好ヒ上好ヒ

粉コウモリト呼ココロ者コトコロ最好ヒョウジトス

二錢ニモン

亞麻油アマオ

三弓ミヨウ

加施カシ

又

夜中吐劑ナガシゼヲ與ヨハシテ多ク粘液及シテ膽液センエキヲ吐スルト兩次リツ。爾後頭痛止シ。口中苦味消シ。脉稍盈揚シ數シテメ百

五六動大蛇タカニ一條下リ。譫語セバ安眠シ熱亦減ス○

才亦日脉百十二動許。舌白苔アリ。口味復苦々甚ダ酸物シタケヲ好ム。大便水瀉シ時。臍邊絞痛ス乃前ノ吉利詞ス爹兒テイエル劑カツラ。纈草末スニ刃カミヲ如シ施ス。夜中蛇タカニ一條通ス。口中苦味除ク。然レ腹痛休マズ。脉數シテメ小。熱勢大。右減ス。又後方ヲ兼用ス。北奇ヒキ齒シ一絲シス。

收斂亞的兒飲

條收斂亞的兒アルヤ名九滴クシ舍利別

大煉蒸餾水カツライシヨウ各二錢ニモン塗敷ヒツブ頭中

十七日十八日諸症同前。大便始テ固リ。腹痛全ク止

然庄夜中復腹滿急痛時。欬嗽。鼻中痒。熱增發。脉疾數大。因テ前ノ攝鱗纈草飲ニ幾那二錢ヲ加、與ヘ。左ノ軟膏ヲ作テ腹部ニ塗擦ス。

羯布羅驅蟲膏

或越沒里膏

外過爾托亞膏

或越沒里膏

石腦油

名二錢

石腦油補一錢

石腦油

名二錢

石腦油補一錢

右研合ス。十九日小腹痛減シ。頭痛再發シ。大便復水漏シ。患者甚ダ憊勞シ呼吸不利時。欬シ鼻中痒シ。脉百十動。絶テ食ノ欲セズ。因テ前ノ攝鱗纈草飲ニ答那攝黑謨葉二錢。番木鼈越幾斯劑八氏ヲ加用ヒ

又左ノ乳劑ヲ内服セシメ且是ヲ吉利詞爹兒トシ施不夜中安眠ス。

汞乳驅蟲飲

一月

水銀

純粹者一弓

乳汁

適宜

右水銀ヲ磁鍋ニ入水一比ヲ加益閉シ煮丁八分時。上清ヲ取り適宜乳汁ヲ攪和シ其半分ヲ内服シ其餘ヲ吉利詞爹兒トス。二十日時、抽掣メ兩手牽縮シ嗜眠ス。庄安眠セズ。全軀ノ病患皆頭中ニ在ガ如シ。小腹痛休ト雖モ臍邊甚ダ膜脹シ。按テ感觸ニ堪ス。又蛇一條大便ニ雜以通ス。脉細數ニノ緊。夜

中頭ノ諸患緩解メ睡眠ス然レ圧時々抽掣シ大便又水瀉ス方劑同前○二十一日諸症同前但頭中ノ患者全ク失カ如レ乃前ノ攝絲纈草飲ノ攝絲ノ量ヲ増シ幾那四錢ヲ加^セ與ヘ又前ノ驅蟲琶布^{バブ}=各那攝黓謨^{カム}二錢ヲ加^セ施ス○二十二日水瀉止^ミ熱竝^ニ腹脹減ス乃後方ヲ與フ

亞鉛驅蟲散

亞鉛華 一匁

沙糖 半勺

右研和シ分テ五服トシ毎朝毎夜一服宛用フ○二十三日諸症輕快脚ノ抽掣頭中患苦盡ク退キ始テ

食ヲ欲ス脉九十八動又蛇一條通ス方劑同前○二十四日諸症復^リ剝發シ脉疾數ニメ緊是調護ノ宜ヲ失ヒ藥劑ヲ怠リ且^シ蛇ノ擾動ニ因ル其故ハ毎ニ蛇通スル以前ハ諸症増劇シ既ニ通スレバ寬解スレバナリ二十五日二十六日腹部復^リ膜脹シ按^{オシ}テ疼甚ク數^シ水瀉スレ压蛇下ラズ熱勢剝ク肌膚燥熱爛^ク如ク唇澹白舌燥キ栗殼色舌ヲ出スニ甚^シ困難脉細數搏度齊ハズ手指抽掣ス因テ後方ヲ與フ

麝香鎮痉散

麝香 二匁

亞鉛華 一匁半

沙糖 半刀

右研和シ分テ六服トシ朝夕一服宛與フ又芥子泥ヲ腓ニ貼ス自餘藥劑同前夜中昏睡熱増發脉細弱。時譫語シ下利休マズ○二十七日昏睡醒解ス然レ压熱仍甚久脉百二三十動腹部感觸甚シ午後熱稍減シ肌膚乾燥夜中熱增發嗜眠時々抽掣煩擾譫語ス夜半後安眠ノ譫妄下利休ム大抵朝夕熱及諸症増發ス○二十八日諸症同前夜分昏睡甚ク眼開力ズ耳聽工難ク總テ知覺微ナリ因テ芥子泥ヲ腓ニ貼シ先膏膏ヲ兩肩間ニ貼シ羯布羅精ヲ温湯ニ和シ

肢體ヲ蒸湯シ又後方ヲ以テ腹部ニ擦ス

龍腦揮發膏

硇砂揮發膏名三錢 龍腦油圖一錢

舍電阿芙蓉液

半錢

右研和ス又左ノ劑ヲ吉利詞爹兒トシ施ス

鎮痉吉利詞爹兒

加密列名

四錢

右水九弓ニ煮減ソ五弓トシ後藥ヲ加フ

纈草根末

二錢

亞兒尼加根末

一錢

右煮ル少時滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

龍腦 四氏

舍電 阿芙蓉液 十滴

右研和ス是ヲ施ノ後又舍電阿芙蓉液八滴ヲ增加シ施ス少間ノ昏睡醒解シ人事ヲ省ス。然ニ全軀感動シ易ク腹部殊ニ甚ク。屢掣引シ時々譖語脉細數搏度齊ハズ○二十九日熱減シ精神醒復ノ能傍人ヲ知ル。然ニ腹脹シ稍動搖スレバ腹痛ニ肌膚燥キ。大便通ゼザルトニ日脉小弱百五動許乃前ノ攝絲纈草飲加幾那劑ニ民蛭列利精四錢舍電阿芙蓉液八滴ヲ増加シ與ヘ。且麝香鎮痉散_{タマフク}布羅精蒸湯法吉利詞爹兒共ニ持重シ施シ。又午時ニ硇砂ト醋ト

合和ノ頭部ヲ冷溻ス患者復皆睡譖語手指抽掣交發シ口ノ邊圍ニ小皰ヲ發シ潰破疼痛ス吉利詞爹兒ヲ施ノ大便一行通シ腹脹差減ス然ニ寒熱往來肌膚燥涸夜中脉甚ダ虛軟搏度齊ハズ時々欬嗽及喘鳴ス因テ又芥子泥ヲ肺ニ貼シ羌青膏ヲ臂ニ貼ス芥子泥ノ刺戟ニ由テ夜半前些モ睡ラズ煩ノ感動甚シ。故芥子泥ヲ去ル。熱勢甚ノ燐如シ。然ニ昏睡減シ喘鳴休ム。脉數小ニノ緊。夜半復嗜眠ス○晦旦早旦搗掣煩燥床中ニ跳起シ唇瞞動肌膚唇舌燥キ眼中曇暗感觸甚メ些モ肢體ニ觸レルヲ惡ニ呼吸大

喘鳴ス。因テ勉_レテ藥劑ヲ多服セシノ且_レ印_イ設酒ヲ兼用ス。夜分又冷溻法ヲ施シ。芫菁膏ヲ左臂ニ貼ス。然_レ煩躁劇ク。呼吸短促。暮中ニ展轉ノ瞬間モ安卧セズ。但_レ脉勢稍盈揚ス。因テ舍_セ_テ電阿芙蓉液八滴ヲ葡萄酒少許_テ加_ス。頻服セシメ。又前ノ麝香鎮痉散ノ麝香ヲ加_ス。テ三合トシ沙糖ヲ二合ニメ一服トシ朝夕一服。宛與_ス。夜中大便二行通シ腹脹及感動減ス。○七月朔日朝。患者安眠シ全身蒸氣ヲ發_ス。津潤シ。酸臭甚シ。舌燥キ。熱減ノ微惡寒シ。肢體ノ甚キ感動減シ。語聲連續ノ能_ス。事理ヲ辨識シ。口邊ノ小炮消散

シ。脉軟弱ナレ_ス。既_タ細小ナラズ。百六動ヨリ百十動許。晝間屢_テ水渴ス。因テ揮發衝動藥ニ幾那一錢。龍腦一合ヲ加_ス。吉利詞爹兒_{キリス}テ_アル。吉利詞爹兒トシ施ス。其他方劑及_テ葡萄酒モ用フ。夜中熱甚_ク。昏睡及_テ痙攣_ス。諸症ヲ兼發シ。寒熱交_ス。發作ス。○二日肢節顫振搗掣劇ク。殊ニ呃逆甚_シ。ノ汗アリ。夜中稍睡眠ス。方劑同前。○三日昏睡及_テ驚悸跳惕_ス。交_ス發_ス。休_マズ。但_レ熱劇シカラズ。肌膚潤ヒ。脉百二十動方劑同前。又冷溻法ヲ腹部ニ施シ。且_テ蒸湯法ヲ施_ス。丁_レ前法ノ如シ。夜中復_テ大熱。腹脹メ下利ス。乃_テ醋ヲ吉利詞爹兒トシ。又後方ヲ作_ス。テ腹部ヲ蒸湯ス。

龍齒湯方

鴉布羅猜

大龍齒擦方 卷八出
各四弓

右合和ス夜中大便二行通シ腹脹及感觸熱勢昏睡共ニ減ス。但ノ中ノ一處被膜剥脱シ胃管感觸甚シ。ノ藥汁ヲ嚥下スレバ攣縮ス。方劑同前夜分昏睡セズ精神輕爽ナリ。但耳聾メ大聲聽ズ熱解メ總體温緩。脉稍緩。乃前ノ麝香鎮痉散一服ヲ與フ。五日朝熱減シ脉數減スル。十五動。大便祕シ腹脹ス。因テ醋ノ吉利詞爹兒トシ施ス。夜中聲嘎^{カシ}煩憊時ニ大息シ腹脹甚クメ下利ス。六日七日終日腹痛ス。乃前方

ヲ用ヒ又草麻油半匙宛與フ。毎日兩次。又酪餘^名ヲ用。夜中不寐煩憊ス。八日腹痛甚シ。乃前ノ吉利詞爹兒^{テール}ヲ施ス。夜中安靜ナリ。九日朝腹脹甚シ。因テ前ノ吉利詞爹兒^{テール}ヲ施ス。諸症同前。十日腹部感觸甚シ。脉百動許。熱甚シカラズ。皮膚乾燥ス。方劑同前。夜中平便ニ死蛇ヲ雜ヘ通スル。三次。十一日脉小弱ニメ微數。是ヨリ十四日マデ大抵諸症同前。唯精力虛憊スルノ。十五日ヨリ熱ノ發作。及痙攣ノ諸症漸ク休^ヤ。脉百動許。乃滋養培補ノ爲^ニ沙列布^{サリヤブ}。肉羹汁ニ加^ハ煮テ與^ヘ。草麻油ヲ持重シ用フ。二十

七日ニ至テ日ニ快愈ニ向ヒ食漸々進ニ精力復シ
熱再發セズ。唯脉數ナルノニ。次テ逾滋養ノ飲食ヲ
與フ。藥劑ハ幾那。セメン攝鱗施那沙列布。纈草根。民塗列利
精。草麻油ヲ用テ竟ニ瀕死危極ノ病全愈シ停藥ヲ
告グ。

神經熱。焫衝熱。合併篇第六。請參同簡○十日鄭子方
神經熱ニ焫衝熱ヲ合併スル症ハ其焫衝ヲ治スル
ニ各部瀉血法吸角若ハ蝶針法或全身瀉血法澤尺
等ニ刺絡ノ瀉スルヲ云。神經熱ヲ治スル強壯劑ニ防
血スルヲ云。

焫衝藥ヲ加用フ。防焫衝藥ヲ加ルハ強壯劑ノ是
ニ二般ノ別アリ。一ハ全體ノ焫衝ナリ。一ハ各部ノ
焫衝ナリ。

全體焫衝合併病原

此症ハ患者神經熱ヲ發スベ
キ虛弱ノ體質ニ焫衝質。若ハ多血質ヲ兼併スルナ
リ。○或云。神經熱ト焫衝病トハ病性虛實全ク相反
人。是ヲ以テ二病合併ノ說ハ大ニ實理ニ乖ケリ。其
合併ト云ハ必ズ虛焫衝。虛症、焫衝ニメ眞ノ焫衝ニ
非ズ。故ニ治法モ亦神經熱ニ從ヒ專ラ揮發強壯劑ヲ
用ベシ別ニ焫衝ノ治法ヲ施スペカラズト。此說ヲ

推究スルニ凡、全身諸器ハ人ニ稟賦ニ隨ヒ各、強弱ヲ異ニス假^{タトヘ}令バ神經ハ虛弱ナレニ脉管ヲ組織セル筋纖維ハ強實ニメ焮衝質ナルが如シ故ニ神經虛弱ナルニ因テ神經熱ヲ發スレニ脉管焮衝質ナル故ニ焮衝ヲ發シ此合併病トナルナリ是ヲ以テ或、全軀同時ニ病邪ヲ受レニ諸器ノ病性各、異ナル「假^{タトヘ}令バ熱病ニ於テ此器ハ運行大過ナレニ彼器ハ運行不及ニ係^カリ或、麻痺ニ罹^カルか如シ然ル所以ヲ研究スルニ全軀諸器ハ各、他ニ交渉セザル自家ノ運營アル故ニ其常調ヲ變スルニ至テハ亦其自

家ノ運營ニ隨テ各自殊異ナル患狀ヲ現シ其病ヲ受ルモ此器ハ彼ニ比スレバ早速^{ハヤ}彼器ハ此ニ比スシハ過甚ナルトアリ。假令バ神經熱ニ各部一處ノ焮衝ヲ兼ルガ如キモ神經熱ノ病性ハ運行不及ニメ焮衝ノ病性ハ運行大過ナルが如シ。是ニ由テ神經熱ニモ亦刺絡ヲ要スル者アリ或、一人ノ體ニメ同時ニ焮衝、壞疽、括閉筋ノ麻痺不遂、搐掣等ヲ兼發スル者アルト數、歷驗セリ○是ヲ以テ此合併病ハ彼此相反對スル諸症アル故ニ療法モ亦是ニ應メ或、清涼降鎮減損ノ方法ヲ施シ或、揮發衝動強壯ノ

劑ヲ用ルナリ。凡兼併ナキ熱病ハ病性一途ニノ諸器ノ強弱相反セル症候ナキ故ニ亦一般ノ療法ヲ以テ治ス。然ニ合併病ニ於テハ全體ヲ以テ論スルトナク各部諸器ニ就テ病性ヲ尋索スレバ其發スル所ノ症候自ラ明白ニノ眩惑スルヲ無ルベシ。○顏面盈赤壯實ナルガ如クニノ其神經質甚ダ脆弱ナル者アリ。或筋力甚ダ強健ニメ一時程ヲ歩行シ些モ疲勞セザル人。天稟神經脆弱ニノ感動甚シク居_チ恒神思鬱憂病ニ罹_カリ。若ハ癰瘍等ノ重キ神經病ヲ患ル者アリ。或平素逸居メ勞動セズ甚ダ神思ヲ

困苦シ若ハ放肆遊蕩。酒色節慎ナキ等ニテ大ニ神經質ヲ虛損シ或滋味膏梁ニ飽テ多血盈滿凝積シ血絡細管其多量ノ血ヲ攝行健輸スルニ任_タズメ各部ニ壅滯シ焮衝ヲ發スル者アリ。○凡神經ハ自性固有ノ一個ノ機能ヲ具ル。猶心藏及動脈ニ一個自性ノ機能ヲ具ルか如シ。是ニ由テ神經ノ機能ト心藏血脉ニ係ル諸筋ノ機能ト同シカラズ。故ニ神經ト血脉諸筋ト一般ノ病ヲ受ルト雖_モ其感動ヲ異ニシ又其連及交通スルトモ各自分別アリ。是ヲ以テ動脈病ヲ受ズメ神經獨リ病ニ罹ルヲアリ。假

令ハ各部ノ神經。大ニ麻痺スト雖モ其部ノ動脈、温
煖營養等異狀ナク平日ノ如キ者アリ。是、動脈ノ機
能其病ヲ被ラザル者ナリ○神經熱ニ焔衝ヲ合併
スル者。兩個ノ因アリ。一ハ神經虛弱ニメ平常通泄
スベキ血ノ閑止スルニ因ル。一ハ壯實多血ニメ神
經熱ヲ傳染スルニ因ル○其多血ニメ甚、焔衝シ易
キ人。神經熱ノ傳染毒ヲ被^{カラム}レバ其刺戟ニ由テ初起
直^ナニ全身ニ焔衝ヲ發ス。然^レニ病性^{ホドナカ}幾變ノ神經熱ト
トナリ。若^クハ神經熱ト焔衝病ト合併ス^或、神經熱ト
雖モ甚ダ熱性ノ藥劑ヲ過用スレバ此合併病トナ

ル者アリ

全體焔衝合併症候

神經熱ニ全身焔衝ヲ兼併ス
レバ尋常神經熱ニ比スレバ脉盈充ノ強。然^レニ切按
メ收縮シ易シ。此脉數日誓留ス<sup>神經熱ノ症ハ變化
人兼併ナシト雖モ一二時斯ノ如キ脉ヲ現スアセア</sup>多端ナル故ニ焔衝
リ。故ニ此脉誓留スルニ非レバ焔衝兼併ノ病トセア
ズ。又脉ト諸症ト共ニ増進ス。即^チ脉勢逾、盈強ナルニ
隨ヒ熱勢逾、增加シ。呼吸不利短促。譫妄其他頭腦入
諸症逾、剽盛ナリ。是ニ及メ兼併ナキ純粹ノ神經熱
ハ脉勢盈充スルニ隨ヒ熱勢呼吸不利譫妄等逾、減
除シ。脉勢虛耗ノ小弱ナルニ隨ヒ右ノ諸症逾、增剽

ス就中脉ト呼吸ト相反スルカ若ハ相應スルカヲ察スベシ是ハ神經熱ニ煥衝ヲ兼ルト逾多ケレバ脉疾數ナルニ隨テ呼吸逾短促ス其煥衝ヲ兼ルト逾少ケレバ脉疾數ナルニ隨ヒ呼吸逾短促セズ或遲緩ニメ大息スル者アリ神經熱ハ脉逾疾數ナルスルト逾少ニ呼吸モ遅緩ナリ故血ノ肺=運行スルモ遅緩ニメ呼吸モ亦短促セズ此說後ノ各部虛症出参考スペシ又尋常神經熱ニ比スレバ必ズ渴甚シ總テ熱性衝動ノ劑ヲ與レバ諸症増劇シ殊ニ呼吸短促譫妄甚シ又上ニ說所ノ病前ノ諸因ト患者ノ體稟トヲ察ソ病性ヲ鑒識スルト肝要ナリ○

神經熱ノ諸症ハ殊ニ轉變シ易キ故ニ審診細察メ能其本然ノ病性ヲ認メ得ベシ假タトヘ令バ始テ其脉ヲ診フニ頗ル強實ニメ煥衝病ノ如キモ一時許ヲ經テ再診ヘバ甚ダ小弱ナル者アルガ如ニ真ノ煥衝ヲ兼併セル症ハ強實ノ脉狀時日ヲ經レ既變スルモノナシ故ニ再三診察セザレバ病性ヲ決定シ難シ全體煥衝合併治法此症ハ瀉血法及防煥衝剤ヲ施メ脈管質ノ煥衝ヲ減除シ且微衝動ノ効アル强壮剤ヲ兼用メ神經質ノ虛憊ヲ資補スベシ刺絡右ノ症候ヲ考索メ全身煥衝合併ノ症タル

門ヲ診シ得バ慎重ノ先試ニ刺絡メ四弓許ノ血ヲ
瀉シ。患者輕快ヲ覺エ。脉較著ニ沈小トナラズ瀉血
數トナル代ハ速ニ其血ノ止ムベシ。其瀉出ノ血稠
厚ニメ速ニ凝結シ。若ハ血ノ外面薄膜ヲ被フハ必
燃衝ノ微十ス是ニ反ノ瀉血後諸症増進シ。脉力沈
垂スルハ假ニ燃衝ノ諸症ヲ現ス者ニノ真ノ燃衝
合併病ニ非ズト知ベシ。○刺絡ハ壯實多血ノ燃衝
ニハ甚緊要ナレ。間其外候ニ眩惑ノ神經虛憊ノ
本病ヲ省察セバ大害ヲ致ス。アル故ニ仔細ニ戒
慎メ必多量ノ瀉血ヲ禁スベシ。疑似不決ノ症ハ刺

絡セザルヲ害鮮シトス。是ニ代ニ吸角若ハ鷓針法
ヲ以テ瀉血スルヲ切實トス。殊ニ吸角ハ細絡ノ血
ヲ吸泄スル故ニ刺絡ノ大血脉ノ瀉血ニ比スレバ
心藏及神經ノ機力ヲ減損スル。鮮シ○痔血壅滯
等ヨリ發スル症ハ其部ニ鷓針法ヲ施メ尤効アリ
○神經熱ノ初發燃衝ノ諸症甚キ者ハ刺絡ノ間速
効ヲ得ル。アレニ患者精力未ダ甚ダ虚憊セズ且
多血ニノ瘀血。脳肺ノ如キ要地ニ壅積メ燃衝ヲ崩
發シ刺絡ニ非レバ速ニ救ベキ術ナキ者ニ是ヲ施
スベシ。故ニ脉強實。顏面盈赤等。一二多血ノ症ヲ見

スト雖モ遽ニ實症トシ妄ニ刺絡スルヲ勿レスノ
如キ症ハ大抵角法蜞針法ヲ施メ良効アリ

防焮衝劑

此劑ハ卽、焮衝ヲ防制スル中和鹽、植酸
其藥品前ノ胃腸熱合併篇及少量ノ韓爾答^{タタク}越默窒^{タマツ}
第4瀉劑用法ノ註ニ出フ。又、安質沒扭酒^{モモニテ}解凝ノ効ヲ以^テ其說^{タクニ}出^テ等ヲ熱性ナラサル
壯神藥ニ加用フ。假令バ纈草根、遠志、槲寄生等ノ泡
劑亞鉛華^{ミシデ}、民蛭^{ミシデ}、列利精ノ如シ。又白芥子ヲ脚湯ニ加
施シ、芥子泥ヲ貼ス○焮衝漸減スルニ隨ヒ強壯劑
ニ轉シ殊ニ幾那等ノ保固強壯藥ヲ用ベシ。然ニ葡萄
萄酒其他熱性衝動ノ壯神藥ハ必害アリ。唯瀉劑刺

絡等ヲ過用メ精力大ニ脱缺セル症ニ用ベシ○此
病初起焮衝ノ諸症ヲ見スニ因テ涼解攻瀉ノ劑ヲ
過用シ患者卒ニ虛憊スルヲアル故ニ預^メ是ヲ省察
スル「肝要ナリ」近來流行セル神經熱ノ病性多ク
焮衝ヲ兼ル故ニ防焮衝法尤^モ効アレ^モ常必適應
スルニ非ズ宜ク神經虛憊ニ注意メ本病ノ治法ヲ
遺忘スルヲ勿ルベシ。焮衝性ノ病ト雖モ固ヨリ純
一ノ焮衝ニ非ズノ神經熱ノ兼症タル故ニ是ヲ過
用スレバ脳及神經質麻痺シ若ハ腐敗熱トナリ遂
ニ強壯劑的當ノ症トナリ易シ。或^{モト}素ヨリ焮衝性ノ

病モ極テ惡厲ニメ諸症劇盛ナレバ腐敗熱ヲ兼ル故ニ終ニ壯神衝動ノ峻劑ヲ與ベキ症トナル然バ防歟衝法ヲ過用セズ殊ニ刺絡ヲ戒慎シ是ニ代ヘテ如羅^{ロメル}幾兒ヲ用ヒテ歎衝ノ凝血ヲ疏散スルヲ尤佳トス○凡神經熱ニ歎衝ヲ兼ル症ハ元來神經其病毒ト抗抵メ罷弊シ發スル故ニ防歎衝劑モ專ラ歎衝熱ヲ療スル如キ峻劑ヲ用ヒ勿レ唯其毒ノ神經質ニ著^{ツク}脉管質ヨリ居^{カホキ}多ヲ標準トシ療スベシ○凡疫毒ハ皮表ニ蒸散スルヲ最良トス故ニ饒多ニ蒸氣ヲ宣發スルハ防歎衝法ノ一大要更トス初發熱性ノ發

汗劑ヲ用テ發汗スルヲ謂^フ非^ハ唯病中始終是ニ清解ノ蒸發劑ヲ用テ蒸氣ヲ宣發スルナリ是ニ因テ其全身ニ彌漫ノ刺戟スル病毒並ニ外襲ノ傳染氣ヲ蒸發驅散シ且^ハ病毒ノ刺戟ヨリ生スル痙攣ノ運動ヲ減除シ腐敗液ノ鬱聚スルヲ排泄^ス又專防歎衝劑ヲ施セバ脉管ノ充張力ヲ減損スルヲ已^{ハシ}キ故ニ毎ニ防歎衝劑ニ蒸發劑^{蒸氣發散ノ劑}ヲ加用テ偉効アリ其劑ハ卽^チ硝砂^{ニシテ}列精安^{アシテモ}質沒扭劑^{安^モ没扭酒^{タマリ酒}}等^云植酸類^{狗櫻汁^{シカツ}、橙^{オレンジ}ノ如シ但^シ強壯劑ヲ用ル症ハ歎衝ノ増發ヲ恐ルト雖モ消石ヲ加ヒ勿レ○然^ハ發汗過多ナレバ病性ヲメ大ニ惡性ナラ}

シム。唯腠理融和宣通ノ人目ノ見ルベカラザル蒸氣ノ發越スルハ卽皮腠ノ常調ヲ得ル所ニノ甚ダ利益アリ。故ニ肌膚温潤和柔ニメ宛モ天鵝絨ニ觸ル如クナルハ能病氣分利ノ排泄スト知ベシ蒸氣過泄ノ發汗淋漓シ或常ニ自汗漏泄ノ止ザルガ如キハ大ニ元運力ヲ耗損メ傳染毒ヲ増息シ其害宛皮膚燥硬ニメ乾革ノ如キ者ト同一般ナリト知ルベシ発汗過多ナレバ血中ノ稀液亡脱シ血液稠厚ノ熱勢轉增シ且元運力虛脫ノ疫毒ヲ蒸氣ヨリ排泄スル能ハズ卽皮膚閉塞ノ乾燥スル症ト同シ故初起發汗劑ヲ與、發汗メ害アルト亦此理ト同シ斯云往古醫學未詳明ナラザル時ハ醫家熟病ノ初發必ズ發汗劑ヲ與、邪毒ヲ驅散セントス。今

熱時病モ能ル者ノ機カニ因テ遍身自ラ發汗シル者ニニ非ズ。初發ハ病毒未ダ化熟セザルス故ニ發汗ニテ其毒ニ至レバ誤トス。凡マ固ヨリ初起發汗メ解毒ヘキ輕淺ノ散ス。良テ毫モ排除セズ。血質轉、稠厚トナリ脉管逾、壅塞ノ病毒也。是レ津液燥涸者ナレ。然レ醫家仍以爲初起發汗セレ。是古法ニ拘泥セレ。病之陋弊性也。皮膚乾燥ハ即、腠理ノ閉塞ナル故ニ内熱ヲ増發シ。病毒内鬱ノ神經感動ノ諸症ヲ誘起シ血ヲ脳肺等ニ衝逆ス。○病室ノ熱蒸氣ヲ排散ノ清涼ニ保護スレ。

バ蒸氣ヲ開達スル最良法ニゾ能。皮膚、焮衝ノ刺戟ヲ消散ノ蒸發ノ機力ヲ獎起ス。○脉軟弱沈細。皮膚黽滯微冷ニメ神經ノ諸症逾、增長スルハ是專ラ元運力ノ沈垂ヲ提揚シ神經ノ罷弱ヲ資輔スペキ症トス。防焮衝法固ヨリ害アリ。○凡、虛憊ノ症ハ神經質甚ダ沈垂スル故ニ適宜ノ時節ニ壯神衝動劑ヲ用。テ良功アレ。圧疫熱ハ其藥力ニテ脉管質ヲ挑撥衝動シ、焮衝ヲ増發スル故ニ預メ其藥性ノ強弱及。服量ヲ考定メ其宜ニ適セシメ。又其血質ヲ熱沸スルヲ甚シカラザルガ爲。ニ清涼劑即防焮ヲ加テ脉

管ノ充張カノ減損シ其熱ヲ抑制スベシ。假令バ龍腦ニ消石ヲ加、與ルが如シ是ニ由テ壯神衝動劑ノ瞑眩ナシ。○神經虛憊甚グ若ハ腐敗ノ症ヲ見、ス片ハ純補活揚ノ峻劑ニ揮發性ノ蒸發劑前出ツヲ兼用メ的當ス。然、此幾那ノ收固性ニメ揮發性ニ非ル故ニ流行神經熱ノ疫毒ヲ揮發蒸散スル時節、病、毒大抵分排ノ後、專ラ虛憊ヲ挽回スベキ症ハ是ヲ用テ的當ス。但、亞兒ニアニ加根ニ幾那ヲ加用、レバ能揮發シ且保固強壯スル効アリ。○各醫一處有此方

各部焮衝合併病原 神經熱ニ各部一處ノ焮衝ヲ
 発スル者ハ全身焮衝合併ニ比スレバ甚ダ多シ。凡ツ
 肢體外部ニ於テ焮熱腫痛ヲ發スレバ則一^チ看メ直^チ
 ニ焮衝タルヲ知^ルト雖モ内部ニ是ヲ發スレバ能^フ其
 徴候ヲ細察スルニ非レバ辨知シ難シ。假令バ肺焮
 衝ノ如キハ纏^{ラフ}呼氣ノ熱スルヲ驗スルノニ疼痛
 アルモ亦焮衝ノ候トシ難シ。焮衝ニ非ズト雖モ疼
 痛ヲ發シ又腦肺及腹内諸藏ニ於テ些^{スルシ}疼痛ナク
 ノ大ニ焮衝ヲ發スル者アレバナリ。故ニ先^シ其病因
 ト症狀ヲ參診メ察スペシ。而^ハ之ノ外今

○ 内部各處ノ焮衝ニ三種ノ別アリ。其一ハ實症。其
 二ハ虛症。其三ハ假症ナリ。此三種ニ因テ病性ヲ區
 別シ治法ヲ考定ス。其虛實ノ二症ハ病因全^シ相反ス。
 實症ハ血脉ノ機力大過強盛ヨリ發シ。虛症ハ血脉
 ノ機力虧損虛乏ヨリ發ス。然^ハ血液其部ニ堆積ノ
 症候ニ於テハ異ナル^トナシ。然^{レバ}先^シ症狀ニ就テ
 焰衝ヲ察シ。病因^シ比較メ其虛實ヲ鑒識スルヲ要
 務^ス。而^ハ之^ニ其時ニ沐^マ陳煥入^リ也。

各部實症焮衝病原

各部實症、焮衝ハ患者ノ體稟。

焮衝質アルニ因ル。或、病毒アリテ患部ヲ刺戟スルニ因ル。但、病毒直ニ其部ニ在テ刺戟スル症アリ。或、他部ノ毒。患部ニ連及メ刺戟シ。焮衝ヲ發スル症アリ。○全身焮衝質ニ非ズト雖モ一部ヲ刺戟スル毒アレバ能、一部又焮衝ヲ發ス。故ニ全身ノ神經質、虛衰セル者ト雖モ亦能、實症ノ焮衝ヲ發ス。又各部資稟ノ元運力ニ強弱アリ。其感動ニモ多少アルニ因テ其部ノ焮衝モ亦虛實アリ。○神經熱ニ葡萄酒若ハ熱性ノ飲液ヲ過用メ各部ノ焮衝ヲ發シ或時令ノ寒氣ヲ肺ニ感メ肺焮衝ヲ發シ或平常通泄スル

血ノ閉滯若ハ時々刺絡スル人其期ヲ怠リ。或嘗テ屢々焮衝様ノ症ヲ患ヘ毎次刺絡メ治スルガ如キ人ニ發スルハ皆實症、焮衝タルヲ知ルニ足ル是患者ノ體稟ニ就テ病原ヲ考索スル者ナリ。

各部實症焮衝症治

各部實症、焮衝合併ノ候ハ内部各處ニ於テ焮衝人諸症(脳焮衝ハ頭痛譫妄剽々促迫、胸、腸、腑衝ハ胸肋刺痛ノ歟スル等其他諸藏ノノ焮熱疼痛等ノ癥、血湊積ノ候ヲ見シニ係ル症)其熱全身ニ増發シ殊ニ患部ニ甚シ血湊積頬面盈赤額熱シ眼焮赤頭及頸ノ動脈搏動甚々又右ノ諸症

副^フテ更ニ一種人強脉ヲ見スナリ然レ压皆必シモ盈實
ナルニ非ズ以上總體^{ニ係ル}症尚疑似不決ノ症ハ葡萄酒。其
他揮發強壯劑ヲ與レバ病勢忽^レ增長シ殊ニ頭腦ノ
諸症劇發ス。是皆多血焮衝ノ候ナリ○治法ハ防焮
衝劑及^ヒ瀉血法ヲ施メ其血ノ堆積凝聚セルヲ疏散
シ脉管過盛ノ運動ヲ減損スベシ。其標的ハ鎮針法。
若^ハ吸角ヲ患部ニ施シ凝血ヲ瀉スレバ全身ノ精
力虛耗セズノ最良トス或^ヒ瀉血法モ施シ難キ者ハ
加羅蔑兒^{カロノル}ヲ與^フベシ能^ヒ焮衝ノ凝血ヲ疏解スル衝動
藥トス○又發泡膏及^ヒ芥子泥ヲ貼メ患部ノ刺戟毒

ヲ他部ニ迎導メ甚ダ驗アリ○然レ此熱病ハ強壯
劑ヲ兼用メ虛憊セル神經質ヲ資輔スベシ但血ノ
運行ヲ增進セズ。熱性ナラザル藥ヲ佳トス即^シ纈草
根^{アラルニカ}亞兒尼^{アカ}加花遠志等ニ硝砂少許ヲ加^ヒ兼用スベシ
○神經熱ニ焮衝熱若^ハ胃腸熱ヲ兼併セル者ニ妄シ
ニ揮發衝動劑及^ヒ阿芙蓉ヲ與^フテ腐敗熱トナル者多
シ。故ニ先哲神經熱ノ焮衝合併ノ症ニ熱劑ヲ與^フ
テ講明セリ○胃腸熱。病毒ノ刺戟。腦及^ヒ胸部ノ諸器
ニ連及メ脳焮衝。肺焮衝。胸腸焮衝ノ諸症ヲ見ス者

多シ。此症ハ吐下劑ヲ的當トス。草醫動輒バ此症ノ
譖妄及胸脇痛ニ刺絡ノ危篤ニ至ル者少カラズ。
[肺熸衝] 實症ノ熸衝ハ胸及頭ニ發スルヲ最多シ。
肺熸衝ハ輕蔑スベカラズ更ニ戒慎ヲ加ベシ。殊ニ
以前是ヲ患ル者或既ニ勞歎ノ候アルガ如キハ最
危險トス。速ニ肺癆勞瘵トナレバナリ○總テ内部
熸衝ハ脉ヲ以テ診決シ難シ。肺及胃腸ノ如キ神經
多キ部ノ熸衝ハ脉沈小ニメ搏度齊ハズ。大ニ虛脫
セル者ノ如シ尋常熸衝ハ脉是眞ノ虛脫ニ非ズ。肺
熸衝ハ全身運行ノ血。肺ニ於テ阻遏シ壅滯ノ動脈

=充灌セザヒバナリ。腸及腹内諸藏ノ熸衝ハ其神
經痙攣ノ運動ヲ發スル故ニ動脈管亦攣急メ其血
管中ニ循行シ難キニ因ル故ニ譖妄ノ如キ脳熸衝
ノ症モ脉ニテ決シ難シ○神經熱ニ肺熸衝様ノ症
ヲ兼ル者ハ初發是ヲ虛症ノ熸衝トシ。揮發衝動劑。
鎮痙劑ヲ用ヒ假症ノ熸衝共ニ後出ノ如ク。畢竟是
ヲ神經熱ノ傍症トシ療スルヲ切實トス。是由テ
逾險重トナル所ハ始テ實症熸衝オシ療スベシ○
肺熸衝ハ蜞針法ヲ胸意施極血ヲ渴メ偉効アリ曾
テ神經熱ニ肺熸衝ヲ兼テ既ニ危篤ニ至ル症二人

ヲ診ス。俱ニ腕ニ刺絡ノ大効ヲ得タリ。就中一人ハ
醫家專ラ神經撲ニ注意メ。焮衝ヲ顧ミズ。多ク揮發
衝動劑ヲ連進シ。焮衝日增劇ス。于是ヲ診フニ脉強
盈ニメ。尚一回取刺絡ニ堪ベキ症ナリ。因テ刺絡ス
レバ患者既ニ呼吸不利。入日ニ至ル者。忽快利寛解
セリ。是故於テ遠志。纈草根等ヲ與テ終ニ全功ヲ收
ム。斯ノ如キ症ハ。刺絡後。胸ノ痛苦ヲ覺ル部ニ發泡
膏ヲ貼シ。且。硇砂。渴布羅膏名。硇砂揮發膏ニ渴布及
舍電阿芙蓉液ヲ擦メ。捷効アリ。○瘻癰様ノ喘息。呼
吸不利。短息甚キ。症ハ接骨木花。菲阿斯失亞密失鳩
内服セシムベシ。

答

等ヲ乳汁加、煮テ緩和。蒸湯劑トシ。胸部ニ施シ。
又接骨木花ヲ沸湯ニ浸シ。醋少許加テ其蒸氣ヲ嗅
引シ。遠志纈草根。亞兒尼加金硫黃。民塙列利精等ヲ
内服セシムベシ。

腦

焮衝 凡熱病。譖語狂妄等。腦ノ諸症ヲ發スル
者。刺絡メ。間効アル。是實症ノ脳焮衝ナリ。然ニ其
刺キ譖妄連繫メ。歇ザル症ノ癥ヲ剖觀スル。若脳及
脊髓毫ニ焮衝。微ナ者多シ。又險重ノ頭創等
精神錯亂譖語等。以脳焮衝メ症。ヲ發セル者ノ屍
剖觀スル。脳ニ毫毛焮衝。候。未者アリ。○胃腸

ノ病毒汚物。延テ頭脳ヲ刺戟シ脳焔衝ノ症ヲ發スル者訛。此症胃腸ヲ淨掃スニ非レハ治セズ。故神經熱中一部ノ焔衝ヲ發ス。毎テ胃腸病毒ノ有無ヲ察スルヲ肝要トス。右ノ症ハ吐劑。下劑。吉利詞。父兒等其症ニ隨ヒ施メ治スベシ。又先哲ノ經驗説ヲ考ルニ熱病ノ譖妄ヲ兼ヒ症ニ刺絡ノ譖妄逾増劇シ或刺絡後直ニ劇キ譖語ヲ發スル者アリ。是ニ吐劑若ハ下劑ヲ與テ譖妄忽林ニ諸症解散スル者必カ。テ是胃腸毒ノ刺戟腦ニ連及スル症ニメ脳焔衝ニ非ズ。卽胃腸熱ノ病毒壅鬱ノ症ナリ。然ヘ神

經熱ノ譖妄ハ腐敗毒。胃腸熱。膽液熱ヨリ來。症多ク或神經熱ノ一傍症トシ。妄ニ刺絡ノ危險ヲ致ス。ナク先假焔衝トシ療スルヲ切實トス。○實症ノ脳焔衝ハ胸焔衝ニ比スレバ少シ且神經熱ニ於テハ脳焔衝ノ如キ劇キ譖妄狂躁ヲ發スル者モ多ハ實症ニ非ズ。ノ大抵脳ノ痙攣ヨリ起ル所ノ假症焔衝ナリ。○然ニ神經熱ニ於テ實症ノ脳焔衝絶テナキ。非ズ。其候譖妄劇盛ニノ動輒バ狂躁シ譖語ト嗜眠ト更替發止シ或時々昏睡シ或自手ヲ以テ頭ヲ打額熱シ頬面憤盈焔赤或膨脹シ眼中焔熱ノ赤絡ヲ

見シ眼光恍暴異常。頸及頭ノ動脈浮起ノ劇ク築動ス。又葡萄酒。龍腦。阿芙蓉等ノ揮發衝動藥ヲ與レバ譖妄較著ニ増劇ス。○實症。腦焮衝兼併ノ治法ハ顛顚耳後項窩等ニ蝶針法八口若ハ十口許モ施シ或同數。吸角ヲ施メ漏血シ次ニ頭髮ヲ剃全頭ニ氷冷漏法氷ヲ囊ニ盛リ貼スヲ施シ項窩ニ大ナル發泡膏ヲ貼シ。腓ニ芥子泥ヲ貼シ。又刺戟性ノ藥ヲ吉利詞ステール爹兒トシ施ベシ。内服劑ハ甚ダ熱性ナラザル壯神劑。鎮痙劑ヲ用ベシ是ニ因テ其症仍休ザルキハ頭上ニナル發泡膏ヲ貼シ釀膿セシムベシ。○此焮衝動輒

ハ變メ壞疽トナリ或患部罷弊ノ虛症トナル故ニ初發ハ防焮衝法効アレ。既ニ時日ヲ經ハ害アリ。總テ神經熱ノ方法ヲ施シ且、阿芙蓉劑ヲ與テ尤効アリ。或云此症水銀○實症。焮衝ハ初防焮衝法ヲ施メ効アル症モ其後復諸症增劇。薦荐外止者アリ。是必實症變メ虛症トナル者ナリ能是ヲ察メ速ニ防焮衝法タ轉メ峻性ハ揮發強壯劑ヲ用且、龍腦ヲ用元大効アル。蓋龍腦ノ防焮衝ニ峻効ヲ稱スル所以ハ唯虛症ノ焮衝ヲ治スルノ。實症ハ焮衝ハ固ヨリ効力シ。故ニ實症變メ虛症トナル者或刺

絡過度ニテ虛症トナル者ニ峻効アリ○脳焔衝。肺
焔衝等ノ實症ニメ吸角。鍼針法ニテ漏血シ其後變
メ虛症トナル者ハ阿芙蓉。麝香等亦大効アリ。故ニ
未、漏血セズメ阿芙蓉。麝香類ヲ用ルト既ニ漏血メ
是ヲ用ザルト其害寃モ同一ナリト知ベシ。唯患部
ノ運營罷弱ナルニ因テ焔衝留連淹滯メ解散スル
ノ能ハザル症ニ阿芙蓉。麝香類ヲ用テ速ニ其壅滯
ヲ解散シ治スルニ闕ベカラザル要藥トス。其
各部虛症焔衝病原虚症ノ焔衝ハ素ヨリ虛症者
アリ或、實症變メ虛症トナル者アリ○素ヨリ虛症
アリ或、實症變メ虛症トナル者アリ○素ヨリ虛症

者ハ熱病ニ因テ全身虛憊セルヨリ發ス。此症殊
ニ神經熱腐敗熱ニ多シ。或、各部一處大ニ虛憊ノ發
スル者アリ○其實症變メ虛症トナル者ハ初、實症,
焔衝ノ刺戟ニ因テ患部ノ元運力大ニ罷弊シ遂ニ
全ク虛症トナリ或、初、焔衝ノ刺戟劇盛ナルヲ速ニ
防制セズノ縦ニ增長セシムルニ因リ或、攻漏ノ方
法ヲ過用スルニ因リ或、元來其部ノ元運力甚、壯實
ナラザル等ニテ精力速ニ虛憊ノ患部ノ血脉ニ凝
聚セル血液ヲ疏解驅散スル不能ザルニ因ル或、實
症ノ焔衝暫時誓留シ未ダ顯著劇盛ニ至ラズメ速

虛症ニ變スル者アリ。是暫時、焔衝ノ刺戟ニテ其部速ニ虛衰スレバナリ。故ニ虛症ノ焔衝ハ多々實症ヨリ變ス。是殊ニ神經熱ノ固有ノ症トス。血熱者、各部虛症焔衝症候。虛症各部焔衝モ亦血ノ患部ニ堆積メ焔熱疼痛等ヲ發スルト實症、焔衝ノ如シ。故ニ腦ニ在テハ譫妄ヲ發シ。肝脾胃腸等モ亦各自焔衝ヲ發ス。○腸焔衝ヲ發シ。肝脾胃腸等モ亦各自焔衝ヲ發ス。○然ニ虛焔衝ハ脉小弱ニメ收縮シ易ク。患者罷勞殊ニ甚シ。又脉ト諸症ト相反ス。即、虛症ハ脉力漸生メ盈充スルニ隨ヒ諸症逾寛解ス。脉小弱ナルニ隨ヒ

諸症逾增劇ス。是脉ト諸症ト相反スル者ナリ。實症勢強盈ナルニ隨ヒ諸症逾増進ス。是脉ト諸症ト相應スル者ナリ。就中脉ト呼吸ト相反ス。即、虛症ハ脉甚疾數ナレ。呼吸却テ緩徐ナリ。實症ハ脉缺數ナルニ隨ヒ呼吸逾短促不利ス。是ト呼吸ト相應。○虛症人脉疾數ナルハ脉管ノ機力。強盛増進メ然ニ非バ。唯其機力ノ虛憊セル者ナリ。又脉甚數ナルハ腐敗熱ノ一徵トシ。又瀕死ノ前兆トシ。虛脫人極テ甚キ者トス。其故ハ心藏罷勞甚キ。因テ心室能牽縮メ盡ク其血ヲ動脈ニ搾出スル。能ハズ其牽縮スル毎ニ多少血必心室ニ殘留故ニ。

次テ來血驟ク心室ニ盈滿メ荐リニ牽縮ノ機ヲ促スナリ。然レバ心藏其血ヲ一頓ニ搾出スルト能ハザル故ニ勉強テ荐リニ數々牽縮シ稍々ニ驅逐メ纏ニ其壅塞ヲ免ルナリ。然ハ其血ヲ動脈ニ驅逐スルト甚タ些少ナル故ニ其脉數ナルホド逾^{ワカ}血ノ運行遲緩ナリ。○煥衝ノ虛實ハ藥ヲ服メ後、發スル諸症ニ由テ逾^{ワカ}著實トス。卽^チ熱性、強壯劑ヲ與^フルニ煥衝增長セズノ減シ、寒涼劑ヲ與^フルニ其症増劇スルハ虛症トス。是ニ反スルハ實症トス。

各部虛症煥衝治法

虛煥衝ノ治法ハ毫モ思^フ煥

衝ニ存セス通例煥衝ト言ハ唯是ヲ神經熱ノ一險症ニノ患部ノ虛衰極^ムテ甚^ク殆^ト死壞シ壞疽トナントスル症トシ療スベシ。是故ニ最^モ峻性ノ揮發衝動劑。其他強壯劑ヲ常量ニ倍シ用^ヒテ患處ノ元力ヲ揮活提揚メ其煥衝ノ壅塞ヲ疏散セシムベシ。○其藥ハ幾那ニ葡萄酒、龍腦、麝香、阿芙蓉、^セ攝爾扁答、亞兒尼加等ヲ饒多ニ加用^フベシ。○凡内部ノ煥衝ハ芥子泥、芫青膏ヲ貼メ峻効アリ。腹内煥衝ハ刺戟甚^{シキ}擦藥、蒸湯劑。冷湯法ヲ外敷シ。又揮發強壯劑ノ吉利詞^ス爹兒^テ施シ。且^シ香竄強壯ノ藥ヲ蒸湯劑トシ施メ

大効アリ○右ノ如ク揮發衝動ノ峻劑ヲ施メ患部ノ元運動回復シ。焮衝漸減除スルモハ其剤ノ量ヲ減スベシ。否ラザレバ患部ノ精力滋生スルニ隨ヒ初ニ的効アル峻劑ノ刺戟ニ過テ害アレバナリ
各部假症焮衝症治此症ハ内部各處ノ神經大ニ病毒ノ刺戟ヲ受テ痙攣ノ運動ヲ發シ。假ニ焮衝ノ如キ諸症ヲ現スナリ。故ニ其部ノ脈管些モ焮衝ナ久。血液ノ凝聚堆積ヲ爲スナシ。然ハ是焮衝ニ非ズメ痙攣ノ一症トス其症ノ相似タルヲ以テ是ヲ假焮衝ト曰フ。固ヨリ内部ニ在故ニ患處。焮熱腫痛等。

ヲ見ズノナシ○其症。胸中ニ發スレバ劇キ胸脇痛。呼吸不利。掣急様ノ乾嗽ヲ發シ。或大ニ苦悶ノ呼吸壅塞セントス是肺焮衝或胸脇焮。腹中ニ發スレバ劇キ腹痛。一處ニ住留メ轉移セズ。且嘔吐シ或脇閉塞ス。其疼痛キ者ハ醫家誤テ胃腸肝等ノ焮衝トス。頭部ニ在テハ劇キ頭痛。譖語狂妄。ヲ發スルト宛モ草醫動輒バ症狀ニ炫耀メ刺絡ヲ施シ痙攣逾甚シ。諸症危劇ニ至。レザル者アリ。故ニ先其症ニ就テ痙攣。病性タルヲ診決スベシ○其候。脉小ニノ攣縮。

シ。搏度齊^{ソロ}ハズ。肢節熱セズ。却テ微冷シ。冷汗膚ヲ濡シ。或、惡寒シ。小便清稀ニメ水ノ如ク。若ハ勞責急迫ノ疼アリ。患者小心危懼メ安_シセズ或、呃逆呻吟大息。顫振筋惕肉瞶。咽喉縮窄。等痙攣ノ諸症ヲ兼_ス。就中確徴トスベキハ患部_{スコニ}モ熲熱セズ。血液聚滿堆積ノ候ナシ。假令バ呼吸不利劇クノ肺熲衝ノ如_シト雖モ氣息熱セザル。平人ノ如シ。是肺熲衝ニ非ル明徴トス。或譖妄狂躁スル。腦熲衝ノ如_シト雖モ額冷テ顏面赤色ナク眼中焮熱ナシ。右諸候ニテ仍診決シ難キ症ハ戒慎メ熱性揮發衝動劑ヲ與_テ試ベシ。是

ヲ與_テ患者忽_ク輕快ヲ得ル。片ハ果ノ假熲衝ニメ痉攣ノ運動ヨリ發スル症トス。○治法ハ唯鎮痉劑ヲ與フベシ。其藥ハ 阿芙蓉 菲阿斯失亞密^{ヒオシニアミ} 繁草麝香等ナリ。精力殊ニ虛憊セル症ハ葡萄酒^{アーヴィング}。亞的兒^{アーティル}ノ如キ揮發壯神ノ峻藥ヲ加ベシ。又鎮痉ノ効アル軟膏。蒸湯劑。殊ニ發泡膏ヲ患部ニ施ベシ。但胸痛腹痛ニハ直^ナ其部ニ施シ。劇キ譖語^ハ項窩ニ施ス等ナリ。又鎮痉ノ効アル藥ヲ吉利詞爹兒^{リスナル}。或浴湯トシ施メ良効アリ。○或病毒直^ナ患部ニ在テ刺戟メ此症ヲ發スルカ或他部ノ毒。患部ニ施及メ刺戟シ此

痙攣ノ運動ヲ發スルカヲ考索スル下肝要ナリ。若其毒ノ刺戟ノ發スル顯微アル片ハ其毒ヲ驅除スル藥劑ヲ兼用スルニ非バ治スベカラズ。假令胃ニ汚物アリテ刺戟シ假欬衝ヲ發スル者ハ吐劑ヲ與テ一吐スレバ即_ナ治ス。其毒胸部心下ニ在_ルハ吐劑殊ニ捷効アリ。若其毒腸ニ在テ發スル者ハ吉利詞_{キリ}父兒_{テル}ヲ施シ導泄ノ治スベシ。○傷冷毒ノ刺戟ニ因テ此假欬衝ヲ發スル者多シ。此症ハ發汗劑其他傷冷毒ヲ排泄スル劑ヲ鎮痙劑ニ加用テ治スベシ。新訂增補和蘭藥鏡卷十終。

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十一

幾那(六)

神經熱腐敗熱合併篇第七

血液腐敗溶崩徵候

腐敗熱總症

腐敗熱看法

腐敗熱合併病原

腐敗熱合併治法

潤燥斂血飲 清酸爽涼飲

爽涼幾那飲 葛私多僂鎮痙散

飲食

腐敗熱兼症治法

安質催吐飲

雙聖催吐散

物齋胃腸壅鬱

安質催吐飲

下利寒傷冷毒

漏汗

失血失氣

漏汗

小便不利

漏汗

鶩口瘡

清爽消毒水

蓐瘡

耳聾。脚腫。眼熾。腺腫。

新訂增補和蘭藥鏡卷十一

棕齋先生譯述

男

宇田川榕

榕菴校補

幾那

六

神經熱。腐敗熱合併篇第七

是卽腐敗

熱ナリ

共

其

始

人

之

之

神經熱ト腐敗熱ノ區別ヲ考究スルニ神經熱ハ神

已甚

ナダシ

キト

ノ

患ル

者ナリ

腐敗

熱ハ右ノ兩患アリテ又血液ノ溶解渙崩ヲ兼ル者

ナリ

神經熱

ト

腐敗熱

ノ

分別唯

是ノ

其溶解渙

崩ノ

腐敗

スル

崩ハ血液ノ腐敗^方ニ瀕キ者ナリ既ニ盡ク腐敗スル

ニ至テハ固ヨリ生機ナシ腐敗熱ハ血液未だ盡ク
 故ニ神經熱腐敗熱合併スル片々元運力ノ虚脱極
 テ甚クメ神經ノ機力殆ド廢弛スル者ナリ。故ニ一
 ニ是ヲ惡性熱ト曰フ神經熱、胃腸熱、腐敗熱、合併熱ト名ク初發直ニ腐敗ノ諸症ヲ見ズ者アリ。或時
 日ヲ經テ精力缺脱シ發スル者アリ。共ニ甚ダ危篤
 トス。是血液腐敗ノ前兆ニノ死スル者甚ダ多シ○
 然バ腐敗熱モ亦虛弱ヲ以テ病因トスル。神經熱
 ト同シ。然ニ是ヲ以テ同一種ノ病トセズ。其故ハ險
 重ノ神經熱ヲ患レ。一月許ニノ竟ニ腐敗ノ徵ナ

ク死スル者アリ。故ニ神經熱ニ血液腐敗溶崩ノ症
 ヲ兼ル者ハ即腐敗熱ト稱スルナリ。

血液腐敗溶崩徵候

其候神經熱ニ比スレバ脉殊

ニ細小ニメ疾數。又脉ト熱勢諸症ト相應セズ。即脉
 細小ナレ。熱勢ハ強猛ニメ燠ガ如ク肌膚乾燥シ
 热氣骨底ヨリ蒸發スルが如ク是ニ切按スレバ肌
 热逾甚クメ手裏ニ徹シ。憎熱暫ク指頭ニ殘ルヲ覺
 ナ。或粘汗皮上ニ淋漓シ臭氣アリ。或冷汗粘リテ油
 脂ノ如ク。或下利過多ニメ水ノ如ク是血液溶崩ノ下利小便稠濁黃赭色若ハ黒色ヲ帶ビ。黯赭火塗アリ。或大小

便失禁ス。氣息ニ便。汗唾皆敗屍ノ如キ腐穢ノ惡臭アリ。鼻口唇舌乾燥汚穢。舌苔粟殼色。若ハ黒ニメ裂紋アリ。或失血ヲ發シ。衄血吐血唾血斷血尿血等帶ビ。或暫尿器ニ在赤血色ニ變。其血黯赭色ニメ凝スル者アリ。共ニ血腥臭アリ。固セズ溶解ス。或皮上血斑ヲ發ス。敗血皮中ノ血絡或赭色鉛色青紫。點黑等ノ斑ヲ見。スヲ云。其形圓長廣狹一ナラズ。隆起セズ。或膠滯色ニノ顯著ナラズ。泛然トノ分界ナキ。如ク熟視セザレバ。辨シ難キ者アリ。或胸背ニ發ノ手足ニ火ナク面部ニ發セズ。或黑斑。咎痕ノ如ク。或青黑色ニノ隆起スルハ善徵トス。是皆惡徵トス。班赤色ニノ隆起スルハ善徵トス。凡神腐敗熱。惡性ノ發斑アレ。患者精此病惡性。發斑神錯亂。若ハ昏睡。死スル者多シ。此病惡性。發斑熱。粟疹熱ヲ兼ル者多シ。或鴉口瘡ヲ發シ。或壞疽ヲ。

生ス。是蓐瘡ナリ。或發泡膏ヲ貼ノ是皆血液溶解崩壊ノ漏泄スル者ナリ。○或瘡疹出沒次序ナク青紫色ニノ速ニ寒壞疽ニ變シ。良膿ヲ成サズ細胞ヲ兼子。炮中水液若ハ血色ノ酷厲液充ツ。此症多ハ青紫黑色等ノ斑ヲ兼子。或赤炮咽喉ニ生メ寒壞疽トナル者アリ。

腐敗熱總症

外大抵初起。頭鈍痛。肢體困倦。頭旋眩暈。不寐。食進マズ。或胃腸熱ノ症。兼々其後壯熱。稽留若ハ發歇往來。疲勞速ニ增加シ。脉數或否ラズ。肢體煩疼譖語或昏トノ眠ニト欲ニ。耳聾。眼中曇濁不

潔涙ヲ流シ面部藤花色ヲ帶ビ微渴ニ或大渴ニ堪
ズ。肢體振蕩瞶動。筋惕少腹膨脹シ患者漸ク虛脫メ
眼昏若ハ黒花現スルヲ覺ル者アリ最危篤ノ症ハ
呼吸甚ダ短促煩躁シ黯色ニ煤ノ如キ者チ吐シ
若ハ瀉下シ腹鳴休マズ湯液ヲ嚥下セバ喉間ニ激
ノ響ヲ爲シ眼中眊朧トメ半閑キ口顎閑キ眼耳鼻
口皆知覺ヲ失ヒ冷汗粘テ臭氣アリ大小便自利。蛇
ヲ吐スル等ナリ右ノ諸症漸次ニ増進シ遂ニ元運
力凝流ニ體共ニ虛竭ノ死ス死後一二時モ其熱去
ラズ肢節彊硬トナラズ是ヲ剖觀スルニ諸藏多ク

變壞メ溶崩セル敗血及寒壞疽様ノ斑アリ

腐敗熱看法

此病最劇盛ナルハ十二時中或第三

日ニノ危篤ニ至リ或第七日第九日ニメ斃ル者ア
リ慢症ハ三週ニメ劇症ヲ發スル者アリ○此病愈
ルト甚タ緩慢ナリ既ニ治スト雖モ罷勞久ク復セ
ズ或水腫トナリ或羸瘦長ク復セズ○病毒排泄ノ
候亦顯著ナル者甚ダ稀ナリ然レニ諸症減メ總身遍
々温汗ヲ發シ或小便中黃赭色ノ塗渣多ク生シ或
病毒外部ニ轉移シ各處ノ腺ニ凝聚メ膿瘍ヲ生シ
或口邊ニ瘡疹ヲ發シ或耳聾スルハ皆善兆トス○

患者少壯ニメ歟衝質ノ者ハ諸部歟衝ヲ發シ易キ
故ニ病勢危險ニ進ニ易シ小兒老人並ニ以前既ニ
此病ヲ患ル人ハ傳染ヲ免ル者多シ

腐敗熱合併病原 血液ノ腐敗ハ元運力ノ虛憊甚
キヨリモ亦能是ヲ發スル故ニ純粹ノ神經熱ニ於
テモ此熱病ヲ發スルトアリ故ニ總テ血液ヲメ腐
敗セシムル原因ヲ兼レバ是ヲ發スルト殊ニ甚シ
其原因ハ此病前既ニ患者ノ血質腐敗ニ傾ク者失
苟兒陪苦ケタルボイクノ毒アル者或天行若ハ住處等ノ腐敗氣
其他汚穢鬱敗ノ蒸氣ヲ氣息ヨリ吸入シ或消化シ

難キ肉類ヲ過食シ或腐敗膽液胃腸鬱敗ノ汚物ヲ
吐下劑ニテ清掃セズ或病室ノ鬱熱若ハ體中ノ劇
キ熱氣ニテ精力大ニ虛憊シ遂ニ血液モ亦腐敗溶
崩スル等ナリ殊ニ神經熱ノ病室ニ鬱蓄セル腐敗
ノ蒸氣ヲ吸入メ發スル者多シ

腐敗熱合併治法

トノ治法ヲ兼施スナリ故ニ勉テ凝流二體ノ元力
ヲ揮發活揚ノ其虛憊セル精力ヲ強壯充張シ且々血
質ノ溶解崩壊ヲ收固防護メ腐敗ヲ挽回スルヲ肝
要トス○其血質溶解崩ノ症ヲ遏止スルニハ神經熱

ニ用ザル藥モ亦効アリ。即礦酸類一山酸及阿煎藥。拳參根
礬精明礬ノ如シ其他植酸類ト名ク假令バ綠
幾那等亦良驗アリ。此症玫瑰丁幾那出爾良効アリ
スヘシ殊ニ礦酸ヲ此病人要藥トス。精力憊勞セル
者ハ尤良効ヲ奏ス。但熱勢甚ク。脉虛軟。顏面膨脹。譫
妄。發疹等ノ症アリテ焮衝ノ恐ナキ者ニ峻効アリ
○凡腐敗熱及膽液毒ノ熱病ハ收斂劑礦酸及醋ヲ
用ヒ殊ニ効アリ。神經熱モ海鹽精効多シ。或蒸餾水
ニ覆盆舍利別ヲ加與テ良効ヲ得タリ。○礦酸ハ適
宜ノ飲液。或粘汁ニ和シ與ベシ。假令ハ後方ノ如シ
後方ノ如シ

潤燥斂血飲

遇爾託亞根アーレタニア四錢

右水適宜ニ加煮テ八弓ヲ取。滓ヲ去リ後藥ヲ加フ
綠礬精患者其味ニ堪ルニ隨上一錢
若クハ四分ヨリ三錢ニ至ル
右攪和シ半時毎ニ半茶椀ヲ與ヘ或幾那煎ヲ加用
○或綠礬油二錢ヨリ四錢マデ日常人飲液一比ヨ
リニ北ニ溶化シ毎日適宜ニ服メ良驗アリ。假令ハ
後方ノ如シ

清酸爽涼飲

覆盆子水七弓製法名薄荷水ト同シ

綠藜精 一錢 麗春花舍利別名 一弓

右合和シ一匙。寃用フ〇礦酸類。悍烈ニメ用ヒ難キ。症ハ忽布^{サツブ}鎮痛液。或收斂亞的兒。或越栗失爾。赫篤立沃利^{リリ}_{共名}ヲ用フベシ〇明礬ノ効力亦諸礦酸ノ如シ。但血液溶崩ノ汗下利失血等ニ捷効アリ〇患者虛憊甚ク。血液運行遲慢ノ症ハ酸收藥ヲ禁ス〇凡胃腸虛弱ノ諸症ヲ治シ精力罷弊ヲ復シ又熱病ノ膽液ヲ吐スル症。嘔吐熱渴アル症。或血液溶崩及失^{カル}兒陪苦ノ諸失血。或外傷失血過多等ハ左ノ方殊効アリ。

爽涼幾那飲

幾那丁^{イナキ}幾劑^{イナキ}前ニ出

桂丁^{イシキヤ}幾劑^{イナキ}四錢

綠藜油

二滴或三滴。酸味ノ口ニ適フ^{ノ度トス}

右合和シ一時若ハ二時毎ニ十滴ヨリ三十滴マデ水一盞ニ點服ス〇諸方法ヲ施メ病勢増劇シ虛憊逾甚シ。腐敗轉進ミ。危險ノ症ヲ見ス者ハ揮發衝動劑ヲ用テ患者ノ精力ヲ挑起撥揚スルヲ專要トス然^レ病勢ノ輕重。感動ノ銳鈍。血液溶崩ノ微甚ニ隨^ヒ藥性ノ強弱。服量ノ多少ヲ酌料ノ適當セシムベシ。其藥力其過烈ナルトハ其害同一ナ

レバナリ其虛脫ヲ挽回スルニハ神經熱ノ治法揮
衝動劑保固強壯劑ヲ施シ勉テ其垂絕ノ元運力
云其用法モ亦同シ

ヲ活揚スペシ脉細弱冷汗膠粘聲音力ナク。肌肉陷
削膚色黯澹微々譫語。默々嗜眠。皮膚ノ諸管失常。皮膚諸管ノ失常ヲ治スル
枯燥或漏汗冷汗等云皮膚諸管ノ失常ヲ治スル
ハ殊ニ緊要トス。皮膚ハ病毒分利第一ノ道路タリ
バナ等ノ症ハ揮發壯神劑即揮發衝動劑ヲ用ベシ。殊ニ香

竄揮發酒製ノ品効アリ假令バ左ノ品ノ如シ

攝爾扁答

纈草根

白芷

昆答刺越爾發根

名

葡萄酒

龍腦

麝香

忽斯

忽律

葛私篤慢謨

揮發亞兒

加利鹽

砂華等

揮發油

香竄揮發

名

亞的兒 民塗列利精

右ノ品皆此症ニ闕ベカラザル要藥トス散劑若ハ
泡劑煎劑トシ多量ニ用ベシ又右ノ劑ヲ皮膚ニ擦
リ或吉利詞ス參兒アイルトシ施ノ殊効アリ○經年醇厚ノ
列印設酒ハ此熱病ニ最良トス多量ニ與ベシ
○葡萄酒ハ初少許寃與ヘ漸々加テ患者ノ意ニ適
セシムベシ過用スレバ眩暉惡心等ヲ發ス
○龍腦ハ効力殆ハ葡萄酒ノ如シ故ニ能同症ニ用
テ効アリ服量四丘ヨコ到五丘ニ至ル。最多キバ一時
若ハ二時毎ニ一刃マデ沙糖或乳劑ニ和シ與ブ

○攝爾扁答白芷昆答刺越爾發纈草等ハ浸劑若ハ煎劑トシ一味用或對症ノ藥ヲ加用ヘシ
 ○揮發亞兒加利鹽ハ脉虛軟搏度齊ハズ振搖スル症ニ的當ス
 ○麝香葛私篤僂謨モ右ノ藥品ト同様ナレ疎痙攣運動ヲ兼子小便濁滯稀薄肌膚乾燥脉緊小ニメ搏度次序ナキ症ニ殊効アリ小兒ハ一丘ヨリ三丘大人ハ一時毎ニ八丘ヨリ十八丘マデ與フ散劑トシ與テ尤良又左ノ二方殊効アリ

麝香定瘻散

麝香

上好者自六丘至八丘

沙糖

十五丘

右研和ノ散劑一服トシ大人ハ半時若ハ一時毎ニ一服

葛私篤僂鎮瘻散

麝香葛私篤僂謨

外沙糖

各半勺

宛用フ右研和ノ散劑トシ分テ十二服トシ半時毎ニ一服

○忽斯忽律ハ二丘マテ亞麻油一匙ニ溶シ水二弓ヲ和シ咽コ咸忽斯忽律三丘ヲ亞的兒一錢ニ和シ一時若ハ一時半每十滴宛用テ屢危険以惡性熱ニ

奇効ヲ得ル。先哲多ク稱說セリ○又銳烈ノ藥精ヲ以テ頻ニ脊椎胸間足蹠其他肢體適宜ノ部擦若ハ蒸燭シ或芥子泥ヲ腓及項窩ニ貼スベシ或揭布羅ヲ布帛ニ擦テ全身ヲ纏ヒ或冷水ヲ撒撥シ或冷醋冷水雪冰等ヲ以テ冷湯法トシ施スベシ腸虛憊甚キ者ハ殊効アリ或云冷醋冷水若ハ食鹽ヲ水ニ溶シ諸部ヲ洗浴メ此症ニ得タリ

○發泡膏ハ諸器ノ機力大ニ萎衰シ脉遲弱或嗜眠皮膚乾燥等ノ症ニ奇効アリ又發泡膏ノ一部メ刺戟ト雖モ能全身ヲ衝動ノ時善汗ヲ發スル者アリ。

隻腓若ハ兩腓或項窩或其症ニ隨ヒ右ノ諸部一齊ニ貼ソ良○發泡膏ニ由テ皮膚剥脱スレバ此病性ノ腐敗ニテ速ニ寒壞疽様トナル者アリ故ニ此膏ヲ貼メ皮膚赤色ヲ見ス時速ニ是ヲ去レバ右ノ患ナシ或悍烈ノ芥子泥ヲ以テ發泡膏ニ代ルモ良○其他揮發衝動藥ヲ腐敗熱ニ用ル方法總云神經熱篇ニ說ク如レ○右ノ治法ニ由テ元運力ノ將ニ亡脫セントスル症及肢體ノ虛冷神識ノ蒙昧神經感觸ノ太甚キ症殆ト回復スル片ハ始テ有形ノ病毐攘除ノ手段ニ注意スベシ但攻瀉驅泄ノ方法ハ戒

慎ヲ加ヘテ施シ渴血法ハ殊ニ意ヲ用ベシ腸ヲ淨掃スルハ吉利詞^{キリス}爹兒^{テアル}ヲ最良トス。殊ニ冷醋幾那煎ノ冷液ヲ施メ効アリ○大抵此病ハ揮發衝動劑ト保固強壯劑トヲ始終更^{カハヤク}互用ヒ。或驅泄劑ヲ要スル症ハ右ノ兩劑ニ配合シ若^ハ兼用スベシ。或他ノ熱病ヲ兼ル者モ其症ニ眩惑セズ一意ニ右ノ方法ヲ施ノ本病ヲ療スベシ○凡揮發衝動劑ハ唯一旦罷弊沈垂セル精力ヲ揮發提揚シ諸器ノ感觸微弱ナルヲ増進強壯スル道路ヲ啓クノミ保固強壯劑ハ揮發劑ニテ罷弊ノ精力ヲ挑起撥揚セル後ヲ承テ凝

流二體ノ本質ヲ保固シ諸器ノ機能ヲ強健ニス。故初メ揮發劑ヲ用ヒ終ニ保固劑ヲ施シ或保固強壯劑ニ揮發衝動藥ヲ加用ル等既ニ神經熱ノ治法ニ說ク所ノ如シ○脉管纖維縱緩弛解シ血液溶崩メ漏汗失血等ヲ恐ル症ハ保固強壯劑ヲ的當トス。揮發衝動劑漏汗失血等ヲ增進スルノ危懼^{オソレ}非^ズ。故ニ血液溶崩ノ症ハ專ラ用ヒズ必ズ幾那綠磬精等ヲ加用ルナリ○保固強壯劑ハ幾那其他苦味收濁ニノ香竄質アル藥最効アリ神經熱本病治法ノ條出熱ノ

沈細ナル症等ニ尤モ奇効アリ。舌上黒苔燥涸ト肌膚乾燥トニ拘ラズ多量ノ幾那ヲ用ベシ。散剤。水煎煉膏。越幾斯^{エキス}剤等ニ製シ揮發香竄藥ヲ加テ殊ニ良。散剤服シ難キ者ハ濃煎トシ用ベシ。卽^フ幾那三弓水二升煮テ半ヲ減シ分テ六服トシ六時ニ服セシム。或^フ幾那末四錢冷水ハ弓浸^スト一二時許數攪セ灑テ渣ヲ去リ。又幾那一弓水十二弓煮テ半ヲ減シ滓ヲ去リ。前ノ浸剤ト合和シ適宜ニ分テ六時ニ服ス。然^ル患者危劇ノ諸症ヲ發スルニ至テハ右ノ如キ多量ノ幾那ヲ服スルヲ能ハズ。○脉強。胃腸汚物鬱滯及煩衝ノ候アル者ハ皆幾那害アリ。○患者虛憊日甚クノ胃腸汚物仍除カザル者アリ。此症幾那ヲ與テ其虛憊ヲ救シトスレバ胃腸鬱滯ニ害アリ。下劑ヲ以テ汚物ヲ疏滌セントスレバ虛憊逾甚シキヲ恐ル。醫家毎ニ此兩端ニ遲疑ノ明次シ難シ。斯ノ如キ症ハ幾那ト輕キ下劑ト適宜ニ配合シ用ベシ。下劑ハ答末林度^{マリンド}大黃尤^モ効アリ。○此熱病ニ幾那ヲ用下利スル者、綠藜精。明藜等ノ收斂藥ヲ加^フ或^フ阿芙蓉ヲ加^フ用テ治スベシ。○幾那其他苦味強壯藥ハ長ク連服ノ諸症悉ク退キ。肢體ノ精力回復スルニ至ル。

增言和蘭藥錄 卷十一

及煩衝ノ候アル者ハ皆幾那害アリ。○患者虛憊日甚クノ胃腸汚物仍除カザル者アリ。此症幾那ヲ與テ其虛憊ヲ救シトスレバ胃腸鬱滯ニ害アリ。下劑ヲ以テ汚物ヲ疏滌セントスレバ虛憊逾甚シキヲ恐ル。醫家毎ニ此兩端ニ遲疑ノ明次シ難シ。斯ノ如キ症ハ幾那ト輕キ下劑ト適宜ニ配合シ用ベシ。下劑ハ答末林度^{マリンド}大黃尤^モ効アリ。○此熱病ニ幾那ヲ用下利スル者、綠藜精。明藜等ノ收斂藥ヲ加^フ或^フ阿芙蓉ヲ加^フ用テ治スベシ。○幾那其他苦味強壯藥ハ長ク連服ノ諸症悉ク退キ。肢體ノ精力回復スルニ至ル。

「肝要ナリ○幾那煎汁ニ醋少許加テ面部手足ヲ洗湯スル」毎日一兩次。或、幾那煎汁ヲ吉利詞^{ヨリス}爹兒^{テール}トシ施ノ殊効アリ

○冷水及雪水ノ冷湯法ハ此熱病ニ良効アリ。殊ニ腹滿甚キ症ニ是ヲ腹部ニ施メ奇効ヲ稱^ス然^レ久ク是ヲ施セバ大ニ血液運行ヲ減損メ却テ大害ヲ致ス^トアル故ニ慎重ヲ加ベシ○腐敗熱ニ浴湯甚効アリ。痙攣ノ症アル者。或皮膚ニ膠固ノ汚液粘著メ病毒分利ノ善汗ヲ妨ル者。其他皮膚排泄ノ障碍アル症ニ施メ殊効アリ○浴湯ニ加密列幾那其他

香竈ノ品對症ノ藥ヲ加^フ施ノ亦良効アリ。若精力甚乏弱ナル者ハ浴中及浴後葡萄酒ヲ適宜ニ與ベシ○腐敗熱ハ殊ニ病室ニ鬱蓄セル汚穢腐敗ノ蒸氣ヲ清掃シ^{ツコ}日常新鮮氣ヲ迎引スベシ否^ヲザレバ諸藥劑毛効驗ナシ。故ニ患者ノ肢體衣衾卧牀等モ亦淨潔ニシ^ム鬱敗ノ蒸氣ヲ祛^ム緊要ナリ

飲食

常用飲料ハ冷水ニ橙汁若ハ醋或綠礬精ヲ適意^ス和^シ與^ヘ。或溫湯ニ葡萄酒ヲ加^フ與^ヘテ良○飲料ハ輕淡新鮮ニ^ス酸性ノ者ヲ擇^ム與^{ベシ}假令^ハ能^ス熟セル果類。稻米大麥ノ稀粥煮汁ニ拘椽汁。橙汁。

若ハ葡萄酒ヲ加ルか如シ○腐敗熱ハ患者虛憊ス
特雖寒酸性醇厚ノ食料ニ由テ元運動ヲ活暢スル
肉食ニ勝セリ凡、肉類ハ甚^メ病歎ヲ増進スル故食
總^メ禁^メ之。患者精神漸^ク復^シ飲食消化之機力
始^メ壯旺スル新^メ肉類ヲ許シ與^テ甚^ダ捷効^カリ
腐敗熱兼症治法 腐敗熱ノ兼症、危劇ナル者速ニ
救^メサレハ死ス。或^ハ輕症ト雖モ是^ガ爲ニ本病ノ治^メ
妨^ル者アリ。乃^チ其症治^メ左ニ略舉ス
胃腸壅鬱 初發胃腸汚物壅滯ニ因^テ病勢甚^メト
メ淹留^シ或^ハ增長スル者多シ。此症患者ヲ虛憊セシ
メズノ速ニ病毒ヲ驅除スルニハ吐劑ヲ最良トス。
適宜ノ時節ニ是ヲ施セバ危險ニ至ラズ或^ハ全病殆^メ
ト解散スル者アリ。其後兩三日ヲ經テ汚物復^シ胃腸
ニ聚ル所ハ患者ノ精力堪^ルヲ量^メテ再^ヒ吐劑ヲ與^テ
吐セシムベシ。然^ハ精力虛憊ノ是ニ堪^ザル者ハ與^ル
ルノ勿レ○吐劑ハ太抵安質^メ没^シ扭转劑ヲ佳ト^シ殊^ニ
韃爾答^タ越^メ黒室^タヲ的當トス。其効力ヲ皮表ニ致メ蒸
氣及汗^メ發スレバナリ後方治驗多シ

安質催吐飲

韃爾答^タ越^メ黒室^タ

四瓜^タ蒸餾水

二湯

右溶和シニ二時毎ニ一匙宛與ヘ吐スルニ至ル○下利ヲ兼ル者及下利ヲ恐ル症ハヒ百葛格安那ヲ用テ吐セシムルニ的當トス。即後方夫與ベシ。

雙聖催吐散

又方
ヒ百葛格安那末十二丸
韓爾答越黙室一丸
右研和シ一服トス四分時毎ニ一服宛與フ。
ヒ百葛格安那一刀
韓爾答越黙室一丸
沙糖三刀

右研和シ分テ四服トシハ分時毎ニ一服宛與、吐スルニ至ル○吐劑外胃中汚物ヲ除クノニナラズ能、神經ヲ振蕩メ健運シ大ニ快復ヲ速ス故ニ此病ニ奇効アリ○下劑ハ仔細、慎重ヲ加ベシ少許ト雖モ動輒バ劇ク下利メ精カヲ劫奪シ神經熱人起因ヲ添増スレバナリ○腸中腐敗毒アレ、明晦メ患者未ダ甚ダ虛脱セズ且下利ノ恐ナキ者ハ下劑ヲ用ベシ。藥品ハ緩和酸性清涼ノ下劑ヲ佳トス。即答未林度酒石英滿那ノ如シ。又綠藜精ヲ飲劑ニ加用セ。或上好列印設酒ヲ一口宛與テ良或輕キ吉利。

詞^ス爹兒^{テール}ヲ施スモ良○初發。膽液熱ノ症^子ヲ兼^子或^ノ日^ヲ經^ス其症^ヲ發スル者アリ。凡^ニ流行^ス腐敗熱^ハ膽液熱^ノ病性多^ニ是^ニ尋常腐敗熱^ニ比^スレバ熱多^ク頭痛甚^ク久^ニ惡心嘔逆不食等胃腸毒鬱蓄ノ候多^ニ此症^モ亦吐劑尤^ニ効アリ。但^シ日^ヲ經^ステ既^ニ腐敗熱^ノ症^モ顯著ナル^ハ下劑的當トセズ若^ニ過用スレバ大^ニ精力ヲ劫奪スレバナリ。此症^ハ唯適宜^ス壯神劑^ヲ用^{ベシ}。但^シ胃腸毒アル^ニ因^テ腐敗ノ症^モ除^カガル者ハ右ノ例^ニ非^ス其症^ニ隨^日胃若^ハ腸^ヲ滌除スベシ○右ノ療法^ニ由^テ諸症漸^々輕差^ト得ル^ハ第八日^或

第十四日ニ^メノ病毒排泄ノ候^ニ自ラ汗若^ハ小便^ニ現^ハ回復シ爾後強壯劑^ヲ與^ヘテ全治スルナリ
冒寒傷冷毒^ニ腐敗熱^ニ冒寒^ヲ兼レバ初^ニ冒寒ノ諸症^ヲ發^シ時日^ヲ經^ルニ隨^ヒ精力漸^々虛脫シ^シ痰快利^セズ^シ或^ニ痰色變^シ若^ハ臭氣^ヲ帶^ビ遂^ニ腐敗熱ノ症候^ヲ現^ス即^チ神思昏憤[。]譫妄[。]粘汗[。]臭穢[。]下利[。]^{甚^ダ精^力奪^ス}四肢顫振[。]粟斑[。]血色斑^出前^ニ鵝口瘡[。]胸中懊悶大便失禁[。]精力非常[。]缺脫スル等ナリ[。]此病回復^ニ向^ハ利^ヲ進^メ精力虛脫^ヲ保護スル^ヲ肝要トス[。]乃^ハ防腐利^ヲ進^メ精力虛脫^ヲ保護スル^ヲ肝要トス[。]乃^ハ防腐

劑ニ發汗利尿。排泄劑ヲ配合シ用ベレ。○肺ノ諸症ヲ治セ略痰ヲ進ルニハ胸ニ發泡硬膏ヲ貼シ。内服スルニ遠志。亞爾尼加。土木香等殊効アリ。○腐敗熱ノ初起。傷冷熱ヲ發シ。各部腫痛シ。漸ク腐敗熱ノ徵ヲ見ス者アリ。其腫痛ノ部焮衝ヲ發スレバ速ニ寒壞疽ニ變スル者アリ。治法總テ腐敗熱ノ如シ。

下利 血液腐敗溶崩ノ下利ハ患者精力。下利ニ隨テ速ニ虛脱シ。下後却テ腹滿シ。其瀉下ノ物。腐敗質アル等ニテ知ベシ。此症甚ダ危險トス。速ニ止サレバ精力脱落メ死ス。治法ハ亞兒尼加根ニ阿芙蓉ヲ。

加散劑トシ用フ。或、乙百葛格安那ト大黃ヲ末トシ各少許。等分ニ調和シ。初發速ニ用フ。服量些少ニソ以テ下利ヲ止メ或幾那亞兒尼加葛斯加栗刺西瑪爾拔名等ヲ末トシ赤葡萄酒ヲ濕シ用フ。或明礬少許ヲ用テ亦効アリ。○香竈強壯藥ニ阿芙蓉ヲ加蒸湯劑トシ腹部ニ施シ若ハ是ヲ擦藥トシ。或香竈藥ヲ葡萄酒ニ浸シ腹部ヲ蒸湯シ。或粘滑ノ液亞刺比亞趣謨濃ノ類阿芙蓉ヲ加ヘ吉利詞爹兒トシ。或麥蘖ノ細末ヲ麥酒酵母ニ加テ泡釀セシメ是ヲ吉利詞爹兒トシ施メ捷効アリ。○腐敗熱ノ患者。鮮血若ハ赭色。黑色等ノ

敗液ヲ下利シ。惡臭屍ノ如ク。疼痛ナク。精力大ニ虛脱シ。腸壞疽ヲ生シ或失血ノ諸症アル者。是ヲ惡性腐敗下利ト名ク。腸炎衝若ハ膽液痢胃腸毒下利ノ誤治ニ由テ此症トナル者多シ。治法腐敗熱ニ隨テ前說ノ方法ヲ施シ勉テ腐敗ヲ遏止シ治ス。内藏炎衝ノ候アル者ハ速ニ緩和蒸湯劑ヲ作テ頻ニ全腹ヲ蒸湯ノ消散セシメ。炎衝退ク後ハ腐敗熱。神經熱ノ療法。前說ノ如ク施スペシ。然ニ病勢劇盛ナル症ハ治スル者罕ナリ。

漏汗 血液腐敗溶崩ノ漏汗。粘著ノ油ノ如ク。或

稀ノ水ノ如ク。臭氣甚ク。或粟疹ヲ兼發ス。漏汗ニ次テ粟疹及發斑アル者多シ。故ニ斑疹ハ漏汗ニ繼發スル一症トス。○漏汗ヲ發スレバ諸症速ニ危險ニ進ニ精力頓ニ虛脫ス。治法。新鮮清爽氣ノ病室ニ迎引シ患者ノ衾蓐ヲ薄クノ其熱ヲ減スベシ。熱蒸スレバ平人ト雖モ發汗スレハナリ。次ニ酸味收敛ノ強壯劑。次ノ失血治法ニ舉ル藥劑ヲ用テ治スベシ。失血 血液腐敗溶崩ヨリ發スル諸失血ノ治法ハ收敛強壯藥ヲ的當トス。即綠礬精明礬製綠礬即撒爾扶_{斯召}幾那阿煎藥等饒多用テ峻効アリ。○失血過

盛ノ症ハ綠礬精或皓礬若ハ醋等ノ收斂藥ヲ適宜
ニ冷水ニ和シ内服外敷ノ速効アリ漏汗劇キ者
令バ下血ニハ幾那煎ニ明礬。亞刺比亞趨謨ム亦殊効アリ假
利詞爹兒トシ施スガ如シ○諸失血ニ明礬殊ニ捷
効アリ然ニ患者其劇キ收敛ノ刺戟ニ堪ザル故ニ
亞刺比亞趨謨。菲阿斯失亞密。越幾斯劑若ハ番木鼈
越幾斯劑。阿芙蓉等ヲ適宜ニ加、抑制ノ良○熱劇キ
症ハ熱勢ニテ血液沸騰シ益崩血ヲ誘發スル故ニ
清凉劑良功アリ又冰冷湯法。冰水ヲ碎キ打。冰冷吉利
詞爹兒ヲ患部ニ施ノ捷効アリ

小便不利 腐敗熱ニ小便不利ヲ兼ル者ハ粘滑緩
和ノ劑ニ鎮瘡藥ヲ如テ内服セシメ又是ヲ以テ腹
部ヲ蒸湯シ或是ヲ吉利詞爹兒トシ施スベシ○或
果瓜類子仁ノ乳劑。製法。桃乳ト同シ。阿芙蓉少許如興テ
尤良○頑固ノ小便閉ハ測胞子ヲ施スニ非レバ治
シ難シ。大興安良。桑葉。大黃。大棗。甘草。大黃。大棗。大黃。大棗。
鵝口瘡 凡口内咽喉ノ瘡瘍ハ玫瑰蜜ニ蓬砂ヲ研
和メ患處ニ擦リ或酢漿葉ノ生汁。桑椹舍利別。佛甲
草生汁等ヲ擦テ皆良驗アリ。假令バ後方ノ如シ

佛甲草生汁 三錢 蓬砂 半錢

草生汁 玫瑰水

三錢

蓬砂

半錢

右研和シ患處ニ擦ス。此瘡ハ初發屢、肢體ヲ轉移メ患部ノ重壓ヲ避ケ。勉テ其部ヲ淨潔ニシ。底電愈瘡水^{アーデン}及鉛醋^{共名}少許ヲ加、洗湯スベシ。○蓐瘡及壞疽ノ如キ腐敗ノ症ハ綠礬明礬。阿煎藥。幾那拳參等ヲ蒸湯藥トシ施メ尤功アリ。○寒壞疽様トナル者ハ緩和劑ニ輕キ衝動藥ヲ加、外敷シ或麥酒酵ヲ貼メ其効諸藥ニ勝リ耳聾脚腫眼焮腫腺腫小病末ニ耳聾脚腫眼焮腫等。

ノ發スルヲアレ压大抵患者精力復スルニ隨ヒ自愈ユ。但頑固ノ聾ハ耳後ニ發泡硬膏ヲ貼メ最効アリ。耳孔ヨリ膿出ル症ハ微温乳汁ヲ水銃ニテ耳孔ニ注入シ淨刷メ尤良。○脚腫ハ香竈藥ノ蒸氣ヲ以テ薰シ輕く摩擦スレバ速ニ治ス。○耳腺腋下鼠蹊陰囊等ニ病毒凝聚メ腫起スル者ハ勉テ膿潰ノ排泄スルヲ緊要トス。消散メ内攻スレバ危症ヲ發スレバナリ。

新訂增補和蘭藥鏡標目
斯人山人醫要行之。前增八門丸。又以急急急急急急
細參附子。麻參參參參參參參。大川芎。甘草。白芍。白芍。
黃芩。知母。沙參。葛根。冬瓜。火麻。白芷。白芷。白芷。
生熟人。活血丹。大黃。川芎。白芍。白芍。白芍。白芍。白芍。
九。白芷。白芷。白芷。白芷。白芷。白芷。白芷。白芷。白芷。
白芷。白芷。白芷。白芷。白芷。白芷。白芷。白芷。白芷。
新訂增補和蘭藥鏡卷十一終

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十二

幾那

七

神經熱流行病性各異篇第八

神經熱流行疫症治

來衣大麥

神經

千五百六十六年

諸加千六百八十八年

千六百年

十七年同七年

惡性

千七百八十年同七年

千八百十三年同十三年

千八百六年同四年

千八百六年同七年

清涼氣

佩益增強

基貴陳草

大勝

冷湯法

附篇

神經熱治例篇第九 二則

青蓬硫酒石散 蓬黃纈草飲

雙聖湯吐飲 壯運纈草飲

纈草吉利詞ナル壯神纈攝飲

幾攝壯神飲 龍腦爽神散

芙蓉催睡飲 爽涼大麥飲

琳鱗鎮痙誘吐散 各異鎮痙加纈煎

幾攝爽神鎮痙飲

防腐蒸湯方

卷十二壯神丁幾劑

鎮痙排毒散

新訂增補和蘭藥鏡卷十二

榛齋先生譯述

男 宇田川榕菴校補

幾那

神經熱。流行病性各異篇第八

神經熱ハ沿門闔戸一般感染スル疫熱ナレ。流行スル毎ニ病性一樣ナラズ或、焮衝熱。胃腸熱。腐敗熱。惡性發斑熱等合併ノ症多キ故ニ歴世先哲ノ諸說亦異同アリ。今其經驗說ニ據テ古今流行疫ノ首症夫歷舉之。當年ノ病性ニ隨ヒ寒熱補瀉各異ノ療法

ノ施メ的効アル說ヲ左ニ略引ス。厭惡谷異ハ無矣。
○和蘭紀元千五百六十六年本朝永饑僅徭役連年
休メ。衆人困厄勞碌。饑飽節ナクメ一種少疫即チ神經熱流行シ。皆腐敗性ノ發斑熱ニメ血液溶崩ノ漏汗又兼
初發惡寒戰慄シ次テ壯熱焚ガ如久。或腹痛リ發行
精力速リ。精神昏憤。譫語或默々嗜眠。或狂躁ノ終昏睡シ。
是惡性候多頭腦ノ諸症ヲ發シ。殊頭痛劇ク。精神昏憤。譫語或默々嗜眠。或狂躁ノ終昏睡シ。
顏面黯澹陥削。舌燥黑。連縣不寐。聲音振搖或下利。腐敗性ノ咽喉腫ヲ發シ。或種々發斑大小形色一樣ナ
テズ全身ニ彌漫スレ。諸症寛解セズ。或肢節蓐瘡

ヲ發ス。或膣液質ノ下利。ノ發メ。病毒分利シ。或耳腺腫起メ。聾シ終ニ膿潰シ。治スル者アリ。○千六百八十八年本朝元年亦同様ノ疫熱流行シ。其首症大抵前說ノ如ク。初起ヨリ精力甚疲勞シ。烈キ頭痛。頭旋眩冒。次テ精神錯狂譫語。昏睡或發斑ス。草醫動輒ハモスレバ發汗劑及熱性揮發衝動劑ヲ投メ。大害ヲ致シ死スル者多。治法右兩回ノ熱病。大抵清涼酸收劑。接骨木傑列ヒ名等ヲ用。或消石精。若ハ硫黃精ヲ水ニ滴シ酸美ト爲用。或蜘蛛石ニ消石龍腦ヲ研和シ用テ皆良驗。ヲ得。リ多血厥衝症ハ初發刺絡メ大効ヲ得者アリ。

○千六百年本朝慶長五年以來。崩汗疫屢流行ス。病性極テ。惡厲ニゾ初起ヨリ汗大漏泄シ劇症ハ兩三日ニメ。斃ル治法專壯神強壯ノ峻劑ヲ饒多ニ用テ其暴脫ヲ防護シ救活セリ。然レ此症死スル者甚ダ居多。○千七百四十年以後十年間本朝元文五年ヨリ寛延三年至一一種天行疫流行ス。大抵前說症ノ如タキ五百六十年千六百八十八年。患者精力大ニ虛脫シ殊手臂振搖ス。初起恶心ヲ發シ精神甚タ沈重ノ時昏憤シ譖語狂躁或筋惕抽掣。多發斑ス。脉數ニメ搏度齊名ハズ。然レ細弱ナラズ。皮膚口舌燥キ病勢增長スレバ熱劇盛ニメ溶崩ノ下利。

ノ發シ終脉細弱沈微ニメ多ハ第七日ヨリ第十四日中ニ斃ル治法先病室ヲ清掃メ鬱蒸セル傳染不潔ノ惡氣ヲ除。初發吐劑ヲ與テ鬱蓄セル腐敗毒ヲ滌刷ノ皆大功アリ。是ニ由テ病勢過半潰散セリ。或再吐ノ要スル症アリ。肺嗽衝ヲ兼者ハ刺絡メ効アリ。頭痛烈ク譖語甚キ症ハ蜞針法ヲ顛顫ニ施メ瀉血ス。但脉力沈垂虛弱ナル者ハ瀉血法大害アリ。内服劑ハ蟇姑石消石ニ龍腦少許ヲ加散劑トシ用。脉及精力虛憊沈垂スルニ隨ヒ的里亞加及鹿角鹽精ニ保護強壯シ昆答刺越爾發攝爾扁答幾那葡萄酒。

等ヲ用。發泡膏ヲ貼メ皆良驗アリ。或右ノ如キ熱性衝動劑。葡萄酒等ヲ誤用シ或刺絡ノ譖妄ヲ發シ若ハ增劇セル者アリ。○又一種。疫熱流行ス。大抵前症ト同ノ患者大ニ虛憊シ神思昏憤頭痛ナキ者アレ昏憤ナキ者ナレシ多ハ初發ヨリ精神錯亂譖妄狂躁シ呼吸不利促迫煩悶。壯熱アラ燐ガ如ク。舌燥キ頸及腋下疫腫ヲ生ス。其毒烈キ症ハ病勢速ニ増劇シ或第三日ニメ死スル者アリ。治法此流行疫諸藥効ナク唯吐劑ニテ救活セリ。即韃爾答タタタ越黙室エメナ三丘ニ多ク水ヲ加テ溶シ一二匙宛與テ吐スルニ至ル。是ヲ此病ノ奇藥ノ如

シ用テ死スル者鮮シ。是ニ由テ皆吐劑或症ニ隨ヒ下劑ヲ與テ胃腸ヲ淨掃シ次ニ酸收劑及民塗ミシデ利精ヲ用。又龍腦ヲ與テ尤効アリ。但刺絡セバノ發泡膏ヲ貼ス終ニ幾那ロル攝爾扁答等ヲ與テ全功ヲ收ム。○千七百七十年同七十一年。本朝明和七年同八年惡厲ノ發斑熱流行ス。其首症。發斑譖語。昏睡シ血液溶崩ノ脫泄漏汗大小便失禁等ヲ兼又治法初發吐劑及緩下劑ヲ用テ病毒ヲ清掃シ。次ニ酸收劑植酸礦前出ヲ用テ其熱ヲ治シ。其危險ニノ精力虛脫ノ症ハ幾那劑ヲ與テ効ヲ得ナリ。但刺絡ハ皆害アリ。按此病肅敗

○千七百八十二年本朝天明二年流行熱。疫毒暴烈ニメ舉國速ニ傳染ス。初起傷冷毒ノ諸症ヲ兼子。其毒深ク内藏ニ侵入シ患者速ニ虛脱シ。熱勢劇盛ニメ或、焔衝熱ヲ兼子。或、歎嗽呼吸不利甚シノ肺焔衝ヲ兼子。或、神經感觸ノ諸症甚シク。或、胃腸熱ヲ兼併セリ。**治法** 指發壯神劑ヲ標準トシ防焔衝劑清涼ヲ兼用シ。焔衝甚キ者ハ瀉血法ヲ施シ或、下劑ヲ兼用メ皆良驗ニ得リ。

○千八百年ヨリ同四年本朝寛政十二年ヨリ文化元年ニ至ルマデ赤班熱流行ス甚ダ惡性ニメ一般傳染シ皆頭腦及シ神經ニ侵襲スルヲ甚シノ劇症ヲ發ス。**治法** 大抵揮發衝

動強壯ノ峻劑ヲ施メ多ク救活セリ

○千八百三年本朝享和三年一種ノ疫熱流行ス其症初發惡寒發熱。頭痛烈シク。視聽ノ感觸已甚シ。モ晴明物響ニ堪ズ。小便稠濁。下利ヲ兼子。肢節顫振筋惕瞤。動。譫妄或、嘔吐呃逆ヲ發シ。遂、血液溶崩メ自汗淋漓或、大便。血ヲ交テ黑色。或、衄血ヲ發シ舌燥黑ニメ中央微赤。兩邊殊ニ燥硬。又精神昏憒。全觸知失ヒ。脉細數。煩躁。痙攣運動。**風氣腹滿**或、壞疽ヲ生シ或、小便卒ニ清澄ニメ水ノ如ク是ヨリ死兆トス大抵第五日ヨリ第十一日中ニ死ス。右ノ諸症ヲ考究スルニ一ハ病毒頭腦

及神經ヲ侵襲ノ發ス。卽^シ神經熱ナリ。一ハ病毒。脉管質ヲ侵襲ノ發ス。卽^シ腐敗熱ナリ。治法其多ク神經熱ニ係ル症ハ頸項ニ角法ヲ施シ。芥子泥ヲ疎ニ貼シ。礦酸^{綠藜精・硫}的里亞加精ヲ與レバ大抵其增長ヲ遏止ス。病勢增長スル代ハ龍腦麝香ヲ用。且^シ龍腦醋泡膏阿芙蓉ハ此病ニ應セズ皆害アリ。病勢漸衰ヘ唯神經感動ノ症甚キ者ハ幾那煎ヲ用テ自ラ治其腐敗熱ニ係ル症多者ハ初發吐劑大効アリ次ニ幾那ニ阿芙蓉攝爾扁答白芷大黃葡萄酒等ヲ加用。

テ効アリ。刺絡ハ總テ害アリ。唯病室ヲ清潔シ爽涼氣ノ開通スルヲ緊要トス。○右神經熱ニ係ル諸症多者ノ屍ヲ剖觀スルニ腦中黒血聚滿シ。腐敗熱ノ症多者ハ胸腹諸藏殊胃腸ニ黒血多ク瀦留セリ。○千八百六年同^シ七年本朝文化三年同^シ四年惡厲ノ神經熱流行ス。其症初發ヨリ精力極テ罷勞シ。肢體顫振精神昏憤譁語。昏睡筋惕及痙攣ノ運動ヲ發シ脉細數。熱勢過盛ナラズ動輒^{ヤモスレ}バ温煖平日ノ如シ又初發ヨリ下利メ休^ズ是^シ血液溶崩下利ニメ其他漸次ニ血液溶崩ノ危症。壞疽等ヲ發シ大抵第八日ヨリ第十四

日ニ死ス。但發斑アル者少ク。焮衝ノ候ナク唯精力虛憊ノ腐敗溶崩ニ傾^ム。此病性トス。腐敗性神經熱治法。初發審察戒慎メ揮發衝動劑ノ緩性ナル者ヲ用。卽^シ塙^デ列利精。纈草根[、]稀泡劑及^テ阿芙蓉液少許。宛與^テ浴湯ヲ施メ多回復セリ。其既ニ增長セル者ハ最峻ノ揮發衝動劑ヲ用[、]酸收劑^{〔綠礬精^{ウツキフリタシ〕}}

等ヲ云ハ下利ヲ增^ス故ニ用^ス。但阿芙蓉ハ卓偉ノ効アリ能^ム精力虛垂ヲ發揚シ危劇ノ諸症ヲ挽回スルコ甚^ム多シ。然^ム压劇キ下利。昏睡。脉疾數ナル症ハ阿芙蓉。葡萄酒等自餘。揮發衝動劑ノ過用ヲ戒メ甚^ム緩劑トシ用[、]頭ノ諸症多^ク及^ム少

壯多血ノ者ト雖モ刺絡ヲ施メ害アリ。但肺焮衝ヲ兼ル症ハ刺絡ノ速効ヲ得^ム者アリ[、]或^テ葡萄酒一二盞ヲ與^フレバ譖語。下利。昏睡。筋惕等ノ症忽^ク寛解シ。脉ノ細數減シ。精神錯亂靜止メ爽快ヲ得ル者アリ○近年ノ流行疫^{〔千八百十二年同十三年ノ神經熱ヲ云〕}本朝文化九年同十年亦大抵前症ノ如シ其症。初起惡寒戰慄シ次^テ發熱稽留。大ニ罷勞シ食進^マズ又總テ三件ノ症ヲ發ス其一ハ精神昏憊。頭旋眩暈ナリ其二ハ肢體顫振メ定持シ難シ其三ハ脚痿弱ノ步履シ難シ是ニ次^テ諸症増劇シ殊ニ頭痛劇ク。頭中困重壓迫。嗜眠。睡中煩擾。

譖語等ノ頭腦ノ諸症甚シ。脉數若ハ緩ニ。ノ搏度齊
ハズ或虚軟細小或頗盈張スレバ強實ナラズ。皮膚
乾燥熱勢時ニ増發ノ燠ガ如ク或温煖平日ノ如シ
或面部盈赤眼光異常時鮮朗或曇黯眼陷凹視神乏
弱病增長スレバ小便赭赤焮熱シ或赭麥酒ノ如ク
ニノ稠塗ヲ生ス但小便卒ニ澄清ニノ水ノ如ク上
面浮翳ヲ現スハ死候トス危篤ニ至バ呃逆昏睡譖
妄大小便失禁胃管麻痺メ嚥下ヲ妨グ舌癰ノ言_フ
能_ス右數症ハ殊ニ此病患者大抵第四日ヨリ第十
性ノ見ハス者ナリ。患者大抵第四日ヨリ第十
八日中ニ昏睡メ死ス○或胃腸熱肺焮衝ノ諸症ヲ

兼子或惡性發斑熱ヲ兼ル者甚多シ或衄血ヲ發メ
諸症寛解スル者アリ○此熱病ハ溶崩下利筋惕搐
掣様ノ症稀ナリ。是ヲ以テ前説ノ流行熱ト分別ス
前ノ十八百六年同七年治法神經熱ハ卽流行傳染疫ニノ或胃
腸熱腐敗熱ヲ兼ル故ニ吐下劑若ハ防腐劑ヲ兼用
シ焮衝ヲ兼レバ各部瀉血法ヲ施スノニテ刺絡
ヲ禁シ大抵揮發衝動劑保固強壯劑ヲ主トシ用ル
ヲ常法トス卽前説ノ流行熱ハ葡萄酒及揮發衝動
劑ヲ與レバ頭腦ノ患症速ニ減シ脉亦緩ヲ帶ヒ寒
涼攻瀉人劑ヲ投スレバ諸症忽_ク增進スルガ如シ然

ニ近年人流行疫ハ熱性衝動壯神塗諸劑。葡萄酒等ヲ與、レバ劇症減シ殊ニ頭腦ノ諸患輕快ヲ致シ刺絡亦効ヲ得タリ。或初發吐劑ヲ與テ大効ヲ得ル者アリ。然所以ヲ考究スルニ當時流行ノ疫毒各異ナル由テ或神經質ヲ侵襲スルト少々タメ大其脈管質ヲ損害シ或專神經質ヲ侵掠ノ脈管質ヲ毀傷スルト少キ等ニテ各自病性ヲ異ニス。又衆人一般體力旺盛強健ノ時アリ。或虛缺脫力ノ罷弱ノ時アリ人類ナラバ獸類其旺盛ノ時ハ煥衝性ノ病多々。虛罷ノモ亦然リ。

時ハ神經熱多シ。諸病皆然リ。又地方ノ高卑時令ノ燥濕ニ由テ病性ヲ異ニス。卽卑濕ニハ神經熱腐敗熱多々。高燥ニハ煥衝病多シ。或神經感動甚キ人或凶厄失意等大ニ神思ヲ勞傷スル者疫毒ニ感スレバ神經熱トナリ。少壯多血ノ人ニ感スレバ煥衝ヲ發シ諸症亦劇盛ナリ。是以テ疫熱ハ一定ノ治法ナシ。唯其毒神經ニ感襲スル居多キ故ニ神經熱ト稱スルトニ。然レバ毎常新發ノ流行病トシ始テ其病性ニ蹤跡メ方法ヲ考定シ寒熱補瀉其症ニ應メ變易シ必常套ニ拘ラズ。同病ト雖モ一軌轍ニ據ラズ。

メ的効ヲ得ルト多年歷驗明試スル所ナリ○或病
毒種々兼併ノ多少ニ由テ病勢輕重アリ輕症ハ醫藥ヲ假
感染人淺深ニ由テ病勢輕重アリ輕症ハ醫藥ヲ假
テズメ自愈シ或傳染鮮少ノ者ハ熱病ヲ發スルニ
至ス唯身體虛憊メ遷延神經病トナル者アリ○或
神經熱ニ惡性發斑熱ヲ兼_子諸症極テ劇盛ナレ凡其
毒頭腦ニ襲入セズ死ニ至_ルマデ精神些_{スコ}モ錯誤ナキ
者アリ○凡病院ハ狹隘鬱閉ノ室ニ衆人雜沓羣居
シ日夜腐敗ノ蒸氣ヲ氣息及皮腠ニ吸收スル故ニ
熱病皆惡厲ノ腐敗熱トナリ血液溶崩ノ脫泄腐敗

交血ノ下利。其他失血壞疽等ヲ生ノ臭穢ニ堪_ズ多
死ス然_ルニ病室ヲ淨潔シ羣居ヲ禁シ常ニ新鮮氣ヲ
開通スレバ熱病皆善性ニノ熾衝様ノ神經熱トナ
ル者多シ○右所說ノ如ク近年流行ノ神經熱ハ總
テ熱性揮發衝動劑ヲ與レバ病勢増劇メ多害アリ
殊ニ險重ノ症初發ニ是ヲ用レバ頭ノ諸症ヲ增進
シ血ヲノ頭腦ニ聚滿セシメ熱ヲ増發ス或些少ノ
龍腦阿芙蓉纈草等ヲ用或葡萄酒ニ多水ヲ加與レ
ば病勢轉劇ク頭ノ諸症殊甚シ凡血ノ運行ヲ減損
シ防歟皮表ノ壅塞ヲ宣通スル劑清涼ノ蒸發劑ヲ用レバ

熱減シ血ノ頭脳ニ攻衝スル症漸靜止シ腰理通暢
シ蒸氣開達スルハ殊日大便通メ大抵全功ヲ奏セ
此病ニ緊要トス。殊日大便通メ大抵全功ヲ奏セ
リ其藥劑ハ硝砂。安質沒扱酒。民塗列利精及醋。答末
林度ノ如シ又初發鹽酸劑殊ニ良効ヲ得タリ。即海
鹽精ニ多水ヲ加稀クシ用ルガ如シ消石ハ血液運
行ヲ減損スルト甚キ故ニ用ス。○頭脳肺肝脾等各
部煥衝ノ症アレ。圧瀉血法ヲ施シ難ク。揮發衝動劑
モ亦害アル。症ハ是ニ代テ加羅蔑兒ヲ多量ニ用テ
患部ノ凝血ヲ疏解メ大効ヲ得タリ。○此熱病大抵
初起ヨリ六七日ヲ經テ熱勢減セズ。頭脳ノ諸患逾

增進シ。精力虛憊轉加ル症ハ右ノ方法ヲ用ル際更
ニ細察戒慎メ壯神劑ヲ用ベシ。即龍腦ニ消石若ハ
硝砂ヲ研和ノ散劑トシ一丸若ハ半丸ヲ一服トシ。
一時若ハ一時半毎ニ纈草泡劑ニテ送下ス。此龍腦
劑ニ由テ譫語狂妄ノ症靜止シ。肌膚和柔メ能蒸氣
ヲ宣發ス。○右ノ壯神劑ヲ與テ寸効ナク脉虛細精
力甚缺脫シ昏睡譫妄顫振增加シ或痙攣ノ運動ヲ
發スル者ハ阿芙蓉劑速効アリ。大抵十二時中ニ惡
症消散ス。既刺絡若ハ攻瀉ノ劑ヲ施メ諸管纖維弛
緩セル者並多ク清涼劑ヲ施ス者ハ殊効アリ。但過

用スレバ害アリ。假令ベ舍電阿芙蓉液ヲ取り大抵一時半毎ニ二滴若ハ三滴宛與ヘ。一兩日用テ適應ス。長服スレバ却テ害アリ○亞兒尼加根攝爾扁答々每常此熱病ニ大功ヲ奏ズ。亞兒尼加ハ殊疫熱ニ特効ノ藥トス○元運力大ニ虛憊シ。病毒。神經ヲ侵襲スルコ甚ク。皮膚乾燥休マズ。動輒バ肢體各部冷ルトアル症ハ麝香ヲ一兩次用ベシ。能皮腠ヲ宣開シ腠理開通メ津潤ア。神經質ヲ和調シ此症ニ確當メ。無比ノ殊効ヲ奏ス○下利アレ。剽シカラズ。病勢是カ爲ニ增長セサル者ハ是ヲ閉止スルコ勿レ。若是カ爲ニ增長セサル者ハ是ヲ閉止スルコ勿レ。若

阿芙蓉劑ヲ與テ遷ニ遏止スレバ腹部諸藏ニ焮衝様ノ諸症ヲ發シ或瘀血。頭腦ニ攻升シ或呃逆。風氣腹脹及熱勢増發等。危篤ノ症ヲ崩生ス○或胃腸熱ヲ兼テ自下利ヲ發シ其毒排泄スルハ佳兆トス。其下利少キ者六下劑ヲ與テ是ヲ助ケベシ○下利水瀉若ハ失禁メ脉細弱精カ沈垂虛憊スル者ハ速ニ其下利ヲ閉止スペシ此症ハ漿粉前ニ出ツニ阿芙蓉液十滴若ハ十五滴ヲ加吉利詞アーリス翁兒トシ施ノ捷効アリ○十年以前流行ノ神經熱ハ刺絡及防焮衝劑大害アリテ揮發衝動強壯劑皆偉効アリ。是ニ反メ近

年流行ノ神經熱ノ刺絡。防燃衝劑共ニ多良功アリ。凡少壯多血力人。刺キ頭痛或精神昏憤。譖妄。頬面眼中燃赤。頸動脈。頭部動脈ノ搏動甚^ク或胸腹諸臟燃衝ノ候アル者ハ初發一兩日若ハ第七日中ニ刺絡メ捷効ヲ得タリ。殊ニ飽煩優給ニメ多血壯實ノ患者ハ是ニ由テ死ヲ救^フ多シ。大抵初次刺絡メ刺キ煩躁。精神昏憤。頬ニ寬解シ再發セズ或微譖語スルノ主若再煩悶スレバ再刺絡シ或既ニ第十二日至ル者。及農夫脚力ノ如キハ第十四日ニ是ヲ施シ。譖語連続既ニ八日ヲ経ル者モ治スルトアリ○然レ

刺絡ハ毎常必効ヲ得ルニ非ズ或患者虛憊シ若神經感動甚キ症ハ多ク濁血ノ死スル者アリ。凡當年流行ノ疫毒。及各國住地ノ病性ニ因テ其應否。亦一樣ナラズ。故ニ其疑似不決ノ症ハ刺絡ヲ輒テ各部濁血法ヲ施メ切實ナス○肺及胸腸ノ燃衝ハ既ニ數日ヲ經ル者モ饒多ニ刺絡ノ良功アリ。腦燃衝様ノ症ハ刺絡メ害多シ動輒^{ヤモス}バ譖妄等增長シ或麻痺及血液溶崩ヲ崩生ス。故ニ若血ノ頭腦ニ攻升セル症アル^トハ顛顛。且後頸項ニ蝶針法若ハ角法ヲ施スベシ。始終多ク施スト雖モ損害ナシ又芥子

泥ヲ腓、蹶ニ貼スレバ能^シ頭腦ノ病毒引降シ其諸症ヲ寛解ス。○發泡膏^モ亦頸項等ニ貼シ化膿ノ良驗甚^シ。○血氣散、頭顱散、頭瘻散、大頭瘻^スヘ對^シ敷^シ、血或頭瘻散^スヘ對^シ敷^シ。○清涼氣^ス。凡^シ疫熱ハ新鮮清涼氣ヲ患者ノ室ニ迎引シ又其卧榻衣衾未淨潔^スルノ最好緊要事ニメ疫毒ヲ驅散スルニ極^シ大効アル一療法トス。殊^ニ近年流行ノ症ハ患者ノ保護溫煖ナレバ病勢逾^ク増長^シ保護清涼ナレバ病毒^ス消解シ^ソノ常内服劑^ヲ用^ス。外^ノ治スル者甚^シ。總^ニ爽涼^ス新鮮氣ヲ通暢^シノ病室ノ腐敗氣ヲ攘掃スルキハ其効功藥劑ノ比ス。

ベキニ非ル。古今名哲歷試ノ確證セル所ナリ。○寒冷氣ハ其効防歟衝^ス非ズ。挑^シ搔^シ揚^シ爲^スニ非ズメ能^シ疫毒ヲ消尅^ス。凡^シ疫熱ハ凝流體ノ熱蒸沸騰ノ病トス。寒冷氣ハ能^シ其熱蒸^ス抑遏^スノ内熱ヲ消シ疫毒沸騰ノ銳勢ヲ摧制^シ。一^ハ皮膚ノ熱蒸^ス涼解スルヲ以テ腠理ト肺トニ壅鬱セル。病毒ヲ泄泄セシム。殊^ニ冷湯法良功アリ。又一ハ日夜患者ノ氣息ヨリ吐出セル腐敗ノ疫氣。病室ニ熏蒸スル^ス宍^モ密雲稠霧ノ如ク患者ヲ圍繞^シ。日新轉增ノ神經ヲ侵掠シ血液ヲ沸騰スル^ス猶礦炭ノ毒烟中ニ在^ルか如シ。

此毒烟ニ中レバ卒升暈故ニ新鮮氣ヲ迎引シ毒蒸倒江次テ癥不遂ニ罹ル故ニ新鮮氣ヲ迎引シ毒蒸氣ヲ排遣メ大効アルト死モ毒烟ニ觸テ暈倒スル者爽涼氣ヲ得テ忽蘇活スルガ如シ。然バ先其鬱敗氣ヲ除クニ非レバ峻効アル内服藥モ應驗ヲ得ド能ヘズ。○腐敗性ノ惡痘ハ清涼氣ヲ病室ニ迎引メ其鬱敗ノ毒氣ヲ排遣スレバ瞬間ニ其惡症ヲ挽回スル一療法トシ是ニ由テ大効ヲ得ル者甚多シ。冷湯法。冷湯法ハ此神經熱ニ大効ヲ得タリ。但是ニ三法アル。其一ハ各部湯法ナリ。是ハ冷水若ハ雪。冰ヲ取テ患部ニ打湯ス。喻ヘ患症頭ニ在カ如ハ。

是ヲ頭部ニ施シ腹部諸藏ノ煥衝及痞氣腹脹等ハ是ヲ腹部ニ施スガ如シ。腐敗溶崩ノ下利ヲ兼症モ亦捷効アリ。冷水ハ布片ニ浸シ。雪。冰ハ水若ハ醋ニ水ヲ加稀クシ。全身皮上ヲ洗湯スルナリ。凡熱病皮膚乾燥ノ症並ニ粘汗若ハ稀汗アル症ニ是ヲ施セバ皮膚ヲ衝動メ蒸氣ヲ挑發シ腠理ノ病毒分利ヲ進起シ。皮膚ノ病毒ヲ分利スルハ熱以テ壯熱ヲ解散シ病勢ヲ減除ス。但。病毒分利ノ微汗及蒸氣融發スル症ハ冷湯法ヲ禁ス。○其三ハ冷水ヲ患者ノ身體ニ滴注スルナリ。是尤奇効アル。一法

トス。凡、熱病ノ初發。患者少壯強實。皮膚燥熱スル者ニ施ノ効驗駭捷ナリ。然レ寒冷最劇キ故ニ過用スレバ害アリ。壯實ノ人ト雖モ甚多血ニメ表部ノ血脉大ニ盈脹セル者ニ是ヲ施セバ其血遷ニ内藏ニ反流内攻シ。殊ニ腦中ノ血脉腫脹メ管外ニ泛溢シ。患者昏睡卒倒ス或老人小兒虛人。神經感動シ易キ人。肢體甚虚羸ノ者。各部殊ニ罷弱セル者。肌膚津潤アル者ニ是ヲ施セバ暴烈ナル寒氣ノ刺戟ニ由テ虛憊ノ精力ヲ劫奪シ。卒ニ温煖氣ヲ撲滅メ腦髓麻痺シ昏睡卒仆ノ死ス○千七百二十九年本朝元禄十四年

惡厲疫熱流行スルト九個月。皆清涼氣並冷湯法ヲ施シ或冰ヲ以テ總身ニ摩瀉スルノニテ内服藥ヲ用ズ危劇瀕死ノ症ヲ救フ甚ダ多シ此流行病ハ多ク漱衛性ニ屬スレバナリ○前説ノ千八百七年人神經熱ハ温浴湯及温湯法温湯ニテ蒸湯スルヲ云總テ良効アリ殊ニ汗アル症及患者虛憊メ病毒ヲ抗拒スベキ精力ナキ者ニ驗多シ此症總テ冷湯法害アリ然レ病ノ初發ス時頭ニ冷湯法ヲ施ノ甚ダ良益々大變外近暴

神經熱治例篇第九

神經熱ノ治例ニ則テ舉グ。一ハ患症甚ダ變化シ易ク。一ハ極テ頑固險重ナリ。○一男子二十歳資稟虛弱。十月初旬熱病ニ罹リ。食進マズ且々嚥下ヲ妨グ。患者從來屢々咽喉腫ヲ患フ。但シ今回ハ過酒メ風寒ニ感シ其症殊險重ナリ。一醫吐劑ヲ與、夥ク粘液及膽液ヲ吐ス。然ニ諸症增長シ態勞更甚シ。吐後兩三日ヲ經テ是ヲ診ニ罷勞及咽喉腫日増劇シ。頭鈍痛少間モ休マタ。亞満塹兒腺(咽ノ腺邊ハ腺腫脹シ)口中斷舌遍ク粘液被ヒ。目眩ノ淚ヲ流ス。但

大便時々通利シ少腹心下脹滿セズ小便淡稀ニノ。壅ナシ。脉大小堅軟時變ノ定^{アズ}然ニ頗盈充シ大抵數ニメ九十動ヨリ九十五動許。時々譖語^ス夜中煩燥甚^ムノ多少譖語少間^モ休マズ乃^ナ神經失常ノ運動ヲ防制シ。劇症ヲ除キ蒸氣ヲ發センガ爲ニ纈草濃泡劑^ト忽拂^フ滿鎮痛液ト硝砂少許ヲ加ヘテ與。芫菁膏ヲ項窩ニ貼シ。又硝砂ヲ屋施^シ蔑兒^リニ研和シ含漱藥トス。是ニ由テ脉稍調和シ蒸氣漸^ム發泄シ譖妄減ス。然ニ咽喉ノ症逾^ム增長シ甚^ム嚥下ヲ苦シ^ム大ニ艱苦スルニ非バ言フ^ト能^ハズ。口中ヲ診ニ遍ク鶯口瘡ヲ生シ涎

唾流溢ス。因テ頻ニ先菁膏ヲ項窩ニ貼メ化膿セシ
メ。内服劑ノ硇砂ヲ去テ用又幾那泡劑ニ民塗列利
精ヲ加テ兼用シ。蓬砂ヲ玫瑰蜜ニ研和シ口中ノ塗
藥トス。是ヲ用十二日。諸症大ニ寛解シ不日ニ全愈
スベキガ如シ。然ニ其夜大ニ煩悶シ毫モ眠_レ不能_ズ。
肌膚搔痒ニ堪_エス且_ハ數日以前ヨリ陰囊小胞ヲ發メ
焮熱シ皮膚剥脫セル者。今其焮痛ニ堪_エス。其煩悶皮
膚搔痒ハ發斑ノ前兆タルベキヲ察ス。翌日果ノ白
色ノ粟疹ヲ發シ殊胸及四肢ニ多シ然_レニ_ハ諸症尚輕
快ヲ得_ズ。唯煩悶及咽喉ノ症微減スルノミ。又知覺

感觸甚遲鈍トナリ。脉更ニ數ニノ堅乃_ハ前方ノ服量
ヲ倍シ攝爾扁答ヲ加用ヒ。又先菁膏ヲ貼シ陰囊ハ
越沒里膏モリ名ニ_ヒ非阿斯失亞密_{オスレアミ}越幾斯劑エギス止痛ヲ加貼ス
○翌日粟疹起脹シ邊圍赤色ヲ帶患者爽快ヲ覺ユ。
唯脉小ニノ堅搏度齊_{ツヅ}ハズ譫妄除_カ小便中雲翳生
シ少間ニノ消散ス乃_ハ前方連進二日粟疹自消シ患
者復煩躁メ展轉シ眼光恍暴夜中譫語甚ク脉逾堅
テメ次序ナシ。因テ速ニ芥子泥ヲ腓ニ貼シ數温湯
ヲ與又内服藥ノ量ヲ倍シ用十二時ニノ皮上白斑ヲ生シ長二三寸濶五分ヨリ一寸許漸起脹メ水

充肌膚微冷黯澹色。額冷汗沾上。脉細數。呼吸短促。患者恍惚トノ醒覺セズ。是ニ於テ壯神揮發ノ峻劑。闕ベカラザル症トシ幾那濃煎劑ニ攝爾扁答泡劑ヲ合シ龍腦及民塗列利精ヲ加テ頻ニ與。又纈草煎汁ヲ吉利詞爹兒トシ。芫菁膏ヲ貼メ化膿セシメ。又屢芩子泥ヲ貼ス。其白斑暫留二日ニメ夜中盡消散ス。翌朝患者軒睡シ。脉浮虛散漫シ。少間メ大發汗シ。小便數通シ。雲翳ヲ現シ。少頃ニノ器底ニ沈ム。患者醒寤スレハ尚賴悶休ズ。夜中稍安靜。時譁語ス。翌日諸症輕快。呼吸寬利。蒸氣發泄。脉次序アリ精神快爽。

ナリ。然レ歟嗽止ゞ夜中殊劇ク。大ニ困苦ノ僅痰ヲ吐ス。但歟ノ疼ナク。胸肺焮衝ノ候ナク。耳聾ス乃ナ幾那沙列布。金硫黃。及民塗列利精ヲ内服セシメ。胸芫菁膏ヲ貼ス。是由テ諸症漸回復シ。十月末ニ至テ患者病牀ヲ出ツ。然レ歟嗽仍止ザル。數週因依蘭苔。遠志。蜀羊泉。硫黃。乳汁ヲ用ヒ。發泡膏ヲ貼メ連日化膿セシメ竟ニ全愈セリ。一婦人三十歳。體羸多血ニメ膽液過多。十一月八日。月經多來リ。偶寒邪ニ感シ月經一日ノ止。同十日肢節倦重。頭痛。眩暈。食進ス。大便通セズ。脉數ニメ次

序ナク稍盈脹シ肌膚乾燥ス。一醫左ノ散剤ヲ與ス。

蓬疏酒石散

金硫黃 六丘 甘草 三錢 又纈草煎汁
右調勻メ散剤半シ一時毎ニ一茶匙ヲ取り如密列

ス翌日稍月經來ル。方劑同前○十三日始テ神經熱ノ病性ヲ見シ。脉緊細ニメ攣縮。搏度齊ハズ。精力大ニ虛憊シ。舌白苔。大便稀溏。小便淡稀。月經復止。時々振掉ス。乃後方ヲ處ス。中於陳太子困苦ベ對之

蓬黃纈草飲

纈草根 末 三錢

右沸湯六弓ニ浸^スト四分時。滓ヲ去リ後藥ヲ加フ蓬砂 一錢 大黃丁幾劑^{イシキ} _名 韻爾答^{タエメチ} 越黙窒 一丘

右調和シ半時毎ニ一匙ヲ與フ○翌日大便溏セズ。脉甚ダ小ナラズ。渴アリ。喜テ吐セント欲ス○十五日。後方ノ吐劑ヲ與フ

雙聖湧吐飲

百葛格安那 未 十五丘

韃爾答越默窒ニ氏

右水三弓ニ溶和シ。海葱蜜四錢ヲ攬和シ。八分時毎ゴト
ニ一匙宛服入答註尋常ノ水ハ清潔ナラズ。故ニ韃爾
和スルニハ必ズ蒸餾水ヲ用ベシ。尋常井水ハ諸種氣
ノ鹽氣ヲ含ミ或炭酸加爾幾苦土收斂基硫氣滲氣等ヲ含ム故ニ右ノ諸藥殊昇是ニ由テ粘液及膽
汞ノ性力ヲ剋制スレバナリ。是ニ三後方ヲ與フ
液ヲ吐スルコト三次爾後脉小ニメ數搏度齊ハズ頭
目鬱重小便淡稀大便水瀉ス。乃後方ヲ與フ

壯運纈草飲

纈草根末三錢

白芷末二錢

右水六弓ニ煮テ渣ヲ去リ後藥ヲ加フ

民塙列利精

一弓

番木鼈越幾斯劑

六

亞刺比亞謹摸漿

四錢

舍利別

一弓

右調和シ半時毎ニ一匙宛與フ○十七日下利止舌
兩邊黑色苔アリ中央苔ナク潤アリ肌膚和柔脉緊
細ニノ攣縮搏度齊ハズ甚數十ラズ九十動許腹軟
頭目困重耳聰ナラズ虛憊甚シ午後兩顴赤色時譖
語微直視シ或眼光恍暴乃前劑ヲ用室中清爽氣ヲ
迎納メ鬱蒸氣ヲ散ス夜中熱增發ス然舌及皮膚
稍潤フ大便通セズ○十八日月經少來リ眼光恍
暴小便水ノ如ク舌潤アリ栗殼色苔ヲ帶夜中脉次

序ナシ但昨ニ比スレバ盈實シ夜半後脉細數皮膚及舌燥キ復譖語甚グ且腹痛ヲ發シ大便失禁ス。因テ芥子泥ヲ兩腓ニ貼シ左ノ吉利詞爹兒ヲ施ス。

纈草吉利詞爹兒

纈草根カミラレ各二錢
菲阿斯失阿密草ヒオスレアミ一錢
右水煎シ施ス○翌日諸症同前。但脉細數皮膚口舌乾燥粟殼色稠苔アリ。水瀉一行。腹痛止ズ少腹軟ニメ痞脹シ渴ナシ乃芥子泥ヲ兩臂ニ貼シ後方ヲ與。

壯神纈攝飲

纈草根カミラレ一錢
龍腦トウボクアヤシ少許
民塗列利精ミンダーレリ一弓
舍利別カミラベツ一弓

右水六弓ヲ以テ煮テ滓ヲ去リ後藥ヲ加フ

攝爾扁答ルパント一錢

安質沒扭酒三十滴

右調和シ半時毎ニ一匙宛與又時々屋施蔑兒一茶匙死與テ口舌乾燥ヲ潤シ前ノ纈草吉利斯爹兒ヲ施ス○二十日脉稍和メ盈揚シ百動許舌潤ヒ腠理宣通シ小便赭濁ニメ泣ナシ大便通セズ呼吸短促不利シ時歎メ痰ナシ頭甚困重夜中脉疾數ニノ次

序ナシ乃_チ前方ニ忽弗_{タツフ}滿鎮痛液ヲ加_ヘ與_ヘ。又上好ノ
列印設酒一匙宛_{タマ}半時毎ニ與_{カハ}。渴布羅精_{カハ}以數肢體
ヲ蒸湯_シ。又亞兒尼_{アルニカ}加纈草根ノ煎汁ヲ吉利詞_{スル}爹兒
トシ施_シ。芥子泥ヲ貼_ス○翌日患者眼中_ヲ闇恍惚ト
ノ辨識ナク肢體懈_リ。頗然_トメ倦卧_シ時脚_ヲ牀外
ニ擲_ケ。眼中矇矇_。舌頭潤_テ苔_{ナク}脉昨ニ比スレバ
盈揚_ス夜中大小便失禁_。呼吸短促_。譖語_ス方劑同前。
又芥子泥ヲ兩臂ニ貼_シ。列印設酒ノ量ヲ増_ム渴布羅
精及吉利詞爹兒_ス前日ノ如_シ午後諸症稍寬
解_ス。又乙百葛_{ペカ}格安那半瓦_{タマ}宛_{タマ}半時毎ニ服セシム夜

幾攝壯神飲

分脉復細小虛憊益甚_ク大便水濁_ス是服_{スル}所_ノ
然_リ乃_チ後方ヲ作_リ與_フ

幾那_未一弓_セ攝爾扁答_未

白芷_未 亞兒尼_{アルニカ}加根_未 各二錢

右水六弓_ニ煮_ズ滓_ヲ去_リ後藥_ヲ加_フ

忽弗_{タツフ}滿鎮痛液_ス八十滴

安質沒扭酒_{アシテモ}三十滴 舍利別_未一弓

右調和_シ半時每ニ二匙宛_{タマ}與_フ又四分時每ニ列印
設酒半盞宛用_フ○翌日諸症同前精神差輕快面赤

耳聾シ大便失禁。夜中嗜眠譖語ス乃後方ヲ與フ

幾芷壯神飲

幾那未一弓

攝爾扁答未

白芷未各三錢

八十亞兒尼加末

一錢

右上好列印設酒六弓ヲ如浸シ渣ヲ去後藥ヲ加フ

氏塙列利精

一弓

忽弗滿鎮痛液

六十滴

安質沒扭酒

四十滴

舍利別

一弓

右攪和シ半時毎ニ二匙宛與フ又後方ヲ用フ

龍腦爽神散

與大

龍腦

一弓

百葛格安那

半弓

沙糖 一夕

益母草

大百葛格安那

半弓

右合和メ散劑トシ分テ八服トシ一時毎ニ一服宛
與フ○二十三日。二十四日。精神稍輕爽ニメ辨識ア
リ。脉甚小數ナラズ大抵八十動許。差盈揚シ軟ニメ
次序アリ。仍耳聾。舌苔粟殼色ニメ潤ヒ。振搖セズ。肌
膚柔潤。面部蒸氣ヲ發シ歎嗽胸痛ナタ。呼吸短促セ
ズ。時々大息シ。小便稠濁。雲翳懸留シ。下利止ム。夜中
スルノ一回。其貼セル芥子泥ノ疼ニ堪ズメ是ヲ去
ル。又呃逆ヲ發スルト二三次。或嘔氣アリテ服藥ヲ

惡ム。大便一行通ス。方劑同前。唯幾那ヲ加倍用ス。又
 ○翌朝譖語シ。上瞼外眞ニ牽引ス。脉昨ニ比ヌレ。遂
 小數ニノ堅。舌頭苔大久潤フ。然レ挺出スル。能如
 ズ。大小便失禁。夜半以後煩躁甚クメ藥ヲ服セズ。因
 テ前ノ諸方ヲ持重シ。又後方ヲ兼用ス。

芙蓉催睡飲

古苔栗粉。水半錢。右攪和シ一時。每ニ二十滴。水半錢。右攪和シ一時。每ニ二十滴。宛葡萄酒ニ點服ス。又前
 本吉利詞。爹兒ニ幾那ヲ加施ス。○患者午後ヨリ夜
 ニ至。頻ニ嗜眠シ。時々眼半閑テ睡リ。大息シ。兩便失

禁ス。方劑同前。更羌青膏ヲ項窩ニ貼メ。發泡腫痛ス
 ○二十六日。精神輕爽。能事理ヲ辨知シ。耳聾治シ。大
 便通セズ。脉稱小軟ニ。次序アリ。呼吸利シ。時々大
 息シ。舌兩側栗殼色。潤アリ。夜中譖語セズ。○二十七
 日。諸症同前。夜中微譖語ス。脉強弱齊ズ。然レ急數ナ
 ラズ。呼吸利ス。或時ニ煩悶甚シ。薦骨褥瘡生シ。小便
 色褐色。濁雲翳及。塗渣アリ。○二十八日。眼瞼復上牽
 斯。夜半前蒸氣發シ。爾後睡眠ス。其他諸症藥劑同前
 ○翌日脉數ニノ次序ナク大小齊ス。呼吸不利。大息
 ス。皮膚及舌乾燥。苔栗殼色。大便微溏。小便塗ナシ。乃

前幾那劑ニ水楊梅根ヲ加テ効力ヲ峻ニシ又龍腦
ヲ阿芙蓉液ニ加ヘ一時毎ニ四滴宛與。前列印設酒渴
布羅精ノ蒸湯法。吉利詞爹兒ヲ持重シ施ス夜中脉
小軟ニメ猶次序ヲ得。大抵八十動。呼吸快利。脚ノ肌
膚和柔。頭腹兩臂蒸氣發。夜半後煩ノ時譖語ス。乃
芥子泥ヲ貼スル。三時許。毎日患者精神沈重。面
赤眼神乏弱粘液被上。脉軟弱大小齊。九十動許。呼
吸不利メ大息シ。肌膚和柔。舌苔粟殼色テノ厚。微燥
テ粘液被フ。昨以來大便通セズ。兩日吉利詞爹兒腸
内ニ留ル。小便赭色稠濁雲翳アリ。方劑同前。但前幾

那剤ニ遠志二錢ヲ加テ與。又時々左大麥煎ヲ兼用ス。

爽涼大麥飲

綠藜精 半錢 舍利別 一弓

右攪和シ二匙ヲ取テ大麥煎一小茶椀ニ和シ與。又
芫菁膏ヲ胸元貼ス。夜中煩躁シ發汗ス。夜半後汗止テ
譖語シ曉至テ省覺ス。十二月朔日脉昨ニ比ス
ヤハ稍盈揚シ數減軟ニメ次序アリ皮膚及舌苔潤
アリ呼吸不利シ大便失禁ス。芫菁膏大ニ發泡ス。患
者肉羹汁ニ蒸餅ヲ煮テ喫ス。夜中嗜眠。脉小ニメ微
數。呼吸利シ頭臂腹部蒸氣ヲ發ス。二日脉細小。次

序ナク呼吸短促。時大息不皮膚及舌潤。苔甚シ吉
利詞參兒ヲ施。之硬屎少許通ス。其他諸症方劑同前
○三日精神沈重ス。然ニ辨識アリ。脉甚小ニ。疾數
呼吸不利。太息。皮膚燥。舌苔赭色ニ。甚厚ク且振
搖ス。口中粘液被ヒ心下苦滿惡心。大便通セズ。小
便稠濁ニ。微赤色。入瀉多シ。右ノ如々峻効アル方
法ヲ用テ呼吸仍不利スル故ニ。左ノ吐劑ヲ與フ
鎮痉誘吐散
平和元會休限
半夏
元百葛格安那
末一刃
葛私多僂謨
四瓦
右研和メ。一頓ニ服セシメ。次ノ飲劑ヲ用フ

鎮痉加纈煎

加密列

纈草根 各二錢

右泡劑トシ飲料トス。是ニ因テ午後粘液ヲ吐シ呼
吸稍利ス。但嗜眠ノ睡不能ス。乃ト吐劑ヲ休。前諸方ヲ
用。又幾那丁幾劑四十滴。宛一時。每ニ與フ。○四日。嗜眠
醒覺ス。然ニ精神鬱重シ。兩手顫振惕動ス。此症甚キ
ハ麝香二丸。宛一時。每ニ與フ。脉小ニ。メ八十動許。或
時甚數ニ。メ次序ナシ。呼吸不利。大息耳稍聲。皮膚
及舌乾燥シ。赭色稠苔アリ。大便通セズ。小便同前。乃
復芫菁膏ヲ胸ニ貼シ。芥子泥ヲ兩腋ニ貼ス。方劑同

前但午後筋惕瞶動甚キ故ニ麝香ニ瓦窓一時毎ニ用夜中嗜眠シ微譫語ス○五日耳聽難ク脉小メ稍數次序ナシ時大息シ仍筋惕ス故又後方ヲ兼用ス

夾神鎮痙飲

鹿瓊漿

製法臭氣銳烈ノ鹿角精ヲ適宜取硝少許宍加テ些モ沸淬セザルニ至能研和

ノ瀝過レ渣ヲ去硝子壠ニ入封シ貯ム

忽弗滿鎮痛液

幾那丁幾劑

各三弓

舍電阿芙蓉液

半錢

右調和シ一時毎ニ九十滴宍與○六日患者倦卧シ神思沈垂顏面黯澹脉小ニメ微數呼吸不利大息ス。

然ニ顫振筋惕休乃前ノ鎮痙飲ヲ一時毎ニ増加テ竟ニ百二十滴ニ至リ龍腦夾神散前出ヲ與ル毎ニ華尼利莢六瓦ヲ加用又夾涼大麥飲ノ綠礬精ノ量ヲ増加シ其他内外方劑モ持重シ用フ午後患者半睡シ半眼ヲ閑キ脉小ニメ百動許呼吸不利皮膚乾燥筋惕咬牙舌苔尚厚ク大便通セズ夜ニ入テ醒覺シ脉小ニメ次序アリ大抵八十動皮膚及舌潤ヒ歎嗽シ夜中稍睡眠ス方劑同前華尼利ノ量ヲ増テ十二瓦ニ至○七日面部瘦削眼球陷凹耳冷額皺ヲ生シ嗜眠メ睡ラズ又搐掣ヲ發ス然ニ辨知アリ耳聾シ

脉甚シ小ナレ。仄次序アリ。九十動許。呼吸稍利シ。欬メ粘痰ヲ咯。共ニ嘔氣ヲ發ス。皮膚及舌乾燥シ苔甚タシ。大便閉四日方劑同前。又加密列。纈草。石鹼ヲ以テ吉利詞。爹兒ヲ製シ施ス。午後患者直視。搖掣甚シク。脉細數ニメ。按知シ難シ。皮膚燥キ。小便稠濁ニメ。塗ナク。斷ニ鶩口瘡ヲ生ス。然仄咽喉口中ハ發セズ。吉利詞ス。爹兒ヲ施メ大便一行通ス。乃龍腦爽神散。華尼利ハニリ十五丸。宛加テ一時。每ニ與。又蓬砂ヲ煉膏トシ。鶩口瘡ニ擦ス。其他方劑同前。夜中發熱。面赤。倦卧ス。脉甚シ小ニメ。微數。次序アリ。稍睡眠ス。八日精神稍輕爽。

ノメ對晤辨知ス。脉小ナレ。仄甚シ數ナラズ。次序アリ。呼吸利ス。然レ仍欬嗽休タ。皮膚乾ケ。仄和柔シ。舌苔消ノ潤ヒ。鶩口瘡殆ト消散ス。午後復煩躁メ。時々狀外ニ展轉ス。然仄呼吸不利セズ。皮膚及舌潤ヒ。稍白苔アリ。脉小ニメ。微數。大便通セズ。小便赭濁ニメ。塗ナシ。夜中大ニ發汗シ。稍睡眠シ。時譫語ス。脉午後ニ比スレバ稍盈實シ。次序アリ。九十動許。胸發泡。創口ヲメ。仍愈サラシ。方劑同前。○九日。大便一行通ス。面赤。神思爽輕。脉昨ニ比スレバ稍盈實シ。軟ニメ。數ナラズ。次序アリ。呼吸利シ。蒸氣ヲ發ス。夜中嗜眠メ。

睡テズ。但譫語セズ。方劑同前〇。十日。舌頭潤テ苔ナシ。又大ニ發汗ス。故ニ爽神鎮痙飲ノ鹿魂漿ヲ去リ。幾那丁幾劑又增加ス。大便通セズ。午後嗜眠。面部赤色ヲ帶。顏面。胸。兩臂ニ豆大ノ瘡胞ヲ生シ。肛門ニナル水胞ヲ發ス。夜中睡眠シ寛快ノ狀アリ。耳能聴エ。晤言辨知平日ノ如シ。方劑同前〇。十一日。脉小メ微數。呼吸快利。欬ノ痰ヲ喀。舌頭苔ナク。舌本ニ向テ赭色ノ苔アリ。大便通セズ。面部蒸氣ヲ發シ。皮膚和柔。兩臂ノ皰稍起脹シ。右臂赤色ノ粟疹ヲ發シ。夜中安眠ス〇。十二日。患者知覺全平復シ。脉微數ニメ盈

實シ。其皰多ハ化膿シ次テ乾固ス。或化膿セズメ消散スル者アリ。芫菁膏ヲ貼スル部能發泡シ且乾愈セサラシム。但大ニ褥瘡ヲ生ス。乃雞子白ニ羯布羅精ヲ和シ貼ス。患者肉羹汁少許並可喜一二盞ヲ喫シ味佳美ヲ覺ユ。方劑同前。但華尼利ヲ去テ用ズ〇。十三日。諸症同前。乃滋養ノ羹汁ヲ與。又欬嗽ヲ治スルガ爲ニ。前ノ幾那飲劑ニ金硫黃十五丸ヲ加用。夜中安眠ス〇。十四日。十五日。脉頗盈實シ次序アリ。皮膚及舌潤苔消ス。其皰仍彼此ニ在テ化膿ス。小便稠濁ナラズ。尚雲翳ヲ現ス。大便通セズ。患者稍食ヲ欲

シ。褥瘡釀膿ス。○十六日。褥瘡ノ疼甚。ノ睡。ノ能。ズ。脉
小ニノ數。呼吸稍短促ス。然ニ欬嗽減ス。小便拘擗色
中メ稠濁。褥瘡潰爛深殆ト一寸許。其底黑痂被フ。然
ニ邊ニ熐衝候ナシ。因テ後方ヲ作テ瘡上ヲ蒸湯ス

防腐蒸湯方

楊皮

蘇格爾需謨葉スコレダウム

芸香ヒハツ各四錢

菲阿斯失亞密草オヌレニア二錢

右剉水三十二弓ニ煮テ患部ヲ蒸湯シ。緩和愈創ノ
膏藥ヲ貼メ其潰爛ヲ愈合ス。○十七日。褥瘡痛ニ因
テ睡眠ヲ妨グ。瘡底黒痂殆ト剥脱セントス。瘡胞盡

消散シ夜中安眠ス。○十八日。脉小ニノ數ナラズ次
序アリ。呼吸快利シ效減シ皮膚及舌潤テ苔去。食ヲ
欲シ。小便褐色溷濁。大便固カクシ。○十九日。神思爽快。眠
食逾復ス。因テ前ノ諸方ヲ休テ左ノ二方ヲ與フ

壯神丁幾劑

幾那丁幾劑イニヤ

四錢

纈草丁幾劑イニヤ

右調和シ一時毎ニ百五十滴。宛服ス。

鎮痙排毒散

挖歇爾私發汗散ドウヘルス

十五瓦

甘草末

十五瓦

右調和ノ散劑トシ分テ六服トシ毎夜一服宛與フ
○廿日ヨリ正月朔日マデ諸患日快愈シ脉力盈充。
始テ牀中ニ起坐ス。唯歎嗽脉數ノニ症退_カザルノニ
○二日患者神思爽了ナラズ。恶心シ吐スルヲ一兩
次食ヲ欲セズ。口中頻ニ淡水湧溢シ舌白苔生ス。乃
ヒ百葛格安那ヲ用。吐スルヲ四次。爾後神思爽快。食
進ミ。脉小ナレ压數ナラズ。乃前ノ丁幾劑ヲ與ヘ別
ニ楊皮ノ浸劑ヲ服セシメ。正月十六日ニ至テ竟ニ
全治ヲ告テ停藥ヲ許ス。史書又告聞者各食之。

新訂増補和蘭藥鏡卷十二 終

史書又告聞者各食之

