

新訂
增補
和蘭藥鏡

自卷十三至卷十五

X
28-1

F
才-35

499.2

OT
5

No. 3237

12 0-28-1



富士川文庫

3345

新訂増補和蘭藥鏡標目

卷十三

楊皮

壯神楊皮煎

遏爾託亞楊皮煎

七葉樹皮

經驗說六則

水銀散

槲皮

槲實

槲耳

槲皮散

榆皮

榆皮排毒煎

榆皮散

榆皮散

瑞香

瑞香發汗煎

瑞香解毒煎

經驗說七則

瑞香消毒煎

瑞香消炎煎

瑞香實

瑞香散

瑞香散

寄生

蟲卵驅蟲丸

胡桃

桂 桃 驅 蟲 飲

胡桃綠實越幾斯劑

胡桃實綠皮

胡桃排毒煎

胡桃核皮

胡桃仁

胡桃油

甘草

甘草舍利別

番木鼈

番木鼈消毒飲

番木鼈丁幾劑

番木鼈越幾斯劑

藤黃

抹修 摸品

卷十五

藤葱驅水丸 加羅藤葱丸

達謨葱鹹丸

藤英驅水膏

新訂增補和蘭藥鏡卷十三

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕菴校補

楊皮

「ガハヤナギ」又「子コヤナギ」俗稱
サリクス羅「ウルケンボーム」蘭

試効性收濁。血液稀涼。稠厚シ諸脱泄ヲ止ム。間歇

熱。下利。赤痢。白帶下。月經過多崩漏。吐血。下血等。虛憊

ノ症ヲ治ス。○水煎ノ蒸湯劑トシ焫腫眼ヲ治シ頭
ノ浸淫瘡。白瘡瘍。白屑風。污穢潰爛惡瘡ヲ淨刷乾愈

ス。○花絮外敷ノ創傷出血ヲ止ム。叔物

○按ニ和蘭近來楊皮ヲ以テ幾那ニ代用メ治驗

ヲ稱ス予馬底依華等ノ書ニ就テ其說ヲ檢得テ始テ同好ニ告共ニ是ヲ試用ルニ大約其所說ノ如シ故ニ其衆說ヲ左ニ略舉メ考據ニ備フ

福云
幾那

代用メ効驗ヲ得ル藥ハ楊皮・七葉樹皮・槲皮・水楊梅根・菖蒲根等ナリ

晚近ノ名醫楊皮ヲ以テ幾那ニ代用シ治驗ヲ稱ス。

博學精練ノ名醫斯覩涅ト子人楊皮ノ苦味アルヲ擇三散劑トシ熱病ニ用テ當時ノ患者五十人許ヲ治ス又高明ノ内科百可寧及ギ人近來楊皮ヲ用テ血液腐敗ノ諸病ヲ治シ虛衰ヲ挽回シ幾多ノ熱病ニ大効ヲ得。當時ノ患者二十人許皆回復セリ大學師傑蘊

私人伏兒斯甸スヂン上亦是ヲ熱病ニ用テ多々治驗ヲ得タリ○楊皮及其花絮收瀉ノ効ヲ稱シ和蘭ニ於テ第謨斯覩涅ト子人始テ楊皮ヲ幾那ニ代用シ其後斯覩涅瓦祿收斯群須斯華爾列兒勃圖會斯トホイス共人名皆親ク質驗メ殊効ヲ稱ス○楊皮ハ拔爾撒謨性ノ苦味アリ然レ幹皮老枝皮ハ收瀉ノ効多シ嫩枝皮ハ拔爾撒謨様ノ苦味質多シ故ニ四五月頃嫩枝皮ヲ採用テ尤良アル按ニ嫩枝皮ノ苦味○楊皮ハ効力幾那ニ比スレバ劣ニ代用メ驗多シ訶倫トシ人云楊皮ヲ幾那ニ代用メ効アレ庄幾那ノ如キ香竄質ナタメ竄透少キ故

ニ劇險危篤ノ症ハ楊皮一味ニ委テ効力切實ナラズ。又幾那ニ比スレバ收瀉ノ効多ク味亦佳ナラズ。且、熱病ニハ服量。幾那ヨリ多カラザレバ効ナキ故ニ毎ニ多服ノ胃腸ノ諸症ヲ發シ或長服ノ飲食消化ヲ妨ル者アリ。故ニ是ヲ對症ノ香竄揮發劑。若ハ壯神健胃ノ藥ニ加用レバ服易クメ胃ヲ妨ゲズ。假令バ桂。纈草根。山奈。菖蒲根。水楊梅根。亞的兒ノ如シ○伏兒的連名云。數楊皮ヲ試用ルニ幾那ニ比スレバ驅熱ノ効劣ルト雖ニ血液腐敗ヲ遏ニ峻効アリ。傳染赤痢。腐敗熱。紫斑熱。惡性痘疹等ニ用テ精力虛

憊ヲ強健シ腐敗ノ酷厲毒ヲ除治スル經驗甚多シ○服量。散劑ハ一刀ヨリ一錢ニ至ル。水煎ハ四錢ヨリ一弓マデ水八弓ニ煮テ半弓減シ香竄藥ヲ加用ス○熱病虛憊ノ症ハ揮發壯神劑ヲ加用テ良効アリ假令バ後方人如シ

[壯神楊皮煎]

楊皮 一弓半

菖蒲根 四錢

右水一丸ニ煮テ半弓減シ滓ヲ去冷定メ後藥ヲ加

橙皮舍利別 一弓 挥發香竄精 半錢

忽布滿鎮痛液 半錢

右調匀シ半時毎ニ一小茶椀ヲ服ス○肺藏特ニ虛弱ニノ感觸甚^キヨリ欬嗽喘急促迫等ヲ發スル者、撒兒末爾扶斯ヲ加テ殊効アリ假令バ後方ノ如シ
遏爾託亞楊皮煎

楊皮一弓

右水ニ丸ニ煮テ半^ト減シ滓ヲ去リ後藥ヲ加フ
遏爾託亞舍利別名 一弓

撒兒末爾扶斯名 十二瓜

右攪和シ一時毎ニ一小茶椀ヲ服ス。右ノ症、楊皮ニ依蘭苔ヲ加^ヘ煎服メ亦良驗アリ○潰破瘍ハ楊皮煎

ニテ蒸湯ノ諸惡性ヲ抑遏シ臭穢ヲ祛キ増劇セザラシム○水癌ノ骨ヲ腐蝕スル症ハ是以テ蒸湯ノ其腐蝕ヲ遏ム水癌ハ卷二ノ○潰瘍ノ纖維池弱ニ^ト腐壞スル症ハ是ヲ内服外敷メ治ス○寒壞疽熱壞疽ノ腐蝕ヲ止^ム又一切穿蝕潰爛臭穢ノ瘡瘍幾那ヲ施ス症ニ甚^キ驗アリ○惡厲潰瘍及^ヘ破腫ハ楊皮四弓水二比煮テ半^ト減シ蒸湯シ或^ヘ楊皮越幾斯劑製法名幾那軟^ト同シ^ヘ玫瑰蜜ニ研和シ塗藥トメ尤^モ良殊惡性熱ノ患者肢體破腫^ス生ノ焮痛ヲ堪^ズ若^ハ潰爛スルニ塗テ捷効アリ○焮腫眼ハ楊皮四錢水四

弓。煮テ半、ヲ減シ滓ヲ去、燒酒或、阿芙蓉液一錢ヲ攪和シ温メ眼ニ點ノ殊効アリ

依馬園
福庵

七葉樹皮下チノキ俗稱「ツボカヌタ」又「ウルデカヌタ」イ蘭近世幾那ノ經験甚多ク稱譽日盛ニメ價貴ク且姦商偽品ヲ販ク故是ヲ遠ク異邦ニ求メズ近ク自國於テ幾那ト同効ノ藥ヲ得テ日常饒多ニ施用センヲ冀ニ性味幾那ニ髣髴タル樹皮類ヲ採テ試徵スルフ多年偶先哲七葉樹皮ヲ幾那ニ代用メ治驗ヲ得ル說ヲ檢得シ數是ヲ試用テ殊効ヲ得タリ因

テ今其試說並經験ノ患症ヲ左ニ略舉ス
 ○春月。七葉樹ノ葉未敷行セザル時。其枝過ハ老セズ過ハ細嫩ナラザル者ヲ伐リ皮ヲ剥取テ裏面ノ白色木様ノ處ヲ去日乾スレバ自筒卷シ形狀竝收濬苦味殆ト幾那ノ如シ唯微辛味アルノニ且是ヲ貯ヘ性味十年餘モ損敗セズ。但細末ハ一年ヲ經ズメ蛀敗スル故毎用新ニ研末スベシ○新芽及花蒼モ皮ノ功力アリ○皮細末一弓ヲ取テ硝子ノ列篤兒多ニ内沙火ニテ蒸餾スレバ初淡水出ヅ漸火ヲ増セバ臭油其水ニ浮ム其水及油各四錢アリ其列篤

兒多ニ殘炭ヲ燒テ灰ト爲シ水ヲ加、灰汁トレ上清
ヲ取テ熬乾スレバ固性、亞兒加利鹽半錢出ツ○皮
末四錢ヲ取り亞爾箇兒八弓^{セム}浸^ス四分時。其上清
黃色ヲ帶フ。數時ヲ經レバ黃金色トナリ味甚^シ苦シ
○皮末ヲ稀キ綠礬精ニ加^スレバ黃色トナリ味甚^シ苦シ
殆^シト消ス。是制酸ノ効アル徵トス○皮末ヲ牛肉ニ
摻^スケ貯^フレバ腐敗セズ。既ニ敗餽セル肉ハ臭氣消メ
鮮肉ノ如シ○皮ヲ水ニ浸シ藥氣ヲ出シ是ニ膽液
若^ハ稠^キ血ヲ加^ヘ貯^フレバ腐敗セズ其血些^{シモ}溶解セズ。
是^ハ腐敗ヲ遏^ムル徵トス○右試說ヲ以テ觀レバ此皮。

効力幾那ト殆^シト同様タルヲ知ルベシ

經驗說是ヲ以テ幾那ニ代用シ間歇熱其他諸病ニ
治驗ヲ得^スト總テ楊皮ノ如シ。服量製劑亦同シ。然^レ正
楊皮ニ比スレバ胃ニ觸^ル少^ク。飲食消化ヲ妨^ス。
但^シ幾那ニ比スレバ服量多カラザレバ効ナシ
○一婦人間歇熱ヲ患ヒ發作スレバ頭痛懊悶ノ膽
液ヲ吐渴甚久。殆^シト昏憤ス。此皮二錢ヲ取り亞爾鮮
水四弓^{セム}浸^スノ藥氣ヲ出シ發作後是ヲ用半時ヲ經
テ芳香健胃ノ飲劑ヲ與フ。是ニ由テ胃ノ諸症ヲ發
セズ。翌朝及其夜前法ノ如ク用三劑ニ^シメ治ス

○一匠工間日熱ヲ患フ、下劑ヲ與テ胃腸ヲ清刷シ此皮末半錢宛用^レ。日三次。翌日其熱稍減ス。然ニ毎服腹痛ヲ發スル故、是ヲ休メ。此皮二弓酒石鹽一錢。水一升半ヲ以テ煮テ一升ト爲シ滓ヲ去。毎日二茶椀宛用^レ。是ニ由テ腹痛セズ。六日ノ經^カ再發セズ。○一匠家三日熱ニ罹リ。右ノ煎劑ヲ用^レ。毎日二茶椀。然ニ其熱減セズ。因テ二茶椀宛用^レ。日三次或四次。其熱漸^{レダヒ}減シ。十日ニメ全愈ス。是多服セザレバ熱毒ヲ制服スルニ足^ラ。ザルナリ。○其他經驗二十餘人アレ。大抵右所說ノ如キ故ニ斯ニ贅セズ。但

其中治セザル者一兩人アレ。此藥毫^合モ害アラズ。幾那ヲ用^レ。凡十ノ一二ハ効ナキ。慎ニ足^ラ。ネズ。若是ヲ用^レ。大便祕スル者ハ輕^キ下劑ヲ與ベシ。○此皮疼痛及往來熱等ニ効アル。ト亦幾那人如シ。一少年。吐糞病ヲ患ヒ。腹痛極^タ。テ劇シ。此皮末ニ舍電阿芙蓉液ヲ加^シ。與テ其疼消散セリ。○一婦人二十一歳。體稟膽液過多。偶忿怒ノ後。經閉シ漸^シ羸瘦。日晡潮熱。盜汗多ク。小便上面青色ヲ帶ビ且^シ。白色微赤ノ塗アリ。肢體瘦削日甚^シ。乃^チ此皮ヲ水煎シ。毎日午後ヨリ。黃昏マデ。二茶椀用ヒ。又初更マ

テ一茶椀用ヒ。大黃浸劑大黃條出三錢。酒石葉液一錢攪和シ每朝四十五滴。宛用レ兩次。又稀キ大麥煎。若バ水ニ狗櫟汁ヲ加、適意ノ酸味ト爲シ飲料トス。爾後三週ヲ經テ月經通シ諸症漸輕差ヲ得テ四復セリ。

○胸脇焔衝及肺焔衝ハ初發饒多ニ刺絡シ緩和劑ノ煎湯ニ橙汁ヲ加、テ適意ノ酸味ト爲シ用ヒ或、是ニ海葱蜜少許ヲ加、用ヒ痰垂カタツムリヲ咯シメ其後此皮ノ煎劑ヲ前法ノ如ク用ヒ多々治驗ヲ得タリ。

○一男子左腕ヲ打撲シ焔痛甚シ此皮ノ煎劑ニ石灰水ヲ加、患部ヲ蒸湯ノ腫痛速ニ消散ス。

○一婦人脇ノ創ヲ誤治メ惡性ノ潰瘍トナリ諸藥驗ナシ終ニ此皮ノ煎汁ヲ以テ蒸湯ノ腐穢除キ好肉生ノ乾愈セリ。

○此樹ノ實ヲ採リ炒テ粗末シ一弓半マデ取り。水六椀ニ煮テ半弓減シ。凡諸管纖維人弛虛縱緩ヨリ發スル諸失血。其他劇キ脱泄ニ朝夕一枕宛用テ良驗アリ。

賢學福

試効皮收瀉乾燥ノ効アリ。收瀉ノ効殊ニ在リ内服ノ諸失血。下血崩漏。下利赤痢白帶下等虛症ノ諸脫泄ヲ止。

槲皮外ハクノ又カシハ和名空ルキス・ロビル羅正イケン蘭

頑固ノ間歇熱ニ此皮ヲ以テ幾那ニ代、水煎若ハ泡劑トシ服量亦幾那ノ如用ヒテ多ク治驗ヲ得タリ○收瀉ノ峻藥的當ノ諸症ニ外敷メ殊効アリ。卽諸出血ヲ止ルニ此末ヲ摻シ或歯痛ヲ止メ、漬ノ腐壞ヲ除キ懸壅垂ノ弛腫ヲ消スル等ニ水煎ノ含漱劑トシ良驗アリ○脫肛及子宮腔ノ下墜突出ハ此煎湯ニテ蒸湯シ若ハ水銃ニテ注入シ或腰湯トシ効アリ○潰瘍創傷ヲ淨刷ノ腐壞ヲ過メ又纖維弛虛ノ好肉生セズ或腐蝕ノ愈難キ等ニ是ヲ以テ幾那ニ代用シ水煎ノ蒸湯シ偉効ヲ奏ス○胃腸等ノ内藏

弛虛衰弱セル諸症ハ此末ニ燒酒ヲ濕シ其部ニ外敷ノ亦効アリ

[槲實]内服ノ衝動強壯ノ良藥トス。瘰癧毒諸腺ニ壅塞シ療瘻結腫ヲ生メ肢體羸瘦スル症及小兒此症ヲ患シ者ハ槲實入皮ヲ去リ炒焦メ末ドシ一匙ヲ取テ沸湯八弓ニ浸シ一日ニ服メ多ク治驗ヲ稱ス或沙糖ヲ加甘美トシ用フ
[槲耳]ハソタケ俗稱ボレテウスイグナリウム那
 榆、檉等ノ樹柄是ハ槲ノニナラズ蒲那皆通シ用フ其質柔ニメ革外如シ外面ノ硬被ヲ去リ槌ニテ打テ軟ニシ貯フ○創傷ノ剽キ出血動

脉傷肢節截斷等ノ創口逆血止ザルニ貼ノ捷効アリ。其法此皮ノ小片ヲ取テ創中ノ出血セル血脉ニ緊貼シ。次ニ其差大ナル片碎ヲ益貼シ。次ニ最大ナル片碎ヲ益貼メ適宜創口ニ填充セシメ縛帶ヲ施スナリ。或云剝キ出血ハ水棉ヲ取テ熔解セル蠍スナリ。投ノ浸シ絞テ創ニ貼スレバ止血ノ効尤モ捷リナ。○衄血ハ搾耳ヲ適宜ニ截テ條ト爲シ鼻孔ニ挿テ節効アリ。○初生兒ノ誤テ臍帶ヲ牽離ス等ニテ出血止マズ諸藥効ナクメ死スル者アリ。此症ニ搾耳ノ一片ヲ創口ニ當テ牢著ノ益膏ヲ貼シ縛帶ヲ施セバ其血速ニ止ム。依淑福未在

榆皮

ユルミウス・カムペストリス・ローベンボーム又オルムボーム蘭

春月此樹ノ細枝ヲ採リ外粗皮ヲ去リ裏皮ヲ用フ但甚ダ細嫩ノ梢枝ハ効ナシ。藥鋪清雅云。舶來アリ 榆白皮ト呼ブ。白皮ニ非ズ。外皮モアリ。又和産アリ。

試効 皮收瀉シ愈創發汗ノ良藥トス。疥癬及乾癬甚。

久ヲ經ザル症。其他皮膚病ニ大効ヲ稱ス。或極テ頑惡。險重ノ疥癬。水銀劑及吐涎法ヲ施セ汎治セザル症ニ後方峻効ヲ稱ス。

榆皮排毒煎

榆皮 八弓 水 四升

右煮テ半リヲ減シ滓スミヲ去_ル。朝夕八弓。寃數日連服ス。但慢火ニテ久ヒ煮ルト勿レ甚ダ稠粘トナレバナリ。○列ハ孫シメ人云。乾癬。頑癬。瘻瘍。惡厲。頭瘡。膿瘡雁瘡等。經久頑固ノ皮膚病。對症ノ藥劑レシピヲ用_テ。驗大ク。終ニ水銀吐涎法ヲ施_テ。治セザル症ニ此藥ヲ試用_ヒ。治驗ヲ得ル者。勝テ算へ難シ。予是ヲ用_ルニ加味ノ品ナク此皮四弓リヲ取り。水四升リ以テ煮テ半リヲ減シ與フ。但是ヲ用_ヒテ多クハ大便祕閉スル故_ニ。時々緩下劑ヲ兼用ス。濃煎スレバ藥汁稠粘ニノ味惡シ。右ノ如ク煎ス。

レバ服シ易シ。唯稍收瀦味アルノミ。是ヲ越幾斯エキス劑ニ製スレバ殊ニ收瀦ス。○是ヲ用_ヒテ良効アル症ハ初其瘡増發シ長服スルニ隨ヒ漸ク乾愈ス。此藥速効ナキ故ニ功ナシトソ廢棄スル者アレ_ハ十分長服スレバ効驗必ズ切實ナリ。但其毒殊深キ者ハ一旦治スレバ効驗必ズ切實ナリ。但其毒殊深キ者ハ一旦治スレば再發ヲ防グ爲_ニ春秋ハ數日此前劑ヲ用_ヒテ盡ク其毒ヲ淨除スベシ。○依_貲

瑞香 オニシバリコセウノキナツボヅ花名 タラ
瑞香 オニシバリコセウノキナツボヅ花名 タラ
形狀高二三尺ノ灌木ニメ數枝ヲ分葉ハ花後生シ

狹長ニノ末尖。冬月凋落セズ。春月筒様四瓣ノ赤花
ヲ開キ或白花三花宛攢生シ枝梢長穗ヲ爲シ芬香
ナリ。花後圓實ヲ結ブ。初綠黃色。熟スレバ殷紅。終ニ
乾皺黑色トナル。肉多シ肉ハ毒ナシ。裏一圓核アリ。
嚼食ヘバ味不佳辛辣。口舌咽喉ヲ侵刺メ焚ガ如ク
大ニ燥渴シ劇水漏シ若ハ吐シ胃腸焔衝ヲ發ス○
樹皮ハ薄ク柔韌帶赤色或云帶外皮褐色。或云帶
氣ナシ性酷厲ニノ味辛辣口舌咽喉ヲ刺戟ス。

○榕按=瑞香ハ「ダブ子」テイメレアノ一種ナリ。
瑞香ハ實ヲ結バザ故是ニ確當セズ。瑞香ノ一種花戶ニ「オニシバ

蘇リト呼ブ者。花淡黃ナレ。圓實及皮ノ性味一般ナ
リ。故ニ瑞香ヲ總稱トシ花戶ノ名ヲ掲テ藥用ノ
本種ニ充シ。自瑞香亦此類ナリ。蘭山啓蒙云。甲州
ニテオニシバリト呼ブ者アリ。花戶ニ誤テ胡椒
通。木ト呼ブ葉ハ瑞香似テ薄ク色淡シ春四瓣
外久黃花ヲ開キ。後圓實ヲ結ブ。夏月熟メ色赤シ故
越後ニテ「ナツボウズ」ト呼ブ。又云花戶コセウノ
妹木ト云アリ。小木ニメ葉ハ瑞香葉異ナラズ春。
枝梢ニ四瓣ノ白花未開ク形亦瑞香花ニ同シ後
圓實ヲ結ブ。熟メ赤シ味辛クノ毒アリ。食スレバ

半日許煩悶ス。是白瑞香ナリ。

試効 皮ヲ藥用トス。幹大枝及根ヲ剥取乾シ用フ。細枝皮ハ氣味薄ク効力弱シ。性酷厲侵蝕シ過用スレバ吐下シ胃腸歎衝ヲ發ス。水煎内服メ汗ヲ發シ小便ヲ利シ。徽毒ノ骨疼潰瘍及痛風ニ徽毒ヲ兼ル症。夜分增發スル骨疼。或骨腫。腐骨疽等ニ大効アリ。○服量半錢ヲ取水六北ニ煮減メ四北トシ初半分ヲ一日ニ服シ漸々其量ヲ加用フ。若瞑眩ノ症アルキハ醋等ノ酸收ノ品ヲ與レバ治ス。○右ノ諸症ニ後方良驗アリ。

瑞香發汗煎

瑞香皮

右水十六弓ヲ以テ先、瑞香皮ヲ煮テ一北ト爲シ。甘草ヲ加、火ヲ下シ濾テ滓ヲ去リ。一小茶椀宛服スル。一日四次。○此皮ニ薩爾沙根サルサ山牛蒡根。甘草等ヲ加、テ煎劑トシ用テ惡厲潰瘍。頑固瘡瘍。其他右ノ皮膚病及徽毒諸症。痛風等ニ偉効アリ。次ノニ二方共ニ良驗ヲ稱ス。

瑞香解毒煎

瑞香皮

蜀羊泉莖各一錢半

山牛蒡根 二弓

瑞香排毒煎

羊蹄根

山牛蒡根 各一弓

瑞香皮

甘草

各四錢

右剉調勻シ水三十弓ニ煮テ半ノ減シ滓ヲ去リ服ス
 ○瑞香根ノ煎劑。解凝ノ奇効アリテ黴毒諸症殊ニ
 骨腫様ノ硬腫ニ治驗甚ダ多シ。此症水銀劑ヲ以テ
 消散シ難シ然ニ骨質腫起セル者ハ殆ド是ヲ疏散
 スル藥劑ナク。其骨腐蝕メ碎片トナリ除キ去ルニ非

レハ治セズ但骨膜ノ盈息腫脹スル硬腫。其他斯ノ
 如キ類ノ腫ハ此藥大効アリ。骨膜腫ハ黴毒ヲ夾ム
 者殊ニ多シ或黴毒諸惡症治メ後遺滯セル壅塞硬
 腫ハ此藥ノ解凝ノ峻効ヲ以テ治スル者甚ダ多シ
 左ニ其治例七則ヲ略舉ス

第一 婦人十八歳未月經ヲ見ズ五月初旬黴毒ニ
 云咽喉腫痛シ右側ノ過溝^{アマヅ}堆^{デレ}兒^レ懸壅垂ノ左右
 ノ潰爛シ小便淋痛。肛門ノ邊圍^リニ無花果腫ヲ生ス
 其形無花果^{ニ似}乃^ク白降汞ヲ用ヒテ輕^ヒ吐涎シ八月中
 旬ニ至テ諸症漸解散ス。唯咽喉焮腫初ヨリ依然ト

ノ減セズ。因テ左ノ剤ヲ與フ。

瑞香消毒煎

瑞香根剉ニ錢取門水圍三北卦界鄭生火

右煮減メニ北トシ一茶椀完數飲服ス。九月初旬ニ至テ其腫殆ト消シ數日ノ經テ全愈ス。是咽喉ノ腺腫ニノ水銀劑ニテ治セザル者ナリ。

第二 一男子二十三歳淋疾下疳咽喉爛瘡丸腫等ヲ患ヒ醫療ヲ加治メ後一年許ヲ經テ前症再發ノ愈ザル。既六週乃キ白降汞ヲ用ル。五週ニノ諸症解散シ唯睾丸腫在苒トノ消セズ。因テ左ノ方ヲ與フ。

解凝瑞香煎

瑞香根

甘草各一弓

水十五北

右先瑞香根ヲ水ヲ加、磁礮ニ入、蓋閉セズ文火ニテ煮減メ十北ト爲シ甘草ヲ加、濃メ滓ヲ去リ半北完服ス。レーハ日四次。是ニ因テ患者嘔氣大ク飲食消化ヲ妨レーハナシ。若瑞香根ノ量ヲ增加レバ辛味ニ堪ズノ嘔氣ヲ發ス。患者是ヲ用ル。三週ニノ睾丸腫全治セリ。○右經驗ヲ以テ觀レバ此根ハ水銀劑ノ功ナキ。徽毒腺腫ヲ疏散スル特効アル。顯然タリ。然

バ。徽毒ニ非ズト雖モ幾多ノ壅塞結腫ノ諸藥効ナク。水銀劑ヲ用テ疏解セザル症此藥ヲ與テ解凝ノ効ヲ微セント欲シ尚是ヲ試用テ治驗ヲ得ル。一必カラズ。卽ナ左ニ其一ニノ治例ヲ略舉ス。

第三 一男子三十九歳。體痛ヲ患ヒ治メ後。二週ヲ經テ胸ノ右邊ニ硬腫ヲ生ズ。因テ解凝瑞香煎前出ヲ用フ日ニニ七。小便多ク通利スレ汎汗ナク大便祕シ且嘔氣甚クノ食ヲ妨ク。然レ此劑ヲ與ル四日ニノ其腫過半減シ八日ニメ盡ク消散ス。

第四 一婦人四十一歳。喉頭ノ甲狀軟骨結喉下ニ一腫

ヲ生シ漸増長シ七十日ヲ經テ卵大トナリ。是ヲ按テ移動シ。脉狀變セズ月更平常ノ如シ。但呼吸ヲ妨ゲ食進マズ睡寐少ナシ。乃解凝瑞香煎ヲ與ヘ又其煎汁ニ小麥粉ヲ加テ琶布パツブト爲シ腫上ニ貼ス是ヲ施ス。一二日許ニノ其腫半ヲ減ズ。其後患者羈旅ニ由テ此劑ヲ休ム。

第五 一婦人十九歳。頸ノ右側差後部ニ一腫瘍ヲ生シ是ヲ按テ移動シ疼ナク漸盈長ノ高。二拇指横徑長六拇指横徑。濶三拇指橫徑ニ至ル既ニ一年。其他病症ナシ。但其腫。腺ニ屬スルカ若ハ筋肉ニ屬スル

力的知シ難シト雖モ多クハ筋肉ニ著テ生スルガ
如シ。因テ意ラク此症服藥ハ捷効ヲ得難シ。徑⁴ニ截
斷シ除クベシ。ト然^レニ瑞香根ノ効ヲ試ンガ爲ニ其
煎劑及^サ琶布^{バフ}ヲ施ス^レ前說ノ如シ又其煎汁ヲ蒸湯
藥トシ施ス^レ十四日ニノ其腫較著ニ減ノ皺縮シ
爾後其劑ヲ連服スル^レ三月餘。其腫逾減ノ栗大ニ
至リ其他些^レモ患症ナシ。因テ患婦大抵治セリトシ
此劑ヲ休ム

第六 一男子二十八歳。右ノ耳腺^{耳下ノ皮裏ニ在ル}一
出^レ一腫瘍ヲ生スル^レ既ニ半年。其後二月ヲ經テ又
左ノ耳腺ニ一腫瘍ヲ發ス。右腫長^サ二拇指横徑。濶一
拇指横徑。左腫長^サ一拇指半横徑。濶一拇指横徑。是ヲ
按テ移動シ俱ニ疼アリ。津唾大ニ減ス然^レニ嚥下ヲ
妨ゲズ脉平常ノ如シ。乃^チ解凝瑞香煎ヲ用^レ前法ノ
如^レノ患者嘔氣ヲ發ス。是ヲ用^レ二十日ニノ右腫
收縮シ又二十日餘ニメ其腫半^レ減ス但^レ左腫ハ仍
依然タリ故ニ患者服藥ヲ厭ヒ此劑ヲ休ム
第七 一男子右ノ耳腺硬腫ヲ發ス。乃^チ下劑ヲ用^レテ後。
解凝瑞香煎ヲ用^レバ輕^レ下利シ且^レ發汗シ十日許ニ
メ其腫消散セリ〇右ノ經驗說ヲ以テ觀レバ此藥

凡腺腫其他頑固ノ硬腫ヲ疏解メ從前効驗著實ナル諸藥及水銀劑モ功ナキ症ヲ治スルト寶ニ卓異ノ解凝藥トス。後來逾是ノ歷試シ効用ヲ推廣スル所ハ尚幾多頑固淹滯ノ諸症ヲ治スベシ。且此藥ハ腫瘍ノ增長盈息スルヲ抑遏減殺スル効力アリ故是ヲ用テ其腫過半減スル日速ナレ。其後ハ効力緩慢ナル者アリ。是ヲ以テ新發ノ腫ハ此藥ノ効力殊彰著ナリ。○此藥ハ一種ノ酷厲毒アル故ニ是ヲ服メ嘔氣ヲ發シ或瀉下シ若ハ發汗ス。即其酷厲毒ノ刺戟衝動ニ因テ細管纖維ノ運動ヲ增進驅逐シ

其壅塞硬結ヲ疏解スルナリ

○瑞香皮ヲ外敷メ侵蝕シ發泡化膿ノ酷厲ノ沴乙ノ流泄ス故是ヲ打膿法名トシ施メ惡液ヲ排泄シ尋常打膿法ノ効アル經久頑固ノ頭痛眼疾耳聾久效腰髓痛股膝痛腕臂痛脚痛及痛風等ノ遷延病ニ秀偉ノ功ヲ稱ス。是ヲ施ス部位ハ項窩顱顫臂脛。其他尋常打膿法ノ部ト同シ是ヲ施メ効アル諸病及部位名打膿法ノ條ニ舉参考ス生鮮皮ハ効力峻捷ナリ或云是ヲ醋浸ノ尤峻乾皮ヲ施スニハ醋若ハ水ニ浸ス「五六時ニノ取出シ截テ二三分許ノ方形ト爲シ貼メ粘固硬膏ヲ蓋貼ス

大抵六時若ハ十二時中ニ發泡ノ潰爛シ一兩日中ハ殊ニ酷厲液夥ク漏泄ス但毎日一次若ハ兩次此皮ヲ更換メ貼シ數日施ノ長ク惡液ヲ排泄セシムベシ。或數處一齊ニ是ヲ施シ或胸部ニ貼メ些モ害ナシ○資稟感觸甚鉢ナル人ハ是ヲ貼メ潰爛シ難ク乾愈シ易シ。此症ハ先羌青膏ヲ貼シ發泡ノ後此皮ヲ貼スル皮モ濕潤ヲ失者ハ大麥煎其他適宜ノ飲液ヲ多ク與、血液ヲ津潤シ釀膿軟化ノ膏藥ヲ貼メ膿ヲ成シムベシ○此皮ヲ貼メ厚痂ヲ生シ膿ヲ釀セ

ズ惡液漏泄セザル者ハ其痂ヲ截^リ去リ拔實^リ栗格謨膏^(名)其他化膿ノ軟膏ヲ貼メ膿ヲ釀スベシ○其惡液漏泄過多及酷厲ニソ傍邊ノ皮膚ニ浸淫シ赤爛腫痛ニ堪ザル者アリ。此症ハ此細枝ノ嫩皮ヲ貼シ或^は是ヲ貼メ數更換セズ或^は其部ノ傍圍ヲ冷水ニテ數洗淨シ羯布^{カムブ}羅膏ヲ擦テ治スベシ○經久ノ焮脰^ク治ス○肺ニ酷厲液アリテ刺戟シ欬嗽經久治セザル者、此皮ヲ臂ニ貼シ化膿セシメテ良驗アリ○或^は此皮ヲ貼メ其液ヲ血中ニ吸收シ發熱頭痛シ或

感觸甚キハ人ハ粟胞ヲ發メ搔痒ニ堪サルアリ此症ハ速此皮ヲ去清涼下劑ヲ用テ治スベシ。或云右人如キ患害アル故ニ尋常打膿法ヲ施メ尤モ切實トス瑞香實味辛辣メ酷厲毒甚シ是ヲ用レハ剉水瀉ス故水腫ノ停水ヲ下スニ用ル者アレ正動輒バ胃腸煥衝ヲ發スル故ニ其効切實ナラズ叔依叔福貨華

寄生

ヤドリキ俗稱マーレンタケシ蘭

諸樹ノ寄生皆用ベシ殊多ク槲寄生ヲ藥用トス。櫟樟栗菩提樹ノ寄生亦多ク用幹枝葉共ニ採陰乾

シ貯フ。香氣ナシ微不佳ヤノ味アリ括云寄生効力專ラ皮ニ在リ試効神經ヲ強壯スル効アリテ麻痺毒ヲ兼ヌ。故ニ一梧ノ神經藥ニメ鎮痙ノ良効ヲ奏シ汗ヲ發シ蟲ヲ殺シ癆不遂ニ亦間驗アリ】纈草根。橙葉。阿芙蓉。麝香等ノ壯神衝動藥ヲ加メ或ア魏ヲ加メ鎮痙ノ効ヲ扶テ殊驗アリ○痙攣搐掣ノ運動アル症ハ雙鸞菊越幾斯劑。亞鉛萃。硇砂礬補等ヲ加メ用テ偉効アリ○數發作往來ノ間歇アル痙攣搐掣ノ諸症昆姪兒等ノ症子宮衝逆依剥時く發動スル輕キ癪症ニ多ク治驗ヲ稱ス。但劇盛

險重ノ癪瘻ニハ峻効ナシ○搐掣様人運動時日ヲ定テ發スル症ハ幾那ヲ加テ的効アリ○凡諸管纖維ノ弛緩緩弱ヨリ發スル諸病諸液脫泄過多ノ症ニ良驗アリ○服量細末ハ一時半毎ニ半錢ヲ用フ泡劑浸劑ハ此藥一弓ニ水六弓ヲ加製ス或水煎シ用フ或云未トシ三時毎ニ二刀ヨリ一錢マデ然レ用ヒテ癪及痙攣ノ諸症ニ聞効ヲ得タリ泡劑浸劑ハ此樹實ハ味辛苦大ニ瀉下メ胃腸燥衝ヲ發ス但長服スルニ非レバ効ナシ體對脾腫等之效也

○此樹實ハ味辛苦大ニ瀉下メ胃腸燥衝ヲ發ス但外敷ノ腫瘻ヲ膿熟スル効アリ依叔括

胡桃

ハグランス・レギアロ
オックルノイド蘭

試効

未熟綠實殺蟲ノ偉効アリ是ヲ越幾斯劑トシ

一味用テ瀉下シ蛇蟲ヲ剿絶ノ驅泄入小兒ハ茶匙ニ二三抄宛與大人ハ其量ヲ増ス或後方ヲ用フ

〔桂桃驅蟲飲〕

未熟胡桃綠實越幾斯劑

キス

二錢

桂水四錢

右調勻ノ溶化ス二三歲ノ小兒ハ二十滴ヨリ三十

滴マデ用フ或云二三歲ノ兒ハ五十滴宛毎日用六日若ハ八日ヲ經テ下劑ニ水銀劑ヲ加用甘汞等

胡桃綠實越幾斯劑

製法

未熟綠實ヲ採リ桶^{サヒ}に入^ル、沸湯ヲ加^フ、搗テ其汁ヲ取^フ、鍋ニ内^レ文火^ス、煎^ス、熬^ス、外^レ調

厚ノ越幾斯劑ト爲シ貯^ス、味酸ヲ帶^フテ收^ム、濁^ス三十

○驚口瘡。口中瘡胞潰爛、咽喉焮腫等ヲ消散スルニ

未熟綠實ヲ水煎シ若ハ越幾斯劑^ス、傑列乙等ニ製シ

漱劑トシ良驗ヲ稱ス

胡桃實綠皮^ス、徽毒種々頑滯ノ諸症ニ實^ス、綠皮ヲ用^フテ

的實ノ捷効ヲ稱ス、假令バ後方ノ如シ

胡桃排毒煎

胡桃實綠皮一弓

沸湯一升

右磁器ニ入^レ益闊シ浸^ス、三時^{アマ}又煮^ル八分時^{アマ}、滓ヲ去^フ、此量ヲ毎日服量ト^ス、若^ク其綠皮ナキ時ハ此皮ノ越^ス、幾斯劑^ス、製法綠實越^ス、幾斯劑ト同水ヲ加^フ稀シ用^フベシ、徽毒潰瘍ハ此綠皮ノ煎劑ニテ蒸漏^ス、治ス

胡桃核皮

外皮ノ裏面ニ在外テ核ノ被皮

苦味香氣アリ、虛寒風氣痞

滯、疝腹痛、痙攣、運動ヨリ起ル腹攣痛等ニ殊効アリ。是ヲ燒酒ニ浸^ス、用ヒ或^ク末トシ半錢宛用^フ、但^シ焮衝性

ノ熱症ハ害アリ。

胡桃仁

甘美無毒、温煖滋養ノ効アリ、但過食スレバ

重滯ノ消化シ難シ、膽液過多ノ人ハ殊ニ害アリ。

胡桃油 新鮮ノ仁ヲ搾取ル。製法甘扁桃油名ト同シ味甘美。飲食ニ調和シ乳酪ニ代用ス。内服ノ緩和滋養シ且驅蟲ノ効アリ性功甘扁桃油。阿利襪油ノ如シ○外敷メ緩和シ諸疼痛攣急ヲ鎮メ腫瘍ヲ消散シ毛髮ヲ生メ脱落ヲ防護ス○角膜ノ白斑ニ此油ヲ點メ能消散ス。此油稍澁敗スト雖モ此症ニハ害ナシ〔依叔羅〕

甘草〔グレイセイルリサ〕羅
〔ストホウト〕蘭**試効**

甘味ノ粘液ヲ含ム甚多キ故ニ酷厲液ヲ甘和

包攝シ刺戟疼痛ヲ鎮止シ攣急ヲ緩解シ燥涸ヲ滋润シ彊硬ヲ縱弛スルニ超羣ノ効ヲ稱ス○胃寒傷冷毒ノ酷厲液。肺氣管ヲ侵刺ノ攣急シ且滑液津潤ヲ失テ乾歎喘息聲嗄咽喉痛。胸脇痛等ヲ發スルニ是ヲ用ヒ効多シ故ニ胃寒ノ諸症ニ多ク用フ○凡ル酷厲毒神經ヲ侵刺毀傷ノ疼痛スルヲ和撫甘解スル一良藥トス故ニ胃腸腎膀胱尿道ノ煥衝痛。其他内部諸煥衝ヲ寛解ス○肺煥衝ハ初發此藥ニ葵根麗春花ヲ加用ヒ其煥衝漸ク退フニ隨ヒ茴香。加密列接骨木花等ヲ加用終虛憊ノ症ヲ見スニ至テ亞兒

ニ加ヲ加、衝動健運ノ治スベシ。○麻疹及諸熱病様ノ症ニ乾歎ヲ發シ患者ニ堪ザル者ハ適宜ノ緩和剤ニ甘草ヲ加用テ適應ス。○酷厲毒ノ刺戟メ發スル尿道諸病。劇キ小便淋瀝頻數及黴毒淋。腎痛石淋。小便血ヲ交ル症ヲ治ス。○酷厲毒ヨリ發スル遷延性ノ疼痛假令バ痛風傷冷毒痛。黴毒痛。及諸皮膚病ノ刺戟毒。瘡瘍ノ痛痒甚キヲ寛解ス。○經久傷冷毒痛ニ茴香排毒散亦効多シ。方後茴香。○淹滯セル赤痢下利。其他斯如キ胃腸病ハ其壅滯セル病毒ヲ滌除メ後。對症ノ藥剤ニ多ク甘草ヲ加用テ其剝脱セ

ル滑液ヲ滋生シ枯燥ヲ津潤シ攣急ヲ緩解メ治ス
ベシ○緩和滋潤劑ヲ用ル症ハ甘草ニ大麻子。亞麻
子。罂粟毬。蘆根等ヲ加或甘草膏度祿布^{ドロッパ}圖ニ製シ用
テ尤良○煎劑ハ甘草一两ニ水二北半ヲ加煎服ス
濃煎スレバ胃ニ重滯ノ嘔氣ヲ生シ服シ難シ多々ハ
他藥ヲ加用フ但其劑ヲ煎了^{シリ}テ甘草ヲ加火ヲ下ス
ベシ否サレバ味佳ナラズ又過用スレバ胃ヲ緩弛
スルヲ甚^フ消化ノ機力衰廢シ粘液留飲ヲ生ソ食
欲ヲ減ス○是ヲ舍利別トシ用ルモ亦良

甘草舍利別

製法甘草汁ヲ取ル
甘草膏

有 [名] 人如之

適宜ニ沙糖ヲ加、煎熬ノ舍利別ノ獨ト爲ス主治甘草膏ノ如シ

福依伍
叔淑

番木鼈 マチニン俗稱「ストレ井クノス。又キスホミカ」 羅ガランオク蘭

是ハ「ストレ井クノス。コルダブリナ」ト云、樹ニ生ス此

樹

セイロン印度、島名 麻辣拔爾 ラバール印度西南、國名

哥魯漫得爾東南印度、海濱等國名

海濱等印度地方ニ自生シ甚ダ高大ニメ幹圍一丈二尺許。其實圓ク杏ノ如シ熟スレバ美黃色硬皮被ヒ裏ニ柔白ノ瓤アリ是ニ八個許ノ核仁アリ此即番木鼈ナリ扁圓淡灰色柔毛アリ裏堅剛ニメ角ノ

如ク味苦シ

試効

大毒アリ一二錢服スレハ死ス

禽獸亦同シ

一二刀

服スレハ冷汗頭旋眩暉顫振昏冒搐掣等ヲ發ス○然レニ些少服スレバ催暎麻痺鎮痉ノ効ヲ奏ス或云其効阿芙蓉ノ如シ。然レニ阿芙蓉ヲ是ニ比スレバ起熱乾燥ノ性多シ○粘液質ノ人寒粘液壅滯シ諸管纖維縱緩弛虛、膽液虛乏メ衝動排泄ノ機力ヲ失ヒ粘液留飲鬱蓄セル等ノ虛弱ノ諸症ニ多ク治驗アリ○此藥近來頑固ノ間歇熱ヲ治スル一奇藥トス然レニ切實無危ノ功ヲ確證シ難シ但幾那ヲ用テ驗

ナキ症ハ幾那劑ニ此越幾斯劑ヲ兼用メ効多シ○
扶歇蘭度名其他醫家ノ經験ニ是ヲ赤痢ニ用ヒテ殊
効ヲ稱ス後方尤モ驗アリ

番木鼈消毒飲

番木鼈越幾斯劑

十氏入寒帶來疎散之散者

接骨木水

六弓

亞刺比亞趨謨漿

遏爾託亞舍利別

各一弓

右調和シ一時毎ニ二匙宛服ス○或此藥ヲ丁幾劑
トシ前說ノ諸病ニ用ヒテ良驗ヲ稱ス

番木鼈丁幾劑

製法

番木鼈細末一北 燒酒再餾者四北

右調和シ浸メ藥氣ヲ出シ濁ノ渣ヲ去リ聽用ス。此
劑五滴ヨリ漸ク加テ百滴ニ至ル。瞑眩ノ症アレバ
其量ヲ減ス

番木鼈越幾斯劑製法。健質亞那越幾斯劑

名ト同シ

服量細末トシ二三氏ヨリ五六氏ニ至ル。其質甚ダ
堅硬ナル故ニ鑣屑若ハ刮ヒテ粗末ト爲ス者多シ是
又用レバ胃腸ニ懸留メ消化セズ危篤ノ諸症ヲ發
ス。扶歇蘭度名是ヲ十氏宛日三次用ヒテ記スト雖
モ甚タ過量トス殊ニ粗末ヲ用レバ害アリ。故是ヲ

用、レニハ刮ラズ炙ルノナク極細末トシ若ハ越幾
斯劑トシ粘滑緩和ノ諸品。或亞的兒、阿芙蓉等ヲ和
シ用ベシ。華依伍、華依伍

藤黃

キウムニギウツタ又キウツタガ

修是ハ印度地方ニ產スル一種ノ樹ヲ鑽刻メ出
脂液ヲ曝乾メ凝固スル者ナリ。其樹花生セント
スル時幹皮ヲ鑽刻スレバ乳様ノ液滲出シ稠厚ニ
メ的列竝底那ノ如シ或火氣ヲ以テ其滲出ヲ助ヒト
云。其樹ヲカムボギア又カムバギアト名ク或ゴッタ
ヒカリカルカヒカリゴムキウツタボムキウツテゴムボ

ム等ノ○其樹三種アリ一種ハ喬木ニメ幹巨ク圍
八尺ヨリ一丈二尺許大約二人合抱スベシ其材帶
白色皮微赤裏面黃色粗皮黑色ヲ帶ブ梢頂大枝繁
茂シ廣々數衍メ傘狀ヲ爲ス葉橢圓本末尖リ厚硬
ニメ枝條ニ對生シ面黒綠背淡綠ニメ筋脉隴起シ
短柄アリ味酸澁ナリ花及萼四瓣黃赤色香氣ナシ
鬚蕊淡白色蕊頭黃色一心蕊ヲ闔ム花謝メ圓實ヲ
結ブ大及形橙人如タメ稜起瘡癟多シ條理八九初
綠後黃熟スレバ白色ヲ帶ブ頂ニ小突起アリ味酸
中心八室アリ各一仁ヲ收ム稍長ク扁ク大指節ノ

如シ青黒色。生乾共ニ食フベシ。此樹錫蘭島及麻刺
拔爾ニ産ス。○一種ハ其樹前種ノ如クニノ葉圓ク
肥厚。實ノ形及大梅李ノ如クニノ肉粘滑甘美食ベシ。中
心四個白小仁アリ。此樹ヲ「カントナゴラタト」名ヅ。錫
蘭島ニ産ス。○一種ハ其樹中等ニメ甚ダナラズ大
抵前種ノ如シ。暹羅及錫蘭島ニ産ス。其枝葉ヲ破碎
メ黃汁ヲ取り暴乾メ藤黃ヲ製ス。此樹ヲ「ギウツタ」ア
ヘテヘラト名ヅ。○亞墨利加洲ノ墨是可加冕涅島
等亦是ヲ産スレニ皆下品ニメ藥用ニ勝ズ。或龍骨
木脂汁ヲ以テ偽製スル者アリ。奇木ニハ韓石ベ
國

○榕按ニ藥舗ニ盤様。辨天印ノ二品アリ。辨天印
多ハ上品ナリ。竹筒ニ入乾ス者ナリ。蛇ノ蟠屈セ
ル如シ。是漢人所謂竹管黃ナリ。盤様ハ多沙塵雜
下品ナリ。江戸藥舗說。樂只亭盤様大塊ノ者ハ外
容面竹籠紋アリ。碎ハ全塊色一様ナラズ真黃色處。
帶紅色處。光彩多處。帶黑色處。アリ是其製煉ノ時
小鍋ニテ煎熬シ集テ一大塊ヲ成者ナルベシ。猶
黑糖ヲ小鍋ニ煮。三次ニ一大桶ニ納ル故一桶黑
糖色ノ濃淡質ノ美惡必三等ヲ分カ如シ。

撰品

藤黃其質謾華爾斯ナリ。上品ハ大塊ヲ成シ

硬固ニメ破碎シ易ク。能乾キ淨潔光澤アリテ透亮
ナラズ雜腹蘭色。然庄水ニ溶セバ美黃色トナル。香
臭ナシ嚙メバ粘稠ニメ初味ナク。後漸辛クロ中乾
燥ス。水ヨリハ燒酒ニ能溶化メ清澄ナリ。水ニハ溶
解スレ庄溷濁ス。剝篤亞斯等ノ亞兒カリ利鹽ヲ水ニ
溶シテ此藥ヲ加レバ能溶化ス火氣ニテハ溶化セ
ズ。但火ニ投スレバ焚燒ス○下品ハ汚物沙石ヲ雜
或斑點アリ或透明ノ小碎片ヲ爲ス者ハ皆藥用ト
セズ多ク畫料トス

〔試効〕烈々瀉下シ停水ヲ大小便ニ驅逐スル峻藥ト

ス又能粘液ヲ疏解ス。故ニ水腫。粘液腫等ニ用ヒテ停
水ヲ蕩滌スルニ駿効アリ。但患人粘液質ニノ血液、
運行緩慢ナル者。膠粘液ヲ疏解ノ滌除スベキ症ニ
的當ス。感觸シ易ク且燃衝性ノ症ハ害アリ○服量
二合ヨリ六七合マデ一服トス。八合ヨリ多ク用ル
「稀ナリ。過用スレバ烈ク吐瀉ノ腹痛スル故ニ少
許宛敷用ルヲ佳トス○諸蟲ヲ驅泄スル峻藥トス。
殊ニ條蟲ノ奇藥トス。他ノ下劑ヲ用ヒテ功ナキ症ニ
間大効ヲ奏ス。健質亞那越幾斯劑ニ丸薬トシ用
テ尤良○藤黃ニア兒カリ利鹽剝篤亞斯等加用レバ瀉

下ノ効減ノ利水ノ効多シ故ニ是ヲ水腫ニ用ヒテ甚
験アリ水腫ニ左ノ數方峻効アリ

藤葱驅水丸

水、
藤黃、
白石鹼、
海葱、
各一刀
薑、
甘草、
大半錢、
水、
加羅藤葱丸

右細末トシ研合シ三丘ヲ一丸トシ甘草末ヲ衣ト
シ五丸宛用ヒ日四次。但瞑眩人多少ニ隨ヒ加減ス
加羅藤葱丸 水腫及胸水腹水肢節腫ヲ治ス

藤黃

未一刃

加羅
薑兒

十丘

血瘀

藤謨葱鹼丸

次出ツ
二錢

水、
海葱、
甘草、
大半錢、
水、
加羅
薑兒

右研和メ三十六丸トシ三丸宛用ヒ日三次。口中腫
痛スル片ハ劑中ノ加羅薑兒ヲ去ル

藤謨葱鹼丸

小便ヲ利シ水腫ヲ治シ又能痰ヲ

咯出ス故ニ遷延欬嗽痰喘壅盛等。膠粘液過多
ノ諸症ニ奇効アリ

藤謨安沒尼亞幾

末

海葱、
各二錢

白石鹼

四錢

茴香油、
八滴、
一方去茴香

右研和シニ氏ヲ一丸トシ朝夕十九丸宛服ス

藤英驅水膏

患者壯實水腫腹滿ノ症ニ用ヒテ蓄

水ヲ驅泄スル峻駛劑トス

藤黃 末 一弓半 酒石英 末 一弓

乾薑 末 四錢 患者持此 舍利別 適宜

華利

右令和ノ煉膏ト爲シ早朝半錢ヲ服ス

華利

又服入

福叔依

新訂增補和蘭藥鏡卷十三終

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十四

參蘆莖

參蘆丁幾劑

參蘆清熱劑

參蘆清熱散

雜腹蘭

撰品

偽品 產地

雜腹蘭

丁幾劑

雜腹蘭

越仙劑

雜腹蘭

舍利別

酸模

附 醋漿草

醋漿草

醋漿昆設爾弗

醋漿舍利別

醋漿鹽

地榆

地榆驅水散

地榆

丁幾劑

地榆

越仙劑

芍藥

芍藥排毒散

茴香水

茴香油

茴香

茴香丁幾劑

茴香

茴香排毒散

茴香水

茴香油

角茴香

杏仁

桂皮

茴香油

胡荽子

胡蘆巴

燙

茴香水

茴香油

睡菜

睡菜解凝丸

青蒿

野艾蒿

蒿

芷

解毒水

解毒精

解毒精

解毒水

野艾蒿鹽

健胃

鎮

嘔飲

解毒水

艾葉

徐長卿草

卷

坪兒

始爾草

鬱金

佛甲草

扁桃乳

催睡乳

治勞乳

清涼子

乳劑

清刷

消毒膏

藜蘆

藜蘆蜜

藜蘆

丁幾劑

藜杜

誘嚏散

杜衡

新訂增補和蘭藥鏡卷十四

棕齋先生譯述

男

宇田川榕榕菴校補

雜腹蘭

蘭

口

クス

羅

撰品是雜腹蘭花ノ蕊ナリ一花三蕊ナリ○上品ハ
新鮮柔潤光澤。香氣芳烈微辛苦。黯赤色。長濶シ=繖細
短キハ下但上端濶鈍ニノ雙紅色。下端細ク尖テ白
黃色ヲ帶ビ上品ハ白黃ノ處少々黑色ノ處ナシ。三個相連ル者アリ
指捻レバ柔撓ニノ微滋潤アリ。然ニ濕ラズ粘著セ
ズ細末トナリ易カラズ指間ニ摩スレバ黯赤ニ染。

少許ヲ取テ多量ノ水ニ浸セバ遍ク黃色トナル。雜腹蘭五北ニ水ヲ加、蒸餾スレバ油纏ニ一弓出テ露水ノ底ニ沈ミ黃色烈香アリ○是ヲ貯ルニハ獸ノ膀胱ニ包ミ錫盒ニ内、固封スルヲ最良トス。

偽品微粘潤アレニ指間ニ摩ノ手指染ラズ。水ニ浸メ染色淡薄。香氣微ク。白黃色若ハ黒色ノ者多ク雜ルハ藥用トセズ。是泡出ノ藥用トシ或、深料ニ用。タル滓ヲ乾シ雜、販者ナリ水若ハ燒酒ニ是ヲ浸ソ盡其色ヲ出セバ氣味ナキトナル或、其滓ヲ赤色ニ染メ真品ニ雜、貯テ香氣ヲ寫ス者アリ。是殊辨シ難シト雖モ其色真品ト同。

カラズ、香氣微ク且速ニ消散スルヲ以テ是ヲ知ルベシ○或、金盞花。紅藍花ノ瓣ヲ雜ル者アリ。紅藍花ヲ雜ル者ハ其瓣ノ本形アリテ淡黃色。且、其端ノ邊五稜様ナリ。金盞花亦其瓣ノ本形アリテ淡薄色。又兩品共ニ上端尖リ真品ハ上端鈍ナリ下端真品ノ白尖ト異ナリ○或、牛馬ノ肉ヲ煮テ乾シ剖析メ細條トシ是ヲ真品ニ雜、偽ル者アリ。是ハ赭赤色ニメ下端真品ノ如キ白尖ナシ炭火ニ投メ焦肉ノ腥氣アリ。

產地往昔ハ阨日ナガタガス多麻打葛失曷爾カレル共、亞弗利其名其他印度地方ヨリ輸ス。其後歐羅巴洲諸國殊ニ諸瓦利亞アングリヤ

齊西里亞拂郎私^{アノンス}伊斯把尼亞^{イスバニア}意太里亞^{イタリア}波爾杜瓦爾^{ボルトガル}
喚矢多里亞^{オストリア}蘭牛鐸古博厄美亞^{オランダ}諾爾滿第亞^{ノルマントニア}悉勒西^{シルベニア}

亞等多々是^ヲ培裁^ノ諸方^ニ貨^ス

試效此藥^{。アヨテル}的兒^様ノ油^ヲ含^ミ是[。]微^{ヤハ}催眠[。]麻痺[。]ノ効^{アリ}。故^ニ少^シ許用^フレバ精神^ヲ欣^キ爽快[。]活^{ハシ}頭痛[。]鬱塞^ヲ開散^シ睡眠^ヲ醒解^シ失氣^{昏冒}ヲ^ノ省^復ス。然^レ一頓^ニ多服^スレバ頭目困重[。]昏睡[。]麻痺等^ヲ發^シ或^ハ恐異^{スベキ}症^様ノ笑^ヲ發^シ精神^{昏冒}ノ斃^ル者^{アリ}。或^云一頓^ニ三錢服^スレバ右^ノ如^キ惡症^ヲ發^ソ死^ス然^{レバ}此藥^ハ效力峻駿^{ナル}故^ニ通例半刀ヨリ一刃

マデ泡劑若^ハ散劑トシ與^{ベシ}。但^シ多ク用^フベキ症^ハ一次^ニ半錢^ヲ與^ヘテ害ナシ。又漸次^ニ慣^ヒ用^フレバ多量ニ堪^ル。阿芙蓉ノ如シ[。]○此藥効^ヲ統括^スレバ竄透[。]衝動[。]溫煖[。]開達^シ壯神[。]鎮痙[。]止痛[。]解凝[。]緩和[。]ノ標的^{トシ}諸病^ニ用^{ヒテ}捷効^ス奏^ス。○腦肺心胃及^シ神經^ヲ揮發[。]健運^シ元運氣^ヲ活潑^シ風氣^ヲ驅^リ腐敗^ヲ遏ム[。]○失氣昏冒卒倒^ヲ醒復^シ肢節顫振[。]心悸動[。]子宮衝逆[。]及^シ諸急痛[。]搐掣等^ヲ鎮定^{スル}ニ是^ヲ泡劑トシ與^ヘテ即効^{アリ}。○神思鬱憂沈重悒悶ノ症^ニ用^{ヒテ}精神^ヲ爽快欣慰^ス。○神經熱[。]惡性熱[。]及^シ諸遷延神經病

ノ阿芙蓉ヲ用ベキ症ニ間大効アリ。殊ニ大便閉ヲ兼テ阿芙蓉ノ用難キ症ニ的當ス。○總テ肺病ノ一良藥トシ殊効ヲ稱ス。頑固ノ咳嗽喘急呼吸不利。肺傷勞歟。久歟等ヲ寛解ス。○發汗劑ニ如或一味泡劑トシ用テ發汗ノ峻藥トス。又凝結ヲ疏解ノ排泄ノ効ヲ兼ス。故傷冷毒痛ヲ排除シ粘痰多キ冒寒ノ諸症ヲ緩解シ殊ニ其毒。肺ニ侵襲ノ歎嗽甚キ症ニ尤効アリ然ニ壯實ナル煥衝病ハ害アリ。○痘瘡及諸瘡疹類ノ潛伏内攻スルヲ驅發スル峻藥トス。殊ニ是ヲ丁幾劑トシ或越仙劑トシ用テ鬱毒ヲ皮表ニ

驅逐シ蒸氣及汗ヲ發シ瘡疹類ノ潛伏。殊ニ惡性ノ痘。俄ニ肉攻シ危篤ニ至ル症ハ是ヲ用テ速ニ其毒を驅發ス。服量二十滴マデ葡萄酒等ニ點服ス。又精神ヲ爽快活潑シ失氣昏冒。神思鬱重等ヲ治ス。但過服スレバ人ヲノ妄ニ喜笑セシム。○雜腹蘭丁幾劑製法圖ニ出ツ。○雜腹蘭越仙劑製法圖ニ硝子壙ニ内燒處ニ置數振蕩シ浸丁三日。濾テ液ヲ取り又新亞爾箇兒ヲ加浸丁總テ前法。

ノ如シ濃テ前液ト合シ是ヲ格兒弗ニ内慢火ニテ
蒸餾シ格兒弗ノ底ニ赤色香竄辛味ニメ稀キ油ノ
如キ液一弓許殘ニ至リ其蒸餾液ヲ取り硝子壺ニ
内固封シ貯ヘ聽用ス。其格兒弗底入液亦貯用テ効
勝リ。○雜腹蘭ハ通經ノ良藥トシ經閉ニ殊効ア
リ四五氏ヨリ二十氏許密一味用ヒ或對症ノ劑ニ
加ヘ或痙攣ノ運動ヲ兼シ症ハ阿芙蓉葛私多僂謨
等ヲ加用テ殊驗アリ。○月經アリ時毎ニ發熱頭痛。
腰腹攣急痛等痙攣ノ運動ヲ發メ月經遲速多少調
順ナラズ或閉滯スル者ハ月經定期ノ數日以前ヨ

リ此藥ヲ泡劑トシ服ノ諸症寛解ス。○臨產ニ泡劑
トシ用テ催生レ難產ニ用テ分娩ヲ進メ血暈ヲ鎮
メ衝逆等痙攣ノ運動ヲ靜止ス。○產後昏暈絞痛等
痙攣ノ運動ニ由テ惡露順利セズ。或難產後子宮弛
緩罷弱メ惡露閉滯スル者ハ對症ノ劑ニ此藥ヲ兼
用メ能惡露ヲ下ス。故ニ亦產後腹痛ヲ治シ惡露ヲ
下ス。一要藥トス。○此藥ニ葡萄酒若ハ水ヲ加、搗テ
腹部ニ貼ノ産後腹痛ヲ解散ス。○是ヲ舍利別トシ
用テ鎮痙止痛ノ良劑トス。小兒腹痛等阿芙蓉劑ノ
効ナキ症ハ卵匙ニ一二匙宛與テ捷効アリ

雜腹蘭舍利別

製法

雜腹蘭

四錢

葡萄酒

十二弓

右硝子壘ニ内浸ノ八日絞瀝テ滓ヲ去リ其液十弓
 ヲ取り後藥ヲ加フ沙糖一丸半亦可耳。此藥
 沙糖一丸半亦可耳。此藥
 右調和シ聽用ス○雜腹蘭ハ鎮痛ノ効ヲ以テ疝腹
 痛。腎痛。下利。赤痢ノ腹痛ニ用テ捷効多シ○蒸瀝劑。
 若ハ琶布トシ外敷メ凝血ヲ疏散シ一切焮腫劇痛
 ヲ緩解シ或膿熟ス○琶布ニ如貼メ諸腫瘍ヲ消散
 レ或化膿ス。羅斯及諸瘡瘍ノ焮腫ヲ兼ル症ニ施ノ

能消散ス○痔痛。睪丸。乳房等ノ焮腫痛及硬腫ニ是
 ヲ以テ蒸瀝シ若ハ琶布トシ貼メ速ニ消散ス○一
 切焮腫眼ニ是ヲ蒸瀝藥トシ或琶布トシ貼シ或水
 藥ニ加、或乳汁ニ加、浸メ眼ニ點シ速ニ消散ス又痘
 瘡ニテ眼焮腫甚ク其毒。眼中襲入ヲ恐ル症ハ是ヲ
 乳汁ニ研和メ頻ニ眼瞼及眼胞全部ニ點濕メ能其
 毒ヲ消散ス○香竈藥草ニ此藥ヲ加、囊ニ入温メ心
 窩ニ貼メ剝キ嘔吐。胃痙等ヲ靜止ス胃中汚物壅滯及蛇蟲等ナク
 痊撃ノ運動ニテ乾嘔呃逆等劇症ヲ云

萃伍庚福

酸模 スカランボ俗稱 **アセトーサ** 羅

附酢漿草 カタバニ俗稱 **アセトセルラ**

羅ガラヘルシウリング蘭

試効 生葉根及其絞汁ヲ用フ。乾セバ酸味脱メ効ナシ根葉共酸味多キヲ擇抹ベシ。○清涼收敛ノ血液沸騰ヲ鎮メ壯熱ヲ解シ燥潤ヲ潤シ煩渴ヲ止メ酷厲毒ヲ制シ脉管ヲ收固シ血液腐敗ノ諸病ヲ治ス故壯熱燃衝諸症。膽液熱腐敗熱ニ良驗ヲ稱ス。○酸涼疏解清血ノ効アリテ血中惡液ヲ淨刷ス故惡液質ノ諸病。疥癬。惡厲瘡瘍。熱性ノ失禁兒陪苦ヲ治スル一良藥トス。生根葉水煎ノ服シ或蔬菜トシ食ワ

○吐血下血痔血赤痢ヲ止血熱ヲ涼解ス。○是ヲ昆設爾弗トシ或生絞汁ヲ濾テ上清ヲ取り_{或患者ノ好ニ隨ヒ}攪和シ用フ。或其汁ヲ舍利別トシ共熱病ノ清涼飲トシ用テ壯熱ヲ涼解シ腐敗ヲ防護ス。

酢漿草 性味酸模ト同シ代用スベシ。酸模生草ナキ氏ハ酢漿ナ

草ノ生葉

ヲ用フ

酢漿昆設爾弗

酸模昆設爾弗

製法是ニ同シ

酢漿草 生葉 沙糖 各一 匙

右葉ヲ洗淨シ磁孟ニ内沙糖少許宛加テ搗和シ磁器ニ内固封シ乾處ニ貯フ

酢漿舍利別酸模舍利別
製法是二同**製法**

酢漿草 生葉

右水適宜ニ加、搗キ絞テ汁

ヲ取り濾テ滓ヲ去、靜定メ上清ヲ取り其汁一斗ニ
沙糖ニ比ト加、磁鍋ニ内、慢火ニ上セ、水氣ヲ蒸散シ舍
利別ノ稠ト爲、固封シ貯フ

○酸模或酢漿草ヲ以テ酸收鹽ヲ製シ前說ノ諸病
ニ用ヒテ良驗ヲ稱ス。其効酒石英及拘繩汁ト全同シ

酢漿鹽〔サル・エッセンテア・酸模鹽製法
アセトセルラ〕羅 是二同ニ**製法**

酢漿草、生葉ヲ採能、洗淨シ磁器ニ内、搗爛、

淨布袋ニ内テ盡、其汁ヲ搾取り其量ニ六倍ノ水ヲ

加、濾過數次ニメ、其汁稀薄澄清酸美トナルニ至、其
上清ヲ取、硝子壠ニ内、文火ニ上セ、水氣ヲ蒸散メ酥
〔名〕ノ稠ト爲ス〔叔云〕是ヲ冷處ニ置ケハ結芒是ニ圓腹、
硝子壠ニ内、其頸マデ充シメ其上ニ亞麻油少許ヲ
注入ルヘシ是ニ由テ其汁沸釀或膜ヲ生シ或腐敗
スル等ヲ防ナリ。此壠ヲ清涼ノ窖ニ入レ置ク八個月
許ニメ取出セバ酒石英ノ如キ芒晶其汁ニ結成ス
是ヲ取、水ニテ速洗淨メ其粘物ヲ去リ風乾シ固封
シ貯。此鹽ハ水ニ溶化シ易シ煮レバ其鹽消散ス〔叔云〕
如ク製スレバ鹽ヲ得ルト多シ
絞汁ニ酒石英ノ未以許加前法ノ

又方

酢漿生葉ヲ搾、汁ヲ取ル。前法ノ如クシ其量

四五倍ノ水ヲ加。又是ニ雞子白ヲ研和シ文火ニ上セ少シ煮レバ清濁自ラ分。其稠濁去リ精緻ノ毛布ニテ濾過シ清液ヲ取ル。若澄清ナラサレバ紙奴裏ニテ濾過シ澄澈。水ノ如キ至テ磁器ニ内レ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ舍利別ノ稠トナルニ至テ硝子壇ニ入シ固封シ清涼ナル窯ニ置、下四週許。即_チ結芒ス。其芒ヲ取り水ニテ洗淨シ磁器ニ入レ風乾ス。若潔白ナラザルキハ其芒ヲ沸湯ミ溶シ濾過シ文火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ冷處ニ置テ結芒セシム。其結芒セザル液

七再右ノ如ク水氣ヲ蒸散スレバ結芒ス。是ヲ硝子壇ニ收メ固封シ貯フ。叔_チ依_ク

地榆

ヒムビ子ルラ羅

[試効]根及葉ヲ藥用トス性收瀦シ脉管纖維ノ弛弱ヲ強壯シ創_チ愈シ能_ク内部膿瘍創傷ヲ治ス。故肺傷勞欬ニ用_チ良驗多シ殊_チ屢_チ吐血ノ後發スル勞欬ニ効アリ。生葉一二握ヲ濃煎シ適宜ニ服ス○吐血下血下利赤痢月經過多等ノ諸失血ヲ止ム。但_シ燥衝性人症_チハ害アリ散劑或_チ水煎シ服ス○胃寒傷冷毒ノ

諸症ニ此根ヲ丁幾劑トシ飲液ニ點服メ効多シロ
中咽喉ノ焮腫ハ其丁幾劑ニ消石。玫瑰蜜ヲ加。患處
ニ塗リ或管ニテ吹入テ速ニ治ス○此藥利水ノ殊
効アリ先哲水腫人方劑ニ加用テ小便ヲ利シ汗ヲ
發シ汚液ヲ淨刷シ多ク殊効ヲ稱ス。左ノ方殊ニ總
身水腫脚腫及熱病後ノ水腫ニ効多シ

地榆驅水散

地榆根

細末

杜松實

細末
炎者

鬚ニ暖駕綸安質沒扭或霸王鹽細末

各等分

右調勻シ一刃若ハ半錢許宛用一日三四次○此藥

外敷大面部ノ汚斑小皰潰瘍ヲ愈シ。水煎漱藥トメ
齒痛ヲ止ム

依淑庵

叔因

地榆丁幾劑製法健質亞那。丁幾劑圓ト同シ

地榆越仙劑地榆丁幾劑ト同シ

新

本

新

本

新

本

新

本

新

本

新

本

新

芍藥

ローラニア羅蘭

根

根

根

根

根

根

根

根

根

試効根ヲ用フ。生根ハ微麻痺催眠質人臭氣アリ乾
者ハ其臭消ノ微甘苦收敛ス。○鎮痉止痛ノ一藥上
シ神思感動ヨリ發ス。痙攣擣掣大諸症。神經諸筋
人攣急。頭旋眩暈。癇症。睡覺。小兒癇瘓。子宮衝逆痛。痛

風等ニ良驗ヲ稱ス。煎劑或散劑トシ用フ。○芍藥花
又舍利別若ハ昆設爾弗主爲シ用テ右ノ諸病ナ治
ス。芍藥子亦驗アリ然レバ稍吐瀉之効ヲ兼ヌ。○或云。
此藥癆ニ良驗ヲ稱スレ。味用テ功夫成ス。足ラ
ズ且古人搐掣擊急等神經病ニ大効アルヲ稱スレ
也。晚近ノ諸名哲是ヲ多ク歴試メ殊効ヲ得ザル故
此藥往古ニ比スレバ漸聲價ヲ減セリ。叔依福
此藥根亦效アリ。輕キ亞的兒様ノ油。此藥力專
茴香。ア子。チム。石ニ。キム。羅。ヘンケル蘭。
試効子ヲ用根亦効アリ。輕キ亞的兒様ノ油。此藥力專
茴香排毒散。

茴香

旃那葉

毒敵硫黃華

甘草 各四錢

沙糖 二弓半

○熟入麻風膏

右件各細末メ調匀シ一茶匙宛用^ル日四次

福

○細末八十克ヨリ三十克マテ沙糖ヲ和シ用フ或泡劑水煎シ用フ。破氣驅風劑ニハ一二錢モ加ベシ

○洗藥トシ眼焮痛ヲ消シ凝血ヲ疏散ス。殊ニ露水ヲ取り施メ良

茴香水

製法主治

名ニ出ツ前說諸症ヲ治シ殊ニ健胃ノ効ア

リ。總テ苦味越幾斯劑ヲ是ニ溶シ用テ能其効力ヲ

扶ク。又是ヲ以テ驅風劑ヲ送下スルニ良一味用^ル或亞的兒ヲ加用テ能痰ヲ咯出セシム小兒腹痛ハ茴香水ニ麻油涅失亞遏爾技^名ヲ加用テ速効多シ

茴香油

製法主治

名ニ出ツ風氣鬱蓄痞滿妨悶噫氣疝痛等

此油七八滴許ニ沙糖一弓ヲ研和シ用テ治ス。是ヲ旅行等ニ携ヘ用ニ臨テ此劑二錢ヲ水六弓ニ攪和シ旅中芳香ノ露水ナキ時ニ是ヲ代用メ便利トス八倍右硝子壠ニ入浸ス^ル八日濾テ滓ヲ去リ貯此劑風氣痞滯ノ諸症疝痛等ニ殊効アリ

茴香丁幾劑^{茴香}是ト同シ^{仙劍}製法

茴香適宜燒酒度者十五

角茴香 アニシタム・インデキタム・ステルア子イス蘭

アニシタム・羅・ステルア子イス蘭

此樹三種アリ○第一種ハ日本及支那ニ産ス羅甸
和蘭名ア子イスボーム日本ニテ是ヲ「シキ」又ハナ
シキ即奉ト呼フ。此樹大木アリ葉老利兒様花菊

樣淡白色實莢七八瓣ニ分披メ中央ニ輻湊ス。每莢
仁アリ按此實藥○第二種ハ非利皮那諸島亞細亞洲
南海南島名支那ト馬路古島ノニ產ス此實即藥用ノ
開ニ在リ呂宋亦是ニ屬ス。其樹
角茴香十リ南海諸島及支那韃靼ニテ貿販ス。其樹
一丈二三尺許葉長二三寸濶一寸半許薄ノ末尖羊

齒狀ニメ十一十三或十五葉宛枝條ニ排列ス。花荳
大胡椒ノ如ク攢簇ノ穗ヲ爲シ開ベ菊樣淡白九瓣
宛三襲ニメ二十七瓣アリ實莢形狀第一種實ト同
試効氣味茴香及遏泥子ノ如ニ尤峻ナリ性効氣
殊ニ其莢水以テ蒸餾スレバ油多ク出ツ茴香油遏
泥子油ニ比スレバ精微清澄ニノ氣味峻ナリ○第
三種ハ花地亞墨利加洲國名產ス羅甸名イム・フ
リダンヒア子イヌボーム花赤色實ノ形前種ト同シ尤佳香アリ

華叔

胡荽子

コリアンドルム・サチヒツ
ム羅
コリアンドル蘭**試効** 破氣驅風ノ良藥トシ。温煖強壯健胃ノ効ヲ兼

○香竄藥ヲ加、葡萄酒若ハ燒酒ニ浸シ用テ温煖強壯劑。適應ノ諸症ニ大効ヲ稱ス。假令ハ後方ノ如シ

温壯胡荽飲菖蒲根
土木香根橙皮
各四錢

桂三弓

三茴香

胡荽子
各一弓半

右調勻シ燒酒四十弓ニ浸、丁二十四時、滓ヲ去リ一匙完用、丁日三四次。此劑虛寒ノ胃痛ニ殊効アリ。薄

荷ヲ加ヘテ尤良或諸器ノ運營怠慢虛乏ノ症ハ薄荷油若ハ揮發香竄精名ヲ加用テ捷効アリ。但患者虛憊スレニ感動已甚キ。症ハ右ノ如キ銳烈ノ藥ニ堪。ノ能ハス。唯溫和驅風ノ藥草ヲ葡萄酒ニ浸シ用ベシ。○未トシ沙糖ニ和シ服ノ痞氣鬱滯諸症。疝痛ヲ治シ間歇熱ニ殊効ヲ稱ス依。○取鄭齋方。

胡蘆巴

アニアム・ガラキウム
ギリーキ又ボックスホーレン蘭**試効** 子ヲ藥用トス。味微苦。不佳ノ氣アリ。○温煖疏

解消散止痛。緩和軟化。破氣驅風ノ効ヲ稱ス。○下利

赤痢ニ是ヲ沸湯ニ浸メ粘汁ヲ取り若ハ水煎ノ其
汁ヲ吉利詞爹兒トシ施シ又其汁ニ雞子黃沙糖ヲ
適宜ニ攬和シ内服メ腹痛メ酷厲液大緩和シ腸中ヲ滑利
シ摩急ニ弛メ腹痛ヲ止ム或此末ヲ煮テ琶布トシ
其腹痛ノ部ニ貼メ痛ヲ消散ス○疝腹痛ニ此子ノ
煎汁ヲ吉利詞爹兒トシ施メ其痛ヲ緩解シ大便ヲ
通ス○大便閉ニ是ヲ水煎シ服メ便屎ヲ軟化スルニ
利ス○一切腫瘍焮腫ヲ消散シ或軟化膿熟スルニ
此末ヲ琶布トシ貼メ尤良○此末ニ乳汁ヲ加ヘバ
シ打撲傷青斑等ニ貼メ消散ス○是ヲ沸湯ニ浸

粘汁ヲ取り外敷メ眼焮腫潰爛ヲ治ス

伍叔淑

睡菜

ヨヅガシワ俗稱 テリホリムア多
チキム羅 ワトルテリブテド蘭

試効莖葉共ニ藥用トス○此藥香竈揮發ノ氣ナク
健質亞那。亞爾鮮ノ如ク性効拈失亞及格
ノ衝動ニ由テ胃ヲ健運シ胃腸虛弱ニメ粘液滯積。
飲食消化セザル等ノ諸症ヲ治ス○險重ノ脾病。依
剥昆塙兒萎黃病等ノ諸藥効ナキ症ニ間大効アリ
○頑固間歇熱時々發スル頭痛。粘痰多キ喘急沈滯
耳痛婦人經閉。黃疸。水腫。痛風。失苟兒陪苦等ニ治驗

ヲ稱ス○水腫及黃疸ハ胃腸等弛緩ノ運化怠慢シ
發スル症甚多シ斯如キ症ハ此藥ニ石鹼及鐵劑
加用テ大効アリ○右諸症ニ左ノ方治驗多シ
睡菜解凝丸 新又鵝參水木○劍璽

睡菜越幾斯劑 牛膽各二錢

趨謨安沒尼亞幾 或撒瓦百奴謨

石鹼 勿擗祭亞者一錢半

金硫黃 半錢

右調勻シ三瓦ヲ一丸トシ蜘蛛石末ヲ衣トシ一時
半毎ニ四丸。若ハ其餘是ヲ服ノ惡心ナキヲ度トス
○煎劑ハ此草一弓ニ水十二弓ヲ加煎服ス。或越幾

青蒿

アルテミシア・アプロタ
スム羅アヘリイト蘭

斯劑トシ十瓦ヨリ二十瓦マデ一服トス 製法名失
ト同丸藥トシ用モ良○外敷ノ諸般惡厲瘡瘍疥癬
經久瘻瘍等總テ臭穢腐爛ノ潰瘍ヲ淨刷ス

試効 穂及葉ヲ用フ。苦味香竄微收瀉シ疏解淨刷利
尿發汗殺蟲ノ効ヲ稱ス。大抵亞爾鮮ノ如シノ經閉
ヲ通シ萎黃病處女病白帶下痛風ニ効アリ○肝脾
壅塞ヲ疏解シ頑滯ノ間歇熱及黃疸ヲ治ス。末トシ
服メ尤良○小兒頭瘡浸淫瘍ニ用テ膿ヲ排ヒ淨刷

ス○水煎ノ内服シ或吉利詞爹兒トシ施メ殺蟲ノ効亞爾鮮ニ勝レリ○是ヲ袋ニ盛ル腹部ニ貼メ小兒蟲症ヲ治ス○水煎シ服メ歎嗽喘息ヲ治ス○芭布或蒸湯劑トシ腫瘍ヲ消散シ腐敗ヲ防護ス○水煎メ洗藥若ハ塗藥トシ惡性ノ疥癬乾癬小兒頭瘡等ノ皮膚病及諸毒蟹刺咬ヲ治ス伍叔依

野艾蒿

曰ノヨモギ俗稱アルテミシアニ

ニ羅セールケレインアルテミシア蘭

○按ニ野艾蒿性味功用亞爾鮮名ト同シ代用スベシ故ニ斯其主治ヲ贅セズ唯一二ノ試効方

ヲ舉グ
試効方蒸氣及汗ヲ發シ小便ヲ利シ粘液ヲ稀釋シ胃ヲ健運シ風氣ヲ驅散シ冒寒傷冷毒瘴厲疫毒ヲ排除スルニ左ノ方甚ダ驗アリ

蒿芷解毒水

味四三五
稱毒詳二五

野艾蒿葉新者

白芷葉新者

薄荷葉新者各等分

右水適宜ニ加蒸餾ノ露水ヲ取リ其法名薄荷水ト同硝子壠ニ内固封シ貯フ○右藥料燒酒ヲ以テ蒸餾シ精ヲ取ル是ヲ解毒精ト名ク此精八比ニ蒸餾醋一比ヲ

攬和ス是ヲ解毒酸精ト名^ク_ト症ニ用アル○熱病及傷冷毒等不寐ニ因テ患者憊困スル症ハ後方ヲ與テ輕ク催睡發汗メ良効アリ斯ノ如キ症。催睡ノ峻藥ヲ用レバ病毒ヲ壅遏ノ害アリ

催睡解毒水

葛白朮粟舍利別

三弓 解毒精 二弓

禁糞水

六弓

右調和シ毎夜臨卧四匙宛服ス。熱病不寐ノ症ハ二時半若ハ二時ニ一匙宛服ス。

野艾蒿鹽製法及性功亞爾鮮鹽

同ト同シ○熱病ノ

患者胃虛弱ニメ惡心嘔吐ヲ兼ル者後方奇効アリ健胃鎮嘔飲

野艾蒿鹽 三錢

水 一升半

綠藜精

適宜

解毒精

沙糖 各十二錢

右先野艾蒿鹽ヲ水ニ加、煮テ浮沫ヲ去、次綠藜精ヲ少許宛滴メ沸淬セザルヲ度トシ次解毒精ト沙糖ヲ加、一匙宛數服ス○胃中酸敗液ヲ消シ小便ヲ利スルニ此鹽六瓦ヨリ十瓦マデ水ニ溶服メ尤良○酸敗液ヲ消シ小兒搐搦ヲ治スルニ左ノ方殊効ア

リ。酸敗液ハ擣掣等危險人小兒病ヲ發スルト甚ダ
多シ。又此方拘僂病ヲ治スル常用ノ良藥トス
健胃消毒水 取入胃中類娘敷之散 此更
燒野艾蒿鹽 取入 二錢 少 薄荷水 取入 二湯匙 少 醬
右溶化シ二三十滴寇飲液ニ點服ス此一日兩次。或
乳汁若ハ乳清名少許ニ點服メ尤良 利斯

鴉黎散**驗毒散**

艾 アルテミシア 羅

試効葉ヲ藥用トス。溫煖開達。強壯。疏解淨刷。止痛。ノ
一藥トス。○輕久經閉ヲ通シ子宮癰血壅滯ヲ淨掃

シ小便ヲ利シ處女病。惡液腫。萎黃病等ニ良驗。ト稱
ス○水煎シ腰胯陰處ヲ蒸湯ノ經閉ヲ通ス 依物叔伍

徐長卿

アナハラ又柳葉細辛花戶ノ稱アスクレピア
スヒンセトシキム羅スワリク左弓ルトル蘭

試効 根ヲ用フ。苦辛香竄。溫煖衝動ノ汗ヲ發シ小便
ヲ利シ經閉ヲ通シ神經ヲ強壯シ腐敗ヲ遏止ス。性
功纈草ニ類シ又昆答刺コシタラエルハ 越兒發名ノ如シ代用ノ
神經熱惡性熱等ノ患者虛憊シ發汗ノ治スベキ症。
及惡性傳染發班熱ニ効アル等。總テ昆答刺コシタラエルハ 越兒發
ノ主治ニ舉ル諸病ニ的効アリ○水腫。喘急。疝痛。及。

癰症。脾病。子宮病ヲ治シ蛇蟲ヲ殺ス○未トシ一錢
マデ一服トス。或、水煎シ服ス

叔伍依

捲塹兒蘭 テイニウス・シルヘストリ
ス羅 スラ アリルデテイニウ蘭

○按此草伊吹麝香草ト呼名迷迭香精條ニ記ス

如シ長雋足立氏東山道ヲ經過シ信州八幡鹽灘岩村田・小田井等路傍河邊阜丘ニ多シト云

試効葉及花穗ヲ用ア。性温。微收瀦。香竄ニノ頭腦神經ヲ強壯シ痙攣搐掣ノ運動ヲ鎮メ粘液ヲ稀釋シ飲食消化ヲ扶ケ痙攣ノ諸症。子宮病等ノ神經病ヲ治シ萎黃病。處女病ノ如キ粘液質ノ諸病及諸管纖

維縱緩弛弱ニメ粘液壅滯セル經閉ニ効アリ○稍發汗利尿ノ効アリテ汚液ヲ排除ス故ニ冒寒傷冷毒痛ヲ消シ咳嗽痰喘頭痛等ヲ治シ殊ニ羅斯ニ良効ヲ稱ス○泡劑煎劑或未トシ用フ。功大約迷迭香刺賢塹兒 ロウノ如シ○蒸湯劑トシ頭痛。傷冷毒痛。痙攣搐掣等ノ患部ニ施メ虛憊セル神經筋膜ヲ健運シ其疼ヲ消散ス○花葉ノ露水 製法 ロウ薄荷水ト同シ取リ傷冷毒痛及痙攣搐掣ノ諸症ニ内服外敷メ殊効ヲ稱ス○蒸餾油 製法 ロウ薄荷油ト同シ内服ノ風氣ヲ驅リ胃ヲ健運シ食ヲ進メ小便ヲ利シ汗ヲ發シ癰症ヲ寛解ス

○齶齒痛ニ此油ヲ綿絮ニ滴シ齶孔ニ捕テ劇痛消

散入依國儀

鬱金 キルキツマ 羅 インデアンセサフラン 蘭

試効 石鹼様ノ質アリテ解凝ノ一良藥トシ稍衝動メ利尿ノ効アリ。○内藏壅塞硬塊殊ニ肝脾壅塞ヲ疏散スルニ大効ヲ稱ス。或云。格碌屈斯。未爾扶斯。固其他鐵劑ヲ用ヒテ功ナキ症ニ多ク良驗ヲ得タリ。○經閉ヲ通シ黃疽ニ用ヒテ効多シ。○水腫ニ用ヒテ小便ヲ利シ腎痛ヲ治シ結石ヲ驅出ス。○此藥散劑煎劑。

丸藥煉膏ニ加用フ。服量一刀ヨリ半錢ニ至ル

淑國依

佛甲草

ツルレンゲ 俗稱

セムペルヒヒウ

蘭

試効

葉鹼味收斂汁ニ含ミ其性消石様ニノ清涼シ

汚物ヲ淨刷シ酷厲毒ヲ制挫ス。○此生汁一味或沙糖ヲ和シ或舍利別上シ内服メ壯熱ヲ清涼シ煖熱ヲ祛キ煩渴ヲ止メ咽喉口舌ノ煖脰ヲ消レ又下利赤痢ニ良驗ヲ稱ス。○驚口瘡咽喉口顎斷舌唇等ノ焮痛潰瘍瘡胞失荀兒陪苦ノ腐爛或乳頭唇舌手指等ノ坼裂痛或浸淫瘡火傷等。此葉ノ生絞汁ヲ以テ

含漱シ或、患處ニ塗テ速ニ愈ユ○咽喉口中ノ潰瘍
其他荏苒タル咽喉病ハ此葉汁ニ玫瑰蜜名ヲ等分
研和シ少許宛口中ニ含テ偉効ヲ稱ス但口頸唇
舌等ノ癌様ノ惡厲潰瘍ハ沒藥若ハ沒藥丁幾劑ヲ
加テ研和シ外敷メ極テ的當ス假令バ後方ノ如シ
然ニ真ノ癌瘡ハ効ナシ

清刷消毒膏

佛甲草佛甲草汁

四錢

玫瑰蜜

一弓

沒藥丁幾劑

二錢

龍腦

二丸

右研合シ絲撒絲ニ塗テ患處ニ貼シ數更換ス○

腫羅斯火傷等此葉汁ニ胡桃油ト燒酒少許ヲ和シ
塗藥トシ施メ消散ス○咽喉焮腫ニ此葉汁ニ硝砂
少許ヲ研和シ漱藥トメ捷効ヲ稱ス○眼焮腫及角
膜斑翳ニ此葉汁ヲ點メ消散ス○痔ノ焮痛ニ此葉
ヲ乳汁ニ煮テ膏ノ如クシ患處ニ貼メ其腫痛速
消散ス○胼胝様硬肉魚目等ハ此生葉ヲ醋ニ浸シ
取出シ乾貼スレバ硬肉漸軟ニカリ消散ス依叔

清涼子

ブルクレンデサーデン

蘭

附乳劑 榻按清俗是ヲ酪ト稱ス杏酪ノ類ナリ女科切要ニ洛ニ作ル

是ハ清涼滋養ノ効アル子仁類ヲ總稱ス。多ク藥用
トスルハ胡瓜子。甜瓜子。西瓜子。壺盧子。ナリ古人是
ヲ四種清涼子ト曰フ。冬瓜子。トウガ越瓜子。エトウガ南瓜子等亦用
ベシ。○凡此類ノ子仁ハ滋養緩和ノ効アル油質ノ
粘液ヲ含メリ故ニ乳劑トシ用レバ扁桃。大麻子。亞麻
子等ノ如ク血中ノ酷厲液ヲ包攝甘和メ刺戟衝動
ヲ減除シ血液沸騰ヲ抑制メ運行ヲ降鎮シ且々毀傷
セル神經ヲ和撫滋養メ攣急ヲ寬弛ス。是ヲ以テ自
清涼滋潤解熱ノ良効ヲ奏シ蒸氣ヲ發シ小便ヲ利
シ壯熱煩悶不寐煩渴上衝頭痛及胸脇煩衝肺煩衝。

小便不利淋澁焮痛ヲ治シ殊ニ肺傷勞熱内伏熱等
頑固ノ肺病ニ大効ヲ稱ス。但壯熱甚キ症ハ消石ヲ
加ヘテ良。○凡乳劑ハ澁敗シ易キ故ニ毎次新製シ用
ベシ。澁敗スレバ酷厲毒ヲ生メ侵蝕性トナリ是ヲ
服メ大害アレバナリ

乳劑

ヨウラルシヌ羅 サードメルキ又アマ
ンドルメルキ又メルキダラシカ蘭

是節^ナ乳汁様ノ飲液ニ性味功用亦乳汁人如江製
法前說ノ子仁類ヲ適宜ニ取リ石臼ニ内沸湯或大
麥煮汁ヲ少許宛加ヘテ搗爛^シ布片ニ包之搾リ濾テ
汁ヲ取り患者ノ意ニ隨テ沙糖ヲ加甘美トシ服ス

○甘扁桃ニテ製スレバ尤良。其他前說ノ子仁ノ之
大麥大瞿粟子。榛子。芍藥子。胡桃子等亦乳劑ニ製ス
ベシ。○發汗ヲ要スル症ハ安質沒扭アヤカ若波列アラタ蜘蛛
石等ヲ加フ。○華爾斯及搾油類扁桃油。阿アモ以テ亦
乳劑ヲ製スベシ。是ハ先其油ニ雞子黃ヲ研和シ次
水大加レハ能混和ス。試効乳劑ハ胸肺諸症。欬嗽
等々寛解ノ滋養シ血中酷厲毒消メ内熱ヲ解シ
又催睡降鎮ノ一良劑トス。其他功用前說ノ清涼子
說ク如シ。又乳劑數方ヲ左ニ舉ク隨症擇用ベシ

扁桃乳 甘扁桃四丸右暫温湯ニ浸メ皮ヲ去白

**内細搗キ磁壺ニ内沸湯少許加テ泥ト爲シ能研
和シ次ニ多沸湯ヲ加テ乳汁ノ稠ト爲シ。蓋閉一時
許ニメ時々攪セ患者ノ意ニ隨テ多少沙糖ヲ和シ
瀘テ貯、臨時ニ温用フ。此劑清爽滋養潤燥ノ殊効ア
リ。右製法ノ沸湯半、ヲ減メ其量ノ乳汁ヲ加製スレ
バ滋補ノ功尤峻ナリ又法 甘扁桃三弓大麥煮汁
ヲ加製スル。前法ノ如シ硝子壠ニ内冷處ニ貯ヘ
臨時ニ温服ス。大麥煮汁製法精大麥一弓水五升
半許煮半時餘瀘テ汁ヲ取ル**

催睡乳 甘扁桃皮ヲ去者四個清涼子前出二錢白瞿粟
子一錢半右製法扁桃乳ノ如ノ乳劑ト爲シ白瞿

粟舍利別四錢ヨリ六錢マデ加^{セイジ}或^{セイジ}電阿芙蓉液十二滴ヨリ十五滴マデ加^{セイジ}攬和ノ一服トシ臨卧ニ用

治勞乳

清涼子十二錢 甘扁桃皮二個去壳

右臼ニ

内左ノ泡劑ヲ適宜ニ加^{セイジ}搗爛メ瀝過シ每朝空心毎夜臨卧ニ服ス

泡劑方

洞庭藍一撮

連錢草或

葵葉半握右沸湯ヲ加^{セイジ}テ泡出シ滓ヲ去リ遏爾託亞

舍利別四錢ヲ攬和ス○右ノ諸乳劑沙糖ヲ加^{セイジ}製ス

ル者ヲ總テ乳舍利別ト名^{セイジ}ク

叔物

藜蘆

「ヘラトウムアルビウム又「ベルレボリタス」

アルビウス羅「ナツテテスコロイド」蘭

試効根ノ鬚ヲ去用ノ烈々吐シ且瀉下ス停水留飲粘液黑膽液等ヲ滌除シ癲癇狂躁神思鬱憂錯狂依剝昆姪兒脾病及麻痺不遂等頑固病ヲ療シ水腫ニ間奇効ヲ奏ス然ニ體稟壯實ニメ厥衝ナキ人ニ用ベシ虛人及厥衝性ノ病ハ大害アリ○服量末トシ半瓦ヨリ四五瓦マデ對症ノ藥劑ニ加^{セイジ}患者瞑眩ニ堪^{セイジ}マデ用ベシ但過用スレバ胃腸厥衝ヲ發メ搐掣ノ諸症ヲ起シ危險ニ至ル○狂人ハ服藥ヲ惡ム故ニ此未^シ飲膳蔬羹ニ加^{セイジ}與ベシ○狂癇神思憂悶錯狂等總テ精神錯亂病ハ此藥ノ暴劇攬擾ノ瞑眩ニ

因テ脳失常ノ運動變化シ回復ヲ得ルノ先哲ノ試
說甚多シ○或云。神思鬱憂病人錯狂ニ此藥ヲ試用
ト二十八人或全治シ或其症輕快ヲ得タリ○或云。
發狂及神思鬱憂病ノ狂症ニ黑膽液鬱滯ノ徵候ヲ
兼ル者此藥殊的効ヲ見ル○或云。發狂及神思鬱憂
狂症ニ此鬚根ヲ取末トシ沙糖ヲ研和シ初日一瓦
宛與ヘ漸加テ一刀宛用ニ少モ惡症ヲ發セズ全愈
セリ○或云林檎ヲ取り瓢^{ホウ}ヲ剗出シ肉存シ是ニ
藜蘆根一二錢ヲ填充シ紙ニ裹テ熱灰中ニ煨熟シ
藜蘆ヲ去林檎ニ沙糖ヲ摻メ甘美トシ尋常ノ菓子

ト稱シ狂人ニ與ト毎朝一個。是ヨリ其症漸輕快ヲ
得テ竟ニ全治セリ○此藥蜜劑トシ用テ前說ノ諸
病ニ尤効アリ即黎蘆蜜次出本此劑効力稍緩ニメ烈瞑眩
ナク。他ノ吐劑ヲ過用ノ功ナキ癲狂及癇等ニ與テ
劇症ヲ發セズ能膠粘ノ酷厲液ヲ導泄シ峻下渴水
ノ大効ヲ奏シ且蟲ヲ驅泄ス又此劑服量些少ニメ
吐渴セザル許ニ數服スレバ水腫。惡液留飲腫萎黃
病。粘液性喘急。胸水等ニ奇効アリ是ヲ用レバ徐々
ニ纖。舌管ヲ衝動ノ血液運行ヲ增進シ膠粘液ノ
壅塞ヲ稀釋ノ開達シ諸液ヲ體表ニ渙發シ且尿道

ニ驅逐スレバナリ。先哲極テ其偉功ヲ稱セリ。

藜蘆蜜 製法海葱蜜名ト同シ○丁幾劑テイシキトシ用テ亦

狂癇及子宮病、搐搦ヲ兼ル等、神經病ニ良驗アリ。服量二十滴ヨリ四十滴マテ飲液ニ點服ス。分數養資

藜蘆丁幾劑

製法

藜蘆根細末一弓

燒酒十五度者

八弓

右硝子壘ニ内浸丁八日。濾テ滓ヲ去、聽用ス亞○此

根細末シ少許、宛鼻中ニ吸入メ、嚏藥トシ頭中粘穢惡液ヲ誘泄シ。頭痛、黑障眼等ニ殊効ヲ奏ス。但感動甚キ人ハ他藥ヲ加、施スベシ。後方尤良。

藜杜誘嚏散

藜蘆根末六氏

杜衡根末二錢

薄荷油沙糖ヲ適宜ニ研和

スル者六滴

右研和ノ散剤トシ數、鼻中ニ吸引ノ嚏ヲ發ス

伍淑依

杜衡

ガニアフヒ花戶アサ
リム羅アシスヨール蘭

試効 根及葉酷烈氣アリテ内服スレバ吐下ス。先哲此根ヲ吐藥トシ用フ。然レバ百葛格安那ペカコアナニ比スレバ効力緩弱ニメ半錢モ用ザレバ吐セズ○此根能ク小便ヲ利シ又發汗通經ノ効アリ故水腫、腹水等ニ

用テ多治驗ヲ稱ス○間歇熱。內藏經久壅塞。下利ヲ
治ス○根末ヲ鼻中ニ吹入テ輕キ嚏藥トシ頭中膠
粘汚液ヲ誘泄シ頑固頭痛等ヲ治ス依括
新訂增補和蘭藥鏡卷十四終

新訂增補和蘭藥鏡標目

卷十五

蒲公英

蒲蘆解凝飲

蒲公薄荷飲

蒲蘆排毒丸

白屈菜

白屈菜越幾斯劑

白屈鹹解凝丸

白屈海葱飲

紫董

紫董解凝丸

紫黃解凝飲

紫董丸

紫董越幾斯劑

紫董舍利別

濱瞿麥

瞿麥解凝飲

黃石瞿麥飲

濱瞿麥越幾斯劑

白石瞿麥散

土茯苓

薩苓排毒煎

沙列布

沙列布潤燥飲

沙列布吉利詞

綿馬

蘇汞驅蟲膏

綿馬蠅蟲膏

黃豆

龍公山补骨

燕鵲膠敷丸

曼陀羅花

東藏精鍛丸

龍公山杏燉

卷十五 曼陀羅花越幾斯劑

曼陀羅花丁幾劑

煙草

煙草解凝飲

煙草越幾斯劑

新訂增補和蘭藥鏡卷十五

榛齋先生譯述

男 宇田川榕榕菴校補

蒲公英

「タムボホ」俗稱「タラキシ」

「キウム」羅「パールデブルーム」蘭

此草乳樣ノ汁ヲ含ミ殊根ニ多シ其質趨謨華爾斯

ニノ味苦微鹹甘ヲ帶ズ此藥ノ効力專此汁ニ在リ

故生鮮ノ根莖葉及其搾汁ヲ取り藥用トス乾根ハ

其汁耗散スル故効力鮮シ秋冬莖葉萌發セザル時

ハ其汁專根ニ在レ故是ヲ取越幾斯劑トシ貯用ヒ或

生根ヲ細剗ニ沸湯ニ浸シ藥氣濃出テ茶湯ノ如ク

ナルヲ用。或春夏莖葉繁茂ノ時ハ生草ヲ搗其汁ヲ搾取リ頸長硝子壺ニ充シメ其上ニ油ヲ注内固封シ貯レバ速ニ腐敗セズ。是ヲ用時其油ヲ注去リ其汁ヲ取り服ス。

試効解凝ノ一良藥トス石鹼様質アリテ凝結ヲ疏解シ小便ヲ利ス○粘稠凝痰ノ血液膽液粘液等ヲ溶解稀釋ノ分利シ諸藏ノ壅塞ヲ疏解ス○此藥稍苦味ヲ帶テ健胃ノ効ヲ兼ヌ故飲食消化ヲ扶ケ腹内諸藏脉管ヲ健運シ血液ヲ稀釋ノ諸竅ノ分利排泄ヲ進ム○血液稠厚ニメ煥衝ニ傾クヲ稀釋ス。故

血質及諸管纖維ノ運營ヲ減損スベキ諸症ニ的當ス○煥熱諸症及間歇熱ハ此根ヲ泡劑トシ若ハ蘆根山牛蒡根等ヲ加用テ効アリ煥衝性ノ春月間歇熱ハ大抵斯如キ劑ニテ其蘊毒ヲ疏解シ小便ニ排泄スレバ回復ス。熱病ノ餘毒ヨリ發スル諸症モ此越幾斯劑ヲ用テ其毒ヲ疏解スレバ治ス○健胃解凝ノ効ニ因テ腹内諸藏ノ壅塞ヨリ發スル熱病及遷延諸病ヲ治ス○神思鬱憂病ヲ治シ殊膽液過多ノ熱症ニ良○精神錯亂ノ症腹部諸藏壅塞ヨリ發スル者多シ若其壅塞ノ疏解スベキ症ハ此藥ヲ用

テ其凝結ヲ疏散メ治スル者多シ○肝脾等ノ壅塞硬腫ヲ疏散シ黃疸水腫小便閉ヲ治スルニ此藥ヲ對症ノ解凝劑ニ加水煎シ用テ甚^ヒ驗アリ○肝壅塞硬腫ハ此藥ニ酸模葉或酢葉ヲ加水煎シ滓ヲ去雞子黃ヲ適宜ニ攬和シ數週若^ハ一月許用テ効多シ或酒石英ヲ加用^{ルモ}良^ヒ黃疸及腹水初發ニ斯如キ劑ヲ用テ効アリ粘液壅滯ヨリ發スル症ハ殊^ニ適應ス但頑固險重ノ壅塞及膽液ノ結石牢著メ發スル黃疸ハ右ノ劑ニテ治難シ○凡胸腹諸藏經久ノ壅塞アリテ未^タ頑硬腫トナラズ腐壞ノ候ナキ者此藥ヲ解

凝清血ノ劑ニ加長服メ治ス假令バ後方ノ如シ

蒲蘆解凝飲

蘆根 二弓

瀆瞿麥根 三弓

洋芹根

茴香根 各二弓半

右沸湯ヲ加テ泡出シ其液三十弓ヲ取後藥ヲ加フ
當接骨木傑列ケレイ名四弓

赤蒲公英越幾斯劑エキス二弓

酒石葉名四錢

右調和シ一時若^ハ一時半毎ニ一小茶椀ヲ服ス或其症ニ隨ヒ後方ヲ與ベシ

蒲公茴香飲

蒲公英越幾斯劑 一弓

茴香水 八弓

孕礬酒石 四錢

茴香水 八弓

右研和シ一時毎ニ一匙宛服ス

蒲公薄荷飲

蒲公英越幾斯劑 二弓

薄荷水 六弓

白蜜 去沫者 一弓

右溶和シ一時半毎ニ一茶匙ヲ服ス○頑固ノ痛風遷延傷冷毒痛。粘液質ノ間歇熱等ノ煩衝ナキ者ハ左ノ方ヲ連進シ發汗ノ良驗多シ

蒲鷺排毒丸

蒲公英越幾斯劑 一錢半

雙鷺菊越幾斯劑 半錢

山牛蒡根 未 適宜

右捏和メ六十九トシ朝夕一丸宛用フ○經久胃痛幾多解凝剤ノ効ナキ症。此生根ヲ細剉ミ泡剤トシ用テ間速効アリ○此藥ハ諸腺ノ分泌殊皮腠ト腎ノ分利ヲ進輸ス。故荏苒淹滯ノ瘡瘍ヲ驅逐シ小便ヲ利ノ其毒ヲ排除ス是ヲ以テ清血ノ一良藥トシ排毒淨汚ノ飲剤ニ加用テ殊効アリ假令後方如シ

蒲蘆排毒飲

蒲公英根

失格列乙根

或洋萬葛根
代用ス

蘆根 各四弓

接骨木花

茴香

洋芥子

杜松實

各四錢

右水適宜ニ加、浸ノ能、藥氣ヲ出シ其液百弓ヲ取り
一茶椀宛温服ス○服量、生汁及越幾斯劑ハ日ニ一弓
ヨリ一弓半ニ至ル。煎劑ハ根一弓ヲ水六弓ニ煎服
ス○生根搗爛シ腺ノ硬腫ニ貼ノ消散ス。其汁ヲ眼

ノ角膜星翳ニ點ノ消散ス

福依叔

蒲公英越幾斯劑

製法名ニ出ツ

白屈菜

セリドニキム・マイス羅

スチン

蘭

○榕桉ニ和名クサノワウト呼ブ原野ニ多シ是
尋常品ナリ。一種大葉大花ノ者アリ花戸ニクサ
ヤマブキ又山吹草ト呼ブ性効同シ共ニ藥用ニ
供スベシ
試効根莖葉共ニ藥用トス是ニ黃色汁アリ味苦辛
臭氣アリ根汁殊ニ黒黃粘稠ナリ此草乾セバ其苦

辛味減シ解凝利尿ノ殊効アリ故ニ燃衝ナキ水腫。腹水。荘再タル黃疸ヲ治ス。○水腫ニ用ヒテ肝ノ壅塞ヲ疏解シ小便ヲ利ス乾根ハ二錢生根ハ五六錢用。○肝脾壅塞硬腫及萎黃病。處女病等多ク治驗アリ。○或黴毒ニ特効アル藥トシ是ヲ水銀ノ代用藥ノ如クス根及莖葉ヲ乾シ用。或其越幾斯劑モ亦用フ。○服量細末ハ半錢ヨリ一錢マデ一服トス水煎シ或水。葡萄酒等ニ浸シ用フ。生根ハ一弓ヲ葡萄酒十六弓若ハ二十弓ニ浸シ用フ。

白屈菜越幾斯劑

製法名失傳答
越幾斯劑同

此根及莖葉ノ

生絞汁ハ其質石鹼様ニノ甚刺戟シ殆ド侵蝕ノ瀉下ス。或云瀉下ノ効是ヲ以テ解凝ノ一良藥トシ黃宜等ニ大効ヲ稱ス。故ニ其生汁ヲ越幾斯劑トシ對症ノ劑ニ加用ル。多シ○腹内諸藏ノ壅塞及粘痰多キ肺ノ諸症ハ此越幾斯劑ニ刀マデ一服トシ用テ偉効アリ。○内藏壅塞ヲ疏解スル効ニ因テ間歇熱及其毒壅鬱メ發スル水腫。黃疸。其他前說諸病ヲ治ス。此劑五瓦ヨリ十瓦許。宛苦味解凝ノ越幾斯劑蒲公英。亞爾鮮。健質亞那。紫堇等ノ越幾斯劑ヲ云ニ加丸藥トシ用ヒテ良。右諸病ニ左ノ解凝劑亦治驗多シ。

屈鹼解凝丸

石鹼

勿擗祭亞者
或白石鹼

白屈菜越幾斯劑

石鹼

蔻謨安沒尼亞幾

各一錢

右研和シニ合ヲ一丸トシ朝夕十五丸空服ス

白屈海葱飲

自一錢
至二錢

白屈菜越幾斯劑

黑栗薩水

四弓

海葱蜜

一弓

右研和シニ匙宛用丁日四次○角膜曇暗星障翳膜ニ此生絞汁或此越幾斯劑ヲ水ニ溶シ黒ノ消散ス但是ヲ黒ノ疼ヲ覺ル者ハ蜜若バ沙糖ヲ研和シ施

ベシ○眼焮腫潰瘍等ニ此生絞汁ヲ薔薇露若ハ乳汁ニ和シ黒ノ治ス○疣贅息肉等ニ數生汁ヲ擦テ消散シ或軟化侵蝕ノ除ク汚穢潰瘍惡厲侵蝕瘡ニ是ヲ洗藥トシ或芭布トシ貼ノ淨除シ治ス

依福

叔淑

紫董

ヤブケマン俗稱曰ウマリ

ア羅

曰イヘケルフル蘭

試効

莖葉ヲ藥用トス味苦不佳ノ氣アリ且石鹼様ニメ清涼性ノ汁ヲ含メリ是ヲ以テ凝結ヲ疏解シ稠粘ヲ稀釋ノ内藏壅塞ノ諸病ヲ治スルト蒲公英ノ如シ○此藥ノ鹽氣及苦味質ヲ以テ胃ヲ健運シ

蒸氣及汗ヲ發シ小便ヲ利シ微瀉下シ腐敗ヲ遏メ
粘液膣液等ヲ分利導泄ス。故ニ失格列レイ及蒲公
英主治ノ諸病ヲ治シ秀偉ノ清血藥トス。○間歇熱
ニ用テ能熱毒ヲ排泄シ萎黃病。粘液腫。黃疸。脾病。依
剥毘シル兒。神思鬱憂病。痛風。脚痛風。失荀兒陪苦。等ニ
用ヒ解凝ノ殊効ヲ以テ病毒惡液ヲ諸竅ニ排除シ
治ス。○胸腸腑衝熱ノ門脈壅塞ヲ兼ル者ハ此藥尤
効アリ。○黃疸ニ於テ膠粘液殊ニ多ク胃腸ニ壅滯
シ大便祕閉。腹中困重ヲ覺ル等ノ症ハ此藥ニ下劑
ヲ加用テ峻効アリ假令バ左ノ二方ノ如シ

紫董解凝丸

紫董越幾斯劑 三錢

葛爾儒越幾斯劑

名

大黃

各半錢

右合和シ二丸ヲ一丸トシ桂末ヲ衣トシ朝夕十五
丸。宛用フ。

紫黃解凝飲

紫董越幾斯劑 三錢

大黃丁幾劑

名

苦味健胃酒

製法次
出

酒石葉液

名

各一弓

實亞格日溫

名

六錢

右合和シ時、一匙宛用フ

苦味健胃酒

エリキシルヒスセラ
レホップマンニ羅

製法

橙皮 新鮮者
弓半

葛爾儒越幾斯劑

珊篤里越幾斯劑

健質亞那越幾斯劑

幾那越幾斯劑

沒藥越幾斯劑 各二錢

葡萄酒 二升

右橙皮の葡萄酒ニ浸^ス二日絞

テ滓ヲ去^ス次諸^{エキス}越幾斯劑

ヲ加^ム溶和ス

括

試効 胃ヲ健運シ飲食消化ヲ扶^ム汗ヲ發^スシ胃腸
粘液留飲酸敗液ヲ排除シ蛇蟲ヲ殺^スシ食ヲ進
メ心下妨悶苦滿風氣痞滯疝痛萎黃病脾病依^イ
剥昆蛭兒等ヲ療シ一切胃虛諸症ニ尤^モ良

牛膽紫董丸

牛膽

紫董越幾斯劑

薬刺巴末

各二錢

○腹内諸藏壅塞ヲ開達スルニ後方殊効アリ
牛膽紫董丸

○腹内諸藏壅塞ヲ開達スルニ後方殊効アリ
牛膽紫董丸

○腹内諸藏壅塞ヲ開達スルニ後方殊効アリ

牛膽紫董丸

牛膽紫董丸

牛膽紫董丸

牛膽紫董丸

牛膽紫董丸

牛膽紫董丸

牛膽紫董丸

○結石腎痛石淋等此藥ニ大黃石鹼ヲ加^ム用^ステ殊効

アリ○凡^テ頑滯皮膚病瘡癆皰疹焮赤瘻痒等ハ總テ

此藥良驗アリ即^チ生草ハ絞汁ヲ取^ス朝夕ニ弓半^ス宛服シ

乾草ハ水煎泡劑若^ハ散劑^ス用^ス越幾斯劑亦良

或^ハ蜀羊泉及安質沒扭劑ヲ加^ムテ殊捷効アリ

紫堇越幾斯劑

製法主治〔名〕出_レ針灸_レ

紫堇舍利別

製法覆盆舍利別_レ同_レ生草_ニ水_ヲ_ヲ取_リ依_レ板_福_淑製_ス福_淑濱瞿麥_{花戶}〔サホナリア_ロ〕_{セイ}普_コ口_{イド}蘭

○榕按ニ此草海邊ニ生ス江戸花戶ニ多シハマナデシコト呼ブ。形狀瞿麥ニ似テ葉厚潤。花小_ク白色或_シ紫色アリ。

試効乾根ヲ藥用_ス或_シ葉ヲ用フ味微苦。_生_根微辛粘滑ニメ石鹼様質アリ水_ヲ加_ヘテ搗碎キ或_シ水煎スレバ

泡沫アリテ石鹼汁ノ如シ但_レ亞兒_{アガリ}加利鹽ノ質ナシ○解凝ノ一良藥トス微衝動シ發汗利尿通經ノ効ヲ稱ス○蒸氣壅遏ヲ開發シ諸液分利ノ阻滯ヲ驅逐シ粘液ヲ稀釋シ惡液ヲ淨刷ス○此藥ハ遷延病。劇病共ニ壯實煥衝性ナラズ。虛憊脫力甚シカラザル症ニ適應ス○腹内諸藏ノ壅塞ヲ疏解ス。故ニ是ヨリ發スル諸病。即_チ黃痘。粘液留飲病。神思鬱憂病。依剥昆塙兒。經閉ヲ治ス○肝及肺ノ諸病ニ効アル藥トス。肝煥衝及肺煥衝ニ刺絡下劑等ヲ施メ劇盛人症退キ漸ク虛症ニ傾ク者。是ヲ用_ヒテ的効アリ○肝

焫衝ノ下利シ易ノ解凝鹽類中和用鹽類難キ症ニ的當ス○歎嗽粘痰多キ喘急ヲ治ス○胸脇痛。肺焫衝ノ初發ヨリ虛罷メ惡性ノ候アリ若ハ膽液質。粘液質等ニノ傷冷毒ヲ兼ル者ハ此藥殊驗アリ○經久瘡瘍。頑癬。浸淫瘡。胞疹類ノ鬱毒ヲ排除シ治ス○右ノ諸症ニ左ノ二方治驗多シ

瞿麥解凝飲

濱瞿麥根 二弓 過爾託亞舍利別 一弓
右先濱瞿麥根ニ水四丸ヲ加煮テ滓ヲ去ニ北ヲ取
舍利別ヲ攪和シ一時ゴトニ一枕ヲ服ス

黃石瞿麥飲

濱瞿麥越幾斯劑 四錢

大黃浸劑

大黃條出

酒石葉

各三錢

加密列水

四弓

右調和シ半時毎ニ一匙ヲ服ス○此藥水煎シ用或越幾斯劑トシ用フ

濱瞿麥越幾斯劑

製法蒲公英越幾斯劑固十同シ

依叔伍福

土茯苓

「ヲデキスニナ羅」

蘭

試効 皮黯赭色。裏淡赤色。生根ハ粘液ヲ含ミ味甘ヲ

帶ブ。乾ケバ其質粉様ニメ氣味淡薄ナリ故酷厲毒

ヲ緩和スル効尤多ク且汗ヲ發シ小便ヲ利シ。薩爾

沙根ササゲ朴窟福鳥篤ボウクツボウト薩撒弗刺斯ササフラス山牛蒡根等ヲ加水煎

シ用テ排毒清血ノ効ヲ稱シ黴毒。冒寒傷冷毒ノ肢節痛。歷節遊走痛。脚痛風。惡厲頑癬。乾癬類。或經久汚穢。潰瘍。瘻瘍。或瘡毒。水腫或小兒瘡毒潛滯ノ肢節痛。拘攣。羸瘦スル等ヲ治ス殊黴毒諸症。水銀劑ニ右ノ如キ排毒劑ノ煎湯ヲ兼用シ毎日五六椀宛服ノ汗ヲ發シ小便ヲ利シ其毒ヲ排除スベシ假令バ後方

ノ如シ

薩苓排毒煎

薩爾沙根ササゲ補二丂 土茯苓 一丂

朴窟福鳥篤ボウクツボウト名四錢 甘草 六錢

右件剉水八北ニ浸^ス六時ニノ煮減メ三分一二至

左ノ藥ヲ加フ

薩撒弗刺斯ササフラス名剉三錢

右攪合シ火ヲ下^シ暫^シ蓋閉メ冷^ル至リ毛布ニテ灑シ

服ス○此藥ハ黴毒。血液中ニ泛漫ノ未^シ諸骨ニ潛結セザル症ニ効アリ○朴窟福鳥篤瑞香皮等ノ辛辣

酷厲質ヲ抑制スルニ多。此藥ヲ加、水煎シ用フ。○服量此藥一弓若ハ一弓半ニ水五六升ヲ加、煮減メ三分、一トシ服ス。但此藥性功緩弱ナル故、多服セザレバ験ナク或、他人排毒劑ニ加、用テ良。依伍

沙列布蘭

是オルシス・マスキラ羅ト名、クル草ノ球根ナリ。百兒西亞洲國名都兒格都兒格等ニ出。此一種和蘭等。歐羅巴諸國三產シ其根沙列布ト同効ナリ故近來是ヲ代用ス。羅甸名「オルシス・モリヲ・マスキラ・ヘイ・ダリス」和蘭名「スタンドルコロイ」。

ド又「キウルレケンスコロイド」此草從來「サギサンス」類ニ充ツ。其根大小一ナラズ。ナルハ胡桃ノ如ク。小ナルハ豌豆ノ如シ多ハ圓或、微長卵圓或、扁桃狀ヲ爲シ褐色。堅硬。微透亮ニノ角ノ如シ。氣味淡泊。生根ハ膠粘。乾バ堅硬ナリ。然正粉末トナリ易シ。其末ヲ水及沸湯ニ攪和スレバ盡溶化メ膠漿トナル。○是ヲ採ルニハ此草子熟シ莖葉枯ル時ヲ佳トス。新根ハ舊根ニ附テ鮮白粘潤。舊根ハ赭色ニノ枯燥ス。是ハ藥用トセズ。其新根ヲ採水ニ投ノ土ヲ洗淨シ外粗皮ヲ刮去メ沸湯ニ浸シ或云バ透亮トナル。取出ノ布序ニテ拭乾シ數顆ヲ連

四分時ニノ乾セ

云々

テ綿絲ニ串キ風乾ス。即チ白色微透亮トナル。但日ヲ
經ルニ隨自テ褐色トナル。右ノ如ク修製セザレバ
雨濕ノ時候、黴ヲ生ノ變敗ス。其株外根糸亦
○榕按ニ舶來沙列布大零餘子ノ如形圓或微長
堅硬褐色メ微透亮羊角ノ如シ氣味淡泊粘潤
多等譯說ノ如シ其和蘭等ニ產スル者ハ即チ和產
ノサギサウ類ナリ尋常サギサウノ球根ヲ採リ
試ニ粘氣アレニ發味多メ淡泊ナラズ。其一種ツ
バメオモトト云草ノ球根形狀氣味沙列布ノ如
甚粘滑ナリ沙列布ニ充用ベシ。是下野日光山赤

沼原一名戰場原ニ自生多シ高三尺許葉ハ水仙葉ニ
似テ短闊柔滑四五葉叢生シ葉中莖ヲ抽ク莖亦
小葉アリ暑中莖頭三四寸許ノ穗ヲ生シ淡紫花
ヲ開五瓣環拱シ黃藥ヲ抱ク別ニ一舌アリテ三
瓣分ル又一尾アリテ垂ル長一寸許亦淡紫色根
美ニ珠アリ數個連續メ櫛比ス外皮褐色裏白色粘
滑ナリ○一種白花ノ者アリ莖葉前種ニ似テ舌
十三分セズ尾長四五回半穗疎ニメ稠密ナラザルヲ
異トス按ニ白及麥門冬等種類興ナレ性効略似タリ代用スベシ

缺ヲ培補シ。稀涼酷厲液ヲ包攝メ和解シ撃急疼痛
ヲ緩弛ス○經久羸瘦虛損。勞瘵様ノ症ニ効アリ。乳
汁ニ和シ用テ尤良○乾歟。肺傷。勞嗽等ノ肺病ニ因
テ形肉削脱瘦瘠スル症ハ是ヲ沙糖乳汁等ニ加甘
美ト爲シ用テ殊滋補ノ効ヲ稱ス○吐血勞歟及膀胱
潰瘍。婦人崩漏白帶下等。血液稀涼酷厲ヨリ起ル
症ニ治ス○勞歟様ノ諸病ニ後方屢殊効ヲ得タリ。

沙列布潤燥飲

沙列布漿次ニ出

白罂粟舍利別一弓半

大麥煎十二弓

右調和シ一時毎ニ一小茶椀宛微温ニノ服ス
○水樣液ノ酷厲毒ヲ緩和制服ノ膽液毒ノ下利。腹
痛ヲ治ス○赤痢下血下利。腸ノ裏面剥脱セル症ニ
用テ粘津滑液ヲ生シ攀急腹痛ヲ寛解シ虛脫ヲ回
復ス○下利剽且頑固ニノ歇ア及痛利赤痢等ハ左
ノ吉利詞爹兒ヲ施メ治驗多シ

沙列布吉利詞爹兒

沙列布末一刀水五弓

右水適宜ニ加煮テ渣ヲ去。乳汁三弓ヲ加吉利詞爹
兒トス。是ヲ施メ攀急腹痛等ノ兼症緩解セザル者

ハ鯨膠。亞刺比亞。護謨。ヲ適宜ニ取。温湯若ハ乳汁。或
加密列泡劑ニ溶化シ服メ速ニ治ス。若其疼痛メ下
利休マザル者ハ後方ヲ與ベシ。

醫漿鎮痛飲

吉白醫粟舍利別。アリ。亞刺比亞。護謨漿
阿利襪油。各ニ弓。舍電阿芙蓉液。十五滴

右調和シハ分時毎ニ一匙。宛服メ下利。掣痛等減。ノ
水若ハ乳汁ニ煮テ服ス。勞瘵様ノ症ニ尤良。是ニ
服法。滋補榮養ノ効ヲ取ルハ此根一錢ヨリ二錢マ
デ水若ハ乳汁ニ煮テ服ス。勞瘵様ノ症ニ尤良。是ニ

香竄藥ヲ加レバ消化シ易シ。○此根一錢ヲ水八弓
ニ煮テ粘汁ト爲ス。是ノ沙列布漿ト名ク能。酷厲毒
ヲ緩和ス。腸剥脱。膀胱潰瘍等ニ尤良。○或此末半錢
若ハ一錢宛沸湯ニ攪セ用一日。兩次或此末十弓ヲ
水ニ溶シ適宜ニ沙糖ヲ和シ服シ。若ハ是ヲ煮テ舍
利別ノ如シ服ス。○或此末四錢許ヲ乳汁ニ攪セ服
シ。或是ニ沙糖ヲ和シ煮。八分時即好。美ノ膠漿ト
ナル。是ニ薔薇露。橙皮水等ヲ加。香氣ヲ添。服ス。○或
此末ニ水八倍ヲ加。慢火ニ上。攪セ熟煮シ毛篩ニ透
過スレバ冷テ凝固シ美好ノ傑列ヒトナル。是ヲ一

時若ハ一時半毎ニ半匙或一匙。宛服ス○稀液トシ
服スルニハ此末若ハ右ノ傑列ヒヨ水酒泡劑煎湯
等ニ攬和シ與フ。

依福叔

綿馬

オニワラビ キス・マスロ 俗稱 ホレイイ ポヂム・ヒリ

是蕨薇ノ類ナリ一根數葉叢生シ高一尺若ハ一尺
半許高三倍是比スレハ硬固滑澤鋸齒アリ端末
尖テズ葉柄毛茸多下葉ハ短ク濶大ナリ葉背ニ六
七個ノ小星アリ是花實ナリ根塊節狀ニメ錯綜シ
鱗屑様粗糙栗殼色味淡ニメ粘滑收濶微苦ヲ帶ガ

○榕按ニ莖毛黑色ナルヲ「グマワラビ」ト云其褐
色ナルヲ「オニワラビ」ト云共ニ一種ナリ葉長一
尺許潤三寸許一莖二十七八許ノ小葉排生メ一
葉ヲ爲シ小葉亦十四五許ノ細葉排列シ鋸齒ア
リ林娜私名此類ヲ分テ七十種トス其充當ス
ベキ者ヲ略舉スレバ左ノ如シ

第十五種ホレヒボダムヒタルガレ羅サルノセウカ

第二十六種ホレヒボダムヒタルガレ羅サルノセウカ

第五十三種ホレヒボダムヒリキス・マス綿馬

第五十四種ホレヒボダムブニナ

第六十七種 ホレヒホダムバロメス 金毛狗脊

試効 根ヲ藥用トス新根ヲ用フ。黒色ナルハ陳久ニ
メ効ナシ。○殺蟲ノ峻藥トス蛻蟲ヲ殺シ殊_ス縲蟲ヲ
驅泄スルニ奇効ヲ稱ス。是ヲ用ニハ前日食ヲ斷_ス或
少許食シ汚物敗液鬱滯ノ候アル者ハ先_ツ吐劑若_クハ
下劑ヲ投メ胃腸ヲ淨掃シ壯實ノ人ハ翌朝空心此
根ノ細末三錢ヲ取桂水等香竄露水ニテ送下ス是
ヲ服メ嘔氣アル者ハ拘椽皮ヲ嚼ミ或桂水ニテ含
漱シ咽喉ヲ潤スベシ。若_ク吐スル者バ其末ヲ適意ノ
糖料等ニ和メ服シ且_ク飲液ヲ減スベシ。虛人小兒等

ハ服量ヲ減メ一錢ヨリ二錢ニ至ル。服後一時許ヲ
經テ嘔吐ノ候ナキ者ハ左ノ下劑ヲ與ベシ

蘇汞驅蟲膏

蘇甘沒扭謨

加羅蔑兒

藤黃末

接骨木傑列

右調和ノ煉膏トシ強人ハ一服トス。虛人小兒ハ服
量ヲ減ス。是ヲ服メ後速ニ茶湯二椀許與_ク且_ク蟲下レ
バ時_ク茶湯ヲ與_ク患者ヲノ靜坐セシムベシ。或_ク右煉
膏ヲ用_クテ瀉下セズ蟲亦下ラザル片ハ諸厄利斯瀉
利鹽_名四錢若_クハ一弓ヲ與_クベシ。右ノ如クメ効ナキ

卉ハ三日ヲ經テ再前法ノ如ク施シ。仍驗ナキ者及患者是ニ堪ベキ卉ハ一週毎ニ右ノ療法ヲ施メ蟲下ルニ至ベシ然^{ホト}仍的効ナキ者ハ後方ヲ與ベシ

綿馬驅蟲膏

綿馬根末二弓^{アラルタ}遇爾託亞舍利別名^ア適宜右調和メ煉膏トシ一時^{ゴト}毎ニ一卵匙^{ツバ}服用ス數日連服シ且^ツ水銀劑^{甘汞ヲ加}ル下劑ヲ一週毎ニ用レバ條蟲必ズ瀉下ス○孕婦ハ此治法ヲ禁ス。其殺蟲劑峻下劑共ニ崩血ヲ誘起メ墮胎スレバナリ○右ノ殺蟲劑能月經ヲ通ス故經閉ニ大効アリ○乳汁少

キ乳婦ハ右ノ劑ヲ與テ能乳汁ヲ増ス但服量ヲ減シ與ベシ假令バ十瓦ヨリ十五瓦マデ一服トシ日數次用フ○此根通例服量一錢ヨリ二錢ニ至ル○内藏壅塞脾病依剥昆^{イボ}坪兒^{コシデ}神思鬱憂病痛風等ニ良驗ヲ稱ス此根末トシ一錢許宛用ヒ水煎ハ三錢マデ用フ○經閉ヲ通シ死胎ヲ下ス水煎シ服ス○小便ヲ利シ水腫ヲ治ス根一握ヲ水二十弓ニ浸シ服ス○痔腫痛ニ此根ニ水ヲ加搗テ粘汁ヲ取患處

ニ貼メ効多シ

依福淑伍

黃豆

〔列〕イヅ又「ミソマメ」俗稱「ドリ
コス・ウレンス羅ヤボーン」蘭

試効

莢ヲ藥用トス。毛ヲ去、細末トシ舍利別等ヲ和
メ煉膏トシ毎日一弓マデ服メ蛻蟲ヲ殺シ驅泄ス。
又時々下劑ヲ兼用メ良。虛人小兒ハ服量ヲ減スベ
シ
〔附〕依叔

曼陀羅花

〔列〕ウセンアサガホ俗稱「スタラモニム」又
〔名〕ロドルアプロ又「ドルンアブル」蘭

試効葉ヲ越幾斯劑トシ或子仁ヲ丁幾劑トシ用フ
是酷烈ノ麻痺毒ヲ含ミ過用スレバ精神錯亂狂躁。
眼盲。頑麻不遂。知覺運動ヲ失昏睡ノ死ス○然レ服

量些少用レバ鎮痙止痛催眠ノ一藥トシ遐羣ノ效
ヲ稱シ。發狂。癲癇。神思憂悶錯狂等ノ精神感動失常
ノ諸病。或頑滯ノ痛風。傷冷毒痛。其他經久沈痼ノ痙
攣搐掣。諸症ニ間奇効ヲ得テ諸名哲ノ經驗說多シ
○產後發狂。諸藥効ナキ症。此藥ヲ用テ効多シ○右
所說ノ如ク神經諸病ニ効驗ヲ稱スレハ先哲是ヲ
用ヒテ効ナク或害アル諸說亦少カラズ或云癰ノ患
者ニ此劑初少許寃與漸ク其量ヲ加用ニ頭旋眩暈。
眼昏暗。思慮錯誤。咽喉胃管熾熱。煩悶等ヲ發スレハ
癰症毫モ解散セズ○或云一女子發狂ノ剝搗掣ヲ

兼々。此劑ヲ投メ寸効ナシ。又一女子十四歳發狂。斯此劑日二氏或三氏。宛用^ツ終^レ六氏ヨリ八氏。宛用^ヒテ治^ス然^レ。又一女子ノ發狂ニ此劑前法ノ如^レ用^ヒテ微功ヲ得^ズ。○或云。此劑ヲ發狂ノ患者五人ニ試用^ルニ二人ハ驗アリ。三人ハ効ナシ。○又狂婦二人ニ試用^ルニ一人ハ治シ。一人ハ効ナシ。○或云。癇。狂。神思憂悶病等ニ此劑一味或寄生等治癇藥ヲ加^ク試用^ル。患者從來四十六人全治ヲ得^ズ。但諸症漸減シ輕差ヲ得ル者アレ^ル。其中七人ハ病勢險重ニ進ミ三人ハ死ス。○右ノ諸說ヲ觀レバ此藥殆ド驗ナタ或^ク功害相

半^ハス^ト謂^{ベシ}。然^レ是^レ患者體稟薄弱ニメ毒藥ニ耐^ス却^テ害ヲ致^シ。或^ク病毒深重牢固^ノ。藥力是^ヲ制服スル^ト能^サルニ因^ル。知^{ベシ}若能^{患者ノ}體稟ト病毒ノ輕重ヲ察シ是^ヲ用^ル。既^ハ効ナシト云ベカラズ先哲治驗ヲ得^ル。諸說亦多シ。左ニ其一二ヲ援引ス○一少年發狂ノ癇ヲ兼々此劑初半氏宛與^ハ漸^ハ如^テ一氏宛用^ル。日^ニ三次ニ^シノ全治セリ。又一少年癇ヲ患フ此劑ヲ用^ル。前法ノ如^ニノ諸症減スル^ト過半[○]或^ク云。狂。癇。舞踏病及^ハ搐掣諸症ニ此劑ヲ試用^ル。十三人。其中八人全治シ。五人ハ諸症大ニ寬解セリ。又云。

搐掣ノ症ニ此劑ヲ與テ全愈セル者四人ヲ見タリ
○發狂此劑ヲ用ヒ全治メ再發セザル者三人又產後
發狂諸藥功ナキ者是ヲ用ヒ治スルト多シ凡^フ發狂
此劑ヲ用項窩ニ打膿法ヲ施メ大効ヲ得ル者多シ又
神思憂悶病及^ヒ發狂ハ此劑ヲ用ヒ効ヲ取^フ殊^モ多シ
子宮衝逆病ノ阿芙蓉劑ニ堪^ルト能^ハザル症^モ亦是ヲ與^フ
テ屢^ニ良驗ヲ得タリ○或云此藥ハ狂癇^モ神思憂悶錯
亂及^ヒ痙攣搐掣ノ諸病ヲ減除シ若^ハ全治スルト先^づ
哲ノ歷驗多シ是ヲ考究スルニ此藥ノ麻痺毒ヲ以^テ
テ神經ノ感觸知覺ヲ減損シ催眠鎮痙^モ人功ヲ致ス

ノミナラズ一種ノ稀釋解凝ノ峻効アリテ大ニ血
液ヲ稀釋メ壅塞ヲ疏通シ全軀ノ分利排泄ヲ進起
メ諸竅ヨリ驅發ス。是ヲ服スレバ汗小便涎唾等發
泄スルヲ以テ知^ルベシ。又一婦人經閉四年餘此劑ヲ
用ヒ即^チ通ス然^{レバ}凡^フ狂癇^モ痙攣搐掣等^モ神經非常ノ感
動ニ係^ル諸患ハ病毒瘀血凝固壅塞ノ腦神經ヲ侵襲
シ發スル故^ニ其効驗アル^ト準推ノ知^ルベシ○此越^{エキ}
斯^キ劑ハ毎用戒慎ヲ加^フ服量一升ヨリ漸^々加^フテ五六升
宛^フ且^ハ龍腦ヲ加^フ丸藥トシ用ヒ尤^モ良^モ或^ハ初^メ一升ヨリ
漸^々緩慢ニ其量ヲ加^フ服メ患者瞳子散大濶開スル

キハ其量ヲ加^ルト勿レ否^ガレバ危症ヲ發ス是神經既ニ觸知ヲ失フ候ナレバナリ或^ム瞳子散大頭旋昏憚麻痺等惡症ヲ見^スト雖モ病勢減セズ少^シモ輕快ヲ得ザル者ハ速ニ此藥ヲ休ベシ是其毒ノ妨害ヲ現^スノ^ニニ毫モ裨益ナケレバナリ

曼陀羅花越幾斯劑

製法失^シ龜答^タ越幾斯劑

○^ヒ菲^オ阿^ス失^シ亞密^{アミ}越^エ幾斯劑^{キス}亦右諸病ニ峻効アリ但^シ曼陀羅花^エ越^{キス}幾斯劑^{キス}良^キ若^シ越^エ幾斯劑^{キス}ハ麻痺ノ効力殊甚シ○^ヒ曼陀羅花實^ハ仁及^ヒ膜^モハ麻痺毒殊^シ峻ナリ是ヲ丁^{オシ}幾^ナ劑^トシ用^ヒテ鎮痛催眠麻痺ノ峻効ヲ奏

シ起熱ノ害ナク通利閉塞ノ患ナクメ阿芙蓉劑ニ勝^リ此劑經久頑固ノ神經病神思ノ感觸失常諸病前說ノ患症ニ用^ヒテ大効ヲ稱ス此劑初六滴ヲ用^ヒ毎日漸次ニ加^ヒテ二十滴ニ至^リ患者眼眩ノ候ヲ現^スキハ速ニ後服ヲ止^ム或云此劑二十滴ヲ與^ヒテ切實ナル催眠藥トス發狂神思憂悶錯狂等ハ殊ニ此麻痺毒ヲ以テ能^ヒ其病勢ヲ制服ス

曼陀羅花丁幾劑

製法

曼陀羅花仁^{極細末}

二^弓

葡萄酒

八^弓

古節子^十華燒酒一^弓

右硝子壘ニ内燒處ニ置テ泡釀スル。二日。瀝テ渣ヲ去。固封シ貯フ。此劑虛症ハ煥腫眼ニ黒メ殊効ヲ稱ス。○此仁ヲ末トシ服スレバ初神思欣怡シ醉狂メ歌舞喜笑シ終ニ昏冒沈睡シ醒後些モ醉中ノ情態ヲ知覺スル。○大シ。○曼陀羅花毒ニ中ル者ハ醋若ハ乳汁或油類阿利機油等。○服スレバ卽解ス。但此毒ヲ服ノ時ヲ經ザル者ハ吐劑ヲ最良トス。依伍叔

煙草

ニコティアナタバキム
羅列バ已諸國通稱

試効葉ヲ藥用トス。是熱性刺戟ノ吐下藥トス。且麻

痺毒アル。○曼陀羅花。龍葵類ノ如ニノ稍緩ナリ。又解凝利尿ノ性功アリ。其効力皆是ニ含メル油ニ在リ。○是ヲ水煎シ過服スレバ吐シ且瀉下ス。少許服スレバ小便ヲ利ス。○麻痺鎮痛ノ効アリテ瀉下スル故ニ惡液壅滯ノ發スル疝腹痛ノ阿芙蓉ヲ用。難キ症ニ甚適應ス。○水腫及煥衝ナキ粘液腎痛ニ用。テ小便ヲ利シ偉効ヲ奏ス。○解凝麻痺ノ効力アル。因テ粘液性ノ喘急及疫欬等ニ間良驗アリ。然ニ總テ煥衝性ノ症ハ此藥大害アリ。粘液質ニノ神經感觸鈍ナル患者ニ適應ス。○右ノ如キ遷延諸病ニ是

ヲ浸劑トシ用テ尤良。卽後方ノ如ニ譽矣。當用

煙草解凝飲

國々煙草葉 一弓

沸湯 一升

右浸スル半時。瀝テ滓ヲ去。後藥ヲ加フ

燒酒 再餾者 二弓

水

煙草葉

令々利也

右調和シ二十滴ヨリ漸加、テ六十滴マデ水或酒ニ

點服スル。日兩次○小便ヲ利シ水腫ヲ治スルニ

左ノ方殊効ヲ稱ス

煙草驅水飲

煙草葉 一弓

水 六弓

右浸メ藥氣ヲ出シ後藥ヲ加フ
燒酒 再餾者 一弓
忽弗滿鎮痛液 一錢
右調和シ一時半毎ニ二十滴宛飲液ニ點服ス。但其
症ニ應メ増減スペシ○卒厥ノ甦復シ難キ症。煙草
ノ濃泡劑ヲ吉利詞爹兒トシ施メ間捷効アリ○頑
固ノ大便閉及腸貌悽屈ノ緊張ノ大便閉塞スル症
ニ煙草浸劑ヲ吉利詞爹兒トメ効多シ但厥衝ヲ兼
ル症ハ害アリ○頑癬乾癬搔痒甚キ瘡疥類惡厲頭
瘡臭穢潰瘍等ハ煙草濃泡劑浸劑ヲ洗藥トメ痛痒
ヲ消シ蟲ヲ殺シ淨刷乾愈ス○吉利詞爹兒及洗藥

ト爲スニハ煙草四錢ヲ沸湯六勺ニ浸シ用ベシ○
煙銃大槻氏著、ス所ノ要術知新
ニ圖說ヲ載ス参考スベシ○以テ煙草ノ煙ヲ
肛門ヨリ薰入メ頑固ノ大便閉ヲ通シ腸貌ブヒウク僂屈ムカシ人
便閉ヲ療シ。癒急ヨリ發スル疝腹痛等ヲ解散シ。或
溺死エ施ノ間蘇復ス福 淑依

煙草越幾斯劑

製法失憮答越幾斯劑

名
卜同之

新訂增補和蘭藥鏡卷十五終

Kitasato Memorial Medical Library

