


✕  
d 9



華歆私錄補  
上

2冊  
490.9  
Do-3  
1

No. 1363  
19. 0. 9



1008

醫藥庫

等竅私錄補

鑿之為業識人身察疾病得法方而活世之為  
務。人身疾則察之以法。治之以方。而病有因有  
証以証論。因察因分。証是即法也。又有弃証  
而治。因乎有措。因依証是。六權宜之術也。蓋疾  
病去變也。身體者常也。苟不知其常而從何知  
其變哉。故為鑿去先不可不知。人身鑿之於人  
身。猶王公之於天下國家也。王公而不知。不  
國家而可乎。是以有巡狩有述職。醫而不知。人  
身而可乎。是故望聲色運動於活人。視五藏六

府於死也。或曰解體去流以解體為本。然人死謂之異物異物而察。何以能鑿生人哉。人之所以疾則陰陽而已矣。舍其生之氣血陰陽而解其死之骨節內景。何以能之。其所長蓋瘍鑿而已。其內治亦不然矣。云云。龍愚按此六理密之空談而非事實也。其曰其以解體為本者。因非矣。獨取氣血陰陽而棄解體者。不是也。陰陽者體中之盈去而。身體者受陰陽之器也。有其器而後盈去在可寓焉。有盈去而後能使器靈活。故二者不可分別而論。今措其器而偏欲論盈

者為不備也。轉昌黎雜說曰。雲龍之所能使為靈也。若龍之靈則非雲之所能使為雲也。然龍弗得雲無以神其靈矣。失其所憑依信不可效。夫陰陽者譬猶雲也。身體者譬猶龍也。且夫學道有次第。有節目。不可不知焉。先熟讀素靈及傷寒論。次知藥性。後入身。攷脈。察病焉。此次序也。然人有男女。有老少。有強弱。病有寒熱。有虛實。有淺深。有緩急。方有汗吐下及補益。術有順逆。有進退。是皆節目也。次第節目者。進道之階梯也。擇師而事之。習之。學之。而達道則方法皆

為己有。既為己有則我祇使用方法而左右逢  
原也。可不學乎。可不習乎。是為序。

天保丙申春正月

小出純撰於浪速之寓居



松村元亨書



導竅私録補凡例

- 一此卷ハ臟腑經絡其部々ニ當ル所ノ病證ニ古  
人ノ藥方ヲ配當シ治療ノ一助トナランコトヲ  
欲ス然レバ今此ニ舉ルモノハ千百中ノ一二ノ  
ミ擴テ以テ辨識スベシ尤病ニ變化アリ方ニ  
活用アリ知ラザルベカラズ
- 一此書中ニ論曰トアルモノハミ十金匱要略傷  
寒論ヲ指ナリ其他ハ直ニ其書名ヲ記ス
- 一凡此書中ニ舉ル所ノ藥方ハ常ニ取用スル所  
ノモノニメ皆經驗ニ係ル故ニ其病ニ逢テ實

驗アルモノハ之ヲ載セテ論説ニ拍ハラズ  
 一書中ニ吾師ト稱ルハ藝州廣嶋醫官惠美三白  
 先生ヲ云ナリ初代号寧古二代号君達而世々  
 襲三白之通稱  
 一卷末ニ所載ノ奇方名方ノ如キハ此書ノ本旨  
 ニアラズト雖ドモ心得置テ急救ノ一助ニナ  
 ランコヲ欲スルナリ  
 一此書ハ蘇軾撰述ニ當ルニ  
 學蘇軾論蘇軾撰

補



道竅私録補之上

蘇軾撰述 備後大尉蘇少出龍君德撰著

男信近義 校

頭頸項背部疾

桂枝湯論曰太陽病頭痛發熱汗出惡風者○傷

寒不大便六七日頭痛有熱者與養氣湯其小便

清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必

用桂枝芍藥生薑大棗 各七分五厘 甘草

芍藥右伍味以水一合四勺煮取六勺服

麻黃湯論曰頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風

無汗而喘者。傷寒脉浮緊不發汗因致衄者。麻黃杏仁各九分桂枝六分甘草三分右四味以水二合煎取六勺服

葛根湯論曰大陽病項背強几几無汗惡風者。大陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語

桂欲作剛瘧曰葛根六分麻黃一分生薑四分大棗四分

桂枝芍藥甘草各三分右七味以水二合煮

取六勺

括萎桂枝湯論曰大陽病其證備身體強几几然

脉反沈遲此為瘧桂枝芍藥大棗生薑

補一

各六分括萎曰甘草各四分右六味煮如桂枝湯法

桂枝加葛根湯論曰大陽病項背強几几反汗出

惡風者於桂枝湯方內加葛根八分煎煮如本

法

大棗氣湯論曰瘧為病胸滿口噤臥不著席脚攣

急必斷齒大黃六分厚朴一錢二分枳實七分半

芒消九分右四味水二合煮取六勺服

右件ノ諸方。大陽病。及大陽陽明合病。若ハ瘧病

ヲ治ス。瘧病ハ。多頭痛發熱頸項及肩背強急ス。

或ハ手脚攣急胸滿口噤斷齒。忽子斃ルモノ

間々多シ。俗間此ヲ痲痺肩ヲ越ト唱ヘ。急ニ周  
章シテ醫ヲ迎フ。醫モ亦不辨シテ治療ヲ誤ル  
モノ不少。不可不知。若此症ニ遇トキハ。先ニ鍼治  
尤宜トス。早ク肩背手脚強急甚シキ處ヲ見テ。  
頻リニ鍼ヲ刺。而シテ隨證前諸方ノ内ヲ撰テ  
大用ベシ不可救ヲナシ。大人小兒ノ急症。及脚氣  
衝心ノ類。何レモ氣血心胸ニ迫ルモノハ。皆如  
斯早ク鍼治ヲ施。而シテ後隨證テ藥治ヲ可定。  
是亦越人之遺法ナリ。新加坡醫局ノ凡五書出  
五苓散論曰霍乱頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水

補ノ二

者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

澤瀉八分 猪苓 茯苓 木各六分 桂枝四分

右伍味爲末以白飲和服方寸匕日三服煎服亦

佳ナリ

川芎茶調散 治諸風上攻頭目昏重偏正頭疼鼻

塞聲重 川芎 荆芥各四兩 薄荷 白芷

甘草 羌活各二兩 防風一兩半 細辛一兩 右八味

爲末每二錢茶清テ調服

牛蒡芩連湯 治積熱在上頭項腫起或面腫多從

耳根上起俗曰大頭温并治煙瘴 黃芩酒制

黃連

酒制各二錢半

桔梗

石羔

各錢半

連翹

牛蒡

炒

玄參

各一錢

大黃

酒

荊芥

防風

羌活

各五分

甘草

生薑

各三分

右十三味

水煎服

防風通聖散

回

治大頭溫

餘症畧之

川芎

防風

當歸

芍藥

連翹

麻黃

薄荷

各四分

石膏

桔梗

黃芩

各八分

梔子

白朮

荊芥

各五分

滑石

二錢四分

芒消

大黃

各四分

甘草

生薑

四分

右十八味

水煎服

點頭散

入

治偏正頭痛

常服除根

川芎

二兩

香附

四兩

右二味

爲末

茶清調服

二錢

補 / 三

謝傳點眼丹

入

治一切急頭風

頭痛心

腹絞痛

牙硝

一錢

麝香

硃砂

雄黃

各五分

右四味

爲

極細末

磁罐

收貯

臨病用

銀簪蘸藥

點兩眼角內

立時取效

消風百解散

入

治四時傷寒

頭痛發熱

鼻塞聲重

荊芥

蒼朮

白芷

陳皮

麻黃

各八分

甘草

四分

姜葱

右八味

煎服如咳嗽

加烏梅

洗肝散

入

治風毒上攻

目暴赤腫

痛隱淚

眵淚等

證

薄荷

當歸

羌活

山梔子

大黃

防風

甘草

川芎

右八味

各等分

爲末

每二

錢熱水調服

磁石散入治腎虛耳聾面黑饑不欲食腰脇背痛

者磁石五味杜仲白木白石英各二錢

黃芪茯苓各一錢右七味水煎服

清胃散治上下齒疼痛引頭腦發熱大痛者

當歸生芩黃連倍用丹皮各三錢升麻二兩

痛甚加石膏細茶細辛大黃酒黃芩

右十味水煎服

荊防敗毒散治時毒初起頭眩惡寒腮項腫痛脉

浮者服之防風荊芥羌活獨活柴胡

補心

前胡薄荷連翹桔梗枳殼川芎

蘇茯苓金銀甘艸生薑右十五味水煎

連翹消毒飲治時毒表裏二症俱罷餘腫不消疼

痛不退者連翹川芎當歸芍藥牛房

薄荷黃芩天花甘艸枳實桔梗參

升麻右十二味水煎服

一龍按凡二右二方之主治二所謂時毒者天行

時氣之病二于頭面耳項赤腫又此類

是十以葛根湯防風通聖散黃連解毒湯漏蘆連

翹湯等症多而之天六陰陽表裡寒熱虛實

ノ分アリヨクノ辨認スベシ野寒熱盛實

胸郭疾胸郭疾論曰大陽病下之後脉促胸滿者

桂枝去芍藥湯論曰大陽病下之後脉促胸滿者

於桂枝湯方内去芍藥方見前代時和毒者天林

枳實薤白桂枝湯論曰胸痺心中痞留氣結在胸

胸滿脇下逆搶心枳實薤白桂枝湯至之人參湯

亦至之薤白一棧六分枳實厚朴各八分桂枝各

枳實四分右五味以水二合六勺煮取六勺

橘皮枳實生姜湯論曰胸痺胸中氣塞短氣茯苓

杏仁甘草湯至之橘皮枳實生姜湯亦至之

補ノ五

橘皮二棧四分枳實四分五厘生姜一棧二分右三味以

水一合五勺煮取六勺服

括蕒薤白白酒湯論曰胸痺之病喘息咳唾胸背

痛短氣寸口脉沈而遲關上緊數括蕒實六分

薤白二棧四分白酒二合一勺同煮取六勺服

茯苓飲論曰治心胸中有停痰宿水自吐出水後

心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食茯苓

人參木各六分枳實四分橘皮五分生姜八分

以水二合煮取六勺

小柴胡湯論曰傷寒六七日中風往來寒熱胸脇

苦滿默々不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔  
 或渴或腹中痛或胸下痞鞅或心下悸小便不利  
 或不渴身有微熱或欬者○又曰大陽病十日以  
 去脈浮細而嗜卧者外已解也設胸滿脇痛者與  
 小柴胡脈但浮者麻黃湯主之 柴胡八分黃芩  
 人參 其艸曰生姜 大棗 各三分 半夏六分以  
 水二合四勺煮取一合二勺去滓再煎取六勺  
 柴胡姜桂湯論曰傷寒五六日已發汗而復下之  
 胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來  
 寒熱心煩者此未解也 柴胡八分 桂枝

補六

乾姜合黃芩煮牡蠣各三分括婁根四分其艸不  
 二分以水一合煮取六勺一合白朮二合  
 柴胡加龍骨牡蠣湯論曰傷寒八九日下之胸滿  
 煩驚小便不利讖語一身盡重不可轉側者  
 大半夏四分 大棗 生薑 人參 龍骨 牡蠣  
 桂枝 茯苓 牡蠣 各二分三厘 柴胡 六分五厘 大黃  
 二分 右十一味以水一合八勺煮取八勺服大黃  
 薏苡附子散論曰胸痺緩急者出薏苡人大附子  
 等分 右二味杵為散服方寸匕日三服 無大熱者  
 大陷胸湯論曰傷寒六七日結胸熱實脈沈而緊

大心下痛按之石鞮者。亦曰傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此爲水結在胸脇也但頭微汗出者。大黃九分芒消三錢甘遂一分五厘以水一合八勺先煮大黃取六勺去滓內芒消令消內甘遂末服之。大黃大陷胸丸。論曰結胸者項亦強如柔痙狀下之則和。大黃八兩葶藶六兩芒消十兩杏仁六兩右四味搗篩二味內杏仁芒消合研如脂和散取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢七白蜜二合今強一水一合二勺煮取六勺溫頓服之一宿乃下如不

補七

下更服取之爲效。問曰結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者。大黃連四分半夏二錢四分括蕒實八分以水一合八勺先煮括蕒取九勺內二味煮取六勺古至令善用之昔煖而與林九尋門亦富方安瓜蒂散。論曰脉微浮胸中痞鞮氣上衝咽喉不得息者此爲胸有寒也當吐之。蘇亦曰宿食在上脘當吐之。瓜蒂赤小豆各五分右二味各別搗篩爲散已合治之取一錢七以水二錢四分用熱湯七勺煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不

吐者少々加得快吐乃止  
一龍按瓜蒂散吐劑最第一之方也。麻黃湯發汗最第一之方也。承氣湯下劑最第一之方也。四逆湯補劑最第一之方也。汗吐下補四方。不善運用之者。不可謂真得醫術者。但吐方者尤諸家所難。從中古至今。善用之者。越前奧村氏。長門永富氏。安藝惠美先生。海內僅三家而已。惠美先生號晚成堂。有吐方攷之著。曾不許翻刻。雖門弟子。不敢授與之。唯朝夕攷々思而得其術者。然後授之。蓋恐誤其治療也。今世間所行。稱晚成堂吐方攷者。多

補八

亦是係偽作矣。

生姜半夏湯 論曰病人胸中似喘不喘似嘔不嘔亦似噦不噦徹心中憤憤然無奈 半夏 三錢 生姜汁 四勺 以水一合二勺煮半夏取八勺內生 姜汁煮取六勺

吳茱萸湯 論曰嘔而胸滿者 吳茱萸 一錢八分

人參 三錢 大棗 各四分五厘 生姜 九分 以水二合一勺 煮取六勺

黃連湯 論曰胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔

吐者 黃連 三錢 甘草 乾姜 桂枝 大棗 各四分五厘

人參三分半夏九分以水一合煮取六勺  
十棗湯 論曰夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死  
至一百日一歲 芫花 甘遂 大戟 各等分  
右上三味各別擣為散以水一合二勺先煮大棗  
五錢取六勺內藥末一錢頓服之

○心疾

論曰心中風者翕々發熱不能起心中饑食即嘔吐  
亦曰心中寒者其人苦病心如噉蒜狀劇者心痛徹  
背背痛徹心譬如蠱注其脉浮者自吐乃愈  
亦曰水在心心下堅築短氣惡水不欲飲

補九

亦曰心傷者其人勞倦即頭面赤而下重心中痛而  
自煩發熱當臍跳其脉弦此為心臟傷所致也

腫

經曰夫心脹者煩心短氣卧不安  
大黃黃連瀉心湯 論曰心下痞按之濡其脉關上  
浮者亦曰傷寒大下後復發汗心下痞

略下文

大黃二錢黃連一錢右二味以麻沸湯八

勺內藥一二沸須臾絞去滓溫服

瀉心湯 論曰心氣不足吐血衄血黃連

黃連 黃芩 各五分 右三味水煮如上方

附子瀉心湯 論曰心下痞而復惡寒汗出者

大黃 一錢 黃連 黃芩 各五分 附子 七分五厘 右四

味以水九勺先煮附子取六勺去滓內三味煮一

二沸須臾絞去滓服

心痛湯 晚成堂家方 心痛徹背背痛徹心者 庶古一錢

蜀椒 五分 烏頭 四分 甘草 三分 右四味以水二合

煮取一合服之大便鞭者加大黃三分更妙也

梔子大黃豉湯 論曰酒黃疸心中懊懣或熱痛

梔子 二分三厘 大黃 一分五厘 枳實 七分五厘 豉 一錢八分

補十

以水一合八勺煮取六勺

小柴胡湯 方見前 論曰心煩喜嘔 或心下和兼嘔吐半夏

小建中湯 論曰傷寒二三日心中悸而煩者 是欲

桂枝 甘草 生姜 大棗 各四分五厘 芍藥 九分

膠飴 三錢 以水一合四勺煮取六勺去滓內膠

飴令消

括蕒薤白半夏湯 論曰胸痺不得卧心痛徹背者

括蕒實 六分 薤白 九分 半夏 一錢八分 白酒 三合

右四味同煮取六勺服

黃連阿膠湯 論曰心中煩不能卧 黃連 一錢二分

黃芩三分芍藥六分雞子黃一枚三分之一阿膠九分

以水一合半煮三物取六勺去滓內膠烱盡小冷

內雞子黃攪令相得

半夏瀉心湯論曰嘔而腸鳴心下痞者半夏

九分黃芩 乾姜 人參 甘草 大棗各四分

黃連一分右七味以水二合煮取一合二勺去

滓再煎取六勺主大棗各四分

甘草瀉心湯論曰乾嘔心煩不得安者半夏瀉

心湯方內加甘草二分五厘右七味煮如半夏

瀉心湯法

補十一

生姜瀉心湯論曰傷寒汗出解之後胃中不和心

下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

半夏瀉心湯方內減乾姜三分加生姜六分

右八味煮如半夏瀉心湯法

大建中湯論曰心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中

寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近

方腹郭

桂枝枳實生姜湯論曰心中痞諸逆心懸痛

桂枝 生姜各九分枳實一枚五分右三味以水一

合二勺煮取六勺

人參湯 論曰胸痺心中痞雷氣結在胸胸滿脇下  
逆搶心枳實薤白桂枝湯主之人參湯亦主之  
人參 甘草 木 乾姜 各七分五厘 右四味以水  
一合六勺煮取六勺

備急圓 論曰主心腹諸卒暴百病若中惡客忤心  
大腹脹滿卒痛如錐刺氣急口禁停尸卒死者  
大黃 乾姜 巴豆 各一錢巴豆  
去脂研 右藥各須精新先  
擣大黃乾姜爲末研巴豆內中合治一千杵蜜器  
中貯之莫令歇氣 下言水康中雷氣下除者  
走馬湯 論曰中惡心痛腹脹大便不通者下已豆

補十二

杏仁 各二枚 右二味以綿纏槌令碎熱湯二合捻  
取白汁飲之當下老少量之通治飛尸鬼擊病

炙甘草湯 方肺疾下 論曰傷寒脉結代心動悸者  
豬苓湯 論曰小陰病下利六七日效而嘔渴心煩

不得眠者 猪苓 茯苓 阿膠 滑石 澤瀉  
各六分 右四味以水一合二勺煮取六勺內膠令消  
八味李根皮湯 治動氣在上發汗則氣上衝不得

息者 甘草 李根白皮 一兩 當歸 芍藥 茯苓  
黃芩 各二錢 桂枝 三錢 甘草 半夏 各一錢  
右八味水煎温服

瀉心導赤散 壽 治傷寒心下不痛腹中不滿大便  
 如常身無寒熱漸變神昏不語或夢中獨語一二  
 旬目赤神焦將水與之則嚙不與則不思形如醉  
 人醫者不識便呼為死症若以針灸悞人多矣殊  
 不知熱邪傳入少陰心經也因火上而逼肺所以  
 神昏故名越經症 梔子 黃芩 麥門 滑石  
 人參 犀角 小 知母 茯苓 黃連 甘草  
 大棗 燈草 生姜 右水煎臨服入新生地黃  
 汁服 六 龍按傷寒溫疫而熱邪傳入心經逼肺者瀉心導

補十三

赤散之証問々多予數用驗之其功如神實起死  
 回生之方不可不知也

生脉散 辨 滋生精氣培養真元補心潤肺

麥門 中人參 各三錢 五味 十五粒 重右三味水煎服

黃連解毒湯 外臺 喜笑不休者心火之盛也宜之

黃連 一錢 黃芩 黃柏 梔子 各二錢 右四味水

煎服

茱萸木瓜湯 準 治脚氣衝心悶亂不識人手足脉

欲絕 吳茱 半兩 木瓜 二兩 枳實 二兩 生姜 五分

右四味水煎溫服

栝榔散準治脚氣衝心煩悶不識人 栝榔四分

木香五分 茴香三分 右三味以童便煎服

沉香散準治脚氣衝心煩悶喘促脚膝疼痠神志

昏憤 沉香 芍藥 木通 紫蘓 訶子皮

栝榔各兩 吳茱半兩 生姜五分 右七味水煎服

肺疾

論曰肺中風者口燥而喘身暈而重胃而腫脹

亦曰肺中寒者吐濁涕

亦曰水在肺吐涎沫欲飲水

經曰肺脹者虛滿而喘張論

補十四

越婢加半夏湯 論曰欬而上氣此肺脹其人喘目

如脫狀脉浮大者 麻黃 半夏各六分 石膏八分

生姜三分 大棗四分 甘草二分 右六味以水一合

二勺煮取六勺温服

小青龍加石膏湯 論曰肺脹咳而上氣煩燥而喘

脉浮者心下有水小青龍加石膏湯主之

麻黃 芍藥 桂枝 細辛 甘草

乾姜各三分 五味 半夏各六分 石膏二分 右九

味以水二合煮取六勺

射肝麻黃湯 論曰欬而上氣喉中水雞聲

腸下痛 引缺盆

千金證治 同外更加

射肝 細辛 紫苑 欬冬花 各三分 麻黃

生薑 各四分 五味 大棗 半夏 各六分 右九味

以水二合煮取六勺 半 各六分 右九味

皂莢丸 論曰欬逆上氣時々濁唾但坐不得眠者

皂莢八兩 右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯

服三九日三夜一服 厚朴 五兩 麻黃

厚朴麻黃湯 論曰欬而脉浮者 厚朴 五兩 麻黃

四兩 石羔 雞子大 杏仁 半夏 五味 各半升

小麥 一升 細辛 乾姜 各二兩 右九味水煎服

欬冬花散入 治寒壅相交肺氣不利咳嗽喘滿膈煩

補十五

悶鼻塞清涕咽嗌腫痛者 欬冬 桑白 知母

貝母 杏仁 半夏 阿膠 麻黃 甘艸

生薑 右十味水煎服

蘇子降氣湯 論治虛陽上攻氣不外降上盛下虛

痰涎壅塞喘促短氣咳嗽者 蘊子 半夏 各

陳皮 厚朴 前胡 肉桂 各 當歸 三

甘草 大棗 生薑 右十味水煎服

蘇沉九寶湯 治人素有喘急遇寒暄不常發則

不止哮喘夜不得睡者 紫蘇 陳皮 薄荷

麻黃 杏仁 桑白 腹皮 官桂 甘艸

生姜 烏梅 右十一味水煎服

桂枝去芍藥加皂莢湯 論曰肺痿吐涎沫者

桂枝湯方內去芍藥加皂莢五分 經驗小兒常垂涎宜之

生姜甘草湯 論曰肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴

生姜 五兩 人參 三兩 甘草 四兩 大棗 十五枚 右四

味以水七升煮取三升分溫三服

甘草乾姜湯 論曰肺痿吐涎沫而不欬者其人

不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故

也此為肺中冷必眩多涎唾甘草乾姜湯以溫之

若服湯已渴者屬消渴 甘草 四兩 乾姜 二兩 炮

補十六

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

炙甘草湯 外臺 治肺痿涎唾多心中溫々液々者

甘草 二分五厘 生姜 桂枝 各二分 生地黃 一分二分

人參 阿膠 一分五厘 麥門冬 七分 麻仁 四分 大棗

五分 右九味以清酒七勺水八勺先煮八味取七

勺去滓內膠烱消盡服一名復脈湯

桔梗湯 論曰欬而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出

濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰 桔梗 一分

甘草 二錢 右二味以水一合八勺煮取六勺

葶藶大棗瀉肺湯 論曰肺癰喘不得卧 肺癰胸

滿脹一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛  
欬逆上氣喘鳴迫塞○支飲不得卧葶藶搗丸  
五分大棗三錢右先以水一合八勺煮棗取一  
合二勺去滓內葶藶煮取六勺葶藶出  
桔梗白散論曰欬而胸滿振寒脉數咽乾不渴時  
出濁唾腥臭久久吐膿寒如米粥者為肺癰葶藶  
桔梗貝母各三分巴豆一分右件三味為末內  
巴豆更於臼中杵之以白飲和服強人半錢羸者  
減之病在隔上必吐在膈下必利不利進熱粥一  
杯利過不止進冷粥一盃云云合

補  
七

龍按桔梗白散為治肺癰之要藥肺癰病眾醫術  
盡無奈者非白散不能治也雖然此本攻劇之藥  
也能察其人之強弱詳證因而后施治而可亦按  
欲治病則不可不知病之所在用藥有過不及之  
分若不足則病不愈過則傷生焉為醫者不可不  
識也讀右一章推知其餘而可生  
千金葦莖湯論曰欬有微熱煩滿胸中甲錯是為  
肺癰葦莖二升薏苡仁半升枳實五枚  
右四味以水一斗煮取三升服一升再服當吐如  
膿

清肺湯 治一切咳嗽上焦痰盛或久嗽不止或

勞怯或久嗽聲啞或喉生瘡者火傷肺金竝宜此

湯 蘇桔梗 茯苓 陳皮 桑白 貝母 各一錢

十當歸 杏仁 歸山 梔子 天門 麥門 各七分 黃芩

一錢半 五味 七粒 甘草 三分 大棗 生姜 右十五

味水煎服 原方不愈 宜加 蘇子 杏仁 各一錢

肺癰湯 水戶侯函官 原元與家方 治咳唾腥臭口吐膿或如米粒胸

肋間隱痛或徹背聲枯氣急不能卧者 甘草

桔梗 各六分 貝母 括蕒根 各五分 杏仁 四分

白芥子 三分 生姜 二分 右七味水煎服 原方不愈 宜加 蘇子 杏仁 各一錢

補八

○膈膜疾

論曰膈上病痰滿喘欬吐發則寒熱背痛腰疼目泣

自出其人振々身矧劇必有伏飲 宜加 蘇子 杏仁 各一錢

木防已湯 論曰膈間支飲其人喘滿心下痞堅面

色蠶黑其脉沉緊得之數十日醫吐下之不愈木

防已湯主之。虛者即愈實者三日復發。復與不愈

者宜木防已去石膏加茯苓芒硝湯主之。問曰木

木防已 三兩 石膏 雞子大 桂枝 二兩 人參 四兩

右四味以水六升煮取二升分温再服 原方不愈 宜加 蘇子 杏仁 各一錢

木防已加茯苓芒硝湯方 木防已 桂枝 各二兩

芒硝三合人參各四兩茯苓各四兩右五味以水六升  
煮取二升去滓內芒硝再微煎分溫再服微利則

愈論曰來嘔吐心下痞隔間有水

小半夏加茯苓湯論曰來嘔吐心下痞隔間有水

眩悸者半夏一錢八分生姜一錢二分茯苓四分五厘

右三味以水二合八勺煮取六勺如干之不愈本

烏梅丸論曰虵厥者當吐虵令病者靜而復時煩

此為臟寒虵上入膈故煩須臾復止得食而嘔又

煩者虵聞食臭出其人常自吐虵虵厥者烏梅

細辛附子桂枝人參黃栢各一錢于姜

補丸

二十錢黃連三十二錢當歸川椒各八錢右十味異

一搗篩合治之九梧子大服服時吐

四逆湯論曰少陰病飲食入口則吐心中溫々欲

吐復不能吐如得之手足寒脉弦遲者此胸中實

不可下當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也

急溫之乾姜九分甘草一分附子九分右三

味以水一合五勺煮取六勺如干之不愈本

猪苓散論曰嘔吐而病在膈上後思水者解急與

之思水者猪苓茯苓各等分右三味杵

為散飲服方寸匕如干之不愈本

大陷胸湯 論曰大陽病脉浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣燥煩心中懊憹陽氣內陷心下因鞭則爲結胸方見胸郭門七棗湯考 瘧發時獨寒無熱者脉遲名曰牝瘧當責之寒宜此方主之 附子 枳實 大棗 右二味水煎服

一方 正傳方 治久瘧不愈一服便止永不發其効如神 常山 一錢半 檳榔 一錢 丁香 半錢 烏梅 一箇

補丹

右四味細切作一服用好酒一盞浸一宿臨發日清晨飲之

達原飲 溫疫論 溫疫初起先憎寒而後發熱日後但

熱而無憎寒也初得之二三日其脉不浮不沉而數晝夜發熱日晡益甚頭疼身痛其時邪在伏脊之前腸胃之後雖有頭疼身痛此邪熱浮越於經不可認爲傷寒表證輒用麻黃桂枝之類強發其汗此邪不在經汗之徒傷表氣熱亦不減又不可下此邪不在裏下之徒傷胃氣其渴愈甚宜達原飲 厚朴 知母 芍藥 黃芩 各一錢 甘草

草薹仁 各五分 楨柳 二錢 右七味用水二鍾煎

八分

三消飲 溫疫論 溫疫舌上白胎者邪在膜原也舌根

漸黃至中央乃邪漸入胃設有三陽現證用達原

飲三陽加法因有裏證復加大黃名三消飲三消

者消內消外消不內不外也此治疫之全劑以毒

邪表裏分傳膜原尚有餘結者宜之 檳榔

草薹 厚朴 芍藥 甘艸 知母 黃芩

大黃 葛根 羌活 柴胡 薑棗煎服

一右二方又可氏溫疫論中所載也曰邪自口鼻而

補廿一

入則舍於伏脊之內 云云 龍按所謂伏脊即膜原

是也解剖之所視與有可氏曰邪著膜原之論旨

趣略相符

○三焦疾

經曰三焦脹者氣於皮膚中輕々然而不堅 脈論

論曰熱在上焦者因欬為肺痿○又曰吸而微數其

病在中焦實也當下之即愈虛者不治在上焦者

其吸促在下焦者其吸遠此皆難治吸呼動搖振

々者不治

黃連解毒湯 活人 治三焦實火內外皆熱煩渴小

黃便赤口生瘡者 黃連 黃芩 梔子 黃柏

回方連翹 芍藥 柴胡 各等分 水煎食前服

涼膈散 局方 治三焦實火煩渴舌生瘡小水赤大便

結一切有餘之火 薄荷 甘草 桔梗 各八分

連翹 芒硝 梔子 黃芩 各一錢 大黃 一錢半

右八味水煎食後服

小柴胡湯 方見前 論曰陽明病脇下鞭滿不大便而

嘔舌上白胎者可與小柴胡湯上焦得通津液得

下胃氣因和身濇然而汗出解也○又曰食穀欲

嘔者屬陽明也吳茱萸湯主之得湯反劇者屬上

補廿二

焦也

論曰熱在下焦者則尿血亦淋祕不通

龍按此當楮苓湯之證

赤石脂禹餘糧湯 論曰傷寒服湯藥下利不止心

下痞鞭服瀉心湯已復以他藥下之利不止醫以

理中與之利益甚理中理中焦此利在下焦赤石

脂禹餘糧湯主之復利不止者當利其小便

赤石脂 禹餘糧 各二錢六分 以水一合八勺煮取

六勺

麻黃加朮湯 論曰治內極熱則身體津脫腠理開

汗大泄厲風氣下焦脚弱 麻黃 杏仁 各七分半

桂枝五分 木五分 其艸二分半 右五味煮如麻黃

麻湯法 論曰大陽病六七日表證仍在脉微而沉

反不結胸其人發狂者以熱在下焦少腹當鞭滿

小便自利者下血乃愈所以然者以大陽隨經瘀

熱在裏故也 水蛭中 蚘蟲各十個 桃仁七個

大黃二錢 右四味為末以水一合煮取六勺

壯原湯赤水 治下焦虛寒中滿腫脹小水不利上氣

喘急陰囊兩腿皆腫或面有浮氣者 人參

白朮各二錢 茯苓 破骨紙各一錢 桂心 附子

乾姜 砂仁各五分 陳皮七分 右九味水煎食

遠服 論曰霍亂頭痛發熱身疼痛熱多

欲飲水五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

亦曰大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以

理中丸一名人參湯 論曰霍亂頭痛發熱身疼痛熱多

欲飲水五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

亦曰大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以

理中丸一名人參湯 論曰霍亂頭痛發熱身疼痛熱多

欲飲水五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

亦曰大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以

理中丸一名人參湯 論曰霍亂頭痛發熱身疼痛熱多

欲飲水五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

亦曰大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以

九藥温之之人參 甘草 木 乾姜 各七分

右四味搗篩為末蜜和丸不用水吞服中飲之

桂枝人參湯 論曰大陽病外證未除而數下之遂

協熱而利利下不止心下痞鞭表裏不解者

桂枝 甘草 各八分 木 人參 乾姜 各六分

右五味以水一合八勺煮取六勺元方理中丸

六物黃芩湯 論曰乾嘔下利 黃芩 人參 甘草

乾姜 大棗 各四分 桂枝 一分 半夏 九分

右六味以水一合四勺煮取四勺

黃芩湯 論曰大陽與少陽合病自下利者與黃芩

補丹四

小湯若嘔者黃芩加半夏生姜湯主之 黃芩

大棗 各九分 甘草 芍藥 各六分 右四味以水二

合煮取六勺

龍按以上三方皆治中焦之下利凡欲治痢疾者

不詳中焦下焦之差別則誤治不尠盖因赤石脂

禹餘糧湯之治例擴而攷之可也

防風通聖散 方見前 治表裏客熱三焦實火者

○ 腹郭及臟腑疾

論曰正陽陽明胃家實是也 陽明病甚則充滿胃腸至

龍按熱實胃中者謂之陽明病甚則充滿胃腸至

一身四肢凡髮熱氣無所不滿焉此熱之至極也  
調胃承氣湯論曰發汗後惡寒者虛故也不惡寒  
但熱者實也當和胃氣亦曰大陽病三日發汗  
不鮮蒸々發熱者屬胃也亦曰大便秘不通胃氣  
不和者大黃一錢 甘艸五分 芒消二錢 右三味  
以水一合八勺煮取六勺去滓內芒消令消  
五苓散方見前論曰大陽病發汗後大汗出胃中乾  
煩燥不得眠欲得飲水者少々與飲之令胃氣和  
則愈若脉浮小便不利微熱消渴者四苓散水二  
小承氣湯論曰若大滿不通者可與小承氣湯微

補廿五

和胃氣勿冷大泄下亦曰陽明病其人多汗以

津液外出胃中燥大便必鞭鞭則譫語小承氣湯

主之若一服譫語止更莫復服大黃一錢二分

厚朴六分 枳實九分 右三味以水二合煮取六勺

黃連湯方見前論曰胸中有熱胃中有邪氣腹中痛

欲嘔吐者

大半夏湯論曰胃反嘔吐者半夏二錢四分 人參

二分 白蜜二錢五分 右三味以水三合四勺煮取六

勺

生薑瀉心湯方見前論曰傷寒汗出解之後胃中不

和心下痞鞭乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

大柴胡湯論曰按之心下滿痛者此爲實也當下

之亦曰傷寒後脈沉沉者內實也下解之

柴胡八分黃芩五分芍藥五分大棗各三分半夏六分

生姜五分枳實各五分右七味以水二合四勺煮取

一合二勺去滓再煎取六勺用大黃二分

龍按所謂實者皆熱實也熱之以充實腸胃內者

言之

大承氣湯方見前論曰病解能食七八日更發熱此

補廿六

爲胃實亦曰陽明病下之心中懊懣而煩胃中

有燥屎者可攻腹微滿初頭鞭後必澹不可攻之

若燥屎者亦曰陽明病譫語有潮熱反不能食

者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但鞭爾

龍按論中曰胃中有燥屎者胃字不可解若改作

腸則穩疑傳寫誤

大黃牡丹湯論曰腸癰者小腹腫痞按之卽痛如

淋小便自調時々發熱自汗出復惡寒其脈遲緊

者膿未成可下之當有血脈洪數者膿已成不可

下也大黃六分牡丹四分芒消各三分桃仁各三分

瓜子一分五分以水三合六勺煮取六勺去滓內芒消令消

薏苡附子敗醬散 論曰腸癰之為病其身甲錯腹

皮急按之濡如腫狀腹無積聚身無熱脉數此為

腸內有癰膿 薏苡仁十分 附子二分 敗醬五分

右三味杵為末取方寸匕以水一合二勺煎減半

服

己椒藶黃丸 論曰腹滿口舌乾燥此腸間有水氣

防己 椒目 葶藶 大黃各一兩右四味末之

蜜丸如梧子大先食飲服一九日三服稍增胃口

補二十七

中有津液渴者加芒消半兩

桂枝加芍藥湯 論曰腹滿時痛者 亦曰大實痛

者加大黃湯主之桂枝湯方內加芍藥三分

小建中湯方見前 論曰虛勞裏急悸衄腹中痛 亦

曰傷寒陽脉溢陰脉弦法當腹中急痛者先與小

建中湯不差者與小柴胡湯主之方見前

附子粳米湯 論曰腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿

嘔吐 附子三分 半夏一分 甘草二分 大棗五分

粳米二升 右五味以水一合六勺煮取六勺

烏頭湯 論曰寒疝腹中絞痛賊風入攻五臟拘急

不得轉側發作有時使久陰縮手足厥逆

麻黃芍藥黃芪各六分甘草各六分川烏五枚

以水二合

七勺煮四味取九勺去滓內蜜煎中更煎取六勺

真武湯論曰少陰病二三日不已至四五日腹痛

小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣

其人或欬或小便利或下利或嘔者茯苓

芍藥各七分生薑各七分木五分附子四分已上五

味以水一合六勺煮取六勺

梔子厚朴湯論曰傷寒下後心煩腹滿卧起不安

補廿八

者梔子六分厚朴各一分枳實各一分已上三味

以水一合四勺煮取六勺梔子厚朴湯當入心疾部

甘草瀉心湯方見前論曰傷寒中風醫反下之其人

下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿

乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之

其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使

鞭也

半夏瀉心湯方見前論曰嘔而腸鳴心下痞者

厚朴一分生薑一分半夏一分甘草一分人參一分湯論曰發汗後腹脹滿

者厚朴一分生薑一分半夏一分人參一分

其艸三分已上五味以水二合煮取六勺

大建中湯方見前論曰心胸中大寒痛嘔不能飲食

半腹中寒上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸

逆

桃花湯論曰治少陰病下利便膿血腹痛小便不

利者赤石脂一匙六分乾姜一分粳米一匙右三

味以水二合煮取六勺內赤石脂末方寸匕日三

服若一服愈餘勿服桃花湯當入下焦部

和胃湯晚成堂家方胃中不和腹攣急痛大便鞭者

芍藥 甘艸 各一匙二分 大黃五分 右三味以水一

補丸九

合四勺煮取七勺

生姜瀉心湯方見前論曰傷寒汗出解後胃中不和

心下痞鞭乾噫食臭或脇下有水氣腹中雷鳴下

利者

人參敗毒散壽治風中腑手足拘急惡風寒者

柴胡 桔梗 羌活 獨活 茯苓 川芎

前胡 枳殼 人參 甘艸各等分 薄荷減半

生姜水煎

理中安蛇湯六傷寒吐蛇者手足冷胃空虛也

人參七分 白朮 茯苓各一匙 烏梅二分 花椒三分

乾姜 炒五分

水煎服

錢氏白朮散 考 吐瀉發熱咽乾口渴者 小兒吐

蛇為是胃寒胃虛也 人參 白朮 茯苓 各五分

葛根 一錢 藿香 木香 甘草 各五分 右七味

水煎

當歸四逆湯 論曰手足厥寒脈細欲絕者 亦曰

若其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生姜

湯主之一龍試効手足寒從少腹至腰間拘痛若

陰股急痛或筋惕肉瞤之証及口顏喝斜者皆宜

之 當歸 桂枝 芍藥 各三兩 大棗 二十五個

補三下

細辛 甘草 通艸 各二兩 右七味以水八升煮

取三升去滓溫服一升日三服

枳實大黃湯 回 治胸腹有食積大便不通者

枳實 厚朴 大黃 枳櫛 各四分 甘草 二分

右五味水煎以利為度腹痛甚加木香二分

本方芍藥湯 機 治下利膿血裏急後重腹痛作渴

日夜無度 芍藥 二錢 當歸 黃芩 黃連 各錢

大黃 七分 肉桂 木香 枳櫛 甘草 各五分 右

九味水煎

三和散局 治七情氣結五臟脾胃不和心腹脹急

三大小便秘寢食俱廢并沉香紫蘇味腹皮  
 羌活各四分 木香 白木 栝柳 陳皮 甘草  
 各三分 川芎一分二分 木瓜二分 生姜一分 已上十二  
 味水煎温服  
 犀角地黄湯千金 治胃火盛血熱妄行或吐血衄血  
 便血者 犀角 生地黃 牡丹 芍藥 各等分  
 右四味水煎  
 龍按血病多レト雖凡尤可恐ハ吐血ナリ中ニ  
 毛血ノ咽管ヨリ出ルアリ喉管ヨリ出ルアリ  
 能々分別シテ之ヲ治スヘシ咽管ヨリ出ル毛

補世一

ノハ多ハ胃熱及膀胱熱ニヨル故ニ調胃承氣湯  
 大承氣湯 大黃 牡丹湯 桃核承氣湯 半夏瀉心湯  
 生姜瀉心湯 甘草瀉心湯 犀角地黄湯之類隨証  
 テ撰ヒ用テ佳ナリ喉管ヨリ出ル血ハ心肺之  
 部ニ攷テ佳ナリ吐血論ハ本篇肺ノ部ニ詳也

