

鄉食庭秘說

婦人出痘

二十七

X  
k 215

490.9  
Ae

No. 2868  
1月 215



富士川文庫

921

元始堂山田

圖書之鄉 飯庭家秘說卷之二十七目錄

涼血地黃湯

三ヲ

玄參地黃湯

四ヲ

浮肝散

十全大補湯加味

五ヲ

當飮養心湯

六ヲ

涼血解毒湯

七ヲ

孕婦出痘治方

八ヲ

安胎飲

九ヲ

出痘坐艸分娩說

九ヲ

黒神散方ナラ

生化湯ナラ

當歸散 紫蘿和氣飲

四順清涼飲

並ニラ

經行暴啞說

エノウ

婦人出痘經水不止治方說

ハナ

熱入血室治方說

セナ

起發貫漿時經行治方說

セナ

孕婦出痘臨產蓐說

ナラ

鄉庭家秘說卷之二十七

婦人出痘方彙

涼血地黃湯

發熱之初適遇經行如期而至則熱隨血解出痘亦輕不須服藥スナラ如三五日而熱不止痘不出者此熱入血室必妄行為動虛之患宜涼血地黃湯加入參治之

當歸 川芎 白芍 生地 白朮 升麻 黃連

耳艸 人參 山梔 玄參

水煎服



○朱翼曰婦人發熱見苗時經行者用加減升麻湯<sub>ヲ</sub>加生地川芎<sub>ヲ</sub>治之末期經行<sub>ヲ</sub>熟地黃連黃芩黃柏山梔子燒人糞<sub>ヲ</sub>治之

○本文之内經水如期之四字至肝要之目的也如經行暴啞用本方<sub>ヲ</sub>加入參生地麥門冬<sub>ヲ</sub>治之<sub>ヲ</sub>期六假令婦人ノ經水<sub>ヲ</sub>每月定有者也上十日<sub>ニ</sub>經水<sub>ヲ</sub>婦人モ有或ハ又中十日<sub>ニ</sub>經水<sub>ヲ</sub>婦人モ有或ハ又下十日<sub>ニ</sub>經水<sub>ヲ</sub>婦人有也如此其婦人持前<sub>ヲ</sub>千<sub>ヲ</sub>ガウ也折<sub>シ</sub>モ世間<sub>ニ</sub>胞瘡<sub>ガ</sub>ハヤリテ序病ノ節アメツテ毎月ノ期<sub>ヲ</sub>其婦人持前<sub>ヲ</sub>

頃經水<sub>ヲ</sub>是ヨキ<sub>ト</sub>也其ニナイハ其經水<sub>ヲ</sub>ノ邪熱<sub>ヲ</sub>モレ去<sub>ル</sub>故也胞瘡<sub>モ</sub>輕<sub>ク</sub>熱氣<sub>モ</sub>早<sub>シ</sub>サメテ彼是以ヨキ<sub>ト</sub>知<sub>ル</sub>ベシ其レニ<sub>ハ</sub>葉モイラズ惟其方<sub>ヲ</sub>指<sub>シ</sub>キテスム也ト云<sub>フ</sub>事也是<sub>ヲ</sub>經水如期<sub>ニ</sub>至<sub>ル</sub>熱隨血解スト云<sub>フナリ</sub>○若<sub>ニ</sub>三五日<sub>ヲ</sub>經<sub>テ</sub>熱モヤマズ痘<sub>モ</sub>出<sub>ズ</sub>經水<sub>モ</sub>不<sub>レ</sub>止<sub>ル</sub>者<sub>ハ</sub>熱<sub>ガ</sub>血室<sub>ヘ</sub>也其定ノ持前ヨリハ經水<sub>ガ</sub>ヨケイニヨリテ妄行スル也左<sub>スレハ</sub>內津血<sub>ヘ</sub>リテ后患<sub>ト</sub>也是<sub>ハ</sub>葉<sub>ヲ</sub>以<sub>テ</sub>其血室<sub>ヘ</sub>处<sub>ノ</sub>熱<sub>ヲ</sub>醒<sub>カ</sub>サバ熱<sub>モ</sub>ヒカズ痘<sub>モ</sub>不順<sub>ニ</sub>ナル也故涼血地黃湯<sub>ヲ</sub>用<sub>テ</sub>其血室<sub>ヘ</sub>熱<sub>ヲ</sub>驅<sub>ス</sub>醒<sub>ス</sub>也スベテ婦人ノ胞瘡<sub>ノ</sub>序熱<sub>ヲ</sub>アキ<sub>ミ</sub>持前經水<sub>ヲ</sub>

ベキ時節ハ上ノ十日カ中ノ十日カ下ノ十日カ其月々定リ  
經水ノ時ヲ明問テ医按ヲ定ムベシ是肝心心得也  
○未期經水トハ假令ハ其婦人胞瘡席熱上十日ニ  
有テ經水定リハ下ノ十日ナルヲ前モチコシテ上ノ十日序  
热ト指アフテ不時ニ經水だルハ是未期經行者也是  
至テ惡事也其時ニハ涼血地黃湯熟地黃連  
黃芩黃柏山梔子ヲ加テ治セヨト也是ハ胞瘡邪熱  
ノ為血ガサクガサレテ妄行スル故也定リ經水ナルトハ  
其理大キニチガウト也故紫朮黃連解毒湯如キ  
寒涼ヲ加ヘハ其血熱ヲ醒ス也熟地黃生地黃當  
次條ヲ猶又能見合テ治ヲ施スベシ

### 玄參地黃湯

痘疹發熱經水妄行却テ非天癸之期此毒火  
内繖揚乱血海ヲ迫經妄行ニ月事不以時止  
宜玄參地黃湯或ハ四物湯合黃連解毒湯  
以涼血為主必欲其止如必斯不正中氣虛弱  
致生陷伏者有之

○本文非天癸之期トハ前モ云ヲ通毎月定ノ經水

ノ時節テナク疱瘡ノ熱邪ノ為血道ヲサワガシテ逼  
ズル處ノ經水也是前ニ云フ處ノ月十二ノ經水ト其  
理大キニキガウ事也故此方ヲ以テ其血ノ妄行ヲ  
シヅムル為用ル處ノ主方也

玄參地黃湯之方

玄參 生地黃 丹皮 升麻 山梔 蒲黃

甘艸

燈心十茎

水煎熱服ス○傳曰非經行之時於發熱之間而  
經忽至者此毒火內熾逼血妄行之故也痘  
多而毒盛急用涼血攻毒湯倍加連翹步  
後

旁子使熱得清毒得解痘得出經待止  
始終無他變一犀別內虛痘必消矣方見于

浮肝散

經水不斷之時適逢出痘身發壯熱神志昏  
沈言語狂妄如見鬼神尋衣撮空此行經之後血室空虛天行邪乘虛而犯衝脉蓋肝藏  
血衛為血海肝藏魂魄竅於目神志昏者魂  
亂也妄見者視亂也妄言者肝移熱於心也  
宜浮肝散○保赤又心卯曰小柴胡加生地黃牡丹皮

前症治之浮軒散方 羌活六分 當歸一錢 山梔子

龍胆各五分

防風八分

大黃

蒸三遍六分一方有木通

柴胡黃芩一錢大黃一

元本血字  
氣字有  
今改之

○保赤全書痘瘡心卯右兩書云此症小柴胡湯生地黃牡丹皮ヲ加ヘテ前症ヲ治スル、說尤確說ト云フベシ

○熱入血室ノ症惟婦人計リカギリテ有ノヤウ思アテ

居ルハ大ニ心得ナガイニ男子ニモ又有ニ婦人前陰ヨリ血が下、男子ハ肛門ヨリ下血スルニヤハリ同症ナリ

熱入血室ノ諸症備テ下血スルナラバ男子ノ序熱ト云ヘ凡猶小柴胡湯加味ノ方ヲ用エシ是又ニ心得也故ニ又男子モ熱入血室有ノヲ知ラヌが爲

其證據之諸症次舉テ門人示ス耳○許學士

小柴胡湯加生地黃○保命集小柴胡湯加牡丹皮

○医疊元戒ハ先服小柴胡湯次用四物湯○除

春甫用紫物湯○友松子男ハ加紅花山梔子○

女ハ加生地丹皮○是ヲ見テ男子ニモ又熱入血室

之一症有ルトヲ知ルベシ

十全大補湯加味

正值崩漏不止氣血俱虛之後適逢出痘

此必不<sub>レ</sub>能勝仕宜大補其氣血以十全大補

湯八物湯加木香黃耆官桂主之使裏氣

充足、毒無留停、更能飲食、則可保全否  
則倒塌不治矣。○又曰：姬前症用十全大補  
湯、而後出痘、灰白平陷、難癧。難服者、加熟  
附子、一交、治之。○正崩漏トハニワカニ、血が經水、  
如コリテナマムラ云フ。○蝮蛇テリヤアカノ說前詳  
是ヲ述ナリ此條ナシテ予ガ說ヲ参考スベキ  
處、此時遂毒ノ一方ヲ虧テハナラヌ時也能々  
参考メ其理ヲ得ベシ。

### 當歸養心湯

萬氏曰：女子出痘、經水忽行、リ暴瘡不能言。

語者、心血虛而不能上榮於舌、故也。先以當歸  
養心湯、養心血、利心竅、待有能言、訶以十全  
大補湯、調之。當歸養心湯方、當歸、生地

人參、麥門、升麻、甘艸

右各等分加竹心水煎服。

### 涼血解毒湯

非經行之期、於發熱之際、而經忽至者、此毒  
火內熾、逼血妄行之故也。故必痘多而毒盛急  
用涼血解毒湯、倍加連翹牛蒡子、使熱得清毒  
得解、痘得出經得止、終無他變。○保赤曰：

女人出痘亦經期於發熱時而血忽至者治之

當歸 一錢

白芷 五分

升麻 四分

紫艸 一錢

有 五分

訣 一錢

紅花 一錢

桔梗 八分

連翹 一錢

燈心 三十根

赤芍 一錢

右水煎服

婦人出痘經水不止治方

痘出四五日經水不止身熱未退精神虛耗不起  
發氣虛不升不降則食自減痘必陷伏平淡者宜三十  
全大補湯如陽虛甚者加熟附子鹿茸治之  
便泄者去熟地黃如至六日猶不起脹者大  
保元湯參白虎草湯回陽反本湯及參附湯

宜參考

○熱入血室治方發熱時經水適斷宜早服柴胡  
四物湯以防血室空虛毒邪乘虛而入致生他疾  
若已憎寒壯熱神識不寧妄誕見聞言語錯亂  
叱カニ為熱入血室宜四物湯合導赤散與安神  
丸相兼服之○安神丸方二十六卷見

○起癰肉員漿之時適遇經行過三日不止者  
瘡必應起癰而不起癰應灌漿而不灌  
漿頂平形塌或灰白色或黑陷此為經血  
去多陰氣虧耗一為陷伏壞症矣宜八物湯

去地黃ヲ加黃耆木香熟附子ヲ以調元氣或胡荽酒噴之使瘡起癰灌將水或出增者ヲ為吉如寒戰咬牙喘急腫消手足厥者為內脫不治○傳曰痘出四五日經水不止身熱未退精神虛耗痘不脹氣虛守則食自減痘必陷伏宜十全大補湯主之レ如虛甚者加熟附子鹿茸ヲ治之至六日猶不起脹者千金內托散參白鹿茸湯回陽反本湯可參考○孕婦出痘治方痘科鍵曰孕婦何如曰安胎為主胎曰可安乎曰治之不失其時胎可安也失胎之墮ヤ血熱則氣虛初行子升散則火當散而

陰得平○諸書所謂初癰壯熱面眼俱赤如風寒及停食形者先用和解湯加味升麻葛根湯參蘿飲加減升麻湯ヲ如熱毒內甚出稠密者連莞升麻湯之類可選用○次行清解ヲ則陽火消而陰得安已無血熱○見苗之後三四日之間諸症平者只以安胎ヲ為主當取散和氣飲之類加減用之如見血實壅滯者十全神解毒湯涼血解毒湯之類可參考○次行補托則無氣虛之患○五六日參麥清補湯十全大補湯加味四聖散之類可參考ス如氣虛甚獨參湯

行攻乎

兼与六日後膿色不起者可峻補之○凡治痘之  
策投之皆有安胎之用故胎可全而痘可保也  
○傳曰孕婦痘瘡須先知五禁不可過表登不  
可過行下不可過解毒不可過辛烈只以安胎  
為主一二日少加解毒三四日少加清涼五六日  
宜清神七八九日宜補九十二日宜補脾滲湿  
此治痘之常期也如臨無窮之变隨期斟酌  
宜治之安胎之妙要在于此○曰倘不可保何以  
為治曰看在何時如隨于初出之時則補而  
升之○大補湯加防風荆芥之類○墮于小長  
之時則補而清之○八物湯加黃芩防風蓮  
翹或當散合保元湯之類○墮于行漿之時  
則峻補之○參芪鹿茸湯或回陽反本湯獨參  
湯或參附濃煎宜兼與矣○察看形症逆  
順血氣何如以別生死不可忽也○孕婦五  
日以後以唇舌難矣別有訣○曰孕婦有犯  
寒熱之症當行攻下医恐傷胎不敢投也○  
傳曰五症不冥則不可下有口諺○曰有故無損故  
無損雖大黃芒硝石膏桃仁半夏之類亦可用  
○有其實熱不即攻下陽火煩而陰無安胎墮

無疑矣故下而救陰則大黃之屬為安胎之  
藥又何懼乎

九

安胎飲乃子婦出痘始終以安胎為主不可觸  
動其胎其初發熱以參翁飲之痘出現後八  
多安胎飲為佳起發收瘧遲則十全大補湯  
去肉桂○安胎飲方人參白朮黃芩熟地  
當歸川芎芍藥砂參紫蘿陳皮甘草

右拾一味生姜三片紅棗三枚水煎溫服

出痘坐艸分婉痘瘡正在起發灌漿之時忽

遇坐艸分娩之期此氣血俱虛之候宜大補湯

加熟附子一至二錢以補氣血固表裏若產後小  
腹急痛者是血未盡也黑神散畧與行之不  
必拘泥若寒戰咬牙腹脹作渴足冷身熱者  
此脾胃內虛外作假熱也大補湯加熟附子用  
一二劑更用四君子湯加黃耆當歸陳皮木香  
多服止者吉不止者凶

黑神散方當歸川芎熟地乾姜桂心黑砂

蒲黃香附炒

童便青皮木香黑豆

右酒水各半煎

生化湯乃孕婦出痘正當盛時忽臨產只以

補氣血為主。十全大補湯先。腹中微痛。此惡露未盡也。宜除去之。生化湯主之。方當飯身五分。

川芎三分 桃仁二分 牛膝一錢 黑芍藥一錢 条甘草一分

淨水濃煎服。

乃孕婦出痘臨產蓐。萬山曰：孕婦出痘正當甚時。忽臨正產蓐者，只以大氣血補為主。十全大補湯若腹中微痛，此惡露未盡也。宜四物湯去芍藥。加乾姜桂心木香黑豆與之。○方產之後或半月或十日之間適逢出痘，此無胎乃孕，繫累不止。以大補氣血為主。以大補湯八物湯去芍藥。

與服之一痘出多者，加連翹大力子。大便自利者，加肉豆蔻一只。照常一體用。菜施肥治不必妄。

為多疑之評，反致變悞也。

當歸散痘出，脊後無他症三四五日此湯主之。即安胎

之奇方也。

當歸川芎芍藥黃芩芍白朮減半

石水煎溫服。

紫蘿和氣飲出，脊後安胎之妙方也。

當歸川芎芍藥人參紫蘿陳皮膚皮臘生姜水

四頃清涼飲初熱見點時大便祕者宜此湯下之亦安胎也

大黃當歸白芍甘草右四味水用一錢煎五分。

