

X

3 13



鍼灸阿是要穴目錄

卷之二

中風小藥

瘡根穴 入門○治

瘡根穴

瘡塊

又別法

入門

脊背五穴

千金翼○治
癰癧驚風

巨闕俞

千金翼○治
胸膈氣道

中樞

氣府論王註

接骨

醫學入門

氣海俞

入門○治
腰痛痔瘡

督俞

入門○治寒
熱心腹痛

濁浴

千金翼○治
病多驚口苦

腰眼

一名鬼眼○居
家必用治勞癆



吉士川文庫
2729

關元俞

入門○治風勞腰

夾脊穴

圖翼○治霍亂轉筋

下極俞

千金翼○治腰痛
泄利腹脹癰聚

十七推穴

千金翼○治人轉胞腰痛

灸腸風諸痔

入門

回氣

圖翼○治五痔便血

竹杖

千金方○治腰痛

騎竹馬穴

治癰疽

咳嗽灸法

鍼灸聚英

小兒疳瘦

鍼灸聚英

小兒疳瘦

鍼灸聚英

灸勞瘵穴

資生經

灸哮喘

鍼灸聚英
神應經

中風不語

神應經

厥逆

圖翼○治中風厥逆

積聚痞塊

圖翼

治瘡根

類經圖翼○所謂醫學入門瘡根穴也

○卷之二

傳厥瘻

圖翼

灸血病

大便血
千金方○治下

傳厥六爻圖

醫學入門

長谷

大便血
千金方○治下

傳厥六爻圖

十藥神書

盲募

千金方○治
痈不勝食不消

通谷

千金翼○治
大便諸疾

冤舍

千金方○治
裏鍼藥所不及者

肋頭

心腸痛
千金翼○治
瘕聚

乳上穴

千金翼○治
乳癰

龍領

心痛冷氣上
千金翼○治

肋鏃千金翼○治

傳尸注

腸堂

明堂灸經○治

滿喰噫喘逆目黃

腋下穴

千金翼○治

癰噫膈塞

子戶

千金翼○主治

同胞門

身交

千金翼○治白帶

胞落癰疽尿壯者

癩痴偏大

圖翼

絕孕

圖翼○灸之

終身不孕

欬嗽

千金方

欬逆

王機微義○治

欬逆甚者

膀胱氣

神應經○治膀胱

病氣陰腎入腹

腹中氣塊

神應經○治

塊積難分

癩痴

圖翼

陰囊下橫文

千金翼○風氣口禁腹痛

羊矢

圖翼

後神聰

中風風癇

髮際

頭痛眩暈

灸傳尸千金翼

後腋下穴

千金方○治

胞門

千金翼○治

氣腫

不成墮胎腹痛

氣門

千金翼○治

胎孕不成

闌門

圖翼○治

木腎偏墾

子宮子戶

圖翼○治

癥瘕

灸腋氣

圖翼

欬逆

鍼灸聚英

顙門不合

神應經

急脈

素問氣府論○治

病氣小腹急痛

橫骨

千金翼○治

婦人遺尿

泉陰

千金翼○治

癩印偏大

卒癩病

千金翼○治

癩病卒急者

前神聰

中風風癇

衄血

神應經

印頭

急慢驚風

海泉

圖翼○治
消渴

卒腹痛

神應經○治腹
痛皮色青黑

陽維

千金方○治
耳聾鳴

機闢

千金翼○治
卒中風口噤

金津玉液

圖翼○治消渴
瘡舌腫

唇裏

千金翼○治
黃疸馬黃

夾承漿穴

千金翼○治
馬黃急疫

驚口

千金翼○治
鬼語二便不通

顛顚

千金翼○治
痘氣溫病

耳上穴

千金翼○治
瘻氣

當陽

圖翼○治
風眩鼻塞

魚尾

王龍賦○治
目疾

小兒食癟

神應經○治
小兒食癟

○卷之三

本朝諸瘡八穴灸法

神應經

本朝九曜點

治諸瘡

大骨空

圖翼○治
障久痛吐衄

拳尖

明堂灸經○治
風眼翳膜疼痛

五虎

圖翼○治
手指拘牽

中魁

醫學捷法○治
五膈反胃

牙疼

中魁

醫學捷法○治
五膈反胃

手一節穴

千金方○治
牙疼

中泉

圖翼○治
氣痛唾血目中白翳

手際穴

圖翼○治
霍亂轉筋

手後臂間穴

千金方○治
疔腫

風牙疼

千金方○治
牙疼

上牙疼

神應經○治
神應經

下牙疼

神應經○治
神應經

龍玄

神應經○治
神應經

小兒雀目

神應經○治
神應經

虎口

神應經○治頭
痛眩暈小脣緊

兩手研子骨

千金翼○治
痘瘡

河口

千金翼○治

手足髓孔

千金翼○治
痿退風偏枯

注復

圖翼○治
汪復病

小兒鹽哮

圖翼○治
小兒喘哮

肘尖

腸癰

療癰

醫學入門

灸癥風

入門○治癥
風贊疣諸恙

交儀

千金方○治女人
帶下崩漏經閉

榮池四穴

千金方○治女
子帶下崩漏

漏陰

千金方○治婦
人帶下崩漏

逆產

千金方○治
婦人逆產

胞衣不出

千金方

橫產

鍼灸聚英

小兒舌重

千金方

灸齒疼

千金方

灸轉筋

千金方

灸反胃吐食

千金方

灸轉筋

千金方

外踝尖

圖翼○治
外轉筋

踝尖

圖翼○治下牙
痛脚氣寒熱

足踵

圖翼○治
霍亂轉筋

陰陽穴

圖翼○治卒中惡風

足大指三毛中穴

圖翼○治
熱毒欲死○凡有四法

內崑崙

圖翼○治
轉筋

承命

圖翼○治
驚癲狂邪

大指甲

千金翼○治
大便失禁

獨陰

圖翼○治
胎胞衣不下

手足指穴

圖翼○治
水病

手足

大指 千金翼○治
小便數

華陀穴明堂灸經○治癩癓偏大

卷之五

陰蹻

明堂灸經○治月水不調卒痺

張仲傳神仙灸法明堂灸經○治腰痛甚者

卷之五

玉龍賦治腰痛甚者

膝眼

玉龍賦○治膝腿冷痛

髓骨

玉龍賦○治虎歷節風痛

風市

千金方○治腿脚乏力

扁骨

明堂灸經○治指臂痛

前髮際

明堂灸經○治小兒風癇

禁中穴

明堂灸經○治千金方

鬼穴部

千金翼

千金方治鬼十三穴

第一鬼官

第二鬼信

第三鬼壘

第四鬼心

第五鬼路

第六鬼枕

第七鬼狀

第八鬼市

第九鬼營

急路

第十鬼堂

第十一鬼藏

第十二鬼臣

第十三鬼封

以上十三穴治鬼祟其効如神○千金方

鬼城

千金方○治狂邪鬼病

四華六穴

唐中書侍郎崔知悌傳灸勞病

十藥神書

三靈奇俞

鍼灸聚英四華穴

經門四華

醫學入門

膏肓俞

千金方○治癆瘍

暎

○卷之五

本草

六

本朝 治頭痛奇俞

本朝 治喉痺奇俞

本朝 治帶下奇俞

本朝 治目腫奇俞

本朝 治諸瘡三體奇俞

本朝 治瘡英四藥穴

灸後見山辨

鍼灸耐痛與不耐辨

鍼灸各有位辨

鍼著肉不出辨

土用八專不宜灸辨

市金方

鍼灸補瀉之功有勝負辨

第六卷

灸炷壯數辨

灸瘡卒血射辨

取穴尺寸辨

灸炷根下三分辨

灸瘡潰發辨

周體爲經穴辨

禁灸辨

灸後點麻油辨

灸後宜食肉辨

人神辨

每日宜灸三里辨

管鍼打鍼捻鍼辨

灸炷熱與不熱辨

十二推胃俞辨

灸炷有先後辨

預防病者宜灸治辨

○附錄辨鍼灸之疑義

凡二十一事

有三條

中書卦曆

灸法凡所舉奇俞三百八十有七穴

穴解

灸法總要 目錄終

通宜灸三里無俞 普施丁鱗灸

灸野宜灸肉脾灸灸人脾脾

禁灸山脚 禁灸腰帶

禁灸斷髮脾 禁灸腰帶

禁灸入中脾 禁灸腰帶

禁灸出中脾 功有形

灸孔蹠石三分脾

鍼灸阿是要穴卷之一

洛下 法橋 岡本爲竹一抱子 撰

長州 稗 熊谷順安竹隱

門人

防州熊毛 末兼原端向榮

同校

千金方曰凡人吳蜀地遊宦體上常須三兩處灸之勿令癢暫
癢則瘴癘溫瘧毒氣不能著人也故吳蜀行灸必法阿是之法
言人有病痛卽令捏其上若裹當其處不問孔穴卽得使快成
痛處卽云阿是灸刺皆驗故曰阿是也○瘴癘溫瘧毒氣八山

嵐濕熱不正邪氣ヨリ致者也此言心ハ吳蜀八濕熱盛

ノ地也是以吳蜀二遊行任宦ノ人ハ其體中ニ於テ常ノ

兩三處ニ灸メ灸瘡ノ暫モ癒タユヘ無ヤウニスル也如此スレバ彼瘴癘温瘧等ノ毒氣ソノ人ニ執著スルヲ不能ト也故ニ吳蜀ノ風行ニハ灸スルニ必阿是ノ法ヲ以テ法トス其阿是ト言ハ若何ノ處ニテモ病痛アルヲ覺バ即ソノ苦ム處ノ躰上ヲ捏推シメテ若裏ソノ病處ニ適當セバ何人經何ノ俞穴タルノ分ナク只其推テ快ク應ル處ヲ以テ阿是ト号テ即灸レ即鍼スル皆ヨク驗アルヲ致也故ニ此ヲ名テ阿是ト云也蓋身體ノ中イヅコニテモ阿ク推テ是處ヲ以テ灸刺スルガ故ニ阿是ト云者也按スルニ阿是ハ本朝ニ所謂ヲレヤキ也凡人身ノ經脈ニ奇常アリ常經ハ手足六陰六陽十二經也奇經ハ任督衝蹻維帶ノ八脉也輸穴ニモ亦奇常アリ素問氣穴論ニ謂氣穴三百六十ハ此常穴也然氏皇甫士安甲し經素問氣府論王註及滑伯仁十四經發揮ニ舉テ今所存者ハ惟三百五十六穴アリ其三百五十六穴ノ外ニ四花風市腰眼痞根等ノ諸穴アリテ此ヲ奇輸ト云奇輸モ亦阿是ノ中ヨリ出者也内經ニ奇輸ノ義ナレ靈樞刺節真邪論ニ奇輸ノ二字有ト雖在此モ亦三百五十六穴ノ外ナル奇輸ヲ云ニ非ズ身ノ旁ニ所在ノ穴ヲ指テ奇輸ト云也又阿是ノ名モ素問靈樞ニ所無ニソ千金方ヲ以テ始トス然ニ靈樞經筋篇曰以痛爲輸トハ推テ裏ニ應テ快ク痛處ヲ以テ即輸穴トスルノ義也故ニ馬玄臺註證發微曰俗曰天應穴者是也ト天然所應ノ處ヲ穴トスレバ也此皆阿是ヲレヤキノ類也愚按スルニ輸穴ハ本經絡ニ繫者也豈奇輸阿是ト云氏

經絡ヲ外ニスルノ理アランヤ風市ハ足少陽膽經ニ繫リ。腰眼ハ足太陽膀胱經ニ繫ルノ類也。後人ソノ奇輸アル處ノ經絡ヲ推求テ何ノ經何ノ絡ニ屬レ及。何ノ本穴ニ當ガ故ニ如^{ヨリ}此ノ効アルヲ詳ニソ可ナラシ者乎。崔氏^カ四花ノ穴アリ四明高武コレラ考テ足太陽第二行。鬲俞膽俞ノ四穴タルコトヲ辨セリ諸ノ奇輸皆如^{ヨリ}此ニ其所屬ノ經絡。及其本穴ヲ明ニスルニ非バ鍼灸ノ効イカシノ著レシヤ故ニ余諸書ニ所舉ノ奇輸ノ最氏要ナル者ヲ擇記テ鍼灸

阿是要穴ト号シ初學者向南トナサニテ欲スルミ

痞根穴

出李挺醫學入門卷之二下治病奇穴○曰專治

痞塊十三推下各開三寸半多八灸左邊如^{ホチ}左右

俱有左右俱灸^ハ痞ハ否也氣ノ升降否滯ノ難通也俗云

ツカエ也塊ハ積塊也此穴痞塊ヲ致ス病根ニ應ス故ニ号

テ痞根穴ト^ヒ其法脊ノ大推ヨリ數量ニテ第十三推ノ

下ノ左右脊中ヲ開^ハ各三寸半左右ノ間總^ハ七寸ノ穴

トス若痞塊左右ニ偏ナル者ハ多ハ左方ニ^ハ三灸ス若痞

塊ノ有^ハ左^ハ右^ハ俱ニ滯居者ハ左右ノ兩穴俱ニ灸ス○本

說雖^ハ如此愚按スルニ痞塊ノ滯^ハ多ハ左方陽分肝部一在

が故ニ多灸左邊ト云也只痞塊左ニ在者ハ左邊ニ灸レ。

右ニ在者ハ右邊ニ灸スペレ△或問凡穴ヲ取ノ尺寸ニ兩說アリ。一ハ

左右俱ニ灸スペレ△或問凡穴ヲ取ノ尺寸ニ兩說アリ。一ハ

靈樞骨度篇ニ出テ滑伯仁氏十四經發揮ノ仰人伏人尺

寸之圖ニ所記ノ者也一身ソノ處々ニ於テ尺寸ヲ量リ定ム足太陽膀胱經ノ背ノ第二行第三行ノ開ト及胸腹

ノ横寸ハ其人ノ兩乳頭ノ内間ノ廣ラ量。テ此ヲ八ニ折
テ八寸ニ定テ用之。ノ法也。ハ後世ニ所謂手ノ中指中節
ノ一寸ヲ以テ此ヲ周身ノ諸穴ニ用ノ法也。十四經三百
五十六ノ常穴ハ悉骨度篇。及十四經發揮仰伏人尺寸之
圖ニ所述。ノ尺寸ヲ用テ法トス彼奇輸ノ如ハ何ノ尺寸
ヲ用テ法トセニヤ曰穴ヲ取。尺寸ハ骨度篇ヲ以テ正法ト
ス郎伯仁氏十四經發揮仰伏人尺寸之圖是也。中指中節
ノ一寸ハ後世ノ寸法ニゾ經旨ニ非ズ從^{ヨツ}テ考ニ奇輸ハ
内經及甲乙經ニ不載者ニソ此亦後世ニ所出ノ奇穴ナ
ルガ故ニ其尺寸モ亦後世所取ノ中指中節ノ一寸ヲ用
者ナフシ歟。△按^ニ瘡根穴ハ十三推下各開三寸半ナルト
キハ此足太陽膀胱經第二行。盲門^ニ穴ニ當レリ或問肓
第三行ヲ取ノ法兩說アリ。一ハ脊中ヲ去一各三寸「ス
十四經發揮等從之」也。一ハ靈樞背輸篇ノ法ニメ脊骨ヲ
除テ各開一寸。脊中ヨリ量^ハレバ各三寸半。左右七寸ノ
開トス神應經類經從之也。吾子以瘡根穴第三行トスル
者ハ何ノ法ニ從テ云ヤ曰背輸篇ニ從ノミハ門ノ意モ
本三寸半トスル也。李先生足太陽膀胱經背^ハノ二行三行
ヲ辨スルニ節外各一寸半節外各三寸ト云。外字ヲ以テ考
トキハ脊ヲ除テ二行ハ各一寸半。三行ハ各三寸也。脊中
ヨリ開トキハ二行ハ各二寸。三行ハ各三寸半ノ開トス
然トキハ瘡根穴法ニ十三推下各開一寸半ト云。○外
字ナシ此明ニ脊外ヨリ各三寸。脊中ヨリ各三寸半。足太
陽經第三行ノ盲門ノ二穴ナル。○明白也或又問吾子が

說ノ如ナラバ古人何ソ直ニ盲門ト不言ソ別ニ痞根穴法ヲサスヤ曰古人ハ後人ノ點穴ニ不詳者ノ爲ニ種々ノ穴名別法ヲ立テ粗工ニ告ル捷法トス彼孫眞人力竹杖穴ノ如モ實ハ督脈命門ナル類也夫諸輸穴ハ經絡ノ會ニ在テ三百六十五穴トス然ニ今所存ハ三百五十六穴ニメ九穴ヲ關ノミ何如ソ三百六十五穴ノ外ニ經絡ヲ離テ別ニ奇輸ト云者アラシヤ有バ内經不備トス後人其所屬ノ經脈本輸ヲ明テ人生ヲ損害スル勿レ○或問吾子ハ痞根穴ヲ以テ盲門穴トス盲門穴何以痞塊ノ根ヲ治スルヤ曰十三推下ノ左右其二行ハ三焦輸也腎俞ノ上ニ在難經ニ焦ヲ原氣ノ別使トス原氣ハ腎間ノ元陽也故三焦俞ハ腎俞ノ上ニ在テ十三推ノ左右ニ繫ル其圓筋ハ督門穴也盲八藏府肉骨ノ間空陽氣流行ノ處也故正立膈筋云下ニ看原ト云者毛皆元陽府會ノ地ノ指テ育ト云也三焦俞ノ左右ニ盲門兩穴アル者ハ三焦元陽ノ氣コレリ出テ周身ニ徃來流行スルノ戸門タレバ也三焦ヨク行時ハ藏府榮衛ヨク徃來流行メ何ノ痞塊ヲナスノ有ヤ古人盲門ヲ以テ痞根トス神意アルカナ是以三焦俞ニ腹中積聚姪石ナルヲ治スルノ効アリ盲門穴ニ心下堅滿ニ主ソ効アリ余推テ痞根ハ盲門穴タリト云者過論ニハアラズ又問入門ニ痞根穴ニ灸スル壯數ヲ不記何トカセシ乎曰此亦盲門ノ灸壯ニ從テ三十壯ナルベシ然ニ灸艾ノ壯數ハ人ノ長幼羸壯病ノ輕重ニ從テ多少スベシ一定スルト勿レ○按ニ痞根穴類經圖翼ニモ出タリ

文字少々不同アリテ此第一

附錄穴通考

卷ノ終ニ附錄ス通考スベレ

又法

出人門右十俱ニ瘡根ノ條ニ見タリ○曰又法用
稥心量患人足大指齊量至足後跟中止將此稥從
尾骨尖量至稥盡處兩旁各開一韭葉許在左灸右在右灸
左針三分灸七壯神効△此モ亦瘡塊灸治スル瘡根穴才
別法也其法ハ稥心ヲ用テ其人ノ足下ニ踏シメ稥人頭
ト大指ノ頭ト齊ソロヘテ後ハ蹠ノ赤白肉ノ正中ニ至テ
切止メ其稥ヲ其人ノ尾骨ノ尖ヨリ脊ニ著テ上ノ稥ノ
盡ル處ノ脊骨ノ兩旁各開ト十分許ニ灸ス瘡塊在左者
ハ灸右瘡塊在右者ハ灸左常法ハ左右俱ニ灸スベレ○或
問此穴ハ何ノ經穴ニ正當スルヤ曰余此法ヲ推ニ脊ノ十
四椎ノ下督脈命門穴ノ左右ニ當レリ然則人ノ足ニ六
小アリ此モ亦不齊也此大槻足大陽膀胱經第二行ノ別
絡脊ヲ挾テ八竅穴ヲ行者ニ繫ニ似タリ本朝ニ通用
スル所ノ瘡根ハ前法ヲ以ソ此兩法ヲ用ト有者ナレ
出人門右十俱ニ瘡根ノ條ニ見タリ○曰又法於
足第二指岐叉處灸五七壯左患多右患少左灸
後十晚夕覺腹中響動是驗△此モ亦瘡塊ヲ治スル瘡根
穴ノ別法也足第二指岐叉處灸ト八足大指ノ次指ノ間
第二指十三指ト兩指ノ相分ル岐間ノ處ニ灸ス各五七
壯瘡塊在左者ハ灸右在右者ハ灸左灸メ後日ノ一晚夕
ニ腹中響動スルヲ覺者ハ病ノ痊ヘキ是其驗也△按
此足陽明胃經ノ內庭穴ニ近者也腹中響動ト云則強

胃經ノ穴ナルベキ者歟。或又問此等ニ灸スルノ法。病ノ所在ト左右トリタリ湯テ灸スル者ハ何ヤ。曰此內經ノ鍼法ニ所謂繆刺巨刺ノ道也。病處ト刺處ト。左右トリタリ湯テ鍼ス。其經穴ニ於テ如シテ此スルヲ巨刺ト云。絡穴ニ於テ如シテ此スルヲ繆刺ト云也。灸法ニ多ク此意ヲ用ユ。△本朝ニ瘡根穴ト云。則前ノ十三推左右各三寸半ニ取ノ法ノミトシテ覺ル者多。此實ニ誤也。瘡根穴トハ右ノ三法ノ通号ニメ。獨十三推左右ニ取ノミヲ以テ云ニハ非ル也。

腰眼一一名

発刻

出居家必用○千金翼云腰日窟入門名鬼眼

○類經圖翼卷之十。奇俞類集曰。腰眼。其法令病人平眠以鑿於兩腰眼宛々中點二穴各灸七壯。此穴諸書所無而居家必用。載之云其累訣累驗主治諸勞瘵已深之難治者。於癸亥日二更盡入二更時令病人平眠取穴灸三壯。△其人臥タラカ平ニ臥伏セシメ兩手ヲ重カガチテ掌ヲ額ニ當テ身足ヲ伸テ此ヲ見レバ腰ノ十五六推ノ左右ニ於テ穴々タル陷カクボナル處アリ此卽腰眼穴也。勞瘵勞虫ヲ治スルノ要穴也。灸スルニ癸亥日ノ夜四過テ夜半ニ入ノ時ニ灸ス。○入門曰。鬼眼穴專祛勞虫。令病人舉手向上畧轉後些則腰上有兩陷可見卽腰眼也。以墨點記於六月癸亥日夜亥時冬勿金入。御四花膏。盲肺俞亦能祛虫。○圖翼又曰下傳治傳厥勞瘵以致。城門絕戶者有之此證因寒熱煎作血凝氣滯有化而爲蟲者。內食藏府每致傳人百方難治惟灸可攻其法於癸亥日二更後將交夜半乃六神皆聚時勿使人知。令病者解去下衣舉手向上畧轉後些則腰間兩

旁自有微暗可見是名鬼眼穴卽俗人所謂腰眼也正身直
五用墨點記然後上床令面而臥用小艾炷灸七壯或九壯
十壯尤好其蟲必於吐瀉中而出燒燬遠熏之可免傳染此
比四花等穴尤易且效○千金翼曰治腰痛灸腰自竈在尻
王約左右又曰在腎俞下三寸夾脊兩旁各一寸半以指按
陷中主治消渴圖翼云此二說者似皆指此穴△按ニ此足
大陽膀胱經ノ二行三行ノ間大槩第十六推ノ邊ノ左右
ニ在然凡十七推ノ邊ニ在者アリ人ノ肥瘦ニ從テ不同
也此穴能下焦督膀胱ノ地ヲ溫潤スル者歟蓋諸蟲ハ濕
濁ニ生ス此ニ灸メ下焦ノ陽氣ヲ溫養シ清眞水ヲ滋潤
スルが故ニ下焦不足ノ濕濁去テ蟲ノ藏几所ヲ失故ニ勞
蟲ヲ去ノ効コノ穴ニ在者乎△或問灸之法癸亥日ノ夜

亥ノ時ヲ以スルハ何、や日腰眼ハ勞病ノ主穴ニラ眞陰滋補
ノ灸處也。癸亥ハ干支俱ニ屬水且腎ハ夜亥子ノ時ニ其
氣旺ス故ニ水氣所主ノ日與時ヲ以テ癸亥日ノ亥時ニ
灸ス俗因テ此ヲ癸亥穴ト名ク。又按ニ納音六十甲子ノ
中ニ於テ干支音三氣ノ五行ヲ同ズル者ハ癸亥ノ癸亥ハ
水干亥モ水支納音然水音ヲ納テ三氣皆水ヲ合ス故ニ
水旺ソ氣ヲ用テ此日ニ灸之者欤又問入門六月癸亥夜
ト云者ハ何ヤ六月ハ土氣ノ旺分也何如ソ補水灸時
土旺ノ日ヲ用シヤ日入門ノ亥字ハ傳漏ノ誤也六八當
作十字十月水旺ノ月ニ於テ癸亥日ヲ擇テ夜ノ亥時ノ
終リ夜半ニ入シトス九ニ於テ灸スペレ○又按ニ灸之ニ癸
亥日ニ於スル者ヲ呼癸亥穴ト云ベシ他日ニ灸スル者ハ

腰眼或鬼眼

穴ト稱スヘレ

脊背五穴

出千金翼○云治大人癲疾小兒驚癇灸背第

二推上及下窮骨尖二處乃以繩度量上下中
折復量至脊骨上點記之其三處畢復此繩取其半者爲

三折而參合如△字以上角對中央一穴其下二角正夾脊

兩邊同灸之凡五處也各百壯△大人ノ癲癇小兒ノ驚風

ヲ主治ス其法背ノ第二推ノ骨節ノ高キ所ニ點ス又龜

尾ノ尖ニ點シ又繩ヲ以テ其ニ推上ノ點ト龜尾尖ノ點

トノ間ヲ量取テ其繩ヲ兩ツ折テ其折目ノ所當ノ脊中

ニ點シ又右ノ兩ツニ折タル繩ヲ以テ其一折ヲ切去テ殘

レル一折ノ繩ヲ三ツニ折テ繩ノ頭與頭ヲ合レバ△如此ニ

或也其二角ノ上角ヲ以テ右ノ脊中ノ點ニ加レバ下ニ

兩角アリテ脊ヲ挾ムニ穴トナル總テ點スル五穴也其豎

ノ三穴ハ脊路ニ在其攢ノ二穴ハ脊ノ兩邊ニ在也此ニ

各灸スルユト百壯左氏神効アリ○初學者ノ爲ニ一圖

ラ著ス

一如左

窮骨尖トハ如此龜尾ノ尖
骨ノ下ニ點穴ス



二推ノ上トハ如此ニ推骨ノ
高キ所ニ點穴ス

脊

五

穴

之

圖



此上下ノ間ヲ量テ兩ニ折テ折目ニ點穴ス又其折目ヨリ半ヲ切去テ一半ヲ折テ三角ニ作テ左右ノ兩穴ヲ灸點トナスノ如此

△右ノ五穴ヲ半ノ上ノ穴ハ督脈陶道穴ニ近シ下ノ穴ハ督脈長強穴ナリ 中ノ二穴ハ九推下督脈筋縮穴ニ近シ左右ノ兩穴ハ大槻十四推ノ右ニ在テ腎俞穴ニ近キ者也 陶道ハ上焦ノ陽氣ヲ解發ス長強ハ本ヨリ癲狂ノ主穴タリ筋縮モ亦狂癇癲疾ヲ治スルノ効アリ癲驚ノ發スル厥氣ノ衝上ヨリ致者也 故ニ腎俞ニ灸メ下焦ヲ固レ厥氣ノ衝上セラズ此五穴

實ニ癲癇驚風ニ神効アルベキト必トス
出千金翼云 俠膽俞勞行相去五寸名濁浴○治胸中膽病 恐畏多驚少力口苦無味炎隨耳壯△膽俞ハ足太陽經ノ第二行也 十推ノ下脊中ヲ去メ各二寸ニ在也 濁浴穴ハ右ノ膽俞ノ旁ラ 俠テ脊中ヲ去メ各二寸半

濁浴

左右ノ相去ト五寸ノ間ニメト推ノ下ノ左右ニ求ム。故治功皆膽病也。胸中膽病トハ膽氣逆衝ノ胸中ニ結スルヲ云。上焦衝逆ノ膽病ヲ治スルガ故ニ膽俞ノ旁ニ廣開テ五寸ニ取者欵。膽俞ハ相去四寸也。膽ハ清淨ノ府タリ。其濁濁ヲ浴洗メ清淨ナラレム。義ニ取テ濁浴ノ穴各アリ。其恐畏多驚少力ハ膽氣ノ發生虛弱ニメ然リ。口苦モ膽汁ヲ溢ヘレハ也。隨耳壯トハ其人ノ年數ニ令セテ假令二十歳ノ人ハ二十壯ヲ灸スルノ例ナリ。○云二十歲ノ人ハ二十壯△巨闕俞ハ脊ノ第四推ノ下ニ在也。膈中ノ氣道ヲ調ニ灸ス其人ノ年數ニ隨テ灸艾ノ壯數ノ大々假令二十歳ノ人ハ二十壯ヲ灸ス。按ニ脊ノ中行ハ督脈經ニ屬ス。督脈所主者ヲ甲乙經等ノ諸書ヲ以テ考ルニ第三推ノ下ニ在身柱穴第五推ノ下ニ在神道穴テ第四推ノ下ニ穴ナシ千金翼ニ始テ如此。巨闕俞第四推ニ在フ。ラ云實ニ足太陽經第二行ノ者ヲ考ニ第四推ノ旁ニ甲乙經ニ穴ナウノ山眺經ニ始テ四推ノ旁ニ厥陰俞アルーラ云厥陰輸一名闕俞ト云トキハ督脈ノ中行第四推ノ下ニ於モ亦巨闕俞ナクジバアルガラズ彼上古ヨリ所傳三百六十五穴ト雖氏今世ニ闕失ノ不足者ハ此等ヲ以

ノ故欵

督俞

出入門卷一之上太陽經條中○二六節外一寸半
灸三壯主寒熱心痛腹痛雷鳴氣逆○圖翼云主第

六推下兩旁相去各二寸禁鍼可灸一名高益△督俞ハ脊ノ第六推ノ下ノ兩旁ニ在入門ニ節外一寸半トス圖翼二寸トス按ニ入門ニ一寸半ト云者ハ脊骨ヲ除テ云故外字アリ圖翼二寸ト云者ハ脊中ヨリ量テ二五也只第六推ノ下ノ兩旁ニ於テ脊中ヲ去各二寸左右四寸ノ開トスベシ寸ハ其人ノ兩乳頭ノ内間ヲ量テ折テ八寸トスルラ用△督俞ハ明ニ足太陽經背第二行ニ繫者也脊中行督脉ラ考ニ第六推ノ下ニ甲乙經ヒハ穴ナク素問氣府論次注ニ第六推ニ靈臺穴アルヲ云トキハ六推ノ旁ニ於モ穴ナクンバアルベカラズ或問督俞ハ督脉ノ俞タリ何ゾ六推ノ旁ニ在十日甲乙經督脉ハ陽脉之海タルヲ云督ハ陽脉ノ都細タレバ也第五推ノ旁ハ心俞也十推ハ其間ニ在テ第六推ノ兩旁ニ繫者軟管見如此イゾ是ハ旁ハ兩俞也心與肺言上焦主陽ノ尊位タリ故ニ督俞

非ラ

知ズ

中樞

出素問氣府論王氏次註○此穴ハ奇輸ニ非ス然氏

今ノ世ニ麻布スル所ノ十四經發揮等ニ不載之故世人多ハ此穴アルヲ不知也素問氣穴論ニ背與心相控而痛所治天突與十一推ト云所ノ十一推ハ即此中樞穴也穴ハ脊ノ第十推節下間ニ在テ督脉ノ本俞也鍼五分禁灸之令入腰背僵硬圖翼云此穴能退熱進飲食可灸三壯常用常效未見僵硬○入門云十節名中樞明堂不載△按ニ圖翼ニ灸スペキ一傳ラ舉ト雖氏僵硬ノ過千葉ガタシ

幸ニ善穴多存ス禁灸ト

スルニ過千アラレトス

督脉ノ穴ニ繫脊ノ第十二推節ノ下間に在。此穴

下三節名接脊云ノミ鍼灸ノ分壯及其主治ノ功驗ヲ不載也故ニ其詳義ヲ辨スベキニ由ナレ

接脊

諸書ニ不載入門卷之一ノ上腎脈ノ懸樞穴ノ條外各接脊云ノミ鍼灸ノ分壯及其主治ノ功驗ヲ不載也故ニ其詳義ヲ辨スベキニ由ナレ

氣海俞

出入門卷之二上足太陽經之條中○云ト五節外一寸半主腰痛痔病○圖翼曰在第十五推下兩旁相去各二寸刺三分留六呼可灸△足太陽經第二行繫也脊ノ十五推ノ旁ニ在テ脊中ヲ去各二寸トハ入門一寸半トハ脊ヲ踰テ云也寸ハ兩乳頭ノ内間ヲ量テ折テ八寸トスル者ヲ用ユ

關元俞

出入門卷之二上足太陽經之條中○云十七節

聚諸疾○圖翼云在第十七推下兩旁相去各二寸刺三分

雷六呼可灸○主治之功同入門而風勞腰痛四字無△足

太陽經第二行ニ繫也脊ノ第十七推ノ旁ニ在テ脊中ヲ去各二寸トス入門ニ一寸半トハ脊ヲ除テ云也寸

右ト同ノ兩乳間八寸ノ法ヲ用ユ△按ニ任脈腹部ノ中行ニ氣海關元ノ二穴アリ太繫臍與十四推相對ス任脈氣海穴ハ臍下二寸五分ニ在故ニ氣海俞ハ十五推ノ兩旁ニ存ス任脈關元穴ハ臍下三寸ニ在故ニ關元俞ハ十五推ノ兩旁ニ在天腹背筋兩側著良以斷續乎兩相失

七推ノ兩旁ニ在天腹背筋兩側著良以斷續乎兩相失ノ穴俞アヒ對スル者缺出華外卷○十全翼云穴靈屬脾

夾脊穴

圖翼日肘後云此華佗法○千金翼云治霍亂轉筋令病者合面臥伸兩手著身以繩橫牽兩肘尖

當脊間繩下兩旁相去各一寸半所灸百壯無不差者△霍

亂ノ吐瀉スルガ故ニ津液燥テ多ハ轉筋俗云カラナリ。

或云コムラガエリ灸之法ハ病者ヲメ面ヲ席ニ合テ伏臥セレメ其両手ヲ伸テ腸脾ニ著テ風市ヲ取手ノ如ニレ繩

ヲ以テ其両肘ノ尖ノ通ヲ横ニ牽ヘリシテ繩ノ所當ノ脊

中ニ墨點此ハ灸穴非ズ其墨點ヨリ兩旁正相去各一寸

半ノ所ニ灸スルト百壯轉筋無不差者

也○初學者ノ爲ニ一圖ヲ著ア如左

出人門卷上引大醫經卷中○一千十子謂

量八部八十四新計四寸大藥十粒

次二藥脊少夫都與十四粒

新繩ヲビテ肘尖ノ通ヲ横ニ

牽一如此ニノ繩ノ當ル所ノ脊中ヲ開各一寸半

千金翼○正針十正針

「灸之」

「坐合テ臥ス

坐合中腰也

席上如此半十子大藥

亦人亦坐中腰也

夾脊之圖



右ノ法ヲ按ニ繩ノ當ル所ノ脊推ヲ量バ第十二推ヲ得
タリ此ヲ去ヲ一寸半ナルトキハ足太陽ノ第二行胃俞ニ
近シ胃俞ハ主筋脈攣急且霍亂轉筋ノ症ハ所屬專脾胃
ニ在テ多ハ中氣ノ虛トス然則右ノ夾脊ノ兩穴霍亂轉
筋ニ神効アル
ベキ必然也

下極俞

出千金翼○云第十五推名下極俞主腹中疾腰痛膀胱寒飲澼注下灸隨耳壯△脊ノ第十五推

節ノ下間ニ在テ灸壯ソノ年數ニ隨也飲澼ハ痰飲飲物ノ澼積ニ所生ノ痢疾也注下ハ泄濁也△按此督脉ノ穴ニ繫者也夫臍與十四推相對スルノ說アリト雖ビ詳ニ量バ臍八十四推ヨリ下テ太槻十五推ニ對ス然則下極俞ハ神闕ニ對太冬之ニテ中焦ヲ溫養ス故ニ腹中疾瀉痢等ヲ主治スル者歟△難經二十八難ニ下極之俞ト云十有卜雖正此ト不同也難經所謂ノ下極之俞ハ滑伯仁ハ爲會陰丁德用呂廣ハ長強八十又四十四難ニ下極爲龜門コレ皆千金ニ所謂ノ下極ニハ非ル也

十七推穴

出千金翼○云轉胞腰痛灸十七推五十壯

△第十七推節ノ下間ニ在テ轉胞ハ婦人產前ニ小便閉テ不通症也格致餘論ニ詳義アリ△此穴モ亦督脉ノ流ニ繫者也按ニ足太陽經第二行ヲ考ニ十八推ノ旁ニ小腸俞アリ十九推ノ旁ニ膀胱俞アルトキハ中行十七推ニ灸メ下焦小腸膀胱ノ間ヲ溫養メ水道ヲ

静枝

遺腰痛ヲ主
治セシムル者歟

灸腸風諸痔

出入門卷之二下。治病奇穴。○云。十匹推

推ノ下ラ各開一寸。左右二寸ノ開十ス。年深トハ病ヲ
患テ又年ナルヲ云△按。ニ此穴ハ實ニ奇俞也。足太陽經

第二行。腎俞ヲ内ニ去一寸ニ

所屬ノ經脈及本俞ヲ得ガタシ

回氣

出類經圖翼。○云。在脊窮骨上赤白肉下。五痔便

血失屎。

灸百壯。千金翼曰。灸窮骨惟多爲佳。

△窮骨

八尾。體骨即龜尾也。窮骨ノ尖。レ骨上ニ灸ス。失屎ノ大便

不覺。△漏者。○云。按。此亦督脈ノ流。一繫テ長強穴ニ近ル。

考。ニ凡。督脈脊中ノ諸穴ヲ取ニ。諸書皆骨節ノ下キ。

求ム張介賓獨不然。惟脊節ノ高牛所ヲ求テ點ス。前ノ脊

背五穴ニ。二推ノ高牛骨上ニ點穴スルト此。回氣俞ヲ窮

骨上ニ求ド。以テ察スルニ張氏カ脊ノ高所ヲ以テ推穴

トスル者七亦由來アル。○按スルニ此。謂赤白肉下。然

則疑ハ窮骨上ノ玉宇ハ下子ノ義ナラン缺

竹杖

出千金。○云。腰痛不得動者。念病人正立以竹杖拄

地度至髀。乃取杖度背脊灸。

杖頭盡處隨年壯良。丈

夫痔漏。下血脫肛。不食。長溲痢。婦人崩中。去血帶下。淋濁赤

白。皆灸之。△其人ヲノ正ク鍼立セシメ。長竹杖ヲ以テ地ヨ

リ其臍中ニテ。比ヘ合テ杖ヲ切。其竹杖ヲ以テ背ノ方ニ

立易テ地ヨリ立タル其竹杖頭ノ盡處ノ脊中ニ點ス△

此卽督脈十四推ノ命門穴也。臍與十四推相對スルノ說ヨリノ此穴法アリ然ニ十四推ハ臍ヨリ高ノ如此ニ點スルトキハ大槩十五推ノ下間ニ當ル者也。又按ニ此穴婦人下焦ノ諸病ヲ主治スト云ト雖尼此穴近余門、命門穴ハ年二十以上者灸恐絶子ノ戒アルトキハ竹杖穴モ亦妄ニ灸スベカラズ。

竹杖之圖



○又曰正俠兩傍各一寸攢三間寸灸之△竹杖ノ又一法也前法ノ如ニ竹杖ヲ以テ脊中ニ墨點ニ中指一寸ノ寸ヲ以テ其墨點ヲ横ニ開ヒ各一寸兩傍二寸ノ開ニノモ灸スル也三間寸十八中指中節ノ寸ヲ以テ三寸ニレタルヲ云也然則各一寸ノ下ニ半ノ字ヲ

瓶スル者欵此腎俞ヲ灸スルノ法也

騎竹馬穴

此穴出諸書未知其始○入門卷之二下治病奇穴曰騎竹馬穴專主癰疽發背腫毒瘡瘍瘰癧厲風諸風一切無名腫毒多之疎鴻心火先從男左女右臂腕中橫紋起用薄篾條量至中指齊內盡處截斷却令病人脫去上下衣裳以大竹杠一條跨定兩人徐徐扛起足要離地五寸許兩旁更以兩人扶定勿令動搖不穩却以前量

竹箋貼定竹杠豎起從尾骶骨貼脊量至箋盡處以墨點記此不却比病人同身寸箋二寸平招放前點墨上自中橫量兩旁各開一寸方是灸穴可灸三七壯極効○圖翼云騎竹馬灸法主治一切癰疽惡瘡發背婦人乳癰皆可治之量法用薄箋一條以男左女右手臂腕中自尺澤穴橫紋起比至中指端齊肉盡處截斷爲則却用竹杠一條令病者脫去上衣正身騎定使兩人前後扛起令病人脚不著地仍令一人扶之勿令偃仰搖動却將前所量箋從竹杠坐處尾骶骨下番杠比起貼脊直上至箋盡處點記之此是取中非灸穴也要用薄箋量手中指用同身寸法取定二寸平放於脊中畢點上各開一寸是穴一本作名灸_{開二寸}五七壯一日疽發灸左則灸右疽發右則灸左甚則左右皆灸蓋此一穴乃心脉所過之處凡癰疽皆心火雷滯之毒多此則心火流通而毒散矣起多固生之功屢試屢驗△取穴人法紙條テ以テ男子ハ左手女子ハ右手ノ肘守横紋ヨリ量テ中指ノ端ニ至元切次ニ病人ノ臂以上ノ衣ヲ去テ大竹上ニ跨騎レヌ兩人ヲノ竹ヲ扛起ソ病者ノ足ヲ去地ト五寸許ニス又兩人ヲノ病者ノ左右ヲ扶テ病ノ身ヲ正カラシメテ前ノ肘ヨリ中指ニテ所量ノ紙條ヲ以テ病人坐スル處ノ竹上ノ際尾骶骨ノ下ヨリ脊肉ニ貼テ引上シ紙條ノ盡ル處ノ脊中ニ墨點ズ是八灸穴ニ非ス次ニ別ノ紙條ヲ以テ病者ノ中指中節ノ一寸ヲ以テ二寸ヲ裏ヘ此ヲ右ノ脊中ノ墨點ニ横ニ加テ左右ニ灸點スルトキハ各開一寸ヲ得タリ各五七壯ヲ灸ス此穴ヨク心脉ノ火毒ヲ散シテ諸瘡ヲ治スルニ神效アリ

按ニ此穴大槩八九推ノ邊ノ左右ニ在。足太陽經第二行ノ内邊也然ニ入門及圓翼ニ心脉所過之處ニメ疎瀉心火ト云者ハ何以力然コラ辨セシ余未知之也考ニ此俞ヤ膚俞肝俞ニ近シ膈ハ上焦陽位ノ界際也肝ハ相火ノ藏タリ兩ナカラ陽氣ノ旺分火熱ノ動スル處タルカ故ニ諸瘡家灸之海陽疎火神效アルニ至者歟後ノ君子ノ詳攷ヲ待ノミ○鍼灸聚英曰依法量穴在督脈脊中至陽筋編穴中外太陽行脊二行鬲俞肝俞之内非正當也疑必後人傳訛以三寸爲二寸耳豈有不得正穴徒破好因而能愈病哉此不能無疑也△高武カ右ノ騎竹馬ノ法則ニヨリノ量取ニ紙條ノ盡處ハ督脈至陽推筋縮推ノ間ニアリテ兩旁ノ一穴ハ足太陽經第二行ノ鬲俞肝俞ノ内邊ニ在テ正穴ニ不當也豈正穴ニ不當ノ徒ニ好肉ヲ冬レ破テ病ノ愈ル理アランヤ後人傳々訛リテ三寸ヲ一寸トスルノミトヘ以ニ寸爲二寸トハ騎竹馬ノ法ニ同身寸ノニ寸ヲ以テ左右各開フ一寸ト所謂ノニ寸ハニ寸ノ訛トナリ同身寸ノニ寸ヲ以テ中ニテ折目ヲ定テ彼竹上ヨリ所ノ上ノ紙條盡ル處ニ横ニ加テニ寸ノ兩旁ニ點穴スルトキハ武氏疑テニ寸ハニ寸ノ訛トス尤深意アリ△按ニ高武氏カ攷モ背ノ第二行八脊中ヲ去フ各一寸半ノ說ニ從ノニ正ク考則ニ寸ハ四寸ノ訛ト云テ佳ナラニ泉

咳嗽灸法

出鍼灸聚英卷之五治例○二云以蒲當乳頭同

其人兩乳頭ノ正中ノ通ヲ横ニ周ク引圍テ前後紙條ノ
上下ナク正直ナラシメテ其紙條ノタル處ノ脊骨中ニ
灸點ス各五壯ヲ灸ス咳嗽二效アリ△按ニ如此ノ量ハ
脊ノ九推ニ當者アリ十推ニ當者アリ十一推ニ當者在
人ノ肥瘦二從テ不同也然則督脈ノ脊中中樞筋縮ノ位
也其十推ノ中樞ハ禁灸条詳審ニノ佳ナルベシ○初學者ノ
爲ニ一圖ヲ著ト如左

同泉七
乳頭ニ當テ繩ヲ圍引テ
脊中ニ灸點スルコト如左

咳嗽
灸

端々小沓着オフ用

灸穴



法之圖

小兒久癖

出鍼灸聚英卷之五治例。○云小兒癖氣久不
消。各章門各七壯。臍後脊中灸一七壯。○臍後

前後上下ナク正直ナラレメテ其繩ノ當ル處ノ脊骨ノ正
中一穴ヲ灸點ス。小兒塊癖久ク不退者章門ト俱ニ此俞
ヲ灸ス△按ニノノ肥瘦ニ從テ雖不同大槻脊十五椎ニ
當者ナリ經ハ督脈ノ流ニ属ス夫臍ハ神陽ノ根蒂。胃氣
ノ舍也故ニ臍後ニ灸ノ中焦ヲ温養シ營衛ヲノ流行セ
シメテ癖塊ヲ

消散スル者欽

小兒疳瘦

出鍼灸聚英卷之五治例。○云小兒疳瘦號
肛脾瘦渴飲形容瘦瘠諸方不差灸尾翠骨

上三寸脂中三壯兼三伏內用楊湯水浴之正午時灸自灸
之後用帛子拭見有疳蟲隨汗出此法神効△尾翠骨ハ龜
尾也寸八中指寸ヲ用ユ。其法其小兒ノ中指中節ノ寸ヲ
以テ三寸ヲ製ヘ尾翠骨ノ端ヨリ其寸繩ヲ上セテ寸ノ
盡ル處ノ脊骨脂ナル正中一穴ヲ灸點ス灸スルトニ三壯
也小兒ノ疳病百方不差者ニ神効アリ。凡小兒ニ疳症ノ
崩アル者ハ兼々三伏ノ間ニ此灸法ヲ行也三伏トハ五
月中夏至ノ後第三ノ庚日ヲ初伏トシ第四ノ庚日ヲ中
伏トシ第五ノ庚日ヲ末伏トス。三伏ノ間ニ楊柳皮ノ煎
湯ヲ以テ其小兒ヲ浴セシメテ日中午ノ時ニ於テ此灸ヲ
行也灸後ニ帛ヲ用テ兒身ヲ拭ヒ見バ小疳蟲汗ニ隨出
テ帛面ニ在此法神妙ノ効アリ△按ニ此俞ハ督脈ノ流

ニ繫リ二十推ノ邊ニ在テ所屬ノ正穴ナレ致ニ此地大腸膀胱ノ下邊ニメ濕熱汚濁ノ處也凡諸虫ハ濕熱汚濁

ニ生ス故ニ灸灼ノ火氣ニ

攻ラフレニテ、痒虫畏出者欵

冬勞穴

出資生經○云、夕勞其狀手足心熱盜汗精神困頓骨節疼寒。初發咳嗽漸吐膿血肌瘦面黃減食。

少力令身正直用草子男左女右自脚中指尖量過腳心下向_上至曲臍太紋處截斷却將此草自鼻尖量從頭正中發頭心髮量至脊以草盡處用墨點記別用草一條令病人自然貼肉量。

全口量闊狹截斷却將此草於墨上點上平搘兩頭盡處量穴灸時隨耳多灸一壯如三十灸三十累効△久辛勞瘵勞咳ノ主穴タリ其法病人ノ身軀ラノ正ク直ナラシノ。

紙條ヲ用テ病者ノ足下ニ蹠レメ足ノ中指ノ頭十齊ク

レ足跟ノ正中ニ引出テ因ニ貼テ引上ニ曲臍内横紋ノ

正中ニ至テ截止次ニ病人ノ髮ヲ解頭ノ正中ヲ露レテ

右ノ紙條ヲ以テ病者ノ鼻尖ト齊クノ引上ニ頃ニ垂テ

紙條ノ盡ル處ノ脊中ニ墨點ス是灸穴非ズ次ニ病者

ノ内ラメ自然ニ合サレメテ一ノ紙條ヲ用テ印ノ廣サ

ズ量コレラニニ折テ折目ニ墨メ直タラレ右ノ脊中黒

點ノ上ニ申折目ヲ重テ横ニ加ヘ紙條ノ盡ル處ノ左右

ニ灸點ス灸數ハ其人ノ年數ニ隨テ一壯ヲ加ル也假令

年三十者大レバ三ま一壯ヲ灸ス○鍼灸聚英ニ高武氏

曰依此量之其穴合五推兩旁三寸心俞二穴也豈心主血

故灸之歟△按此法崔氏力患門ノ二穴十大ニ同至小

ク異也。患門ハ足大指ヨリ量。口ハ鼻下ヨリ兩吻^ノ至テ
量ル。此ラ異トス△或問内經ニ所謂足中指ハ手ノ例ト
不同^{カラ}足ハ大指ノ次指ヲ以テ中指トス。右ノ法ニ所言タ
中指ハ何ヲカ用ヤ。曰、内經ニ足ハ大指ノ次指ヲ以テ中
指トスル者ハ。經文ニ足ハ次指ヲ以テ中指トフルノ明
文ナシ。今穴ヲ攷ニ足ハ中央指ニ經穴ナクメ冒經ソ厲
先内庭ノ穴皆大指ノ次指ニ在。故ニ註者從^テ之。内經ノ冒
經ニ所謂中指及刺足中指ノ辭ハ皆是。大指ノ次指ニメ
手ノ例十異ナリトス。夫古人ノ教ヲ垂ルヤ後人ノ惑^ハ十
カラニコラ欲スルノミ况^ハ奇俞ノ如キ後人ノ點穴ニ不明者
ノ爲ニ種々ノ奇法ヲ出セル也。故ニ中指ト云^ハ則手足俱
ニ申英指タル下ハ世人ノ通ノ所知ニメ足ハ次指ヲ以

中指トスル者ハ經穴ニ委者ニ非レバ所不知タレバ何
ソ奇俞ノ撻法ヲ示ニ於テ世人通知セガル所ノ中指ヲ
言ヤ明^カニ大指次指十言ベレ然^ハ則此中指ハ手ノ例十同
中央指ナルベキ也。内經ニ所謂ノ足中指モ一槩ニ次指ヲ
以テ決レ難レ

別ニ口授アリ

灸哮

出神應經諸般積聚部又鍼灸聚英卷之五〇云、背
上有穴量穴須用線一條環頸垂下至鴟尾尖上
截斷牽脊背線頭盡處是穴端灸至七壯真爲貴△紙條ヲ
用テ其人ノ項ニ懸テ肩ヲ傳テ胸ニ垂下^タレ兩頭ソロ呈テ
鴟尾骨ノ尖ニ至^リ截止メ此紙條翻テ頤ノ下^タニ懸テ
肩ヲ傳テ背ニ垂^タ下^タレ兩頭ソロ呈テ紙條ノ盡ル處ノ脊中

灸ス△按ニ此法ニ依ハ鳩尾骨ノ尖ヲ以テ則トス
然モ鳩尾骨高メ胸肋ノ内ニ隱テ不見者アリ故ニ胸前
肺骨ノ岐タナル處ヨリ量テ膀中ニ至マノ長サ取テ此ヲ
八指ノメ八寸ヲトレ此寸ヲ用テ右ニ量テ胸前岐骨ヨリ
下ト五分ヲ以テ鳩尾ノ尖トス此靈樞甲し經ニ從テ鳩
尾骨ヲ定ノ法也△按ニ此穴脊ノ第九推督脉筋縮穴上
近シ△或問哮ノ病ハ何如日喘息ノ聲甚キ者聲
水鷄ノ如ク牛ノ吼ホガ如ナ者ヲ哮吼ト云ナリ

中風不語

出神應經○ニ療中風眼戴及不能語者灸第

一推並五推上各七壯同灸炷如半棗核大△
眼戴トハ黑眼中央ニ定リテ上胞ニ懸カテ不動者ヲ云フ灸之

法脊ノ第二推上第五推トノ脊骨高處ニ灸斯故ニ推上

ト云各七壯一穴同時ニ灸斯灸炷ノ大サ枣核ノ半分ニ
準ス△按ニ督脉ノ陶道神道ノニ穴ニ近シ陶道神道ハ
悲愁健忘恍惚等ヲ主テ上焦ノ陽道ヲ發生斯故

二右ノ灸法能中風ノ眼戴不能語者ヲ療スル歟

厥逆

出類經圖翼卷之十二○治中風厥逆日以繩圍男

盡處是穴灸二十一壯△繩ヲ以テ病者ノ臂腕横紋ノ處
ヲ引圍テ其大ヲ量取テ此繩ヲ脊ノ大推ヨリ骨ニ著テ
下シ垂テ繩ノ盡ル處ノ脊中ニ灸點斯△按ニ人ノ臂腕
ニ肥瘦ノ別アリテ此法モ不準太槻脊ノ五六推ニ當ル
督脈神道靈臺ノ二穴ニ近シ俱

ニ陽分ヲ開發スル處タレバ也

積聚痞塊

出類經圖翼卷之十一〇云，久病，灸脊中，命

門穴兩旁各四指許，是穴痞在左，灸右，在右

灸左△脊中第十四椎下，命門穴ノ旁ニ醫工ノ指ヲ四

指許，豎ニ隔テ灸ス。按ニ太熙足大陽經第二行志室穴ニ

當レリ然ニ醫工ノ指ニ

肥瘦アリ此モ亦不準也

圖翼曰一法曰凡治痞者須治痞根無不獲效其法於十二推

下當脊中點墨爲記墨之兩旁各開三寸半以指揣摸自有

動處即點穴灸之大約穴與膚平多灸左邊或左右俱灸此

痞根也或患左灸右患右灸左亦效△此卷首ニ所舉ノ入

門ノ痞根穴也但入門ト小ク辭ノ不同アリ且入門ニ以

指揣摸自有動處八字ナレ故ニ雖如重複附之以備參攷云

鍼灸阿是要穴卷之二

洛下 法橋 岡本爲竹一抱子 撰

門人 長州 萩 熊谷順安竹隱

同校

防州熊毛 末兼原端向榮

傳戾癆

出圖翼〇云第一代蟲傷心宜灸心俞穴並上下

如四華樣〇第二代灸肺俞四穴如前〇第三代

灸肝俞四穴如前〇第四代灸厥陰俞四穴如前〇第五代

灸腎俞四穴如前〇第六代灸三焦俞四穴如前〇此證五

日輕五日重輕日其蟲大醉方可灸△瘻瘵傳戾病ハ内ニ

惡蟲ヲ生化ノ次第二代々ニ傳テ家門ヲ滅ス此ニ灸ス

ルノ法。第一代ハ蟲傷心藏故ニ心俞上下四穴ニ灸ス上
下四穴トハ脊ノ第四推ノ下ノ脊中ニ墨點シ是穴ニ
非ス 乳ノ間八寸ノ法ヲ以テ四寸ヲ製ヘテ其ヲ兩ニ折テ折
目ニ墨合ノ直タメナラシ其中ノ折目ヲ脊中ノ墨點ニ加テ
上下左右四處ニ四穴ヲ灸スル」如此、

○ 上下左右ノ間皆四寸ツ也以下ノ穴法皆如
此、兩乳八寸ノ法ハ兩乳頭ノ内廉ノ長ヲ

量テハツニ折テ八寸トス○第二代ニ肝俞上下左右四
穴ヲ灸ス○第三代ニ肝俞上下左右四穴ニ灸ス○第四
代ニ肝俞上下左右四穴ニ灸ス○第五代ニ腎俞上下
左右四穴ヲ灸ス○第六代ニ三焦俞上下左右四穴ニ灸
ス○右皆兩乳八寸ノ法ヲ以テ前ノ第一代ノ灸法ノ如
ニス○傳屍病ノ證ハ作止アリテ五日ハ重ク五日ハ輕
シ其輕日ニ於テ右ノ灸ヲ致ス○圖翼ニ又曰取癆蟲可
於三椎骨上一穴竝膏肓二穴各灸七壯△ニ推ノ脊骨高
處ニ灸スル也此ニ膏肓二穴ヲ相兼テ灸スル癆蟲ヲ生
スル所以ハ心陽不足ノ濕ヲ生レ腎陰不足ノ熱ヲ生レ
濕熱濁惡ノ氣ヨリ痰ト瘀血トヲ薰蒸シ爲虫寢シ蟲形
ヲナス其形ハ情志ノ凝結スル所ニ因テ種々ノ異形異
色ヲナス故ニ王堂氏曰傳尸癆瘵皆心受病氣結血凝故
有成虫者蓋由飲食酒色憂思喪真遂至於此凡血爲蟲以
血凝而氣養之氣血在胞即爲正氣氣中即爲瘕塊凝在心
部即爲虫悉由不正其心憂恚業緣所致三尸九虫之爲害
治者不可不知其詳九虫之内而六虫傳於六代三虫不傳

者、謂蟲、蛔蟲寸白蟲也。六蟲之內或五藏種毒而生、或親屬習染而傳。云又曰太低六蟲一旬之中遍行四穴周而復始。病經遇木氣而生。立春一日後方食起三日一食五日一退方其餘盡百脉有痛痛蟲之食也。退卽還穴醉睡一醉五日其病全靜。俟其退醉之時乃可投符用藥。云按此四穴八卦右ノ卦下左右ノ四穴也。初學者ノ爲ニ萬可久力十藥神書之所附。六傳。

六蟲ノ形ヲ著。一如左。
此虫形如嬰兒背上毛長。三寸在人身。
此虫形如蠍鬼狀變動。在人府中。
此虫形如蟬。暮變動在人藏府中。
此虫形如蝦。藏府中。
此虫形如蟻。在人藏府中。
此虫形如刺。謂在人腹中。
此虫形如蠅。片在人藏府中。

第一代



此虫形如嬰兒背上毛長。三寸在人身。




此虫形如蟬。暮變動在人府中。




此虫形如蟬。暮變動在人藏府中。


第二代



此虫形如亂髮，長三寸許。



此虫形如蟻。




此虫形如刺。

謂在人腹中。


第三代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第四代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第五代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第六代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第七代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第八代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第九代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第十代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第十一代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第十二代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第十三代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第十四代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第十五代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第十六代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第十七代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第十八代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第十九代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第二十代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第二十一代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第二十二代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第二十三代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第二十四代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第二十五代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第二十六代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第二十七代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第二十八代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。




此虫形如刺。謂在人腹中。


第二十九代



此虫形如蠅。片在人藏府中。




此虫形如蟻。片在人藏府中。



此虫形如刺。謂在人腹中。

第


代
亂絲在人腹藏中



此虫形如




此虫形如



此虫形如



第五代

日其蟲遇巳巳日食起醉歸脾俞穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉方可醫救取蟲出後補肝爲瘥



第六代


日其蟲遇壬癸日食起醉歸肝俞穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉方可醫救取蟲出後補肝乃瘥



本六十



此虫形如爛麪或長或短如飛蝠



此虫形如爛麪或長或短如飛蝠

灸血病

與臍相平須按脊骨高突之處覺痠疼者是穴

日其蟲遇丑亥日食起醉歸腎俞穴中四穴輪轉周而復始俟蟲大醉可醫救取蟲後補腎填精瘥○曰此代蟲有翅足全者千里傳疰所謂飛尸不以常法治也△前ノ灸傳厥療法二八第一代心俞第二代肺俞第三代肝俞第四代心包俞第五代腎俞第六代三焦俞卜ス右ノ玉堂氏ガ如ハ第一代心俞第二代肺俞第三代厥陰穴第四代脾俞第五代肝俞第六代腎俞卜ス不同也

出圖翼○云大便下血諸治不效者取脊骨中

方可於上灸之不疼者非也。七壯卽止。如再發既再灸之。不再發。○又云一法於脊中第二十椎下隨年壯灸之。△一ノ繩ヲ以テ臍ノ正中ノ通ヲ引圍メ其繩ノ當ル處ノ脊中。高キ處ニ灸點ス。此ヲ按ニ瘦レ疼テ能應ル下ヲ覺者是。ヨク穴ニ適テ效アリ若按テモ不疼不應處ハ不宜。故ニ繩ノ當ル處ヨリ少ク上下ストモ惟ヨク疼應ル處ニ灸點ス。△按ニ此大槻督脈ノ命門懸樞ノ兩穴ニ近シ腎ハ精血ノ室タル故ニ此灸ヨク血病ヲ治者歟。△一法二十推ノ下ニ灸スル者モ亦督脈ノ流ニシテ腰俞ノ上ニマリトス。

本穴ナシ

疝氣

出入門一卷之下治病奇穴。○云今病者合口以草橫量兩口角爲一摺照此再加二摺其爲三摺而成立肉加様以上角安臍中心兩角安臍下兩旁當兩角處是穴左患多右右患多左左右俱患卽兩穴俱灸艾炷如麥粒灸十四壯或二十六壯卽安△病者自二口ヲ合テノノ繩ヲ用テ横ニ兩口吻ノ廣ヲ量取テ此長ニ比ヘテ二摺取テ總テ三摺ヲ以テ三肉ニ折並テ△如此二作ル也

此間モロノ廣ノ寸也

此間モロノ廣ノ寸也口ノ

廣ニ比ベテ總テ三摺トリ用テ如レ其上ノ一角ヲ以病者ノ臍ノ正中ニ當ルトキハ臍下ニ兩角垂下ル其兩角ノ左右ニ灸點ス

○此穴太隕足陽明經足少陰腎經兩經ノ間ニ繫ル
竅ハ足三陰經ニ屬メ主病者ハ厥陰肝經也腎

經ヲ灸者ハ難經七十五難ノ母ヨリ子ヲメ虛セレム北

方ヲ補ノ義也肝邪亢レバ脾土得尅テ不足ス故ニ脾經亦灸スベレ良ニ此灸

痴病ニ效ル過トセス

長谷

出千金○在夾脇相去五寸一名循際主治下痢不
嗜食食不消灸五十壯三報之△按此モ中指寸
ナルベレ下同脇ヲ夾テ左右ノ相去ト五寸各二寸半ニ在
是足大陰脾經足陽明胃經兩穴ノ間ニ繫トキハ下痢等
ノ病ヲ主治スベレ△三報之上再取其氣三壯無妨
ハ灸ヲ三度下テ致レ歸スラ云

腸遺

出千金○云腋中極旁相去二寸半治大便灸隨年
壯△中極ハ任脉ノ本穴脇下四寸ニ在也其旁左
右相去一二寸半各一寸七分五厘トス胃經ノ水道穴ノ
内邊腎經ノ大赫穴ノ外邊ニ在トキハ大便ノ病ヲ主治
スベレ蓋腸ハ胃ト下

焦トニ屬スレバ也

肓募

出千金○云肓募ニ穴以乳頭斜度至脇中乃屈
去其半從乳下量至盡處是穴主治結氣囊蟲鍼藥
所不及者灸隨年壯△ノ繩ヲ用テ左ニテモ右ニテモ
乳頭ヨリ引テ斜ニ臍中ニ至テ斷止其繩ヲ一一折テ半
分ヲ斷棄半分ヲ用テ乳頭ヨリ下レ垂テ乳頭ノ盡處ニ
灸點ス左右二穴也此灸ハ一切鍼藥所不及ノ病ニ用ユ

△按ニ此穴ハ太繫乳根及腹哀穴ニ近レ其主治ノ理未考初學者ノ爲ニ一圖ヲ發スルコト如左

募肓末

△其穴ヲ點スルコト如此乳頭麻費蓋ニ鍼摩出子ヨリ所量ノ穴ヲ用テ半ラ去捨半ラ用テ乳頭ヨリ直ニ下レテ繩ハ盡し

△處ニ灸點スル也繩ハ環

△繩ヲ用テ准ナリトス

俞前

△スヲ量コト如此ニ乳頭ヨリ斜ニ勝中マテ取兩旁

者也

圖



通谷

出千金。○云，在乳下一寸，心痛惡氣上，腸痛急，灸五
十壯。△乳頭ノ下各一寸ヲ灸ス。此穴ヲ按ニ太槻

足陽明胃經ノ乳根穴ニ近シ故ニ心腸ノ痛ヲ主治スル
欵△按ニ足少陰腎經ノ腹部ニ於テ通谷穴アリト雖曰
名ハ同メ

此上異也

冤舍

出千金。○在夾脇兩邊，相去一寸，主小腸洩瀆膿血。
灸百壯，小兒減之。△脇ノ旁ヲ夾ム一寸，左右各
五分ニ在也。按ニ足少陰腎經ノ腹部ヲ考ニ內經ニハ中
行任脈ヲ去ニ各五分ヲ流トス資生經十四經發揮ニハ
中行ヲ去ニ各一寸半トス然則此穴モ脇ノ兩旁各五分
左右ノ間，相去一寸ナルトキハ內經ニ所謂ノ腎經ノ

風ニ屬レテ卽言

肋頭

出千金翼。○云治痕癬，患左灸左，患右灸右。第一節

肋頭近第二肋下，卽是灸處。第二肋頭近第三肋下，

向肉翅前亦是灸處。初日灸三壯，次日五壯，後七壯周而復始，至十一止。惟忌大蒜，餘不忌。△穴ヲ取ノ法，脇下背ニ近キ

屈肋骨ヲ摸テ第一肋十二者ハ胸ヨリ數ルトキハ十二
肋也。第二肋ハ第十一肋也。第三肋ハ第十肋也。一肋二肋

三肋トハ脇背ヨリ摸アリ。下ヨリ數テ言者也。第一肋ノ頭，
第二肋ノ下ヲ灸處トス此正ニ足厥陰肝經ノ章門穴ニ

當レリ又第二肋ノ頭，第三肋ノ下毛亦是灸處トス然凡此穴ノ正當未考也。灸之者八初日ニハ三壯次日ハ五壯。

其後ハ七壯ノハ復始ニ歸テ初日二壯。次日五壯。後ニ壯
姪此ニ十日灸メ止也。初學者ノ爲ニ一圖ヲ出ス。

背



○第一肋ノ頭、第二肋ノ下ヲ各一穴トス。
○二穴俱ニ陽部ノ俞也。肝膽ノ二
經ニ繫ヘシ。口渴一千八十二

○按ニ人ノ胸肋十二骨アリ然ニ女子ハ擊夫骨ニ肋ヲ
加テ十四肋アリ故ニ右ノ穴法モ亦女子ノ如^若ハ摸テ擊

夫骨ニ肋ヲ除去テ求ベ彼

章門京門ヲ取ノ如^若スペシ

乳上穴

出于金翼○云治乳癰如乳以繩橫度口以度從
乳上行灸度頭ニ七壯△繩ヲ用テ其人ノ口吻

廣ノ度取テ其繩ノ乳頭ヨリ上行セシメテ繩ノ盡處ニ
灸點ス太痏足陽明胃經ノ膺窓穴ニ近シ胃經ハ乳ノ内
廉ヲ流ガ故ニ乳病ヲ主治スル欵

婦乳乳房腫痛ス云俗チバレモノ也

龍領

出千金翼○云在鴟尾上寸半主心痛冷氣上多

頭トス然則鴟尾ノ上一寸半ナルトキハ岐骨ノ下五分ノ
處ヨリ上行スルノ丁寸半ニ灸點ス此任脉ノ流繫テ太
痏中庭穴

ニ近者矣

肋鍼

出千金翼○云治飛尸諸注以繩度瘻者兩乳間中屈之乃從乳頭向外量使當肋鍼於繩頭盡處是穴灸

隨耳壯又云五壯或七壯男左女右△繩ヲ用テ病者ノ兩乳頭ノ廣ヲ量テ其繩ヲ兩ニ折屈テ乳頭ヨリ當ア乳後ニ向テ繩頭盡處ノ肋骨ノ罅ニ當テ灸ス此療瘵傳尸病ノ灸治也△按ニ右ノ法ハ兩乳頭ノ尺ヲ以テ兩ニ折テ半ヲ去者也太極心包經天池穴ノ後膽經淵腋竅筋穴ノ邊ニ近レ○或曰兩乳頭ノ間ヲ量繩ヲ用テ兩ニ折屈テ如「」シ其ヲ乳頭ヨリ後ニ向下テ盡處ヲ穴トスナ然カ否ヤ

乳後一灸穴 两乳ノ繩兩ニ折或說ニ兩乳間ノ繩ヲ 灸穴 或說ニ兩乳間ノ繩ヲ 折屈テ穴ノ點スルト

灸傳尸

太出子金龜 ○云凡中尸者飛戶遁戶風戶尸注也

其狀皆腹脹痛急不傳息氣上衝心胸兩脇或遇其壯數愈八兩乳頭ノ後各三寸ニ灸スルトキハ膽經輒勝起或牽引腰脊多乳後三寸男左女右可二十七壯如不止多其壯數愈八兩乳頭ノ後各三寸ニ灸スルトキハ膽經輒筋穴ニ近レ○按膽經ハ風木ニ屬ス凡灸ノ生スル木氣ノ化ニ遇テ生ス故ニ王堂氏が療瘵六灸ヲ論ノ曰病經遇本氣而生十風字从虫者モ諸虫ハ風木ノ化ニ從ラシムナ生是以傳尸療瘧ノ灸治多ハ腸側肝膽ニ經ノ分ニ在者ニ脊ハ曲強、鬱鬚前斜背ニ古其背炎、曲刺竅及

腸堂

嵐明堂灸經○云腋下ニ肋骨間陷中舉腋取之主

手少陰心經居極泉穴ハ曲腋ノ中央也在也此穴ハ手臂ヲ舉テ極泉曰リ按腋下ニ二肋ノ骨陷凡甲ヲ納バ

力明，在也。此，モ亦心經心包經ニ繫者也。故に胸膈ノ氣滯，目黃等ヲ主治スル者歟。此穴ハ毛督

後腋下穴

出千金。○云，沿頸漏，灸背後兩邊腋下後文頭隨年壯△頸漏ハ今ノ所謂氣腫也。一日頸二

生スル癰癧漏也。上名之法ハ病者ノ兩手臂ヲ下シ垂テ腸ニ著ヘ曲腋ノ横紋前後胸背ニ在其背後ノ曲腋橫紋，頭，灸點ス此穴ソノ所繫ノ經穴ノ正當未考之。○初學者ノ爲，一圖ヲ發スルコト如左。○或曰，此ノ穴八手ノ大陽小腸經ノ肩貞穴ニ近レト充是ナリト云。

曲腋橫紋頭此灸穴



腋下穴

出千金翼○云、臟噫膈中氣閉塞、腋下聚毛下。

附、肋、宛、穴、

中五十壯、神良△取穴ノ法、曲腋下ノ

聚毛ノ下、脇ノ肋骨ノ陷ナル中也、右ノ脇堂穴ノ

稍下ニアリテ亦手少陰厥陰ノ兩經ニ近シトス

胞門

出千金翼○云、子藏門塞不受精、姪娠不成若、墮胎

腹痛漏胞見赤経、胞門五十壯、關元左邊二寸是也、△關元ハ任脈ノ本穴、臍下三寸ニ在、關元ノ左ノ旁ヲ去

一寸ヲ胞門穴トス、經ハ胃經ニ屬ノ太巨水道兩穴ノ間一當レリ。按、二關元穴ハ胞宮中ニ當ル故ニ主治如、此ノ效アル、欲子藏ハ女人ノ子宮ヲ云○又曰若、胞衣不出及子久、腹中或腹中積、聚皆鍼入胞門一寸

子戶

出千金翼○主治ノノ效、右十同し、關門、膚門

門、膚門、命門、命門

氣門

出千金翼○云、胎孕不成、氣門穴、在關元旁、三寸、各五十壯○又漏胎下血不禁、灸百壯、△漏胎ハ婦人孕中ニ血液ノ漏下、云、關元ノ旁、三寸トハ各、壯也

是玉亦陽明胃ノ經穴ニ近シ○按、二關元ハ胞宮ノ正中ニ當テ、下元ノ地久故ニ直、ニ此ニ灸灼スルヲ恐テ其旁、或二寸、或三寸ニ灸シ下元ヲ温養シテ精血ヲ持チ胞門ヲ守ラレムル者、欲當穴未考、又自前半ヘ自元而後

身交

出千金翼○云、在少腹下、橫文中、當膕孔直下、白筋

中、灸百壯、及治胞落癩、須三報之、又治大小便不通、

胞門ヲ守ラレムル者、欲當穴未考、又自前半ヘ自元而後

又治尿牀者可灸。士壯△臍上ヲ大腹トレ臍下ヲ小腹トス。少腹臍下ノ横紋臍孔少直ニ下ニ當ル是穴也。任脉ノ流ニ繫テ正當ノ穴未考之。白崩中ノ白

帶下也。尿牀トハ不覺メ尿タル、者ヲ云

闌門

出圖翼○云、在陰莖根兩旁各開二寸。是穴鍼一寸半。灸二十七壯。治木腎偏墜△陰莖ノ左右各開。相三寸。兩腿シイナノ横紋中也。木腎ハ陰莖強直ニソ不緩。ア云

偏墜ハ陰囊偏ニ大小アルヲ云。俱ニ肝疝ノ症也。闌門ノ二穴ハ足厥陰肝經ノ流也。血不無多百脉△散也ハ。

ナリ故其效如此者歟

癩疝偏大

出圖翼○云、一法於關元兩旁相去各三寸。青脈上灸二十七壯即愈△按、前門所謂ノ氣門、俞

十同メ彼ニハ青脈ノ二字ナレ人ノ臍邊ラ見ニ青脈ナレ痴氣ヲ病者ハ臍邊ニ青脈ヲ露スナルベニ。癩疝偏墜俱

二陰囊腫大

ナル痴氣病也

子官子戶

婦人出圖翼○云、關元旁各開三寸。左子官右子戶主治療瘕。△按、二前記ス千金翼ノ關元ノ

旁三寸氣門穴ト

祖同レ互ニ考ヘン

出圖翼○臍下二寸三分灸三壯、或至七々壯。卽終身絶孕。

此任脉ノ流ニ屬メ關元。石門兩穴ノ間

ニ當レリ石門穴ハ婦人禁刺矣。犯之終身絕孕ト然也。關元ニ灸シ胎孕ヲナスノ治アルトキハ臍下二寸三分。關元ノ

上五分石門ノ下五分ニ灸ノ絶孕ノ理愚未考之後學ノ發明ヲ俟ミ

ノ理愚未考之後學ノ發明ヲ俟ミ

灸腋氣

出圖翼○凡腋氣先用快刀剝去腋毛淨乃用好

必有孔如鍼大或如簪尖卽氣竅也用艾炷如米大者灸之三四壯愈永不再發△腋氣アル者ハ先刀剝ヲ用テ腋毛ヲ剝去テ淨クシ好定粉ヲ水ニ調テ腋下ニ擦フ六七日ノ後腋下ヲ看バ黒色ナル一點アリテ其一點中ニ小孔

アリ是腋氣ヲ發スル竅也卽米粒ノ大ナル艾ヲ用テ其小孔ノ上ニ灸スルト三四壯ス永不發也○按ニ此手少陰心經ノ極泉穴ニ當レリ考ニ凡物ノ香氣ヲ發スル火

ニメ然リ奇南香沉香檀香ノ如モ皆火ニ因テ香氣ヲ薰

故ニ心火ノ經ラ傳テ臭氣ヲノ腋下ニ薰發セシム其本ハ濕熱ノ鬱燠ニ生ス是以夏月ニ腋氣ヲ強レ及形ヲ勞動レ或情志ノ氣動アル時ハ必其臭ヲ逼スル者ハ悉心火ノ熱動ヨリ薰

スルガ故ナル欬脉本穴ニ五當十灸皆起

灸嗽

出千金○云灸者灸兩乳下黑白際各數十壯卽差

△乳頭ノ四邊ハ少黑色也乳下黑白ノ廉際ニ於灸點スルト如此

灸逆

出鍼灸聚英○嚴氏曰灸乳下一指男左女右與乳相直間陷中灸三壯△乳頭下ニ醫工ノ一指ヲ横

胃經ノ乳根穴ニ近シ

日灸十丁

欬逆

甚者灸二七壯△婦人ノ乳房大ニノ垂者其乳頭

ヲ按屈折テ下ニ向レメ乳頭ノ中リ盡ル處ニ灸點ス此

法ヲ鍼灸聚英ニ舉テ曰武按此穴名乳根也ト胃經ノ乳

下一寸六分乳根ノ本穴ニ正當トスル者欬逆也古經ニ所謂ハ皆欬嗽俗云セキ也後世ニ所謂ハ悉ニヤクリ

トス此欬逆モ亦皆ニヤクリトス内經ニ謂嘯也靈樞曰問

篇ニ嘯ハ胃寒生スルノ問答マルトキハ胃經ノ穴ニ

灸メ效ア

ルベキ者欬

顎門不_合

出神應經○云臍上臍下各五分一穴灸三壯

灸未發顎門先合△臍ノ上五分一穴臍ノ下

五分一穴合メニ穴ニ各三壯ラ灸ニ此任脉ノ經ニ屬メ

水分メ下陰爻ノ上ニ在テ神闕ヲ挾メリ神闕ハ小兒母

腹中ニ在人時血氣其胞衣ニ浸潤ノ臍帶ニ通ニ神闕ニ

透テ兒胎ヲ長養スル處ノ先天外部ノ中焦也任脉ハ衝

脈十俱ニ十二經ノ血海タリ小兒ノ稟質怯弱ニメ血氣

不足スル者ハ體脳難長メ顎門又ク不_合ヲ致ス故ニ

任脉ラ灸メ衝任ノ經血ヲ溫潤シ臍ノ上下ニ近ク灸メ

中焦ヲ温養スルトキハ經脈ヨク流レ胃氣ヨク生發メ體

脣充筋骨健ニ長シテ顎

門合閉ノ神效アル者欬

膀胱氣

出神應經。○云膀胱氣攻。兩脇脅下。陰腎入腹。各

右多左。△膀胱ノ病氣ハ腸ヨリ臍下ニ攻。痛。陰莖縮リテ

腹中。卫入トスル者也。灸法雖如右愚按。二膀ヨリ橫骨ニ

至ノ寸。靈樞骨度篇。二六寸半ト言ト雖正。甲乙經ノ臍下

任脉ノ穴ヲ考。則明。二穴法ハ臍ヨリ橫骨ニ至テ五寸也。

然則此多法モ亦五寸ノ法ヲ以スル者歟。五寸ノ法以テ六

寸ニ求。則六寸ノ盡ル處。陰莖中。在テ左右ノ旁。ヲ求メ

得カタレ。若ハ六寸半トノ求。則任脉中極ノ穴ノ下邊ノ

旁。腎經。近半ニ在也。由テ考。ニ前ニ辨スル如ク奇俞ノ

法。多ハ中指寸ヲ用ユ。此モ亦中指寸ヲ以テ量者ナルベ。

余中指寸ヲ以テ。臍下六寸ヲ量。見ニ寸ノ盡ル處。陰莖ノ

根際。在テ此ガ旁。各一寸ニ求。則兩服ニ近ク足厥陰

肝經ノ道ト云ベキニ似タリ。諸疝ハ足厥陰ノ主病タレバ也。

素問氣府論曰。厥陰毛中急脈各。○王永欽注。日

心脉。在陰毛中。陰上兩旁相去同身寸之二寸半。按之隱

痛甚。爲痛。爲少腹急中寒。此兩脉皆厥陰之大絡通行。其中

故曰厥陰急脈。卽畢之系也。可灸而不可刺。病疝小腹痛者。

即可灸之。○圖翼曰。按此穴自甲乙經以下諸書皆無是遺

誤也。經脉竊曰。足厥陰循股陰入毛中過陰器。又曰其別者。

循脰上。塞結於莖。然此實厥陰之正脉。而會於陽明者也。今

增入之。△急脈ノ二穴ハ足厥陰肝經ノ正穴也。陰毛ノ中。

前陰ノ上際ノ旁。中行任脉ヲ去。各五寸半。陰股ツケ子ニ

在也此本奇俞ニ非ズ足厥陰經ノ本穴タリト雖仄用乙經以下十四經發揮等ニ此穴ヲ不載故ニ世人多ハ此穴アルヲ知者ナキ

ラ以テ今出之ノニ

腹中氣塊

出神應經等諸書○神應經曰塊頭上一穴針二寸半。灸二七壯。塊中一穴針一二寸。灸三七壯。塊尾一穴針三寸半。灸七壯○鍼灸聚英曰腹中氣塊穴頭鍼二寸半。灸二七焚。塊中一穴鍼三寸灸之二十七。塊猶存塊尾一穴鍼三寸。灸至二七壯。塊漸分○類經圖翼曰長桑君鍼。積塊癥瘕先於塊上鍼之甚者。又於塊首一鍼。塊尾一下鍼。鍼訖立應△腹中塊積難分者。ハ其經絡孔穴ヲ不問直ニ塊聚ノ正中ニ鍼レ鍼ノ未解者八灸之二十七壯也。

塊猶存セハ直ニ塊頭塊尾ニ鍼ノ後ニ灸ス。塊必自消散ス。此定レ奇俞ニ非レ。雖正亦阿是ノ屬類ニノ。諸書ニ多載テ神效アリトス

故ニ今載之ト云

橫骨

出千金翼○日婦人遺尿不知時出。灸橫骨當陰門。七壯△陰毛ノ中。陰門ノ上頭。橫骨中ニ七壯ヲ灸ス。此任脈ノ流也○按ニ足少陰腎經ノ腹部ニ横骨穴アリト雖此ト不同也

斯此任脈ノ流也○按ニ足少陰腎經ノ腹部ニ横骨穴アリト雖此ト不同也

亦足厥陰肝經ノ流ニ繫。モ

癩疔

出圖翼○治癩疔在橫骨兩旁夾莖灸之△陰毛ノ中。橫骨ノ兩旁。陰毛ヲ夾テ筋骨陷中ニ灸ス。此モ

泉陰

出千金翼。○云，在橫骨旁二寸。治癩，卯偏大。灸百壯。
三報之。△橫骨ノ旁。中行ヲ去一寸缺。此穴法未

得正當。後ノ君子ノ考ヲ俟ノミ。按ニ旁ノ

字ノ下ニ於テ文字ヲ缺失スルニ似タリ。

陰囊下橫文

出千金翼。○云，治風氣眼反口噤。腹中切
痛灸。陰囊下第一橫紋理。灸十四壯。△男子陰

囊ノ下根。第一ノ橫紋理。灸斯此モ亦在
脉ノ別絡ニ繫テ會陰穴ノ前邊ニアル也。

卒癩病

出千金翼。○云，治卒癩病。灸陰莖上宛々中三壯。
得小便通即瘥。當尿孔上是穴。△按ニ此穴法余

未得正當。陰莖ツケ根ノ上際ヲ言ガ如ニノ又。尿孔上ト
言則馬知ノ上際ヲ指ニ似テ難穴也。然ニ千金。注曰。灸

陰莖頭三壯。十言則右ノ法モ馬口ノ上際ニノ
此一法ハ直ニ龜頭尿孔ノ處ニ灸者ニ似タリ。

羊矢

出圖翼。○在會陰旁三寸。股內橫文中。按皮肉間有
核如羊矢可刺三分灸七壯。△羊矢ハ鼠鼷也。馬氏

曰鼠鼷橫骨盡處ト股内ノ付根ノ橫紋。陰毛ノ際。按テ見
レバ稟核ノ如クレック者アリテ三許連續メ諭バ羊ノ矢
ノ如ナリ。横骨ノ左右盡ル處ニ在テ灸點ス。按ニ羊矢ハ
前陰ノ左右。横骨ノ兩端ニ在則會陰穴ヨリモ稍上ノ左
右ニ當しリ。然ニ會陰旁三寸ト云者未詳也。又按ニ羊矢
ハ足陽明胃經ノ氣衝穴ノ邊ニ近レ甲乙經ニ氣衝灸之
不幸使入不得息。一云禁不可刺。十
然則羊矢俞モ亦詳審ニノ可行也。

前神聰

出圖翼。○去前頂五分自神庭至此穴共四寸。主治中風風癇。灸三壯。△前頂神庭ハ俱ニ督脈ノ

本穴。前頂ハ神庭ノ後二寸。前髮際ヲ入ヲ三寸五分十ス。神庭ハ前髮際ヲ入ヲ五分。前頂ノ前三寸也。前神聰俞ヲ前頂ノ後五分ニ點則神庭至後此穴共四寸トハ五分ノ有餘アリ。然ニ右ニ謂自神庭至後此穴共四寸トハ五分ノ有餘アリテ不合也。四寸ハ三寸五分ニ改テ佳ナルベシ。冗奇俞ノ折量多ハ中指寸ヲ用ト雖凡頭髮ノ覆所ノ諸穴靈樞骨度篇ニ所謂前髮際ヨリ後髮際ニ至テ折テ一尺半トスル者ヲ用ベシ。若前後髮際不明者ハ兩眉心ヨリ大推ニ至テ量リ。此ヲ一尺八寸ニ折テ其ヲ以テ眉心ヨリ上二寸半ヲ前髮際トレ大推ヨリ上三寸半ヲ後髮際トメ

用ベシ必中指

寸ハ不能合也

後神聰

出圖翼。○主治中風風癇。去百會一寸灸三壯。△

此モ督脈ノ流ニ屬ス。一尺二寸ノ折量ヲ用テ

後神聰ハ百會ノ後一寸ニ取十キハ右ノ前神聰ノ後二寸。前頂ノ後二寸五分。神庭ノ後五寸五分。前髮際ヲ入ヲ

六寸ニ蘇頌。○鍼二變針不順。脊ハ胃也。リ大鍼ニ至テ在トス。王氏當取而變針。又取兩穴也。

衄血

出神應經。○灸項後髮際兩筋間宛々中。△此即督脉ノ行ニ繫ル。項ノ髮際ノ正中。兩筋ノ間。宛タル

陷ナル中ニ十穴ヲ灸點ス。若髮際不明者ハ右ノ前神聰ノ條ニ辨ズル如ク眉心ヨリ大推ニ量テ一尺八寸ニ折

髮際

出圖翼。○云平眉上二寸是穴主治頭風眩暉疼痛延久不愈灸三壯。△此前髮際ノ穴也眉毛ノ正中

ヨリ直ニ上ニ當ル所ノ髮際ニ灸點ス左右兩穴也。寒痛頭ノ疼痛也。○按元ニ髮際不明者ハ眉心ヨリ大推ニ至テ一尺八寸ニ折テ眉心ノ上三寸大推ノ上三寸ヲ前後ノ髮際トスル者ハ寇綱先生神應經ノ說也右ノ平眉上三寸ト云者モ亦彼一尺八寸ヲ用テ眉心ノ上三寸ヲ前髮際ト言者也然田骨度篇ニ項至背骨ニ寸半ト言ト雖曰甲乙經醫學六要等ニ皆折テ三寸半トスルトキハ彼一尺八寸ノ中ヲ以テ後髮際ニ。三寸半ヲ取トキハ一尺四寸半ヲ存ス復一尺四寸半ノ中ヲ以テ眉心ノ上三寸前髮際ニ取トキハ一尺一寸半ヲ存メ髮中ノ法ニ比テ五分ヲ不足ス故ニ明ニ前髮際ハ眉心ノ上二寸半ニ定。○夾セリ然則右ノ平眉上三寸ハ二寸半ニ改ベシ。○或曰此改ベカラズ眉心ノ上三寸ハ前髮際ヲ入ト五分ニノ督脈神庭穴ノ旁ナリト然。○神庭ハ髮際ヲ入ト五分ニ在テ髮際ナラズ。何如。○髮際ト云ベケンヤ

印堂

出神農鍼經。○云治小兒急慢驚風可灸兩眉中間三壯艾炷炙小麥。○玉龍賦云善驚搐。△兩眉ノ正中二灸點斯。○此ニ灸ノ驚風ヲ治スルノ義ソノ理不考之凡鍼灸藥ノ治病ヤ其效ヲ致ス所以ノ知ベキ者アリ。又

自然レタル所ニメ人意ノ測知ベカラザル者アリ彼磁石吸
鐵琥珀採芥類ノ如レ膍下一寸ノ石門穴ハ婦人ノ絕孕
膍下三寸ノ關元ハ婦人ノ胎ヲナサレム一寸ヲ間テ孕レ
ルト孕レメザルト雲泥ノノ效ヲ異ニスル者悉知ベケンヤ
ハルト孕レメザルト舌下中央脉上主治消渴鍼出血△此

海泉

出圖翼○在舌下中央脉上主治消渴鍼出血△此直ニ舌下ノ中央ノ筋脈上ニ鍼ノ血ヲ見ス也按

ニ消渴ニ陰消陽消ノ別アリト雖正陰消ハ希ニノ陽消ノ者ヲ多レトス三焦ノ相火亢盛ニ因テ生スル者也手少陽三焦ノ筋ハ入テ繫舌本又心氣通舌肝筋亦舌本ヲ絡トキハ心肝三焦相火ノ筋脈上テ舌本ニ連ル故ニ刺テ血熱相火ヲハリトキハ舌本ニ連ル故ニ刺テ

渴スル者欵

金津玉液

出圖翼○在舌下兩旁紫脈上主治消渴口瘡舌腫喉痺二稜鍼出血△左ニ刺ラ金津ト云

右ニ刺ラ玉液ト云直ニ舌下ノ兩旁ノ紫筋脈上ラ刺テ出也三稜鍼十八鋒ヲ三角ニ刀ラ立テ併ル此九鍼ノ鋒鍼也○鍼灸聚英曰有咽喉腫閉甚治之以細三稜針把鍼藏在筆端内以藥點腫給患人却將筆端點腫處刺之立愈△凡口中及一切病人恐鍼者八鍼ヲ筆毫ノ中に結藏シテ鍼頭ト齊ク製ス病者ニ向テ言藥ヲ筆ニ浸テ點セト病者恐ザルが故ニ刺易シ

鍼工常ニ此鍼ヲ製置ベレ

卒腹痛

出神應經○治卒患腹痛肚皮青黑灸膍四邊各半寸ニ壯△膍ノ上五分六穴膍ノ下五分一穴

陽維絃筋之圖



絃筋如此ニ張
出テ露ル也

陽維

出千金○在耳後引耳令前絃筋上是穴治耳風聾雷鳴灸陽維五十壯△取穴ノ法ハ耳ヲ前エ抑按テ前エ引トキハ耳後ニ大筋ノ張出者アリ此ヲ絃筋ト云。廿六絳筋ノ上ニ灸點ス耳風聾トハ耳中如風吹ニ鳴動ラ覺テ不能聞者ラニ○初學者爲ニ一圖ヲ出スフ姫左

寒陰ノ腹痛

ラ療スル者多

○按ニ此穴俞ハ手足少陽經ノ流ニ繋テ翳風穴ニ近シ
手足少陽ノ經ハ耳後ヨリ耳前ニ出^{アガ}故ニ手少陽經ノ是
動ニ耳聾渾々焞々タリ然^{ナガ}則

陽維俞主耳聾鳴者理有十人

皇文類中

出千金翼○鼻莖ノ止ル處ノ陷ナル中也
指ヲ以テ眉心ヨリ肉ニ著テ按_{ツキ}_{シテ}下セバ鼻

莖ノ盡ル處ニ於テ其指ノ止ル處ノ陷ナル中ニ灸點ス
日主癲風角弓反張羊鳴太風青風面風如蟲行卒風多睡
健忘心中憤々口禁卒倒不識人黃疸急黃此一穴皆主之
鍼入六分得氣即寫留三呼五吸不補亦宜灸然不及鍼慎
酒麵生冷醋滑猪魚蒜薺麥漿水△按ニ此足陽明胃經ニ
繫者也十四經發揮ニ八頸中ヲ以テ胃經ノ爻ル所卜ス

內經二八胃經ノ始ル所ノ如

レ主病コノ意ヲ以テ考視ベシ

機
門
辨

出千金翼。○云在耳下八分近前。凡卒中風口噤不
開。急五壯卽愈。二云隨年爲壯健者。逐左右灸之。△

耳ノ下八分バカリ少々前ニ向テ陷ナル中也取穴時口
ヲ開テ耳下曲瀬ノ推端ニ在大槻足陽明胃經ノ頬車ニ
近シ胃經ハ口吻ヲ挾テ齒根ニ入ガ

故ニ此穴口禁口僻ヲ主沿スル者歟

脣裏

出千金翼。○二云脣裏正當承漿邊。逼齒齦。鍼三錐。主治馬黃黃疽。△承漿穴八任脉ノ本穴也。下脣ノ陷。

ナル中也唇裏ノ穴ハ下唇ノ裏齒齧ニ當テ鍼ス當承漿
邊トハ表^内ハ承漿ノ邊ニ當ト云ノ義也此モ亦冒經ニ繋ル

故ニ黃疽ヲ主治ス疽

病ハ脾胃濕熱ニ因ハ也

夾承漿穴

出千金翼○云夾承漿兩邊各一寸治馬黃急疫△任脉ノ下脣ノ下陷ナル承漿穴ノ

兩旁中指寸ノ各一寸ニ右

トス此モ胃經ノ流ニ繋リ

鷺口

出千金翼○在口吻兩邊鷺口處赤白肉際主治狂風罵詈過斫人名爲熱陽風各一壯狂邪鬼語妄

十五壯小兒大小便不通各灸一壯△取之ノ法兩口吻ノ赤白肉ノ際ニ灸斯此處ヲ鷺口ト云也此モ亦陽明胃經ノ地倉穴ニ近シ地倉ハ口吻ヲ夾ト各四分也按狂病罵詈等ハ陽明ノ熱邪タルト云問陽明脉解篇ニ見

顛顛

出千金翼○云顛顛在眉眼尾中間上下有來去絡脉是鍼之所○主治痘氣溫病△按二眉後方眼尾

中以中間ニ在者然上半有來去絡脉ノ義未通也絡脉八細筋ヲ云者欵眉十眼尾トノ中間骨ノ内廉ヲ按二眉ニメ骨ニ從テ細筋脉アリ此ヲ指者欵未詳也太緊足少陽膽經ノ瞳子竈ノ上手少陽三焦ノ絲竹空穴ノ下ニ近

者

也八尺少陽明脈穴外側盡頭則相合又參照前文

耳上穴

出千金翼○治癆氣風池及耳上髮際各百壯△按二耳上ヲ千金方ニハ作耳後○耳上ノ髮際

トハ耳ヲ前ニ折テ其折目ニ墨點ノ墨點ノ當ル處ノ髮
陰ニ灸點ス是明ニ手少陽三焦經ノ肉孫穴ニ正當ス風

池ハ足少陽胆經ノ本穴也靈樞經脉篇ノ足少陽所生

病ニ馬刀挾癰ト云則風池ハ最汎治癰氣コト明ケレ

當陽

出圖翼○當瞳子直入髮際内一寸去臨泣五分是二寸ノ折量ヲ用テ瞳子ノ上ニ求ム病者ノ瞳子ヲ眼ノ

中央ニ定テ直ニ瞳子ノ通ノ前髮際ヲ入フ一寸ニ灸點

ス鶯足少陽胆經ノ前髮際ヲ入フ五分ニ在臨泣穴ノ後五分也胆經ニ繫テ目窓穴ノ前五分ニ在者也胆經八內謂ニ行テ鼻ヲ挾ミ又外眥瞳子竅ニ行故ニ眩暉鼻塞ヲ王治ス且素問至真要大論ニ諸風掉眩屬於肝ト云則風

眩ヲ主治スル

「理アルカナ」

魚尾

出玉龍賦○云在目眥外頭廉晴明太陽治目證△

直ニ外眥ノ頭ニ求ム胆經ノ瞳子竅ハ外眥ヲ去一五分ニ在此穴ハ直ニ外眥頭ニ求ル也晴明太陽トハ睛明ノ外ニ別ニ太陽ノ穴名アルニ非ズ晴明ハ納謂ニ在テ足太陽經ノ穴ナルヲ以テ晴明太陽トハ云也

髮際

印堂

鼻交頸中

夾魚漿穴

鶯口

顴顎

耳上穴

當陽


魚尾

右九穴ハ前ニ許鉤スト雖曰各本穴ノ近ニ在テ惑闇ヲ

致シ易ク且其俞ノ所在文字ヲ以テ詳審ニレ難者アリ

故ニ別ニ一圖ヲ發スル」姪左尙圖下ニ所辨ノ註解ヲ

頭面九穴之總圖



夾穴ハ任脈ノ承漿
ヲ夾ミテ如此ニ點


嚙口ノニ穴ハ兩口
ノ赤白肉ノ際ニ在
テ胃經ノ地倉穴ノ
内廉ニ存ス地倉ト
相渾スルヲ勿レ

當陽ノ二穴ハ前髪際ヲ入コト
一寸ニメ膽經ノ脇泣穴ノ後
ニアル者如^レ此脇泣與當陽
相渾同スルコト勿レ
——髪際ノ二穴ハ直瞳子。眉毛ノ正中ノ
通ノ上ナル髪際ニ在テ脇泣ノ前
ニ存ス脇泣ト相渾スルモノ勿レ

以テ前條ト各參攷ノ其法廿六意ヲ知ベキ也

耳上ノ二穴ハ耳廓ノ中間ノ髮際ニ在者如

此也



顎顫ノ二穴ハ眉與眼尾ノ中間ニ在テ絲竹空ノ下瞳子
竇ノ上ニ在者如_ク此絲竹空瞳子竇ト相渾スルノ勿レ〇
足少陽膽經、腦空穴ノ二名ヲ顎顫ト云ト雖_ク此ト不同_カ
也〇右ノ九穴ノ中ニ於元髮際魚尾ノ穴ハ余未得適格
穴法ニ疑多ク存ス但本文ニ從テ其綱槩ヲ辨スルノミ後
ノ君子ノ再攷ヲ俟ト云〇按_クニ臨五絲竹空ハ俱ニ禁灸
ノ穴トス其外頭面ニ於ハ禁灸ノ穴多ク存ス故ニ所載
ノ奇俞ソ諸穴王亦詳審ニノ深ク攻_ク廣_ク尋_ク元鍼灸ノ
過_クカルベシ輕易ニ行_ク勿レ彼三百五十四穴ノ如_クハ古
今ニレ考_ク詳ニ論スル者少_クカラニ其書モ亦少_クセズ且
素靈ニ各_ク據_ク所アリテ後人亦累_クニ試テ累ニ驗アル者也
奇俞ノ如_クハ諸書ニ通メ所_ク不載_クニメ素靈ニモ亦コレ有

ノナレ後人ノ悉ニ用ル所ニモ非ズ故ニ其穴法ノ明白ニメ後世累々試テ累々驗アル者アリ後人シイニ未用メ所不試者モ多キス是以廣問ニ深ク考テ見問ニ長メ用ベキノミ痞根ノ穴ノ如キ古ハ知者アルノナレ後世尋用テ其驗ノ神ニ從テ近世通用メ盛ニ行ワル類也彼斤玉ノ如キ璞トメ葉ベケンヤ奇俞モ亦奇トメ葉ベケンヤ近代ノ醫ヲ行者所用ノ藥石ハ百ニ不遇方剤モ然鍼灸家取用ル所ノ孔穴儀ニレテ止ル况ヤ奇經奇俞ニ於ラヤ知者アルト希也故ニ神良ノ功效アル俞穴ト雖ニ自隱沒メ反テ其效アル穴ナレト言者也豈何ノ病ガ此ヲ土治スル俞穴ナク此ヲ療スルモ南十誦載スル「」〇藥方レト言ヤ皆不思ノ甚也間ニ赤テ絲青空ヘ丁觀子

小兒食癟

出神應經

○小兒食癟先寒熱酒漸乃發灸

鳩尾上五分三壯△鳩尾骨ノ上五分ナルトキハ胸前岐骨ノ端ニ在テ任脈ノ流ニ屬ス〇按ニ此謂鳩尾ヲ鳩尾骨トスルトキハ姪右若鳩尾穴ニ取トキハ不^{カナ}同甲し經ニ從トキハ右ト同ク胸前岐骨ノ端ニ至ル。十四經發揮ニ從トキハ胸前岐骨ノ下五分ニ至ル也然ニ此鳩尾ハ骨名トメ

見テ佳ナルベキ欽

卷之二

二

之氣者半消半走於胸間而蒸氣升於上
之氣者半消半走於胸間而蒸氣升於上

身之氣者半消半走於胸間而蒸氣升於上
身之氣者半消半走於胸間而蒸氣升於上

身之氣者半消半走於胸間而蒸氣升於上

四疊發肺二至三呼而食氣者不正食二至三呼而食氣者
固甲子疊發於十二子十二同人脈而更者一號三至八七
脉氣以歸胃十六八十九十子火脉氣以歸胃十六子火脉不
足火脉則胃火蒸云亦元并相火脉三陽火脉火脉三九脉

小兒食肺

數子十五食三九△臘風管上正食子十

也請處通也與食肺未透無事脉火發矣

