

×

a 13

灸
金
阿是要穴

二

492.7
A2
2

No. 1183



富士川文庫
2730

鍼灸阿是要穴卷之二

洛下 洼橋 岡本爲竹一抱子 撰

長州 萩 熊谷順安竹隱

防州熊毛 末兼原端向榮 同校


傳厥癆

出圖翼○云第一代蟲傷心宜灸心俞穴並上下
如四華棧○第二代灸肺俞四穴如前○第三代
灸肝俞四穴如前○第四代灸厥陰俞四穴如前○第五代
灸腎俞四穴如前○第六代灸三焦俞四穴如前○此證五
日輕五日重輕日其蟲大醉方可灸△癆瘵傳厥病ハ内ニ
惡蟲ヲ生化ノ次第ニ代々ニ傳テ家門ヲ滅ス此ニ灸ス

何是要記卷之二



ルノ法第一代ハ蟲傷心藏故ニ心俞上下四穴ニ灸ス上
下四穴トハ脊ノ第四推ノ下ノ脊中ニ墨點シ是穴ニ兩
乳ノ間八寸ノ法ヲ以テ四寸ヲ製ヘテ其ヲ兩ニ折テ折
目ニ墨ノ直タメナラシ其中ノ折目ヲ脊中ノ墨點ニ加テ
上下左右四處ニ四穴ヲ灸スルヲ如此



上下左右ノ間皆四寸ツ也以下ノ穴法皆如
此○兩乳八寸ノ法ハ兩乳頭ノ内廉ノ長ヲ
量テハニ折テ八寸トス○第二代ハ肺俞ノ上下左右四
穴ヲ灸ス○第三代ハ肝俞上下左右四穴ヲ灸ス○第四
代ハ厥陰俞上下左右四穴ニ灸ス○第五代ハ腎俞上下
左右四穴ヲ灸ス○第六代ハ三焦俞上下左右四穴ニ灸
ス○右皆兩乳八寸ノ法ヲ以テ前ノ第一代ノ灸法ノ如

ニス○傳屍病ノ證ハ作止アリテ五日ハ重ク五日ハ輕
シ其輕日ニ於テ右ノ灸ヲ致ス○圖翼ニ又曰取癆蟲可
於三推骨上一穴並膏肓二穴各灸七壯△三推ノ脊骨高
處ニ灸スル也此ニ膏肓二穴ヲ相兼テ灸ス凡癆蟲ヲ生
スル所以ハ心陽不足ノ濕ヲ生シ腎陰不足ノ熱ヲ生シ
濕熱濁惡ノ氣ヨリ痰ト瘀血トヲ薰蒸メ爲蟲變メ蟲形
ヲナス其形ハ情志ノ凝結スル所ニ因テ種々ノ異形異
色ヲナス故ニ玉堂氏曰傳尸癆瘵皆心受病氣結血凝故
有成虫者蓋由飲食酒色憂思喪真遂至於此凡虫爲蟲以
血凝而氣養之氣血在胞即爲正氣氣中即爲瘵塊凝在心
部即爲虫悉由不正其心憂志業緣所致三尸九虫之爲害
治者不可不知其詳九虫之内而六虫傳於六代三虫不傳

者，蠅虫，蚬虫，寸白虫也。六虫之內，或五藏種毒而生，或親屬習染而傳。云：又曰，太低六虫，一旬之中，通行四穴，周而復始。病經遇，木氣而生，立春一日，後方食起，三日，食五日，一退，方其作，苦百躄，有痛痛虫之食也。退，即還穴，醉睡一醉，五日，其病全，靜候其退，醉之時，乃可投符用藥。云：按二四穴，十八右，上下左右，四穴也。初學者，為二，葛可久，力十藥神書二所附，六傳。

六虫ノ形ヲ著ト如左

第一代



此虫形如嬰
見背上毛長
三寸在人身



此虫形如
鬼狀變動
在人府中



此虫形如蝦
蟻變動在
人藏府中

第二代



此虫形如亂
髮長三寸許
在人藏府中



此虫形如蜈
蚣或似守宮
在人藏府中



此虫形如
蝦蟇在人
藏府中

第三代



此虫形如
蚊蟻俱遊
在人藏府中



此虫形如蟻
蟻大如碎血
片在人藏府
中



此虫形如刺
蠅在人暖中

日，其虫遇，庚辛日，食起，醉歸心，俞穴中，四穴輪轉，周而復始。侯，虫大醉，方可醫灸，取出虫，後用藥補心。

日，其虫遇，庚辛日，食起，醉歸肺，俞穴中，四穴輪轉，周而復始。侯，虫大醉，方可治醫，取出其虫，補肺則差。

日，其虫遇，庚寅日，食起，醉歸厥陰穴中，四穴輪轉，周而復始。侯，虫大醉，方可治，取虫後補氣多差。

第四代



此虫形如乱絲在人腹藏中



此虫形如猪肺在人腹中



此虫形如蛇虺在人五藏中

日其虫遇巳巳且食起醉歸脾俞穴中四穴輪轉周而復
公侯虫大醉方可治取出虫後補脾為瘥

第五代



此虫形如鼠似小瓶渾无表裏背面



此虫形如有頭无足有足无頭



此虫變動物形如精血片在於陽宮

日其虫遇壬癸日食起醉歸肝俞穴中四穴輪轉周而復
始侯虫大醉方可醫救取虫出後補肝乃瘥

第六代



此虫形如長尾有西條一雌一雄



此虫形如龜鼈在人五藏中



此虫形如蠅或長或短如飛蝠

日其虫遇丑亥日食起醉歸腎俞穴中四穴輪轉周而復
始侯虫大醉可醫治取虫後補腎填精瘥○日此代虫有翅足全者千里傳症所謂飛尸不以常法治也△前人多傳厥癆法二八第一代心俞第二代肺俞第三代肝俞第四代心包俞第五代腎俞第六代三焦俞卜又右ノ玉堂氏方如八第一代心俞第二代肺俞第三代厥陰穴第四代脾俞第五代肝俞第六代腎俞卜又不同也


灸血病

出圖翼○云大瘦下血諸治不效者取脊骨中與臍相平須按脊骨高突之處覺痠疼者是穴

方可於上灸之不疼者非也灸七壯即止如再發即再灸七壯永可除根至於吐血衄血一切血病百治不效者經灸永不再發○又云一法於脊中第二十椎下隨年壯灸之△一ノ繩ヲ以テ臍ノ正中ノ通ヲ引圍メ其繩ノ當ル處ノ脊中高キ處ニ灸點ス此ヲ按ニ疼レ疼テ能應ル一ヲ覺者是ヨク穴ニ適テ效アリ若按テモ不疼不應處ハ不宜故ニ繩ノ當ル處ヨリ少ク上下ス下トモ惟ヨク疼應ル處ニ灸點ス△按ニ此大藥督脈ノ命門懸樞ノ兩穴ニ近ニ腎ハ精血ノ室夕分故ニ此灸ヨク血病ヲ治者欵△一法二十推ノ下ニ灸スル者モ亦督脈ノ流ニシテ腰俞ノ上ニアリトス本穴ナシ

疝氣

出入門一卷之下治病奇穴○云今病者合口以草橫量兩口角爲一摺照此再加二摺其爲三摺屈成三角如△樣以上角安臍中心兩角安臍下兩旁當兩肉處是穴左患灸右右患灸左左右俱患即兩穴俱灸艾炷如麥粒灸十四壯或二十一壯即安△病者自二口ヲ合テ一ノ稗ヲ用テ橫ニ兩口吻ノ廣ヲ量取テ此長ニ比ヘテ二折取テ總テ三折ヲ以テ三角ニ折並テ△如△此ニ作ル也



此間モ口ノ廣ノ寸也
 此間モ口ノ廣ノ寸也
 此間モ口ノ廣ノ寸也

廣ニ比ベテ總テ三折トリ用テ如△シ其上ノ一角ヲ以病者ノ臍ノ正中ニ當ルトキハ臍下ニ兩角垂下ル其兩角ノ左右ニ灸點ス



○此穴大慄足陽明經足少陰腎經兩經ノ間ニ繫ル疝ハ足三陰經ニ屬ノ主病者ハ厥陰肝經也腎經ヲ灸者ハ難經七十五難ノ母ヨリ子ヲノ虚セシム北方ヲ補ノ義也肝邪亢レバ脾土得尅テ不足ス故ニ脾經亦灸スベシ良ニ此灸疝病ニ效アル過トセズ

長谷

出千金○在夾臍相去五寸一名循際主治下痢不嗜食食不消灸五十壯二報之△按ニ此モ中指寸ナルベシ下同臍ヲ夾テ左右ノ相去ヲ五寸各二寸半ニ在是足大陰脾經足陽明胃經兩穴ノ間ニ繫トキハ下痢等ノ病ヲ主治スベシ△三報之トハ灸ヲ三度ニテ致シ歸スヲ云

腸道

出千金○云俠中極旁相去二寸半治大便灸隨年壯△中極ハ任脉ノ本穴臍下四寸ニ在也其旁左右相去一二十寸半各一寸七分五厘トス胃經ノ水道穴ノ内邊腎經ノ大赫穴ノ外邊ニ在トキハ大便ノ病ヲ主治スベシ蓋腸ハ胃ト下焦トニ屬スレバ也

盲募

出千金○云盲募二穴以乳頭斜度至臍中乃屈去其半從乳下量至盡處是穴主治結氣裏裏鍼所不及者灸隨年壯△一ノ繩ヲ用テ左ニテモ右ニテモ乳頭ヨリ引テ斜ニ臍中ニ至テ斷止其繩ヲ二ニ折テ半分ヲ斷棄半分ヲ用テ乳頭ヨリ下シ垂テ乳頭ノ盡處ニ灸點ス左右ニ穴也此灸ハ一切鍼藥所不及ノ病

可是也

求育募

△按ニ此穴ハ太繁乳根及腹哀穴ニ近シ其主治
ノ理未考初學者ノ爲ニ一圖ヲ發スルコト如左

穴ヲ點スルコト如此乳頭
ヨリ所量ノ尺ヲ用テ半
ヲ去捨半ヲ用テ乳頭ヨ
リ直ニ下シテ繩ノ盡ル
處ニ灸點スル也繩ハ蠟
繩ヲ用テ佳ナリトス

俞之圖



尺ヲ量コト如此ニ乳頭
ヨリ斜ニ臍中ニテ取
者也

通谷

出千金○云在乳下一寸心痛惡氣上脇痛急各五
十壯△乳頭ノ下各一寸ヲ灸ス此穴ヲ按ニ大藥
足陽明胃經ノ乳根穴ニ近シ故ニ心脇ノ痛ヲ主治スル
軟△按ニ足少陰腎經ノ腹部ニ於テ通谷穴アリト雖在
名ハ同ノ
此ト異也

鬼舍

出千金○在夾臍兩邊相去一寸主小腸澀痢膿血
灸百壯小兒減之△臍ノ旁ヲ夾ム一寸左右各
五分ニ在也按ニ足少陰腎經ノ腹部ヲ考ニ內經ニハ中
行任脈ヲ去一寸各五分ヲ流トス資生經十四經發揮ニハ
中行ヲ去一寸各一寸半トス然則此穴任脈ノ兩旁各五分
左右ノ間相去一寸ナルトキハ內經ニ所謂ノ腎經ノ

八二屬ニニ背脊

俞穴ニ相當レリ

肋頭

出千金翼○云治瘕癥患左灸左右患右灸第一屈
肋頭近第二肋下即灸處第二肋頭近第三肋下
向因翅前亦是灸處初日灸三壯次日五壯後七壯周而復
始至十止惟忌大蒜餘不忌△穴ヲ取ノ法脇下背ニ近キ
屈肋骨ヲ摸テ第一肋ト云者ハ胸ヨリ數ルトキハ十二
肋也第二肋ハ第十一肋也第三肋ハ第十肋也一肋二肋
三肋トハ脇背ヨリ摸テ下ヨリ數テ言者也第一肋ノ頭
第二肋ノ下ヲ灸處トス此正ニ足厥陰肝經ノ章門穴ニ
當レリ又第二肋ノ頭第三肋ノ下モ亦是灸處トス然レ
此穴ノ正當未考也灸之者ハ初日ニハ三壯次日ハ五壯

可是要記卷之二

其後ハ七壯ノハ復始ニ歸テ初日三壯次日五壯後七壯
如止二十日灸ノ止也初學者ノ爲ニ一圖ヲ出ス

背



第一肋ノ頭第二肋ノ下ヲ灸穴トス
第二肋ノ頭第三肋ノ下ヲ灸穴トス
○二穴俱ニ脇部ノ俞也肝膽ノ二
經ニ繫ベシ

○按三人ノ胸肋十二骨アリ然レ女子ハ擊夫骨二肋ヲ

加テ十四肋アリ故ニ右ノ穴法モ亦女子ノ如ハ摸テ擊

夫骨二肋ヲ除去テ求ベレ彼

章門京門ヲ取ノ如スベシ

乳上穴

出千金翼○云治乳癰如乳以繩橫度口以度從
乳上行灸度頭二十七壯△繩ヲ用テ其人ノ口吻

廣ク度取テ其繩ヲ乳頭ヨリ上行セシメテ繩ノ盡處ニ

灸點ス太酸足陽明胃經ノ膺窓穴ニ近シ胃經ハ乳ノ内

廉ヲ流カ故ニ乳病ヲ主治スル欵

妬乳乳房腫痛ヲ云俗チハレモノ也

龍頷

出千金翼○云在鳩尾上一寸半主心痛冷氣上灸
百壯勿鍼△鳩尾骨ハ胸前岐骨ノ下五分ヲ以テ

頭トス然則鳩尾ノ上一寸半ナルトキハ岐骨ノ下五分ノ

處日ヲ上行スルコト寸半ニ灸點ス此任脉ノ流繫テ太

髌中庭穴

二近者欵

肋鑛

出千金翼○云治飛尸諸注以繩度病者兩乳間中屈
之乃從乳頭向外量使當肋鑛於繩頭盡處是穴灸

隨年壯又云三壯或七壯男左女右△繩ヲ用テ病者ノ兩乳頭ノ廣ヲ量テ其繩ヲ兩ニ折屈テ乳頭ヨリ當テ乳後ニ向テ繩頭盡處ノ肋骨ノ鏹ニ當テ灸ス此癆瘵傳尸病ノ灸治也△按ニ右ノ法ハ兩乳頭ノ尺ヲ以テ兩ニ折テ半ヲ去者也太繁心包經天池穴ノ後膽經淵腋輒筋穴ノ邊ニ近シ○或曰兩乳頭ノ間ヲ量繩ヲ用テ兩ニ折屈テ如リレ其ヲ乳頭ヨリ後ニ向テ盡處ヲ穴トスト然カ否ヤ

乳後灸穴
兩乳ノ繩兩ニ折
テ如此ス
○乳
或說ニ兩乳間ノ繩ヲ折屈テ穴ヲ點スルヲ如此

灸傳尸

出千金翼○云凡中尸者飛尸遺尸風尸尸注也其狀皆腹脹痛急不傳息氣上衝心胸兩脇或蹠

蹠起或蹠引腰脊灸乳後三寸男左女右可一七壯如不止多其壯數愈△兩乳頭ノ後各三寸ヲ灸スルトキハ膽經輒筋穴ニ近シ按ニ膽經ハ風木ニ屬ス凡重ノ生スル木氣ノ化ニ遇テ生ス故ニ玉堂氏ガ癆瘵六重ヲ論ノ曰病經遇木氣而生ト風字从重者玉諸重ハ風木ノ化ニ從ヲ以ナリ是以傳尸癆重ノ灸治多ハ脇側肝膽二經ノ分ニ在者

脇堂

出明堂灸經○云腋下二肋骨間陷中舉臑取之主治胸脇氣滿噦噫喘逆目黃遠視氣脈可灸五壯△手少陰心經ノ極泉穴ハ曲腋ノ中央ニ在也此穴ハ手臂ヲ舉テ極泉ヨリ按テ脇ニ下テ二肋ノ骨陷凡甲ヲ納ハ

河是經也卷之二

カリニ在也此モ亦心經心包經ニ繋者也
故ニ胸脇ノ氣滯目黃等ヲ主治スル者欵

後腋下穴

出千金○云治頸漏灸背後兩邊腋下後文頭
隨年壯△頸漏ハ今ノ所謂氣腫也○日頸ニ
生スル瘰癧漏也ト灸之法ハ病者ノ兩手臂ヲ下ニ垂テ
脇ニ著ルハ曲腋ノ橫紋前後胸背ニ在其背後ノ曲腋橫紋
ノ頭ニ灸點ス此穴ノ所繫ノ經穴ノ正當未
考之○初學者ノ爲メ一圖ヲ發スルコト如左
○或曰コノ穴ハ手ノ大陽小腸經ノ肩貞穴
ニ近ト尤是ナリト云

後腋下穴



腋窩穴

出千金翼云、臆膈中氣閉塞、腋不聚毛、下附肋宛々中、五寸壯神良、△取穴ノ法、曲腋下ノ稍下、ニアリテ亦、手少陰厥陰ノ兩經ニ近レトス

胞門

出千金翼云、子藏門塞、不受精、妊娠不成、若墮胎腹痛、漏胞見赤、各胞門五寸壯、關元左邊二寸是也、△關元ハ任脉ノ本穴、臍下三寸ニ在、關元ノ左ノ旁ヲ去一、二寸ヲ胞門、穴トス、經ハ胃經ニ屬、ノ太巨水道兩穴ノ間ニ當レリ、按ニ關元穴ハ胞宮中ニ當ル故ニ主治如此ノ效アル歟、子藏ハ女人ノ子宮ヲ云、○又旧若胞衣不出及子久腹中或腹中積聚皆鍼入胞門一寸

子戶

出千金翼云、主治ノ效、右ト同レ、關元ノ右ノ旁ヲ去コト二寸ニ在也

氣門

出千金翼云、胎孕不成、各氣門穴、在關元旁、三寸各五寸壯、○又漏胎下血不禁、各百壯、△漏胎ハ婦人孕中ニ血液ノ漏下ヲ云、關元ノ旁、三寸トハ各三寸也、是モ亦陽明胃ノ經穴ニ近レ、○按ニ關元ハ胞宮ノ正中ニ當テ下元ノ地タリ故ニ直ニ此ニ灸灼スルヲ恐テ其旁或二寸或三寸ニ灸メ下元ヲ温養シテ精血ヲ持チ胞門ヲ守ラ

身交

出千金翼云、在少腹下、橫文中、當臍孔直下、白崩中、各百壯、及治胞落、癩須、三報之、又治大小便不通

又治尿管者可灸七壯△臍上ヲ大腹トシ臍下ヲ小腹ト
ス小腹臍下ノ横紋臍孔ノ直ニ下ニ當ル是穴也任脉ノ
流ニ繫ル正當ノ穴未考之白崩中ハ白
帶下也尿管トハ不覺ノ尿タル者ヲ云

闌門

出圖翼○云在陰莖根兩旁各開三寸是穴鍼一寸
半灸二十七壯治木腎偏墜△陰莖ノ左右各開一寸三
寸兩腿ツク子ノ横紋中也木腎ハ陰莖強直ニシテ不緩ヲ云
偏墜ハ陰囊偏ニ大小アルヲ云俱ニ肝疝ノ症也闌門ノ
二穴ハ足厥陰肝經ノ派
ナリ故ニ其效如此者歟

癩疝偏大

出圖翼○云一法於關元兩旁相去各三寸青
脈上灸七壯即愈△按二前ニ所謂ノ氣門俞

十同ノ彼ニハ青脈ノ二字ナシ人ノ臍邊ヲ見ニ青脈ナ
レ疝氣ヲ病者ハ臍邊ニ青脈ヲ露スナルベシ癩疝偏墜俱
ニ陰囊腫大ニ
ナル疝氣病也

子宮子戶

出圖翼○云關元旁各開三寸左子宮右子戶
主治癥瘕△按二前ニ記ス千金翼ノ關元ノ

旁三寸氣門穴ト
相同ニ互ニ考ヘシ

絕孕

出圖翼○臍下二寸三分灸三壯或至七々壯即終
身絕孕○此任脉ノ流ニ屬メ關元石門兩穴ノ間
ニ當レリ石門穴ハ婦人禁刺灸犯之終身絕孕ト然石門
元ニ灸メ胎孕ヲナスノ治アルトキハ臍下二寸二分關元ノ

上五分石門ノ下五分ニ灸ノ絶孕ノ理未考之後學ノ發明ヲ俟ミ

灸腋氣

出圖真○凡腋氣先用快刀剃去腋毛淨乃用好定粉水調搽患處六七日後看腋下有一點黑者必有孔如鍼尖或如簪尖即氣竅也用艾炷如米大者灸之三四壯愈永不復發△腋氣アル者ハ先刀剃ヲ用テ腋毛ヲ剃去テ淨クシ好定粉ヲ水ニ調テ腋下ニ搽テ六七日ノ後腋下ヲ看バ黒色ナル一黠アリテ其一黠中ニ小孔アリ是腋氣ヲ發スル竅也即米粒ノ大ナル艾ヲ用テ其小孔ノ上ニ灸スル一三四壯ス永不發也○按ニ此手少陰心經ノ極泉穴ニ當レリ考ニ凡物ノ香氣ヲ發スル火ニノ然リ奇南香沉香檀香ノ如キ皆火ニ因テ香氣ヲ薰發ス手少陰心經ハ火ニ屬シ胸中ヨリ出テ腋下ニ流ル故ニ心火ノ經ヲ傳テ臭氣ヲ腋ノ下ニ薰發セシム其本ハ濕熱ノ鬱燠ニ生ス是以夏月ニ腋氣ヲ強シ及形ヲ勞動シ或情志ノ氣動アル時ハ必其臭ヲ強スル者ハ悉心火ノ熱動ヨリ薰スルガ故ナル歟

欬嗽

出千金○云欬者灸兩乳下黑白際各數十壯即差△乳頭ノ四邊ハ少黒色也乳下黑白ノ廉際ニ於灸黠スルヲ如此○灸穴

按ニ此胃經ノ乳根穴ニ近シ

欬逆

出鍼灸聚英○嚴氏日灸乳下一指男左女右與乳相直間陷中灸三壯△乳頭下ニ醫工ノ一指ヲ

二間テ灸點ス此モ亦
胃經ノ乳根穴ニ近シ
出王機微義○云婦人乳頭向下盡處寶鑑曰疔

欬逆

其者灸二十七壯△婦人ノ乳房大ニノ垂者其乳頭
ヲ按風抑テ下ニ向シメ乳頭ノ中リ盡ル處ニ灸點ス此
法ヲ鍼灸聚英ニ舉テ曰武按此穴名乳根也上胃經ノ乳
下一寸六分乳根ノ本穴ニ正當トスル者欬○欬逆ヤ古
經ニ所謂ハ皆欬嗽俗云セキ也後世ニ所謂ハ悉シヤクリ
トス此欬逆モ亦皆シヤクリトス内經ニ謂臑也靈樞口問
篇ニ臑ハ胃寒ニ生スルノ間答アルトキハ胃經ノ穴ニ
灸ノ效ア
ルベキ者欬

顛門不合

出神應經○云臑上臑下各五分二穴灸三壯
灸未發顛門先合△臑ノ上五分一穴臑ノ下

五分一穴合ノ二穴ニ各三壯ヲ灸ス此任脈ノ經ニ屬メ
水分ノ下陰交ノ上ニ在テ神闕ヲ挾メリ神闕ハ小兒母
腹中ニ在ノ時血氣其胞衣ニ浸潤メ臑帶ニ通シ神闕ニ
透テ兒胎ヲ長養スル處ノ先天外部ノ中焦也任脈ハ衝
脈ト俱ニ十二經ノ血海タリ小兒ノ稟賦怯弱ニメ血氣
不足スル者ハ髓腦難長メ顛門各ク不合トテ致ス故ニ
任脈ヲ灸メ衝任ノ經血ヲ温潤シ臑ノ上下ニ透ク灸メ
中焦ヲ温養スルトキハ經脈ヨク流シ胃氣ヨク生發メ髓
腦充筋骨健ニ長シテ顛
門合閉ノ神效アル者欬

膀胱氣

出神應經○云膀胱氣攻兩脇臍下陰腎入腹灸
臍下六寸兩旁各一寸注如小麥大患左多右患
右多左△膀胱ノ疝氣ハ腸ヨリ臍下ニ攻痛陰莖縮リテ
腹中入トスル者也灸法雖如右愚按ニ臍ヨリ橫骨ニ
至ノ寸靈樞骨度篇ニ六寸半ト言ト雖甲乙經ノ臍下
任脉ノ穴ヲ考則明ニ穴法ハ臍ヨリ橫骨ニ至テ五寸也
然則此灸法モ亦五寸ノ法ヲ以スル者歟五寸ノ法ヲ以テ六
寸ニ求則六寸ノ盡ル處陰莖中ニ在テ左右ノ旁ヲ求メ
得カタシ若ハ六寸半トメ求則任脉中極ノ穴ノ下邊ノ
旁腎經ニ近キニ在也由テ考ニ前ニ辨スル如ク奇俞ノ
法多ハ中指寸ヲ用ユ此モ亦中指寸ヲ以テ量者ナルベシ
余中指寸ヲ以テ臍下六寸ヲ量見ニ寸ノ盡ル處陰莖ノ

急脉

上根際ニ在テ此カ旁各一寸ニ求則兩脈ニ近ク是厥陰
肝經ノ道ト云ベキニ似タリ諸病ハ足厥陰ノ主病タレハ也
素問氣府論曰厥陰毛中急脉各一○王氷次注曰
在陰毛中陰上兩旁相去同身寸之二寸半按之隱
指堅然甚按則痛引上下其左者中寒則上引少腹下引陰
丸善爲痛爲少腹急中寒此兩脈皆厥陰之大絡通行其中
故曰厥陰急脉即畢之系也可灸而不可刺病疝小腹痛者
即可灸之○圖翼曰按此穴自甲乙經以下諸書皆無是遺
誤也經脉篇曰足厥陰循股陰入毛中過陰器又曰其別者
循脛上臑結於莖然此實厥陰之正脉而會於陽明者也今
增入之△急脉ノ二穴ハ足厥陰肝經ノ正穴也陰毛ノ中
前陰ノ上際ノ旁中行任脉ヲ去一各二寸半陰股ツケ子ニ

在也此本奇俞ニ非ズ足厥陰經ノ本穴タリト雖凡甲乙
經以下十四經發揮等ニ此穴ヲ不載故ニ世人多ハ此穴
アルヲ知者ナキ
ヲ以テ今出之ノ三

腹中氣塊

出神應經等諸書○神應經曰塊頭上一穴針
二寸半灸二七壯塊中一穴針一二寸灸三七
壯塊尾一穴針三寸半灸七壯○鍼灸聚英曰腹中氣塊穴
頭鍼二寸半灸二七壯塊中一穴鍼三寸灸之二十七塊猶存
塊尾一穴鍼三寸灸至二十七壯塊漸分○類經圖翼曰長桑
君鍼積塊癥瘕先於塊上鍼之甚者又於塊首一鍼塊尾一
鍼鍼訖灸之立應△腹中塊積難分者ハ其經絡孔穴ヲ不
問直ニ塊聚ノ正中ニ鍼ニ鍼ノ未解者ハ灸之二十七壯ス

塊猶存セハ直ニ塊頭塊尾ニ鍼ノ後ニ灸ス塊必自消散
ス此定シ奇俞ニ非ト雖凡亦阿是ノ屬類ニノ諸書ニ多
載テ神效アリトス
故ニ今載之ト云

橫骨

出千金翼○曰婦人遺尿不知時出灸橫骨當陰門
七壯△陰毛ノ中陰門ノ上頭橫骨中ニ七壯ヲ灸
ス此任脈ノ流也○按ニ足少陰腎經ノ
腹部ニ橫骨穴アリト雖凡此ト不同也

癩疔

出圖翼○治癩疔在橫骨兩旁夾莖灸之△陰毛ノ
中橫骨ノ兩旁陰毛ヲ夾テ筋骨陷中ニ灸ス此モ
亦足厥陰肝經ノ流ニ繫
者也故ニ癩疔ヲ主治ス

泉陰

出千金翼○云、在橫骨旁三寸、治癩卵偏大、灸百壯、三報之、△橫骨ノ旁、中行ヲ去一三寸、此穴法未

得正當、後ノ君子ノ考ヲ俟ノミ、按ニ旁ノ中ニ灸ス、此字ノ下ニ於テ文字ヲ缺失スルニ似タリ

陰囊下橫文

出千金翼○云、治風氣、眼反口噤、腹中切痛、灸陰囊下第一橫理十四壯、△男子陰

囊ノ下根、第一ノ橫紋理ニ灸ス、此モ亦、任脈ノ別絡ニ繫テ會陰穴ノ前邊ニアル也

卒癩病

出千金翼○云、治卒癩病、灸陰莖上宛々中三壯、得小便通、即瘥、當尿孔上是穴、△按ニ此穴法、余

未得正當、陰莖ツケ根ノ上際ヲ言ガ如、ニノ又、尿孔上ト言、則馬口ノ上際ヲ指、ニ似テ難決也、然、千金又法曰、灸

陰莖頭三壯ト言、則右ノ法モ馬口ノ上際ニメ

此一法ハ直ニ龜頭尿孔ノ處ニ灸者ニ似タリ

羊矢

出圖翼○在會陰旁三寸、股内、橫文中、按皮肉間、有核如羊矢、可刺三分、灸七壯、△羊矢ハ鼠鼯也、馬氏

曰、鼠鼯、橫骨盡處ト股内ノ付根ノ橫紋、陰毛ノ際、按テ見

レバ、菓核ノ如ク、レツク者アリテ三、許連續メ、論ハ羊ノ矢

ノ如ク、ナリ、橫骨ノ左右盡ル處ニ在テ、灸點ス、按ニ羊矢ハ

前陰ノ左右、橫骨ノ兩端ニ在、則會陰穴ヨリモ、稍上ノ左

右ニ當レリ、然ニ會陰旁三寸ト云者、未詳也、又按ニ羊矢

ハ足陽明胃經ノ氣衝穴ノ邊ニ近シ、甲乙經ニ氣衝灸之

不幸、使人不得息、一云禁不可刺ト、其詳ハ別

然則羊矢、俞王亦詳審ニノ可行也、軒輊至道穴共四十五

前神聰

出圖翼○去前頂五分自神庭至此穴共四寸主治中風風癱多三壯△前頂神庭ハ俱ニ督脈ノ本穴前頂ハ神庭ノ後三寸前髮際ヲ入一三寸五分トス神庭ハ前髮際ヲ入一五分前頂ノ前三寸也前神聰俞ヲ前頂ノ後五分ニ點則神庭ヲ去一三寸五分ヲ正當トス然ニ右ニ謂自神庭至此穴共四寸トハ五分ノ有餘アリテ不合也四寸ハ三寸五分ニ改テ佳ナルベシ凡奇俞ノ折量多ハ中指寸ヲ用ト雖氏頭髮ノ覆所ノ諸穴ハ靈樞骨度篇ニ所謂前髮際ヨリ後髮際ニ至テ折テ一尺二寸トスル者ヲ用ベシ若前後髮際不明者ハ兩眉心ヨリ大推ニ至テ量リ此ヲ一尺八寸ニ折テ其ヲ以テ眉心ヨリ上一二寸半ヲ前髮際トシ大推ヨリ上一三寸半ヲ後髮際トシ

用ベシ必中指寸ハ不能合也

後神聰

出圖翼○主治中風風癱去百會一寸灸三壯△此モ督脈ノ流ニ屬ス一尺二寸ノ折量ヲ用テ後神聰ハ百會ノ後一寸ニ取トキハ右ノ前神聰ノ後二寸前頂ノ後二寸五分神庭ノ後五寸五分前髮際ヲ入一六寸ニ取トス

衄血

出神應經○灸項後髮際兩筋間宛々中△此即督脈ノ行ニ繫ル項ノ髮際ノ正中兩筋ノ間宛々ノ陷ナル中二十穴ヲ灸點ス若髮際不明者ハ右ノ前神聰ノ條ニ辨ズル如ク眉心ヨリ大推ニ量テ一尺八寸ニ折

ノ寸ヲ用テ大推ノ上三寸
半ヲ項髮際トシテ灸點スヘシ

髮際

出圖翼○云平眉上三寸是穴主治頭風眩暈疼痛
延久不愈灸三壯△此項髮際ノ穴也眉毛ノ正中
ヨリ直ニ上ニ當ル所ノ髮際ニ灸點ス左右兩穴也疼痛
頭ノ疼痛也○按ニ髮際不明者ハ眉心ヨリ大推ニ至テ
一尺八寸ニ折テ眉心ノ上三寸大推ノ上三寸ヲ前後ノ
髮際トスル者ハ宏細先生神應經ノ說也右ノ平眉上三
寸ト云者モ亦彼一尺八寸ヲ用テ眉心ノ上三寸ヲ前髮
際トノ言者也然レ骨度篇ニ項至背骨二寸半ト言ト雖
レ甲乙經醫學六要等ニ皆折テ三寸半トスルトキハ彼一
尺八寸ノ中ヲ以テ後髮際ニ三寸半ヲ取トキハ一尺四

寸半ヲ存ス復一尺四寸半ノ中ヲ以テ眉心ノ上三寸前
髮際ニ取トキハ一尺一寸半ヲ存ノ髮中ノ法ニ比テ五
分ヲ不足ス故ニ明ニ前髮際ハ眉心ノ上二寸半ニ定
決セリ然則右ノ平眉上三寸ハ二寸半ニ改ベシ○或曰
此改ベカラズ眉心ノ上三寸ハ前髮際ヲ入リ五分ニ督
脉神庭穴ノ旁ナリト然レ神庭ハ髮際ヲ入リ五分ニ在
テ髮際ナラス何如
中央ノ穴ニ灸
ノ髮際ト云ベケンヤ

印堂

出神農鍼經○云治小兒急慢驚風可灸兩眉中間
三壯艾炷如小麥○玉龍賦云善驚搐△兩眉ノ正
中ニ灸點ス○此ニ灸ノ驚風ヲ治スルノ義ソノ理未考之
凡鍼灸藥ノ治病ヤ其效ヲ致ス所以ノ知ベキ者アリ又

自然シル所ニメ人意ノ測知ベカラザル者アリ彼磁石吸鐵ヲ琥珀ヲ採ヲ類ノ如シ臍下二寸ノ石門穴ハ婦人ノ絶孕臍下三寸ノ關元ハ婦人ノ胎ヲナサレム一寸ヲ間テ孕シムルト孕シメザルト雲泥ノノ效ヲ異ニスル者悉知ベケンヤ

海泉

出圖翼○在舌下中央脈上主治消渴鍼出血△此直ニ舌下ノ中央ノ筋脈上ニ鍼ノ血ヲ見ス也按ニ消渴ニ陰消陽消ノ別アリト雖陰消ハ希ニ陽消ノ者ヲ多シトス三焦ノ相火亢盛ニ因テ生スル者也手少陽三焦ノ筋ハ入テ繫舌本又心氣通舌肝筋亦舌本ヲ絡トキハ心肝三焦相火ノ筋脈上テ舌本ニ連ル故ニ刺テ血熱相火ヲハテス又舌半ノ筋ハ中ノ去ニ出テ正瀉スル者欤

金津玉液

出圖翼○在舌下兩旁紫脈上主治消渴口瘡舌腫喉痺二稜鍼出血△左ニ刺ヲ金津ト云右ニ刺ヲ玉液ト云直ニ舌下ノ兩旁ノ紫筋脈上ヲ刺テ出血也三稜鍼トハ鋒ヲ三角ニ刃ヲ立テ作ル此九鍼ノ鋒鍼也○鍼灸聚英曰有咽喉腫閉甚治之以細三稜針把鍼藏在筆端內以藥點腫給患人却將筆端點腫處刺之立愈△凡口中及一切病人恐鍼者ハ鍼ヲ筆毫ノ中ニ結藏シテ鍼頭ト齊ク製ス病者ニ向テ言藥ヲ筆ニ浸テ點セシト病者恐ザルガ故ニ刺易シ鍼工常ニ此鍼ヲ製置ベシ

卒腹痛

出神應經○治卒患腹痛肚皮青黑灸臍四邊各半寸三壯△臍ノ上五分一穴臍ノ下五分一穴

陽維筋之圖



絃筋如此ニ張出テ露ル也

陽維

臍ノ左右各五分ニ兩穴也合ノ四穴ヲ各三壯ツク灸ス此任脈及腎經ニ繫レリ經脈ヲ温潤シ中下焦ヲ温養ノ寒陰ノ腹痛ヲ療スル者歟

出千金○在耳後引耳令前絃筋上是穴治耳風聾雷鳴灸陽維五十壯△取穴ノ法ハ耳ヲ前上折按テ前上引トキハ耳後ニ大筋ノ張出者アリ此ヲ絃筋ト云其絃筋ノ上ニ灸點ス耳風聾トハ耳中如風吹ニ鳴動ヲ覺テ不能聞者ヲ云○初學者爲ニ一圖ヲ出スヲ如左

○按二此穴俞八手足少陽經ノ流ニ繫テ翳風穴ニ近シ
手足少陽ノ經ハ耳後ヨリ耳前ニ出故ニ手少陽經ノ是
動ニ耳聾渾々焯々タリ然則

陽維俞主耳聾鳴者理有トス

鼻父頰中

出千金翼○鼻莖ノ止ル處ノ陷ナル中也
指ヲ以テ眉心ヨリ肉ニ著テ按下セバ鼻

莖ノ盡ル處ニ於テ其指ノ止ル處ノ陷ナル中ニ灸點ス
曰主癩風肉弓反張羊鳴太風青風面風如蟲行卒風多睡
健忘心中憤々口禁卒倒不識人黃疸急黃此下穴皆主之
鍼入六分得氣即寫雷二呼五吸不補亦宜灸然不及鍼慎
酒麵生冷醋滑猪魚蒜蕎麥漿水△按二此足陽明胃經ニ
繫者也十四經發揮ニハ頰中ヲ以テ胃經ノ交ル所トス

内經ニハ胃經ノ始ル所ノ如

シ主病コノ意ヲ以テ考視シ

機關

出千金翼○云在耳下八分近前凡卒中風口噤不
開灸五壯即愈云隨年爲壯健者逐左右灸之△

耳ノ下八分バカリ少ク前ニ向テ陷ナル中也取穴時口
ヲ開テ耳下曲頰ノ推端ニ在大筋足陽明胃經ノ頰車ニ
近シ胃經ハ口吻ヲ挾テ齒根ニ入ガ
故ニ此穴口禁口僻ヲ主治スル者歟

層裏

出千金翼○云層裏正當承漿是通齒齶鍼三銜主
治馬黃黃疸△承漿穴ハ任脉ノ本穴也下唇ノ陷

ナル中也層裏ノ穴ハ下唇ノ裏齒齶ニ當テ鍼ス當承漿
邊トハ表ハ承漿ノ邊ニ當ト云ノ義也此モ亦胃經ニ繫

か故ニ黃疸ヲ主治ス疸
病ハ脾胃濕熱ニ因バ也

夾承漿穴

出千金翼○云夾承漿兩邊各一寸治馬黃
急疫△任脉ノ下唇ノ下陷ナレ承漿穴ノ
兩旁中指寸ノ各一寸ニ在
トス此モ胃經ノ流ニ繋リ

鸞口

出千金翼○在口吻兩邊鸞口處赤白肉際主治狂
風罵詈撮斫人名爲熱陽風灸各一壯狂邪鬼語灸
十五壯小兒大小便不通灸各一壯△取之ノ法兩口吻ノ
赤白肉ノ際ニ灸點ス此處ヲ即鸞口ト云也此モ亦陽明
胃經ノ地倉穴ニ近シ地倉ハ口吻ヲ夾テ各四分也按ニ
狂病罵詈等ハ陽明ノ熱邪タルト素問陽明脉解篇ニ見

顛顛

出千金翼○云顛顛在眉眼尾中間上下有來去絡
脉是鍼之所○主治疽氣温病△按ニ眉後ト眼尾
トノ中間ニ在者欬然上下有來去絡脉ノ義未通也絡脉
ハ細筋ヲ云者欬眉ト眼尾トノ中間骨ノ内廉ヲ按ニ陷
ニノ骨ニ從テ細筋脉アリ此ヲ指者欬未詳也太繫足少
陽膽經ノ瞳子陷ノ上手少陽三焦ノ絲竹空穴ノ下ニ近
者ニ云々也

耳上穴

出千金翼○治癩氣風池及耳上髮際各百壯△
按ニ耳上ヲ千金方ニハ作耳後○耳上ノ髮際

トハ耳ヲ前ニ折テ其折目ニ墨點ノ墨點ノ當ル處ノ髮際ニ灸點ス是明ニ手少陽三焦經ノ肉孫穴ニ正當ス風池ハ足少陽胆經ノ本穴也靈樞經脈篇ノ足少陽所生病ニ馬刀挾癭ト云則風池ハ最氏治癭氣コト明ケシ

當陽

出圖翼○當瞳子直入髮際內一寸去臨泣五分是穴主治風眩鼻塞灸三壯△前二辨スル髮中下尺二寸ノ折量ヲ用テ瞳子ノ上ニ求△病者ノ瞳子ヲ服ノ中央ニ定テ直ニ瞳子ノ通ノ前髮際ヲ入一一寸ニ灸點ス即足少陽胆經ノ前髮際ヲ入一五分ニ在臨泣穴ノ後五分也胆經ニ繫テ目窓穴ノ前五分ニ在者也胆經ハ内睛ニ行テ鼻ヲ挾ミ又外眥瞳子窠ニ行故ニ眩暈鼻塞ヲ主治ス且素問至真要大論ニ諸風掉眩屬於肝ト云則風

眩ヲ主治スル

一理アルカナ

魚尾


出玉龍賦○云在目眥外頭兼睛明太陽治目證△直ニ外眥ノ頭ニ求△胆經ノ瞳子窠ハ外眥ヲ去一五分ニ在此穴ハ直ニ外眥頭ニ求ル也睛明太陽トハ睛明ノ外ニ別ニ太陽ノ穴名アルニ非ズ睛明ハ内眥ニ在テ足太陽經ノ穴ナルヲ以テ睛明太陽トハ云也

髮際 印堂 鼻交頰中 夾魚鰓穴 鵞口 頤顛

耳上穴 當陽 魚尾

右九穴ハ前ニ詳鈔スト雖各本穴ノ近ニ在テ惑亂ヲ致シ易ク且其俞ノ所在文字ヲ以テ詳審ニシ難者アリ故ニ別ニ一圖ヲ發スル一紙左尚圖下ニ所辨ノ註解ヲ

頭面九穴之總圖



鬢口ノ二穴ハ兩口吻
 ノ赤白肉ノ際ニ在
 テ胃經ノ地倉穴ノ
 内廉ニ存ス地倉ト
 相渾スルヲ勿レ
 夾穴ハ任脉ノ承漿
 ヲ夾ミテ如此ニ點
 穴ス

以テ前條ト各參攷ノ其法其意ヲ知ヌベキ也

當陽ノ二穴ハ前髮際ヲ入コト

一寸ニノ膽經ノ臨泣穴ノ後


ニアル者如此臨泣與當陽

相渾同スルコト勿レ

髮際ノ二穴ハ直瞳子眉毛ノ正中ノ

通ノ上ナル髮際ニ在テ臨泣ノ前

ニ存ス臨泣ト相渾スルヲ勿レ



耳上ノ二穴ハ耳廓ノ中間ノ髮際ニ在者如
此也

魚尾ノ二穴ハ直ニ鏡
背頭ニ在テ瞳子窠
ノ内廉ニ存ス瞳子
窠ト相渾スル

勿レ

顛顛ノ二穴ハ眉與眼尾ノ中間ニ在テ絲竹空ノ下瞳子
窠ノ上ニ在者如此絲竹空瞳子窠ト相渾スル勿レ○
足少陽膽經腦空穴ノ一名ヲ顛顛ト云ト雖此ト不同
也○右ノ九穴ノ中ニ於テ髮際魚尾ノ穴ハ余未得適格
穴法ニ疑多ク存ス但本文ニ從テ其網際ヲ辨スルノミ後
ノ君子ノ再攷ヲ俟ト云○按ニ歸五絲竹空ハ俱ニ禁灸
ノ穴トス其外頭面ニ於ハ禁灸ノ穴多ク存ス故ニ所載
ノ奇俞ノ諸穴モ亦詳審ニ深ク攷正廣ク尋テ鍼灸ノ
過ナカルベレ輕易ニ行下勿レ彼三百五十四穴ノ如ハ古
今コレヲ考テ詳ニ論スル者少カラズ其書モ亦必レトセス且
素靈ニ各據所アリテ後人亦累ニ試テ累ニ驗アル者也
奇俞ノ如ハ諸書ニ通メ所不載ニメ素靈ニモ亦コレ有

ナレ後人ノ悉ニ用ル所ニモ非ズ故ニ其穴法ノ明白
ニメ後世累ニ試テ累ニ驗アル者アリ後人ツイニ未用ノ
所不試ノ者モ多トス是以廣問ニ深ク考テ見問ニ長ノ
用ベキノミ瘡根ノ穴ノ如キ古ハ知者アルナレ後世尋用
テ其驗ノ神ニ從テ近世通用メ盛ニ行ラル類也彼片玉
ノ如キ璞トメ棄ベケンヤ奇俞モ亦奇トメ棄ベケンヤ近代
ノ醫ヲ行者所用ノ藥石ハ百ニ不遇方劑亦然鍼灸家取
用ル所ノ孔穴僅ニシテ止ル况ヤ奇經奇俞ニ於テヤ
知者アルヲ希也故ニ神良ノ功效アル俞穴ト雖モ自隱
没ノ反テ其效アル穴ナレト言者也豈何ノ病カ此ヲ主
治スル俞穴ナク此ヲ療スルヲ病カスルハ「
藥ナレト言ヤ皆不思ノ甚也

小兒食癪

出神應經○小兒食癪先寒熱瀉乃灸
鳩尾上五分三壯△鳩尾骨ノ上五分ナレト
キハ胸前岐骨ノ端ニ在テ任脈ノ流ニ屬ス○按ニ此謂
鳩尾ヲ鳩尾骨トスルトキハ如右若鳩尾穴ニ取トキハ不
同甲し經ニ從トキハ右ト同ク胸前岐骨ノ端ニ至ルナ
四經發揮ニ從トキハ胸前岐骨ノ下五分ニ至ル也然モ
此鳩尾ハ骨名トメ
見テ佳ナルベキ欵

鍼灸阿是要穴卷之二 終

竹葉青

竹葉青一名竹葉青。竹葉青者。竹葉之青也。竹葉青之性。味甘。性平。主。治。諸。般。瘡。毒。及。一切。癰。疽。疔。瘡。無。名。腫。毒。等。症。其。功。效。如。神。凡。患。此。症。者。宜。早。服。之。無。不。立。見。奇。效。此。藥。之。功。用。甚。大。不可。不。知。也。

長。年。廿。十。五。分。中。毒。

四。五。分。每。日。服。三。次。每。次。一。分。至。二。分。開。水。送。下。

此。藥。之。功。用。甚。大。不可。不。知。也。凡。患。此。症。者。宜。早。服。之。無。不。立。見。奇。效。

