



華佗先生
中藏經

蜚英書局印行

附內照法

Kitasato Memorial Medical Library

F 3
チ-22



490.9
Ch-19
3
No. 2354
10 K 1



富士川文庫
999

中藏經卷下

漢華佗元化撰

治惡瘡發背

燒車螯

蘆殼無有竹根伐

黃蘗

甘草

工虞徐靈山重校

右等分為末先以青鹽薄荷園姜樓蕊煮漿水湯洗瘡男子以婦人婦人以男

子唾調前藥塗之以赤水出為度

神效乳香膏治一切瘡腫生肌止痛一名金露

芝麻油四兩

黃丹一兩

乳香分二

羊同骨髓四兩

麝香許

一方用沒藥

一分代乳香

右件藥一處入磁器內用文武火煨之成膏用綿濾過入磁合收之入黃蠟半兩

金屑圓亦名黃圓子治傷風寒頭痛肌熱大效

大天南星五箇

半夏二兩洗七遍

石膏一兩

甘草

鬱金兩

右為末以生薑自然汁為圓如雞頭大每服二圓傷寒頭痛荊芥茶下四肢厥冷燈燭上燒存四分性服大便不通大戟湯下小便不通大黃湯下破傷風豆淋酒下常服茶清下並嚼嚥

白散子治發背候取下毒無次用清涼膏貼之

華佗中藏經

卷下

代當作

無字疑

按嵌甲
因靴穿
研損小
甲陷入

注出相染
五指濕
爛上漸
引起如
四起大
湯日不
燒增夜
倍作動
龍是也

白附子 大香附子各半 半夏一分 黑牽牛二兩半生
大甘遂一分 參以大麥炒候赤去 參不用須極慢火炒之
右為末量患人虛實加減每服二錢以蜜酒調下續飲溫酒一兩蓋候所苦處
刺痛為度微利三五行瀉出惡物即差次用膏藥貼之氣盛者一服二錢餘
更裁度

清涼膏治發背等先用白散子取之次用此藥貼之

川當歸兩二 香白芷 木鱉子肉 白芨 芍藥 黃蘗 白欬各一兩

乳香研別 膩粉各少 白膠許少 黃丹兩五

右用清麻油十兩煎六味候紫色去之入槐柳枝各七寸再煎少頃又去之入
黃丹五兩熬成入乳香等重綿濾入罐子內貯之用如常貼使

妙應膏治疥癬 蘭茹 藥蘆

右等分為麓末油煎焦黑去滓入黃蠟就成膏塗擦之

治惡瘡金瘡刀斧傷見血方

右降真香為末貼之入水並無妨絕妙

治嵌甲累效

硃砂錢 乳香錢 膩粉錢 橄欖核三箇燒 黃丹半

右為末入生油調先以鹽湯洗淨搽乾傳之兩上效

治惡瘡疥癬 巴豆沸去一粒油煎令 蛇床 蘭茹

右後二味等分細末入輕粉少許用巴豆油調傳之及搽痒處

佛手膏治膿窠瘡神效

大戟 細辛 蛇床子各一兩 雄黃 白膠香 青州蝎 黃蘗 黃丹各

兩 白礬一錢

右為末以清油八兩熬煙出次下去皮巴豆四七粒槐枝二七截候焦取去不

用次下黃蠟一兩松脂二兩次下前九味末以槐枝不住攪成膏磁合內貯

又名紫霜膏

治發背一切癰疽金石藥毒發

右以背車螯大者鹽泥固濟火煨通紅放冷取出研為極細末地上出火毒一

宿以甘草膏子圓如梧桐子每服三五圓甘草湯下日進三服第三日取

下惡物用後藥貼之

貼瘡白膏藥

右以寒水石不以多少火煨通紅入磁器中封口令蜜沉井中一宿取出研極

細以臘月猪脂和如膏稀稠得所自瘡赤盡處塗之潤一指許上以薄紙為

按散甲
因靴穿
小

四邊黃水浸
出相染
流指濕
五指漸
爛上脚
引起如
跌起大
湯日不
燒增夜
倍作動
者能是也

白附子 大香附子各半 半夏一分 黑牽牛二兩半生

大甘遂一分 以大麥炒極慢火炒去

右為末量患人虛實加減每服二錢以蜜酒調下續飲溫酒一兩蓋候所苦處刺痛為度微利三五行瀉出惡物即差次用膏藥貼之氣盛者一服二錢餘更裁度

清涼膏治發背等先用白散子取之次用此藥貼之

川當歸兩二 香白芷 木鱉子肉 白芨 芍藥 黃蘗 白欬各一兩

乳香研別 膩粉各少 白膠許少 黃丹兩五

右用清麻油十兩煎六味候紫色去之入槐柳枝各七寸再煎少頃又去之入

黃丹五兩熬成入乳香等重綿濾入罐子內貯之用如常貼使

妙應膏治疥癬 蘭茹 藥蘆

右等分為籠末油煎焦黑去滓入黃蠟就成膏塗擦之

治惡瘡金瘡刀斧傷見血方

右降真香為末貼之入水並無妨絕妙

治嵌甲累效

硃砂錢一 乳香錢一 膩粉錢一 橄欖核三箇燒 黃丹字一

右為末入生油調先以鹽湯洗淨搯乾傳之兩上效

治惡瘡疥癬 巴豆十一粒油煎令 蛇床 蘭茹

右後二味等分細末入輕粉少許用巴豆油調傳之及搯痒處

佛手膏治膿窠瘡神效

大戟 細辛 蛇床子各一兩 雄黃 白膠香 青州蝎 黃蘗 黃丹各半

兩 白礬一錢

右為末以清油八兩熬煙出次下去皮巴豆四七粒槐枝二七截候焦取去不

用次下黃蠟一兩松脂二兩次下前九味末以槐枝不住攪成膏磁合內貯

又名紫霜膏

治發背一切癰疽金石藥毒發

右以背車螯大者鹽泥固濟火煨通紅放冷取出研為極細末地上出火毒一

宿以甘草膏子圓如梧桐子每服三五圓甘草湯下日進三服第三日取

下惡物用後藥貼之

貼瘡白膏藥

右以寒水石不以多少火煨通紅入磁器中封口令蜜沉井中一宿取出研極

細以臘月猪脂和如膏稀稠得所自瘡亦盡處塗之潤一指許上以薄紙為

花子中心留一孔貼定漸次赤退即逸遷移近裏至愈紙花孔子外所留紙
令與所塗藥潤狹等

接骨散治折傷

黃狗頭骨一箇以湯去毛便以湯連皮去之炭火煨過去泥為細末 官桂末 牡礪亦泥固煨

右三味各為細末每用狗骨末五錢入牡礪末三錢官桂末二錢並炒以糯米

粥鋪絹帛上方摻藥在粥上裏損傷處大段折傷者上更以竹并夾之少時

即痒不可抓之輕以手怕三兩日效

治金瘡妙方

右以石灰不以多少和人血作餅厚兩指許風乾旋切傳之

治內損吐血

右以飛羅麵微炒以濃磨墨一茶腳二錢許服立效

越桃散治下血及血利 越桃也 槐花 青州棗 乾薑

右等分燒存性為末陳米飲調下二錢

炙肝散逐胃中風邪益脾進食凡人虛弱用補藥日久漸至瘦損食少倦怠大便

頻數泄漏服此無不取功效

白朮 白芍藥 山白芷 桔梗各四兩

茶脚
疑脫和
字下

右各生為細末用不入水漬猪肝五兩作小片子或塊子拌藥十五錢細切葱

白二寸鹽一錢同拌肝令勻以竹簽子作串慢火炙香熟啖之米飲送下空

心食前各一服渴勿啖冷水半月必安

地黃散牢牙去齒病出僧文瑩湘野錄

歌曰

猪牙皂角及生薑西國升麻熟地黃木律旱連槐角子細辛荷葉要相當荷葉取用

青鹽等分同燒煨研殺將來使最良擦齒牢牙髻髮黑誰知人世有仙方

治牙痛神驗 草蓀撥 木鱉子去殼

右先研木鱉子令細入蓀撥同研令勻隨左右鼻內搗之每用一豆許

治牙痛及走馬疳

右用頭髮乾饒用剃面刀子細切銚內慢火燒存性為細末摻患處

治風氣攻注牙齒腫痛 藁木 煎草 細辛

右等分為簾末每服三錢水二大盞煎至一盞半以下乘熱嗽之過微覺痛少

頃自止

治喉閉及腫痛 白梅二十五 白礬錢一 甘草錢一 生草麻四十九

右同研勻和圓如雞頭大以綿裹含化

健疑誤

絳雪治喉閉

礶砂一皂大 白礬同上 馬牙硝一分 消石兩 黃丹兩 新巴豆六枚

右用礶磁小碗一箇先煨令熱下前四味次下丹次下巴豆仍將巴豆先打破逐箇旋下候煨盡又下一箇入蛇退皮一條自然燒化以砂礬成汁候結硬未成每用少許以筆管吹在患處

碧雪治口瘡如咽喉痛腫即含化

焰硝二兩 甘草二兩 青黛半兩 殭蠶半兩

右為細末取黃牛膽汁和之令勻卻入膽內當風吊臘月合過百日中用烏龍散治骨槽風牙根腫有奇功

右用不蛀皂角不得搥破只剉去皂子卻入和皮尖杏仁一箇在皂子處燒存性研細每一兩入青鹽一分令勻不計時揩牙用

治口瘡 用五倍子為末摻瘡上

治喉閉牙關不開者

右以白殭蠶微炒為末生薑自然汁調下一錢如神效

白龍散治風毒赤爛眼眶倒睫冷熱淚不止滴水為雞頭大圓子亦得

白鱈粉一兩 銅綠一錢 別

湯當作

右同再研勻每用半錢百沸湯化開以手指洗眼

清中湯治暑氣中渴 陳皮二兩 甘草一兩 黃芩一兩 乾薑半兩

右為末每服二錢水一盞煎至八分溫冷喫湯點水調皆可

皂角散治五種腸風瀉血下痢糞前有血號外痔糞後有血號內痔大腸不收號脫肛穀道四面有努肉如妳號舉痔頭上有孔號漏並皆治之

黃牛角一箇 蛇蛻一條 猪牙皂角五箇 穿山甲

右四味同入瓷瓶內黃泥封固候乾先以小火燒令煙出方用大火煨令通紅為度取出攤冷杆羅為末患者先用胡桃肉一箇分作四分取一分臨因時研細如餅溫酒調下便睡先引虫出至五更時溫酒調下藥末二錢至辰時更進一服取下惡物永除根本

白龍散治消渴 寒水石生 甘草半兩 葛粉各等

右件為細末每服二錢濃煎麥門冬苗湯調下服立止

神驗柴胡散治大人小兒骨熱夜間如蒸甚者不過十數日見效

土柴胡不以多去蘆洗淨炙黃色

右為末每服二錢水一盞入地骨皮指面二大片子同煎至七分食後溫服如

虛瘦但空心服補藥食後煎下數服時時如水飲之

按勞肉
二子和
副作勞
也向者可

聖餅子治咯血 青黛錢一 杏仁四十粒去皮夫以黃明臘煎黃色取出研細

右二件再同研勻卻以所煎蠟少許鎔開和之捏作錢大餅子每服用乾柿一箇中破開入藥一餅令定以濕紙裹慢火煨熟取出以糯米粥嚼下

治產後惡心 白朮分 生薑半減 右並吹咀水一盞煎至七分溫服如神

艾煎圓治婦人經水不止 金毛狗脊一兩去黃毛 威靈仙一兩 良薑一兩 熟艾二兩糯米餵和日乾為末一法用醋熬培乾亦

右為末以藥一半同醋煮麩餅和餘一半藥末為圓桐子大每服十圓溫酒下食前空心服

治血山崩甚者

右以凌霄花培乾為末酒下三錢立止晝夜不定者一服效

治產後發熱無憂散 虎魄一兩 生地黃半斤切 右將地黃於銀器中炒煙盡合地上出火毒乳鉢內研為末每一兩虎魄末錢二勻合用童子小便與酒中半調下一錢日三服

治腫毒 天南星生為末 白礬研細

右等分新汲水調塗乾再掃之 治大人小兒偏墜服訖以食壓之 防風 官桂研細辛味者

神鷹烏玉丹治丈夫婦人久新腸風痔瘻着床頭痛不可忍者服此藥不過三四次便見功效初得此疾發痒或疼穀道周回多生硬梗此是痔如破是瘻只下血是風皆因酒色氣風食五事過度即成此疾人多以外醫塗治病在腸內有蟲若不去根本其病不除此藥的有神效不可細述

梭櫚 亂髮各二兩 猬皮四兩 猪蹄甲一十四箇 牛角腮二兩 槐角一兩

苦練樹根二兩半洗淨 雷圓 脂麻各一兩 真麝香錢二 滴乳香半兩

右除乳麝二香別研細外並細剉入藏瓶或沙合子不固濟周回用熟炭火煨烟才盡便去火全在體度煨未則殺入二香同研勻無灰醇酒打麩餅為圓如梧桐子大每服八粒先細嚼胡桃一枚以溫吞下空心晚食前日二服

如病甚日三服切忌服別藥不過三兩日永除根本

治小兒疳癖 右以芥子不以多少研成膏攤紙花子上貼疼硬處坐中效

常山湯治姙娠患瘧

常山二兩 甘草一兩 黃芩三兩 烏梅十四箇 石膏八兩并研

右以酒一升二合清藥一宿煮三四沸去滓初服六合次服四合又次服二合發前次第服之今但抄五大錢清酒一盞

常山湯治同前 常山三兩 竹葉三兩 石膏八兩 杭米一百粒

右以水六升煮取二升半分三服第一服未發前待食久服之次臨發時服餘一服以塗頭額及胸前伍心藥洋置頭邊當日勿近水及進飲食過發時乃飲粥此二方皆大湯劑今但抄五大錢水一盞半煎至七分飲服

鐵單散安胎如神

右以香附子炒去毛令淨為細末濃煎紫蘇湯調下一錢

失笑膏治婦人產後血不快刺痛等症 五靈脂 蒲黃

右等分為細末每服二錢米醋半盞同熬成膏再入水一盞煎至七分熱服痛如失

催生治危急神妙 朱砂半兩 乳香兩

右為末端午日猪心血圓梧子大乳香湯下一粒并治小兒斑豆不出

白朮圓治小兒白瀉 白朮 當歸 芍藥 木香減半

右等分為末煉蜜圓如菉豆大每服十圓十五圓不拘時候米飲下

木香圓治小兒喫食太早遂成疳疾腹脹疳瀉及釀肚等病

木香 沉香 青皮去白各一錢 肉豆蔻一箇麩裏 牽牛二錢炒

右為細末醋麩圓如麻子大二三歲兒服三粒五六歲服五七粒濃煎蘿蔔湯下

玉柱杖散治小兒疳瘦 黃 人參 白茯苓

右等分為末每服一錢水一盞煎至六分呷之不拘時

沉香養脾圓

人參 白朮 川麩薑炮 甘草炙 木香 丁香 肉豆蔻麩裏 縮砂

八味各半兩 沉香一分

右為細末煉蜜一兩作十粒每服一粒嚼下食前服化下亦得

佛手膏治眼生翳膜并弩肉赤脉翳睛翳暈冷熱淚下及眼眶赤爛等方

乳香真者研半兩 硃砂研半兩 麝香研一字 當歸半錢 黃連一錢去鬚 白

礬半兩 白砂蜜四兩 青鹽一字

右除蜜先將上七件於乳鉢內研爛同蜜一處拌勻入新竹筒內用油紙兩三重以線繫扎定口勿致水入放淨鍋內添水煮竹筒自早至午時破竹筒傾藥以新綿或重絹濾過入藥於甕瓶子內牢封埋地坑內經宿取出點之用

勞當作

退下
人隨藥
考勞當作

銅柱點每點了合眼少傾復以溫淨水洗之翳膜嫩者是近年生者當五七次隨藥退下翳老者頻點旬日退下即効勞內癆肉不過兩三日隨藥以銅柱刮落翳肉自然綻斷此方不謬累驗

治小兒乳癰胸腹高喘急吐乳方

右以不入倉黑豆七粒去皮研極細滴水七偏和成作七丸以青黛末裹之令偏更用白麵和作皮裏藥慢火煨熟去麵再研細別入膩粉生腦子麝香各少許再滴水丸作七丸每服一丸臨卧溫水送下兒子小嚼破無妨極効

神木散治傷風頭痛聲重

蒼朮兩 川芎兩 藁本兩 炙甘草一兩

理大腸一切下血

右咬咀每服二錢水一盞生薑二片同煎至七分通日服不拘時候

取雄黑豈擊小長者不以多少微以皂角湯浸發動炒熟去皮為細末煉猪脂為丸如梧桐子大每服三十九丸陳米飲熱水皆得服甚妙

治婦人懷妊多墮方

熟艾五斤米醋三斤 木鱉子五箇 大赭石二兩米醋
右同為末煮棗肉為丸梧子大每服三十九丸米飲下

花紅散治惡瘡大効方

龍骨雪白真者兩 乳香半見 粉霜半 光粉錢 輕粉用小平錢 麝香許 腦子許 黃丹透粉紅即頭

右合和了如患瘡先用溫漿水洗淨次用好油塗瘡口上了方可將藥摻在瘡

上用膏藥貼日三四次易之趙允蹈赴溫倅過諸醫傳此方云親自得效渠患一漏瘡以藥用紙摻填瘡中上以膏貼藥之日生肉舊不通遂漸覺痛有血是好肉生也

治喉閉 白殭蠶 天南星並生

右等分為末以生薑自然汁調一字許用筆管灌在喉中立効仍咬乾薑皂子大引涎出

治腸風下出

槁藤子二箇如當三錢大者如更大 不艸皂角子四十九粒燒
右拌勻每服二錢溫酒調下如人行五里再以溫酒一盞趁之日一服極効

治一切癰疽地黃膏兼治毒蟲所傷

石膏以 藿香葉 蚌粉 香白芷 雄黃研

右等分同為細末以生地黃自然汁調稀稠得所塗瘡上四圍留瘡頭已破者

亦留瘡口勿塗乾即再傳之藥厚以新水潤之其效如神極妙

萬全金花散理發背疽瘡疼痛不可忍者凡腫在脊骨邊根株如椀蓋大上面有細頭子如粟米粒白色其間亦有如石榴子者即疽瘡也

車螯紫色者出海際用火烘生黃蘗末為生甘草末為乾蘆皮自東邊面西蘆蘇障

右各為末了旋抄車螯末黃蘗末各一錢甘草末半錢已上蘆皮末一錢半已上半勻用津唾調以竹篦子傳腫上須蓋遍瘡根未穴者自穴已穴者惡物自出凡十上取效每傳瘡時須先用赤根葱三兩莖薄荷少許鹽少許一處煎湯放冷淋洗旋旋用帛子拭乾方可上藥應係惡瘡癰疽傳之無頭者即消有頭者即膿出神效

治陰瘡 臙茶 五梧子分等 膩粉抄 右傳之

治吹妳 水茸角瓦上煨乾

右為細末臨瓦酒調服二錢七次日即愈已破者略出黃水亦效水茸角狀如鬼腰帶作小窠子生三四月開小黃花葉如夜合葉六七月採兩浙呼合萌

治風痰眩暈二烏圓 川烏頭各四兩 青鹽兩四 黑豆半

右用水二升同煮四味水耗即用溫水添之候川烏頭半軟四破之更煮以透爛為度去皮同煎烏頭並黑豆於石臼或木臼內搗令極爛不見白星即就圓乾即以煮藥水添濕同搗煮時留一盞以下水以備添勿令煮乾也圓如梧子大每服三二十圓鹽酒鹽湯任下食前

治風癩

右九蒸九爆天南星為末薑汁糊圓梧子大煎人參菖蒲湯或麥門冬湯下二十圓

治風蚰牙

右用大北棗一枚劈開去核入和皮巴豆一粒卻捏合於慢火上炙令焦黑如乾浮炭樣取放地上良久碾為細末以紙撚尖撫少許入蚰牙竅內不過五七永絕根本

木香餅子

木香兩半 丁香皮兩二 益智仁兩一 香附子四兩去 甘草二兩 縮砂仁一兩 蓬莪茂二兩

右件七味為細末水糊為圓梧子大捏作餅子每服一二十餅溫熱水嚼下食後

治瘰癧 瞿麥 海藻 凌霄花 北邊背陰土研別 皂角刺新者

右並等服三錢米飲調下食後日二服

貼已破者

右用鉛炒取灰滓研細以溫鹽漿水洗淨貼之

二虎丹治瘰 長砂 硫黃

右熱多加辰砂寒多加硫黃并研細棗肉為圓如龍眼大當發日新水七分一盞化下

金瘡藥

右用上等風化石灰羅過以紫刺芥心韭一服多少搗灰成塊陰乾旋為末用付之五月五日合

神仙眼藥并種空青法

秦皮三錢去麩皮別細 乳香一塊如棗大 胡黃連三錢 燈心一握長七寸 棗子三個

班貓一箇頭去翅足 古老錢七文不到

右都為麩末入無油聲器中砂器尤佳用并化水一大碗熬去半碗用綿絹擠過再將滓以水半碗攪取一盞入擠過汁同煎汁入新碗中熬似稠粥樣入入小甕合中或角合中盛將空青并鵬砂一塊如兩豆大飛過熬乾空青不熱再研入腦子多不妨麝香少許四味同入藥膏內攪勻每點一粟米許在

眼背頭將手挪勻仰面候藥微澁過將沸鹽湯用軟帛片蘸洗快則已之

種空青法

朴消半錢 白蔞一分 龍膽草一分 仙靈毗葉錢一 旋覆花錢一

右為末用黃泥一塊拳大同藥和勻水調如軟飯相似作土餅一箇用太平錢五文按五方排定於光面墨書金木水火土五字所寫字向下錢字向上隨五方安用硃砂如豆大每錢安四塊在四字孔罅中須要乾黃土工頓着土餅將新砂盆一箇蓋之又將燥黃土蓋盆冬月十日夏月五日取出於錢上摘取下細研入藥此為種空青法不可嫩亦不可老須得中也

治胞損小便不禁

北丹須細花者不然無效

白牡丹根皮為末一錢 白芨為末一錢 生絹一尺

治喘嗽上氣

蒲扇葉治一切肺喘劇甚者効如神培碾為細末米飲調服二錢上併服取差氣味清香其實酸澁夏紅可食核如棗核類山茱萸練葉背白者用江西謂之盧都子

治蛇湯 香白芷

右為末濃煎麥門冬湯調下二錢神效

換骨丹治一切卒中手足痲腰膝沉重左癱右瘓截四時傷寒婦人血刺產前

地黃當
作麻黃

按音
陰地室
也地藏
酒為
石仁去
疑天四
行字

後每一粒酒一盞碎搥浸至夜溫動化散臨睡和滓服小兒驚搐米飲化半圓

桑白皮 川芎 吳白朮 紫河車 威靈仙 蔓菁子各二 人參 防

風 何首烏各二 地骨皮 五味子 木香 苦參各一 犀角半兩

麝香 龍腦各半

右為細末用膏和

作膏法 地黃三斤去根不 蒼朮斤 槐角半斤

右用河水一斗八升并水亦得同熬至三四升去滓溜清者再熬成膏和前藥

每兩作八圓硃砂為衣

治痢疾神効香栗飲子

丁香枚五 鴛粟殼五箇 甘草一寸 白豆蔻仁一枚 乳香子一

右吹咀以水一碗煎至半碗溫服

治爛眶風眼

宣黃連半兩 大棗肉三七箇 杏仁五十粒不 腦子字一

右一處用雪水一升砂鍋內文武火煮留一盞許以三七日以銅筋點食後臨

卧日可三四次點之杏仁去尖

華佗內照法附

漢華佗元化撰

上虞徐舜山重校

四時平脈

春弦長 夏洪一曰云數 秋毛一曰云濇 冬石一曰云沉

第二當明臟之病

從心起

其液汗心風嗜忘心風寸浮數心風成癩癩 其聲言心氣痛甚心氣寸緊心氣成

伏梁 其味苦心熱狂走心熱寸焦數心熱風狂走 其焦臭心冷死矣心冷寸沉

浮心冷成痰真心痛手足冷 其色赤心虛嗜驚心虛寸濡弱心虛成恐懼

右五般之病除虛不灸餘四種並灸心俞第七椎相去二寸二分量病輕重上

至百下至三壯一七若從起處灸之亦差餘並倣此也不須更叙

從肝起

其液泣肝風筋脈痠痛肝風關浮數肝風癩癩頸筋急 其聲呼肝氣左脇痛肝氣

關緊強肝氣風癱氣左脇妨 其味酸肝熱骨節疼肝熱關洪盛肝熱成精目赤而

骨節煩 其臭臊肝冷不食萊吐水肝冷關沉細肝冷有痰飲清風 其色青肝虛

多多恐懼肝虛關孔濡肝虛恐懼無力

華佗中藏經

附內照法

右上五般病當灸肝俞從大椎下行至第九椎夾椎相去二寸二分候本臟脈或從餘臟來當灸餘臟還量老少病若重或輕量事而制之除虛不灸也

從肺起

其液涕肺風皮膚生瘡肺風寸浮數肺風鼻塞瘡疥其聲哭肺氣成上氣噎肺氣寸緊數肺氣上喘氣膈其味辛肺熱成癆嗽病肺熱寸洪濇肺熱頭面生疱瘡其臭腥肺冷成面墨悲肺冷寸沉細肺冷右脇生癰氣其色白肺虛饒涕皮痒肺虛寸浮濡肺虛鼻中肉結生

右五般病除虛不灸餘並灸之從大椎下行至第五椎夾椎相去二寸三分若從餘臟來候當臟脈量老少輕重制之

從脾起

其液涎脾風旋重脾風關浮數脾風癱緩右邊多重其聲歌脾氣皆妨脾氣關緩實脾氣背痛久成瘦病其味甜脾熱饒睡脾熱關洪數脾熱成黃亦為三消其臭香脾冷吐水脾冷關細濇脾冷風入尺胃痰飲脹滿其色黃脾虛來欠脾虛關浮孔一脾虛心熱嗜飢嘔

右上諸病除虛不灸餘病須灸第十一椎兩邊相去四寸半季脇盡處即是隨病輕重而灸之若從餘臟來當候脈而灸之不妨藥治

從腎起

其液唾腎風旋吐酸腎風尺浮數腎風痠攣急其聲呻腎氣脇脊疼腎氣尺浮緊腎氣背脊疼其味鹹腎熱骨煩痛腎熱尺洪數腎熱陰毒時行其臭腐腎冷腰脚疼腎冷尺沉浮腎冷腰冷痺其色墨腎虛頭足痠腎虛赤脈弱腎虛多風耳聾

右上諸病除虛不灸餘並灸腎俞大椎下行至第十四椎兩邊相去四寸是內腎又夾此椎相去七寸八分斜下是外腎俞亦主膀胱俞也不妨藥治之恐不審細仍為圖記之後人背面

第三明五臟相入

肝病入心

肝風入心為癩亦或癭癭項筋急頭痛舌縮壯熱肝氣入心為痲痺氣痛甚難忍左脇下痛肝熱入心項筋急目赤舌乾少睡嗜驚恐肝冷入心為吐酸水飲食不下手足冷冷如鐵名心痛肝虛入心嗜驚惡罵燥不欲聞人語聲則叫呼右此五般之病除虛不灸餘並灸之當候之脈從何生灸之即不錯也兼服藥大段灸之當候穴同上心病入亦准上子不合傳母之逆也病即難差肺病入心

肺風入心咳嗽唾血身軀戰掉颼颼不安皮膚搔痒瘡疥 肺氣入心胸中病痛取氣短卧不安胸背痛悶不已 肺熱入心嗽逆吐血皮膚生瘡喘息籠短面赤 肺冷入心目中多淚悲思不已面目青黑色不常 肺虛入心悲啼思慕嗜驚怕怖皮膚白色

右此五般病狀除虛不灸量病輕重觀其老少斟酌用之不妨服餌
心病入肺

心風入肺皮膚生瘡白屑白癩反花癩中生結子 心氣入肺胸背熱悶胸前及背工熱結子 心熱入肺皮膚熱蒸手足煩悶胸中及口生瘡 心冷入肺雞皮白膚面無血色冠弱怯懼色無 心虛入肺啼泣悲目中冷淚鼻塞口乾悲思
右五般病除虛不灸其餘並灸當候其脈輕重老少藥性臨時制之

腎病入心

腎風入心為癩拂然而死輕則眼旋目前生花 腎氣入心為瘰癧氣動而改變為氣病面黃 腎熱入心為狂癩之病輕則骨煩名陰毒時行 腎冷入心手足冷如鐵是名真心痛甚則死 腎虛入心四體昏昏喜出汗足無力困悶昏昏
右此五般病亦候其脈除虛不灸視老少患狀斟酌不得不依
心病入腎

心風入腎脚氣熱吸無力手足骨節痠疼頭痛 心氣入腎連臍痠疼兼膀胱及腰脚痛不可忍 心冷入腎手足冷如鐵痛甚即死名真心痛 心熱入腎困不知痛處心意燥煩怨不耐痛 心虛入腎背吸吸耳聾目昏從忌嗜旋無力
右此諸病餘並灸之除虛不灸服藥量病老少衰弱斟酌候本俞

脾病入心

脾風入心嗜嘔吐頭痛眼前昏昏往往見黃黃黑黑花 脾氣入心背膊妨心中心悶悶妨滿不飲食兩脇妨 脾熱入心饒唾涕目黃疸身熱惡心變吐昏悶 脾冷入心脾中痰飲時時吐水沫脈脹不欲飲食 脾虛入心食了旋飢心中往往多熱來嗜欠卧

心病入脾

右此諸病除虛不灸餘並灸之量老少衰弱斟酌之不妨藥治
心風入脾生熱結子在肉中極則成疱瘡癩病 心氣入脾胃脾中痛自臍上至心難忍則死 心熱入脾及熱皮膚量極風消渴消中消腎 心冷入脾飲食不消背膊妨悶胃中細氣
右此諸病除虛不灸餘並灸之量老少衰弱臨時制之不妨藥治
腎病入脾

腎風入脾手足戰掉四體不安習習昏困無力 腎氣入脾腰脚背疼及胸兩脇妨
痛其隔氣 腎熱入脾饒睡困重不知痛處所在面腫浮也 腎冷入脾腰背疼及
痺脚氣疼白虫蛭虫 腎虛入脾腰脚無力虛吸吸四體困悶頑痺
右件諸虛不灸餘並任灸但且灸腎俞脾自愈

脾病入腎 肝病入脾

肝風入脾肉中生結子瘰癧疔瘡反花等瘡 肝氣入脾左右脇下妨痛甚則為
顛塊痛矣 肝熱入脾背脊上熱腫成熱癰極則成膿 肝冷入脾好吐酸水不欲
喫茶及水亦不欲也 肝虛入脾喜太息來欠咨嗟嘆煩悶擾也

腎病入肺

腎風入肺頭旋鼻塞梁疼頭重脚疼 腎氣入肺肺胸脊欲得撻嗽逆無氣力 腎
熱入肺皮膚熱痛嗽逆戰掉久差 腎冷入肺悲泣涕哭面無血色力微少 腎虛
入肺耳聾塞口乾痰疼腰膝無力

肺病入肝

右五般病除虛不灸餘並灸之量其老少衰弱輕重制之
肺風入肝嗜卧丁瘡反花結筋一聚生惡瘡 肺氣入肝百脈脹口鼻青色行卧不

得 肺熱入肝骨節腕肉生結子結後為瘡 肺冷入肝鼻目多水出淚涓涓不絕
肉帶青色 肺虛入肝常驚怕狀似法人筋中疼痛也

右工諸病除虛不灸餘並灸仍服藥勿使不慎口當候其脉勿使氣量病輕重
而制之腎病入肺無異前也

脾病入肺

脾風入肺癢嗽生瘡在腦及頭面疥癩等瘡 脾氣入肺或噎疾膈氣上喘瘦病背
膊中妨 脾熱入肺惡腫多患膿血疥癩是也 脾冷入肺反胃嘔吐胃中疼心饒
吐稀痰 脾虛入肺皮膚白色擇痒欠嘔等是也

右件諸病候其脉量輕重之除虛不灸從名四支不妨藥治

第四明臟腑相入

肺病入胃口

脾氣入胃胃中熱惡心喫飯無味鼻中覺香氣吐恬水 脾氣入胃胃中妨悶喫食
即脹滿妨勿食白麩食即發脹滿 脾熱入胃喫水多心熱面目黃色久不瘥成三
消之病 脾冷入胃胃好吐酸水不欲食心中痛久而成反胃吐也 脾虛入胃胃
好呵噫時時心悶欲食不喜食來欠多

右工諸病除虛不灸餘並灸四支須灸脾俞差但依病當量之胃俞當第十二椎

兩邊二寸三分是也

腎病入膀胱

腎風入膀胱小便無度頭旋惡心眼昏脚痠疼 腎氣入膀胱膀胱夾臍及背脊兩脇妨痛極成結氣 腎熱入膀胱小便難赤目精痛皮膚寒頭痛 腎冷入膀胱遺溺氣腰痛白虫蛸帶下 腎虛入膀胱令人無力房事不興腦轉耳鳴

右二諸病當灸腎俞及膀胱俞在第十九椎兩邊二寸三分量老少衰弱兼治之臨時而制

心病入小腸

心風入小腸腸鳴作聲或時激痛小便秘滯頭項痛 心氣入小腸令人臍下疼痛赤白痢不秘澁難痛 心熱入小腸令人渴血熱悶煩痛腸中如熱湯不安 心冷入小腸令人渴水穀不化臍中疼痛不知無計 心虛入小腸令人神魂狂亂忌見恍惚多語陶攪

右二語病當灸小腸俞第十七椎兩面二寸二分并灸心俞第五椎兼治之無妨量老少衰弱臨時制之胃中之病亦相透得病因種種不同述難盡肺病入大腸

肺風入大腸腸中宛轉間不欲食食即吐清冷水 肺氣入大腸腸中痛不已成妨

悶作聲脹滿不食 肺熱入大腸令人糞色黃稀無度而不堪近 肺冷入大腸令人腸中水穀不化名為水痢瀉 肺虛入大腸令人面色白胞內枯瘦雞皮有鱗

右二諸病當灸大腸俞第十六椎兩邊二寸二分亦須服藥

肝病入膽

肝風入膽當吐黃水爪甲及面並帶青色項痛 肝氣入膽膽脹滿左脇下痛并膊脇中痛者也 肝熱入膽目赤痛嗜驚叫呼面色惡罵無度 肝冷入膽不欲食菜如吐酸水左脇中第五肋中妙悶 肝虛入膽嗜怕懼不安饒淚哭泣面色青

右二諸病當灸膽俞第十椎兩面三寸三分老少衰弱斟酌之病有風氣相和冷熱相和風冷相和熱氣相並虛而得也因虛而風熱氣展轉通入臟腑相薰成久而不醫遂重難輕而易差便而良醫有重者而難痊謂之小手此蓋為自不識病源養之成重非醫之過也針有一月之功灸有終身之效藥通於六腑丹石通骨大而言之藥治六腑之病灸治五臟之病五臟主皮筋骨血其方內有藥重處用藥一件為治應藥脈流行無非灸道而實貫之達者思之

第五明臟腑應五臟藥名古人處方立法本自不同藥不執方旋為加減量老少虛實斟酌服之無不痊愈

心風服疎冷藥論藥性炮炙製度各名開具在後

附內照法

五

地骨皮 龍骨 青黛 升麻 牛黃 梔子 大黃 知母 瓜蒌 黃連
人參 空青 生地 犀角 黃芩
右為細末溫水調食遠服

心氣服疎熱藥

黃芪 當歸 芍藥 桂心 吳茱萸 蒼朮 陳皮 前胡 柴胡 遠志
人參 茯苓 大黃 食鹽 戎藍
右為末生姜煎去渣不拘多時溫服

心熱原缺 心冷原缺

肝熱服次冷藥

秦皮 石決明 署預 百合 黃芩 生地 黃連 天冬 姜豉 桔梗
芍藥 芒硝
右為末蜜丸如梧桐子大每服三十九丸溫茶食後服

肝冷宜服熱藥

大腹 楝榔 肉蔻 吳茱萸 桂心 槁皮 柴胡 前胡 鼈甲 華撥
姜屑
右為末蜜丸梧子大三十九丸米飲湯空心服

肝虛宜服溫補藥

白芍藥 枳殼 黃芪 吳茱萸 五加皮 人參 赤茯苓 木通 遠志
五味子
右為末生薑去渣不拘時溫服上諸藥量病輕重製之准上肝虛

肺風宜服疎冷藥

桔梗 款冬花 升麻 黃芩 梔子 芍藥 姜豉 百合 麥門冬 茯苓
括萎 署預 黃芪 加薑煎去渣食後溫服

肺氣宜服疎藥

知母 茯苓 人參 丹參 貝母 猪牙 皂莢 蒿本 黃耆 百合 大
棗 葶藶 防己 杏仁
右藥為細末煉蜜為丸梧子大每服二十九丸熱水食遠服

肺熱服疎藥

棗根皮 署預 犀角 通草 百合 黃連 梔子 茯苓 款冬花 桔梗
杏仁 麥門冬 秦艽
右藥煎去渣食遠溫服

肺冷宜服平藥

黃芪 人參 茯神 五味子 芒硝 山萸肉 防己 栝榔 柴胡 澤瀉
射干 百合

右藥為粗末生薑煎去渣食遠溫服
肺虛服溫冷藥

款冬花 貝母 升麻 百合 桔梗 麥門冬 五味子 五茄皮 地骨皮
黃連 人參 茯苓 茯苓 大黃

右為末蜜丸如梧子大熱水食遠服
右諸藥臨時候脈處其方隨時消息

脾風宜服疎藥

前胡 橘紅 人參 姜屑 升麻 黃芩 仙靈皮 五粒松 犀角 桂心
羚羊角

右為末熟水酒各半食前調服

脾氣宜服使藥

前胡 大黃 荆三稜 蟹甲 枳壳 橘紅 桔梗 吳茱萸 蒼朮 蜀椒
右為末蜜丸每服三十九丸薑湯食遠服

脾熱服疎冷藥

升麻 黃芩 桔梗 通草 百合 麥冬 桑白皮 芍藥 姜糖 款冬花
秦艽

右煎去渣食前溫服

脾冷服疎藥

姜屑 附子 桂心 吳茱萸 白朮 茯苓 大黃 澤瀉 橘紅 赤芍
防葵 干姜

右為末酒糊丸梧桐子大二十九丸米湯食前服

腎風服熱藥

黃芪 地骨皮 茵陳 石斛 兔絲子 鹿茸 單解 戎鹽 姜屑 桂心
石楠

右為末蜜丸加酒糊梧桐子大每服三十九丸溫酒食前下

腎氣服鹹熱藥

吳茱萸 桂心 戎鹽 鹿茸 茯苓 磁石 石鹽 禹餘糧 鐘乳粉 硃砂
砂許 夜明砂

右為細末酒糊丸梧子大二十九丸鹽湯食前下

腎熱服疎冷藥

梔子 大黃 石膏 硝石 甘草 葛根 麻黃 黃連 麥門冬 括蕪
芍藥 滑石

右為粗末水煎去渣微熟食遠服
腎冷服毒熱藥

附子 干姜 牛膝 杜仲 天雄 草薢 磁石 葶藶 吳茱萸 黃芪
骨碎補 鹿茸

右為末煮糊丸如梧子大三十九丸空心淡酒下
腎虛服熱補藥

天雄 鹿茸 兔絲子 從容 甘草 方須 當歸 枳壳 芍藥 草薢
吳茱萸

右為末水酒煮糊丸梧子大三十九丸鹽湯下

右諸件藥以意應五臟六腑風冷熱氣虛損量病應藥修合炮製精細詳審旋為
加減用之如神夫良醫處治用藥變應時無以為定病與藥令得復行隨其宜
製之無施不尅方分等差亦時製之但稟藥性兼識病源而不錯也凡藥有州
土採取皆有時節用有新陳擣煉合和服一切知名為良醫也又識會陰陽
之體行年本命旺相生氣禍害絕命福德天醫病之淺深量而制也是良醫知

病與藥

第六明臟腑成敗

五臟死

心絕一日死 何以知之臺眉喘迴視遲口如魚口死矣

肝絕八日死 何以知之面青但伏視而不見泣出如水不止

肺絕三日死 何以知之但口張氣出而短鼻色黑

脾絕十二日死 何以知之臍滿泄痢不覺出足腫

腎絕四日死 何以知之齒面黑目中黃腰中欲拆自汗流水

五體敗

骨絕五日死 何以知之脊痛腰中重不重翻覆耳

肉絕六日死 何以知之舌腫溺血大便赤然也

筋絕九日死 何以知之手足爪甲青叫呼罵而死

脈絕三日死 何以知之口鼻張氣但出而短者死

腸絕六日死 何以知之髮直如麻乾曲身不得者死

五證死

肉及足卒腫一證 面腫蒼肝敗不堪治一日死

眼枯陷二證 手骨并缺盆骨滿敗一日死

聲散鼻張三證 唇反無理肺敗不治五日死

唇齩齒露四證 臍腫滿者脾敗不治十二日死

氣喘語遲五證 陰陽腫不起腎敗三日死

五色死

面赤目青死 面青目黃死 面黃目黑死 面白目黑死 面黑目青死

五聲死

氣聲絕腹脹如鐵脾絕死 妄語錯亂神去死 語色散魂去身無肺死 語聲高

魂去身無肝死 長吟呻志去身無腎死

五體死

重嘔吐一體死 足重心腫二體死 手足甲青三體死 脚爪黑四體死 膝大

如升五體死

五渴

髮直如麻是血渴 足爪甲青筋渴 齒燥如熟小豆骨渴 鼻張氣促出氣渴

耳鼻唇焦黑肉渴

五傷死

五傷脈不療 房事無度傷腎 傷腎三尺脈如屋漏解索雀啄彈石 食飽醉卧

傷脾 傷脾右關如蝦遊雞足踐地魚翔 言無多寡傷心 傷心左寸足如斷索

雀啄屋漏 嗜時鹹熱傷肺 傷肺右寸夢雨之狀亦如彈弦之狀 用力無度傷

肝 傷肝左關如繫弦之狀

五不稱脈



脈大而息細死 大人脈如小兒脈死 小人脈如大人脈死 息大而脈小死


熱病而脈沉死視死 病人目上看人者死 病人目看斜者死 病人目直視者

死 病人下看人者死 病人無睛光者死

凡辨生死之法但人改常者即死矣 色聲心序但一改常即死矣

夫人者稟之法吐納之氣是也以陰陽氣造化之內而運者即手足是也與動吹變
須會逆順若逆則五氣相反若順則五氣相生是以五氣之中則主五臟之內稟五
氣非但人身瓦礫草木悉同於此藥性方術亦復如然然知之鮮矣以圖之於象合
物會之刻心思惟察深理於皮骨之內露五臟焉





Kitasato Memorial Medical Library

