

惠美君醫事談

✕
e 8

490.9
Em

No. 1379
12 e 8



富士川文庫
1021



惠美君鑿事談

富士川家藏本

淨心誠觀日四百回病以宿食為根本三塗之難苦以女人為根本
 南海奇歸傳曰治病斷食而療スル一ツ載ス或三日或四日ナド斷食ス
 水氣々道ニ附喘息腫脹スル症ニハ越婢加水苓附或木防已加茯苓ナド
 ニ石中黃ヲ一錢程加テ朝暮用氣道ヲ鎮ムニ宜シ尤塩味ヲ斷
 小兒陰狐疝ハ水氣ノ所為經絡ハ附陰囊上下ルハ治シ難シ附子或茴
 香甘遂ノ未可服○子細日小兒清炭或ハ壁上等食症輕粉白砂糖等分而
 至而小兒ニ凡ノ服ス未驗トイヘトモ可ナラン
 水腫病汗ヲ發スル者腫堅実而肌表紫黑色ヲアラハス矣腫發汗ニ宜先
 生五十斗ノ病者ヲ麻黄加水ヲ用テ發汗而治スル一有り尤日々大汗ナ
 リ

乾霍乱ハ平生之毒一時崩而尤劇症故却不吐不浮腹痛急也此病必死也吐劑ヲ入ノ候其心下堅実ナルニ能クサハケテ後可入吐薬或小塊トアルカ又毒通氣道イキタワレキ心持ノ症ナトハ不可入薬臍之症者年来宿毒胃中ニ堅固而改々上ノ積喉迫塞ル是カ爲ニ胃府シホミ愈宿毒クルイハ堅固ノ按腹スレハ臍ヨリ心下胸中へホワク怪ク如竹筒ナル者故吐劑ヲ入レハ喉間之毒少レハクツケト氏胃中ノ毒堅固スル故不浮臍眩甚シキ而モニテ死スル者也以上ハ皆四十以上ノ人ヲ云又三十歳ノ人ニテモ臍眩ヲ患アリ是ハ此例ニ非サレトモ吐劑不宜用也○喘息ノ症ハ粘痰胃中胸間ニ滿者ハ尤痰飲ノ毒ハケレキ症ナリ必不可吐也縱吐スルトモ粘痰ヲ不吐又不浮臍降之氣タ、スノ終ニハ臍眩シツイニ死スルモノ也水氣之氣道へ着キ喘アル症ニハ大黃ノ如キ浮薬ハ不宜ト可心得

葦葉汁ツケナノシルナリ大根ノ葉ヲ食イカケシニ塩ヲフリ一宿ツケ置タ、キ能モニ其汁ヲ用尤翌日ナラハ前日ノ晚ヨリ渣置テヨシ是モ改ニ加テ用

藜蘆ハ吐藥也先生未試也○香豉ハ常ノナツトワ也○猪牙皂用非吐藥能出涎沫者也臍眩モナキモノ也

臨産ノ時鹿角菜ヲ煎ノ雲母ノ末ヲ加服スル一有効是モ鹿角菜モト吐者故ニ得吐則通升降之氣故産スル也

先生ハ瓜蒂ヲ用種子按郎湯ハ毒臍間着下之不愈而腫ルハ此方ヲ用可利水○河豚之毒ニ中者藍汁ヲ以可吐深家新出者可也

先生曰食飲於色矣也世人知色慾害人而不知食慾害人可嘆可笑小兒之疳眼大人雀目等ハ皆自胃中宿毒而精血之氣運養ヲ成ス小兒ナ

ト別テ早乳汁ヲ離レテ早歲令食者多必其腹滿スル者也免南腹中ノ毒

可捌只能及可見腹部輕症毒輕也

問曰婦人妊娠人如何師曰此天道自然妙非病氣又問妊婦病惡阻如何
對曰男子一点ノ水氣受子宮經水為之留已下經水順流セサレ故ニ心下
ニ留飲ナドヲ催ス因テ上下ノクリ阻ス故ニ心下懊懷吐食又問乳汁之出
如何若曰乳ハ胃中穀氣血分ノカヲカリ一身榮養ノ余乳汁トナル又問
產而乳汁出姓ヲ乳汁止對曰產而下ノ氣通小兒二三歳ニモナレハ自然
乳汁止如何對曰產而下之氣通ス故ニ上ノ氣モ通ス水滴ノ一竅閉ト開
トノ如シ見二三歳ニモナレハ多クハ姓ス因テ乳汁モ止ハ是天地自然
妙也必此外以理不可穿鑿也後在ノ道理ニ陷ル又肺癆肺痿ハ如何對
曰皆胃口ノ病膿血痰非自肺出者自胃中留飲而成ス也必不可擬肺字
以名乱矣用肺痿肺癆ノ字ハ惡シ今吐劑ヲ用ルニ惡物粘痰胃中ノ食道
ヨリ出ス後在ノ諸論ニ迷フ一ナカレ又婦人帶下赤白之症ハ受天地ノ

濕氣而不去故ニ一身分布養榮スル血氣為之化シテ赤或白トナレナリ
其病根多有心下三味浮心如膠滑亦可服宜化毒丸也傷寒証ニテ胃實水
結之ニ症別而可見胃實ハ胃家實承氣湯ノ場也水氣結ト云ハ心下痞堅
水氣留實スル也此場合附子症多シ脈浮虛殺ハ皆附子ト可知然則舌脈
諸症ニ心ヲ可着○又胃實ヲ兼スル症ハ大黃ニテ浮下而發汗スルノ症
有ス發汗中ニ下劑兼行モ何免南表裏ハ別チ可解大黃附石湯場合見難
シ能ク可心得免南云水結症ニ至テハ見ハ難シ治モ甚六ケカシ舌ニ挾
ルアリ脈ニヨルアリ腹ニヨルアリ各心ニテ可知大野基ナル者ニテ可
知然則他ノ病証ニテモ表裏ハ分鮮スルカ主ナリ胃家實ニテ下劑ニテ
下ヲチヨト取子ハ汗出又也此道理場合ヲ能ク心得テ可治先生常ニ此
茶ヲ多用此道理ヲ以テ也皆傷寒論中ヨリ尋求ルトキ要也
一瘧ハ夏因水飲之トス者也隔日者有日發有リ水氣ヲ大ニ兼スルト少

トノ分風ニヨツテ海波ノ大小アルカ如シ疝モ水氣也彼足ナドニ蚯蚓ノ走カ如キモノハ水經絡ヘツクモノナリ
疥癩癰疽トハ遺毒ヨリ根サスト見ヘタリ先天ヨリ受ルハ骨肉中其病毒有リト見ルナリ

消渴証梅毒中伏固シテ夫ヨリ渴病為在多先生見ト云漫遊雜記ニ云紫陽花ト云フハアサイノト見君達先生云夫大小人共鼠毒一身ハ散漫スルトキハ有熱共毒中尺澤ノ二穴ヲ三稜針ヲ用テ血ヲ可取苦酒ハ酢ノト也一説ニ燒酒ノト云人アリ非也

香鼓ハ能ク臭氣ノ有物故ニ吐スルノ意アレトモ其專ナル処ハ胸ノ毒ヲ崩シ下ス能クヨキモノト可心得
梔子散甘草散トハ非吐劑試共不得吐得吐者止後服ノ語ハ皆東洞ト刪レトモ全刪者モ非也余ヲ過服セヌヤウニトノ戒ノ語ト輕見テ通

カ宜

熱入血室ニ入ナト、後世ニハ血室ヲ子宮衛脈ナト、云説アレトモ非也血室ハ魚鱗古之如鮮傷寒論ニモ言通り熱入血室ニト心得テ宜シ血室ハ總テ少腹ヲ云位ト見テ治療ノ上ニテ可也必況心而血室ニ義理ヲ行ヘカラス

生々乳ノ内ノ焔石ハ白焔焔ヲ可用芒硝ヲ用ハ非也焔硝ハ乳ヲ取ルニ焔硝スル氣多キ故ニ先生焔硝ヲ可用ト也又小兒耳タレ多出ハ独聖散ヲ少宛耳ノ中へ入レハ黃水出必小兒ヲ横ニ臥サレテ毒水ヲ可出也
唾ノ症本胎毒ノ上部ニ附テ夫ヨリ唾ノ症成ルアリ是ハ似タル症而可治然レトモ耳ノシイルハ不治小兒ノ初生ヨリ二三才ノ内心下或脇下腹底ニ塊者母ノ胎中ヨリ受ル毒ナリ此毒有ル小兒ハ驚風ナドヲ病イ多シ

一吐劑ヲ行テ不吐凡帶聖散ヲ入テ又不吐者豆腐ヲ味噌汁ニシテ食セシ
ムヘシ多ハ吐ス又上ヘ不吐下浮ノミニナル症モ有り格別ニ茶煩強ク
瞑眩甚症ニハ麩射香ヲ水ニテ可用是隨分用又カ可ナリ不得心也至晚症
トイエトモ不欲食者ニハ食セシムルナカレ水火ハ陰陽ノ重々也ト
云如人身モトヨリ有水火其水火相兼テ一身ヲ養育スル者而水ハ常形
有火無常形一身ノ寒暖ハ乃水火也兼氣而一身上下内外表裏四肢ニ至
迄莫不運養而今日朝暮飲食ヲ節ニスルニ非ハ心胸ノ間ニ爲雷飲ト腸
胃中ノ爲腐火ト諸病從之生而然共火ハ物ノ形ノ内ヨリ者スル者故ニ
先多水氣此カ爲基ト知ヘシ故万病ハ知水氣生則思過半尔云化毒ノ瞑
眩ニテ口中腐爛ナリト時昨ヲ少宛吞シムカ又含カ宜シ却而砒石ノ毒
ニ中ハ白虎加連湯或服冷水可也ヲフメントウヲ含ムモ宜也
男婦共ニ中年以上ニハ腸胃中ノ積毒ニテ腹底如石塊平生舌上黃胎黑

胎ヲ生スル者有是ニ二途有如是人新病加ハル時ハ輕病ト云ヘトモ治
ニ日ヲ引也一途ハ塊ヲ攻ントレテ攻撃スル時ハ年來因毒動而却不治
根其故固毒ニ不攝新病ノ治方許可行一途ハ痼毒ヲ攻撃スルハ根治レ
ソウナモノカヲ能ク診而後一途ニ攻撃即次手口可根治喘息ノ症ニハ
開逢ヲ用豆黃或少核ニテ時々可下開逢モ三四日下セハ瞑眩ハナレ不
爲瞑眩ヤハニ可用云云又爲瞑眩ヤハ投処モ疴旧年モ腹痛モ結毒梅毒
ノ腹底ニ痼テ腹痛ヲナスニハ開逢ヲ可用○腹痛ニ開逢ヲ可用症有此
ハ水濕氣ヲ兼タル症ニ多服茶スレモ濕毒沉痼而吐劑ナト入カレズ症
傷寒ナトニ自得吐症者是却宜也不得吐時ハ結胸トナル得吐症ニハ格
別惡症ハナキ也場合ニヨリテ一物瓜蒂ヲ入モヨシ
婦人ノ滯下ノ症ハ桃核承氣湯而順湯或香膠ヲ入ハ大概毒モ尽ナリト
欲セシ神馬草水ニ洗塩ヲ入一或目常ニ夜用也長爲愛証他病作也

霍亂吐下後足脚轉筋スル症ニハ難尿自散ニ或日スハ吐下後有此症
難治也○卷狂之症胃実ヨリ起ルナリ方石膏連甘草湯加大黃或浮心
又吐也腸胃ノ穢物ニ三有清リハ水飲瀦ハ濕飲子マキハ痰飲トス
鼓脹ハ惣身瘦而腹脹而青筋見ルハ腫ニワヤアリ力ニアリテ惣身腹内
トモニ腫タルハ水氣也鼓脹ニハ枳朮湯加茯苓或禹余糧凡其外可依症
也必不可用下劑云
淋症ハ人難通黍砂ニ或滑石一或甘五分右如常煎瀦々服スレハ有功先
師日時氣ニ舌ヒタ、ト動クハ惡症ナリ舌直難治也然有痛可治也
吐血下血共ニ黒血ハ不可吐也吐鮮血ハ即可治命門ノ或妙々俗ニ云
フホ口カヘリ病人下利則元氣惡不然氣分善者何矣是今如水滴者水滿
中則釜振不鳴少減則鳴者病人腹胃停滯甚者少減則為茶動者也可詳考
病後赤落ハ蒲黃一味瀦可敷

ヲクリカレキリハ小便ヲ利スル者也故瀦開ニ用ル也又小便閉ニ瓜樓
実ヲ未トノニ或ワ、用有効
痿痺ハ五宝丹、ヲ治スル者ト見ヘタリ
大食スル者ハ忽然身不遂者アリ是不及茶力多クハ食ヲ減スレハ愈
也
中暑霍亂者大槩兵山甫香雷散可也煩渴甚者五苓散等場合可見合乾霍
亂吐下者代來丸等テ可解不然惡又霍亂ニテ久病ニ傍治スルトアリ是
俗ニ云フモツケ調法ト云フモノ也
脈者一身之動氣也故脈皆動不動同今不同一也脈流當骨動ト言フモノ
ハ誤也凡血流行之處皆動也深者不見淺者見之難至日脈ハ陽也是ヲ以
可知伯ト過道ナリ試ニ糸ヲ以テ指テ縛ルトキハ流行スルト不能スナ
ハチ上動脈ハ呼吸ニ應ス呼吸ハ天地ノ氣以應聲也毒癘經ナト卷スル

モノハ飲食ヲ禁其故此病本膏梁酒肉ノ所生過食酒肉而停滯之甚則癩
經ヲ有ス者也○又癩生之化病ニ變スル一有是毒ノ廿ハケル也身虛ノ
ヨキ也癩經ニ有ハ隨分宜却遂毒親身意也

桂枝湯古方第一法也凡世々桂附ヲ補劑ト云フモノ過也以其勢攻邪者
也桂枝効東洞翁所謂治上衝者一偏見也桂枝表ヲ通利スルヲ爲能表裏
竅通スルニ依而上衝ヲ治スル也桂枝加大黃ハ以主通表以大黃而裏實
ヲ解ス桂枝木附ノ目当ハ骨節疼痛也是不表通故水結骨節也痛也○病
有表有其頭痛發熱項背強急治是皆モテ愈師曰天下人溺々是也夫人者
承天地之氣而生天氣參リ三才ト呼ボト一ノレハ昇降運動皆ラハ皆
病也不皆同スル故ニ參天地ノ名有天地春ニナレハ人モ夫ニ連而催發
陽氣心腹ニ微春也燥ニ至レハ又燥也人モ欲爲燥時過食而腸胃塞而或
膏梁酒肉ニ傷ラレ、爲腹心昇降ノ天地ニ戾ル故ニ解シトスレトモ天

地升降之氣シツノ押ラ居故ニ骨節疼痛腰痛ナトノ症起也其ノ廿ハケ
シトスル時葛根湯或桂枝湯ノ類ヲ以テ助追出ス也狂喘勞三種ノ庸匠
皆胎毒ト云是金言也其症ヤ狂治而爲勞死者可考一根而枝葉異ニスル
モノ也毒攻心深入曰狂骨蒸ノ熱トナル勞ト云胸ヲセムル停水ヲ喘ト
云也狂ハ心之病ト云甚妄說也心明腕ノ明ナル者廿ハリ惡ナルモノト
同シ心天地升降之氣ヲ承ラ日月ノ如シト云ヘトモ其氣病ニハ石叶也
廿ナクテハ心出病ナレハ狂ヲ治スルヲ見テ器ノ病ト云可知病攻心故
癩狂皆狂ハ不明ノ病也譬ハ八昼明故物ヲ見ルニ無疑夜ハ月明ナリト
云ハトモ不明ノ處アルカ故ニ每物有疑見人ノ見忘モ明鏡久シク曇リ
タルカ如シ故ニ其曇ヲ用心スレハ百年ノ毒何ノ難カラレ然命ハ有
之者故遮テ言ニハ非サレトモ自然理如此者也脹滿鼓脹一朝一夕ノ毒
ニアラズ故此病ヲ解スルニハ必大熱ヲ生或譫語等ヲ發シ吉凶ノ界也

脹滿鼓脹強亮小豆豉ヲ以治スル也

水香ハ香氣ヲ以心下ヲ押下効有大便閉也豆大黃ノ峻劑ニテ愈通セ又
人有此時ハ他藥ニ加水香通スルハ有

健忘之病抵当丸ヲ用タシ其故者金匱七十四救ニ喜忘者有畜血云云可
考

積氣ハ外陰之氣不順スル故也其因皆留飲也經水不順ハ飲食ヨリ生故
ニ後ニハ白物ヲ下シ能物ヲ下ス

子癎因留飲生吐方ヲ用多効ヲ得タリ
先師曰病裏症ト曰ハ藏府ニアルヤウ庸医ハ思フ誤也裏証ト云ハ病經

絡ニアル也經絡トハ則臍ヲサハケハ肉中ニ縱横ノ赤筋有是經絡也表
ト云ハ皮膚ニ限ル也藏ハ食ヲ化而其精氣ニ類也

小兒癎後脱肛強テ不可瘥也瘥ノ後十六邊ノ骨ヲ挾テ瘥ノ可也

渴証張子知曰治セント欲スレハ心盲目力耳聾力痲癱痛瘰ノ類ニ愛ス
ルナリ渴証音也聾ヤハ耳也ナレトモ痲癱ノ類ニ愛スルハ良也

併病四分六分也大陽証六分有カ陽明ノ症六分有カ〇トチラカ分而居
也合病ハ相半スル也三陽ハ併病合病ナキ也是表裏ナレハコソ合併

アル也太陽少陽モ是少陽半表半裏ニアル陽証ニハ發熱惡寒痛ナト有
合併分ニ三陽ハモハ也裏ハカリナレハ合併ナキ也合併ハ病ノ位ヲ定

メタル者ナレハ合ハ重併キノト云ヘカラス
瘧瘧先一通ハ甘連大黃湯桔梗ヲ加始終宜也惡症ニ至ラハ吐下ヲ取ヘ

儒門事親曰水病脈洪大者可治如此カワル脈且シ弦滑之症ハ必有急變
也尚猶曰百日斗婦人崩漏ノ症苦酸膠艾湯或四順湯投而不治先師曰沃

苓四逆湯ニ加浮石ヲ可服ト云依テ之暫時ヲ得全快後此分ニテ前症

治二凡三四人
瘰癧胸二毒結內攻十十凡二大陷胸丸人類隨症白虎湯十十日

玄竟 治心下痞 苦參 大黃 等分 二劑 日三服

蒼朮 治雜飲 大黃 黃芩 各八分 青礬石 四分 甘遂 二兩

白虎 氣積少腹十寸八寸痛者 硝石 大黃 三錢 各等分

大豆丸 瘡下部毒 大黃 黃柏 各三錢 巴豆 二錢 甘草 一錢

硝石大因 硝石 十五錢 大黃 二十五錢 甘草 三錢 當歸 三錢 人

松葉酒製 治脚氣手足不仁或掌急及風濕身體痠痛不已者 八日合

右三味以酒一斗漬七日日尽一合不嗜酒者隨証用之 八日合

稀涎散方 治卒厥 猪牙皂角 白卷 等分 下

松葉 三錢 烏頭 羌活 各二錢 六神 各一錢 日三服

禹余糧丸 治十腫之水腫方 禹余糧 鐵粉 蛇眼石 各等分

神曲散 治肝經濕熱小便澀滯者 神曲 紅花 大黃 各等分

芎藭散 惠義号朱鳳

苗香散 治膀胱氣痛方 苗香炒 蓬莪朮 川棟子肉 三錢 各一兩

和胃散 甘艸 羊脂 以酒送下 木香 縮砂 各六分 甘艸 三分

喉癰吹藥 且卷 烏頭 各等分 皂角刺 每服一分五厘以竹管吹之

治脾旁之方 病症大抵如疔瘰癧脈緊或細數而脈或虛數而脈或步行則動

劇或方血症或瓜甲薄或反翻或腹內有塊或無塊者名曰脾旁○病勢急初

在膈或欬甚上衝者千金半夏湯兼用○病勢緩而有膈下者無忌臧平胃

湯兼用

脾胃丸 摘名方 鐵粉一夜浸酸洗水 四兩 乾漆 燒存性 香附 各三兩

平胃散 魚鳧藏之有 平胃散 五兩 鐵粉 一兩 鐵粉 一兩 鐵粉 一兩 鐵粉 一兩

腎囊風 以三稜針穿筋 見利後 針頭大黃末 酥 三傳 意 意 意 意

紫圓 有丸散方 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山

療帝咳之方 中西主馬傳 生一足 以取大便中 入 七散 日 三 大 令 強 大 便 撥 清 水 二 洗 入

石皂 土器燒為末 糊丸 白湯 送下 此方 去 骨 熱 事 至 妙 也

照眼方 余已製此方也 不噴水 飛燒 過 等 之 製 魚 似 情 實 不 然 恐 其 業 力

故耳 滑石 二兩 水飛 石膏 二兩 燒過水飛 龜腦 一兩

蘆奇石 四兩 燒過水飛 滑石 二兩 水飛 石膏 二兩 燒過水飛 龜腦 一兩

寒水石 一兩 燒 樟腦 八分 五度燒 麝香 二兩 五厘

右八味別搗節入盞內更杵于金下而生密煉調

甲字丸 按梅瘡秘錄中甲字化毒丸有升麻水香牛黃白鮮皮共十三味分

量亦不同 雞冠雄黃 七兩 五方 辰砂 十二兩 玉乳膏 同 月日紅 十一兩 八分 穿

山甲 同 白強蚕 同 牡丹皮 十八兩 大黃 二十兩 生乳 八分

右九味為末 糊丸 辰砂 為衣 慈葶 三白 翁 所製 如此

洗目散 芩甘石 寒水石 黃柏 枯茗 四味 等分 為末

治頭瘡 經年不愈者 庚耳草 糯米 各等分

右二味 黑燒 存性 麻油 調之 塗 或 加 曼陀羅 花 實 更 妙 麻油 代 亦 凡 卜 力 凡 益

佳 金屑丸 驚風妙方 武州寺山要方 工門家方 紫花 一兩 巴豆 五方 大

黃 二方 白朮 五方 麝香 一分 龜腦 二方 人參 一方 甘州 一方 赤

Kitasato Memorial Medical Library

石脂五分 黃連二分

右細末為丸金箔為丸以後方送下

紅花 黃芩 茯苓 枳殼 柴胡 白朮 枳殼 甘草 山查

右九味細判並湯煎方送下

痲痺之藥 苦膿ヲ以甚則梅肉丸下之愈是怪証ノ内藥也

川芎 大黃 當歸 桔梗

右等分為末一錢以酒送下

刺竹木痛者小蒜麻子ノ壳ヲ煎之吞也

紫雲條之方癩毒聚上部令吸咽漫遊雜記曰梅毒鼻染欲絕輕粉諸藥不効

者

百草霜 二合麻福燒存性也

因播鳥取塚中承孫彌門ヨリ傳授ス教養切

光明丹 二錢

治喘咳方 欬冬花 百合 為末等分煉密白湯送下

治淋疾方 合歡木皮 二身 大黃 五分

右水二合煎取一合溫服

湯火傷 井口ノ貯瓦器中埋土中消尽為水以患處浸水中

治鼠毒方 井田昌祥傳 香蘇散 二身 鼠尾艸根

透膿散 便毒蜜膿未潰腫痛者 皂角刺 椹 牛膝 各三錢 芩一錢

當歸 川山甲 忍冬 離防己 各一錢半

右八味水煎服

治蜈蚣咬傷方 鷄子白黃共二咬處傳之

鷓鴣菜湯尾川淡井類母家法 大黃 青皮 樞實 桂枝 鷓鴣菜 已

上四味等分

產後陰門裂治方

靈天蓋ノ末ヲ可傳

產後陰門裂治方 靈天蓋ノ末ヲ可傳

上四味等分

產後陰門裂治方 靈天蓋ノ末ヲ可傳

蝸牛膏 蝸牛一斗 乾腦 麝香各少許 搗爛汁ヲ取り痔ニ傳ル也

首藤壽圭傳致奏効

出齒藥 石灰大 砂糖中 雄黃小 田竜先生傳

右傳患處少腐爛已腐爛者含之

口中吹藥 白舌小舌喉痺一切妙藥 黃柏 葶藶 薊豆ヤキ 鹿茸

右等分爲末吹玉莖痛ワレ又切疵吉

治龔方室行房傳 麝香 人參 穿山甲 各三分 鼠胆大則一少則二

右黑燒而胡麻ノ油調耳ハ差込丸ヲ石ヲ以耳ノ穴ヲ塞キトキニト

ニツ三ツ指ニテワシ也

治虫齒方 長雄道齋傳 芒硝 細辛 甘松 右等分包絹袋含之

桑蝶蛸丸 治男女老幼虫症及虛脫口流清涎神氣昏眩昏倦諸症不効者

桑蝶蛸爲末右一味糊丸

玉凡丹波家 治男女諸血症虛脫諸方魚鱉者 阿片二兩 尚金量 六分

右一味末丸

金丹 丹波家 治骨疼及諸般脫症產後血虛轉變不可治者

阿片一兩 木乃伊二兩 以上二味末丸以金箔爲衣三分五分或七分隨

輕重

鈴角湯 主治脚氣冲心將死者

脚氣治当熱誦外台脚氣病篇 鈴羊角大七 吳茱萸中七 木瓜中七

木香中七 紫蘇小七 商陸中七

右六味水四合煮取一合半分服

脚氣衝心冲之症專要膝下灸

右四方菽先生方

眼病赤ク爛レテ甚ク痒ク者ナリ大根ニ穴ヲ穿リ其内ハ明菴ヲ入レテ

寒世日遺テ取出シ燒テ辰砂ヲ少シ入桃色ニ大水ニ解テ度ク洗フ又毫
腦ニ昏明少シ入レテ洗フモ吉ナリ亦丹凡水モ吉ナリ

婦人常ニ大便結症ノ人ニ大黃 当飯 牡丹皮 茯苓 山椒末

右六味等分細末レテ用ユレシ
又方桂枝大黃白朮芍药等分細末

私見申候ハ六月廿一日

母道癰治 黒船町菊屋ノ長男岩四郎ト云者正月七草ヨリ癰治致シ候

処五十日斗ニシテ戰振咬芽シ或ハ口眼廻斜セシトモアリ又能ク睡ヲ

ガル或ハ頭痛目痛シ消渴甚シ不食スルト三十日斗消渴甚シキ内ハ吐

セザリシガ渴キ止ムニ隨テ吐スルト聞甚シキ時ハ血モ出シヨシキ

小右ノ諸症漸ク尽テ余程ダヤカナリレガ六月廿一日ニ承リ候処又

其節ニ度目ノ瞑眩ト見ヘテ又候吐ノ氣有テ頭痛目痛耳聾テ不食ニ顔

白ク胸膈ニ黄氣有リ虚里ノ動ナク腹中ノ動氣高フラス羸瘦ス唯食物

シテ心下ニテガラシガ氣ニ嘔ズ候又臍下ニ滯リナスモ氣ニ嘔スト

存候処七月四日四ツ時ニ死ス

伊勢傳ノ身至五用入テ十二日ノニ死シモアリ

痰吐日直下取虫 燒テ辰砂ヲカシ入桃色 月夜ニ睡ニ度々洗テ又光
肥ニ暑明少し入ルヲ洗フモ吉ナリ亦丹丸水モ吉ナリ
婦人等ニ大便結症ノ人ニ一 大黃 芍藥 蘇丹皮 茯苓 山椒末

石大味等合細末レテ用コトシ

又方桂枝大葉白朮元等合細末

和九日候ハ六月廿一日

津道無温 黒餅明菊屋ヲ長男岩四郎ト云者正月七草カト癩治致レ候
其五日斗ニシテ或候咳劇シ或ハ口眼廻斜セシテモナリ又能ク睡テ
目眩候ニ兼テ耳鳴ノ如ク入酒有テ之日天全病ノタマアリ斗消湯志レキ内ハ吐
痔瘻カカヨリニカシ能ク行出スル又ハ國邊ニキ時ハ血モ出シヨレシ
テ此ノ方ヲ用セシトハ一 大黃 芍藥 蘇丹皮 茯苓 山椒末
世世國邊ニ時時治ス一國邊ノ他ノ國邊ニモ此方毎毎ニ用テ大獲効ニ歸ル者

