

惠美寧固先生遺言
乾

✕

e 9-1

全三册

490.4
Em
1

No. 1380



富士川文庫
575

文化乙亥秋七月急寫

田友

惠美寧固先生速言

其言



惠美略説

小兒諸證

双松亭

小兒陰狐疝ハ水氣ノ所謂經絡工付キ陰囊工下ルソ
 治シ難シ附子或茴香甘遂ノ末ニテ服ヘシ
 子紳曰小兒ケシ炭或壁土ナト食フ症案雄事親ニ輕
 粉白砂糖等分ニ入レ到テ細丸少シ服効アリト云
 小兒疳眼大人雀目ナドハ皆胃中ノ宿毒ニヨリ精血
 入氣運養セシムル者多シ其腹必滿スル者ナリトカ
 ク腹中ノ毒ヲサバクベシ能々腹部ヲ見ヘシ



小兒初生ヨリニ三歳ノ中心下或腎下脹底ニ塊アル者ハ母胎中ヨリ受タル毒ナリ此ノ物アル小兒ハ驚風ナト患フヲ多者也

唾ノ症ハ本胎毒ノ上部ニ付キ夫レヨリ唾ノ症ヲ成ス丁有リ是ハ似タル証ニメ可治然レ氏耳ノ聾ナル者ハ不治ト知ベシ

小兒數日瀉利百治不愈荏苒手足至厥逆欲死先生與真武一貼而治ス

小兒嗜土或色々物ヲ食腸胃油スキテノ丁也故驅腸

胃毒藥可用消疳或紫元類

小兒疳之痛ニ後世ニ至テ紅花連堯オヲ用然モ間有効

圭枝一凡與小兒者何也老師曰明ノ錢仲陽曰大人者屬大陽小兒ハ屬小陽ト也余按ニ大人者比干小兒ハ生長スル丁遲也亦小陽ノ氣ハ發達ヲ好ム故小兒ハ生長スル速也其小陽發達ノ氣ニ随テ與主之也或鶴鳩大廣ナト加也

痘瘡ハ先一通リハ甘連將ニ吉梗ヲ始終宜シ惡瘡ニ

至テハ吐下モ取ルヘシ胸ニ毒結シ内攻ナトスルニ
ハ大陷胃丸ノ類或ハ隨症テ白虎ナドモ用ヘシ發毒
劑ナレバ參芪ヲ用ル場合ナシ桔梗ハ毒ヲ發毒スル
也

初生湯茶ヲ投スレハ鼻ヨリ出ルハ惡症ナリ葱白甘
艸杏仁ヲ与フ

初生甘連將丁子瓜根六七日而灸身種七八吐中腕之
穴各十一吐

小兒疳痢瘥後腹脹體重時々怒火易盛又能食案方

參朮各一伏如胡黃分山查三砂仁分使君三甘五分

右水煎服大便秘加大黃

初生傀儡ヲ引ケ如ク兩ノ手ヒククト動シ左ニ臍下

ヘ引ツケナトスル疔ニ千金陷胸一ヲ與ヘ紫元ヲ兼

用シテ速ニ治セシト也凡テ毒ノ胸中ニ附タルハ千

金陷胸ヲヨシトス

胡黃連ハヨク小兒胎毒ヲ解ス又五疳ニ宜ト古書ニ

有予モ亦考ニ効有ル故甘連ニ加味ス

婦人諸證

問曰婦人妊娠ノ下如何師曰此天道自然ノ妙病ニ非
ス又問妊ノ惡阻ヲナスハ如何對曰男子一點水氣子
宮ニ受テ經水為セ而ス既ニ下經水順流セサル故上
ニ心下留飲ナドヲ催ス因テ上下ノ回リ阻ス故ニ心
中懊懷吐食ス又問乳汁ノ下如何對曰乳ハ胃中穀氣
血氣ノ力ヲカリ一身營養ノ余リ乳汁トナル又問フ
産メ乳汁出ルルメ乳汁止ム小兒ニ三歲ニモナレハ自
然ニ乳汁止ムハ如何對曰産メ下ノ氣通ス故ニ上ノ
氣モ通ス水滴ノ一竅ヲ閉スト閉トノ如シ小兒ニ三

歲ニモナレハ多ク妊ス因テ乳汁モ止ム是天地自然
ノ妙用也必外ニ理ヲ以穿鑿スヘカラス既ニ後世ノ
道理ニ落ツ
婦人帶下赤白ノ證ハ天地ノ溼氣ヲ受ケテ不去故ニ
身分布營養スル血氣為化メ赤或白トナル也其根本
多ハ心下ニ有リ三味深心阿膠滑石ナト加工スヘシ
又化毒丸モ可也
熱入血室ナトハ後世ハ血室ヲ子宮衝脉ナト云説
アレ非也血室ハ論ナキ右ニ如シ傷寒論ニ云通熱

入血室ノ症ト心得テ宜シ血室ハ凡テ小腹ヲ云位ト
見テ治療ノ上ニテ可也必心ヲ沈メ血室ニ義理ヲ付
ベカラズ

男女共ニ中年以上ニハ腸胃中積毒ニテ腹底如石塊
ヲナス平居舌上黃胎黑胎ヲ生スルモノアリ是ニ二
途アリ如是人ニ新病加ル時ハ輕病トナエテ治ニ日
ヲ引クモノ也一途ハ塊ヲ攻激スル時ハ年未ノ固毒
ヲ動メ却テ不根治者故ニ固毒ニカマワスト新病ノ
治方ハカリ行フベシ一途ハ痼毒ヲ攻激スレハ根治

シソウナモノカラ能ク診メ而後一途ニ攻激メ次手
ニ根治スベシ

産后婦人禁柿者如何先生曰産後食柿則為眼病故禁
也

前陰ヨリ喪出ルニ輕粉劑ニテ治タルアリ

子痲ハ由甬飲ニ生吐方ニテ多効

婦人經水不順ハ多飲食ヨリ生ス故ニ後ハ白物汚物
ヲ下ス

胞衣不下輕キハ桃核承氣ナトニテ下ルモアリ又一

方 芒消丸 右一味水ニ杯酒ニ杯合入ニ杯ニ煎シ
ヒキツ、ケノマスレハ発熱酒ニ酔タル形出ス是
ニテ大抵下ル也又下ルニ善悪ノ二ツ有リ七日モ八
日モ或十日不下而又下アリ如此ハ夕、レテ下ルニ
悪症ハ脈細數ニ上ニツクトキハ難治也又脈モ才
ダヤカニ上ニツク氣色モナキハ六七日或ハ十日ニ
ノ振寒ヲ發シ下ルアリ此時譬如地震動也故傷寒
論ニ已小便自利者必自愈トアリ
産後ニ血不止ニハヤハリ浮心ノ類可也或ハ圭常木

甘可也

子痛ハ多ク不治也妊娠ノウチ發ル也コレ臨産ノ催
シニ因テ留飲ウコクナリ産後ノ痙症ト似タレ凡發
スル処チカウナリ腹中子病ナト云誤也子病ノヤウ
ナレ先ツ始テ瓜蒂ヲ入ルカヨレ吐劑ニテ吐ケハ則
瓜挽スルナリ時ニヨレハ千金陷胸ノ類或參能用テ
ヨシ
妊婦悪阻ハ一物ヲ畜ヘ毒中ニウコク故也症ニ依テ
何トシテモ食氣ナキハ桔白丸モ可用

婦人帶下ノ症桃核承氣一四須又ハ香膠散ヲ与大聚
毒毛尽キ歌ノニト欲ハ神馬州水ニ洗塩ヲ去一錢目
常ニ用是令变化他病ノ治法也

尚綱曰婦人百日崩漏ノ症芍福膠艾或四須一ヲ投不
治老師曰伏苓四逆加浮石佳也依而与之少時而全狀
後又投此方治スル一二三人

小林十次郎内人妊娠七月腹大如臨月心下氣滿胸中
亦不利脚膝浮腫左右之脈下最張急不可屈伸食則氣
益急迫惡凡背最寒附子淳心一日一服四服諸症頓

瘥

妙教寺内人産后腫脹數日而呼吸促迫喘滿絶汗小水
不通食不進諸賢議為必死辭去最后視之余喫之甘遂
半夏一服而痰水吐出暫時而瀉下數急漸返衆皆
愕然

丹羽善左亦門妹二十余經閉三四年肩背腰脚造煩倦
痛右最甚右之腹内痞鞭恒ハ惡凡四順加生附細辛兼
用消塊丸一棧

一婦人平生便秘心下動氣三年來頭部上熱不堪風寒

耳辺生瘡痒而難忍為瘡瘡英及鼻解毒一黃芩散
一婦人歲四十計惡露不下一年恒、患頭痛物コト気
カ、リ多或耳鳴リ或虚烟ノホリ攻テ面色時、赤ク
師三味淳心ニ本る方ノ甘露散ヲ用
婦人陰門大腫タルニ龍膽淳肝一ヲ用治タルトアリ
老師曰產后凡テ血運スル者是水氣也失心不知人等
者得吐愈不吐者隨症応吐之附子淳心一主之可秘或
天突散兼用

雜證

淨心誠觀曰四百四種病以宿食為根本三塗八難苦以
女人為根本南海奇滯傳ニ治病ルニ断食メ療スル丁
ヲ載ス或三日或四日ナド断食ス
乾霍乱ハ平年ノ病毒一時ニ動ル尤劇シキ故却テ吐
セス淳セス腹痛急ナリ此症必死ナリ
隔噎ノ症ハ年来宿毒胃中ニ堅固メタシクニ上工積
ミ喉間迄塞ル是カ為ニ胃中ニホミ愈宿毒ルイ
ト堅固シテ按腹スレハ臍ヨリ以下胸中へホソク堅
ク竹筒、如ナル者也故ニ吐劑ヲ入レルト喉間ノ毒

少レハクワロケ氏胃中ノ毒堅固スル故深セス又格
別吐セス瞑眩ヲヨキノミニテ死スル者也以上皆四
十以上ノ人ヲ云又ニ三十才ノ人ニテモ隔噎ヲ患フ
ルアリ是ハ比例ニハ非サレトモ吐劑ハ熱テ入レサ
ル者ト知ヘシ
水氣ノ氣道ヘ付キ喘アル症ニハ大黃ノ如キ深ハ不
宜ト心得ベシ
○疝モ水氣也彼足ナドニ蚯蚓ノハウ如クナルハ水
氣ノ所謂經絡ヘ付クモノ也

勞瘵癩癩ナトハ遺毒ヨリ根スト見ユ先天受ル所ノ
骨毒ニ其毒アリト見ユ
消渴ノ忘梅毒中ニ伏シテ夫ヨリ渴症ヲナスモノ多
ク先生見ト云
紫陽花漫遊雜記ニホアジサイノト云ニ
鼠毒一身工散漫スル片ハ熱アリ委中尺沢ノ二穴ニ
テ三棱鍼ヲ用テ血ヲ取ルヘシ
苦酒ハ酢ノト也一説ニ燒酒ニ作ル人アリ非也
杵鼓ノ能ハ息氣アルモノ故ニ吐スル意アレ氏其專

ラナル処ハ胸中ノ毒ヲクヅシ下ヘヲシ下ス能ツヨ
キモノト心得ベシ卮子鼓一ナト卮子甘艸鼓一ナド
ハ吐劑ニ非ス試シレハ吐スルヲ覺エズ得吐者止
後服ノ語ハ皆東洞ナドハ刪ラレタレハ全刪モ非ナ
リ菜ヲ過服セ又様ニトノ減ノ語トカルク見テ蜜カ
ヨシト云
生ノ乳ヲ取ルニ焔上スルヲ多キ故ニ可先生焔硝ヲ
用ユ

水火陰陽之微非也ト云如ク一身素ヨリ水氣アリ其

水氣相兼テ一身ヲ養育スルモノニメ水ハ常形有リ
火ハ常形ナシ一身ノ寒暖乃チ水火也氣ヲ兼テ一身
上下内外表裏四肢ニ至ルマテ運養セサルヲ無ク而
今日朝暮飲食ヲ節ニスルニアラスンハ心腎間ノ留
飲トナリ腸胃中ノ鬱火トナリテ諸病是ヨリ生ス然
レハ火ハ物秋ノ中ヨリ生スル者故ニ先多ク水氣此
ガ塞ヲナスト知ヘシ故ニ萬病ハ水氣ヨリ生スルヲ
知ル時ハ思過半ト云爾

薑葉汁ツケナ汁大根菜ノ葉ヲ食イカゲンニ塩ヲフ

リ一宿漬ケ置キ夕、キヨクモ之其汁ヲ用エ、尤翌日
用エルナラハ前晚ヨリ漬置キテヨシ是モ豆豉代ヘ
ルナアリ

藜蘆 吐薬也先生未試ト云ヘリ

香豆豉 常ノナツトウ也黑豆豉黑豆ニテ製ス綱目

ニ出ツ

猪牙皂角 吐スル物ニ非ス唾沫ヲ能ク出ス扱也瞑

眩モ格別ナキモノ也

河豚ノ毒ニ当ルモノハ藍汁ヲ以テ吐スベシ漆家物

ニ出ス扱ヨシ消毒中ニ吐スル薬品ヨロシ藍其品也

問曰肺痿肺癰ナトハ如何對曰肺痿肺癰皆胃口ノ病

膿血痰肺ヨリ出ルモノニ非ス胃中留飲ヨリナス所

ナリ必肺ノ字ニヨル可ラス以名実ヲ乱ル肺痿肺癰

ノ名ヲ用エルハアシ、今吐劑ヲ用エルニ惡物粘痰

皆胃中食道ヨリ出ス后世ノ語諦ニ迷フナ勿レ

虚ハ其因水飲ノナスモノ也隔日ノ物有リ隔二日ナ

ル有リ水気大ニ兼ヌルト少キトニヨル凡ニヨリテ

海波ノ大小有ルカ如シ

傷寒ノ症ニテ胃実水結ノ二症ヲ別テ見ルヘシ胃実
ハ胃家実承氣ノ場也水結ト云ハ心下水痞堅水氣留実
スル也此場合附子浮心ノ症多シ脉浮虚数皆附子ト
知ヘシ然舌脉諸症ニ心ヲ付テ心得ベシ又胃実ヲ兼
タル症アリ大黄ニテ瀉下ノ發汗スル證有又發汗中
ニ下劑兼テ行フモアリトカク表裏ヘ分テ解スヘシ
大黄附子石膏ノ場合見ヘカタシ能ク心得ヘシトカ
ク水結ト云症至テ見エカタシ治モ甚ムツカシ舌ニ
ヨル有脉ニヨル有腹ニヨル有各心ニテ知ヘシスベ

テ他ノ病ニテモ表裏分チ解スカ主也胃家実ノ症ニ
テモ下劑ニテ下ヲチヨト取ラ子ハ汗出ヌアリ此道
理場合ヲ能ク心得テ治ヲナスベシ常ニ丸散兼用多
クハ此道理ヲ以テナリ〇傷寒ナトニ自ラ得吐症ア
リ是ハ却テヨシ不吐時ハ結胸トナル得吐症ニ格別
惡症ハマレナリ場合ニ依テ一物瓜蒂散ナト入レル
モヨシ
先生曰腹痛ニ芩連ヲ入レル症アリ此本濕氣ヲ兼夕
ル症ニノ多ク服葉ストイヘ氏溼毒沈固シテ吐劑ナ

ト入レラレヌ底ナリ 関逢之瞑眩口中腐爛ナドノ
時酢サレツ、吞ガヨロシ熱テ砒石毒ニ尚ル時ハ白
虎加連或冷水ヲ服ル可也ラフメントヲ合モヨロシ
打鍼ノ説内経ニ見エズ本朝御園意齊ト云人始テ行
ナリ意齊得打鍼之妙行也只非刺鍼以之病ヲヒバカ
ス尤妙也自是世之人習行也彼意齊本禪僧之後改爲
意齊用打鍼ノ一ヲ始ナリ此
桔梗能瘡腫ヲハリ出ス一甚妙也咽喉痛オニ用ルモ
亦如此咽腫ヲ脹出シ潰出嗅味ヲ出スモ皆桔梗主治

こ吉更ハ堀タテヲ用テ佳トス故ニ苦梗ト云生ハ甚
メ尤苦シ仲景ノ吉更爲排膿一オ皆是苦梗也今世ニ
用ユル處晒シテ効少シ故ニ調合ニモ桔梗ニ姜甘草
ニ分ホドニテ可也仲景ノ分量苦梗タル一明也詳可
考排膿一ハ瘡腫ヲ推出シ膿ヲモタスニモ用ユル也
樺皮カハサクヲ本草木曾ニテハカンハト云無尽在
徒木用ヒタリ道ニモ用ヒタリ毒ヲサバク扱ナリ
金匱胸痺緩急者薤苳附子敗漿散胸字尚周字本字薤
苳條下周痺緩急偏者薤苳大戟條下曰時珍云痰涎之

為者隨氣升降無不至入于心則逆竅而成癩癩言安
見入于肺則塞竅而軟唾稠粘喘急皆冷入于肝則留飲
伏而成胸痛乾吐寒于筋骨頭項胸背腰痛手足牽陰隱
痛陳無擇三因方并控涎丹主之殊有奇効此乃治痰之
本水也溼也

一狂婦自舌頭ヲ缺ニテ五分計切血流不止衆医束手
芍干血忽止後里皮ノ如キ物出狂治レタリ甚可考也
狂喘勞三種ヲ庸医皆胎毒ト云一リ是金言也其病也
狂治テ勞トナリテ死スル物ニテ可考一根一ノ枝葉

ヲ嬰ニスル者也毒之皮心深入日狂骨蒸ノ熱トナル
ヲ曰勞攻胸停水曰喘也狂ハ心之底ト云其妄説也心
如明鏡明ナル物其明ナル者サワク悪クナルトクモ
ルト同シ心ハ天地升降ノ氣ヲ承テ日月ノ如レト虽
其暑病ニハ不叶也サナクテ自心出ル病ナレハ狂ヲ
治スルハズナシ狂ノ治ヲ見テ暑ノ病ムト云テ知病
攻心故に狂皆狂ハ不明之病也辟言ハ昼明故ニ見指
無疑夜ハ月明ト虽不明ノ處アル故物毎ニ有疑老人
健忘モ明鏡久シクシテ曇ルガ如シ夫レ故ニ其曇リ

ヲ用心スレハ百年ノ壽ハ何ソ難カラシム雖然命天ニ
アル者故シイテ謂ニハ非スモ目前理如此者也
脹滿鼓脹一朝一夕ノ毒ニ非ス故此病解口ニハ必生
大熱又或謔語ヲ発ス吉凶ノ界也脹滿鼓脹絶穀小
豆蘆ヲ以テ治スル者アリ
脈ハ一身ノ動氣也故ニ脈動皆可同今不同者一也脈
流テ尚骨動ト云ノ誤也凡血ノ流行スル所皆動者也
深者不見淺者見也難經曰脈陷也以是可知陷ノ過道
也試ニ以絲絡指則不能流行乃止動脈ハ呼吸ニ応ス

呼吸者天地之氣也凡ヲ以違也

毒癰腫才ヲ療スルニ至テハ飲食ヲ不禁其故此之病
本膏粱酒肉之所生過食酒肉而停滯之甚所癰腫発ス
ル者也又癰生セズノ他病ニ変スルトアリ是毒ノサ
ハケル也身ハ虚ノヨキナリ癰腫ニ酒肉ヲ欲スル者
隨分宜是却遂毒身養ノ意也癰家不可禁

中暑霍乱者大抵吳山南香需飲可也煩渴甚者五苓散
才場合可見合乾霍乱無吐下者ハ代東丸才ニテ解可
不然患レ又霍乱ニテ久病モ傍治スルトアリ是俗ニ

謂モツケノ謂法ト云也

大食之人忽絶身不遂スル者アリ是不及食ニ食ヲ減
メ多ク治スル者アリ

仙人艸ハ口中ノ子ニ妙也故ニ淳心或胎胸ニ加テ用
可也

堤子曰產后未胞衣下而上ニ衝キ臍キ唾沫ヲ吐スル
者多死者也

老師曰瘕癥ハ玉宝丹ニテ治スル者ト見エタリ

又曰オクリカンキリハ小便ヲ利スル者也故ニ復閉

ニ用ルナリ

又曰小便閉ルニ瓜棗實ヲ末ニメニ錢ツ、用テ効ア
ルト覺エタリ

又曰虫ハムシタツ氣ヨリ生ス故ニムシト云ナリ
又曰五月ニ虫或ハ葶藶用エルハ諸虫ヲカル治方

難經三十難ニ注曰榮行脈中衛行脈外猶水沃之於川
滄風雲之於大虚云々以是外降之一氣所連感通

病後虎落者蒲黃一味霽ニ而可敷

老師曰潔癖者素心包胎毒之汚物有テ夫ニ相感而起

居也ト見ヘタリ

溼未登者ニ瀧用者有虽然安ニ不可用也又溼ハ腸胃ノ鬱熱薰蒸ナリ治方有烏ヲ用者烏ハ食糞故同氣相求テ腸胃ノ毒ヲ解ス

俗ニ曰ヒセシ瘡ハ多ク愈又内ヲ強テ不可攻先右ノ間場合可見合

病人下利則元氣憊不然則氣分善者何矣是今如水滿中虽振不鳴少減則鳴者病人腸胃モ停滞甚者少減則為苦動者可考病毒一杯積テ有故ニ及鳴病毒平人大少レニテモ減スル片ハ鳴ナリ

便黄色者脾胃属土凡在土地者大便黄也鳥禽類者多ハ其屎白何鳥飛空中而然天属金白故其糞白

老师曰舌疽難治虽然有痛可治也手懸リ有リト云吐血下血ニモ黑血ハ不可止也吐鮮血者即可止皆矣余門之穴妙也俗ニ云脐カヘレ也所謂鮮血未去

時氣ニテ舌ビク動クハ惡症也

病人死テ後身不冷者辟言湯ヲ盤ニ入レトモ一通リノ湯ハ忽冷至テ熱湯難冷是死後不冷モ又如此病熱鬱甚者難熱下云者也

津液トハ唾モ小便モ大溲水溲モ皆津液也。和則溲トナリ、或唾凡十九ナリ、内経曰膀胱津液之府也。身順還之氣和則膀胱ニ聚リ小便トナル也。皆異ニシテ本一液也。其メクリワルケレハ水氣病ナドニナル也。勞瘵或痢疾ホ一家内及ク病ハ其氣ニ達ト云フアリ。故ニ他家一別分病ヲ除クハ如何是同席而長話スル者也。人噫則衆人如噫一人立則衆人如立。未噫語他身則不噫。是轉氣故也。察或痢也。相感而病者亦如此可。

詳考

老師曰吐前者朝自己時前为佳。下劑ハ多申時为佳。古書曰春夏可吐、秋冬可下也。日躰心氣躁、食氣不收。又曰勞瘵ノ病ハ父ノ精母之血ヨリ白苔タル毒アルト見エタリ。虽然兄才甲病乙不病モアリ。考ルニ、寧ノ群生スル中、抹夷、啖而加有他事不能長揚而槁者、也是真難治病也。医業不能治病也。

積氣者、升降之氣不順スル故也。其因者皆面飲也。麻疹ハ二十四年而流行也。其徵ハ内経ニ天蒼龍星二十年而必見ル。此時必患麻疹也。予是ヲ考ルニ、果ノ流行ス

ル也然モ其氣ヲ考ルニ天ノ運行レ所為而難謂如何也全ク天ノ變化ナレハナリ譬ハ冬ハ霰雪ナド降り春ハ春雨トテ降ルモ皆天地间ノ妙用也疫病傷寒モ皆同内経ニハ丹痧トアリ医断或ハ諺曰子コトニ皆腸胃不通升降アレキニヨル也便毒欲生始股内累ニ結核アルニハ国木一アレ、必為魚口瘡形難治先袖麴未鳳可服人鼻有不聞息氣モノハ腸胃通又故也故ニ内経曰凡六腑不通ハ腸胃ノ閉塞也

手ノ爪甲白クカケルハ氣道行届又ニヨツテ也如何トナレハ人家ニテモ風通又処ハ蜘蛛ノ巣ヲハルト同動気悸ハ氣血ノ滯リ也心下ニ限ス有滯処ハ皆動気アルニ健忘ノ症ニ抵当丸用多シ其故ハ金匱七十四放ニ喜忘ハ有畜血也ト可考大陽病項背強ルニト云ニ是飲食美味過度ノソレヨリ心下痞塞レ降ノ氣下へ通ハ又故上部ニテ降ノ氣通ハ又故項背強ソレヨリ少黒クナレハ心痛

或胸腹苦滿ヲナスニ譬升降ノ氣ハ凡ノ如シ凡吹ト
云無樹ノトキハ吹ヲ不知也病モ如此心下ニ障ル者
血キ中ハ項背強或苦滿ホノ患ヲナスニ升降ノ氣ヨ
ク通スレハ何ヲサレテ変ト覺ル處ナシ
病深入干裏者不可吐下譬山中如有枯木橋木直置
時ハ不山摧病モ又如此者深キ者ハ頻ニ吐下則精氣
可能勝而死也如此者医之有精察者也病ノ裏症ト云
へハ臑府ニ有ヨウニ庸医思フハ大ニ誤也裏症ト云
ハ病終絡ニ有ル也終絡ハ則魚ヲサバクニ肉中ニ縱

横ニ赤ノ筋アリ是則終絡也表ト云ハ皮膚ニ限ル也
臑ハ食ヲ化メ其精氣ニ養ハレビクノト升降ノ氣
ニ隨テ只動テ居ルモノシ
脈ノ升降ノ氣ニ因テ動クノ扇ニテ燈ヲアラグガ加
シ分ハ真武湯用メルヲアリ振寒出レハ必ヨキ者也
善症ト虽隨分下ス具ハセ子ハナラヌ其ウヘ下ラ子
ハ右ニ通り六七日ニ下ル也産後ニ過三日ハ麋爛メ
下リ難シトイハ一既ニ云レス蝦蟇瘰ハ難治ナリ
急症アル也白散ナド用テ可也

渴症死子和曰渴症治セント欲スルハ必盲目耳聾
或疥癬痺瘰ノ類ニ変スル渴症骨龍耳ノ類也変ハ惡
シ疥癬ノ類ニ変スルガヨシ

酒客病ナト心下有水気喘ナドニハ葛根連文トヨシ
葛根ハ水ヲ通物ナリ

頭汁ハ胃中ノツマリニ結胃ノ症ナト見ヘタリ

隔症心下ヨリ累トノ如擧クカサ子タルヤウナル
ハ惡證也又舌上紫色為班者又ムツカシ

脚気衝心ニハ擅誕丹可也

閉蓬麻凡病不可用驅毒甚強故又テアシ、
金瘡者逐瘀血ノ劑可用四吸或桃仁承氣或鹿頭散ノ
屬可也

脱肛不可愈ニ病人憂脱肛而驚ヲ食頓愈後発軟嗽
而如勞瘵而死

君達先生曰炙甘草トハサシ吐血モアリ虽渴白虎ト
モ虽用亦葛根圭支ノ屬モ虽用此症ニ用得効多大法清
酒入テ可也但不入ノ用テモ可也

霍乱吐下ノ後足脚轉筋スル症ハ雞屎白散ニ或目程

用絶テ吐下ノ後有此症ハ治シカタシ
儒門事親水病脈洪大者可治如此ノカアル脈ハ宜シ
強滑ノ脈ハ必有急変モノナリ

惣テ傷寒論ニ傳文注文續入難助有別傳ハ左傳如々
傳上ノ文ヲ下ニ承テ上ヲ解ス心ノ文也總テ古今ノ
文例皆如注ハ真ニ後人ノ註文本文ニ混入シタルモ
ノ也挽入ハ後人也ヲ補入シタルモノ難助ハ有モ無
キノモノ所云也重複ノ心也

二三章剛瘧柔瘧ト云ヘ凡瘧ノ形ヲトカス是至六章

ニ詳ニ瘧ノ形ヲ解ク是前ノハ序言ノ意也

茶ヲ鼻中ニ入ルヲ治方本治方瓜蒂ヲ鼻中ニ入ル是
ハ目溼頭痛スルニ此治方ニテヤ、得効也

傷寒瘧濕喝如何先生曰是邪氣四時節候ニツイテ病

状異ナル故ニ先此ニ四時ノ邪氣ノ下ヲ參ク瘧ハ産

後凶血或金瘡ナドノ影レタ出血ノ後ニ牙関禁急角

弓及張ノ不省人事ナノ瘧則瘧病也破傷風ナドノ瘧

ニモアルニ先生此ニ先年与豆林酒治一婦云々亦一

婦產后如此ノ症投荆芥湯汁大出而得全効云々右ノ

二方ハ本艸綱目ニ見

豆非酒方黑豆見合醇酒ヲ以煎テ再服但リ腫ハ

荆芥伍 荆芥穗右一味酒ヲ以煎再服

先生曰熱越トハ自辛始テ熱ニナルヲ云熱越出ルノ

意アリ

鼓脹ハ總テ瘦テ腹計脹リ青筋浮ミツヤアリ又リキ

ニ總テ腹内共ニ腫レタルハ水氣也鼓脹ハ枳朮一

加伏苓或禹余糧丸其外症ニヨルヘシ必不可不劑云

喘息ニハ吐劑不可用ト云

中風ハ笑哀トモニ一ツニシルヘシト云

越婢ノ石膏ヲ尚曰石膏麻黄ニ連シテ汗ヲ發シ表ヲ

解ス故ニ小水ヲ通ス石膏逐肌水氣ノ意也

腸胃ノ穢物ニ三ツアリ清ヲ水飲濁ヲ溼飲子バキヲ

瘳トス

曰盜汗氣血脫落盛ナル故ニ出ル也又苦汗ハ病ニ困

メラル故出ル也冷汗ト同シ

曰癡狂之症陽明ノ胃実ヨリ起ル也方石連甘州湯加

將或浮心又ハ吐劑

滑瀆ノ脈胸中ノ病也人身ニ氣道穀道ノ二筋アリ
桂支一ハ古方亦一ノ法也凡世ニ圭附ヲ補葉ト云モ
ノ誤也其證據ハ圭支ノ煎汁木伐リ項灌之則枯ト云
果如言故ニ以其勢テ攻邪者也圭支ノ効東洞謂治上
衝者ト是一遍ニ見也圭表ヲ通利スルヲ為能表氣豁
通スルニ由テ上并治スルニ圭支加將者以圭支通表
將ニテ裏實ヲ解ス圭支水附ノ目尚テハ骨節疼痛也
是表通セ又故ニ水結骨筋痛也
病人干表者有リ其頭痛發熱或ハ項背強治此皆汗出

而愈師曰天下人皆病ニ此ナリ夫人ハ承天地ノ氣而
生シ天地參リ三才ト呼ホトノナレハ并降運動皆
テハ皆病也不皆同スル故ニ象地天之有名天氣春ニ
ナレハ人モソレニツレテ催發陽氣心腹ニ微ノ春ナ
リ秋来レハ又秋也故ニ天氣秋来レハ人モ欲為秋時
何レナレハ過食メ胃腸ニ塞テ或ハ膏粱酒肉ニ傷ル
カメ腹心并降ノ氣天地戾ル解ニトスレハ天地
并降ノ氣レワ、押テオ儿故骨節疼痛ナドノ病起ル
ナリ其サバケントスル処ヲ葛根湯或ハ圭支一ノ類

ニテ助追ふス

補黄ハ血ヲ回ラス者也ルサラレハ吐増ス志ト見タリ
白散ハ結胃大満自尚也白丸大抵同白丸ハ外土ノ方也
五寶丹輕粉ノ分量ハ毒淺深ニ依テ見合七分或一钱
或二钱

青黛散五雜俎ノ方治吐血衄血主治口中牙甚ノ痛或夕、レ血出ん

考也

伏苓飲 主治水腫小便不利者或脚氣腫滿衝心者
消石大圓 主下消膿並痰血治膈腹中積塊

鹿頭散 治打撲瘀血皮中ニコモリイル者ニ良シ

惑思散 婦人経水不順時々小腹痛ム者良シ

梅肉散 疔毒耳鳴手足痛下部ノ小痰等用他薬ヲ時

々此薬ニテ又ク

赤螺散 火逆乃渴者或久年ノ腹痛スル者臨朮ヲ服

秘也

破飲丸 小兒驚風痰涎壅盛者ニ良シ

禹切丸 水腫大小便不利スルニ宜シ

神馬丸 瘰癧潰乱膿出積年不治者

朱涯

滯食塞_キ態胆代_テ疴用者有_{胃中}必吐

無炒異

凡_テ痛_ヲ治_ス古渡_{ヨシ}銀山_産也

左金丸

小兒咳嗽_ニ炒也_煽煽_ノ霜_同之

