

越見實我謨爾爾先生經驗輯彙

✕
e 21-1

492
Er

No. 1473
18 e 21-



富士川文庫

2639

越兒突表誤尔兒兩先生經驗輯彙卷之七

目次

胃管症率操壅閉治驗

舞蹈病自驚駭未之治驗

小兒眼焮衝

初生兒眼焮衝

月經壅遏眼焮衝

心胞絡水腫

眼病用

葶藶丸用

胆液過量ニ属スル諸病ニ莨菪ヲ用ル治験

癩病ニ藍殿ヲ用ル治験

乳腫硬腫ニ莨菪根ヲ用ル治験

初生児之眩暈

兩脚麻木不仁之治験

益酸金塩口臭之病ニ用ルノ説 治験三章

諸筋搐搦目眩之験

股脚水腫用加印加治験

全身水腫司里胆液者莨菪試験

莨菪劑治顔痛之験 偏面痛ニ用ル

脚麻亞尔尼加ヲ用ル之験

麦奴治子宮出血之験

肛門血試験

剌性心悸動塩酸金塩試験

痛風用石炭油之験

倭麻須斯眼嫩衝亞尔尼加花ヲ用ル之験

病疝与柔功明ニ唯澄大血管之疾患終ニ返

去スルノ験

破傷風腐蝕灰塩ヲ摩擦シテ治スルノ験



此疾通者... 凡患此疾者... 宜用... 此藥... 功效... 凡患此疾者... 宜用... 此藥... 功效...

此疾通者... 凡患此疾者... 宜用... 此藥... 功效... 凡患此疾者... 宜用... 此藥... 功效...



セリ其後半歳ヲ経テ以来四肢衰弱ニ漸ク舞踏
 病ヲ発ス○適當ニ劑ヲ用ルノ後月経再ヒ整列
 ニ来ルヲ得タリ然レモ前症仍持久メ止マズ
 ○之ニ由テ鉄ノ片板ニ挺リ各々手掌ニ握ラシ
 ム毎施ニ其症返キ之ヲ持重ニ行テ由テ全ク
 治セリ○
是ヲ以テ青酸亜鉛半匁ヲ取リ一貼トナシ二三四回一時半毎ニ之
 ヲ用テ増ノ一匁ニ至ル此法ヲ行フテ四週ニ至テ全ク安静トナリ下腹麻痺ス
 ルヲ以テ屋外ニ出テ散步スルハ杖ヲ以テ歩行ス此劑四回毎ニ用テ逆送
 香油ヲ下腹ト背推ニ摩擦ス之ニ由テ全ク健康ニ復ス

小兒眼焮衝生齒時ニ於テ皆眼赤チテ
 此症小兒生齒時殊ニ甚ク多血ナリ者ニ於テ眼
 トノ発見ス是ハ此症ハ身体生育旺盛ノ旺期ト

血液頭ニ聚積スルヲ来ル者ニ於テ眼目赤色
 見ハス
 治方
 後下劑頭ノ寒菴法脚浴ニ交テ又微量ノ其承
 内服令心中ハ疾漸ク消散ス○然レモ慢性症ト
 方リ八日間ニ消散セシムル者ハ屢其原因ヲ腺疾
 ニ資シナリ是ヲ以テ腺疾眼焮衝ノ治法ヲ施ス
 可也
可也
 本論ニ於テ眼焮衝ニ關シテ其症ハ眼目赤色トシテ
 其初生兒眼焮衝ニ關シテ其症ハ眼目赤色トシテ

此症ハ痘毒眼焮衝ニ有リ眼瞼ノ焮衝ニノ危険
ニ屬ス又眼球共ニ焮衝シ粘液ヲ流出スルヲ野
ク其色黄様ニシテ縁且ツ血ヲ交ヘ兼テ驚口瘡ヲ
呈見スル者ハ殊ニ危険ナリ唯是レ良医ノ手ニ
於テ治療其時ニ当ル中ハ救フ下ヲ得タリ則チ
微候及経過
初生児ハ善ク服ノ感傷ヲ受ル下アリ故ニ真眼
焮衝ノ感傷症トヲ區別スルヲ必要トス
一爰ニ云フ焮衝眼ハ焮後第五日ヨリ第三週
ニ至ル迄多ク一眼ニ見ハシニ三日ヲ過ル人後

後夕他眼ニ及フ者ナリ○此症多クハ桑子館指フテ種ヲ
育スルヲ云殊ニ核核ヲ察案子館ヲ云フニ於テ之ヲ見ル
都府ニ於テハ之ヲ見ル下尤モ稀ナリ唯清潔ナ
ラサル卑賤ノ者ニ非ル自ハ之ヲ見サル所ナリ
一ニ焮衝ノ時ニ三日警笛已服赤色ニシテ蓋明ス
然則ニ於テハ眼瞼腫脹墨僕膜粘液ヲ分泌スル
下鏡クノ眼中ニ封閉ス○眼ノ括約筋死後スル
ヲ以テ上瞼懸垂シ又強テ瞼ヲ啓クニ外反ス
其眼球黄色膿様ノ物ヲ被覆ス其注ニ
第三粘液ヲ流出スルヲ數日若クハ數週ノ後完

熱ノ安静ナラズ多ク啼踊ル角膜草膜嫩衝ト力
リ遂ニ潰瘍ニ變シ光彩及ヒ水臭液モ膿潰破裂
メ失明ニ至ル○良性症ニ於テ幸ニ角膜ハ白點
葡萄腫腫子端因テ遺ス者アリ○此眼嫩衝ニ於
テハ全身ヲ侵ス下痢カラスト多ク遂ニ羸瘦ニ
劣療熱ヲ発大斃ル下之アリ○
誘同
晩後直チニ侵襲スル乳ノ老母母ノ白帶ト寒冷
湿润ノ氣卑温ノ居室身体ノ不潔祖傳ノ處置一
種ハ傳染毒殊ニ葉子縮ニ於テ傳染毒ホ之ヲ屬

○律私多欲ハ強健ノ小兒最モ乏カ素因ヲ有ス
ト云フ伐尔的兒ハ腺様ノ質ヲ棄タル弱性
小兒最モ乏カ素因ヲ胎スト云フ良科
治法
患者羸瘦セス且フ惡液質ニ非ズ透眼ニ有カ
療法ヲ行フキハ疾ハ日間ニ消散ス否ハ三週
ヨリ數週ニ及ス者ナリ○粘液ハ流出減少シ其
色白クノ酷后太甚ナラサル者ハ良徵ナリ
第一疾ノ始ニ於テ左ハ劑ヲ眼中ニ注射シ又布
帛ニ醃シ眼上ヲ蓋メ俾知アリ

升汞一匁 蓋留水六匁 阿芙蓉水製越我好二十匁
 右調勻用之臨下食匙ヲ取出壺内ニ煖
 之ノ前ノ如ク供用ス
 茅二此諸劑ニ由テ疾域損スル片ハコトト水
 ニ竜腦精少許ヲ加ヘ用テ又重鉛花溶解劑ヲ用
 フ可シ
 茅三微温湯ヲ取り軟ナル海绵ニ潤シ細心ノ目
 ヲ眼中ノ粘液ヲ刷去ス可シ○又身体ヲ清潔ニ
 為シ清燥ノ大氣ニ觸ルルハ百ノ光ヲ避ケ暗室
 ニ就シム可シ

茅四疾ノ始ニ於テハ諸ノ眼水菜害アリ疾數週
 ヲ歴ルハ後我那並ヲ多ク用ルモ全ク消散セサ
 ル片ハ白降朮ニ家猪脂ヲ和シ膏ト為シ用テ其
 刺症ヲ愈スニ効アリ
 茅五尋常ノ症ニ於テハ内服薬ヲ要セス熱レ氏
 數週ヲ歴患者羸瘦スル片ハ左ノ方偉効アリ
 大黃舍利別 桂支水 麻瘋退矢亞
 右能ク混和振蕩シ一服毎ニ一食ト宛テ与フ
 ○又女母ニ我那並液ヲ飲シノ良効ヲ奏セリ

第六眼膜の嫩衝眼球ニ及ヒ鞏膜赤ク角膜曇暗
 ト乃リ小兒健康ニ未タ八日餘ヲ歴サル中ハ
 水蛭ニ三條ヲ置キ尔後升汞加阿芙蓉劑ヲ用ヒ
 終リニ至リ左ノ劑ヲ互換ニ施ス可シ
 皓蓉ニハ 玫瑰 接骨花水各半 阿芙蓉半多
 右混和温用ス
 又方
 「ラビットデヒニキユム」アリユキ子ハ「ラチ」ハハ莖留水四
 亞刺比亞護漿半多 吉電阿芙蓉液半多
 右混和供用ス

第七大黃麻瘋濕矢更々下劑及ヒ升汞金硫黃ヲ
 合劑芙蓉膏ヲ稱用スル人多シ然レ此諸劑ハ
 初生兒ニ適當ナラサル者ナリ
 第八眼ヲ牽掣スルヲ粗ク眼膜外反スル者ハ其
 内面ニ阿芙蓉液ヲ塗リ精細ニ手術ヲ行ヒ再々
 自然ノ位置ニ復サシム可シ
 第十月経壅遏眼嫩衝
 此症ヲ分テ急性慢性ノ二ト為ス
 急性症眼目衰弱ナル者到キ胃寒ニ由テ月事ヲ

壅道スル由ハ速ニ其症ヲ悉ク其嫩衝到列ニ赤
色著ク羞明疼痛ス任験ニ後フニ眼ノ諸部速ニ
侵ナルノ症ニ適眼ノ療法ヲ怠ル由ハ膿潰ニ
復シ嗣テ眼ヲ荒蕪スルカ故ニ尤モ危候ノ症ナリ
治法 巖ッ防燠法ヲ行フヲ要ス即午大ニ刺絡シ水蛭
脚踏蓋気浴清涼下利防燠熨生木ヲ緊要トス其
慢性症ハ是レ危候ニ非レ凡頑固ノ症ニメ太
夕赤色ヲ見サス静脈腫ノ如ク見ヘ且又結膜腫
脹スル下著シ眼膜外反スルヲ稀ナラズ緊大云

ハハ甚ク煩ルキ症ニハ週毎量到老下力壅道
スル虫ニ眼期ヲ以テ週毎ニ列察ス
進テ四週毎ニ列察ス
治法 月復壅塞ノ治法ヲ要ス事壅塞ノ考
諸刺戟利ヲ
避ケ新汲水ノ寒葢漏法ヲ施シ静脈腫脹ヲ乱刺
シ又刺甚ハ時ニ方テハ水蛭ホヲ帖ス
一男子年五十七胸部ハ疾患ニ罹リ心蔵ノ部
壓迫隨重ヲ覺ヘ大ナル煩悶ナリ其煩悶言語及

心 仰臥右方ニ臥ス寸心殊ニ増進ス常ニ心胞絡
液中ニ於テ心藏波動ス心カ如キヲ覺テ心藏
鼓動ハ別ニ充實スルヲ覺ヘス然レ心ノ部
ニ手ヲ按スレハ又鼓動寛柔ト虫凡障碍スヘカ
ラサル勢アリ譬ヘハ其ノ鼓動一軟物ヲ隔テ、
按スルカ如シ○眩暈窒塞ホノ端症ヲ流楚ス睡
中屢々驚悸ニ屬シ煩悶スルニ由テ安眠スルヲ
能ハス小便香濇ス○セレアリハ人ノ説ニ随ハ殊
諸症ハ心胞絡ノ水腫ナルヲ疑ヲ入レス○余實
芟荈利私ヲ用ルニ小便分泌多量ト虫凡此危候

ノ患苦少モ臧却セス之ヲ以テ心胞絡ノ水腫ニ
アラサルカト疑フ○コレトニナルト疑ニ上
諸症及ヒ心動ニ由テ心胞絡ノ水腫ト胸水ト誤
認ルヲナカレ又動脈アリウレトト區別シ難
ト故ニ余動脈アリウレトニ有ラサルカト惑疑
ス然レ動脈アリウレト固有ノ諸症殊ニ病危發及
ヒ脈動ノ不存見存セス○又心藏ノ病的ニアラ
サレカト疑フ然レ余初メ利尿劑ヲ用テ小便分
泌増進ス再ヒ不投サレハ不利ス其後兩臂浮腫
ス以テ心胞絡ノ水腫ナルヲ格定シ○日手正

月二週ノ間患甚ク心臓破裂スルカ如キ者覺
ル日月廿二日ニ死ス

○又翌日女屍ヲ剖観スルニ心胞絡中絶ヘテ水
腫ノ徵ナシ而シテ心臓ト心胞絡トナキモノ如シ

眼病用^{遠志ノ類}セ子カ^ラヲ治験

一工夫齡三十八粘液煩胃寒ニ由テ左眼ノ結膜
嫩衝ヲ免ス。民間ニ於テ通例用ルル処ノ數般ノ

眼水皆効ナシ其症好カラサルニ由テ病ノ所十
四日ニテ^テテ^レニ^テヲ^拓ク。○結膜脈ニ血萎入ノ症

眼病用^{遠志ノ類}セ子カ^ラヲ治験

脹シ羞明アリ涙流出シ眼中外^レ如^キ如^キヲ
覺フ脈數ニノ頭重シ之ヲ以テ刺絡シ眼傍ニ水
蛭ヲ施シ朝夕脚湯ヲ行フ。○外部ハ大麥煎汁
以テ屢々洗シ下劑ヲ内服ス。○并三日病院ニ未
ル^ル嫩衝著ク減ス然レ洗劑及ヒ蔽ナル撰生ハ持
長ス。○嫩衝多ク減スト至レテ結膜少ク赤色眼中
無痛疾退カス約ノ之ヲ云ヘハ嫩衝爰ノ慢性
トナル。○又ヲ以テ^テロ^レテ^レニ^テヒ^テ膏ヲ上^レ膜
ニ擦入ス皓膏ヲ加ヘ用エ皓膏ノ量ハ次^ニ増
スヘシ頃ニ芫菁膏ヲ貼ス。○此方ヲ行フ^テ三週

ニノ寸効ナシ却テ角膜ノ外ニ班ヲ生ス患者不信向ニシテ我僂ナルニ由テ其班増進ス○ホ
アシモシ各如此病ニ大ニ稱用スル処ノ薬剤ヲ
丹シズルニ由テ其法ヲ用テ其方
セ子カ振示五分 右一景一日ニ内服ス之
服スルニ八日ニノ良効アリ十七日ノ後班八十
ニ八九ヲ消ス唯角膜ニ薄キ濁リヲ残ス人ニ
患者曰ク「セ子カ」ヲ用心ノ間眼力前日ヨリ強止
一患者歳十七辭格甚ク健康ニ曰テ多血粘液痰

千八百三十四年ヲクハルニ世六日ニ病院
ニ来ル此ヨリ以前冒寒ニ由テ右眼火ク燃衝ス
○燃衝ハ益発気ヲ催進スル薬剤及ヒ根生法ニ
由テ退ク○患者終夜歩行スルニ由テ再発ヲ招
ク○翌朝眼傍腫脹シテ眼ヲ開クニ能ハス羞明
ノ痛ニ刺スカ如シ涙流出シ○防燃衝劑ヲ用テ
病治ス○三週ノ後患者再ヒ病院ニ来ル今度ハ
慢性燃衝ト角膜上ニ幅廣キ班アリ○頃ニ発泡
膏ヲ貼レ「セ子カ」ヲ内服ス患者発泡膏ヲ用ヒス
ト金氏發茶第七日ニ於テ残病漸ク退ク并ニ

目ニシテ曇暗全ク消散ス
 胃ノ症率ニ嘔吐ヲ合併シ劇甚ノ痲痛ニ苦悩ス
 其症再発ス之ニ由テ胆石ニ非ルカト疑フ然レ
 未タ之ヲ確定スルヲ不能數月上ノ症延展トシ
 特長ス一般ノ景况危険ニ至ル乃チ食気全ク亡
 シ滋養ノ食ニ不堪肉食ヲ大ニ嫌惡ス身体甚シ
 ク羸瘦ス睡眠スルヲ不能軽ニ尿管熱発ス小便

渾汚各濡躁ノ周圍寒腫ヲ現ハス○壯腹ヲ按ス
 ルニ壞腫午ニ觸スト虫疔鳩尾ノ部位ヲ推セハ
 肝藏破裂ノ部ニ当テ惡ムヘキ疼痛ノ知覺アリ
 ○此病ハ肝藏左裂ノ腫脹ナルヲ明瞭ナルカ故
 ニ左ノ方ヲ与フテハ^喘ホリ^リアトタル止^葉葉蒲公
 英^右右^{ラウ}ラウ^リル^水水ニ溶^シ用^ニ此^劑効^ヲ奏^セサ
 ルニ由^テ又^左左ノ^劑ヲ^与フ^ニ葉^若若^根根^大大^黃黃^ニハ
 右ノ劑効較著也然レ一兩回嘔吐痲痛再発シ
 前ニ比スレハ後輕也遂ニ其症消散シ消食故ニ
 後ニ食思モ亦生シ黑色ノ大便多量ニ漏泄シ熱

及之彼人腫而解散之六週人后其患者健康ニ復
スニ其ノハハ散解ニ至ニ其ノ前婦ノ前身婦
ノ一婦人較著ナル胆汁過量ノ症ニ系リ此症ニ刻
ノ間持久シ刻ニキ頭痛ヲ兼子此頭痛ハ胆汁過
量ヨリ屬発スルノ明晰也○稍滋養スル食更
ヲ啜下スルハ一二期ノ后心下部位ニ痲鞭用重
ニ苦悶甚シク且ツ膨滿シ○次キ忽チ頭痛ニ其

頭痛六時或ハ久シク持久シ患者ヲ苦惱セシ
大量ノ胆汁上ニ走リテ吐トナリ或ハ下ニ走リ
排除漏泄ノ利トナリ却テ解散大如ク因難苦惱
ス由テ冷白ノ食ヲ用ルニ至ル是ニ由テ患
者自ラ身体衰弱ノ食料ノ足サレテ覺ルカ故ニ
滋養ノ食ヲ用ヘサレテ得ルニ至ルト至
之ヲ用苦悶ノ増進セシテ忍ルカ故ニ患者大
ニ苦心セリ此患者ニ於テ胆液ヲ泄除スルノ后
ニ非シハ煩惱ノ頭痛止マサルヲ以テ吐劑或ハ
下劑ヲ用ル寸ハ病悩稍軽快セリ○如ク病狀

於此ハ身体ノ滋養著クハ缺損シ患者實ニ羸瘦
正ニ常療ヲ究セシトスルニ至ルハ此人排洩
劑ヲ服用スル下如此常習トナルニ後テ病患愈
増進シ吐下劑ヲ多服セザルヲ得ザルニ至
ルニ試ニ固性強壯ノ諸薬ヲ以テ胆汁諸器以此
抗激ノ病情ヲ変革セシメトスル時ハ毎ニ却
テ宜カラズ○此患者治ヲ余ニ乞フニ至テ余之
レニ吐下ノ劑ヲ用ルヲ禁シ而塩酸ヲ主用セリ
之ヲ用レハ病患稍軽快シ良効ヲ奏スト虽氏唯
阮生ノ胆汁ヲ泄除スルカ故ニ此ニ的當スル而

已ニ大胆汁製造ノ常處ヲ失スル及ヒ能ク服
食スル処ノ諸物ハ此胆汁ニ変化スル処ハ壓止
スル丁能ハス○病漸ク度悪ニ進ニ諸薬効無キ
ヲ以テ終ニ菘菘根ヲ試用セリ此薬肝臟一種性
ノ効カアル下ハ余カ屢歴験スル処ニ在リトワケ
也菘菘根一ハ大黄五ハ右個均散トナシ毎夜一
服ヲ頓服セシム之ヲ用ル下ニ三日ニハ病者早
ク已ニ此薬効アルヲ覚ヘリ飲食尚化日ニ進後
良ニ胆汁液質成造減少シ病者漸多量食量ヲ用テ
之ニ堪ルニ至ル○備考ノ頭痛モ本症ハ快後ス

心下日夕善途ニ向ヒ交許日ヲ過ルノ后病者容
 負ヲ望ムニ羸瘦減シ面色鮮花ヲ現シ身体ノ榮
 養著シク旺盛スルヲ稱スルニ至ル。此茶連用
 スルハ二月唯斯分量ヲ減セリ此後ニ至テ患婦
 已ニ平常ニ復スルヲ告ク然レモ頭痛或自他前
 ノ諸症稍発現スル時ハ前劑一二包ヲ用ヒニ至
 心腹ヲ治ス。其後亦在治中其茶連用ニ至
 心腹下痛ハ此ノ病相ハ驚恐ニ地獄ノ苦茶飲
 治ス。癩癩ニ蓋澱ヲ用エテ治験ハ其後連用
 一箇エセテ其後ニ至ル者齡三十歳身体強康ナリ

従来頭ノ潰瘍ニ罹ルノ外健康ナリ。○其後過多
 ノ滋養物ヲ食スルニ由テ多血トナリ血液壓迫
 ノ症ニ罹リ三歳ヲ過ルノ所其症分離ノ血ニ
 由テ退ク其血春秋ニ必発セリ。○前年秋良
 養ナル血止ムニ由テ頭胸ニ血液割リ壓迫
 頭痛壓ルカ如ク眩暈昏冒ヲ発シ此トノハ全ク
 意識ヲ失スルニ至ルニ至テ食糧缺乏シ大便
 不利此ノ症ハ血液頭ニ壓迫スルハ過度ナルヨ
 リ常ニ発スル者ナリ。○十二月ニ至リ癩癩ノ症
 発スト至此上ノ症状ニ誘因ヲナスニテテス

○癩癩一発スル后十四日ヲ過キ弟二ノ発作来
リ其後暫時ヲ過キ弟三ノ発作ノ終リニ至リ日
ニ三度発スルニ至ル○翌年二月ニ当テカリテ
地ノ病院ニ治ヲ乞フ患者上ニ記載スル処ノ疾
患ニ苦ミ脈沈ニノ稍疾舌上白様ノ苔アリ食気
少ナリ大便甚ク遲滯リ言結行歩スル中ハ神経壓
迫セラレハハハ心微ス○刺絡ヲ行ハ若硝吐酒
石ノ溶解劑ヲ行フ其後患者軽快ヲ覺ヘ○次日
非常ノ劇キ癩癩発作ス然レ上ノ下劑ヲ二週間
持長スルニ由テ発作減少ス○二月二十九日ヲ

リ藍殿ト芳香劑ヲ一茶匙以テ用ル日ニ三
四之レニ由テ不吐大便ノ通利増進セス亦飲食
消化却テ支ル処ナシ○二十八日弱性ノ発作一
次来ルマ、ヲ以テ藍殿ノ量増加シ煉茶を料ト
ナシ日ニ一テニスワ、○消化機ノ疾患ヨリ食
欲減シ痙痛下利ヲ発ス○然レ藍殿ヲ持長スル
ニ由テ其症速ニ退キ唯大便日々ニ六行或ハ八
行下利スルノニ熱レ其下利食欲ト生カトヲ
害スル下ナシ○三月十二日ニ至ルマテ癩癩輕
症一二度発作ス其後絶テ発スル下ナシ○快後

ヲ窮ニカノ三六月ニ至ルマテ藍殿持長スルニ
五月六月ニ於テ分離ノ兆アリハシ全ク健康ニ
後ス

乳腫硬腫 莖莖根ヲ用心治療

一婦人舐格端小ニノ嬌柔年朔十三歳ニノ十四
歳ノ男子ニ配合ス嫁セシ后忽チ子宮衝逆ノ症
ニカ、ル苛ノ発見セル月經通利不整然モ三
期ニ至リ妊娠ス遂ニ男子ヲ容易ニ分娩シ其兒
体負甚ク小也ト云滿月ニノ生活ス此婦人而乳

太ク膨脹セズ其他身体ノ形状其乳兒ニ乳スル
トヲ禁スト云自ラ乳セシト欲ス故ニ此婦人分
娩ノ后三三日ニ乳セシ后乳内孔力如キ刺衝ヲ
覺テ始メ其刺衝劇烈ノ疼痛ニ増進ス○乳ノ周
圍腫脹シ已ニ十二日ノ后摩ニ推シ或ハ哺乳ニ
由テ一点ノ汗ヲ漏泄スルヲ不能而乳一種ノ
障カヲ失セシ其表面指ヲ以テ推スニ凹陥セズ
此極赤色ヲ帯ヒス然モ顔面其他身体ノ皮下ノ
如ク灰色ニ四肢寒冷舌苔ナク一食セノ下劑ヲ
服スルノ后大徳通利ス脈小数ニシテ緊ヲ帯フ○

病床ニ於テ苦悶シ轉々及例ス乳中ノ疼痛劇裂
ニシテ此患者一兩回眩暈ヲ発スルニ至ル胸部壓
迫頸筋ノ痙攣ヲ合儀ス○予此患者ヲ診スル前
一箇匣戸油ヲ摩擦シ菜梳カミルニ裸麥粉ヲ以
テ蓋隔ス又匣戸仁ノ巴布ヲ用シト破ス○上人
諸瘡ニ於テハ此藥品ノ方神経統系ノ著シキ真
奮ヲ緩和シ殊ニ疼痛ヲ減退スルノ要方ナル下
疑ヲ容レズ予ハ此症ニ「ラレキ」ルノ混和劑的
當トシ疾速ニ効カヲ奏スルヲ希望スヘカヲサ
ルニ由テ左ノ劑ヲ与フニ此藥液ニ此藥液ニ

莖莖根ニル
六ラウサト山ニ水ニ
テ山ニ水ニ
此水劑乳ニ摩擦シ「ラレキ」ルニ又半眠ノ間被ノ后表
皮稍赤色ヲ現ハシ患者著シク輕快ヲ覺フ身体
安靜眩暈発越セリ琴弦ノ如キ脈搏次第ニ減退
シ○患者「アトテ」ルノ臭気ヲ嫌忌ノ頭痛ヲ発ス故
ニ「アトテ」ルヲ去リ「アル」工トルヲ加入ス○疼痛
減退スルニ隨テ乳腺ノ硬腫モ亦解散シ十三日
ノ后漸々トメ治愈シ十四日ノ后患者病勢ヲ離
ル

初生児之經驗

模氏ノ一小児少婉後年八日顔面白色様ニノ羸
瘦ス千八百二十八年十二月十日予之ヲ診スル
ニ文症左ノ如シ身伴羸瘦陰茶色ナリ三日以來
屢々嘔吐シ脈疾ニシ小眼目灰白色頭四肢共ニ
寒冷嗜眠スルモ呼ハハ能醒覺ス綠色臭便ヲ通
スルヲ饒多ナリ速ニ羸瘦衰弱ニ至ニトスル
病発前三日迄ハ小児十全ニ健康ナリ悉シモ
湯色ニク病発ノ骨ニ於テ年少ニク灼熱ス。其
母二十六歳ニシテ既ニ流産スルヲ三回身伴羸瘦

灰白ニシテヘトステリ山ニ罹ル又小児タル既
倭病ヲ患ヒ許嫁ノ期ニ至テ天突不須ナルヲ致
年夜夕暮黃病ニ罹ル。此患兒「マ」クフルウエ
ニクナルヲ診シ得ルヲ以テ刺私烏私人法ニ
從テ左ノ如ク行フ
○罌粟煎ニココロシウハリクイキユムヲ和シ与フ
芳香菜ニ葡萄酒ヲ加テ腹部ヲ温蒸ニ温巾ヲ以
テ背ヲ摩擦シ精輝ノ微温浴ヲ行フ
○右ノ方法ヲ行フ後諸症輕快ヲ得嘔吐止ニ元
ト灰白ニシテ知覺鈍ナル顔面今赤色ヲ顯シ治滯

トナリ緑色ノ大便復メ帯ノ如ク黄色トナリ諸
カ速ニ復ス○終ニ至テ^{...}五カ
沙列布溶劑ニ大黃丁数少許茴香水ヲ内服セ
^{...}ニ鉄浴日ニ三此行ハシム^{...}
○予女母ニ余ノ他ノ乳母ヲ以テ養フテ嚴リ命
スレモ母肯セズ○此患見ヤ十ヶ月ニ及テ迄
其母ノ乳ヲ哺シ消化極少シク缺損ニ且ツ便秘
ヲ疾ムノ外總テ健康ニメ齒牙發生ニモ亦患ル
如ナキカ如シ○千八百三十年四月ニ至リ注意
メ哺乳ヲ禁リタリ○上ニ云如人諸症ハ初生兒

ハ分曉後日ニ於テ屢之アル如ナリ○同年四月
下院ニ至リ注意メ哺乳ヲ禁シ唯輕キ乳製ノ食
餌ヲ以テ養育セリ然ルニ^{...}八日^{...}恐驚ス
ヘキ^{...}ニ侵襲セラレタリ
○其症速ニ羸瘦シ大腸引致貪餐シ脈疾ニメ嗜
眠嘔吐太シク便秘ノ常慣今ハ緑色黄色様ニメ
粘稠ノ便ヲ通スルカ故ニ余大ニ恐怖ス是ヲ以
テ芳香ノ區活ヲ行ヘコロヒウムリクイテユムヲ
用ルテ四日ニシテ効アリ又葡萄酒ヲ用ルテ
十三時ニメ一時毎ニ一茶ヒヲ与テ

諸症著トク快復ス。○翌日後夕嗜眠ス在ノ方ヲ
与ルニ六服ニシテ患者益快復ス。○
甘草半斤 茯苓半斤 芍药半斤 白朮半斤
白糖名六分
用右昆和シ調勻シ一服半毎ニ半服ヲ一服ヲ
石矢ノ急ニ速ニ服ス。○
大便燥烈已據ニ大粒ノ干シキヲ嚼ル子ルノ人
干ニツセトシテ赤葡萄酒ニ和シ五倍ヨリ八倍迄用
ル下日ニ三次ニ患者復テ全ク快復シ至ル。
六月廿四日至此迄赤葡萄酒ヲ用ル。○

蓋テ西脚麻木不仁人治蹟也。○
一男子歳十八。○心付山并夜ニ衰弱シ却年秋時
ニ脊椎攙四搏腕足脚羸瘦禁立ス。○十五歳ニ夜
ニ兩足トノ广本不仁ス。○由是足脚ニ自由ノ運
動ヲ失シモ十寸丁不能足脚寒冷削瘦シ急氣発
越モ太女ナリ。○大概三年ノ間運動セズト至ル
飲食ニ消化善良ニ足脚ノ疾患除ク外健康
住適ナリ。○父母茶セナルニ由テ自らホシ人
此ノ病院ニ至リ内薬及外薬ヲ服スレテ少シモ
効カヌ不見即チ外薬ハシ香木系茶トシ子ニ焙鉄ホ也

○是ニ由テ「ヤト」ハ此氏ニ治ヲ乞フ「ヤト」ハ此氏
アルカ根ヲ用ヒ漸次ニ増加メ毎日一列ヲ用ヒ
ニ至ル○此亞兒尼加根ヲ用テ牙齦腫ニ屢痲痛
ヲ奈起シ血ノ如キ者ヲ漏泄シ裡急後重灼熱箱
頓才ク催起ス之ニ由テ諸酸硫酸精糖ヲ大量ニ与ヘ
垢酸凝水石ヲ服用セシム○凡ソ六週経過ス後
此藥ニ堪ルヲ得此藥ヲ用ヒシ后八週ヨリ初テ
兩足ノ麻痺善達ニ赴ク見ルニ即チ兩足ノ知覺
増進メ蟻ノ行クカ如キヲ覺ヘ又患部ノ溫暖増
盛ス○九週ニ至テ一日換官憲書ヲ持シ父母ノ

罪ヲ鞠問セシカガニ未ル四是此患者錯愕トシ
床上ニ坐スルヲ常ノ如シ○換官未ル既其父後
園ニ在テ室中ニアラス由テ換官未ルヲ告ニカ
ガニ兩足ノ麻痺ヲ意トセス室中ヨリ出行歩メ
欲ム○二三年歩行スルヲ不能今ヤ垣壁ニ從テ
匍匐且歩行シ父ニ告ルヲ得タリ○此ヨリ患者
景况愈々佳境ニ進ミ亞兒尼加根ヲ止メ四週ノ
後四半眠或ハ半眠ノ間歩行ヲ試ムルヲ得足
脚ノ滋養知覺モ亦増盛ス

指頭ヲ津唾ニ天固ニ菜末ヲ着テ上唇内面ニ
 擦ルル下日一次或二次ニシテ用ルルハ二十四
 ○大人癩瘰性ノ鼻腫知覺饒敏ニ火燄衝以希キ
 者ハ火燄衝ヲ膏トナシ用テ塩酸金塩ニ家猪脂
 三手ヲ右昆和膏トナシ豆大ヲ取り膏ニ当テ
 鼻孔ニ摩擦ス○内服法十ニ多ク或ハ十二多クニ乳
 糖ニハヲ和シ一包トナシ指頭ヲ深ッレ上顎ニ摩
 擦スル下日ニ二三吹○塩酸金塩ハ口中上顎鼻
 ニ一種性ノ効カヲ待ツ物アリ
 一 小女「フ」ナル者九歳鼻腫腺ニ嬰リ其症復

硬ニメ光リアリ腺病ニ用ルル処ノ菜劑ヲ用ルル
 多シト虫少シモ効ナシ○此ヲ以テ余塩酸金塩
 一ニ分ルヲ散劑トナシ正文ニ又日劑ヲ軟膏ト
 ナシ筆ニテ鼻孔ニ擦ルル朝夕二次○此療法ヲ
 行フハ后其鼻腫減シテ自由トナル○此塩酸金
 塩梅毒諸症ニ強試スル下ハ他書ニ論スル故ニ
 此ニ贅セズ
 一 婦人齡五十二歳壞液病ニカ、リ子八百三十
 三年慢性ノ眼腫燂衝ヲ患ヒ悪性ノ潰瘍ニ附シ
 天見心カ如ク眼腫赤色也○此眼疾極永失鳴答

一貴婦名折年五十歲屢冒感ノ毎ニ耳聾ヲ病ム
 終リニ泄瀉ヲ得諸藥効ナク一年半迄不治患者
 肉食ヲ禁 續肉ヲ食スル片ハ女泄瀉甚クシク又
 屢ニ腹痛ヲ兼発ス予ニ問ハズ及部醫治後屢試
 之亦效ナク又補劑新舊試シ亦無効ニ至リ
 此年肢脚水腫用ア任ニカ治疎 疎於ニ試シ亦無効
 ○一婦年三十四肢脚ノ水腫ニ罹リ皮膚及脚足
 ノ部水泡ヲ生ス泡中赤色ノ液ヲ含ム○下肢泡
 至ス冷寒尤豆ノ餅把ヲリ外踝ニ達シテ痛ニ甚
 シ○食欲缺夜ニ渴每夕又腹中苦ム処ナク消化

蒼長ナリ患者自ヲ思フ大ニニ身體ヲ勞動シテ
 脱汗山直子ニ密中ニ入ルニ在ルニ二三晝由テ
 此病ヲ得ルト○病発ヨリ是ニ至リテ凡ソ六月
 ノ間夕湯菜皆断テ○七月廿九日カノカカ
 與テ藥ヲ服スルニ始メ其後ニカカカカカカカカ
 氏治カノカカカカカカカカカカカカカカカカ
 右丸トカカカカカカカカカカカカカカカカカ
 吐ス故ニカカカカカカカカカカカカカカカカ
 テキリステトルトカカカカカカカカカカカカカ
 便七行アリ其夜小便夥ク通ス○左肢水腫軟

ナリ八月朔日二日ハ利尿鏡多ニシテ右股脚
著ク端瘦ス。左右ノ脚共ニ本然ノ脚ニ後ス只
左足ノ脛及踝ヲ固テ微腫残留スルノ如ク。日月
三日カヘシカエキスヲ三十氏モリステトルル
為ニ用テ水浮十行アリ痲痛アリ利尿頻數ニ
患者暫モ尿知ヲ留レ得ス已ニ然云ト並氏左足
ノ痛尚休マズ幸ニ甚ニキ惡臭ノカラムヘ水
アリテ豆皮膚ノ水腫全治スル迄退散セス。○月
月五日ヨリ八日ニ至ル迄カヘシカエキス三十氏
ニ屢ニキリステトルル為ニ用テ水浮七行アリ

痲痛ナシ利尿ハ分量甚多シ。○鏡テ次日ヨリ
ト健固ニ後シ而後カヘシカエキス三十氏ヲ屢
ニキリステトルル為ニ用テ水浮七行アリ
テ赤痛ナシ利尿ハ分量甚多シ。○鏡テ次日ヨリ
ト健固ニ後シ而後カヘシカエキスヲ用スト並
モ水腫ハ必ス全ク消セシ故ニ只コトニ
鏡ニ後ニ神経痛ヲ療スルノ如ク。○九月七日歩行
シテ痲痛ヲ覺エス數日ナラステテ病院ヲ辞ス
○一婦人四十五歳下支水腫ヲ行テ能ハス全足
冷ヲ覺エ食欲アリ尿ト如渴アリ消化惡ク大便

雖小便各三ノ赤色或ハ焰ノ如シ○如是諸症在華
 タル下凡ツ二年熱氏体質少モ損セス○此病ヲ
 究メル原因ヲ探索スルニ知ル可ラス胸腹諸感
 ハ共ニ女自然ヲ得○五日十一日カハカ加末一
 支ヲニツニ今午用ヒ盛効ナシ十二日十三日一
 ヲ一包ト方シ用エ十二日ニハ尿ヲ利スル下多
 ニメ且安シ女夜モ亦是ノ如シ十三日利尿続ヲ
 多ク大便初テ通ス○股脚ノ大サ微シク減ス○
 十五日カハカ末ニ支ヲ服ス大便夥ク通ス○
 下三行痲痛ナシ利尿増進ニ脚腫減少ニ膝ノ

重々
 甚重
 甚重
 甚重

動キ容易トナル○十七日十八日廿日廿二日毎
 日ニ支ヲ用テ排泄持長シ消化器損セス○股脚
 ノ腫続ニ減退ス○廿四日又カハカハキス世
 氏ヲ与テ水浮十行アリ利尿甚ク夥シ患者步行
 自在ニナリ尚方ナト腫方ニナリ○廿六日數月
 閉止ス止処ノ月経来ル是ヨリ婦婦等ニ来リ産
 病状ヲ告ク○廿七日又前方十二ハヲ用エ廿日
 一ニ時半同月経尚アナ○甚ク久ク歩行スル
 由テ膝ノ周圍及方ナト又腫起ス○前葉十六ハ
 ヲ用テ又腫再ニ散消セリ○水腫ヲ再発ヲ防グ

乳腫 硬腫 莖
若用 治 莖 有
宜也

力力信勝三至此近不とり口以状ノ縛帯ヲ施ス
○六月十四日病婦来リ大病人全愈ヲ謝ス
○一夫年七十慢性ノ肝癩衝ニ黄疽ヲ染ス其病
弱ハ甘黍異効アリ自承ハ患者ノ頑固ナル大病
ノ之ヲ治ス分量ハ削ク一カニ至ル少シ味流涎
十日又齒齦ヲ患傷ト信ニ奇ナリ廿六日
全兆八日會到社行ハ其味亦甚ナリ患
○一婦人侏儒少ニシ嬌柔年紀十三ニ至テ十四
歳人男子ニ合蓋ス嫁セリ其病ハ
○一婦人年七十慢性ノ肝癩衝ニ黄疽ヲ染ス其病
弱ハ甘黍異効アリ自承ハ患者ノ頑固ナル大病
ノ之ヲ治ス分量ハ削ク一カニ至ル少シ味流涎
十日又齒齦ヲ患傷ト信ニ奇ナリ廿六日
全兆八日會到社行ハ其味亦甚ナリ患

中々年不為安給淋濁ノ後場男建并ヲ指シ持女
流中節瀾亦兼取衆道皆也自受帝恩國天許由
輕重ノ差辨也○如病染染候更些田病者ハ所後
中々年不為安給淋濁ノ後場男建并ヲ指シ持女
流中節瀾亦兼取衆道皆也自受帝恩國天許由
輕重ノ差辨也○如病染染候更些田病者ハ所後
中々年不為安給淋濁ノ後場男建并ヲ指シ持女
流中節瀾亦兼取衆道皆也自受帝恩國天許由
輕重ノ差辨也○如病染染候更些田病者ハ所後
中々年不為安給淋濁ノ後場男建并ヲ指シ持女
流中節瀾亦兼取衆道皆也自受帝恩國天許由
輕重ノ差辨也○如病染染候更些田病者ハ所後
中々年不為安給淋濁ノ後場男建并ヲ指シ持女
流中節瀾亦兼取衆道皆也自受帝恩國天許由
輕重ノ差辨也○如病染染候更些田病者ハ所後

○一貴婦年五十粘依質作括屈盤肥滿ノ致短リ
胃テヨリ月経ヲ見ス兎ヲ生マス○己ニ累年未
腸胃積滯ノ症ニ罹リ喘息常習トナリ肺燥衝ノ
症ニ屬シ罹リ二年前純性ノ肺燥衝ヲ患テ愈エ
○千八百三十年再ヒ此病ニ罹リ一種ノ烈烈ノ
頭痛ヲ兼候ス○此病暴烈ナリ然レ的当ノ術ヲ
施シ肺藏皮膚皮腎藏諸通ヨリ予ニ週ノ終リニ
向テキリシスノ排洩ヲ為スト虫トキリシス十

多ナラズ○気管粘液膜ノ感傷胃積滯ヲ諸症持テ
シ尚且諸症益峻悪ニ進ム○予四週ノ半ニ当テ
舌根ニ腐敗壞黒色ノ粘液被覆スルヲ見ル○後
性ノ解熱下劑ヲ服シ食欲故ニ復テ睡眠スルヲ
ヲ得熱減退ス然レ喉嚨黒色ノ舌胎精神大劑キ
昏冒尚延辰ノ八日ノ後假性ノ倭麻痺私性ノ眼
燥衝発起スシ迄持長ス次日此眼燥衝大低解散
以テ然トノ腺病一種ノ感動ヲ持来ル○大抵全
身ノ腺其患ニ罹リ唾腺胸部ノ腺腺下及合縫腺
養液管ナヘモ腫脹硬腫疼痛熱ヲ帯ヒス然レ名

状大へカテハ心憂悶不楽ヲ覺ユ大湯食道ニ煩
 燒ヲ覺ユ舌胎黑色ナリ○此諸症ヲ察メ考証
 此症ハ胆汁ヲ現存ヨリ持来ルナルハ故ニ
 莖苕根一公ヲ聽用ス此茶多ク腺疾ニ効カヲ達セ
 ニカ力ニ甘汞金硫黄ヲ配伍シ朝夕服用セシム
 ○此ヲ毎月稍多量ヲ懸布状ニメ黑色ハ便汚漏
 洩ス女漏洩ニ吐瀉ニ引老ノ煩燒ヲ覺テ且ノ諸
 症俄ニ減退メ五日ノ後唯其諸症微々トシ殘留
 スルノニ○腺疾ノ感動モ大抵解散シ煩悩ト咳
 嗽及ヒ渴モ亦減メ只舌根ニ黑色ハ胎稍滯留ス

此ノニ○流涎ハ兆尅見スルヲ以テ甘汞ヲ廿リ
 莖苕根金硫黄ヲ持童シ用ニ○系六週ハ終リニ
 痘状ノ疹顔面及ヒ四肢ニ発シ其疹一二日ハ
 後膿膿ト次テ忽チ乾燥遂ニ女疹消散スルト共
 ニ患者十分ニ健康ニ復ス○此患者以前ニ此ハ
 シハ身体異ニ佳ナルヲ覺テ喘息及ヒ腸胃諸
 症モ又前ニ比スレハ減却ス
 莖苕根治顔痛之效 偏面痛 野橋密馬滿先生
治験
 ○一女子五ニリトナル者歳廿六歳半面痛ニ罹リ
 千八百廿五年六月二十六日予ニ治ヲ乞フ○予

以前仕へた此患者ノ母也ナリ此患者ノ病ニ罹リ
其病治スルノ後偏頭痛ヲ病ム然レ此症ヲ治
療ニ因テ幸ニ制服セリ○其後其母拾廻スルニ
由テ予カ治療ニ与ラズ然レ其後流テ諸般ノ苦
惱ニ罹リ一日モ休ムナリ遂ニ顔面ノ癰腫ヲ
罹リ死スルト云フナリ同ノ其父ハ亦八十
歳ノ老翁ニテ甚健康ナリ○其母ハ亦八十
○患婦上ニシテ若キ時少シク虚弱ニシテ毎春凍
瘡ニ似タル瘡腫ニ罹リ又屢々レウマナリ○
ウマナリノ性ノ初服痛ニ罹リノ外健康ナリ○子

八百廿三年春冒寒ノ後左眼ト齧齒ノ間ニ刺痛
ヲ覺フ數日ヲ過ルノ後其部腫脹スル由鼻中
リ膿ヲ曳シ其疼痛消散ス然レニ其右直ニ右頰
眼ト齧齒ノ間ニ方テ前ノ疼痛ヲ免ルニ二年餘尚
散セズ患者ヲ苦シマシム○其痛錐刺スルカ如
ク盛ナルニ及レテハ言笑咀嚼スルモ恐ヘキ到
痛ヲ免スルニ至ル○其痛四肢及ヒ天氣ノ寒暖
風雨陰晴ニ拍ハラズ患者ヲ悩マス○患者体質
艶澤嬌柔ナリト云凡其容貌灰白色ニシテ病状現
ハレ齧齒ニ牧齧齒トナリ○其他健康ニシテ食

能消化碍ナク月経及ヒ諸能洩共順整ナリ眼人
 畸形絶テ多ト虫モ眼カ弱クノ書ヲ讀テ能ハス
 ○患者居室ニ拙ニ前年ノ冬其疼痛ニ苦ムト甚
 シク医術ノ救ヲ求ムレバ如シク緩快ヲ得ス○
 其地ノ大医ニ人ノ之ヲ療スルヲ二回ニ及ヘトモ
 亦其症ヲ緩快スルヲ能ハス○予八百廿三年ノ
 夏ニ於テワシケルヲトゲ地ノ海水ニ浴セシムル
 丁廿四日ニ入兼テ左ノ方法ヲ行フ即チ硝砂加
 燒耐ニカヤフーテ油ヲ加工其蒸氣ヲ顔額ニ当
 テ又ヒスシユツト 喇帖石ノ合劑又サーレツブ煎ニ

列印酒ヲ加工テ服セシメタルセム葉芥葉及ト
 ロツワリユヒユリト三味ノ菜枕子ヲ作テ患部ニ當テ
 又ヘイワツプヒユレキエム 野生ノ卷垣尔刺賢垣
 尔泥苜根五葉ノ全身浴ヲ行ハシメ又ウイシテラヌス皮
 泥苜根ヲリトエムヘリエムノ泡劑ヲ内服セシメ又夕
 苜荬根ニ瓜ニ硝石半及ヲ位シ日ニニ四回与ヒ
 硝石ヲ与ルハ苜荬大量十 吐酒石膏ヲ一日項ニ摩
 ルヲ以テ瞑眩ヲ禦クカカナリ 入ス○患者ノ親族等ニ對シテ其症快愈スルヲ
 得ヘキ事ヲ問フ答曰此患者雖治ノ症ニ及
 テサレバ以前療スル所ノ方劑ヲ按スルニ傳功

下心毛ノヲ用ヘス且以病痛自家ノ性ヲ換差
 七廿ルニ由テ今日一テ治スルヲ能ハサ心毛ノ
 十リ余左ノ方法ヲ以テ之ヲ療ス心毛ノ葉ニ治
 又凡ノヲ得ルヲ能ハサ心毛ノ葉ニ治
 其法外ニ西ニ飯ヲ平敷テ心毛ノ葉ニ西ニ置キ
 國第一ノ患者ヲ湿室ヨリ移シテ乾燥セ心毛
 餘ヲ摘テ之ヲ極細ニシテ心毛ノ葉ニ西ニ置キ
 又第二ノ肩胛間ニ吐酒石膏ヲ持重ニテ擦セ
 飛利三ノ莖若根ニキス心毛ノ葉ニ西ニ置キ
 飛利三ノ莖若根ニキス心毛ノ葉ニ西ニ置キ

埃水劑一次三十滴
 マリ九十滴用フ
 ル片ハ大九十三日
 録ニ版シテスノ蔓
 陀羅丁散一日ニ九
 滴ナリ又二枚四十
 滴マリ日百二十滴
 用フル片ハ十二日ニ
 版シテス蔓陀羅
 量三十滴録ナリ
 ○考フルニ埃水
 劑ノ全量九ツ十
 日ニ用フルヘシ

大ニ是ノ高ニテ半 苦扁豆水ニテ
 右混和シ二服毎ニ三十滴ヨリ四十滴
 又 鉄粉 十粒 白糖 一丸
 右混和シ十六粒ニ分テ前劑ト更換シ
 二時毎ニ一服ヲ与フ
 蔓荖根ニキス 蔓陀羅花丁散 各一及
 苦扁豆水ニテ
 右混和シ少許ヲ取り一服毎ニ疼痛
 部ニ擦ス

腐骨疽ニ由テ凹ヲ為シ其齩根腫痛ヲ生シ屢
 潰膿スルニ由テ女齩齒ヲ拔去ル下ヲ命知茶劑
 前ノ如シ○同月八日上ニ云フ如ノ齩齒ヲ拔去
 ト至ヒ其腐壞蠶食ノ齩齒根ノ岐処ヨリ齒神經
 ニ達シ頰顛割痛ヲ発ス処方前ノ如シ○同月十
 日左頰ノ腫痛全消散ス○今日患者甚ク爽快唯
 精力非常ニ虚脱シ食欲少ナシ○吐酒石膏ニ由
 テ発スル疹泡ノ疼痛ニ耐ス是ニ於テ其膏ヲ休
 ム肩脚間ニ発泡膏ヲ貼シ持長シ左ノ方ヲ与フ
 鉄屑 コリン ホ 槿皮 赤 若 詳 每 日 用 直 下

右ニ味分テ十二貼トシニ収毎ニ一包ヲ服ス此
 劑ト互換メ前方ノエルクニシニ二十滴ヨリ三十
 滴ヲ与ヘ外部ニハ尚菘茗エキス蔓陀羅花丁友
 ノ茶液ヲ廣擦ス○十三日患者精力大ニ復シ疼
 痛絶テ之ナク健康ヲ覺フ処方前ノ如シ○同月
 十六日発泡微シク愈アルニ及テ忽チ右頰痛ニ
 一種ノ寒吟ヲ覺フ○故ニ注意メ発泡ヲ愈サス
 左ノ方ヲ与フ
 鉄屑 括矢 亞末 若 十五 桂 赤 詳 每 日 用 直 下
 右ニ味分テ十二貼トシニ収毎ニ一包ヲ与フ

前ノ如クエヒキシルヲ互換ス右頬ニ菜液ヲ
 擦スルヲ始メ如シ○同月十九日全百倭廣
 私ニホシキ疼痛ヲ免ス是ヲ以テ微温浴ヲ行フ
 但シ其度毎ニ老人劑三ヲ溶シ行カ
コロビエリ。マルチヤレス。リリユヒレス。銅屑製
注 人工鉄浴ノ最上ナル者ハ此銅劑
 其餘ノ菜方前ノ如シ○月廿二日頭部ノ疼痛
 消散ス然レ脚痛惡心ノ吐セヒト欲スルノ症
 リ食機欠亡セリ○故ニ前ノ散劑半ヲ減シ前
 液劑十五滴ヨリ廿滴迄ヲ与フ○月廿五日尚

未毎ニ少シク惡心シ食機少シ○患者以前健康
 ナリレ既毎ニ鼻嚏アリ然ルニ面痛免スレハ後
 其鼻當ニ乾燥セリ○寒冷ナル頬額液劑ヲ擦
 スルノ後温腹トナリ一二日以未患者面足心
 刺痛ヲ免シ漸ニ歩行スルヲ得○処方老人如
鐵粉 竜胆エキス 各ニヲ
右混和シ二ルヲ一丸ト為シ毎日二回毎ニ十九
ヨリ 十二丸ヲエヒキシルニテ与フ
又方

ヒラスヤモス油 スヒリキスサホシス 各半ヲ

阿芙蓉丁茂ニヨカンワル半ヲ

右混和シ足心ニ片擦スルヲ日ニ四回〇兼テ鉄

浴ヲ持長ニ接骨木花ノ温浸ノ蒸気ヲ鼻中ニ嗅入

シセムルヲ頻ニニシ其分利障碍ヲ回復セシム

〇日月廿八日正シキシルヲ飲取スル毎ニ悪心

尚女シク未ル熱氏是ヲ休止スル候ハ直ニ右頬

ノ疼痛再発ス〇患者ノ諸力増進シ足心ノ疼痛

減シ再ニ徜徉スルヲ得ニ至ル〇今ヤ正シキ

シルヲ十二滴ヨリ廿滴迄ヲ与ヘ其他丸薬片擦

劑鉄浴ホヲ持長ス〇八月朔日面痛及足心ノ痛

絶テナリ諸力著ク旺盛ス〇法方前人如シ服ノ

衰弱ヲ強壯ナラシメシカカニカヤフトテイ油

ヲ服圍ニ屢ハ片擦ス〇日月廿日患者總テ健全

ニ復スト岳氏前ノ方法ヲ持長シ肩胛間ノ発泡

ハ尚愈サス〇日月八日患者ノ容貌總テ屢ニ

シ〇患者郷里ニ歸ルニ由テ予六月廿六日ノ工

シキシル及片擦劑七月廿五日ニ処スル丸薬鉄

浴ヲ日ニ二次或ハ三次持長シ背ノ疝膿ヲ愈サ

サルトヲ命ス〇同年十月十日再ニ此地ニ来ル

病状善達ニ向テ以テ曾テ行ヒ後療法ヲ遂ニ
 三ハ何レノ日迄為レテ宜ナル哉ヲ問フ。○姑患
 者予カ命ニ從ツテ予ニノ齧齒ヲ又拔去リ鉄活
 フル一回行ヒリ。○七月廿五日ニ処スル丸劑ヲ
 服スレハ下版ニ疼痛ヲ覺ヘタリ。○上ニ行ヒレ
 キ膿ヲ今ニ至迄持長ス故ニ尚以テ後モ持久スヘ
 シト牽ス。○病候善達ニ進ミ顔面口吻吐版及ヒ
 足脚ノ疼痛消散シ食欲故ニ夜ニ消化苦碍ナリ
 能睡眠シ諸力充盛而膜鮮華ニシ玫瑰色ノ如シ
 月経通利モ順整ナリ故ニ危方ヲ与フ。○

鉄屑 半匁 括矢 亞末 印^イ堙^チ爾^ル皮 各六匁
 右混和シ十二包ニ分テ一服半毎ニ一包ニ酒
 ニテ飲服ス。○同年十月十七日患者鉄屑ニ無耐
 一ニ只^シ腔^シノ^ノ倭麻^質私痛ノ頭痛ニ苦ム。○患者散
 葉ヲ嫌惡スルニ依テ危ノ丸葉ヲ与フ。○
 鉄屑 就胆^ニキス 各ニ^ニ棗^ニ 槿皮^ニ末^ニ
 右混シ二匁ヲ一丸ト為シ毎日八九或十二丸ヲ
 服スル下四吹。○廿一日倭麻^ノ私性ノ疼痛此部
 ヲリ彼部ニ游^ス走^ス則^チ其^ノ疼痛^ノ齒^ノ牙^ニ走^リ或ハ頭^ニ或
 ハ項^ニ走^リ由^テ危ノ劑ヲ与フ。○

痛止ルサバリル山牛蒡 泥菖根 遠
 野羊泉
 右ノ煎液中ニ双鸞菊 艾キス 安瓚 没 柘 阿 加入
 以前ノ丸薬ト共ニ飲服ス。二十六日此日陰雨
 濛トトノ人ニ可ナク是ニ由テ患者左睡時腕
 肚版足部ニ倭ノ痲私性ノ疼痛ヲ苦楚ス病牀ニ
 テ温ムルハ其痛ニ殊ニ甚シ故ニ前ノ丸薬ヲ休
 ヲ只上ノ煎劑ヲ与フ。廿九日倭ノ痲私性ノ疼
 痛モ頭ニ減退シ版痛モ全熱ト大消散ス患者兩
 御里ニ帰省スルニ由テ左ノ劑ヲ与フ

重

山牛蒡 泥菖根 野羊泉 荳
 各半又

右能判ニ多量ノ水ニテ煎シ一多ヲ取り漉過シ
 龍腦 羊 又 ホフマン 鎮痛液 一多 羊 双鸞菊 艾キス 又
 安瓚 母 柘 阿 フルニキ ヲム 各半 荳 橙皮 舍利 別 一多
 一時毎ニ一食ヒヲ与フ共劑ハ諸般ノ倭ノ痲私
 性ノ疼痛体止スル迄服用シ十月十七日ニ与ヘ
 シ鉄屑丸ヲ二ヶ月有餘服スヘシト有ス。○患者
 予力年ニ從ヒ鏡ヲ服用シ遂ニ健康ニ復シ再ヒ
 顔面痛ニ苦悩セズ

麦奴治子宮出血之經驗

一婦人廿八歳作格速康三月以前死児ヲ懐シ是ヨリ以来続テ子宮出血ニ苦ム良医知スル知ノ薬劑効ナシ○患者ノ諸力衰弱スルヲ甚シク起テ能ハス面色灰白脈弱ナリ処方

麦奴五匁 圭支十八 白糖一匁

所載
血

右散劑一包下為三日四時服下○右ノ散劑ヲ用ニ此下六日如後出血休止不然心ヲ著述者考心如ク房莖ヲ侵スニ由リ八日ニ過キ出血再発不再ニ麦奴六匁一貼下ニ日直四時与テ是ニ由テ五日ヲ過シ人後出血全ク休ム然レ同劑ヲ九日間持長シ与テ○是ヲ用ニ人同端ハ増進ニ致育ヲ経心ノ後患者故人如ク健康ニ極久シ○嘔婦年四十再嫁人時ニ当テ即果大ニノ嬢姪七月ノ状ニ似タリ○此婦一二年前ヨリ慢性ノ子宮出血ニ罹ル時ニ当テ一月餘女出血持長

壯門血
試談

不直今五十餘身體尚勞若以意識大感動之
遇ハハ出血甚ク遂ニ秘ス下能ホセ心對至ル
○予妻奴ヲ用至ル下ル也也是病之臨也六○患婦
決散茶ヲ服スル下ル每果一包○一包ヲ服スル
ハ後出血既ニ止ム○新郎之家婦人家ヲ去心直
甚遠分ニ六曾テ婚ニ行ルニ當テ車ニ在ル時同
列相眩暈惡心ヲ覺ス然レ其病直ニ消散シテ次
日少シモ病ハ如クシテ再々發ル
下女子年廿五幼時ヨリ列相頭痛喘息暗昏病
公共婦スル外ホルム在テ産婆ヲ索ハス故ニ女

臨月ニ當テ其家ニ來ル○千八百三十四年四
月十二日男子ヲ分娩スルハ後列相ノ播瀕ヲ覺
ス故ニ予ヲ招ク○多量ノ刺絡ヲ行フ下ル二回亦
子泥ヲ用ヒ考醋水ノ灌腸方ヲ行ク下ル數回ニシテ
一日ノ後播瀕止ム○同年八月其女人妊ス妊娠
ノ後常ニ頭痛眩暈喘息ヲ病ム唯刺絡ノ少ク
是病ヲ寛解ス故ニ刺絡ヲ行フ下ル七回ニ至ル○
千八百卅五年八月十二日再ヒ其婦ノ助ニ由テ
男子ヲ産ス分挽輕ク母親ヲ乳ス十五日ノ間ハ
健康ナリ而後大熱ヲ覺シ咳嗽甚シ胸膈及薦骨

疼痛ス。○療薬到ラサル。如毎ト其氏寸効ナシ。九
 月ノ廿一日ニ至テ薄暮周ニ行ク。肛門ヨリ血ヲ
 漏ス。二時許。○予麦奴五匁ヲ五ニニト毎ニ与フ。○
 茶ヲ用ス。ル。是ノ如ク頻ニ十ルニ由テ。二色
 ヲ用ヒテ。天血止ム。○漏血ノ狀ヲ候差スルニ
 多クハ黯黑色ノ血水ニ。其中ニ葡萄ノ如キ丸
 ヲ見レバ。血塊尽ク。トブリユ子ヨリ成ル。○廿二日迄
 出血到ク。再荒ス。然レ血塊ヲ雜スル。ト廿四日。予
 去ルニ臨ニテ。年ノ日出血再ヒ来ル。肛直ニ麦奴

試門血

散ヲ与フヘト。出血再荒スルニ由テ。家人年少
 如ク麦奴ニ包ヲ用テ。板止ム。○廿三日。人朝病大
 死ス。

○死体ヲ解剖シ。是ヲ見ルニ。迴腸ノ盲腸歧出ス
 ル。如ヨリ直腸迄。黯葛色ノ粘液ニ。膜ニ凝着シ
 其。恰モ黑眼球ノ如シ。○其他腸胃及ヒ彼等ノ部
 モ受ル。如ナシ。唯肺藏中。種々大小ノ結節腫アリ。

魚道ヲラシム。子モ如キ。其由其由。前嫌手。

○一患者。壮年。多血。曾テヨリ。教ニ。割性。人。倭。戸。瘰。

割性心悸動
 瘰癧金瘰核
 瘰癧

症類
脈診
問診
望診
聞診

○此症次日に至り全ク消散し内感又心藏を襲
と順序ナキ別性ノ心性動ヲ発シ兼テ甚シキ壓
迫墜重ヲ苦ム○刺絡スルハ五回其他消煩方法
ヲ行フテ危篤ノ諸症退ク熱止而后ヲ療方絶テ
患者ヲ煩惱ヲ去ルヲ能ハス遂ニ青酸ヲ用ユル
ト虫モ効ナシ茲ニ於テ左ノ方ヲ与フ
○塩酸金塩（一八）大リツサ水（一五）ニ溶シ加密列舍利
別ニ多ク加ヘ
右一日毎ニ一哥喜トス服ス此劑ヲ用ユル時手
腕ニ始ル次夜ニ至ルハ病後未嘗テ有テサレ処

ノ安眠ヲ得タリ而后日ニ唯順序ナキ心悸動及
壓迫墜重アリト虫モ以前ニ比スレハ減ニ微ニ
ノ注心スルニ足ラス○數日長服ノ中痛苦漸々
良知ヲ奏シ右手ニ腫痛ヲ発ス患者此劑ヲ尊信
スルヲ甚シキニ由テ医生全治ヲ促シカガニ徐
々ニ他薬ヲ用ント欲スレハ患者之ヲ恐ル○ス
ビユルチユス云塩酸金塩ハ絶テ利尿ノ効ヲ見ス

候ノ頃私暇暇衝正ル尼加在ノ用ルノ時
一男子ハ才歳秋初一日暴烈ノ寒ニ臨テ日而眠

及口共四沿疼痛ヲ発シ其疼痛料カ如ク裂カ
如リ淚陸々ト外流ル病毒ニ入り或ハ温覆スル
ハ其痛愈増盛ス○其後結膜甚ク赤色トナリ日
ヲ怖レ明ヲ羞○大惡寒続テ発熱シ遂ニ全身ノ
疾患ヲ媒起シ刻ニ干向歌性ノ痲衝熱ヲ続発ス
○故ニ患者ヲ晴室ニ移シ數回刺絡ヲ絶シ耳後
ニ水蛭ヲ數次貼シ下劑ヲ與ヒ其後緩和ノ発汗
劑ヲ与レ凡少モ輕快ヲ覺ス疲弊ト陰惡ニ進ミ
今ヤ疼痛全頭及ヒ上額ニ普達シ涕淚ノ流出愈
増シ羞明モ亦甚ク眼球恰モ一片ノ赤肉ノ如

シ○項上ニ大発泡ヲ貼シ外用ニハ乾茶枕子ニ
竜腦ヲ加ヘ温クテ眼上ニ敷シ内用ニハ金硫黃
朴屈福多華尔斯ヲ散トシ服セシム○二週ノ間
其療法ヲ持重スレ凡効ヲ見サレニ由テ猛藥ヲ
内服外用ス○三週ノ間眼焮腫ニ俾効アル諸藥
ヲ施セ凡少シモ効ヲ見ズ是以テ余亞尔尼加
花ハ並劑ヲ内服セシム○尔後第八日眼焮衝羞
明亦殆ト減退シ而シ患者大汗ヲ發シ尿ヲ多
泌増進シテ全治ニ至ル

及之... 病状... 治法

一男子年六十... 疾之可十七... 患之少... 榮動... 扭多... 滲出... 患部...

り自他病理... 十ヶ又短息... 如之... ス○此疾ノ識別... 間ニ血ノ運行... 容々其血行... 心ノ力若クハ... トトトトト... トトトトト... 是ニ於テ刺絡...

○實芟荅利私ニ高菑ニ工ニ也ニ也ニ
右調勻ニ一服或ハ一服半毎ニ一服ニ与テ也
○刺絡ヲ行フト金匱著レク知カテ現ハサズ
日ヲ任テ其脈大不正ニハ一密紐多ク間ニ一
ハテ又ニ一攻ニ重搏或ハハルモ又或ハ柳伏
ホ其變迅速或ハ上章ノ諸脈彼故一時ニ交現
ル○斯ノ如キ脈狀留連スルト三四日ニ其後
殆ニト平脈トナリ唯稍言紹テ以テ各狀ト雖キ
一異ク脈狀ヲ氣心ノ也○其呼吸ハ前ニ敬劑
ヲ用テ十二時ヲ過ル人後快候ヲ現ル三四日ハ

後再ク平日ニ後ニ血瘕モ亦從テ漸減スス
小便常ノ如シ唯夜中ノ尿ヲ沈底スレハ瀉陽ニ
晝日ノ尿ハ澄明ナリ○前ノ散劑ヲ用テルト六
日ニ後腹ヲ止ム自後二三日ノ間ハ病者全ク
平康ニ後ニ只少シク頭眩ヲ覺テルト且ツ或
眩急卒ニ少シク段措ヲ登ル人眩短息ヲ覺テル
ノ外他患ヤルトナシ
○斯ノ如ク假リニ快候ヲ現ハスト金匱上ノ散
劑ヲ止ルノ後脈浮數ニハ一晝扭多ク間百四十
百五十或ハ動モスレハ百六十動ニ至ル者二回

刺絡ヲ施シ其脈ノ數ヲ鎮靜スルヲ能ハス也
且血痿ヲ雜フル咯痰ヲ亦減退スルヲナシ○前
ノ短息ノ症又亦後漸吹ニ発生増進スルノ
ノ自他ノ諸症ヲ現サス今ヤ小便ノ色常ノ如
疾モ亦全ク止ム○上ノ散劑ヲ復服用スルノ後
横岡ノ諸症忽チ解散シ脈節モ前同ノ如ク復
六十動ニ鎮降ス○今回ハ散劑ヲ一頓ニ休止セ
ス女量ヲ漸次ニ減殺シ与フ○終リハ散劑一服
ヲ与フルノ后第二日ニ方テ脈搏亦甚夕數ニ
短息ノ症発生ニ後未ノ発作ノ如ク夜中不安身

休ヲ靜卧スレハ呼吸陸續トシ短息ニ未テ止レ
下欲ノ能ハサルニ至ル○其呼吸短息ノ症ハ上
ノ散劑ヲ一日或ハ二日服用ノ殆ト消散ス○
此回ノ発作劇烈脈搏數ニノ偏次ナク且フ弦十
リ故ニ再夕ニ刺絡メ女レク血ヲ洩ス○其刺絡
女レモ効ナキニ由テ重テ之ヲ施サス○上ノ散
劑非常ニ効カテ奏シ短息ノ症四日ノ間ニ頓解
散ス○脈搏ハ偏吹ナシト重モ脈度減シ第六日
ニ方テ一密担多ノ間ニ四十六或ハ四十八動ニ
減ス故ニ直子ニ其散劑ヲ休ハ○後未ノ如ク

如ク夜中ノ小水ハ澄明昼日ハ濁濁ス○患者斯
ノ如ク屢チキタリスヲ用テ小水ノ漏泄ノ量減
セス女病モ亦變セス尚且其尿ハ尿ノ分泌ヲ増
進セスノ如ク回ノ発作彼回ノ発作ノ如ク留連セ
ス○チキタリスヲ用テ発スル悪心喉前閃光小
ノ病ヲモ発セス○此餘ノ発作ヲ反復メ揭示ス
ル中ハ鄭重ニ失スルカ故ニ都テ下款ニ示ス
其短息ノ発作ハ大抵二週或ハ三週ニ於テ又
一回ハ八日ニ於テ又一回ハ五週ニ於テ又
終ノ発作ノ間暇ニ於テ患者勞動ヲ操作スルニ

方テ已前消散シタル症ノ頭眩心悸動ヲ兼発
ス○短息ノ症ハ発作ヨリ彼発作ヲテ盡然解散
セス自他ノ景况常ノ如キモ身体運動スレハ輒
チ其短息増進ス○其短息始メハ耐入キモ病
速ニ頭ホニ登リ患者煩躁苦悶ス自ラ衣ヲ服ス
ルヲ能ハス少ノ言語モ障碍ナク十ス下能ハサ
ルニ至ル○今回ノ発作ハ渴ヲ兼併ス熱ニ此
発作ノ始メニ上ノ散劑ヲ与ヒテ忽チ減退ス其
散劑ハ短息ノ症ヲ驅除シ脈搏ニ印カ人達スル
ヲテ持重ニ用フ○此脈発作ノ外ハ大抵百三十

動ニメ偏次アリ但シ微細ニシテ指下ニ忘セルニ
忽チ復メ強大トナリ暫ク収メ後々微細ト
ナル○短息ノ忘増感スルニ從テ脈搏甚ク數ニ
メ偏次ナク其搏度ヲ數フルハ能ハス然レ前ノ
散劑ヲ用フレハ搏度殆クト減退メ五十五動或
ハ六十五動ニ至ル且ツ偏次アリ但動モスルハ
俄ニ復メ一二搏度不齊ヲ見ス○此ノ如ク搏度
減退スルモ少シク歩行シ身体ヲ運動スレハ忽
チ數トナリ百三十動ニ至リ然レハ身体ヲ安靜
スレハ忽チ復メ六十動ニ減ス○脈ノ搏度減退

スルハ大抵散劑ヲ用ユルノ後四日或五日一回
ニハ三日ニ於テス○脈ト心藏トノ搏度時ヲ同
セス心ハ短息ノ発作ト休脈ノ時ヲ論セス其搏
度常ニ動脈ヨリ疾速ニメ尚偏次ナレ○此キハ
トリスヲ用ヒ搏度四十八度迄沈降スルニ當テ
心ノ鼓動ヲ動脈ニ比スルニ尚猶疾速ニシ不整
ナリ○此時ニ當テ右ノ散劑ヲ用ユルノ外他劑
ヲ用ヒス尤モ胸上ニ灸膏ヲ貼シ暫時打膿ス
ルモ寸節ナレ○散劑ヲ用ユルハ大抵毎日六包
ヨリ或ハ稀ニ七包ニ至ルハモ輕快ヲ明サス却

ヲ困悶ヲ覚ユ○脈又疾速ニメ一抄之間百三十
度ニメ伏ス夜ニ入テ困悶シ多量ノ尿ヲ利ス乃
于九包ノ散劑ヲ与フ次日ニ及テ患者才ニ爽快
ヲ覺ヘ脈搏八十度緩ニメ稍ニ偏次アリ然レ或
ハ間々結代ヲ帯フ○此日又散劑九包ヲ用シ
○翌日患者在爽快ヲ覺フ夜ニ入テ安静ナラサ
レ共困悶スルニ至ラス脈大抵五十度ニメ結代
昨日ニ比スレハ多シ○同日ノ暮ニ當テ脈狀朝
ニ比スレハ少シメ偏次アラヌ又疾速トナリ而
患者言語ニ於テ安シク妨ヲ受ケ自國人思考ヲ

能ク吐露スルヲ能ハス○且患者ノ感受思慮操
作常ヲ失フ是亦ノ諸症年中ノ前證ナリ○予直
ニ刺絡ヲ施シ八寸ノ血ヲ浮シ更ニ灌腸方ヲ行
フ是ニ因テ夜中安静ナルヲ得○翌朝ニ當テ
患者晚ニ及ニテ更ニ僅ノ錯乱ヲ催シ言語又多
少妨ケラル、知アリ○終夜安静次日ニ至テハ
若ニト昏睡狀ノ如ク熟睡ノ醒メス○脈搏八十
四度少シク熱狀ヲ帯ヒ其他順序アリテ常ノ如
シ○是ニ於テ又刺絡ヲ施シ頭上ニ芫菁膏ヲ貼
シ排腸ニ魚子芥子泥ヲ施ス如是百方術ヲ施ス

ト虫氏患者少シモ醒覺セ久是日病体少シモ爰
スル下益三日テ患者ヲ燒物トス○翌日一至
氏患者ノ景况尚自若タリ唯長久是ノ呼喚スル
心稍忘スル処アリ又醉卧ノ人ノ如ク一二人言
語ヲ覚スレトモ又直ニ再ニ沈睡ス○脈昨ノ如
ク是ニ於テ頭ニ水蛭六條ヲ施シ灌腸ヲ行フ○
此日ヨリノ患者所ノ五神ノ感忘醒覺ノ思慮明
瞭トナル諸症俄ニ善途ニ進ミ五日后精神錯亂
ホノ症解散ス○然レ女他人ノ感忘ハ漸次ニ回復
シ刻々躁擾ヲ受タル性カモ善良ノ食餌キテ兼

湯ニ目テ保持セリ○日々水蛭ヲ施シ夕ル后脈
搏尚八十度ニノ輕ク熱状ヲ帯テ他ハ全ク常
ノ如シ○自后脈搏六十八度或ハ七十度又七十
ニ度ニ減シ尚連綿トノ呼吸アリ予一二週ノ前
心動ヲ換差スルニ常ニ脈搏ト奇一ナリ○予尚
是ニ一言ヲ贅ス患者幸ニ些少ノ不仁ヲ残スト
虫氏然レ女回復ノ期ニ及レテ咳嗽ヲ覚シ右側
假肋骨ノ下ニ於テ微痛シテ咯痰ス是癆ハ何ホ
因ニ由テ起ルヤ知ルヘカラス○但レ彼是ノ諸
症ハ二週ノ后幸ニ消散シ病覺以來患者頭眩短

息ノ二症モ九月ニノ漸ク解散ス二三週ノ前ニ
於テハ心臟大動脈ノ疾患峻危ニ進ムヲ以テ是
ヲ難治トス又卒中状ニ悩マサルノ力故ニ愈々
性年存亡不測トナセシモ患者今ヤ十分健康ノ
境ニ跡ル下ヲ得予管見スルニ是レハ所謂卒
中ノ症却テ是カ幸トナル者ナリト云フ○
破傷風腐蝕灰塩ヲ用テ治スルノ法
一女子十四歳身体健康庭前ニ徜徉シ豚齒ヲ足
ニ刺入不騎躓シテ家ニ入り一晝夜業ヲ用テ

トナシ○患者病豆ノ諸節ヨリ女傍ノ頸ニ至ル
マテ強直トナレリ是ニ由テゲハルト臥招カル
○行テ診スルニ痙攣ノ運動明ハレス脈殆ク
ト恒ノ如ク瘡口閉止セリ○女瘡処ヲヒストイ
ヒ療カヲ以テ切開キ的列並積ヲ注テ汚穢セシ
ム○今ヤ患者痙攣ヲ免ズル下刻甚トナレリ是
ニ由テ大量ノ阿芙蓉ヲ内服セシムルニ其痙攣
愈増進シ角弓反張ノ如ク体ノ後部ノ諸節痙攣
スルノミナラス呼吸器ノ諸節モ又痙攣シ患者
方ニ窒塞スルノ恐アリ○翌朝ケハルト女席ニ

在し時ヲタニスル刻症ヲ発シ再ヒ其ノ如キ発
作ル未ル時ハ其愈悪性ナラン夏ヲ謀ル〇是
ヲ以テケハルト子全背髓即チ頸ヨリ腰ニ至
ル迄水ニ溶シタル腐蝕灰汁塩ヲ片擦スルヲ
決セリ〇是ヲ施コスノ間ラタニス又新ニ発生
シ而后患者叫ニテ背火傷セリト云〇其後直ニ
痊愈休ミ諸筋弛緩ス〇暫時ニハ患者健康ニ復
ス

