

遠西醫方名物考

計五 未下

卷十一

✕
e 15

藥又E


499,2
Em-3
11

No. 1436
re e 15



富士川文庫

3278



遠西醫方名物考標目

卷十

滿那

麻倔涅失亞遏爾拔

驅風消毒飲
制酸消毒飲
煎製麻倔涅失亞

末兒叔尼斯散

末爾扶斯鎮痛液

計 齋蓬鹽

齋蓬鹽晶

遠西名物考

卷十

標目

風雲堂藏



結麗土品

精製結麗土

血石

桂精。桂露

六ニ増訂和蘭藥鏡ニ出

桂丁幾去爾

桂舍利別

健質亞那越幾斯劑

健質亞那

健質亞那丁幾去爾

結爾茂斯

結爾茂斯舍利別

見篤散

結爾茂斯密涅刺列ノ安質没扭

遠西醫方名物考卷十一



遠西醫方名物考卷十一

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

滿那羅 マンナカラブリナ

滿那加辣豹利亞齊西里亞亞彪綾 共ニ歐羅巴洲ノ國名 等

ニ多ク産スル一種ノ苦櫪木 泰ノ幹枝及ビ葉ヨリ

滲出スル白蜜ノ如キ脂液ナリ 或云細蟲アリテ其

液ナリト 其樹尋常ノ苦櫪木ニ比スレバ幹枝葉

共ニ小ク花ニ辨アリ花後蒴ヲ結ビ内ニ仁アリ是

春滿那樹ト名ク○滿那三種アリ第一種ハ夏月酷

暑ノ頃自然ニ流溢シ清白或ハ帶黃色透亮ノ淚珠
 出ナリ炎熱ニテ一日ノ間ニ乾キ凝結ノ顆粒ヲ爲
 シ枝葉ニ懸ルコレ最モ上品ニシテ稀ナリ○第二種ハ
 形長ク指ノ如ク凝結シ長ク一拵指横徑濶一拵指
 横徑許鮮美純潔輕白ニシテ微赤色ヲ帶ブ是ハ其樹
 ヲ鑽刻シ是ニ蘆管ヲ刺テ其流出スル脂ヲ取ル者
 ナリ故ニ長クノ管ノ狀ヲ爲ス是ヲ滿那マナ加涅兒刺
 答ト名ク蘆管滿那ノ義○第三種ハ秋末暑氣減シ其脂流
 溢セザルユエニ土人其樹幹ヲ鑽刻シ流出セルヲ
 集メ乾固シテ凝塊下爲ス者ナリ第一種ニ比スレ



バ黃色ヲ帶ブ。淨潔ナル者或ハ不潔ナル者アリテ
 一樣ナラズ是レ尋常ノ加辣カラ利亞リア滿那ナリ。其最
 モ純潔ナルヲ滿那マナ越列屈答ト名ク越列屈答ハ上品ヲ擇ムノ義
 其純潔ナラザル品ハ水ニ溶シトカ瀝コシテ汚物ヲ去リ火
 ニ上セ水氣ヲ蒸散タ蜜ノ稠中爲シ磁壺ニ入キ木筋
 數多投シ置ケバ是ニ凝結メ淨潔トナルナリ○上
 品ハ新鮮透亮白色或ハ淡黃或ハ赤色ヲ帶ビ乾テ
 輕ク柔ニシテ脂ノ如ク淨潔ニシテ汚物ヲ雜ヘズ。顆粒
 或ハ大小ノ碎塊ヲ成シ性味沙糖或ハ白蜜ノ如ク
 甘美ニシテ辛ヲ帶ビ稍粘リ盡ク口中ニ溶化シ殆ト

香臭ナシ○其質ハ沙糖様ニメ粘液ヲ含メリ。故ニ其淨潔ノ者ハヨク燒酒及ヒ水ニ溶化ス○此物極テ鮮麗瑩白ニメ水晶ノ如キハ瀉下ノ効微ナシ粘氣アル者其効却テ勝レリ或ハ淡赤。栗壳色。淨潔ナラズ或ハ流動ノ蜜ノ如クナルハ皆藥用トセズ○或ハ粉麩ヲ加ヘ或ハ沙糖ヲ和シ煮テ偽造スル者アリ是ハ純^{モロハ}テ沙糖ノ味アルヲ以テ知ルベシ○或ハ蜜。沙糖汁等ニ旃那葉。蘇甘^{スカムモ}沒^{ニウ}捩^ム謨^ムヲ加テ是ヲ偽造スル者アリ此ハ真品ニ比スレバ瀉下ノ効烈シ宜ク仔細ニ擇ニ用ベシ○落葉松。松。樅。榲。杜松。阿利

襪等ヨリモ亦滿那類ノ脂液出ル^トアリ或ハ楓樹ヨリ出ル液ヲ煎熬ノ一種ノ滿那ヲ製スト云○或ハオーステルセ^{マンナ}那^{東方滿}ト稱スル品アリ此ハ百兒西亞及比亞刺比亞^{共ニ亞細亞}ニ産ス是ニ二種アリ一ハ蜜ノ如ク流動ス。一ハ凝固ス然レモ多クハ前ニ説ク品ヲ藥用トス○
 ○榕按ニ滿那ハ漢人所謂甘露。刺蜜。雀餉ノ類ナリ。和蘭ニ是ヲヘメルダウト名ク。天露ノ義ナリ又ホニフダウト名ク。蜜露ノ義ナリ。滿那ハ日用糧食ノ義ナリ。其説ニ云。昔人意ラク天。幽裔荒地

ノ民ヲ愍テ甘露ヲ此樹ニ降シ餓殍ノ感ナカラシム○職方外紀曰度爾格國有樹如橡栗夜露墜其上即疑爲蜜晨取食之極甘美萬寶全書大食勿斯國條云其國秋露降日曝之即成糖霜食之清涼甘美コレ亦一種ノ滿那ナリ○此物和產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用フベシ

主治酸味ノ鹽油水及微土氣アリ留飲_{左イ}敗黑膽

液ヲ瀉下ス緩下ノ藥トス故ニ小兒ノ下劑ニ尤良

○肺ノ諸症ニ用テ胸ヲ利シ肺ヲ潤シ粘痰ヲ豁シ

胸痛喘急經久ノ傷冷毒胃欬_{重訂內科撰要第百七十七章ニ出}等ヲ

治ス是潤滑甘和ノ質ヲ以テ酷厲液ヲ消シ大便ヲ

利スレバナリ或ハ大黃ヲ加飲液ニ和シ用テ胸中

痰飲ヲ疏滌ス○熱病ニ用テ潤下ノ効ヲ稱ス○產

婦或ハ壯熱熾衝病等ノ輕ク大便ヲ通利スベクノ

峻下劑ヲ用難キ症ニ的當トス○小兒呼吸不利胸

中苦悶促迫スル者ハ海葱蜜ヲ加用テ粘痰ヲ驅除

シ治ス○勞欬等虛羸ノ病輕キ下劑ヲ用ベキ者ハ

滿那最良トスヨク肺ヲ甘和ノ大便ヲ通スレバナ

リ○服量小兒五歲以下ハ一錢ヨリ四錢マデ適宜

ノ飲液或ハ大麥煎或ハ乳汁ニテ用大人ハ二錢ヨ

リニ多或ハ三多マデ水ニ溶シ用ヒ或ハ下劑ニ加
 用フ○過服スレバ酸敗液或ハ風氣ヲ生メ胸腹痞
 滿ス斯ノ如キ者ハ苦味香竄ノ藥品ヲ加ヘ用ベシ
 ○體質薄弱ニメ感觸シ易キ者は是ヲ過服スレバ腹
 痛ヲ發シ或ハ胃腸ニ風氣ヲ生スルアリ故ニ常
 ニ多ク用ルニハ他藥ニ加ベシ或ハ味惡キ下劑ニ
 加テ甘美ト爲スニ用フ○滿那ヲ蒸餾スレバ味辛
 微酸ナル清液出ヅ此液發汗ノ効アリ又惡性熱自
 餘熱病ニ用テ汗ヲ發シ熱ヲ解ス服量半錢ヨリ一
 錢ニ至ル

馱伍底物
 斐依福

麻^マ屈^グ涅^ネ失^シ亞^ア過^オ爾^ル枝^バ羅^ラ

グイツテマグ子シア又コ
 ルシラレラテルアルデ蘭

製法

其諸厄利斯瀉利鹽

剝篤亞斯

精製者

右瀉利鹽ニ雨水ハ沸湯三比ヲ加テヨク溶シ瀝過

メ汁ヲ取リ次ニ剝篤亞斯ニ雨水ノ沸湯一比半ヲ

加テ溶シ瀝テ汁ヲ取リ右兩個ノ灰汁仍熱セルヲ

合シ磁壺ニ入レ又沸湯八比ヲ取テ是ニ加ヘ火ニ

上セ煮ル十四分時ニ是ヲ綴布上ニ傾ケ寫シ其

布ニ留ル瀉利鹽ニ數沸湯ヲ注キ透漏セシメテ洗

淨シ其鹽毫モ味ナキニ至テ取り出シ夏月ハ日乾シ或ハ文火ニテ乾シ白色ノ鹽ト爲シ貯フ

又法

諸厄利斯瀉利鹽

四北

右瀉利鹽ヲ水ニ溶シ紙ニテ濾シ精製剥篤亞斯ヲ取り適宜ニ水ヲ加テ溶シ紙ニテ濾シ此灰汁ヲ以テ一滴宛右ノ鹽汁ニ滴スレバ毎滴乳汁ノ如クナリテ其底ニ沈シ雪白色トナル斯ノ如ク數滴ノ終ニ火モ乳白色トナラス沈マザルニ至テ此液ヲ火ニ上セテ煮沸セシメ其間ヨク攪セ火ヲ下シ微冷

ルニ至テ是ヲ細絹ニテ濾ス片ハ雪白色ノ麻偶涅失亞其絹上ニ留ルナリ此ヲ取り數水ニテ洗ヒ必モ味ナキニ至テ乾シ硝子壺ニ入レ貯ス上好ノ品ハ皆右ノ二法ヲ以テ製ス
○古昔ハ多ク消石ヲ以テ是ヲ製ス今ハ用ルル稀ナリ其法消石ヲ製造スル時消石ヲ結芒セシメテ後其芒ヲ結バザル苦辛粘稠ノ汁ヲ取り濾過シ徐々ニ煮テ水氣ヲ乾シ鹽ト爲シ是ヲ坩鍋ニ入煨過メ白色トナルニ至リ水ニテ洗ヒ絶テ味ナキニ至リ乾シ貯フ或ハ扑硝ヲ水ニ溶シ煮テ膜ヲ生スルニ至リ放冷メ芒ヲ結

バシメテ上好ノ消石ヲ取り其刺汁ヲ前法ノ如ク
煮テ結芒セシムルヲ數回ニシテ少モ芒ヲ結バザル
汁ヲ取り。煮テ水氣ヲ乾シ煨過シ洗テ味ナキニ至
リ乾シ貯フ。○或ハ結麗土等ノ石灰質ノ土ヲ以
テ偽造スル者アリ宜ク仔細ニ擇ミ偽品ヲ用ル
勿レ。石灰ヲ加ヘ偽ル者ハ其量重シ。眞品ハ秤量甚
ダ輕シ。眞品一匁ト偽品二匁ト其多サ相等シ又眞
品ハ甚ダ清潔ニシテ雪白色ナリ。○酸味ノ液殊ニ稀
キ綠礬精ニ是ヲ加レバ盡ク速ニ溶化シ苦味ノ液
トナル。是ヲ火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ稠厚ト爲シ冷

處ニ置ケバ酸性苦味ノ芒ヲ結テ復詰厄利斯。瀉利
鹽トナルナリ。其苦味ノ液及ビ芒晶ハ微利ノ効ア
リテ小兒産婦虛人ノ大便閉ニ用フ若シ此物ニ石
灰質ノ土ヲ雜ルカ或ハ其土ニテ偽造スル品ハ右
ノ酸液ニ加レテ速ニ溶化シ難ク或ハ絶テ溶化セ
ズ。雲母ノ如クナリテ底ニ沈ムナリ
主治此藥ハ一種ノ中和鹽ナリ。酸敗液ヲ消刺スル
一良藥トス。土質ノ品ナレバ微大便ヲ利スル故ニ
胃ニ停滯セズ閉塞ノ害ナク大便閉ノ症ニ用テ妨
ゲズ速ニ制酸ノ良効ヲ奏シ凝結ヲ疏解シ依剥昆

堉兒神思鬱憂病共ニ重訂内科撰要脾病ヲ治ス凡
 質ノ藥ハ水液濕氣ヲ吸收シ殊ニ酸敗液ヲ剋制ス
 ルヲ主能トス故ニ性收瀦ノ胃腸ニ壅滯シ閉塞ス
 ル害アリ石灰様ノ土質ノ如ク然リ但此藥ハ瀉利
 鹽ノ酸性ト土質ノ亞兒加利鹽ト相和シタル中
 鹽ナル故ニ是ヲ服スレバ胃中ノ酸液ト抱合メ又
 一種ノ中和鹽トナリ輕キ瀉利ノ効ヲ爲ス故ニ土
 質ノ閉塞スルヲナシ
 ○小兒ハ多ク酸敗液ヨリ
 病ヲ生スル故ニ小兒諸病ニ多ク良驗ヲ稱ス○每
 服半錢ヨリ一錢ニ至ル小兒ハ二瓜ヨリ十瓜ニ至
 ル大人ハ半錢ニ沙糖。大黃。橙皮。茴香ヲ加ヘ用テ良
 ○是ヲ酸味ノ液ニ和シ用レバ胃ノ痙攣及ビ逆行
 ノ運動ヲ鎮メ嘔吐ヲ止ム左ノ方劇キ嘔吐ヲ止メ

大便ヲ微利スルニ奇効アリ麻痺ハ古亦製其味

麻痺涅失亞鎮嘔飲

其味ニ用レハ○鎮嘔飲

麻痺涅失亞過爾拔ハ糞餅舍降限イ大黃ヲ精

右麻痺涅失亞取テ必許宛拘椽汁ニ加ヘ必必液

動セ非也度ナシ其液ヲ取り硝子壤ニ内レ固封

ニ貯ク○麻痺涅失亞過爾拔ハ小兒酸敗液ノ腹痛

ニ殊効アリ香味ナクノ服シ易ク他人制酸土質ノ

品ノ如ク溢滯セズ宜ク此末ヲ飲液ニ加テ必許宛

數用フベシ或ハ左ノ方尤効アリ

遠西各物考 卷十一

制酸消毒飲

八麻^ゴ屈^シ涅^シ失^シ亞^ア過^ア爾^ル技^バ末^ニ錢^ニ薄^ク荷^ク舍^リ利^ト別^ト三^ニ錢^ニ苗^ク香^ク水^ニ三^ニ錢^ニ右^ニ調^シ和^シ之^ト一^ニ時^ト每^ト一^ニ匙^ト布^ク匙^ト用^ス若^シ大^ニ便^ト通^セザル^者ハ大^ニ黃^ヲ末^ト四^ニ五^ニ瓦^ヲ加^フベシ大^ニ便^トヨク^ト通^利スレ^レ疝^ノ腹^ノ痛^ヲ休^マザル^者ハ薄^ク荷^ク舍^リ利^ト別^ト大^ニ黃^ヲ除^テ白^ク罌^ノ粟^ノ舍^リ利^ト別^ト三^ニ錢^ヲ攪^シ和^シ用^フベシ○酸^ノ敗^レ液^及ビ風^ノ氣^ノ痞^ノ滯^ヨリ發^スル腹^ノ痛^ハ左^ノ方^亦屢^捷効^ト

驅風消毒散

沙^ノ糖^一苗^ノ香^一各^ニ錢^ニ右^ニ散^劑トシ半^ト時^ト每^ト一^ニ卯^ト匙^ト宛^ト適^ト宜^トノ飲^レ液^ニテ送^ス下^ス斯^ノ如^キ散^劑ハ小^兒勞^瘵様^ニ羸^瘦シ全^ノ軀^ノ榮^養虧^損シ頻^リニ饑^テ食^シ腹^ノ肚^ノ膨^脹シ酸^ノ敗^レ液^ノ症^ヲ兼^ル者^ニ用^ヒテ大^ニ効^{アリ}此^ノ症^ニ搗^撃テ兼^ルル^片ハ阿^ノ芙^蓉或^ハ麝^ノ香^ヲ加^フベシ右^ノノ消毒^飲ハ小^兒

兒ノ胸熱嗽痰喘等 胃寒熱。生齒熱。或ハ善性ノ痘
瘡麻疹。赤斑熱等ニ良驗アリ。若シ是ニ清涼ノ効ヲ
要シ或ハ大便ヲ利セズト欲スル者ハ左方。的効
ナリ。

默栗薩海那飲

默栗薩水 一弓

滿那 六錢

消石

麻屈涅失亞過爾拔

右研和シ頻々ニ一茶匙ヲ用フ

煨製麻屈涅失亞

製法

麻屈涅失亞過爾拔ヲ適宜ニ取り坩鍋ニ

入レ密ニ蓋ヲ覆ヒ炭及ビ灰ノ入ルヲ防キ火ニ上

セ。坩。熾紅トナリテ後一時許ヲ經テ火ヲ下シ硝子

曇ニ入レ固封シ貯フ但シ其初ハ漸々ニ火ヲ加ヘ坩

ヲノ熱セシメ通紅トナスベシ初メヨリ烈火ニテ

煨テ此藥力脱メ諸液ニ溶化スベカラザル渣塊

トナリ或ハ煨燒其度ニ過レバ侵蝕スベキ酷厲毒

トナリ是ヲ服メ害アレバナリ。故ニ煨製セザルヲ

切實トス○ヨク煨過スル者ハ是ヲ酸味ノ液ニ加

テ毫^{スシ}モ沸騰セズ是ヲ醋ニ加ルニ火ヲ上セ温ムルニ非レバ融化セズ若シ是ヲ醋ニ加テ稍滾動スル片ハ再ビ煨過スベシ○石灰質ノ土ヲ雜テ偽造スル者ヲ煨過スレバ其性更ニ酷厲トナリテ侵蝕ス故ニ是ヲ用ヒテ大害アリ

主治是ヲ煨燒スレバ其含ム所ノ酸性ヲ脫除シ純^モラ亞兒加利性トナル故ニ胃腸ノ酸敗液ヲ除クノ効甚ダ峻ナリ然レ下利ノ効ナシ凡ソ石灰質ノ土ハ速ニ酸敗液ト混和セザル故ニ自ラ侵蝕スベキ酷厲毒ヲ生ス但此藥ハ煨過ノ酸性ヲ脫除スルノ

ニナレバ侵蝕毒トナルヲナク制酸ノ効ヲ成スナリ

亞拔
福依

末^マ兒^ル叔^ト尼^ニ斯^ス散

マ^ロル^ヒス^マル^シヨ^ニス^シ羅^蘭

製法 芍藥^根

白鮮皮

槲寄生

鹿角

真珠母

蝟蛄石

各三ツ

或ハ石梅ヲ用フ

酸性ヲ含ムト多クメ性緩ナリヨク芒晶ヲ結ビ氣
ニ觸レバ粉碎トナル
主治是レ一種ノ亞兒加利鹽ニメ大抵刺篤亞斯下
同シ製煉術及ビ精好人硝子ヲ造ルニ用フ○此鹽
ヲ水ニ溶シ濾テ火ニ上セ煮乾メ固鹽ト爲セハ性
尤酷烈ニメ腐藥及ビ打膿法ヲ施スニ用フ。又衣服
ノ脂垢ヲ除クニ尤良。凡ソ亞兒加利鹽ハ油氣アル
者ヲヨク溶解スレバナリ○此鹽及刺篤亞斯ニ生
石灰ヲ和スレバ其含メル所ノ酸性ヲ脫除メ極テ
酷烈ナル亞兒加利鹽トナル (依)(伍)

蘇蓬鹽晶

キリスタルヨダ又サルヨダ又ソイダデ
シラタシヨダキリスタルレシ又ゲソイ
フルデデルフスルレキヨグソウト
又ヨグソウチヘヨルシレヨグソウト

製法

蘇蓬鹽

適宜

右極細末トシ鐵壺ニ内レ水適宜ニ加ヘ煮ルト良
久フメ其鹽氣ヲ融解セシメ水減耗スレハ數加ヘ
水氣ヲ蒸散メ稠厚ト爲シ温ニ乘メ濃過シ其液ヲ
冷處ニ置、片ハ晶ヲ結フ。其晶ヲ取り餘殘ノ液ヲ煮
出前法ノ如クシ芒ヲ結バシム。斯ノ如ク數回メ
其液終ニ芒ヲ結バガルニ至リ其芒ヲ集メ硝子壘
ヲ入レ固封シ貯フ (依)

又法 鹹蓬鹽 三北

其藥水 十二北
右鹹蓬鹽ヲ坩ニ内レ火ニ上セ煨テ硫黃ノ蒸氣消
スルニ至リ水ニ溶シ煮テ紙ニテ濾シ其渣ニ又水
六北ヲ和シ煮テ盡ク溶化セシメ紙ニテ濾シ前ノ
液ト合メ又濾過シ暫ク煮テ放冷シ芒ヲ結バシメ
其餘ノ芒ヲ結バザル液モ亦煮テ前法ノ如ク結芒
セシメ終ニ火モ芒ヲ結バザルニ至リ其芒ヲ取り
貯フ其餘ノ汁ハ煮乾シ白色ノ鹽トナルニ至リ右
藥蓬由共ニ收メ貯ヘ用フ

主治 是 鹹蓬鹽ノ純精淨潔ナル者ナリ 剝篤亞斯ニ

比スレバ性緩ニメ良効ヲ稱ス ○石淋ヲ治スルニ
多ク用フ ○蠟壳勿搗祭亞石鹼ヲ加ヘ丸トシ毎日
二錢或ハ三錢マデ用テ酸敗液ノ諸症ニ尤良

結麗土 蘭

○榕按ニ是レ豐後土或ハ白繪土間ノ稱ト呼ブ

者天造ノ結麗土ナリ風化石灰ハ人工ノ結麗土
ナリ西洋說ニ云結麗土ハ能ク火ニ堪ヘ烈火ニ
投メ燒ケル其色少シモ變セズ灰トナラズ消化

セズト。蘭山本草啓蒙ニ云。茶碗ノ白藥ニハ豊後
 玖珠郡ノ白土ヲ用フ。燒テ白色變セズト是ナリ。
 先輩是ヲ白堊ニ充レ凡重ハ磨沙ト稱シ且磁器
 ノ不ト爲ス者ニノ和蘭ニホルセイルト
 性結麗土ト異ナリ其
 結麗土ハ石灰質ノ白土ニノ其形鉛粉ト同シ。其質
 精細ニノ輕ク乾キテ脆ク磨碎スベク。ヨク水ヲ吸
 收シ沙様ナラズ粘氣アリ指ニ著テ剥易ク味毫モ
 收瀋セズ燒テ性色變セズ消散セズ。灰トナラズ。消
 石精ニ加バ盡ク溶化シ或ハ醋ニ加レバ沸騰ス。故
 三亞兒加利性ノ土トス。是ニ硫黃精若クハ綠礬精

ヲ和スレバ水ニ溶難キ一種ノ鹽トナル是ヲ硫酸
 加爾幾ノ石膏ト云燒テ白粉ト爲シ水ヲ和メ膠泥ニ
 用フ○往古此土結麗太島歐羅巴洲ニ産ス。故ニ結
 麗土ト名ク。今ハ歐羅巴洲ノ諸國ニ出ツ○此物白
 色ノ畫料書記及ビ器械墻壁ヲ塗ルニ用ヒ又醫藥
 ニ供ス○藥用トスルニハ是ヲ精製ノ汚物ヲ去リ
 用フ
 精製結麗土。結麗土ヲ取リ極細末トシ磁器ニ入
 多ク水ヲ加ヘ木棍ニテヨク搗リ和シ暫ク靜定メ
 後徐々ニ其上面ニ浮ム乳白色ノ液ヲ他ノ器ニ傾

又寫シ其渣^リ並^リ又水ヲ加ヘ攪滾ノ前法人如ク其水ヲ傾ケ寫シ斯ノ如ク數回^クシテ其水乳白色トナラザルニ至リ其水ヲ集メ合シ靜定メ其渣ヲ取リ又緻布ニテ其水ヲ濾^ステ布上ニ留ル粉ヲ取リ共ニ磁盃ニ入レ日乾シ研末トシ貯フ[○]

主治 結麗土ハ自然ノ風化石灰ニノ性功亦同シ。酸敗液ヲ剋制緩和シ且吸收ノ濕ヲ乾ス効アリ故ニ胃中ノ酸敗液ヨリ發スル諸症。吞酸嘈雜。胸腹刺痛等ヲ治シ或ハ肺血效略。下血諸失血ニ効ヲ奏シ蟲ヲ殺ス或ハ甘和ノ効アル舍利別^{白罌粟舍利別過爾詮亞舍利別等}

ヲニ加ヘ或ハ一味用ヒテ酷厲ナル粘液肺ヲ刺戟ノ發スル劇キ痰效等ノ胸病ニ驗アリ○下利ニ疝痛ヲ兼子或ハ酸敗液ヲ兼ル症ハ此物ニ驅風ノ藥ヲ加ヘ用ヒテ効アリ○凡ソ亞兒^{アル}加利性ノ土ハ酸敗液ヲ消化スルノミナラス又酷厲ナル粘液ヲ衝動刺戟スルヲ甘和ヲ抑制スル効アリ○服量一刃ヨリ一錢ニ至ル或ハ此末六弓ニ水三比ヲ攪和シ煮テ三分ノ一ヲ減シ靜定メ上清ヲ取リ濾過スレバ乳汁ノ如シ是ニ舍利別ヲ和シ服メ良○但土質ノ藥ハ澁滯ノ閉塞スルニ至^スニ必許宛用フベシ。過

服スレバ胃腸ヲ閉塞ノ食ヲ妨ケ或ハ疝痛ヲ發シ
或ハ便閉ヲ患ルコトアリ故ニ上ニ説ク如ク製シ用
ヒ或ハ必ク下劑ヲ加テ大便閉ヲ防ギ或ハ健胃香
竈ノ藥ヲ加ヘ用フベシ假令ハ肉豆蔻。山柰。薑。等ノ
未ヲ加ルガ如シ是亦酸敗液ヨリ起ル胸腹ノ諸症
ニ甚ダ驗アリ○甲介ノ類即チ蠟壳。雞卵壳。蜆壳石。
等ハ皆石灰質ノ土ト生族ノ粘液質トヲ含テ制酸
ノ効アル故ニ粘質少キ結麗土ニ比スレバ尤切實
ニメ害ナシトス○外敷メ焮赤腫痛ヲ消シ酷厲毒
ヲ祛ク故ニ創傷潰瘍ノ汚液出ルコト多キ症或ハ瘡

中水棉椽ノ贅肉ヲ乾シ癰瘡ヲ愈シ或ハ一切皮上
ノ焮赤小胞及ビ汗漏泄スル症或ハ乳頭圻裂ニ此
未ヲ掺ケ或ハ乾カス藥ニ加ヘ施メ良効アリ

血石 譯名 ハーマチテス 羅 ブルド ステ イン 蘭

此石ハ礦石ノ如ク堅固ニメ破碎シ難ク重ク稜ア
ル長キ塊片ヲ爲シ黯赭色ニメ微黑色ノ條理アリ
或ハ黃色ヲ上品ハ條理分明ニメ破碎スレバ鮮美
帶ルアリ
ノ束鐵紋ヲ爲シ朱砂ノ色アリ
レバ血色ヲ爲シ或ハ水ヲ加ヘ礪ニテ磨スレバ其

近ト名ル石アリ此亦血石ニ比スレバ堅固ナラズ
 ○假血石ト名ル石アリ其色全ク血石ト同シ然レ
 軟脆ニシテ小刀ニテ割截シ易シ畫家木匠等以テ摸像
 記痕ヲ爲スニ用フ是レ赤結麗土書記結麗土石筆
 云或ハブルドアルドノ義ト名クベキ者ニ又赤石
 筆ノ類ナリスノ如キ類多シト雖モ血石ニ比スレ
 バ堅固ナラズ又束鍼紋ナキヲ以テ分晰スベシ然
 凡其性功ニ於テハ大約血石ニ似テ中時漢時
 主治性收瀉閉澀シ乾燥ス諸失血吐血ヲ止ルニ速
 効アリ○白帶下利萎黃病經閉ヲ治スルト格碌

屈私未爾扶斯鐵ノ條ト同シ○服量極細末トシ十
 五氏ヨリ一錢マデ適宜ノ飲液ニ點服ス○燒酒ニ
 浸シテシキ丁幾去爾ト爲シ用ヒテ吐血尿血肺血衄血ニ

卦効ヲ稱ス○外敷ノ潰瘍ヲ乾愈ス是ニ肉豆蔻油少
 許ヲ研和シ創ニ塗テ愈ユ搗伍疾

桂テシキ去爾テウル○服量十二錢ト雖モ十餘ト有テ

製法判搗者桂一多燒酒二十度者

右硝子壘ニ内レ固封シ淹ス六日漚テ滓ヲ去リ

固封シ貯フ〔按〕固封シ貯フハ六日懸ク朝ト去リ

主治衰弱ヲ強壯シ精神ヲ爽快シ諸失血下利脱泄

等ヲ閉止スルノ良効アリ是ヲ單用シ或ハ對症ノ

劑ニ加ヘ用フ○服量十二滴ヨリ三十滴マデ葡萄

酒ニ加ヘ用ル一日三四次○桂露ニ比スレハ苦味

アリテ收瀉ノ功多シ〔依〕

桂。舍利別〔依〕○依遠東藥典云其肉且蒸時

製法桂極細末四多〔依〕○依遠東藥典云其肉且蒸時

正人水一北○依遠東藥典云其肉且蒸時

右硝子壘六肉レ固封シ淹ス〔依〕三日。布片ニテ絞リ

ハ漚シ其液ヲ靜定ノ渣ヲ去リ左ノ藥ヲ加フ

桂露 一北半

沙糖 淨白者 三北

右磁鍋ニ入レ文火ニ上セ溶化シ水氣ヲ蒸散メ舍

利別ノ稠ト爲シ固封シ貯フ〔依〕

主治胃ヲ健運シ神經衰弱ノ諸症。處女病。虛寒ノ淋

疾白帶下ヲ治シ諸脱泄ヲ止メ驅風ノ効ヲ稱ス〔依〕

健質亞那羅 ゲンチアイン 蘭

○按ニ是レ和蘭藥鏡ノ龍膽草條下ニ載ル所ノ

ゲンチアナノ第三種。根太キ者ナリ若シ缺ル片ハ龍膽ヲ代用スベシ其説和蘭藥鏡ニ出ツ
健質亞那越幾斯劑 エキスタラクト ゲンチアナ羅

製法

健質亞那

根粗末

用法

沸湯

十北

右浸ス日十二時ニ磁罐ニ内レ蓋閉シ煮ル一
時。温ニ乗ノ過過シ汁ヲ取リ沸湯八北ヲ其滓ニ加
ヘ煮ル一。一時。温ニ乗ノ絞リ濾テ滓ヲ去リ前ノ汁
ト合シ是ヲ煎熬ノ膏ト爲ス

主治

健胃ノ良藥トス是ヲ服メ刺戟衝動セズ熱ヲ

増發セズ飲食消化シ難キ等總テ胃弱ノ諸症。萎黃
病。胃腸風氣痞滿。疝痛。酸敗液腹痛。脾病。依剥イボ昆垓コンゲル兒
子宮病ヲ治シ。虚症ノ黄疸。間歇熱ヲ解シ。痛風關節
痛ヲ消シ白帶下。虚損ニ因ル經閉等ニ良驗アリ。是
ニ幾那キナヲ加テ健胃ノ効尤峻ナリ故ニ頑固ノ間歇
熱ニ用ヒテ治驗多シ○服量十瓦ヨリ二十瓦ニ至

健質亞那

丁幾去爾ランキン

根搗碎者

製法

健質亞那

燒酒

十五度者

ク乾シ貯フ○此物新鮮肥實。虧損セズ。黯赤色ニノ
 柔ナル者ヲ擇ムベシ○其樹ハ亭落葉樹ノ一種
 一種ニシテ大約四尺許ノ灌木ナリ葉骨ニ似テ小
 ク邊ニ刺角アリ四時常緑。花ハ猫兒ニシテ鱗屑様ノ
 細線ヲ以テ成リ是ニ碎花著ク。盞様ニシテ刻缺アリ
 花後實ヲ結バズ實ハ別ニ枝ニ生シ擱實ノ如クニ
 ノ灰白色。斗ニ刺アリ其内ニ仁アリテ兩片ニ分ル
 ○此物意太利亞伊里斯把尼亞波爾杜瓦爾弗郎察福
 撈察蘭牛鐸古甘的亞以上歐羅巴其他亞細亞洲亞
 弗利加洲ノ諸煖地ニ産ス辛苦

○按ニ此物和漢産未ダ詳ナラズ洋船ノ品ヲ用
 フベシ

主治 性收斂ス油氣鹽氣アリ衰弱ヲ強壯シ失氣眩
 暈ヲ治シ胃ヲ健ニシ嘔吐ヲ止メ飲食ヲ消化シ孕

婦産婦ノ虛損ヲ復シ墮胎ヲ防護シ痘疹ヲ驅發ス
 ○往古ハ虛損ヲ補充スルニ多ク用フ近來ハ用ル
 下罕ナリ○服量半刃ヨリ一刃ニ至ル。細末トシ或

ハ雞卵ニ攪和シ用ヒテ催生藥トス。性功大抵哥攝

尼爾後ニ出ツト同シ 物 國 國

結爾ル 蔑斯ス 舍利ル 別ル セイロプスケルメス羅

製法 結爾蔑斯

結爾蔑斯 二弓

蓄薇露

右結爾蔑斯 蓄薇露ヲ加ヘ浸ス 十二時。文火ニ

上セ煮熟シ搾テ汁ヲ取リ砂糖ヲ加ヘ再ビ文火ニ

上セ水氣ヲ蒸散メ舍利別ノ稠ト爲ス

主治 結爾蔑斯主治ノ諸病ニ尤効アリ

結爾蔑斯 昆設爾弗

ベニシ蘭

製法 結爾蔑斯舍利別

北平ノ新法ノ品ヲ用

沉香

桂 各六錢

右舍利別ヲ文火ニテ溶シ二味ヲ下シ煉和ス

主治 腦心ヲ強壯シ精力ヲ旺盛シ精神沈重ヲ爽快

シ胃ヲ健ニシ眩暈昏冒ヲ醒シ神志鬱憂病ヲ治シ

虚脱ノ下利赤痢水腫ニ効アリ 服量一刃ヨリ一

錢ニ至ル

見篤散

製法

蟹爪

二弓

珊瑚石

一弓

真珠

一匁

鹿角灰

一匁

琥珀

各二匁

昆答刺越

兒發根

八匁

反鼻

四匁

金箔

一匁

右各別ニ極細末トシ調勻ノ散劑トス

主治 小兒痲痺搐搦及ヒ酸敗液ノ諸症ニ奇効ヲ奏

シ汗ヲ發シ惡液ヲ表發ス蒸氣ヲ排泄シ神經ヲ

強壯ニス○服量六匁ヨリ一匁ニ至ル

各六匁

遠西醫方名物考卷十一終

Kitasato Memorial Medical Library