

遠西醫方名物考

計下 不

卷十二

✕
e 15

高士川文庫
✕
499.2
En-3
12


某

499.2
E 11-3
12

No. 1437
18 e 15



3279



遠西醫方名物考標目

卷十二

芫菁

芙蓉驅水丸

芫菁丁幾去爾

芫菁驅水酒

芫菁乳

治淋丁幾去爾

芫菁越栗失爾

咬傷消毒丸



遠西名物考

卷十二

標目

咬傷解毒丸

發泡硬膏

發泡軟膏

排毒化膿膏

〔不〕覆盆舍利別

蒲里阿尼亞

府利

卷十二

遠西醫方名物考卷十二



遠西醫方名物考卷十二

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

芫菁

〔性〕芫菁ハ揮發鹽ト華爾斯ヲ以テ其質ヲ成ス。是レ
燒酒ニ浸セバヨク溶解シ水ニハ溶化セザレバナ
川○製煉術ニテ是ヲ蒸餾スレバ亞兒加利性ノ揮
發鹽蒸升シ其底ニ華爾斯殘ル。是ニ揮發酸性ノ酷
厲毒ヲ含メリ。味ヒ舌ヲ侵刺シ其氣惡ムベシ○是

ヲ研末スレバ其氣眼鼻咽喉ニ竄入メ大ニ焮腫シ
 或ハ總身斑疹ヲ發スル者アリ故ニ研磨スルニ戒
 慎ヲ加フベシ○此蟲ハ久ク貯テ性能ヲ失ハズ然
 氏新ニノ全形具ル者ヲ擇ニ用フベシ
 [主治] 芫菁ノ主功二般アリ○其一ハ此蟲殊ニ腎輸
 尿管膀胱尿道ヲ刺戟スル一種ノ酷厲毒アリ故ニ
 過服スレバ右ノ諸器大ニ焮熱腫痛シ或ハ尿崩尿
 血ヲ發ス或ハ口舌咽喉熱燥シ胃腸肛門モ亦焮痛
 赤爛シ甚キ者ハ壞疽トナリ死ス故ニ右ノ諸器焮
 腫アル者ニ用レバ大ニ其症ヲ増劇ス然ルニ精練

ノ醫家病性ヲ察シ服量ヲ慎ニ適宜ニ是ヲ用レバ
 其酷厲毒ヲ以テ腎膀胱等ヲ刺戟衝動シ小便分利
 ノ機轉ヲ進メ極テ利尿ノ峻効ヲ奏ス故ニ水腫小
 便閉ノミナラス凡ソ粘稠ヲ稀釋シ凝結ヲ疏解シ
 小便ニ驅泄シ治スベキ諸病ニ奇効アルト是ニ比
 スベキ者ナシ○其二ハ是ヲ過用スレバ其酷厲毒
 ヲ以テ特ニ小便ノ諸器ノミナラス全軀ノ凝體纖
 維ヲ侵蝕毀壞シ血液ヲ稀渙焯崩メ危殆ノ諸症ヲ
 發ス是ヲ外敷スレバ肌膚ヲ腐爛シ發泡潰蝕スル
 ヲ以テ知ルベシ然ルニ良醫ノ手ニ在テ患者ノ強弱

ニ隨ヒ病性ヲ察メ服量ヲ斟酌シ或ハ對症ノ藥劑ニ調和シ用レバ是所謂名匠ノ利器ニシテ其酷烈刺戟ノ殊能ヲ以テ衆器諸液ノ運動怠慢衰頹セルヲ警發醒覺シ元運生氣ノ沉滯潜結セルヲ振起發揚シテ一種ノ熱ヲ誘發ス此熱即チ細絡纖管ニ頑滯セル膠粘液ヲ融解蕩滌ノ諸竅ニ驅逐ス是ヲ以テ頑痼危險ノ諸病即チ痲癩神經熱腐敗熱疫欬經閉咬傷毒癩等ニ奇効アリ○右兩件ノ主功ハ此蟲ニ稟ル所ノ一種ノ刺戟衝動ノ所爲ニシテ古今ノ明哲多ク歷試考究シ殊効ヲ稱スルヲ勝テ算ヘ難シ即

チ其一二人ノ經驗說ヲ左ニ舉グ

水腫 **小便閉** 水腫ニ芫菁ヲ内服ノ利水ノ峻効アリ

殊ニ諸脉纖維ノ弛弱縱緩ノ感觸鈍ク血液ノ運行

怠慢ナル水腫ニ用ヒテヨク停水ヲ驅泄ス是レ動

脉ノ神經膜動脉管ヲ襲成スル神經衣膜ヲ刺戟ノ其搏動ヲ强健

ニシ血液ヲ進輸ノ壅滯ヲ開利シ小便ヲ驅逐スレ

バナリ○服量四分爪ノ一ヨリ一爪マデ龍腦上沙

糖少許ヲ研和シ用フ龍腦ハ芫菁毒ヲ抑制ス是レ小便

閉ノ云ナラズ小便不利艱澁淋瀝等ノ症ニ用ヒテ

捷効アリ○或ハ芫菁末ニ酒石鹽ヲ加テ驅水藥ト

用ヒテヨク水腫ヲ治ス○或ハ此末ニ消石龍腦
 各一二匁ヲ加ヘ用テ焮衝ヲ防キ小便閉ヲ治ス○
 或ハ此末一匁ヨリ三匁マデニ甘汞ト龍腦少許ヲ
 加ヘ用テ水腫ヲ治スルニ甚ク驗アリ○一患者小
 便涓滴モ通セザルヲ十一日利尿ノ諸藥寸効ナク
 苦悶譫語筋惕肉瞤冷汗等ノ惡症ヲ發ス乃チ芫菁
 末一匁ヲ扁桃乳ニ研和シ分テ九服トシニ時毎ニ
 一服宛與フ第三服ニ至テ小便漸ク利シ諸症隨テ
 減シ回復ス○一婦人腹水ヲ患フ芫菁下幾去爾後
 出ヲ取テ二十滴宛列印設酒ニ點服シ爾後漸ク加

テ四十滴ニ至リ小便快利ノ全治セリ○水腫ニ芫
 菁發泡膏ヲ貼ノ亦効アリ然レ内服スルヲ尤切實
 トス刺戟スルハ少ク且焮衝ヲ發セズ諸器脉管ノ
 運動ヲ増進シ粘稠液ヲ稀釋ノ小便ニ通利スレバ
 ナリ○焮衝ノ候ナク膀胱麻痺不遂ノ小便利セズ
 或ハ尿道粘液質ノ腫瘍アリテ久ク愈ズ小便利
 不妨ク是ヲ刺戟衝動ヲ疏散スベキ症ハ皆芫菁ヲ
 用テ効アリ○尋常ノ水腫ニ丸藥奇効アリ
芙蓉驅水丸
 精製者
 十二匁

芫菁末 六分

右研和ノ十二丸ト爲シ銀箔ヲ衣トシ朝夕一丸宛服シ爾後漸ク半丸ヲ加フ是ヲ用レバ小便崩泄シ水腫隨テ消ス但痛ヲ發シ小便利セザル者ハ速ニ此藥ヲ休ムベシ

芫菁丁幾去爾

製法

芫菁一錢 二十度者

右硝子燬ニ入レ固封シ浸ス一六日。紙ニテ瀝シ硝子燬ニ内レ固封シ貯フ按患者ノ感觸甚フノ芙蓉

驅水丸ニ堪ザル片ハ此テ丁幾去爾ヲ用フベシヨク小便ヲ利ス但每人瞑眩ノ一様ナラザル故ニ初少許用テ漸ク加フベシ假令タハ十五滴宛日ニ一次用ヒ。漸ク加テ患者小便焮痛ヲ覺ルニ至ルベシ諸藥効ナキ小便閉ニ此劑一二匙用ヒテ小便崩泄シ全愈セル者アリ○左ノ藥酒亦水腫ニ奇効アリ

芫菁驅水酒

芫菁末 一匁

列レ印セ設酒四匁

右硝子燬ニ内レ浸メ藥氣ヲ出シ瀝テ滓ヲ去リ此

液一匙ヲ取テ葡萄酒七匙ニ和シ用ス○芫菁ヲ乳劑トシ用レバ瞑眩ノ恐ナシ故ニ感觸シ易キ者ハ左ノ方ヲ用フベシ

芫菁乳 芫菁末 半錢

龍腦 一、二分 亦水煎ニ有クマリ

甘扁桃 一、二分 亦水煎ニ有クマリ

水 十、二十分 亦水煎ニ有クマリ

右扁桃ニ水ヲ加ヘ搗テ乳白色ノ汁ト爲シ次ニ二味ヲ研和シ一時或ハ一時半ニ一匙宛用ス○或云芫菁ハ小便閉ニ奇効アルト他ニ比スベキ者ナシ

然レ庄諸般ノ小便閉此一藥ニテ悉ク治スベキニ非

ズ唯腎中ノ泌尿管 重訂内科撰要尿管篇第三百十

中ノ細管ナリ輸尿管膀胱等ノ纖維衰弱弛ノ感觸鈍ク

麻痺ノ小便ヲ分泌健輸スルト能ハズ或ハ右ノ諸

道ニ粘液凝滯ノ小便ノ分利ヲ妨ケ閉塞スル者ハ

此藥ヲ用ヒテ刺戟衝動シ其諸器ハ運營ヲ増發セ

シムレバ小便忽チ利ノ諸症自ラ解ス然レ庄腎膀胱

等ノ痙攣 腎尿管膀胱頸及ビ焮衝ヨリ發スル症

ニ用レバ大ニ害アリ凡ソ刺戟衝動ノ諸藥ハ痙攣

及ビ焮衝ヲ増劇セシムレバナリト。或云芫菁ヲ

内服ノ腎膀胱ニ焮衝ヲ發スル者アレハ是ニ因テ
 小便閉ニ至ル者ナシタトヘ假令ハ芫菁發泡膏ヲ外敷ノ
 其毒皮管ヨリ血中ニ侵入シ腎膀胱ニ觸テ焮衝ヲ
 發スル者アレハ是ヨリ小便閉ヲ爲ス者ナキガ如
 シモシ或ハ此藥四匁若クハ六匁ヲ一服トスルガ如キ
 服量過多ナレバ腎膀胱尿道大ニ焮衝シ或ハ尿崩
 尿血等ヲ發スルコトアレハ小便閉ヲ爲ス者ナシ○
 或云水腫ハ水液多ク血中ニ混淆シ血ノ醇厚ノ質
 ヲ失ヒ焮解ノ終ニ腐敗ス然ニ芫菁ヲ用レバ其酷
 厲毒ニテ血液ヲ焮解崩壞ノ逾危篤ニ至ラシムト

然レハ服量適宜ニ是ヲ用レバ速ニ其停水ヲ驅泄ス
 ルガ故ニ曾テ血液ノ腐敗ヲ恐ル、コトナシ
 淋疾淋疾黴毒淋ヲ患ヒ其毒漸ク解散シ小便通スルニ
 痛少ク唯粘液漏泄ノ歇ヤザル症或ハ頑固ノ遺精ニ
 芫菁ヲ用テ良効アリ此症動モスレバ經久治セズ
 滯患トナリ諸藥効ナキ者多シ是レ攝護精囊尿道
 等ノ腺輸泄管重訂内科撰要黴毒衰弱緩弛ノ粘液
 ヲ漏泄スル症ナル故ニ是ヲ用ヒテ刺戟衝動シ其
 衰弊セルハタシキ運營ヲ憤起増發セシムレバ其諸器自ラ
 健旺メ小便通利ノ常調ニ復スルナリ夫ノ腎膀胱

大麻痺ノ發スル小便閉前條小便失禁後ト症ヲ異
ニ原ヲ同フスル故ニ其ニ此藥ニテ治スル所以
ナリ○右ノ諸症ハ芫菁末一匁ヨリ三匁マデ烏賊
骨末一錢ニ研和シ日一服宛用ヒテ効アリ或ハ左
ノ方良驗アリ

治淋丁幾去爾

大黃丁幾去爾

三錢○製法大黃剉十五度ノ
燒酒八倍ヲ加ヘ硝子壘一匁

固封シ浸ス六日滷テ
其液ヲ取り貯ス

亞刺比亞越謨

一錢半

紫鉚

一錢

芫菁

末二錢

右銳烈ノ燒酒一比半ヲ加ヘ浸メ藥氣ヲ出シ其症

ノ輕重ニ隨ヒ三十滴ヨリ五十滴マデ朝夕兩次微

温湯少許ニ點服ス○微毒ナクメ久ク愈一ザル淋疾

モ芫菁劑良効アリ○或云芫菁ヲ過用スレバ小便

淋澁焮痛シ腎膀胱尿道ニ焮腫或ハ膿瘍ヲ發スル

故ニ總テ淋疾ニハ害アリト。但是ハ微毒淋ノ初發

其毒多ク鬱蓄シ尿道焮熱腫痛スル症ニ用レハ害

アルヲ云ナリ微毒漸ク解散シ小便通スルニ痛ナ

ク粘液漏泄メ久ク愈一ザル症ニ用レハ良効アルナ

芫菁 未半多

越粟失爾赫篤立 一北 綠藝條

右調和シ浸ス一兩三日。瀝過シ十五滴ヨリ三十滴

マデ服スル一日兩三次或ハ初十滴宛日兩次用ヒ

爾後二十滴宛用ヒ終ニ三十滴至ル扁挑乳或ハ

亞刺比亞越謨漿 亞刺比亞越 謨ノ條ニ出 ヲ兼用メ尤良

小便失禁 此症亦芫菁ヲ用ヒテ間奇効アリ是レ勝

眈頸ノ括閉筋麻痺不遂ノ括約ヲ失フヨリ發スル

故ニ是ヲ用ヒテ効アルヨリ前條ノ症ト同シ○一男

子小便失禁ヲ患ヒ經年愈エス幾那ヲ服シ芫菁膏

ヲ薦骨ニ貼メ發泡シ或ハ冷水ニ浴メ皆寸効ナシ

終ニ芫菁丁幾去爾 上ニ出 ヲ内服セシメ又其丁幾去

爾ニ錢。礬砂精一錢。亞麻油少許ヲ研和シ患者ノ會

陰ニ塗擦メ全愈セリ

非 此病ハ諸筋及ビ神經虧損ノ官能ヲ失フヨリ發

スル故ニ芫菁ヲ用ヒテ其衰弊セル運營ヲ憤起逞

發セシムルヲ尤肝要トス。凡ソ侵刺衝動ノ細管纖

維ニ鑽透穿入スルヲ芫菁ニ若ク者ナキ故ニ古人

多ク是ニ發泡膏ヲ外敷メ良驗ヲ稱ス。晚近漸ク内

服劑トシ其性功ヲ擴充發明メ沈痾痼疾ヲ救フ

甚多。此即前二說之小便閉。尿管。小便失禁ヲ
 治スルト同シ。○一男子痲ヲ患フ。芫菁^{ライキタル}丁幾去爾ニ
 硃砂精ヲ加テ内服セシメ。又是ヲ項窩。脊推及ビ頑
 痺ノ關節ニ擦メ平復ス。一人頑固ノ脚痲ヲ患フ。每
 日芫菁^{ライキタル}丁幾去爾十滴宛。錦葵花ノ浸劑ニ點服スル
 七日。其後二十滴宛前法ノ如ク用ヒ。又扁挑乳及
 ビ龍腦ノ丸藥ヲ兼用メ尿道ノ刺戟ヲ防キ二月ニ
 ノ回復ス。

痲疫效 **頑痰** 芫菁ハ脉絡纖維ヲ刺戟メ其運動ヲ增
 發シ膠固頑結ノ諸液ヲ驅逐スル故ニ痲疫效及ビ

肺。氣管。咽喉ニ膠痰凝聚壅盛セル症ニ開大効アリ

經閉 婦人體質薄弱ニ萎黃病及ビ粘液質ノ諸病
 ニ罹リ經閉ヲ患ル者ハ是ヲ用ヒテ膠粘稠固ノ汚
 液ヲ稀釋メ回復スル者多シ

遷延神經熱 **腐敗熱** 芫菁^{ライキタル}丁幾去爾ニ民埵^{ミンデ}列利精。鹿
 角精。雜腹蘭。龍腦ヲ適宜ニ加ヘ神經熱腐敗熱ニ用
 ヒテ大効ヲ得ルヲアリ此熱病險重ニ至レバ視聽
 嗅味ノ神經麻痺メ作用ヲ失ヒ精神亦錯誤スル故
 ニ是ヲ用ヒテ其神經及ビ元運生氣ノ運營沈重怠
 慢ナルヲ衝動揮發シ血液ヲ活潑健運セシメテ治

スルナリ。是ヲ外敷メ亦効多シ。然レ其毒ハ狂犬咬傷ノ要藥トス。是ヲ用ヒテ小便ヲ利スルノミナラズ。發汗ノ其毒ヲ解ス。芫菁末ヲ丸トシ。或ハ丁幾去爾トシ用テ良。○左ノ方殊ニ治驗多シ。

咬傷消毒丸

芫菁 末 一匁

甘汞 一匁半

龍腦 十匁

右研和シ亞刺比亞釐謨漿ヲ加テ丸トシ。毎夜一服

トス。又規吉撒兒弗ヲ以テ毎日其創ニ塗ルベシ。効驗尤モ的實ニシテ再發スルコトナシ。病治メ後半年許ハ右ノ丸藥ヲ用フベシ。○咬傷毒ニ因テ狂躁等ノ危症ヲ發スル者ハ左ノ丸藥奇効アリ。

咬傷解毒丸

芫菁 末 六匁

桂 末 十二匁

砂糖 半錢

右研和シ玫瑰蜜適宜ニ加テ三十丸トス。五丸ニ芫菁一匁ヲ含メリ大人ハ一時毎ニ六丸ヲ服ス。一歳

ノ兒ハ一時毎ニ一丸四歳ハ二丸七歳ハ四丸宛服
ス又芫菁發泡膏ヲ其創ニ貼シ患者ヲメ數温湯ニ
浴セシメテ尤良

瀨芫菁テシキテタル丁幾テタル去爾テタルヲ瀨ニ用ヒテ開大効ヲ得タル經

驗說甚ダ多シ。是レ腎ニ於テ分泌スル小便モ皮表

ニ發越スル汗及ビ蒸氣モ固ヨリ一種ノ液ナレバ

此利尿ノ馱藥ヲ用ヒテ皮表ニ浸淫セル毒液ヲ小

便ニ驅逐シ一ニハ其頑凝牢著セル惡液ヲ稀釋焔

解ノ諸竅ニ排泄スルニ因ル凡ソ經久頑滯ノ皮

病ハ表部ニ運輸セル洩左イニ重訂内科撰要第 粘稠ニ

ノ酷厲毒ヲ夾ムニ因ル故特ニ瀨ノミナラズ總テ

險重惡厲ニモ諸藥効ナキ瘡瘍ヲ治スルノ効驗甚

タ多シ○芫菁ハ一種ノ烈キ酷厲毒ナレバ誤用ノ

害ヲ致スヲ亦少カラズ故ニ精良ノ醫家病性ヲ察

シ體質ヲ審ニシ戒慎ノ服量ヲ些少ニシ用ルニ非

レバ百中ノ効ヲ得難シト知ルベシ依叔福後

發泡硬膏 エ ン プ ラ ス ト ヘ シ カ ト リ ム 羅
ア ラ ル テ ッ ケ ン デ フ レ イ ス テ ル 蘭

製法 芫菁細末 黃蠟各八分 松香

遠西醫藥考 卷十一 三十一

滿香 各四弓
家猪脂 三弓

右臘。松香。滿猪脂ヲ文火ニ上セ焯化シ次ニ芫菁末

ヲ加ヘ火ヲ下シ煉和シ硬膏ト爲ス

又法 中芫菁

細末

家猪脂

各四弓

黃蠟

松香 各一弓

劍重蒸酢

七弓

右煉和メ硬膏トス

臣

發泡軟膏

ユシグエシカトムヘシカトム

製法

越没里膏 六弓

芫菁

極細末

右膏ヲ火ニ上セ焯化シ芫菁末ヲ加ヘ煉和ス

又法

拔實栗膏 七錢

芫菁

末 一錢

右調和ス

或ハ芫菁末ヲ家猪脂或ハ適宜ノ軟膏ニ和シ貼

シ或ハ芫菁末ヲ醋ニ和シ是ヲ攤タル硬膏ノ上ニ

敷テ貼スルモ亦ヨク發泡ス

遠西名物考 卷十一 十四 廣雲堂藏

スニハ羌青^{イシキ}丁幾^{チキ}去爾^{キョ}出ツ^{上ニ}ヲ外敷^ニ或ハ羌青末ヲ
阿利^オ襪^イ油^フニ研和シ塗テ良^ニ○此軟膏ハ上ノ硬膏ニ
比スレバ泡ヲ發スル^ル速ナリ故ニ多ク是ヲ用フ
發泡部位項窩。顛顛。耳後。肩胛ノ間。股。腓。脚。等ナリ但
是ニ拘ラズ其症ニ隨ヒ各處ニ貼ス。齒痛。背痛。手足
痛ノ如キハ直ニ其患部ニ貼スル等ナリ唯神經多
クノ知覺ノ敏ナル部ヲ避ル^ルニ
發泡試効是ヲ貼スレバ其處水泡ヲ發シ是ヨリ一
切内部ニ鬱蓄スル病毒惡液ヲ外泄シ速ニ其部ノ
疼痛等ヲ治ス。故ニ總テ急迫ナル諸症ニ捷効アリ

但皮中人神經ヲ侵刺衝動ノ運動ヲ増發スル故ニ
疼痛ヲ治スル効ヨリハ其部ニ壅塞ヲ開通シ其毒
ヲ疏散スル功尤^モ居多^ホシ○此膏ハ痛風流走痛等ノ
諸痛ノニナラズ内藏ノ痲衝或ハ痙攣ノ諸症或ハ
瘡瘍内攻ヲ發スル諸症ニ貼メ其内鬱ノ毒ヲ外部
ニ引泄ス。但患人壯實ニハ刺絡スベキ者ヨリハ虛
弱ニ屬スル症ニ尤^モ効アリ是レ羌青ハ侵刺衝動ノ
性力ヲ以テ諸器血液ノ弛弱怠慢ナルヲ憤起醒覺
メ其毒ヲ排泄セシムレバナリ故ニ神經血脉ノ弛
弱ニハ運營怠慢ナル者ホド^イ逾功多^シ○咽喉焮腫

遠西名物考 卷十一 十四 廣雲堂藏

頭或ハ項窩ニ貼メ泡水出レバ其劇痛忽チ解散
ス劇キ齒痛ハ其外部ニ發泡メ捷効アリ○痛風傷
冷毒痛流走痛荏苒タル關節痛肩背腰腕脚等ノ
焮熱ナキ痛ハ患部ニ發泡メ其毒ヲ泄シ治ス○内
部ノ焮衝ハ其外部ニ發泡メ効アリ然レ先ツ焮衝
ノ治法ヲ施メ其劇盛ナル諸症ヲ減スベシ焮衝劇
クメ暫留スレバ膿ヲ成シテ危篤ニ至レバナリ胸
脇焮衝肺焮衝等ハ刺絡スル一兩次ニメ其焮衝
ノ血ヲ減シ次ニ胸脇ノ疼處或ハ其近傍ニ發泡ス
レバ更ニ病毒ヲ疏散メ分利セシメ且其疼ヲ消散

ス患人衰弱セル者ハ殊ニ良○胸脇痛ノ表部ニ在
ル者按ノ痛ハ其疼處ニ發泡メ速ニ治ス○頑固ノ
疝痛或ハ疝痛ノ腸焮衝トナランコトヲ恐ル症或ハ
既ニ焮衝ヲ兼ル者或ハ赤痢ノ痛劇キ者ハ皆其疼
處ニ發泡メ解散ス○傷冷毒ノ眼耳痛齒痛頭痛ハ
項窩耳後顛顛等ニ施メ良○焮腫眼ニハ項窩或ハ
顛顛ニ發泡メ速効アリ但預メ尺澤ニ刺絡メ患部
ニ攻衝スル血ヲ瀉メ尤良傷冷毒流走痛ヨリ起ル
焮腫眼モ是ニ同シ○焮腫眼ノ淚多キ症モ亦顛顛
或ハ耳後ニ發泡メ効アリ麻疹後此症多シ○傷冷

毒ノ炊腫眼及ビ齟齒痛ハ其發泡ヲ膿潰セシメテ
久ク汚液ヲ漏泄スルヲ肝要トス如此症ハ發泡硬
膏ヲ貼メ良○黑障眼兩形眼ニハ是ヲ額ニ貼シ膿
眼ニハ項窩ニ貼メ効アリ○惡厲ノ疥癬癩乾癬浸
淫瘡疥瘡或ハ頑固ノ頭瘡雁瘡等ハ患部ニ發泡メ
惡液ヲ泄シ若クハ膿ヲ成テ其毒ヲ泄シ或ハ其内攻
セルハ速ニ再發メ鬱毒ヲ驅泄ス○熱病ノ斑疹及
ビ痘瘡ハ適宜ノ部ニ發泡スレバヨク其瘡ヲ透發
メ潜伏セシメズ或ハ其陷没内攻スルヲ發越セシ
ム○痘瘡ノ初發臂腓或ハ背ニ發泡メ痘毒ヲ肢體

下部ニ疏導シ頭面ニ多ク發セザラシメ或ハ眼目
ニ傳染スルヲ避ケ或ハ咽喉ニ侵襲メ呼吸不利飲
食嚥下シ難キ等ノ患無ラシム○痘兒虛弱ニメ見
點スレ用快發起脹セズ或ハ行漿メ善膿ヲ釀セズ
苦悶譫語不寐或ハ痘乾枯メ内陷スル等ニ發泡メ
ヨク其毒ヲ誘發シ諸惡症ヲ治ス○凡ソ頭腦及ビ
内藏諸器ニ酷厲毒アリテ諸惡症ヲ發スル者ハ四
肢背脊等適宜ノ部ニ發泡シ其毒ヲ外泄メ聞大効
アリ○潰瘍ヲ作り或ハ打膿法ヲ施メ内部ノ毒ヲ
表發シ或ハ種痘ヲ爲スニモ亦此膏ヲ用フ○芫菁

ハ諸器血液ノ運營怠慢之弱ナルヲ刺戟衝動ノ警
發省覺セシムルガ故ニ遷延緩慢ノ熱病即チ神經
熱。心藏ノ運動微弱弱 脈微ニメ患者虛煩呻吟耳聾。小
便黦澹色等ノ症ニ是ヲ頭部項窩ニ貼シ或ハ部位
ニ拘ラズ發泡ノ大効アリ○惡性熱。腐敗熱ノ患者
虛憊ノ精神沈倦昏聩或ハ脉沈微ニメ四肢厥冷セ
ル者ニ發泡ノヨク其精力ヲ挽回ス○諸病ニ虛熱
ヲ兼子。精力虛乏。精神蒙昧或ハ昏睡様ノ症アリニ
是ヲ貼メ効アル一ト神經ヲ強壯ニスル諸藥ノ如シ
①卒倒昏睡ハ是ヲ項窩ニ貼シ大ニ發泡ノ省復ス

但、粘液質ノ患者ニ尤驗アリ、癩ニモ亦良効アリ、然
レ其麻痺ノ部ニ循行スル神經ノ原本ヲ考索メ發
泡スベシ○或ハ發泡膏ニ堪ガル者或ハ遍ク麻痺
ノ部ニ施スベキ者或ハ稍侵刺メ小泡ヲ發セシメ
ント欲スル症ハ芫菁ランキ丁テタル幾ル去爾前ニ出クヲ布巾ニ蘸ヒタメ
廣ク癩不遂ノ部ニ貼シ縛帶ヲ施セバ其部悉ク小
泡ヲ發ス是ニ硃砂精ヲ加レバヨク鑽透シテ其効
尤速ナリ○痙攣ノ部ニ發泡メ効アリ是レ其内鬱
ノ病毒惡液ヲ引世シ一ニハ刺戟衝動ノ功力ヲ以
テ痙攣ノ運動ヲ變化メ消散スレバナリ故ニ癩症

或ハ瘰癧性ノ效嗽喘急或ハ瘰癧ヨリ起ル經久ノ胸
腹痛及ビ嘔吐ヲ治ス○小便失禁ニハ薦骨ノ部ニ
發泡ノ驗アリ○傷冷毒ノ經久ノ效嗽ニハ胛間ニ
發泡ノ捷功アリ○狂犬咬傷ハ其創ニ芫菁末ヲ摻
シ縛帶ヲ施シ潰爛ヲ愈ル¹ヲ無ラシメ宛モ化膿藥
ノ如クシ其毒ヲ引泄ノ内攻セズ惡症ヲ發セガラ
シム○水腫ノ水皮下ニ充滿スル症ハ肢脚ニ發泡
メ其水ヲ泄シ効ヲ得ル¹アリ○諸器纖維ノ運營
衰弱ナル水腫ハ是ヲ施メ衝動健運ニ小便ヲ利ス
或云。是ヲ水腫ニ貼スレバ其部潰爛メ壞疽トナル

ト。然^レ凡^レ皆必ズ然ルニ非ズ。唯患者老年或ハ元運氣
虛脫シ其腫經久ニメ停水既ニ腐敗スル者ニ是ヲ
貼スレバ間壞疽トナル¹アリ非^レ然^レ也

戒慎此膏ヲ貼スレバ特ニ泡ヲ發スルノミナラズ

皮中ノ喻收管ヨリ其酷厲毒ヲ吸收メ血中ニ運輸
シ一種ノ焮衝ヲ發ス。故ニ多ク貼スレバ發熱苦煩
口中燥渴小便焮痛ヲ發シ或ハ其瘡遍ク皮上ニ浸
淫滋蔓シ焮痛潰爛ニ堪^タザル者アリ故ニ是レヲ施
スニ戒慎ヲ加フベシ

防護發泡ノ其部大ニ焮腫ヲ發シ或ハ小便淋痛尿

血等ヲ發スル片ハ緩和ノ効アル飲液ヲ多ク與フ
ベシ假令バ乳汁或ハ扁桃乳或ハ扁桃乳ニ龍腦少
許ヲ加ヘ用ヒ或ハ過爾託亞根ノ煎汁ヲ頻ニ服シ
或ハ阿利機油或ハ扁桃油二三匙宛服メ皆捷効ア
リ○芫菁ノ酷厲毒ヲ抑制スルガ爲ニ通例此膏ニ
羯布羅ヲ加フ然レ是ヲ以テ却テ泡ヲ發スルヲ速
ニノ甚シク且、炊腫スルモ亦甚ダシ然レバ是レ發
泡ヲ扶ル者ニノ抑制スル者ニ非ズ故ニ感觸ノ甚
シキ人ハ阿芙蓉或ハ阿芙蓉液或ハ拔爾撒謨亭露
ヲ是レニ加フベシ共ニ鎮痛ノ良効アリ或ハ其部

ニ緻布ヲ置キ其上ニ此膏ヲ貼スベシ○然レ此膏
ヲ貼シ或ハ芫菁ヲ内服スルニ就テ内部ノ炊衝ヲ
抑制シ且、解散スルニハ龍腦ヲ内服シ或ハ龍腦ヲ
果仁乳扁桃乳器乳汁等ニ加ヘ用フベシ此毒ヲ解
スルノ良藥トス

貼膏法

是ヲ貼スルニ法ノ如クナラザレハ特ニ効

ナキノミナラズ或ハ害アリ故ニ審ニ左ノ所説ニ
從ヒ施スベシ○發泡セント欲スル部ハヨク其膚
上ノ脂垢ヲ拭ヒ去リ毛髮アル處ハ剃リ又醋ヲ塗
リ布片ニテ摩擦シ微赤色トナルニ至テ是ヲ貼シ

遠西各書考 卷十一 二十

其一倍モ大ナル蓋膏

ヨク膠著スル適宜ノ膏ヲ擇ビ用フベシ

ニ貼メヨク牢著セシメ又中ニ醋ヲ撒ケ貼メ縛帶

ヲ施シ少シモ移動セシムルヲ勿ルベシ但是レヲ

緊禁メ發泡ノ起脹ヲ妨ルヲ勿レ速ニ發泡セシメ

シト欲セバ布片ヲ温メテ敷其上ニ蓋フベシ○其

膏ノ大小ハ患者ノ資稟感觸ノ銳鈍老少症ノ緩急

部位ノ濶狹屈伸スル部ノ遠近ニ隨フベシ○此膏

ヲ貼メ後大人ハ五六時小兒ハ二三時許ニメ其處

稍膨起シ泡ヲ發ス輕症ハ其泡膜ヲ去ラズ唯刺破

メ水ヲ泄スベシ是ニ由テ痛ヲ發スルヲナシ但侵

蝕シテ膿潰セシメ長ク愈ルヲ勿ラシムキ者ハ

鉸刀ニテ悉ク其泡膜ヲ截去リ緩和ノ軟膏ヲ貼ス

ベシ或ハ長ク其水ヲ流泄セシムルニハ泡膜ヲ去

ルヲナク緩和ノ軟膏ニ芫菁ノ末少許加ヘ若クハ

發泡軟膏ヲ加ヘテ其瘡ニ貼スベシ或ハ左ニ舉ル

緩和ノ化膿膏ヲ貼シ連絲刺戟ノ愈ルヲ勿ラシム

ベシ

排毒化膿膏

○芫菁 末 適宜

右水浸シ溶化シ是ニ油ト蠟ヲ適宜ニ加ヘ徐々

蒲里阿尼亞カールド又ウツテ名インカールド蘭

形狀是レ一種蔓草ノ根ニ黒白ノ二種アリ○其

白キ者ハ春月蔓莖叢生シ細硬多節粗糙ニ速ニ

蔓延シ卷鬚アルカールド葡萄蔓ノ如ク能ク傍木垣籬ニ

絡フ。葉葡萄葉ニ似テ小ク帶白色粗糙毛茸アリ夏

月葉間ニ筒様單瓣五出ノ小白花。簇生ノ穂ノ如シ

一心蕊雌花三鬚蕊雄花アリ形チ常春藤花ノ如シ萼亦

筒様五叉。秋間小圓子攢簇スルカールド小ナル葡萄ノ如

ク或ハ櫻子ノ如シ或ハ二子雙生スル者アリ初メ

緑色。熟スレバ赤色黒色トナル。内ニ許多ノ小核ア

不

リ卵圓或ハ稀ニ稜ヲ爲ス。黄色ノ汁充チ味辛。其氣

嘔スベシ根太サ腕ノ如ク外面灰白。裏白ク或ハ黄

色ヲ帶ビ柔ニシ蘿蔔ノ如ク。白ク乳汁ノ如キ液充

ツ。是ヲ横斷シ切片ト爲セバ輪紋アリテ正中ヨリ

外邊ニ旋面ス。味辛苦澁。舌ニ刺戟シ嘔スベキ臭氣

アリ乾ケバ其氣味差減ス。冬月莖枯レズ唯葉落ル

ノニ。全草不佳ノ氣アリ○其黒キ者ハ莖赤色ヲ帶

ビ卷鬚ナシ度云卷鬚アリ然レモヨク傍木ニ絡フ。葉缺裂ナ

ク旋花葉ノ如シ光澤アリ子熟スレバ黒色深紅内

ニ四五核アリ根外面黒色或ハ栗殼色。裏ハ黄色ニ

ノ黄揚ノ如シ其餘總テ前種ト同シ冬月莖葉枯レ
 春苗宿根ヨリ生ス○一種葉三出牽午葉ノ如キア
 ○按ニ此草和漢産未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用
 主^治根白キ者多ク藥用トス黑キ者ハ効稍劣レリ
 ○根性熱燥辛苦侵蝕鑽透ス油氣鹽氣及ビ粘液多
 シ。生鮮ノ者ハ液多ク且臭氣有テ効尤峻ナリ。乾ケ
 ル者モ多ク用フ○此物粘稠液ヲ疏釋シ留飲停水
 ヲ大便ヨリ瀉下シ且血中ニ入テ細管ノ閉塞ヲ鑽

開シ敗液ヲ驅逐ノ小便ヲ利スル峻藥トス故ニ水
 腫。粘液腫ヲ治スルニ多用フ○水腫及ビ水氣粘液
 胸中ニ滯著ノ喘息欬呼吸不利ノ症ニ此生根搗
 碎キ一考ヲ取り葡萄酒ニ比ニ淹ス^ヒ十二時ニノ
 滓ヲ去リ一時每^下ニ一匙ヲ與レバ小便利ノ速ニ治
 ス○肝。脾。腸間膜。等ニ粘液壅塞スルヲ疏泄シ痛風
 脚痛等ノ惡液ヲ滌除シ或ハ發狂。癩。非等ノ腦中粘
 稠液過多ナルヨリ起ル症ニ尤驗アリ是ニ香竄ノ
 藥ヲ加テ殊ニ良○寒性粘液質ノ經閉ヲ通スルニ
 甚ダ驗アリ又生胎死胎ヲ下シ蛇蟲ヲ殺ス○此藥

ハ性峻ニ胃ヲ刺戟スル故ニ桂。丁香。酒石鹽等ヲ
 加ヘ胃ヲ健運シテ更ニ良○末ハ半錢ヨリ一錢マ
 デ一服トス。水煎ニハ四錢ヲ用ヒ。葡萄酒ニ淹スニ
 ハ二錢ヲ用フ○生根ヲ採リ薑擦子ニテ擦リ温メ
 テ腹部ニ貼スレバ停水ヲ瀉下ス或ハ生根ヲ搗キ
 煮テ毳布トシ或ハ醋ヲ加テ搗キ或ハ煮テ膏トシ
 或ハ阿利襪油ヲ加ヘ煮テ外敷メ痛風脚痛ヲ消シ
 療癰堅硬腫及ビ打撲青斑ヲ治シ皮肉間ノ凝血ヲ
 散シ疥癬惡厲諸瘡經久潰爛侵蝕瘡瘦瘡ヲ治シ竹
 木刺ヲ拔ク物伍依
叔裴淑

府利蘭

ゴシス羅ブルムハンノイテモスカト蘭是肉
 豆蔻花ノ義本邦藥舖亦花肉豆蔻ト呼ブ

是ハ肉豆蔻ノ外皮ノ下裏皮ノ上ニ纏フ中皮ナリ

○肉豆蔻ニ三皮アリ外皮ハ柔滑ニメ緑胡桃或ハ

扁桃ノ如ク肉様ニメ厚桃ノ如ク稍硬ク裏面淡白

酸澁ノ汁アリ初淡緑熟スレバ桃ノ如キ紅色ヲ帶

ビ且黃ト紫ノ斑ヲ生シ自ラ坼裂スルト胡桃皮ノ

如クニメ中皮即チ府利見ユ裏皮ハ直ニ核ヲ被ヒ

薄フノ榛子皮ノ如ク硬固赭赤破レ易シ其核即チ

肉豆蔻ナリ○府利ハ形チ薄片ノ細條羅紋ノ如ク

枝極ノ錯綜スルガ如クニ裏皮ニ纏ヒ其質水棉ノ如ク膜ノ如ク柔ニ粘潤アリ。樹ニアルキハ血紅色ナリ採リ乾セバ赤黄色或云帶トナリ氣味枝爾撒謨ノ如ク芳烈香竄肉豆蔻ニ勝レリ○上品ハ其片條太ク鮮美赤黄色。形チ全クメ碎折セズ其碎小ニノ赭色或ハ淡黄ナルハ下品トス是レ未熟ナルヲ採リ或ハ久ク經テ性味脱スル者ナリ○肉豆蔻ヨク熟メ皮自ラ坼裂スレバ土人府利ヲ採テ曝乾シ鹽水少許ヲ濕シ貯フ其燥テ油氣脱スルヲ防グナリ

主治 府利フレイ肉豆蔻共ニ性温辛微苦芳香ナリ肉豆蔻

ニ比スレバ收瀟ノ効少クノ揮發鹽及ビ精微竄透ノ油氣多ク性功尤勝モトレリ肉豆蔻主治ノ諸病ニ用ヒテ更ニ峻効アリ○府利フレイモ亦搾油蒸餾油ヲ製ス是ヲカオレウムマシスト名ク肉豆蔻油ニ比スレバ清稀ニノ揮發精微ナリ○府利油ハ性熱ノ虛冷ヲ温メ胃ヲ健ニシ風氣ヲ驅リ蟲ヲ殺シ失氣眩冒卒倒頭痛寒疝痛齒痛ヲ治シ外敷ノ痲及ビ脚痛風等ニ奇効アリ然レバ貴價ナル故ニ多クハ肉豆蔻搾油ヲ代用ス○服量四滴ヨリ六滴マデ砂糖ニ和シ適

