

遠西醫方名物考


天 巳
上

卷十

✕
e 15



富士川文庫
3280



遠西醫方名物考標目

卷十三

巴 琥珀 琥珀油

琥珀鹽

再餉琥珀油

哥 攝 尼 爾 琥珀 丁 幾 去 爾

琥珀 越 仙 扶 亞

昆 答 刺 越 兒 發 根

格 墨 因 油

越 謨 安 沒 尼 亞 幾

薩 毘 那 調 經 丸 格 密 訥 膏

格 碌 波 尼 亞

越 謨 安 石 丸

昆 設 爾 弗

格 兒 弗

遠西名物考

卷十三

標目

風雲堂藏



499.2
Em-3
13
No. 1438
R 915

榛齋宇田川先生著



遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌



己

遠西醫方名物考卷十三

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕菴校補

琥珀 ソクシニラム 又 カラッペ 羅 バルンス テーシ 蘭

琥珀ハ白色或ハ黄色 拘櫟皮色ニノ鮮美透亮ナルヲ上

品トシ醫藥ニ供ス。黄赤色ノ者ハ是ニ次グ赭色灰

色ナルハ下品トス。土質多クノ藥用トセス。○黄色

ナルハ油氣多シ。油ヲ取ルニ用フ。白色ナルハ油氣

少クノ揮發鹽多シ鹽ヲ取ルニ用フ。○此物通例

塊多シ。一塊ノ量一比アルハ稀ナリ或ハ長九寸餘

遠西名物考 卷十三

風雲堂藏



天

香竄阿芙蓉液 舍電發謨阿芙蓉液ト同
 昆勿苦蟄屋亞爾結爾 私結爾弗爾
 護烏刺兒度水 羅獨成篤爾
 固性消石 消石條
 固性硝砂 硝砂加石條
 皓礬 石膽條
 皓礬水 同上
 的里亞加 的里亞加水
 的里亞加精
 底電愈創水 白出
 若把兒麻膏
 若傑禮需謨 蘇甘沒扭

遠西醫方名物考卷十三

遠西名物考 卷十三 風雲堂藏

潤七寸六分餘。厚五寸餘。秤量九比餘ノ者及ビ一塊
二十七比アルヲ見ルヲアリ

產地 海産山産陸産ノ三種アリ海産珠ニ多クノ上

品トス○海産ハ窩オノ所ス徳海北海羅洲バニ産シ潮波

ニテ多ク亭フ漏イ生シ洲歐國羅名巴ノ海濱ニ簸揚シ或ハ土八

其海岸ニ漂漾スルヲ見テ速ニ是ヲ採ル否ラザレ

バ風波ニテ復漂散ス。上品ハ多ク此濱ニテ採リ百

兒西亞都兒格支那共洲亞國細等ニ輸スト云或ハ思

可祭亞蘇亦齊弟那瑪爾加洲共洲歐國羅名巴止白里洲洲亞國細名

海濱ニモ多ク簸揚ス○窩オノ所ス徳海ニ産スル琥

珀中ニ灰色ニノ木ノ如キ小扁塊著ク者アリ是ヲ

燒ケバ樹脂ノ氣アリ通紅トナレバ滅キザルト木炭

ノ如シ是琥珀ノ軟ナル片木片粘著ノ化スル者ナ

リ或ハ甲介木片。樹皮。海草等膠著シ或ハ木葉形ヲ

印識スル者アリ○山産陸産ハ亭漏フ生イ波ホ墨イ撈シ西シ齊

里亞蘇亦齊蘭牛鐸古洲洲歐國羅名巴等ノ海ニ遠キ山ニ

琥珀坑多シ或ハ福撈察洲洲歐國羅名巴地方ノ巖窟ノ間ヨ

リ出ル者アリ或ハ地ヲ掘レ十五丈許ニノ巖石ニ

著ク者アリ又亭漏フ生イノ海邊ノ地ニ於テ琥珀坑多

シ其在所ハ一種樹皮様ノ土アリテ墳起シ宛モ樹

皮ノ堆積セルガ如シ其上面ノ土ハ乾テ灰様ナリ
 其下ハ軟ニノ黑色ノ毘黠密那註後ニナリ其下ニ一
 襲木片ノ如キ者アリ然レ其質ハ木ニ非ズノ但薄
 片ヲ層襲セル者ナリ是ヲ密涅刺爾木ト名ケ刺爾
 ハ金石類 又琥珀母ト名ク此下ハ必ズ琥珀アリ
 ノ總稱 琥珀アル地ハ此物ノミナラズ石砮及ビ石
 膽質ノ礦類多シ或ハ思可祭亞蘇亦齊弟那瑪爾加
 止白里上ニ出ツ海邊ノ湖澤淡水中或ハ沙地或ハ粘土
 或ハ毘黠密那質ノ土或ハ石膽明礬氣アル朽木多
 キ土或ハ鐵礦様ノ土中ニ生スト云○山産ノ琥珀

ハ多ク下品ニノ土氣多ク重濁黯楮ニノ透亮ナラ
 ズ。是ヲ蒸餾スルニ揮發鹽少ク總テ海産ノ如キ上
 品ナシ

質琥珀ノ質ハ一種ノ毘黠密那ナリ毘黠密那ハ石

等ノ土中ノ華爾斯ノ總稱ナリ一ニアルドハルトキト
 名ク土中ノ華爾爾ノ義ナリ又一ニアルドハルトキト名
 ク土中ノ華爾爾ノ義ナリ故ニ是ヲ摩擦シ或ハ研末シ或ハ燒
 ケバ毘黠密那ノ氣ヲ發ス火ニ投スルハ溶化シ燃モ

テ其質消散ス○琥珀ハ初メ流動ノ油ノ如ク或ハ
 軟ニノ脂膏ノ如シ土中ノ鹽氣ト石膽質ノ蒸氣ニ
 因テ漸ク凝固ス若シ其軟ナル片粘著スル物アレ

バ又此ニ其液流レ被ヒ或ハ片塊粘著ノ遂ニ凝固
 ス故ニ水。粘土。石膽。松樅等ノ葉。實。枝。皮。蘆。苔。穀粒。或
 ハ蜚蛾蜂蟻蜘蛛。蟲蝨等種々ノ物象。琥珀ニ含容メ
 透見スル者アリ其土中ノ華爾斯流動シ凝固メ字
 漏生等ノ海岸及ビ海底ヨリ出ル者即チ其海産ナ
 リ○凡ソ其山坑ニ出ル者ハ海産ニ比スレバ柔ナ
 リ或ハ軟ニノ捏漏スベキ者アリ故ニ新ニ掘取ル
 者ハ暫ク海水ニ浸シ堅固ナラシムト云或ハ海邊
 ノ小河。湖池。陂頭ニモ琥珀ノ軟ナル者ト堅キ者ト
 アリ。其軟ナル者。時ヲ經レバ漸ク凝固ス。或ハ石ニ

化スル者アリ○古人以爲琥珀ハ白楊。松。樅。等ノ樹
 脂。漸ク土中ニ入リ深クノ字漏生等ノ海中ニ流溢
 シ鹽氣ニテ凝固スル者ナリト。晚近ノ究理家ハ此
 說ヲ排セリ○或云。琥珀ハ素樹脂ナリ。大古。洪水等
 ニテ地面陥没メ大洋トナリ幾多ノ樹林。海底ニ朽
 腐シ其脂遂ニ琥珀トナル。故ニ蜚蛾蜘蛛等ヲ包容
 シ或ハ木葉形ヲ印識シ或ハ木屑樹皮等膠著シ或
 ハ蘆。小枝等ノ周圍ニ著テ凝固シ琥珀ニ孔ヲ貫ク
 者アリト物理小識云。大西言。洪水時。亞爾墨尼亞。爲
 甚。猛雨。旬。地面。全。沒。止。遺。諾。兒。數。人。考。其
 時。當。帝。嚳。之。林。娜。私。名。云。琥珀。ハ。諸。華。爾。斯。及。ビ
 八年。壬。辰。云。

アールド。ハルス羅甸名アムペルテス年ヲ經テ海ニ
 入り潮水ニテ凝固ス。故ニ蟲類ヲ包容スト。是即チ
 樹脂ヲ以テ體ヲ爲シ。久ク土中ニ在テ昆黥密那質
 ノ油ヲ含ニ又海ニ在テ鹽氣ヲ受テ凝固シ成ル者
 トスルナリ

〔性〕琥珀ヲ蒸餾スレバ初ニ微酸味ノ稀液出ヅ。次ニ
 帶黃色ノ油ニ揮發鹽交リ出ヅ。此鹽ヲ綠礬精ニ加
 ルニ沸騰セズ。是酸性鹽ノ微ナリ。硃砂精若クハ酒
 石液ニ加レバ泡起ノ沸騰ス。是亦酸性鹽ノ微ナリ。
 然レバ琥珀ハ昆黥密那質ノ稠脂精微稀薄ノ油様液。

酸性ノ揮發鹽。硫黃精様ノ液。自然ニ混和シ成ル者
 ナリ。○琥珀ハ亞兒加利鹽液酒石鹽剝馬亞斯石灰
 ヲ草木類ノ酸汁醋或ハ消石精。海鹽精ニ浸メ溶化
 セズ。石膽油ニ浸セバ溶化ノ紫色トナル。燒酒ニハ
 溶化シ難クハ唯微赤色トナル。然レ此末ニ亞兒加
 利鹽剝馬亞斯ヲ研和ノ亞爾箇兒銳烈ノニ浸セバ
 溶化メ丁幾去爾トナル。或ハ此末ヲ香竈ノ蒸餾油
 迷迭香油刺ニ加ヘ硝子燻ニ入レ時々振蕩スレバ
 賢堙兒油等ニ加ヘ硝子燻ニ入レ時々振蕩スレバ
 漸ク溶化ス。或ハ此末ニ的列底那或ハ技爾撒謨
 格泮霍一倍量ヲ加ヘ硝子燻ニ内レ固封シ慢火ニ

上^レ徐^クニ煮^テ八^日許^キ。其末盡ク溶化^シ赤色トナル。
 右ノ如クニ^テ老利兒油ニ^テ煮^レバ紫赤色トナル。
 阿利襪油。胡桃油ニ^テ煮^レバ美赤色トナル。罌粟子
 油ニ^テ煮^レバ黄色トナルナリ。亞麻油ニ^テ煮
 レ^バ黄色トナルナリ。
 [主治] 琥珀ニ含ム所ノ油氣鹽氣ヲ以テ小便ヲ利シ
 經閉ヲ通ス。○傷冷毒等ノ酷厲ナル^レ沔^ト重訂内科
 十章ニ^テ和解ノ排泄ス。○搗掣痙攣ノ諸症或ハ昏
 註ス^ル睡。眩冒。癩。子宮病。脾病ニ効アリ。是^レ毘黠密那質ノ
 竈透揮發ノ油鹽ヲ以テ腦。神經ヲ開達ス^レバナナリ

又收斂ノ効アリテ下利多尿。遺精。淋疾。白帶下。吐血
 ヲ治ス。○末トシ飲液ニ點服シ或ハ雞子黃ニ和シ
 或ハ丸藥トシ用ヒ或ハ薰藥トス。○服量一^タヨリ
 一錢ニ至ル。○末トシ摻^ケ皮膚瘡裂小創ヲ乾愈ス
 [伍] [依] [伍] [依]
 琥珀油 オレウム。シクシ^ム羅
 琥珀鹽 サル。シクシ^ム羅
 [製法] 琥珀 極細末
 二光
 固 沙 淘洗シ乾淨ス^ル者
 琥珀ノ三分一
 右拌合シ頸潤キ硝子ノ列^ト兒多ノ半ニ充シノ沙

火ニ入レ潤大ノ承餾壘ヲ接シ膠泥ニテ其接際ヲ固封ノ必モ透漏セガラシム。初メ文火トシ漸ク火ヲ増シ列篤兒多ノ底燬紅トナルニ至テ火ヲ下シ初ハ酸味ノ精液ニ清稀ノ油浮ミ且揮發鹽交リ出ツ。次ニ黃色ノ稠油ニ鹽交リ出ヅ。初ニ出ル油ハ揮發香竄ナリ。終ニ稠濁承餾壘ヲ放テバ其内ニ液油。楮黑惡臭ノ油出ヅ。承餾壘ヲ放テバ其内ニ液油。鹽相混シ又列篤兒多ノ頸ニモ鹽升リ著ク。此鹽ヲ取リ承餾壘ノ液ニ加ヘ又是ニ沸湯ヲ加ヘ攪滾ノ其鹽ヲ溶解シ悉契瓦刺斯之部ヲ以テ先ヅ其液ニ雜ル油ヲ分チ取り其油ニ沸湯ヲ加ヘ洗淨メ又其油ヲ分チ取ル。前法ノ如クシ是ヲ硝子壘ニ收メ

貯フ。其洗ヒタル液ヲ承餾壘ノ液ニ合シ濕シタル紙ニテ是ヲ漚シ其液ヲ文火ニ上セテ水氣ヲ減シ放冷ノ芒ヲ結ハシム。其芒ヲ取り沸湯ニ溶シ火ニ上セ速ニ煮テ水氣ヲ減シ漚テ復火ニ上セ。水氣ヲ減メ放冷シ芒ヲ結ハシム。其芒ヲ取テ紙上ニ排ベ乾シ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ。是レ琥珀ノ揮發鹽ナリ。右ノ如ク數結芒スルニ因テ油氣盡ク消メ純粹トナルナリ。技○白琥珀一匕ヨリ揮發鹽四錢出ツ。黃琥珀一匕ヨリ揮發鹽一錢出ヅ。○黃琥珀一匕ヨリ油八弓許。精液二弓半許出ヅ。列篤兒多ノ底ニ

黒キ渣脚ニ多ク許殘ル。其質ハ鐵氣ヲ含メル硝子性土ナリ。

琥珀鹽主治

油氣ヲ含メル鹽ハ

承儲樓中ニ在テ未ダ結芒セシメズ油

氣ヲ含ム揮發竄透ノ神經ノ諸症ヲ治ス即チ痙攣搐掣ヲ鎮メ子宮衝逆頭痛等ヲ治シ汗ヲ發シ殊ニヨク小便ヲ利シ月經ヲ通ス○其結芒シタル鹽ハ純ラ酸性ニメ清涼ノ効アリ。殆ト枸櫞汁或ハ酒石英ト同シ故ニ鎮痙發汗利尿ノ効必シ其効ハ唯油氣ヲ含メル鹽ニ在ルノミ。故ニ此結芒鹽ヲ用ルト稀ナリ○多分ノ琥珀ヲ以テ些少ノ鹽ヲ得ル故ニ

是ヲ偽造シ販ク者アリ是ヲ驗辨スル法。其鹽ヲ頸

長キ硝子壺ニ入レ火ニ上セ火候差沸湯ノ熱ヲ過

ルニ至レバ眞品ハ盡ク升化メ雪ノ如ク。其底ニ留

ル者ナシ偽物ハ皆壺底ニ殘リテ升化スルコトナシ

○初餾ノ琥珀油ハ臭氣アリテ稠濁ナルユエニ左

ノ法ヲ以テ再ビ蒸餾ノ土氣及ビ亞兒加利鹽ヲ去

レバ鮮美清稀ニメ水ノ如ク且佳香アリ藥用ニ供

ノ尤良○此油ハ香竄ノ蒸餾油或ハ的列拉底那及

ビ拔爾撒謨ト混和シ易シ此說前ノ琥珀發烟消石

精ヲ加レバ大ニ熱ス。銳烈ノ燒酒ニハ混和セズ。是

皆草木類ノ油ト異ナル徴ニ其性殆ト石腦油ト
同シ爾爾類ノ油ト異ナル徴ニ其性殆ト石腦油ト

再餾琥珀油 ゲソイフルデバルンスネンオーリイ 蘭

琥珀油適宜

蒸餾水 琥珀油ノ六倍

右合和シ硝子ノ列篤兒多ニ入レ承餾壘ヲ屬シ其
接際ヲ塗封シ沙鍋ニ入レ文火ニテ蒸餾メ其水ノ

三分ノ二ヲ取り放冷メ其油ヲ分チ取り硝子壘ニ
入レ固封シ貯ス 醫

琥珀油 主治 再餾ノ油ハ甚ダ精微ニテ揮發竄透シ

且^{ツハ}拔^ル爾^サ撒^ムノ質アリテ凝結ヲ疏散シ稍衝動シ疼

痛ヲ止ム。神經ノ閉塞ヲ衝開シ峻効アル鎮痙藥ト

ス。故ニ子宮衝逆痛ノ諸症ヲ治シ汗ヲ發シ小便ヲ

利スルニ良驗アリ○血液ノ運行ヲ増進シ粘液ノ

閉塞ヲ疏通シ以テ諸竅ノ壅滯ヲ開達ス。殊ニ經閉

ニ驗アリ○鎮痙解凝ノ功力ヲ以テ喘急卒厥非眩

胃頭痛精神沈重等ノ頭腦神經病ニ効多シ○微毒

去テ後荏苒トノ歇^ヤガル淋疾白帶下及ビ小便閉ヲ

治シ催生シ死胎ヲ下ス○服量六滴ヨリ三十滴マ

テ葡萄酒或ハ適宜ノ飲液ニ點服シ或ハ雞子黃ニ

和シ用フ○外敷ノ卒厥麻痺不遂肢節強硬攣急或ハ痿弱或ハ寒性ノ痛風傷冷毒等一切神經。腓ノ諸症ニ効アリ是ヲ患處ニ擦ス。或ハ脊推ニ塗テ痲瘰ヲ治ス○此油ニ蒸餾醋少許ヲ加ヘ蒸餾スレバ烈キ香氣ヲ嫌フ患者モ惡ムコナク用ヒ易シ

琥珀アイキテウ丁幾アイキテウ去爾アインキタルシニシム蘭バルンステイン

製法 琥珀細末 一多 ○血氣ノ衰々トシテ衰弱シタル者ハ右硝子燻ニ入レ固封シ爐邊煖處ニ置テ十日ニシテ濃過シ其液ヲ取り固封シ貯フ

又法 琥珀細末 適宜 亞的兒アイテール 綠礬油ノ條ニ出

右琥珀ヲ硝子燻ニ入レ亞的兒ヲ加ヘ琥珀ヲ溶化セシム○前方ノ如キ燒酒ノニテハ琥珀盡ク溶化セズ此方ハ琥珀ヨク溶化スル故ニ尤モ効多シ瘰瘰ノ諸症及ビ後ノ主治ニ舉ル神經病ニ殊効アリ

十滴ヨリ一茶匙マデ葡萄酒ニ點服シ或ハ鎮痲劑ノ飲液ニ加ヘ用フ

又法 琥珀細末 一多 剝篤亞斯ポットアス 精製者 四錢

右研和シ格兒弗ニ入レ燒酒ヲ加テ其藥料ノ三四
 指橫徑ノ上ニ至リ固封シ煖處ニ置キ赤色トナル
 ニ至テ瀝過シ其液ヲ取り用フ○或ハ酒石液四錢
 ヲ以テ劑中ノ剥薦亞斯ニ代ヘ浸ス丁十二時ニソ
 瀝シ用フ○或ハ琥珀ノ末四多ヲ取り酒石液ヲ撒
 ケ濕シ乾カシ硝子壺ニ入レ燒酒ニ比テ加ヘ浸シ
 赤色トナルニ至テ其液ヲ瀝シ用ルモ亦良

主治 痙攣搐掣。卒厥。癩。疝。脾病。子宮衝逆等ノ諸神經
 病及ビ虛弱ニ屬スル經閉。遺精。白帶下ヲ治シ痛風。
 傷冷毒ノ寒粘液ヲ驅除シ小便ヲ利ス○服量二十

滴ヨリ半錢許飲液ニ加ヘ用フ○此丁幾去爾ニ揮
 發香竄精ニ出部少許ヲ加テ硝子壺ニ入レ煖處ニ置
 テ泡熟セシム。是ヲ壯神丁幾去爾ト名ク。卒厥。失氣
 昏冒。子宮衝逆。心悸怔忡。傷冷毒痛。非不遂經閉等ニ
 奇効アリ服量十五滴ヨリ一錢マデ茶湯。葡萄酒其
 他適宜ノ飲液ニ加ヘ用フ○頭蓋ノ骨縫ニ擦ノ傷
 冷毒ノ頭痛ヲ治ス鼻中。顛顛。心窩ニ塗テ失氣昏眩
 心動悸ヲ治ス臍部ニ塗テ子宮衝逆ヲ治ス

琥珀越仙扶亞トシキ琥珀丁幾去爾トシキ同シ

遠西各物考 卷十三 十 風雲堂藏

哥攝尼爾ゴツシニルラ又ゴツシニルラ羅ゴッセル

哥攝尼爾ゴッセルハ小蟲ナリ生活セル者ハ蝨虱ニ似テ圓

或ハ楕圓。大サ翹搖ノ如シ。新伊イバ斯ア把ニ尼亞ア加カ北カ亞ア墨メ利リ洲シ國ク名ナ

就中墨是メキシ可コ上上ニ産スル霸王樹ニ生ス。此樹ノ花及

實ノ汁。殷紅ナリ。實ハ葉端ニ生ス。蜜果ノ大ナル

四時常緑。皮ニ刺アリ。頂ニ臍アリ。是ニ刺多シ。味收

斂ス。殷紅ノ汁アリ。核多シ。細小ニハ大サ胡荽子ノ

如シ。此蟲其汁ヲ吮テ長育ス。是ヲ破テ深紅ナル片取

テ籃ニ入レ水ニ浸シ殺ノ乾スナリ。形扁々三四稜

アル粒ヲ爲シ外面銀色或ハ淡白ニハ白粉ヲ摻ケ

タル如シ。裏ハ深紅ナリ。或云水ニ浸シ殺ノ暴乾ス

ル者ハ外面褐色ナリ。焙リ乾ス者ハ焦黑色ナリ。然

レ裏ハ皆美紅ノ粉充ツ。○此物重實ニハ輕虚ナラ

ズ。淨潔ニハヨク乾キ。銀白色ニハ光澤アリ。破レバ

殷紅ナルヲ上品トス。或云。上品ハ黯紫色。横紋アリ

白粉ヲ摻ケタル如シ。是ヲ研末スレバ美紅色ナリ

○按ニ此物和漢産未ダ詳ナラズ。舶來ノ品ヲ用

フベシ。

主治 強心。發汗。利尿ノ効ヲ稱ス。然レ醫藥ニ用ル

稀ニハ多クハ猩々キョウキョク絨等ノ美紅ノ染料ニ用フ。○此

藥一月ヲ赤葡萄酒ニ加ヘ服メ小便閉ヲ治シ。或ハ

藥一月ヲ赤葡萄酒ニ加ヘ服メ小便閉ヲ治シ。或ハ

胎動ヲ鎮メ墮胎ヲ護スルニ用フ 嬰 嬰

昆^{コン}答^タ刺^ラ越^エ兒^ル發^ハ根^ハ 羅 テ ゲ ン ギ フ ト 多 ル ト ル 蘭

形狀是ハ字露新^{ドリック}伊斯把尼亞^{イスバニア}墨^メ是^キ可^コ等ニ産スル蔓

草ノ根ナリ初メ數葉生ノ地ニ塌シ葉ノ末凹ニ

馬蹄ノ狀ノ如シ 或云半多長二三指橫徑。濶一二指橫

徑。綠色。背淡白且黯色ノ筋脉及ヒ黃點アリ。短梗ニ

著ク。其後葉間ニ圓莖ヲ抽キ是ニ亦葉生シ卷鬚ア

リテ高ク傍木ニ糾フ。花ハ洞庭藍ニ似テ小。花後粟

殼色ノ圓子ヲ結ビ黑色ノ仁アリ根太サ小指ノ如

ク塊節皺積ヲ爲シ長鬚多シ。外皮褐赭或ハ黃赭色。

裏淡白是ヲ嚼ニ初メ收瀋シ漸ク滲透ノ微苦辛。微

佳香アリ ○一種葉楮圓ニメ末微尖リ地ニ布元坐

ヲ爲シ爾後葉間ニ蔓ヲ抽テ太一指許是ニ葉ナク

ノ花生スル者アリ ○根新鮮肥實多鬚佳香葯味ア

ルヲ擇ニ鬚根ヲ除キ用フベシ

○按ニ此草和漢産未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用

フベシ 依云白薇根ハ香竄ニメ衝動シ利尿。發汗。

通經ノ効アリ性功纈草及ヒ昆答刺越兒發根ノ

如シ 叔 伍 物云山柰根或ハ白薇根ヲ以テ此藥ニ

代用ス。ト。若シ闕ルニ遇バ代用スベシ。○榕按ニ
 白薇ハ江戸ノ花戸クサタチバナト呼ブ。其根味
 苦辛微香氣アリ。或ハ白薇ノ一種。徐長卿。花戸ニ
 柳葉細辛ト呼フ者根味苦辛微甘。香氣アリ。俱ニ
 代用ノ可ナリ。

主治性温。精微ノ油氣鹽氣アリ。腦心胃ヲ強壯ニシ
 血液運行ノ怠慢凝澁ヲ健輸シ。專ラ病毒ヲ汗ヨリ
 發泄シ。又小便ヨリ除ク。○纖維ノ弛弱ヲ收固シ。腐
 敗ヲ遏ム。故ニ惡性熱。發斑熱。神經熱。疫痢。間歇熱。肢
 節痛等ニ用ヒ。其毒ヲ汗ヨリ發散メ治ス。然レ是皆

温壯メ發汗ヲ要スル症。或ハ熱病人腐敗毒アリテ
 血液ノ焔解スベキ症ニ的當トス。○寒粘液アリテ
 食進マガルヲ治ス。○下利赤痢。虛症ニ用ヒテ殊効
 アリ。○癩瘻。搐掣等ノ腦神經ニ關ル諸症ヲ療シ。虻
 蟲ヲ殺シ。又蝮蛇咬毒ヲ解スルニ尤効アリ。○水煎
 或ハ泡劑。或ハ末トシ。每服半錢ヨリ一錢マデ。毎日
 數次用フ。
 斐叔伍
 斐叔伍

格墨因コメイン蘭ランキニニウムニウム羅ラ

形狀此草莖葉花實大抵茴香ノ如クニ。葉短ク一

遠西名物考 卷十三 十三 風雲堂藏

尺アルハ稀ナリ。葉小ク。兩對シ枝頭ニ重瓣ノ小白

花或云繖ヲ爲ス。其子大葛縷子ニ倍シ茴香ノ如シ

灰色或、緑黄色ニノ條理アリ。味辛。香氣強クノ不佳

ナリ。春月種ヲ下シ生ス是レ葛縷ノ一種ナリ。黑地

兀皮亞ア阮エ日ジ多ト共ニ亞ア弗フ利リ等ノ熱國ニ産ス

○按ニ此草和漢産未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用

フベシ度云性功茴香ノ如シト。茴香或ハ葛縷子

ヲ代用メ可ナリ○不詳

主治子。性温。葛縷子ト同シ破氣驅風ノ要藥トス又

粘稠ヲ稀シ凝結ヲ解キ急迫ヲ緩メ堅硬ヲ軟ク。故

ニ風氣痞滯拘攣痛。胸痛。疝痛ヲ治シ或ハ欬喘急

等。肺ノ諸症ヲ甘ケ粘痰ヲ疏シ小便ヲ利シ淋疾痛

ヲ除キ月經及ビ産後惡露ヲ下ス○水煎或ハ泡湯

或ハ末トシ一錢許ヲ服ス○大麥粉ヲ加ヘ琶布ト

シ腫瘍ニ貼メ消散シ或ハ膿熟ス或ハ咽喉腫ニ漱

藥トシ効アリ伍叔裴

格墨因油オレウムキニウム羅

製法子ヲ蒸餾ス。薄荷油及ビ茴香油製法ト同シ

主治痞氣鬱滯ヲ散シ欬喘急。疝痛。脾病。淋疾等凡

ノ枯墨因子ノ主治ニ舉ル諸症ニ捷効アリ○服量

五滴ヨリ十滴マデ飲液ニ點服ス
格密訥膏 「エムプラスト、キニノ、ロ」

製法

若把兒麻膏

黃蠟

阿利襍油

格墨因子

各一比

半比

未一比

右膏蠟油ヲ合メ文火ニ上セ溶化シ火ヲ下シ格墨因子ノ末ヲ煉和シ冷ルマデ攪セ膏ト爲ス
主治 外敷メ堅硬ヲ軟ゲ凝結ヲ解キ胸脇痛、肢節痛、痛風、脚痛ヲ散シ腫瘍ヲ膿熟シ或ハ消散ス

薹ゴ謨ム安アン沒モ尼ニ亞ア幾キ蘭ラン 「ギムエ、アムモニアキウム」

是ハ亞弗利加洲ノ地方ニ産スルアムモニアキウム

ト名ル樹ヲ鑽刻メ取ル薹謨華爾斯ナリ

兩質アルヲ云故ニ此脂ハ水醋其樹形狀未ダ詳ナ

ラズ○此脂乾固柔脆ニ汚物ヲ雜ヘズ淨潔ノ碎

塊宛モ顆粒ノ如ク捻レバ破碎セズ柔ニノ粘著ス

新鮮ナルハ黄色ニメ白色ヲ帶ズ經久ノ者ハ赭色

ヲ帶ブ或云皆乳白色臭氣蒜ノ如ク或ハ葛私多儂

謨或ハ瓦爾拔奴謨ノ如シ是ヲ嚼片ハ白色トナル

味初メ甘ク漸ク苦辛。此物白色ノ質多ク雜リ。脆ク
 温氣ニテ軟ニナリ易ク。其味舌ニ滲透シ火ニ投シ
 燃テ白色トナルヲ上品トス。子仁木屑沙土等ヲ雜
 ヘテ塊ヲ爲ス者ハ下品ニシテ藥用トセズ

○按ニ此脂和漢産未詳ナラズ船來ヲ用フベシ

主治 性温收瀋。油氣鹽氣アリ諸**趨謨**華爾斯中ニテ
 此物尤^モ凝結ヲ疏散スルノ効ヲ稱シ稍刺戟衝動ノ
 粘稠ヲ稀釋シ堅硬ヲ軟化ス○肝。脾。腸間膜等ノ壅
 塞硬腫ヲ融解疏散スル要藥トス。子宮衝逆或ハ經
 閉ヲ兼ル症ニ尤^モ効アリ○膠粘液ヲ疏散シ驅逐ノ

經閉ヲ治ス但血脉諸管ノ運營怠慢ニシテ血液凝滯
 シ。痙攣ニ因ラス多血ナラザル經閉ニ効アリ。此症
 ハ鐵粉。盧會。沒藥。阿魏ヲ加ヘテ丸藥トシ用ヒテ尤^モ良
 又左ノ方殊効アリ

薩毘那調經丸

趨謨。安沒尼亞幾。各二錢

盧會。一兩

薩毘那油。十二滴

右散劑トシ三氏ヲ一丸トシ五丸宛用ル。一日四次

○此護謨ハ脾病。依剥昆垤兒。子宮衝逆或ハ黄疸。荏
苒タル間歇熱。白帶下。或ハ粘液ヨリ起ル頑固ノ疝
痛等。下劑驅風劑ヲ用ヒテ効ナキ症或ハ喘息等ノ
胸病。總テ頑滯ノ病ニ効アリ。此皆粘液ノ壅塞ヲ疏
解シ腹部諸器脉管ノ弛弱ヲ强健スルヲ標的トシ
用フ又右ノ諸病ニ左ノ方尤驗アリ

護謨安石丸

護謨安沒尼亞幾

石鹼 勿擗祭亞

蒲公英越幾斯劑

各等分

右調勻シ三氏ヲ一丸トシ五丸宛用ル一日四次○
此護謨ヲ漱藥ニ加レバヨク痰ヲ吐セシム○多ク
用レバ瀉下ス○外敷ノ稍刺戟衝動ニ疏散シ或ハ
軟化ス故ニ諸腫瘍。頑硬腫ヲ消散シ或ハ軟化ノ膿
ヲ成スニ尤効アリ關節ノ頑硬腫。水棉樣腫。水腫。經
久ノ膝臏水腫。或ハ關節拘強ノ初發或ハ腺腫瘰癧。
罌丸硬腫。痛風結腫。或ハ瘤ノ初起ニ施メ消散ス或
ハ潰瘍ノ腐敗液ヲ排ヒ膿ヲ釀ス或ハ癬樣ノ穢液
多キ浸淫瘡ニ効アリ但炊衝ヲ兼ル腫瘍ハ効ナシ
總テ寒性ノ腫ニ施スベシ○是ヲ醋ニ溶シ貼メヨ

夕腫瘍ヲ消ス或ハ醋若クハ葡萄酒ヲ加ヘ煮テ琶
布トシ革ニ塗テ貼シ或ハ海葱醋ニ溶シ貼メ殊ニ

効アリ 葡萄酒或ハ海葱醋ニ溶シ膏藥トシ貼メ膝

或ハ微毒罌丸腫 ○此脂ヲ蒸餾メ精及ビ油ヲ取ル

其精ハ失苟兒陪苦ヲ治シ閉塞ヲ開達シ卒厥ヲ蘇

復スルニ十滴ヨリ二十滴ヲ用ス油ハ肝脾ノ硬腫

ヲ消シ子宮衝逆ヲ治ス (物依布福) (叔伍裴按) 走ハ神小ハ

格碌波尼亞羅 スキゲルハルス又ゲウ子ハルス 蘭

是ニ二種アリ第一種ハ的列竝底那ヲ水ニ煮テ凝

固セシメ乾カシ破碎スヘク爲ス者ナリ。上品ハ黃

色淨潔透亮ニノ是ヲ日ニ映ズレバ赤色ノ塊片透

見ス○第二種ハ的列竝底那ヲ蒸餾メ油ヲ取り其

壘底ニ残りタル渣脚ナリ乾脆黑色光澤アリテ

ノ如シ然レハ滿ニ比スレバ固クノ淨潔ナリ是ヲ下

品トス

主治 性收瀟ス第一種ハ凝結ヲ疏解スルニ効ヲ稱

シ汚液ヲ淨刷シ創瘍ヲ乾愈シ膏藥トシ外敷ス○

是レ的列竝底那ノ良質ヲ存メ酷厲刺戟ノ性ヲ脱

ス。是ニ燒酒ヲ和スレバ殊ニ解凝ノ効多シ。或ハ丸

散

散

散

藥トシ用ヒテ無毒ノ淋疾及ビ遺精ヲ治ス。○膝臏ノ寒性白色ナル腫ヲ消散スルニ此末ヲ布片ニ摻ケ一指横徑ノ厚ト爲シ是ニ再留セル燒酒ヲ濕シ患部ニ貼ス乾ケバ數燒酒ヲ濕メ良。是レ能ク華爾斯ヲ溶化シ滲透セシムレバナリ。○潰瘍ノ汚液多ク流泄シ細絡纖維弛緩膨腫ノ乾愈シ難ク或ハ水棉様肉ヲ生メ愈ザル症ニ此末ヲ摻スレバ乾テ愈ユ。○第二種ハ凝結ヲ解散シ膿ヲ成スニ多ク硬膏或ハ軟膏トシ貼ス然レ第一種ニ比スレバ効稍劣レリ。或ハ松香ニ水ヲ加ヘ數煮テ^収_製是ヲ製スル者アリト云^伍_製

昆^{コシ}設^{セル}爾^フ弗^蘭 ^コンセルハ^羅

是ハ藥品ヲ剉ニ或ハ細末トシ或ハ生鮮ノ品ハ搗爛シ其量ノ一倍或ハ二三倍ノ沙糖若クハ蜜ヲ調和スル劑ノ總稱ナリ。根ノ汁多キ者ハ剉テ磁罐ニ入レ重湯ニソ煮テ軟ニシ搗テ糊ノ如クシ適宜ニ沙糖ヲ和ス或ハ果實ノ瓢肉仁等ハ搗テ篩過シ沙糖ヲ和シ製ス尚其藥品ニ隨テ製法及ビ沙糖ノ分量差異同アリ各品本條ニ就テ詳ニ記ス^疾_製

ロマキッス 其他の里亞加方一ナラズト雖モ皆多味
ハ人名 其他の里亞加方一ナラズト雖モ皆多味
冗長ニメ主能的知シ難ク且ッ功力相反スル品類ヲ
配合スル故ニ性味相抑制ノ効績ヲ逞シ難シ故ニ
漸ク勿擗祭亞其他諸國ニ於テ刺長無益ノ藥品ヲ
除キ簡約ニメ良効アル劑ト爲ス即チ按ニ載ル所
ノ阿芙蓉昆設爾弗是ナリ此方即チ右ニ舉
此方即チ右ニ舉
主治劑中阿芙蓉アルヲ以テ一切疼痛ヲ止メ不寐
煩躁等ノ急迫ナル症ニ用權ニ患苦ヲ鎮テ安眠セ
シメ患者ノ精力ヲ保護メ甚ク虛罷セガラシムル
ノ要藥トス○此劑ハ熱性香竈ノ諸品ト阿芙蓉ア

ルヲ以テ血液ノ運行ヲ増發シ汗ヲ發ス故ニ冒寒
傷冷毒ニ用テ汗ヲ發シ疼痛及欬嗽ヲ止ム熱湯ニ
テ送下シ温覆メ尤良○痙攣搐掣ヲ鎮メ虛痘ニ用
テ起脹セシメ膿ヲ醸ス○胃腸ノ病毒去テ後嘔吐
下利劇クメ休ザルニ用フ○惡性熱ニハ龍腦少許
ヲ加ヘ橙汁或ハ醋ニ溶化シ用テ良驗アリ○虛寒
ノ諸症及粘液質ノ入ニ効アリ此藥ハ阿芙蓉並ニ
辛熱ノ品多キ故ニ壯熱病。焮衝病等總テ壯實熱性
多血ノ諸病ニハ大ニ害アリ又虛羸ノ諸病及菲勞
效等ニ是ヲ過服セシムレハ神經ノ知覺運營ヲ鈍

患者ヲ衰弱セシメ遂ニ昏睡搗搦ヲ發ス○服量
半錢ヨリ一錢半ニ至ル○外敷ノ諸獸毒螫刺咬ヲ
治ス癩狗傷。蝮地咬。其他諸獸毒蟲ノ咬傷ハ先鹽水
或醋ニ的里亞加ヲ溶メ患處ヲ洗或是ヲ棉撒絲ニ
塗テ患處ニ貼シ硬膏ヲ蓋フベシ或的里亞加少許
ヲ取テ醋一匙ニ溶シ内服セシメ技實里膏ニ亦降
汞少許ヲ加テ其創ニ貼シ毎日更換スルヲ兩次半
月許ハ創ヲ愈スヲナク膿潰セシメテ其毒ヲ排泄
シ又時々的里亞加ヲ醋或葡萄酒ニ加テ内服セシ
メ臥床ニ温覆メ發汗シ其毒ヲ驅發メ殊ニ良
依 叔 疾

的里亞加水 アクテリアカコムボシタ 羅

製法 的里亞加 ハ 弓

沒藥 ニ好者 二弓

龍腦 四錢

燒酒 銳烈者 十一弓半

右調和シ格兒弗ニ内レ蒸餾メ露水ヲ取ル 叔

主治 一切疫熱。惡性熱。胸脇痛。發汗スベキ症ニ用。虛

痘ヲ透發シ酷厲液ヲ消シ酸敗液ヲ祛キ疔痛ヲ治

ス○服量二錢ヨリ四錢マデ適宜。飲液ニ點服ス 叔

的里亞加精 スヒリチラス。テリアカ 羅

製法

的里亞加

三勺

枸橼皮

生鮮者 剉 八勺

白芷

剉 各一勺

山奈

剉 各一勺

地榆葉

剉 各一勺

酒石鹽

四錢

酒石精

一匕

右調和シ蒸餾ノ露精ヲ取ル

又法

的里亞加

二勺

雜腹蘭

一勺

燒酒

二匕

右固封シ浸ス日三日。蒸餾ノ精ヲ取ル或ハ罐ノ兜

内ニ龍腦四錢ヲ懸テ蒸餾ス

又法

的里亞加

十勺

沒藥

五勺

雜腹蘭

一勺

燒酒 四匕

右浸ス日數日ニ蒸餾シ精ヲ取り是ニ龍腦六錢

ヲ加ヘ溶化シ貯フ

主治 汗ヲ發シ心胃ヲ強健シ失氣昏冒ヲ復シ疫熱

悪性熱ヲ解ス （収） 胃ノ弱對シテ夫廉容胃ノ對シテ其効

底電愈創水 「ア多、ヒル子ヲリア、チデシ、底電ハ人名

製法 醋 各三比 燒酒 各三比 綠礬精 十

又法 沙糖 一比 一方、四味等分 ○右硝子壘ニ内レ固封シ、重湯ニメ

藥氣ヲ出ス、八日、漚過シ、固封シ、貯フ、ハ、藥ノ氣、
主治 血絡ヲ刺戟シ、收斂ス。輕キ創ニ外敷メ、速ニ治

ス一切打撲傷、脉外泛溢ノ凝血ヲ消散シ、又輕キ止
血藥トス、或ハ諸、痲腫ノ初發ニ施メ、消散シ、或ハ神
經損傷等外傷ニ良効アリ。布ニ浸シ、外敷ス （底）

若把兒麻膏 「エム、プラス、トリム、デヤ、バルマ、又、エム、

製法 阿利襪油 各三比 密陀僧 各三比

家猪脂 各二比 水 各二比

右阿利襪油。密陀。家猪脂ヲ合シ文火ニ上セ煮テ時
 々水ヲ加ヘ手ヲ住メズ攪セ溶シ煎熬メ硬膏ノ稠
 ト爲シ鉢ニ水ヲ盛リ其膏ヲ投シ水中ニ捏テ凝固
 セシメ適意ノ形ト爲ス○煎熬スル間ニ水減耗セ
 バ多ク水ヲ加ヘ煮テ焦著セシムルヲ勿レ

主治 外敷ノ清涼乾愈ノ良膏トス。焮熱腫痛ヲ清涼
 シ酷厲毒ヲ消シ熱痛風ヲ治シ癩痕ヲ祛キ乾シテ
 肌膚ヲ生ス

遠西醫方名物考卷十三終

