

遠西醫方名物考

〔天〕
下

卷十四

×

e 15

×

499.2

E 3

.14

F 14
E-16



3281



遠西醫方名物考標目

卷十四

的^テ列^レ並^ビ底^ニ那^ナ油

的^テ列^レ並^ビ吉^キ利^リ詞^ス參^シ兒^ル
的^テ列^レ並^ビ吉^キ利^リ詞^ス參^シ兒^ル
的^テ列^レ並^ビ吉^キ利^リ詞^ス參^シ兒^ル
驅^ク蟲^ク利^リ詞^ス參^シ兒^ル

鐵 鐵 鐵

鐵 鑄 製 法

越^エ扶^ナ屋^ヲ布^フ斯^ス未^マ爾^ル扶^ナ亞^ア栗^リ斯^ス
格^コ碌^ロ屈^ク私^ス未^マ爾^ル扶^ナ斯^ス
治^チ僂^ル散^{サン}治^チ僂^ル散^{サン}

遠西名物考 卷十四 標目



葉 26

499.2
Em-3
14

No. 439
19 e 15



醫士川文庫
3281



撒兒末爾扶斯

乾白撒兒末爾扶斯

升鐵鹽

收斂鐵液

鐵丁幾去爾

收斂鐵丁幾去爾

開達鐵丁幾去爾

未爾扶斯鎮痛液

遠西醫方名物考卷十四

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

的列並底那羅

テイルペンテイン

蘭

的列並底那ハ其質拔爾撒謨ノ如ク。焔解セル膠ノ

如ク。粘稠ニシテ澄清透亮。辛苦烈香アル樹脂ナリ。是

二三種アリ。○第一種ハ「テレピン」テイナセイペリア

ト名ク。是レ際波里西亞ノ國名。細亞洲ノ國名。伊斯把尼亞蘭

牛鐸古意大利亞ノ國名。歐洲ノ國名。其他亞弗利加洲。亞細亞

洲ノ諸國ニ産スル「テイルペンテイン」ボームト名ク。ル



小木ノ幹枝ヨリ自然ニ流溢シ或ハ是ヲ鑽刻ノ出
 ル華爾斯ナリ。此品透亮ニメ硝子ノ如ク軟ニメ稠
 蜜ノ如ク粘リ白色或ハ淡黃或ハ青白色味辛熱。舌
 ニ滲透シ自餘ノ二品ニ比スレバ尤佳香アリ。是ヲ
 嚼或ハ手ニ觸テ粘著セザルヲ上品トス。是レ真ノ
 的列並底那ナリ。此品近來輸ス下少ク藥舗ニ貯ル
 一稀ナル故ニ多クハ第二種第三種ヲ用フ其樹ハ
 皮及白色。枝稀ニメ長シ。葉老利兒葉ニ似テ小ク。尖
 ラス差硬ク四時常綠。苦檜木葉ノ如ク羊齒様ニメ
 兩對シ末ニ一葉アリ。此樹雌雄アリ雄ハ花アリテ

實ヲ結バズ雌花ニ實ヲ結ブ。春月淡紫色ノ花生シ
 瓣ナク但鬚蕊攢束ノ穗狀ヲ爲シ阿利襪樹ノ花ノ
 如シ。花後楕圓ノ實ヲ生ス大サ杜松子ノ如クノ硬
 ク初綠色。後赤色ヲ帶ブ。熟スレバ青綠色。是ニ觸レ
 バ粘著ノ脂氣多シ。其壳中微長キ一二ノ核アリ。此
 樹甚ダ脂多ク。木理堅實。榆錢樹ノ如シ。秋間枝葉ニ
 淡紫ノ小膜囊生シ又枝梢ニ没食子ノ如キ贅瘤生
 シ。漸ク長スレハ軟骨ノ角ノ如シ。其大ナルハ八指
 横徑許ニメ赤色ヲ帶ビ。中虛ニメ粘脂液及ビ蚊ノ
 如キ蟲アリ。此樹ニ稠厚ノ脂液是即樹的多キ故ニ

動モスレバ其脂。水理ニ壅塞シ其地中ヨリ升テ樹
 ヲ養フ所ノ津液流通スルヲ能ハズノ乾枯シ木理
 圻裂スルヲアリ。然レ其幹ノ地ニ近キ處及ビ幹枝
 ノ數處ヲ鑽刻スレバ脂液溢泄ノ其樹蘇活ス。此猶
 多血ノ人卒厥ヲ發スレバ刺絡ヲ施メ忽チ甦復ス
 ルガ如シ。○第二種ハ勿搦祭亞ヘ子ナア。的列底那ト名ク。
 往古勿搦祭亞ヘ子ナアノ歐羅巴洲ヨリ出レバナリ。今ハ落葉
 松或ハ白樅ノ幹皮ノ節ヨリ自ラ流溢シ或ハ是ヲ
 鑽刻メ出ル脂液ヲ用フ。上品ハ潔白透亮或ハ淡黃
 ニメ枸櫞皮色ノ如ク。軟ニメ流動シ。蜜ノ如ク稠油

ノ如ク拔爾撒謨ノ如クニメ味辛苦氣味共ニ枸櫞
 皮ノ如クニメ甚シ或云華爾斯質。此品多ク藥用
 トス。其樹楮爾勿婁亞ヘ子ナアノ牙而白ノ歐羅巴洲其他山地
 ニ多ク生ス。樅ハ赤白二種アリ。白樅ハ幹喬直。材白
 色。皮帶白。滑澤柔撓。枝上部ニ四數シ。每節四枝。十字
 樣ヲ爲ス。葉扁細ニメ未尖リ。赤樅ニ比スレバ細ク。
 淡綠色ニメ莖ノ周圍ニ著ク是ヲハ重。或ハ莖ノ兩
 側ニ櫛比スルアリ。實楮圍ニメ未尖リ。鱗片疊次シ
 毎片ニ核著キ。薄膜アリテ蜂羽ノ如シ。脂氣多シ赤
 樅ハ白樅ニ比スレバ樹皮暗楮。材帶赤。葉黯綠ニメ

稍濶ク。莖ノ兩側ニ櫛比ス。○第三種ハ尋常的列竝底那ト名ク。是モ亦樅樹ノ脂ヲ取り製ス。稠濁ニノ白色或ハ赭色ヲ帶ブ。香味凡ニ佳ナラズ。但上品ハ澄清ニノ黄色ヲ帶ビ汚物ナシ。○或ハ經久稠粘ニ用フベカラザル的列竝底那ニ的列竝底那油ト銅綠少許ヲ加ヘ偽テ上品ト稱スル者アリ。此ハ的列竝底那油ノ烈香アルヲ以テ知ルベシ。○樅樹ヨリ的列竝底那ヲ取ルニハ夏月樅ノ脂液流溢スル時其幹ノ皮ヲ少シ剥ギ。樹下ノ地ニ穴ヲ穿テ置ク。其ハ脂液自ラ流レテ其穴ニ聚ル。是ヲ取り汚物ヲ

去リ水ニテ洗淨シ毛篩ニテ漚過ス。是即チ尋常ノ的列竝底那ナリ。其篩ニ留ル渣ニ多ク水ヲ加ヘ蒸餾ノ油ヲ取ル。其罐底ノ渣ハ即チ尋常ノ華爾斯ナリ。即チ亞格碌。又法。樅或ハ落葉松ノ脂ヲ取り。多ク水ヲ加ヘ。文火ニテ煮ル。其烈香漸ク減メ凝結シ。冷レバ其脂。手ニ觸テ粘著セス。宛モ硝子ノ如ク破碎スベクナルナリ。○樅ノ脂ヲ以テ満テ製ス。其法。樅ノ幹ヲ割テ木屑ト爲シ地ニ深キ坑ヲ穿テ。其底ニ磚ヲ敷キ。是ニ細孔ヲ穿テ。其下ニ陶壺ヲ置キ。木屑ヲ其坑ニ積ニ。鍋或ハ瓦ヲ其上ニ蓋ヒ。其邊ニ煙

氣ヲ泄ス孔ヲ穿チ。木屑ニ火ヲ點シ焚ク片ハ其脂
 流レテ陶壺ニ下ル。是ヲ爹爾ト名ク。是ヲ文火ニ上
 セ煎熬ノ凝固セシムル者即チ尋常ノ諸ナリ
 ○按ニ的列並底那樹。和漢産未ダ詳ナラズ或云
 真ノ的列並底那ハ甚ダ稀ナル故ニ第二種ヲ藥
 用トス。性功。落葉松脂ト同シ或云尋常ノ品ハ
 落葉松脂ヲ以テ製ス。其効真ノ的列並底那ト同
 シ或云三種共ニ性功同シ或ハ藥舖ノ品ハ
 白樅及ビ落葉松ノ萃爾スナリ然レバ落葉松
 脂或ハ白樅ノ脂ヲ以テ製シ用フベシ

主治 性熱。辛苦收斂ス。諸管纖維ヲ開達シ。粘稠ヲ稀
 釋シ。未熟ノ諸液ヲ化釀シ。腐穢敗液ヲ淨除シ。疼痛
 ヲ止ム。○此藥ハ侵蝕スベキ酷厲質ナク。其性拔爾
 撒謨亭露及ビ格泮霍ノ如シ。故ニ拔爾撒謨ニ代用
 スベシ。○表發ノ蒸氣ヲ排泄シ。殊ニ小便ヲ利スル
 ニ峻効アリ。○是ヲ服スレバ其香氣直ニ小便ニ出
 ルヲ以テ尿道ノ諸症ニ捷効アルヲ知ルベシ。○痞
 氣鬱塞ヲ散メ小便ヲ驅逐シ。腎膀胱尿道ノ諸器虛
 弱ヨリ起ル小便閉。淋疾。漏精。白帶下。或ハ淋疾ノ毒
 解メ後。淋瀝止マザル症ヲ治シ。經閉ヲ通ス。○攝護。

及ビ婦人陰器諸部ノ弛弱セルヨリ起ル諸症尿道
ノ潰瘍等。少燉衝ノ諸症ナキ者八十氏ヨリ半錢マ
テ用ヒテ良効アリ○腎膀胱ノ膿瘍腎痛殊ニ尿道
ノ諸症ニ雞子黃或ハ蜜或ハ砂糖ニ和シ用ヒテ尤
良○胸中ノ腐敗液粘稠液ヲ淨刷シ痰ヲ化熟シ略
キ易カラシム○肢節痛腰髓痛流走痛風ニ用ヒテ
驗多シ○條蟲ヲ殺ス○過服スレバ瀉下ス○每服
十滴ヨリ二十滴マデ用フ雞子黃或ハ亞刺比亞蘆
謨漿ニ研和シ用フ○多血熱性ノ人或ハ體質感動
シ易キ者或ハ燉衝壯熱アル諸症ハ害アリ此藥熱

性ニシテ衝動刺戟スレバナリ○是ヲ阿利襪油ト蜜
ニ研和シ耳中ニ滴メ耳孔ノ潰瘍ヲ治ス○二三錢
許吉利詞參兒ノ藥液ニ加ヘ施メ大便閉ヲ通ス○
下利劇ク且苳苳トメ休マズ殊ニ重墜努責ヲ兼ル
症ハ左ノ吉利詞參兒ヲ施メ大効アリ又痔痛甚キ
ヲ治ス

的列並吉利詞參兒

的列並底那 二錢

的列並底那 二錢

的里亞加 三錢

乳汁 五三

右先ヅ的列並ヲ雞子黃ニ研和シ。次ニ餘藥ヲ調和シ水銃ヲ以テ直腸ニ灌入スル。一日一兩次。○的列並底那ハ創傷潰瘍ニ外敷ノ稍鑽透刺戟シ汚液ヲ洩シ。膿ヲ排ヒ。腐敗ヲ遏メ。瘡瘍ヲ乾愈スルノ良藥トス。○外敷ノ纖維ヲ強固シ。肉ヲ生シ痂ヲ作シ。醜穢ノ癍痕ヲ消ス。故ニ愈創ノ技爾撒謨トシ。一切虛弱ニノ愈難キ潰瘍癰瘡ヲ治シ。硬肉ヲ軟ラゲ。又惡厲ノ諸瘡頭瘡疥癬類ヲ治シ。或ハ捫挫轉筋攣急ヲ弛メ。或ハ皮上ノ汚斑ヲ消シ。陰處ノ搔痒ヲ去リ。竹

木刺ヲ抜ク。是ヲ脂類或ハ雞子黃ニ和シ外敷スレバ腐壞ヲ遏メ穢液ヲ除キ殊ニヨク創ヲ愈シ。硬腫ヲ軟ラゲ。膿ヲ醸ス。○鑽透ノヨク凝結ヲ疏散ス。故ニ關節及ビ腓ノ腫瘍ニ擦テ驗多シ。○蒸湯劑ニ加ヘ施メ神經ヲ強壯シ前說ノ諸症ヲ治ス。○但炊衝ヲ兼ル腫瘍或ハ瘡瘍ヲ乾愈メ其毒内攻スヘキ症ハ總テ此藥ヲ禁ス。或ハ皮膚ノ感觸甚キ人ニ外敷スレハ動モスレバ炊腫發泡スルアリ。製法 的列並底那油 一匕

國慶侯福 裴按依

雙志水

右頸

長ク潤キ列篤兒多ニ内レ。蒸餾ノ油ヲ滴ス

又法の列竝底那ヲ以テ硝子若クハ磁製ノ列篤兒

多人三分ノ二ニ充シメ。大ナル承餾壘ヲ接シ。其接

際ヲ塗封シ。炭爐或ハ沙鍋ニ入レ。文火ニテ蒸餾ス

レバ芳香酸味ニノ鹽氣ヲ含メル水ノ如キ清稀ノ

液出テ是ニ清稀竄透烈香アル油浮ム其油ハ即チ

的列竝底那油ナリ是レ澄清ニメ水ノ如クナル故

ニ一ニ是ヲ的列竝底那精ト名ク新鮮ノ者ハ澄清

色ヲ粘テ黄其精及ビ油出ザルニ至テ承餾壘ヲ換

へ。火ヲ増シ蒸餾スレバ酸味ノ水ニ稠稠キ微黄色

ノ油雜リ出ツ。其後逾火ヲ増ス其ハ黄色ノ水ニ粘

稠赤色ノ油雜リ出ツ。終ニ其油出ザルニ至テ火ヲ

下シ放冷スレバ赤油ハ凝結シ又列篤兒多ノ底ニ

渣塊殘レリ。是即チ格碌波尼亞ナリ

主治清稀ノ油ハ味辛苦竄透揮發シ。細絡織管ノ壅

塞ヲ開達シ。粘液ヲ稀釋シ。冷結ヲ温散シ。汗ヲ發シ。

小便ヲ利シ。疝痛腎痛ヲ消シ。腎膀胱尿道ノ虛弱ヨ

リ起ル淋疾滑精尿道ノ潰瘍ヲ治ス○服量六滴ヨ

リ十二滴マデ葡萄酒或ハ適宜ノ飲液ニ點服ス○

小便閉。淋疾。結石等。尿道ノ諸症ハ十滴ヨリ二十滴
 マデ砂糖ニ和シ燒酒ニテ用ヒ速効アリ。但過服ス
 レバ尿管ヲ發ス。然レ陰具諸器ノ虛弱ヨリ起ル尿
 崩漏精ニハ良驗アリ。○在再寒性傷冷毒痛。肢節腰
 腕ノ痛風ニ左ノ方尤驗アリ。

的列並膏

的列並底那油 二錢

白蜜 一匁

右研合シ朝夕一卵匙ヲ服ス。○的列並底那油ハ條
 蟲ニ奇効アリ。早朝空心ニ弓ヲ取テ冷水一盞ニ加

へ服ス。蟲下ラザレバ半時ヲ經テ又一弓ヲ服ス。或
 ハ左ノ方亦良

的列並驅蟲飲

的列並底那油

亞刺比亞越謨 各一弓

薄荷水

右研和シ早朝空心ニ半劑ヲ服ス。効ナキ片ハ翌朝
 半劑ヲ用テ。但其油ヲ増シ服スレバ尤良。○燒蟲ハ
 左ノ吉利詞爹兒極メテ驗アリ

驅蟲吉利詞爹兒

的列並底那油

雞子黃

水 十多

右調和シ吉利詞爹兒ト爲ス。小兒ハ其量ヲ減ス○
 此油ハ辛熱ニシテ衝動スル故ニ諸、焮衝壯熱ノ症ニ
 ハ害アリ○外敷ノ峻効アル防腐藥トス。ヨク鑽透
 ノ腐壞ヲ遏ム○神經及ビ腱ノ損傷、截斷、破裂、刺傷
 等。總テ神經傷ニ外敷ノ特效ノ藥トス○諸創、潰瘍
 ノ膿ヲ排ヒ腐爛ヲ除ク○麻痺不遂及ビ神經攣急
 ノ部ニ擦ノ尤驗アリ○此油ハ外敷ノ宛モ銳烈ナ

ル燒酒ノ如ク止血ノ良藥トス。細絡ヲ收固シ血液
 ヲ凝結セシムルヲ殆ト腐藥ノ如シ但、是ヲ温メ施
 サレバ峻効ナシ○刺戟衝動ノ分利疏散ノ効アリ
 リ。故ニ糊瘤、腺腫、關節腫、陰囊水腫、其他諸部ノ水腫
 ニ外敷ノ良効アリ。然レ、焮腫及ビ化膿スベキ腫瘍
 ハ是ヲ施サズ。或ハ手ノ腱瘤ニ此油ヲ擦ルト毎日
 一次漸ク赤色トナリ細胞ヲ發シ終ニ軟化メ消散
 ス○寒壞疽ノ穢液出ルト多クメ血液焮解崩壞ス
 ル症ハ其部ヲ鑽刻ノ此油ヲ塗リ或ハ槲皮ノ末ヲ
 摻ケテ此油ヲ滴シ濕スベシ。總テ寒壞疽ニ此油ヲ

塗レバヨク滲透ノ腐壞ヲ遏ム。幾那モ亦此症ニ大
 効ヲ稱スト雖モ深ク其部ニ滲透セズ。故ニ幾那ハ
 内服ノ峻効アレバ外敷ニハ此油ノ効勝レリ燒酒
 ハ幾那ニ比スレバ刺戟ノ深ク滲透ス。然レバ其肝要
 ナル化膿ヲ妨ク^テ列竝油ヲ外敷スレバ深ク滲透
 ノヨク腐壞ヲ遏メ又化膿ヲ妨ル下ナシ○腐骨疽
 ノ大ニ腐蝕シ骨片剥脱スル症ニ施メ其腐蝕ヲ遏
 メ速ニ腐骨ヲ脱除セシメテ治ス。但腐骨ノ剥脱セ
 サル症ハ燒酒ヲ良トス○其稠厚ナル黄色ノ油ハ
 揮發竄透ノ氣少ク唯神經ヲ強壯シ急迫ヲ緩弛シ

堅硬ヲ軟化シ腫瘍ヲ消散シ拔爾撒謨ニ代用ノ創
 傷ヲ愈シ出血ヲ止ム粘稠赤色ノ油ハ止痛ノ奇効
 アリ創ニ施セバ膿ヲ成サズノ愈^依^國^醫

鐵^ヘル^リム^羅 ^エイ^ズル^蘭

鐵ハ毘黠密那^ナ硫黃珪土ヲ渾合メ成ルト云是古說

ナリ晚近是ヲ一種ノ元素トス故ニ毫モ夾雜ノ物
 質ナシ^生毘^黠密^那ハ石腦油琥珀石炭ノ如キ土中ニ
 フ含ム者ナリ^鍊石^精炭^末ニ^埋メ^燒テ^水ニ^淬ス^レハ
 鋼トナル^鍊石^精炭^末ニ^埋メ^燒テ^水ニ^淬ス^レハ
 炭素現スル^鍊石^精炭^末ニ^埋メ^燒テ^水ニ^淬ス^レハ
 痕生セス○炭素^補卷^八珪土^補卷^九ニ註ス

屑ニ濕シ堆積シ置、片ハ是ニ含メル水氣鬱蒸ノ自
 ラ熱氣ヲ生ス是ニ硫黄ヲ加ヘ置片ハ自ラ燃テ燄
 ヲ發ス○鐵ニ銅氣ヲ含ム片ハ内服ノ害アリ。是ヲ
 試ル法。鐵屑ニ硃砂精ヲ加ヘ研磨ノ青色トナルハ
 銅氣アル候トス○鐵ト鋼ト性功同シ但、多ク鐵ヲ
 藥用トス○製煉家ノ究理說ニ云凡ソ動物植物ノ
 質多クハ鐵氣アリ或云血二十五比ニ鐵二錢ヲ含、
 或說血ハ酸化鐵ヲ含、凡五百零三分一ト云酸化鐵補卷八
 〔主治〕性温收瀦ス○鐵ヲ用レバ血ノ赤色ヲ増シ虚
 冷ヲ温煖シ凝體諸器ノ基趾ヲ培補ノ強固ナラシ

ム○全軀ノ纖維弛緩虚衰セルヨリ起ル諸病ヲ治
 ス。コレ其諸器ヲ收固ノ強壯ニシ血液ノ運行ヲ増
 進シ腺ノ諸液ヲ分泌スル機力ヲ健ニスレバナリ
 ○纖維脆弱血液稀薄ニメ水ノ如クナルヲ醇厚ニ
 ス○血液ノ運行怠慢ナルヨリ血中多ク粘液ヲ生
 シ寒性ニメ顔色灰白黦澹ナル者ニ是ヲ用レバ脉
 實シ體健ニメ肌膚紅潤トナル○凝體諸器ノ薄弱
 ニメ血液ヨク釀熟セズ。粘稠液ヲ生メ諸藏ニ壅塞
 スルヲ治シ。總テ寒性ノ粘液質ノ人ニ効アリ○胃
 腸ノ纖維脆弱ニメ飲食化シ難ク動モスレバ下利

シ若クハ痞氣鬱蓄ノ諸症ヲ發スル者或ハ萎黃病
 脾病ノ衰弱セル者或ハ粘液腫。虛弱ノ水腫或ハ下
 利シ易ク若クハ汗多キ症。或ハ神經諸筋虛衰ノ肢
 體勞倦精力虛乏ノ者。或ハ皮肉軟弱。脉管緩弛。浮腫
 停水アリテ運輸シ難キ者。或ハ經久虛寒ノ諸病ニ
 萎黃病ヲ兼ル者或ハ血液多ク脱泄ノ羸瘦シ若クハ
 ハ水腫トナル者或ハ内藏衰弱ノ月經過多若クハ
 閉滯シ及ビ佝僂病等ヲ發スル者。或ハ居恒放縱安
 逸ニ慣ヒ勞動ヲ厭ヒ懶惰ヲ好ミ竟ニ精力虛耗肢
 體乏弱ナル等ハ身體ヲ運動シ起居飲食ヲ節慎ノ

鐵劑ヲ用レバ皆良驗アリ○適宜ニ是ヲ服スレバ
 飲食消化ヲ扶ク腸中ノ酷厲液ヲ制ス但レ其病ニ適
 セズメ過用スンバ胃腸ノ消化ヲ妨ゲ閉塞ス○鐵
 維甚ダ硬強牽張セル者或ハ胃腸ニ膽液質ノ惡液
 鬱積スル者ハ鐵劑大ニ害アリ○鐵ハ收瀟ト開達
 トノ兩効ヲ兼ヌ即チ諸器ノ弛緩衰弱ヲ收固強壯
 ノ諸失血月經過多崩漏下利多汗尿崩等ヲ閉止シ
 良効ヲ奏スルハ收瀟ノ効トス萎黃病。脾病。依剝昆
 堉兒等ノ壅塞ヲ開達スル聖藥トシ粘液質ノ經閉
 ヲ通シ肝脾腸間膜ノ閉塞ヲ疏解スルハ開達ノ効

トス斯ノ如キ兩般ノ効アルヲ以テ醫家種々ノ鐵劑ヲ製メ或ハ開達劑トシ或ハ閉澁劑トシ各異ノ効驗ヲ稱ス然レモ今其閉澁劑ト稱スル者ヲ與ヘテ大小便ヲ利シ經閉ヲ通スルコトアリ。其開達劑ト稱スル者ヲ用ヒテ頑固ノ下利ヲ閉止スルコトアリ。又同方ノ鐵劑ヲ以テ或ハ下利崩漏ヲ止メ或ハ瀉下セシメ經閉ヲ通スルコトアリ。一種ノ鐵劑ヲ以テ斯ノ如ク相反スル効ヲ爲ス所以ヲ考究スルニ畢竟是皆收瀋ノ一性功ニ係ルノミ。其故ハ脉管纖維柔弱弛解シ血液ヲ保攝維持スルコト能ハズノ脱泄ノ

諸症ヲ發スル者ノ如キハ鐵劑ヲ用ヒテ閉澁收固シ治スルコト固ヨリ其主能トス。或ハ脉管纖維虛衰ノ萎縮シ血液ヲ健輸スルコト能ハズ且血中ノ水液粘稠トナリテ凝滯シ諸器脉管ニ壅塞メ諸竅利セザル者ノ如キハ亦鐵劑ヲ用ヒテ是ヲ收固强健スルキハ脉管ノ萎縮セル者充張シ復括約縮張ノ機轉ヲ逞メ血液ヲ健輸シ壅塞セル者開通メ乃チ開達ノ効ヲ現ハスナリ。然レモ閉澁ト開達ト其効ヲ異ニスレモ皆其收瀋ノ功ニ非ルハナシ。唯患者ノ體稟及ビ病原ノ一ナラザルニ隨テ其効ヲ奏スルモ

亦同シカラザルノ云○凡ソ鐵劑ヲ用ルニ就テ先
 ヲ患者ノ血液ニ三種ノ差別アルヲ察シ是ニ蹟^{ソレ}テ
 或ハ効アリ或ハ害アルヲ辨スベシ○第一種ハ
 血ノ質膠粘ニメ血中ノ水液亦甚ダ粘稠ナル者ナ
 リ是ニ因テ脉管縮張ノ運輸ノ機轉ヲ爲スト雖モ
 血液流利スルヲ能ハズノ脉管ニ壅滯シ是ヨリ萎
 黄病。處女病。粘液腫。經閉。其他粘稠液ニ因ル諸病ヲ
 發ス○第二種ハ血中ノ^水液過多ニメ血ノ質
 稀薄ナル者ナリ是ニ因テ水液滿溢泛濫シ細絡纖
 管括約ノ力ヲ失ヒ緩弛縱解ノ下利自汗失血水腫

等ヲ發ス右兩種ノ血質ヨリ發スル諸病ニ鐵劑ヲ
 用レバ全軀ノ脉管纖維ヲ收固ノ縮張運輸ノ機轉
 ヲ強健ニスル故ニ其壅滯セル膠粘ノ血液ヲ推盪
 碎挫ノ流利セシメ或ハ血質ヲ收固ノ水液ヲ分利
 滲泌セシメ或ハ泛濫停止セル水液ヲ搾出驅逐ノ
 通利セシム。故ニ萎黄病。處女病。粘液腫。經閉。其他纖
 維脆弱ニメ血ノ膠粘ヨリ起ル諸病ヲ治シ或ハ下
 利尿崩自汗水腫其他纖維ノ弛解シ血液稀渙メ脱
 泄スル諸症ニ偉効ヲ奏スルナリ○但諸藏ニ頑固
 ノ壅塞アリテ纖維攣急牽縮セルヨリ發スル諸病

即チ勞瘵熱。肺傷久欬。肺瘍。羸瘦。消耗熱等ニ於テ下
 利自汗尿崩失血水腫ヲ發スル者ハ鐵劑大ニ害ア
 リ。是其細絡織管ヲ收縮ノ逾。壅塞セシノ血質ヲ收
 固ノ水液ヲ搾出シ其脫泄ヲ更ニ増劇セシムレ
 バナリ。或ハ經久ノ腹水。四肢羸瘦スル症モ鐵劑ヲ
 禁ス。此病ハ水液腹腔ニ緊滿停滯シ血分ハ殆ト乾
 涸ス然ルニ鐵劑ヲ用ヒテ其血ヲ收固スレバ血中
 ノ水液逾。消耗メ皆腹腔ニ滯留シ四肢更ニ瘦削ス
 レバナリ。○第三種ハ血中ノ水液匱乏シ血ノ質甚
 ダ乾涸メ稠厚ナル者ナリ。此血ヲ和蘭ニブルドト名ク血ノ

焦涸セル義ナリ。或ハ是ヲメラコリカ質ト名ク
 神思沉重鬱憂病ノ義ニノ其血。敗黑膽液質トナル
 者ナリ。是ニ因テ其血。細絡織管ニ凝泣滯著スレバ是
 ヲ以テ脉管ノ縮張運輸ノ機轉ヲ障碍ノ牽縮セシ
 メ遂ニ内藏ノ頑硬腫。默朗格利亞神思沉重失苟兒
 陪苦ノ壅塞ヲ生シ。或ハ内藏ノ頑硬腫ヨリ危險難
 治ノ下利失血嘔吐水腫等ヲ發ス。斯ノ如キ壅塞ア
 ル病ニハ鐵劑大害アリ。是ヲ用レバ細絡織管ヲ收
 固ノ逾。牽縮セシメ血モ亦益。水液匱乏ノ凝滯滯著
 シ其患症ヲ増劇ス。故ニ鐵劑ハ開達閉澁ノ兩効ヲ
 稱スレ。凡右ノ血質ヨリ生スル患症並ニ凝體諸器

ノ硬強ニ因ル諸病。及ビ膽液質ノ惡液胃腸ニ鬱蓄
 スル症ニハ皆害アリト知ルベシ。○凡ソ收瀟ノ諸
 藥多シト雖モ鐵ニ比スベキ者ナシ其故ハ草木類
 ノ收瀟藥ハ是ヲ服ノ胃腸ノ諸液ニ泡釀消化セラ
 ル、凡ハ其性能渝變ノ普ク全軀ノ血液ニ達シ難
 キトアリ胃腸ノ諸液ハ胃液腸液膽鐵ハ胃腸ノ諸
 液ニ混和スト雖モ其性必モ變化セズヨク血液ニ
 浸滲シ周身ニ普達ノ其効驗ヲ致スナリ。○烙鐵ヲ
 葡萄酒或ハ水ニ焯シ其汁ヲ用テ瀉泄。乳糜利。下血。
 脾病。其他胃弱ノ諸症ヲ治シ。纖維ノ虛弱緩弛ヲ強

壯ス。其功鐵泉ノ如シ。○凡ソ衰弱虛損ヲ回復セン
 ガ爲ニ鐵劑ヲ用ント欲スレハ便秘及ビ津液乾涸
 スルヲ恐レ或ハ血液ヲノ過大稠厚ナラシムルノ
 害アラントヲ慮ル者ハ是ニ滋養浸潤ノ効アル液
 ヲ和シ用フベシ。此症ハ鐵乳清ヲ的當トス其方
 烙鐵ヲ取テ數乳汁ニ投シ其上清ヲ取毎朝温服ス。
 此劑ハ滋養ノ功アルヲ以テ凡ソ神經脆弱枯燥ノ
 人或ハ纖維勁固硬強ナルヨリ發スル諸症。或ハ失
 血過多或ハ房勞過度精力虛損ノ者或ハ體質薄弱
 ニノ血中惡液多ク其血液ヲ以テ全軀ヲ養フ故ニ

遠西名物考

風雲堂藏

面色黧澹萎黃肢體浮腫ヲ發シ或ハ脾病風氣痞滯
 ノ諸症ヲ患ル者ニ是ヲ用レバ精力健旺肌膚潤澤
 ヲ生シ神經ヲ衝動セズ。焮熱ヲ生セズ。大小便ヲ利
 シ。虛羸瘦削ノ人ニ用フレ疋枯燥ノ害ナシ此劑ニ
 野羊乳或ハ牛乳等分ニ加ヘ用レバ滋養ノ効尤多
 シ按ニ乳劑ハ飲食ヨク消化スル者ニ用フベシ否ラザレバ停滯ノ胃腸ノ諸症ヲ發ス○或
 ハ鐵屑ヲ乳清若クハ水ニ浸シ用ヒテ亦良効アリ。
 鐵ノ精氣ハ血液ニ融和ノ細絡纖維ニ灌漑シ渣滓
 ハ血ニ入レトナク大便ニ通メ胃腸ヲ妨ルトナシ○
 鐵ハ胃腸ニ於テヨク溶化スレバ大便黑色トナル

鐵屑是ハ汚物ヲ去リ藥用トスベシ其法鐵屑ヲ取
 リ篩テ汚物ヲ去リ其上ニ粗篩ヲ置キ篩内ニ上好
 ノ磁石ヲ内レレバ純粹ノ鐵屑ハ悉ク磁石ニ著クナ
 リ是ヲ取り硝子壘ニ入レ貯フ○鐵劑ハ鐵屑或ハ
 鐵鏽ヲ極細末トシ丸藥散劑煉膏或ハ酒劑トシ用
 ヒテ良効アリ○鐵粉ハ壅塞ヲ開キ經閉ヲ通スル
 ニ稱シ用フ服量十二匁ヨリ半錢マデ丸藥或ハ煉
 膏トシ毎日一兩次用フベシ○鐵屑ノ極細末ヲ煨
 過シ三匁ヨリ十匁マデ用ヒテ胃腸ヲ強壯ニスル
 ト宛モ一種ノ神經劑ノ如クス然レ惡液汚物胃腸

ニ鬱滯スル者ハ先ツ吐劑或ハ下劑ヲ用ヒ胃腸ヲ
 淨掃ノ後用フベシ。或ハ内藏壅塞アル者ハ中和鹽
 ノ類硝砂孕礬酒石ヲ用ヒ融解疏通ノ後是ヲ與フ
 同類ヲ加ヘ黃疸水腫等ノ虛衰セル者ニ用ヒテ殊効
 ヲ稱ス。○鐵粉ニ石鹼ト加カ密列ミツレ。越幾斯劑越幾斯劑ト製法法。蒲公英
 シ同ヲ加ヘ黃疸水腫等ノ虛衰セル者ニ用ヒテ殊効
 ヲ稱ス。○酸敗液ノ症ニ鐵粉ヲ用レバ鐵中ノ硝子
 性ノ土ト胃中ノ酸液ト抱合渾和ノ鐵性ノ中和鹽
 トナル故ニヨク酸敗液ヲ消化ス。又鐵ノ強壯ニス
 ル性カテ以テ胃ヲ強健ニシ酸敗液ノ復タ滋生スル
 ヲ抑制ス。是ヲ沙糖ニ和シ十匁マデ一服トシ日ニ

三四次用フ。或ハ鐵粉ニ葛爾儒別涅實カ屈室ル桂イ薄荷ベ
 ヲ加ヘ散劑トシ用ヒテ酸敗液ノ諸症。心腹痛等ヲ
 治ス。○胃腸ニ多ク酸敗液アル症ハ鐵粉尤モ効アレ
 凡他ノ病ニハ重滯ノ消化シ難キチアル故ニ格コ碌ロ
 屈私ク末爾マ扶斯レ出ス後ニ或ハ鐵鏽ヲ良トス。然レ凡此二劑
 モ長服スレバ胃腸ニ鬱滯スルラアル故ニ鐵テ丁キ幾
 去爾テヲ最モ良トス。○諸鐵劑及ビ鐵粉ハ殺蟲ノ良
 効アリ。是レ胃腸ノ酸敗液ヲ消化シ胃ヲ強壯ニシ
 蟲ノ巢ヲ滅スレバナリ。○鐵粉ハ香竄藥桂丁子益
 類ノヲ加ヘ用ヒテ尤良。但レ初ハ少許宛用ヒ漸ク其量

ヲ増スベシ。初メ一頓ニ多ク用レバ胃ニ重滞ノ惡
 心妨悶等。胃ノ諸症ヲ發スル^{イナド}アレバナリ。若シ右
 ノ症ヲ發セバ鐵粉ヲ煨過ノ用ヒ或ハ丁幾^{テシキ}去爾^{テム}
 シ用レバ服シ易クノヨク消化ス

鐵鑪製法

鐵屑 精製者

右適宜ニ取り醋ヲ撒^{フリカ}ケ曝乾シ數^スノ如クノ盡ク
 鑪ト爲ルニ至リ。極細末トス。淨潔ノ鐵鑪ハ一味用
 ヒテ良。鐵粉ニ比スレバ消化シ易シ。萎黃病及ビ是
 ニ頭痛ヲ兼ル症。或ハ月經過多等ニ尤^モ稱シ用フ○
 佝僂病ニ左ノ方。奇効アリ

治僂散

ヒルヒス。コントラ。ラシテム 羅

鐵鑪 一弓

蝸蛄石 四錢

銀朱 一錢

右各別ニ極細末トシ調和シ分五十服^手シ日ニ二服
 宛用^フ是。佝僂ニ經驗ノ一良方ナリ。患兒毎日是ヲ
 服シ時々下劑ヲ用ヒテ便秘セシメズ又身體ヲ運
 動シ飲食ヲ節ニシ水氣必ク乾テ強壯ニシ且香氣
 アリテ精神ヲ爽快ニスル物ヲ加ヘ用ヒ。又居室臥
 床衣衾等ハ勉テ濕氣ヲ避^{サケ}テ乾淨ニシ又香竈ノ藥

品ヲ火ニ投シ烟氣ヲ毛布ニ薰シテ毎日周身ヲ摩
擦スベシ（保）○左ノ方亦尙僂病ニ偉効アリ

未爾扶斯治僂散

乾白撒兒未爾扶斯後一錢

蜊蛄石三錢

右散劑トシ分テ四十服トシ一服宛乳汁ニテ用ル

一日ニ三次。小兒年齡強弱ニ隨テ服量ヲ増減ス（依）

越扶屋布斯未爾扶亞栗斯

オキセイガリヘルリニ
グリ羅斯ワルトフル
シールセルハンエイズル蘭エチヲプス
ハ黑色ノ義マルチアリスハ鐵ノ義

製法

鐵屑 適宜

右陶製ノ坩堝ニ入レ火ニ上セ通紅ナラシメ頻々

ニ水ヲ撒テ手ヲ住メズ攪セ鐵屑光澤ナク黑色ト

ナルニ至リ温ニ乘メ研末シ羅（羅）ニ硝子壘ニ入レ固

封シ貯フ（袋）

主治 感觸甚フノ脆弱ナル人。及ビ小兒ニ用ヒテ衝

動セズ鐵ノ主治ニ舉ル諸病ニ効アリ。此劑二錢沙

糖六錢研和メ十二服トシ一服宛用ル一日四次（依）

格碌屈私未爾扶斯 羅 エイズルサフライン（鐵）

ノ義ナリ此劑雜腹蘭
色ナルヲ以テ名ツク

製法

撒兒未爾扶斯 後ニ出ツ 新製者適宜

本草綱目卷之二十一 鐵

右水ニ溶化シ瀝テ汁ヲ取り是ニ精製剥篤亞斯ノ
溶液剥篤亞斯一ヲ蒸ヲ滴シ加テ鐵質盡ク其底
ニ沈ムニ至リ其ウハズ上清ヲ傾ケ去リ温湯ニテ其鐵ヲ
洗ヒ乾シ研末シ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ○此
劑ハ鐵ニ含ノル酸性ヲ脱スル故ニ服シ易シ鐵味
ヲ惡者ニ用テ良エ服量越エ蟄屋布斯マ末爾扶斯ナト同シ
又法 鐵屑淨潔者 適宜
右春月雨露風日ニ晒スフ數日悉ク鏽ヲ生スルニ
至テ研末シ篩フルヒ聽用ス○或ハ鐵屑ニ多ク水ヲ加
ヘ搗テ攪滾シ其濁水ヲ取瀝テ汚物ヲ去リ靜定ス

ルコトニ宿其上清ヲ傾去レバ精純ノ渣泥其底ニ
留ル是ヲ取磁鍋ヲハスニ内レ火ニ上セ乾シ貯フ○或云
以上二方收瀝開達ノ兩効ヲ兼ヌ服量十匁ヨリ二
匁ニ至ル○或ハ鐵粉ヲ煨過メ通紅ト爲シ放
冷シ研末ス○或ハ鐵鏽ヲ煨過シ末トス○或ハ鐵ヲ燒
テ通紅ト爲シ數是ヲ醋ニ投シ鐵質終ニ磨碎スベ
クナリテ細末トス右三種ノ鐵劑モ亦格碌屈私マ末
爾扶斯ト名ク或云右三方ヲ收瀝格碌屈私
又法 鐵屑十匁
硫黃華五匁

本草綱目卷之二十一 鐵

右合シ坩鍋ニ内レ密閉シ武火ニ煨テ通紅ト爲シ
放冷メ末トシ聽用ス後或云此劑ヲ開達格碌屈
數種アリテ諸書ニ載ス然レ大
同小異ナルヲ以テ是ヲ略ス

主治 下血崩漏痔血下利等一切脫泄ヲ止ム此劑輕
ク閉澁スルヲ以テ害ヲ貽スナシ○壅塞ヲ開達
スル良藥トス肝脾腸間膜等ノ壅塞ヲ疏通シ黃疸

ヲ治シ經閉ヲ通シ其他鐵ノ主治ニ舉ル諸病ニ良
効アリ○服量十匁ヨリ一錢ニ至ル沙糖ヲ加ヘ散

劑トシ或ハ丸藥錠藥煉膏水煎浸劑トシ用フ○諸
鐵劑ヲ長服ノ胃腸ニ重滯スル症アル者ハ適宜ノ

下劑ヲ用テ是ヲ導泄シ治スベシ叔伍侯

撒兒末爾扶斯 羅 ヒットリヨールマルチス羅 ヒットリヨール
ハンエイズル蘭 鐵鹽又鐵礬ノ義

製法 鐵屑淨潔者

綠礬油銳烈者

右綠礬油ニ蒸餾水四倍ヲ和シ硝子壘ニ入鐵屑ヲ

取テ少許宛加レバ沸騰シ其清液忽温ニメ灰色ト

ナリ蒜臭ヲ生ス右ノ如ク鐵屑ヲ加テ必モ沸騰セ

ガルヲ度トシ其壘ヲ温沙火ニ置下半時ニノ瀝過

シ又火ニ上セ水氣ヲ蒸散シ上面膜ヲ生スルニ至

テ放冷スレバ鮮美綠色透亮ノ芒ヲ結ブ是ヲ取乾

硝子燻ニ入固封シ黯處ニ貯ス。其芒ヲ結ガハル液モ
 前法ノ如ク煮テ結芒セシムベシ。○是ヲ煮ニ火候
 強ケレバ其液美綠色ヲ失テ黯灰色トナルナリ。

主治 諸藏ノ壅塞ヲ開キ凝結ヲ解ク良藥トス。故ニ
 大便ヲ通シ小便ヲ利シ萎黃病ヲ治シ處女病ノ經
 閉ニ太効アリ。○殺蟲ノ効アリ殊ニ條蟲ヲ殺ス。二
 氏ヨリ十氏マデ他ノ殺蟲劑ニ加用フ。但胃腸ノ脆
 弱ナル者ハ腹肚微絞痛シ。過服スレバ吐スルヲア
 リ。○一味用ニハ製ノ乾白撒兒未爾扶斯出ツト爲
 シ。大人ハ一月ヲ琶布類ニ加用ヒ。幼兒ハ二氏マデ

用ヒ四五歳以上ノ兒ハ十氏マデ用フ。○酸敗液多

キ症ニ鐵劑ヲ用レバ蒜臭或ハ敗卵臭ノ噫氣ヲ發

ス。○熱性ニノ膽液過多ノ症或ハ腐敗熱及ヒ腐敗

ヨリ起ル諸病ニハ此劑害アリ。凡ソ亞兒カ加利性ノ

腐敗毒ハ此劑ノ酸性ヲ吸收スレバ凝泣滯著メ危

險ノ閉塞ヲ生スレバナリ。○此劑瀉下ノ効アリ。故

ニ下利アル人ハ是ヲ禁ス。○服量二氏ヨリ一月ニ

至ル。○此劑一錢ヲ水一匕ニ溶シ空心ニ一服トス。

大小便ヲ通シ蟲ヲ殺ス或ハ一氏ヲ取水十六弓ニ

溶シテ鐵泉ヲ擬製ス。毎日服ノ良。○外敷ノ止血藥

トス或ハ多ク水ヲ加テ稀クシ淋疾白帶下ニ水銃
ヲ以テ數灌入ノ良効アリ 福 侯

乾白撒兒末爾扶斯

オイトドログデスワ
フルシルエイズル蘭

製法

撒兒末爾扶斯

適宜

右陶埴ニ入レ。文火ニ上セ乾シ白色ノ鹽ト爲ルニ

至リ。硝子壘ニ收メ固封シ貯フ 國

主治 撒兒末爾扶斯ニ比スレバ其芒ヲ爲ス所ノ水

氣ヲ脱スル故ニ性力差強クナルノミ

升鐵鹽

ヘルルム。ミリアチキム。又ヘルルム。
サリ左ム羅ソウトシル。エイズル蘭

製法

鐵屑

三多

發烟海鹽精

適宜

右發鹽海鹽精ヲ取テ鐵屑ニ滴シ加ヘ文火ニ上セ

テ終ニ盡ク溶化スルニ至テ仍是ヲ文火上ニ於テ

水氣ヲ蒸散メ乾クニ至リ。鐵壺ニ入レ上ニ鐵壺或陶

壺ヲ蓋ヒ。合際ヲ塗封シ。文火ニ上セ。漸火ヲ増シ。壺

底遍ク透紅ト爲テ三時ニメ放冷シ。其上壺ノ内ニ

升化セル鐵鹽ヲ取速ニ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ 國

主治 諸失血ヲ治ス又白帶下。夢遺。洩精或ハ善性淋

ニ偉効アリ。水ニ溶シ半時ニ五六滴宛服ス 福

收斂鐵液

リキヲルス。ステイキ。ス。羅。サイメン。ゲス
テル。デ。フル。イ。エ。ンド。ソ。ウト。シル。エイ

製法

砒鐵華

砒鐵華砒砂ノ條血石或鐵粉ヲ製ノ後

其列篤兒多ノ底ニ殘リタル黯赭色ノ渣ヲ取リ是
ヲ濕處ニ置キ溶化ノ橙皮色。收滲稠厚ノ液トナル。

此液ヲ取リ硝子壘ニ入レ固封シ貯ス。

主治一切失血ヲ止ム。升鐵鹽ニ比スルバ其効尤峻

劇崩漏白帶下。衄血等。半時毎ニ五六滴用ハ速ニ止

鐵丁幾生爾テインキヲラマルチ太羅火土ニ於テ

此劑收斂ト開達トノ二方アリ。

收斂方製法

テインキヲラマルチス。サリタ羅サメンテ
レツケンデ。マイズルテインキヲル蘭

升鐵鹽

一錢
上ニ出ッ

蒸餾水

一匁

右溶化シ硝子壘ニ内レ貯フ。

又法

鐵鏽

三匁

海鹽精

適宜

右文火^ニ上セ鹽精ヲ鐵鏽ニ加テ盡ク溶化スルヲ度ト

シ是又蒸餾醋ヲ加ヘ攪和ノ全劑ノ量ニ比半ト爲

シ。硝子壘ニ收メ固封シ貯フ。

主治收斂閉澁ノ良劑トス。險重ノ失血ニ速効アリ。

劇キ衄血。婦人崩漏。帶下。遺精。善性淋等。半時ニ五六

滴宛用フ(依)

開達方製法

「テイキンキタラマールチスアペリンス」
「オイベ子ンテエイルズルテインキタル蘭

撒兒未爾扶斯

酒石 各四弓

水蒸餾水 六比

右合和シ鐵壺ニ入レ。煮テ手ヲ住メズ攪セ。乾クニ

至リ。葡萄酒四比ヲ和シ。靜定スルヲ一兩日ニノ瀝

過シ。硝子壘ニ收メ固封シ貯フ(括)

又法 鐵鏽 細末 一比

酒石 白者 二比

右鐵罐ニ入レ蒸餾水適宜ニ加ヘ。手ヲ住メズ攪セ

煮ルヲ六七時ニノ瀝過シ放冷スレバ蜜ノ稠ト爲

ル。是ヲ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ(括)

又法 鐵屑 淨潔者 半比

酒石英 一比

剥篤亞斯 精製者 適宜

右鐵屑。酒石英ニ水ヲ加ヨク研和シ。剥篤亞スヲ少

許宛加テ少シモ沸騰セザルニ至リ。文火ニテ煮テ十

二時。其間。水減スレバ適宜ニ加。紙ニテ瀝シ。再文火

ニ上セ。煮減ノ二比ノ量ト爲シ。硝子壘ニ内貯ス。亞
主治 萎黃病。經閉。水腫等脉管纖維ノ虚弱緩弛ヨリ
 起ル諸病ヲ治シ。内部ノ壅塞ヲ開通シ。血ノ惡質ヲ
 回復シ。又諸鐵劑ノ性功ヲ全備ス。○寒性ニノ諸液
 稀涼ナル病ニ尤驗アリ。○此劑ニ健胃衝動ノ劑ヲ
 加テ良効アリ。假令バ健質亞那丁テイキン幾去爾テイタル珊篤里丁サンドクリン
 幾去爾テイタル越栗失爾テイタル剥祿布利恒ペルクブレイ阿魏アウイ丁テイタル幾去爾テイタル各條末カクジョウマ
 爾扶斯エルフス鎮痛液テイタル出次ニ等ナリ。○凝體纖維強壯ニノ血
 液稠厚ナル症ニハ此劑ヲ禁ス。○鐵粉格碌屈斯末ゲルクククス
 爾扶斯等ハ胃腸ニ鬱滯スル下アレレ此丁幾去爾テイタル

ハヨク消化ス。○服量一錢ヨリ四錢マデ飲液ニ和
 シ用ヒ或ハ茶匙ニ三四抄マデ用フ。依 炭 福

未爾扶斯鎮痛液

リキヲル。アノデイナ。マルチス。羅斯
 ワーフル。アーテリセ。エイヌル。アルコホル。蘭

製法

鐵屑 適宜

發烟海鹽精 四勺

消石精 一勺

右海鹽精ト消石精ト合和シ鐵屑少許宛加テ溶化
 セシメ。終ニ鐵屑少モ溶化セザルニ至テ文火ニ上
 セ。水氣ヲ蒸散ノ乾固セシメ。是ヲ窖ニ内レ置ケハ
 濕リテ黯赭色ノ液流出ス。其液ヲ取り亞的兒アイトールノ綠礬キョウラン

ヲ加ル一一倍量ニノ硝子壘ニ内レ。振蕩ノヨク混
 和セシメ。又是ニ銳烈ノ燒酒ヲ加ル一一倍量ニノ
 長キ硝子壘ニ收メ固封ノ靜定シ天日ニ透映ノ色
 ナキニ至リ聽用ス按

主治鐵劑中最精微揮發竄透ノ強壯スル効アル藥
 液トス。疼痛ヲ止。痙攣ヲ鎮メ經久ノ神經衰弱ノ諸
 症ニ奇効アリ○每服十五滴ヨリ三十滴マデ毎日
 數次其症ニ隨テ増減シ或ハ沙糖ヲ加用フ福依疾

遠西醫方名物考卷十四終

