

遠西醫方名物考

之三

卷二十六

✕
e 15

葉 26

499.2
Em-3
26

No 1451
10 e 15



遠西醫方名物考標目

卷二十六

失歇篤

靈貓

失鳩答

產地

香囊

主治

形狀

性情

採香

性

食料

香質

解毒法

主治

失鳩答膏

失鳩答越幾斯劑

服量



3293

附 荳蔻

形狀 性 試法 主治

服量

荳蔻散
龍麝荳蔻散

荳蔻越幾斯劑

蒸餾醋

製法

試法

醇精醋

性

主治

雙酸清涼飲

香竄醋

香醋飲

外敷諸法



遠西醫方名物考卷二十六

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

失歇篤蘭

シベテウム

羅

兩陰

間

ニ

アル

囊中

○按ニ失歇篤ハ靈貓ノ兩陰間ニアル囊中ノ香

液ナリ靈貓一名香狸。和蘭ニモスクス。カト又

ヘット。カトト名クモスクスハ麝香ナリカトハ貓

ナリ失歇篤ノ氣麝香ニ似タルヲ以テナリ正本

邦ニテ是ヲジャカウ子コト呼ブニ相符ス和産詳

ナラズ薩州及ヒ長崎ニハ稀ニ舶來アリト云

靈貓形ヲ猫ニ似テ稍大。鼻端ヨリ尾ノ端マデ二尺餘。頭短ク鼻長ク眼小。稍長シ。耳小。貓耳ニ似テ尖ラズ。牙尖利ニノ狗ノ如シ。脚短小。前脚殊ニ短ク五指指横徑許。五指アリ。爪直ニメ尖リ黒シ。全軀ノ毛ニ様アリ。一ハ長ク硬粗ニメ黑白茶褐ノ三色雜リ。黒斑及ビ條紋ヲ爲ス。一ハ短ク柔細。灰色ニメ赭色ヲ帶ビ。縷縮メ長毛ニ間ル。頭ノ兩脇ニ大ナル黒斑アリテ眼ヲ圍ム。體軀。頸及ビ尾ハ毛長ク硬粗ナリ。頭ハ毛短ク灰色ニメ黒色間ル。鼻灰白。其端黒色。耳ノ外面黒ク裏白シ。頸黑白ノ斑ヲ爲シ。吻ト腹ハ黒シ。

尾ノ上面ハ黒色。兩側及ビ下面ハ白毛雜リ。或ハ黒白人輪紋ヲ爲ス。脚ハ毛短ク頭ノ如シ。

產地此獸ハ亞弗利加洲ノ諸國殊ニ加依魯。厄日多。爲匿亞。亞墨利加洲ノ伯西兒。新伊。斯把泥亞。字露。或ハ支那其他亞細亞洲諸國ノ山野ニ穴居ス。多ク子ヲ産ム。小獸諸鳥ヲ食トシ。缺レハ果類。菜草ヲ食フ。係蹄ヲ以テ捕ヘ。鐵檻ニ内レ。他邦ニ貨ス。果類菜性情性兇悍ニノ馴レ難ク。人ニ是レ觸レハ抓破シ。或ハ咬傷ス。但幼ヨリ畜テ檻ヲ放テ漸ク慣レシムレバ馴テ戯ル。下猫ノ如シ。然レ必ク怒レバ動モスレ

ハ人ヲ咬ム其狀貌柔弱懶惰ナル如シト雖モ蟲鼠
鳥類ヲ捕ルニハ奔跳飛越ノ輕敏ナルト貓ニ減セ
ズ。夜視眼光アヒト亦貓ト同シ
食料牛乳及ビ雞卵ヲ最良トス。肉類及ビ穀果蔬菜
等ニテ畜ヘバ失歇篤ノ性能香氣劣弱ナリ是ヲ他
國ニ輸ルト雖モ意ヲ用テ良食ヲ與ヘ畜ヘハヨク
生育ノ失歇篤ヲ取ルト產地ニ異ナラズ然レ元來
暖國ノ産ナル故ニ寒地及ビ寒暖中和ノ國ニ來レ
バ精力稍減ノ子ヲ産セズ

香囊 牝牡ニ陰具ト肛門トノ間ニ一披溝アリ内

ニ短毛被フ其左右ニ膜囊アリテ皮上ニ隆起シ。溝
ノ唇ヲ爲ス。其囊長三拇指橫徑許。濁ニ拇指半橫徑
許。其内。鴿卵ヲ容ルベシ或云此囊牡ハ大ニノ牝ニ倍スト囊ノ内外
幾多ノ腺アリ又溝内ノ左右ニ二腺アリテ共ニ失
歇篤ヲ分泌シ囊中ニ藏ル。溝内ノ兩側ニ各一孔アリ
テ兩囊ニ通シ失歇篤ヲ溝ニ流泄ス
採香 失歇篤ヲ取レハ其檻ノ前ヨリ棍ヲ入テ是ヲ
後邊ニ逐行リ檻後ノ格子ノ間ヨリ其尾ヲ把住シ
板ニ枚ヲ檻ニ入レ此獸ノ兩脇ヲ夾テ動搖セザラ
シメ。後脚ヲ格子ニ結縛シ小匙ヲ以テ徐々ニ溝内

ヲ刮^クゲ其液ヲ抄^スヒ取ルナリ。或ハ時候ノ寒暖ニ隨テ其液出ル^ト多少アリ故ニ毎日或ハ隔日或ハ三日ニ一^{イナド}次取り大抵二日ニ一錢許出^ツ。此獸山野ニ在テハ自ラ木石ニ觸^レテ此液ヲ剔出スト云

香質 失歇^シ篤^トハ其質蜜ノ如ク牛酪ニ似タル稠厚ノ液ナリ新鮮上好ノ品ハ白色及^ヒ黃白色。其氣烈ニメ麝香ノ如ク且^ツ琥珀油ノ如キ臭ヲ帶ブ。味苦シ。上品ハ白色ナレ^レ時ヲ經^レバ漸ク黃色トナリ終ニ赭色トナル。或ハ帶黃灰色或ハ赤色ヲ帶ル者アリ。凡赭色多キホド逾^ク下品トス是ヲ紙ニ攤^クテ平等ニメ

粒塊ナク脂ノ腐敗セル如キ臭氣ナキヲ上品トス此液ニ酪及^ヒ脂類ヲ雜ヘ偽り販^ク者多シ○乳汁及^ヒ雞卵ヲ以テ畜^フ者ハ失歇^シ篤^ト白色ニメ上品ナリ。肉類果菜ヲ以テ畜^フ者ハ其液赭色ニメ其香及^ヒ性功劣レリ

主治 油氣揮發鹽多シ。鎮痛。解凝。緩和ノ良効ヲ奏シ神經ヲ強壯ス。疝痛。小兒腹痛。子宮硬腫及^ヒ衝逆等

是ヲ臍ニ擦^テ偉効アリ。但^シ婦人ハ此香氣ヲ嫌^フ者多シ○多ク香料ニ用^フ。少許ヲ取^テ他ノ香料ニ加^レバ佳香ヲ生^メノ麝香ノ如シ○此物燒酒ニハ溶

化セズ。油脂類ニハヨク溶化ス

叔伍叔

失鳩答羅

シキウタラ ゴニウム マモキ ラチュム 羅 ゲフ ラク テ シケル リク 蘭

形状 此草高二三尺許。圓莖滑澤ニシテ中虛。苗香シ莖

ニ似テ太ク。節アリ。是ヨリ傍枝ヲ生メ逐次ニ小極

ヲ分ツ。淡綠色ニシテ紅紫若ハ赭色ノ斑アリ宛モ蛇

皮ノ如シ葉ハ芹葉ニシテ粗糲。光澤アリテ羊齒狀ヲ

爲シ面綠色ニシテ背淡綠色。揉テ嗅ゲバ嫌ヒ惡ムベ

キ毒様ノ臭氣アリ。貓尿若ハ芫菁ノ臭ノ如シ。味辛

苦ニシテ微甘。莖枝共ニ莖衣ハカマアリ。葉柄ノ著ク處ハ凹

ニシテ莖ヲ包圍ス。莖枝頭ニ五瓣ノ小白花ヲ開キ大

ナル繖ヲ爲ス。花後子ヲ結ブ過ア泥子子イ テ 差 大 似 ニ 似

テ白ク五縦道アリ。根太サ指ノ如ク二三寸。若ハ七

八寸許。白色。其氣苛烈ニシテ味微甘ヲ帶フ。嫩根ハ乳

白色ノ汁ヲ含リ平原荒野ノ陰地。路傍溝池ノ邊ニ

生シ二年ニシテ枯レ新苗生ス。園生ノ者ハ藥用トセ

ズ。此草種類多ク相似テ真ヲ亂ル。ヨク擇ムベシ

莖ニ斑アレハ臭氣ナキハ本種ニ非ズ。斯ス篤ト爾ル窟ク名

ノ説ニ此根ノ生汁ヲ舌ニ滴スレバ苦辛ニシテ舌麻

痺シ次テ腫痛拘強ノ言フヲ能ハズ。本種ニ非レバ

此苛烈ノ味ナシト云リ一種ギフチヘ。ワトルシケ
 ルリングト名ル草アリ全形失鳩答ノ如クニノ莖
 斑ナク葉ノ臭氣微ナリ。莖ニ稜及ビ條理アリ。根
 ニ近キ處赤色ヲ帶ビ葉差長ク鋸齒アリ。根黑色。拇
 指大ニメ未尖リ鬚根アリ。截レバ焦黄色ノ汁出ツ。
 味苦シ榕按ニ是レ本邦ニ和蘭及ビ勿能泥亞都
 産スル毒芹ト呼フ者ニ於テモ誤テ是ヲ失鳩答ニ充テ用テ効驗ナシト
 スル者多シ一種「ベド」名ルムデ。トイン。シケルリン
 グト名ル者ハ葉黒綠色ニメ背光澤アリ一種「ベド
 空ルムデ。ペイブコロイド」ト名ル者ハ莖葉共ニ毛

茸アリテ粗糙ナリ又一種根太クノ卵圓形ノ者ア
 リ此皆其種類ニメ藥用トセス○凡ノ野草ヲ食フ
 獸類ハ自ラ此草ノ毒アルヲ知テ是ヲ避ク

○榕按ニ本邦ニ大芹オホセリドクセリ毒芹ドクセリ芹葉鈎吻ト呼ブ草。

毒アリテ形狀失鳩答ニ似タリ故ニ失鳩答ニ充

ル者ヲレ其莖ニ斑ナク。葉ニ猫尿ノ如キ苛烈

ノ臭氣ナシ。是右ノ譯說ニ舉ル一種ニメ藥用ニ

充ザル者ナリ。和蘭ニ於テモ誤テ是ヲ本種トシ

用テ効ナシトスル者アリト云「江戸郊外ニ於テ

未ダ本種ニ充ベキ者ヲ見ズ。故ニ姑ク其形狀ヲ記

ノ後來充當ノ考證トス〔福〕云失鳩答越幾斯劑ノ
 効用雙蘭菊越幾斯劑前ニ出ツノ如シト。又莨菪モ一
 種ノ毒草ニシテ瘰癧毒腺腫ヲ治スル効失鳩答ノ
 如シ故ニ是ヲ失鳩答主治ノ後ニ附ノ參考ニ備
 〔性〕失鳩答ハ一種ノ酷厲毒アリテ過服スレバ眩暈
 昏冒麻痺搐掣精神錯亂或ハ吐利心腹痛胃腸炊衝
 ヲ發シ速ニ救療ヲ加ヘザレバ死ス其麻痺酷厲毒
 ノ性莨菪番木鱉ノ類ニ屬シ凝體諸器ヲ溶解シ血
 液ヲ渙崩シ神經ヲ虛衰セシムルヲ自餘ノ酷厲ナ
 ル麻痺毒アリテ解凝ノ効ヲ爲ス諸藥ノ如シ故ニ

虛弱ノ人及ビ神經感動シ易キ者ニ是ヲ用フレハ
 兼用ノ藥ヲ以テ其害ヲ防クベシ
 〔解毒法〕若シ是ヲ過用ノ瞑眩烈キ者ハ微温湯ニ油
 若ハ蜜ヲ加ヘ與テ吐セシメ或ハ吐劑ヲ用テ其毒
 ヲ除ケバ治ス或ハ橙汁醋等酸味ノ液ヲ與フベシ
 ヲク其毒ヲ解ス海藻蟹モ亦良又清涼緩和ノ吉利
 詞參兒ヲ施ノ腸ノ炊衝ヲ治スベシ
 〔主治〕刺戟衝動シ麻痺セシメ疼ヲ止メ睡ラシメ血
 中ノ酷厲毒ヲ驅除ス○凝結ヲ溶解稀釋スル峻藥
 トス癰瘰ノ硬腫頑固ノ腺腫瘰癧ヲ消散ス○斯篤

爾窟^ル人^名此藥ヲ用テ癌腫ニ奇効ヲ奏シ其經驗說甚多シ。然^レ在^レ醫家或ハ是^レヲ用テ効ナク或ハ潰破ノ癌瘡ニハ却テ腐敗ヲ增長ノ害アリトシ是^レヲ詆誹スル者必^クカラズ。是^レ究竟癌腫ト腺腫トノ區別明白ナラザレバナリ。眞ノ癌腫ハ失鳩^{シキウダ}答及^ヒ莨菪等ニテ治スル^{コト}稀ナリ。唯癌ニ似タル腺ノ硬腫。瘰癧腫ニハ効驗アル^{コト}毫疑ナシ。患者甚^ク衰弱スレ^バ較著ノ酷厲毒鬱蓄セル候ナク其腺劇^ク熾衝ナキ者ハ是ヲ用テ殊効アリ。○酷厲ナル瘰癧毒ヨリ來ル腺ノ硬腫ハ此藥ヲ用テ治スル^{コト}古今明哲ノ經驗甚^クダ

多シ。傑^{ケツ}泄^セ兒^ル人^名云。一患者乳房ニ瘰癧毒ノ硬腫ヲ發シ宛^モ乳癌ノ如シ。諸醫多ク不治トス。此藥ヲ内服セシメテ其腫半^ク消散シ半^ク善膿ヲ釀ノ潰破シ治スト。其他瘰癧腫及其毒ヨリ發スル諸惡症或ハ乳癌ノ如キ症ヲ治シ或ハ幾^キ那^ナヲ加ヘ用テ効アル經驗說甚^クダ多シ。○頑固ノ腺腫。瘰癧腫ハ外敷藥ニテ愈ス^{コト}ナク唯此藥ヲ内服セシメテ消散シ或ハ潰破シ善膿ヲ生メ治スル者多シ。○或云。癌瘡様ノ潰瘍。臭氣近^クベカラズ劇痛。燒^カ如キ症ニ此藥ヲ内服外敷シ其酷厲稀涼ノ敗血漿ヲ和解メ善膿ト爲シ

治スルコトアリ。内服ニハ是ヲ越幾斯劑トシ用ルヲ
 良トス。小兒ハ沙糖ヲ加、舍利別トシ或ハ昆設爾弗
 ト爲シ用ベシ。○子宮口ノ硬結腫痛ノ漸、癌瘡ノ如
 ク臭穢ノ汚液流泄ノ惡性ノ白帶下トナル者ハ此
 越幾斯劑ヲ用テ全治スル者多シ。○瘰癧毒ニ因テ
 唇ニ癌様ノ腫ヲ發スル者多シ。其症。下唇ヨリハ上
 唇多ク腫起シ中間圻裂ノ疼痛シ其毒漸、眼ニ浸淫
 シ、焮痛ノ潰爛ス。便チ此越幾斯劑ニ越謨安沒尼亞
 幾ノ乳劑製法扁桃乳ト同シヲ加、用テ多ク治ス。是尋常失苟
 兒陪苦ノ毒ヨリ發スル症ト異ナリ。○癌様ノ硬結

セル腺腫ニ此藥ヲ外敷メ消散シ其痛ヲ甘解ス或
 ハ此草ヲ末トシ玫瑰蜜ヲ和シ癌様ノ硬腫潰瘍等
 ノ邊圍ニ塗テ劇痛ヲ解散ス或ハ頑固ノ乳房硬腫
 ニ此越幾斯劑ノ膏藥ノ如クシ貼メ消散スル者多
 シ。乳房ニ乳汁凝結メ發スル硬腫ハ殊ニヨク消散
 ス或ハ打撲傷。其他外傷ニ因テ硬腫トナリ疼アル
 者右ノ諸症何モ是ヲ貼メ發泡スルコト火傷ノ如キ
 者ハ其泡自乾マデ其膏ヲ貼レハ消散ス。若シ發泡
 セザル者ハ數是ヲ貼メ發泡セシメ乾シ愈スベシ
 ○内藏諸腺ノ壅塞硬腫ニ峻効アリ。ヨク其凝結ヲ

溶解シ壅滯ヲ疏散ス小兒ノ肝脾。腸間膜等ノ腺。壅塞ノ腹肚脹硬滿シ肢體羸瘦スル症ニ良驗アリ

○瘰癧毒ヨリ發スル勞效ニ間偉効アリ然レ病勢既ニ增長スル者ハ驗ナシ

○肝脾。腸間膜等ノ硬腫ニ此藥ヲ蒸湯劑トシ或ハ此越幾斯劑ヲ膏藥ノ如クシ貼メヨク消散ス

○或云。眞ノ癌腫ハ固ヨリ治スベカラズト雖モ古今ノ醫家此藥ノ治驗ヲ稱スルヲ甚ダ多シ或ハ癌ト腺腫ト相似テ混同スル故ニ癌様ノ腫ト雖モ未增長セズ甚ダ危險ニ至ラザル症ハ先此藥ヲ試用ベシ縱ハ良効ヲ得ズト雖モ

他ニ治スベキ藥ナケレバナリ。是ヲ用テ諸症逾増進スルキハ唯緩和鎮痛ノ劑ヲ投メ當時ノ患苦ヲ安撫シ劇症ヲ甘解シ其酷厲稀涼ノ液ヲ化熟ノ稠膿トナラシメ腐敗ヲ防護シ精力ヲ保續セシムベシト

○或云。醫家此藥ヲ用テ良驗ヲ得ザル所以ノ者數件アリ。是レハ眞ノ失機答ヲ鑒識セズノ誤テ其種類ヲ充用ルニ因リ。一ハ患者虛羸シ此毒藥ニ堪ズメ久服スルヲ能ハザルニ因リ一ハ病毒極テ猛惡ニメ藥力是ヲ剋制スルヲ能ハザルニ因ル。是猶水銀幾那。阿芙蓉等モ百發的當ノ効ヲ得難キガ

如シ。或ハ患者ノ稟賦異常ニメ峻攻ノ藥ト雖モ効
 ナキコアリ譬バ徽毒ニ水銀ヲ用テ寸効ナク又毫
 モ眩眩セザル者アルガ如シ○此藥ハ酷厲毒ノ各
 部ニ凝結ノ牢固頑滯スルヲ溶解シ疏散スルノ峻
 効アリ故ニ痛風傷冷毒痛經久治セズ腫痛甚ク諸
 藥効ナキ症ニ用テ捷効ヲ得ル者多シ或ハ頑固ノ
 臂痛諸藥効ナキ者初ニ此越幾斯劑少許ヲ用ヒ漸
 加テ日ニ半錢ニ至リ三週ニメ全治スル者アリ或
 ハ此越幾斯劑ヲ膏藥ノ如クシ腕股等ノ痛風ニ貼
 ノ消散スル者多シ○徽毒ニ因テ諸部疼痛荏苒ト

ノ解セズ或ハ徽毒經久ノ潰瘍瘰癧硬腫鼻中潰爛
 ノ骨ヲ腐蝕スル等。其他諸惡症。水銀劑升汞等ヲ多
 ク用テ効ナキ者ハ此越幾斯劑ヲ與テ大効ヲ得ル
 コ多シ。或ハ越幾斯劑効ナキ者ハ此葉ノ末一錢ヲ
 取テ蜜一弓ニ和シ用テ速ニ治スルコアリ其劇痛
 休マザル症ハ此越幾斯劑ニ阿芙蓉ヲ加用テ捷効
 アリ○此藥ハ凝結ヲ溶解シ蒸氣ヲ發泄シ疼痛ヲ
 止ル効アル故ニ徽毒ノ潰瘍ノミナラズ總テ經久
 惡厲ノ潰瘍腐骨疽等ニ内服外敷ノ間偉効アリ或
 ハ脚ノ癩瘡諸藥効ナキ者ニ是ヲ用テ速ニ治スル

アリ○惡厲ノ疥癬。頭瘡。經久ノ瘡瘍。頑固ノ皮膚病。尋常ノ藥劑ニテ治セザル者ハ是ヲ用テ驗多シ○經久ノ瘡瘍。一切頑固ノ皮膚病ニ左ノ方。殊効アリ

失鳩答膏

材ヲ失鳩答シキウタ末未二錢

白蜜ニ弓

右調和シ一卵匙宛服スル七日二次○痘瘡後其毒滯著ノ諸惡症ヲ發シ或ハ小兒尙儂或ハ頑固ノ黃疽。水腫。癩。久効。惡性ノ白帶下。黑障眼ノ初發。經久ノ陰痿等解凝ノ諸藥寸効ナキ症ニ左ノ越幾斯劑ヲ

用テ間奇効ヲ得ルアリ

失鳩答越幾斯劑

失鳩答シキウタ 生鮮者

エキスタラクト。ハン。ドルレケルフル蘭

右花候前ニ莖葉ヲ採リ搗爛シ布袋ニ内レ絞テ汁

ヲ取リ磁鍋ニ内レ火ニ上セ手ヲ住メズ攪セ煎熬

メ蜜ノ稠ト爲シ放冷シ此膏二十弓ニ失鳩答乾葉

ノ細末五弓ヲ攪和シ丸藥ト爲ベキ稠ト爲シ固封

シ貯フ按○或ハ乾葉ノ末ヲ加ズ絞汁ノニ煎熬メ

膏ト爲モ良大約絞汁六比ニテ此劑一比ヲ製ス淑

服量 此越幾斯劑八日一瓦ヲ用ヒ漸加テ一錢ニ至

遠西名物考 卷二十一 十三 雲堂藏

ル或ハ二日ヲ一丸トシ朝夕一丸宛茶湯ニテ送下
シ三日毎ニ一丸宛増加テ患者頭目困重昏暈惡心
等。瞑眩ノ症アルヲ度トシ服量ヲ減シ若ハ暫ク休
其症治ノ復用ベシ。此藥ハ瞑眩スル許ニ用テ諸器
血液ノ運動ヲ變化セシムルニ非レバ頑固ノ壅塞
ヲ溶解スルヲ能ハザレバナリ或云。日一錢或ハ一
錢半宛用テ瞑眩セザル者アリ或ハ日三錢宛一年
半用或ハ日一弓宛數月用テ少モ害ナキ者アリ又
一婦人病中此劑五十比許用テ少モ惡症ヲ發セザ
ル者アリト。是漸此劑ニ慣テ瞑眩セス又越幾斯劑

ハ煎熬ノ製スル故ニ苛烈ノ藥氣蒸散スレバナリ
○服量度ニ過ギ或ハ患者ノ資稟此毒ニ堪ヘズ或
ハ病性ニ的當セザレバ是ヲ用テ惡症ヲ發ス○丸
藥ヲ嫌フ者ハ此越幾斯劑ニ沙糖若ハ蜜ヲ加テ煉
膏トシ用ベシ○或ハ花候前ニ生草ヲ取リ火氣ニ
テ速ニ乾カシ太キ莖ヲ去リ末トシ硝子壘ニ内レ貯
用フ。服量越幾斯劑ト同シ。但越幾斯劑ニ比スレバ
藥力差峻ナリ或ハ乾葉一握ヲ取テ沸湯二十弓ニ
投シ泡湯トシ朝夕小茶碗ニ二碗宛用テ生草ハ尤
酷烈ナリ○或云。此草ノ花ヲ越幾斯劑トシ用テ利

水ノ峻効アリ。殊ニ肢節ノ水腫ニ良○或云。此越幾
 斯劑ノ性功大約。雙鸞菊越幾斯劑ノ如シト○外敷
 ノ腫瘍。堅硬腫ヲ消散シ潰瘍ヲ淨刷シ治ス。此草ノ
 濃キ泡湯ヲ蒸漏劑トシ或ハ此草ヲ煮テ琶布トシ
 貼シ或ハ越幾斯劑ヲ膏藥ノ如ク貼シ或ハ是ヲ石
 灰水ニ溶シ布ニ濕メ貼シ或ハ生草ノ絞汁ヲ取テ
 硬膏軟膏トシ貼シ或ハ生絞汁ニ蜜ヲ和シ煮テ稠
 膏トシ外敷シ。或ハ此草ト花ヲ採リ蒸餾ノ露水ヲ
 取り施ス等ナリ 度物叔依拔 叔布伍福

苘若 ベルラドシナ又アトラバベルラドシナ羅ドル
 マーケンデナクトシカーデ蘭○和名バシリトコロ

形状 此草。圓莖叢生シ高廿二三尺許。直立シ黯赤色
 粗糙。枝多シ。葉龍葵葉ニ似テ大ナルヲ三倍。柔ニノ
 汁多シ粗糙ニメ毛茸アリ短梗著ク。葉間數梗ヲ抽
 テ花生ス筒様五出。黯紫或ハ黄白色。萼五出。花後圓
 子ヲ結ブ大サ葡萄ノ如シ熟スレバ黑色ニメ光澤
 アリ。裏ニ汁アリ味甘ヲ帶ブ。數核アリ。根太ク長ク
 塊節様ニメ桮アリ淡白色或ハ黄色ヲ帶ブ。葉根子
 共ニ較著ノ氣味ナシ 或云。葉根共ニ臭氣是龍葵ノ
 アリ味微辛收斂ス

一種ナリ山林原野及ビ垣籬ノ陰地ニ生ス

性 葉根子共ニ大毒アリ少許服スレバ咽喉乾燥。舌

拘強煩悶シ。次テ眼昏眩運。睡眠ノ後大ニ蒸氣ヲ發
 泄ス。多ク服スレバ精神錯亂。發瘧。咽喉胃腸劇痛シ
 次テ皮膚及ヒ肺肝腸間膜等焮衝ノ内外壯熱。耐忍
 ビ難ク。大渴ノ嚥下スコ能ハス。食ヲ惡ク。肢體頑麻
 不遂昏睡搐搦ヲ發メ死ス。其屍速ニ腐壞シ肢體各
 部紫黑色。肌皮坼裂シ諸竅ヨリ敗血汚液漏泄ノ臭
 氣甚^クシ。或云此草四錢ヲ服スレバ死ス。此草ハ酷烈
 ナル麻痺毒ヲ含メリ根殊ニ甚シ。或云此子五六個
 ヲ服スレバ發狂シ口眼掣引メ大ニ笑ヒ。總身漸ク
 搐搦シ。發熱燭クカ如シ速ニ救療セザレバ十二時

中ニ死ス。○此毒ヲ解スルニハ酸味ノ液。醋。橙汁等
 ヲ多ク飲シムベシ。失^レ鳩^{キウ}答^タ解毒法ト同シ

主治葉ヲ藥用トス。或ハ根ヲ用フ。揮發鹽及油アリ

葉ハ内服ノ解凝緩和ノ藥トス。或ハ生葉ノ絞汁
 砂糖ヲ加ヘ舍利別トシ用テ鎮痛催睡ノ効ヲ稱シ
 外敷ノ焮腫ヲ消散ス。生葉ヲ貼メ止痛消散ノ効アリ
 リ。○癌樣ノ硬腫ニ内服外敷ノ焮痛等ノ惡症ヲ緩
 解ス。然^レモ眞ノ癌腫ハ効ナキ。失^レ鳩^{キウ}答^タノ如シ。○腺
 ノ硬腫。癰癤樣腫ニ試用ルニ少^クモ害ナク。毎ニ良驗
 ヲ奏ス。其腫。癌瘡トナラズ。ノ惡性ノ潰瘍トナル症

モ此根ヲ用レバ腐蝕セズ增長スルヲナシ總テ腺ノ腫瘍。瘰癧様ノ壅塞ヨリ發スル諸症ハ皆峻効アリ是ヲ用テ驗ナキハ此草ノ陳久脫性ノ者若ハ園生及ビ肥土ニ培養セル者ヲ用レバナリ然レ患者甚ダ薄弱ニノ病毒極テ惡厲ナルルハ此藥モ効ナク漸ク惡症ヲ發スベシ故ニ仔細ニ診察ノ是ヲ施ス。肝要ナリ○子宮口ノ硬腫ノ初發ニ用テヨク其腫ヲ消散ス。此症增長スレバ癌瘡様ノ白帶下トナリテ治シ難シ子宮ヨリ惡性ノ汚液漏泄ノ頑固ノ白帶下トナル者ハ此葉ノ末一味用ヒ或ハ水銀

劑ヲ加用テ治驗多シ一婦人子宮口ニ惡性ノ硬腫ヲ生シ交媾ヲ妨ルヲ數年。此葉ノ末ヲ用テ全治セリ○葉ヲ水煎ノ内服外敷シ或ハ乾葉ヲ末トシ少許ヲ取テ水ニ和シ服シ或ハ葉ヲ搗貼ス。腺ノ硬腫ヲ溶解シ惡性ノ潰瘍ヲ治ス○發狂及ビ神思鬱憂病ハ腹部諸藏ノ壅塞若ハ痔血。月經產後惡露等ノ閉滯及ビ瘡瘍ノ内攻ヨリ發スル者甚ダ多シ皆此藥ヲ用テ間大効アリ○鬱憂悲悶シ人ヲ避テ沈黙獨處ヲ好ム狂症ハ此藥多ク良効アリ。然レ狂躁暴亂大甚キ症ニ用レバ搐掣ヲ發スルヲアリ或云。此

子ノ絞汁ニ沙糖ヲ加ヘ舍利別トシ發在ニ用テ奇効ヲ得ルコトアリト○癩ヨリ發スル狂ハ此藥ヲ用テ治スル者多シ癩モ亦良驗アリ但此藥ニ慣ル片ハ再發スルコトアリ○瘧攣搗掣ノ諸症及ビ疝不遂モ亦治驗少カラズ或ハ疫效ニ間奇効ヲ得ルコトアリ○子宮水腫ヨリ發スル小便閉ニ甚ダ驗アリ○徽毒頑固ノ諸症ニ効多シ或ハ甘汞ヲ加用フ殊ニ其侵蝕スル潰瘍ヲ治ス○乾癬ニ尤効アリ大黃ヲ加用テ殊ニ良又總テ頑固惡厲ノ皮病ヲ治ス○黑障眼ニ効アルコト失鳩答ノ如シ

服量多ク越幾斯劑トシ用フ葉ノ末ニ比スレバ効差緩ナリ日一匁ヨリ四匁マデ用フ或ハ初ハ日半匁若ハ一匁ヲ用ヒ漸クテ瞑眩スルニ至ル○或ハ葉半匁ヨリ一匁マデ沸湯十考ニ浸スコト八分時濾テ其液ヲ取り毎朝二匙宛服ス○服量少許與ルニハ根末良トス葉ニ比スレバ其効差峻ナリ○漸ク服量ヲ加テ患者咽喉乾燥頭眩暈眼花閃發スルヲ覺ルハ藥力充足ノ良効アル徵トス是ヨリ服量ヲ増コト勿レ但其症甚キ者ハ服量ヲ減シ或ハ暫休テ温乳汁ヲ與ベシ若シ服量ヲ加用レ右ノ諸症

ヲ發セザルハ此藥ノ性カ脫セル者ヲ用ルカ或ハ
 服量仍足ザル候トス。故ニ其新鮮ノ草ヲ採_リ用ヒ或
 ハ其三分一ノ量ヲ増_レ與_レベシ。○或ハ生草ノ絞汁ヲ
 煎熬ノ蜜ノ稠ト爲シ或ハ此草ヲ蒸餾ノ露水ヲ取
 一匙宛用フ或云根二錢マデ用テ瞑眩セザル者ア
 リ此葉ノ末ヲ醋ニ加ヘ服スレバ吐劑トナル。○近
 來。犬咬傷。其他諸獸咬傷ニ此根ヲ經驗ノ奇効ヲ奏
 ス。是ヲ用_レバ其症增長セス狂躁等ノ惡症ヲ發セ
 スノ治ス。又宜ク的當ノ外治法ヲ兼_テ施スベシ。是ヲ
 用テ眼眩甚キ者ハ三四日モ此藥ヲ休_テ復_テ用ヒ斯

ノ如クノ數週用_レベシ。此病既ニ發狂シ飲液ヲ服シ
 難キ等ノ症ヲ發スル者ハ差_シ其服量ヲ増シ數日服
 セシムベシ。發汗利尿吐涎等ニ因テ速ニ其毒ヲ排
 泄シ治ス。此根ヲ細末トシ野生者ノ宿根ヲ採リ陰乾ス四歲以下
 ノ兒ハ二晝夜ニ一匁ヨリ三匁マデ用フ。四歲ヨリ
 六歲マデノ兒ハ五匁マデ用フ。大人ハ五匁ヨリ十
 五匁マデ大黃ヲ加用ヒ或ハ阿芙蓉麝香ヲ加_テ良
 効アリ。或ハ初半匁ヨリ一匁マデ用ヒ漸_ク加_テ患者
 咽喉乾燥。眼花閃發スルヲ度トシ其量ヲ増_ス勿_レ
 或云大人ハ五匁ヨリ十六匁マデ一服トシ二晝夜

過テ復其量ヲ用ベシ。其後咽喉大ニ乾燥スルハ服
量過度ノ候ト不動モスレバ是ニ次テ精神錯亂眼
昏等ヲ發スルアリ若シ此症ヲ發セバ吐劑ヲ用
ヒ。吐ヲ發セバ水若ハ乳汁ヲ多ク冷飲セシムレバ
速ニ治ス○荏苒タル間歇熱ハ左ノ方偉効アリ

〔莨菪散〕

莨菪葉 末 八匁

沙糖

右調和シ分テ四服トシ間日ニ朝夕一服宛飲液ニ
テ送下ス○左ノ方亦良

龍麝莨菪散

莨菪葉 末 十六匁

麝香

龍腦 各四十匁

沙糖 四匁

右調和シ分テ八服トシ一服宛用テ日ニ三次○總テ
莨菪ヲ用ルハ大便ヨク通スルヲ肝要トス故ニ右
ノ散劑ヲ用間ハ時々大黃或旃那等ノ末ヲ用ベシ

莨菪越幾斯劑 製法失鳩答越幾斯劑ト同シ

叔叔 伍伍 技依

福布

遠西各物考
卷之二十一
十九
風雲堂藏

蒸餾醋

アセラム、デイス、テイル、テラム、羅、アセイニ
フシタル又、オフル、ゲハイル、デアセイ、シ、蘭

○按ニ西洋ニ於テハ通例葡萄酒ヲ以テ醋ヲ造
ル但、葡萄酒ヲ産セザル國ニテハ穀類ヲ以テ造釀
シ日用飲膳及ビ藥劑ニ供スト云然ハ米醋亦藥
用ニ供スベシ

製法

醋 適宜

木炭 極細末
醋ノ十六分一

右攪和シ硝子若ハ磁製列篤兒多ニ内レ兜及ビ承
餾壘ヲ接合シ沙火ニテ慢緩ニ蒸餾シ
或云、重湯ニ
テ蒸餾スレ
ハ焦著 初ニ出ル淡薄ノ液ヲ除キ
蒸餾ノ初ニ出ル
セズ

淡薄ノ液ハ此ヲ除クト但、醋ニ強弱アレバ
其氣味ヲ試テ是ヲ除クニ多少アルベシ 承餾壘

ヲ換ヘ火ヲ増シ蒸餾ノ焦臭生スレバ速ニ火ヲ下

シ蒸餾醋ヲ取り硝子壘ニ收メ固封シ貯フ 此醋ヲ
再ビ蒸

餾スレバ氣味淡薄トナリ格
兒弗ニ殘ル醋ハ醇厚ナリ

試法 蒸餾醋ニ醃蓬鹽晶ノ末八分一ノ量ヲ加テ其

沸騰止ニ少モ滾動セザルハ上好適宜ノ醋トス 云

右ノ如ク醃蓬鹽晶ヲ加ヘ少モ滾動セザルニ至テ

放冷シ透明ノ芒ヲ結ブハ其醋上好適宜ノ候ナリ

ト依云、蒸餾醋ニ多ニ剥篤亞斯一錢ヲ加ヘテ沸騰
止ニ少モ滾動セザルハ其醋尤モ悍烈ノ候ナリト

醃蓬鹽晶ヲ加ル一錢ニ至ラズメ沸騰止ム者ハ
其醋薄弱ノ候トス。是ヲ加ル一錢ニ至レテ沸騰

仍止ザルハ其醋過大タ悍烈ナル候トス。故ニ其薄弱ナル者ハ醇精醋出次ニヲ加テ悍クシ。悍烈ニ過ル者ハ初餾ノ淡薄ナル液ヲ加ヘ若モハ水ヲ加ヘ復メ前法ノ如ク鹽晶ヲ加ヘ試テ適宜ノ度トナルニ至リ硝子壘ノ口マデ滿シメ固封シ貯フ。

醇精醋

アゼラム。ラヂカール。羅アゼイン。シウル。又
 ホーグストフルステルケンデアセイニ蘭
 是醋ノ極テ悍烈ナル者ノ義

製法

蒸餾醋 各適宜
 鰾蓬鹽晶 亞斯ニ作ル
 精製剥鰾

右鹽晶ヲ取リ少許宛醋ニ加テ少モ滾動セザルニ

至リ磁壺ニ入レ文火ニ上セ煎熬ノ乾固ノ鹽ト爲シ是ヲ列レ篤ト兒ル多ニ内テ半ニ充シメ。再餾綠礬油石膽ノ條ヲ取テ徐々ニ是ニ滴シテ右ノ鰾蓬鹽量ノ半ヲ加ルニ至リ。潤大ナル硝子ノ承餾壘ヲ其列レ篤ト兒ル多ニ接合シ。其合際ヲ塗封メ沙火ニ内レ。初メ文火トシ漸ク火ヲ加テ武火ト爲シ蒸餾ノ終ニ霧ノ如キ蒸氣承餾壘ニ透見セズ且列レ篤ト兒ル多ノ頸ニ少モ蒸露ヲ見ハス。ナキニ至テ火ヲ下シ承餾壘ヲ放テ其醋ヲ取リ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ。是醋ノ極テ悍烈ナル者ナリ。○其列レ篤ト兒ル多ニ殘リタル渣塊ヲ取

遠西名物考 卷二十六 三十一 風雲堂藏

水ニ溶シ是ニ剥篤亞斯ノ末ヲ加テ冷モ沸騰セザ
ルニ至リ紙ニテ濾テ其液ヲ取り文火ニ上セ煮テ
上面ニ膜ヲ生スルニ至リ放冷メ芒ヲ結バシム。是
即孕礬酒石ナリ按是酒石ノ條ニ舉ル孕礬酒石ト
同シ依云醋ハ酒石酸性鹽燒酒
水ヲ合和ノ成ル即チ酒石一北燒酒再餾者一北半
沸湯十六北右酒石ヲ湯ニ溶化シ放冷ノ燒酒ヲ和
シ硝子壘ニ内紙ニテ其口ヲ蓋ヒ上ニ小孔ヲ穿テ
處ニ置テ化釀セシムレバ醋トナルヲ以テ知レベシ
性醋ノ性ハ酒ト相反ス酒ヲ蒸餾スレバ初ニ銳烈
ノ精液燒酒出テ後ニ淡水出ツ。醋ヲ蒸餾スレバ初ニ
淡水出テ後ニ銳烈ノ醋出ツ。燒酒ニ火ヲ點スレバ
燄ヲ發ス。醋ニ火ヲ點スレバ撲滅ス。酒ハ血ノ運行

ヲ増盛シ熱ヲ生シ人ヲノ醉眠セシム。醋ハ血ノ強
盛ナル運行ヲ靜止シ清涼ニシ酩酊ヲ解ス。燒酒ヲ
血中ノ名イ刺絡ノ出ル液ニ加レバ忽チ凝固ス。是ニ
蒸餾醋ヲ加レハ速ニ溶解スル等ヲ以テ知ルベシ
主治清涼滋潤シ津ヲ生シ渴ヲ止メ汗ヲ發シ凝血
ヲ稀釋シ腐敗ヲ遏メ精神ヲ爽快ニシ燥熱ヲ解スル
良藥トス○蒸餾醋ハ尋常ノ醋ニ比スレバ氣味緩
和ナレ其質精微ニシヨク竄透シ味好クノ服シ
易ク諸飲劑ニ加ヘ用ルニ宜シ○醋ニ水ヲ加テ稀
クシ或ハ沙糖ヲ加ヘ甘美トシ諸熱病ノ飲料トシ

遠西名物考 卷二十六 風雲堂藏

渴ヲ止メ燥ヲ潤シ熱ヲ解ス○虚憊ニ屬スル諸疫熱腐敗熱。惡性熱ヲ治ス○厥衝病ノ膽液過多及腐敗ヲ帶ル症ニ尤良。但尋常壯實多血ノ厥衝病ハ初發ニ發汗ノ害アリ故ニ初發ハ是ヲ斟酌スベシ○清涼ノ血液腐敗ヲ遏ルニ峻効アリ故ニ膽液熱腐敗ノ發熱病ニ尤驗アリ○醋ニ蜜ヲ加テ屋施蔑兒前ニトノ熱ニ尤驗アリ○醋ニ蜜ヲ加テ屋施蔑兒前ニト病ノ熱ニ尤驗アリ○醋ニ蜜ヲ加テ屋施蔑兒前ニト爲シ膽液熱ニ多ク用フ○膽液熱及膽液腐敗ノ酷厲ナルヨリ發スル腹痛下利ニ左ノ方尤驗アリ

雙酸清涼飲

蒸餾醋 二勺

密涅刺爾鎮痛液 二勺

酒石鹽 一錢

舍利別 四錢

沸湯 四勺

右調和シ半時ニ一匙宛用フ○發斑熱及ヒ冒寒傷冷毒ノ諸症ニ醋ヲ用テ汗ヲ發シ熱ヲ解シ腐敗ヲ防テ良効アリ。殊ニ龍腦ヲ加テ發汗防腐ノ功尤峻ナリ。腐敗熱ニハ胃腸ヲ淨刷ノ後是ヲ用フベシ。又右ノ諸病ニ於テ專ラ蒸氣及ヒ汗ヲ發スベキ症ハ左

ノ方良効アリ

香竄醋

アゼ左ムアシチセベチモム羅
スベセレイアゼイン蘭

菖蒲根

白芷 各六錢

亞爾鮮 二弓半

撒爾非亞 三弓半

芸香葉 二弓

府利 二錢

蒸餾醋 八北

右硝子壘ニ内紙ニテ其口ヲ固封シ慢火上ニ置テ

浸ス_レ二日。絞テ其液ヲ取り紙ニテ瀝シ左ノ藥液
ヲ加フ

羯布羅丁幾去爾 四錢

右合和シ固封シ貯フ_後又此劑傳染疫毒ヲ驅散シ
腐敗ヲ防ク効アル故ニ傳染病流行ノ時。毎日數一
匙宛内服シ或ハ鼻孔ニ塗リ或ハ是ヲ温メ蒸氣ヲ
居室ニ薰スレバ其病ニ傳染スル_レ無シ○發斑熱。
惡性熱。冒寒傷冷毒等ノ蒸氣及ビ汗ヲ發スベキ症
ハ左ノ方亦良効アリ

香醋飲

遠西作物考 卷二 二六 三十四

香竄醋

前ニ出

接骨木花

傑列

密涅刺爾鎮痛飲

一錢半

沸湯

一匕

右調勻シ半時ニ二匙若ハ三匙宛服ス
○傳染腐敗熱。惡性熱ハ醋ヲ一匙宛飲液ニ加用テ精神ヲ清爽シ汗ヲ發メ病毒ヲ排泄シ血液ノ腐敗ヲ防護ス凡熱病ノ患者虛罷メ煩渴シ津液燥涸スル症ハ醋一匙ヨリ二勺マデ一服トシ用テ良
○痘瘡麻疹ノ腐敗ヲ帶ル症及狂犬蝮蛇等ノ咬傷ニ醋ヲ用テ峻

効アリ或ハ的里亞加ニ加ヘ内服メ解毒ノ効ヲ稱ス
○腐敗熱。痘瘡等ノ血液腐壞焯崩ノ酷厲トナリ血脉ヲ穿蝕メ下血吐血衄血尿血ヲ發スルニ用テ腐敗ヲ遏メ血液ヲ收斂メ其症ヲ治ス
○血液運行怠慢ニメ腐敗セルヨリ發スル失苟兒陪苦ヲ治ス航海ノ徒ノ如キ身體ヲ運動セズメ此症ヲ發スル者多シ
○醋ハ氣味竄透シ清涼收斂スルヲ以テ鎮痙ノ良効アリ。蒸餾醋ニ舍利別ト密涅刺爾鎮痛液少許ヲ攪和シ用テ諸痙攣ノ症。及上衝頭痛不寐或ハ神思鬱憂病。狂癩ニ良驗ヲ奏シ又爽涼降鎮ノ効アルヲ以テ阿芙蓉劑ノ用ヒ

難キ諸症ニ尤モ効アリ○醋橙汁及醋ノ製劑ハ皆過酒ノ沈酔スルヲ解ス。醋ニ水ヲ加テ服シ或ハ鼻孔ニ塗テ良又阿芙蓉毒ノ瞑眩ニ内服ノ速効アリ其他亞兒加利性ノ辛熱酷厲ニノ麻痺昏睡發狂セシムル諸藥即チ雙鸞菊失鳩答巔茄菘菔等及甲介類ノ毒ヲ解ス。但中毒ノ甚キ者ハ初ニ先ツ吐劑ヲ與ヘ快吐セシメテ後醋劑ヲ用ベシ。又烟氣ニ咽テ呼吸窒塞スルニ即効アリ○醋ハ凝血ヲ溶解スト雖モ乳汁及ビ脂油質ノ液ニ加レバ忽チ凝固ス故ニ乳汁ヲ服スル人或ハ乳養ノ兒ニ是ヲ與フレバ乳

汁。胃中ニ凝固ノ消化セズ停滯ノ酸敗液トナリ病患ヲ發ス○醋ハ鼻血ヲ止メテ頭痛ヲ除ク

外敷頭眩暈或ハ昏冒卒倒等ハ患者ニ醋ヲ嗅シ

メ或ハ鼻孔ニ塗リ或ハ面ニ噴テ醒解ス。是ニ用ル

ニハ悍キ醋ヲ良トス。ヨク竄透スレバナリ。醋ニ銅

精ノ末少許宛加テ少モ沸騰セザルニ至リ磁製ノ

格兒弗ニテ蒸餾スレバ其醋甚ク悍烈ナリ是ヲ硝

子壘ニ收メ固封シ貯テ聽用スベシ。是諸金ヲ腐蝕

スルニ用フ○劇キ頭痛ハ醋ヲ温メテ嗅シメ或

ハ醋ニ水ヲ加ヘ消石ハ硝砂各少許ヲ研和シ布片

本草綱目卷之三十六
二十六
鹿茸堂藏

ニ蘸^{ヒタ}メ貼シ或ハ頭^ニテ捷効アリ○醋ハ竄透刺戟ノ脉管ヲ收斂シ止血ノ効アリ。是ヲ^経浸シ深ク鼻孔ニ挿^{サシ}テ衄血ヲ止ム。是ヲ布片ニ蘸^{ヒタ}シ頭ヲ縛スルモ良○醋ニ水ヲ加ヘ温メ含漱メ斷頸等ノ出血ヲ止ム。外傷ノ輕キ出血モ是ヲ貼メ効アリ○婦人崩漏。孕婦及^ヒ産後ノ崩血ハ醋ニ水ヲ加ヘ稀^{ウス}クシ温メ水銃ヲ以テ子宮ニ注輸メ治ス或ハ産後子宮收縮セズメ崩血止ザル症ハ冷醋ヲ布片ニ蘸^{ヒタ}シ腹部ニ貼メ効アリ○醋ハ凝血ヲ溶解ス。故ニ打撲傷ニテ血絡破裂シ其血皮中ニ泛濫ノ青斑ヲ發スル

者。及^ヒ諸焮腫ヲ消散シ痛ヲ止ム。醋ニ水ヲ加^テ稀^{ウス}クシ温メテ布片ニ蘸^{ヒタ}メ數換貼ス或ハ燒酒或ハ消石硃砂各少許ヲ加^テ研和シ施スモ良○金創ヲ洗フニハ醋ニ多ク温湯ヲ加フベシ否ラザレバ大ニ刺戟ノ焮熱ヲ發ス○醋ハ骨ヲ軟ニシ硬骨ヲノ軟骨ノ如クナラシム。故ニ骨傷ニ久ク是ヲ外敷スレバ骨ノ堅剛ノ質ヲ失ヒ回復セザラシム。又尙僂病アル小兒ニ酸味ノ飲食ヲ與フレバ諸骨逾軟弱ニ^テ其病增長ス但^シ胼胝様ノ硬腫ハ是ヲ外敷メヨク軟化シ消散ス^{骨ハ土質ヲ以テ成ル酸物ハ土質ヲ溶化メ故ニヨク骨ヲ軟化ス魚骨等}

酢ハ醃醋ニ淹セバ軟ルヲ以テ知ルベシ是ニ反ノ燒酒ハ纖維ヲ硬固シ軟肉ヲノ肝胝様ノ硬肉トナラム○醋ニ苦味收瀋ノ藥品ヲ加テ外敷スレバ殊ニヨク腐敗ヲ遏ム幾那ノ末ヲ加レバ其効尤峻ナリ。諸潰瘍ノ腐壞ヲ遏ルニ用フ或云夏月肉類ヲ醋ニルヲ以テ防腐ノ効アルヲ知ルベシト○真珠。蜷。蚌。石。珊瑚。蠟。殼。卵。殼。等ヲ醃醋ニ淹セバ軟化ス○疫熱流行ノ時石ヲ燒テ醋ヲ撒ケ其蒸氣ニテ居室ヲ薰シ傳染惡氣ヲ驅逐スルノ効ヲ稱ス叔淑布揭 依福伍技

遠西醫方名物考卷二十六終

