

遠西醫方名物考

世此
世此

卷二十八

✕
e 15

F 20
工-16

499, 2
 E n-3
 28
 No. 1453
 R e 15



第26

富士川文庫
 3295

榛齋宇田川先生著

十篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌

遠西醫方名物考標目

卷二十八

比百合油

氷糖

毛沒藥

沒藥丁幾去爾

沒藥越幾斯劑

沒藥油


木炭

赫篤立沃利末爾扶斯撒兒末爾扶

沒藥糖 未爾扶斯沒藥丸

雜腹蘭沒藥飲

沒藥越仙扶亞



世消石

精製消石

挑舎涼解飲
瑰麥潤涼飲
未爾快斯消石散
鎮痛清涼飲
爽神涼血飲

霸王鹽

固性消石

消石液

消石錠

消石精

發烟消石精

蒸餾器圖四種

斯的爾苦笈篤兒

暹羅多倫赫篤乘沃刺黠謨
過兒加奴謨需百利加黠謨

甘消石精

杜松驅水飲



比

遠西醫方名物考卷二十八

捺齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

百合油

オレウムレリヲリュム

製法

百合花瓣ヲ取製ス其法加密列煎油ト同

主治

外敷メ温煖ニシ凝結ノ解キ堅硬ヲ軟ケ疼ヲ

止メ

胸病ヲ治ス

冰絲糖「ボルストソイクル」和胸糖「ゲダナイデソイク

ル」捨糖「アルヘニ」氷絲糖

火

製法 白沙糖ヲ水ニ溶シ雞子白ヲ加、煮テ泡沫ヲ去、放冷メ凝結セシム。○一種大麥煮汁ニ沙糖ヲ加煎煉、凝結セシムル者アリ。是ヲニゲルスト、ソイクルト名ク、麥糖ノ義ナリ

主治 急迫ヲ緩メ疼痛ヲ祛キ、胸中ノ酷厲液ヲ甘和シ粘痰ヲ稀豁ノ吐易カラシメ、欬嗽、咽痛、口中乾燥、聲啞ヲ治ス。○沙糖ハ石鹼ノ質アリテ纖維諸管ノ強硬ニノ拘急セルヲ緩弛シ酷厲毒ノ刺戟ヲ甘解ス。故ニ乾欬及冒寒ノ諸症ヲ治ス。○沙糖一弓半ニ阿利襪油半錢ヲ研和シ用テ欬嗽ニ殊効アリ。石長生、舍利別モ亦良。○沙糖、赤石脂、酒石英、各等分極細

毛

沒藥 メイルラ メイルレ 蘭

末トシ角膜ノ星翳及肉翳ニ點メヨク消散ス。○沙糖ヲ鼻中ニ吸引ノ嚏藥トス。或ハ吉利詞、參兒トシ肛門ニ注入メ大便ヲ導通ス。或ハ沙糖ノ末ヲ潰瘍ニ摻ケ水棉様ノ壞肉ヲ除キ淨掃ス。伍 過 依 叔

沒藥ハ阨日多黑地兀皮亞共 三 亞 弗 利 亞 刺 比 亞 細 亞

亞州等ニ産スル一種ノ樹ヲ鑽刻メ採ル。越謨華爾國名 等 ニ 産 ス ル 一 種 ノ 樹 ヲ 鑽 刻 メ 採 ル 越 謨 華 爾

斯ナリ依 云 大 約 越 謨 七 錢 其 樹 ハ 三 モ サ ノ 一 種 ニ

ノ棘刺アル小木ナリ樹 類 ノ 總 稱 ナ リ 西 紅 海 ノ

本草綱目卷之八

○按ニ藥舗ニ煉没藥ト呼者是ナリ。花没藥ト云ハ紫鉗ナリ混スベカラズ○此物多クハ楮黒色ニノ香氣微ク。苦味ナク土石木屑等ヲ雜ル故ニ其中ニ就テ明淨透亮ニノ香氣強ク味苦辛ノ者ヲ擇ニ藥用ニ供スベシ

主治 温煖衝動ノ衰弱ヲ強壯ニシ。又解疑。稀釋。開達。防腐。止痛ノ殊効ヲ稱ス○凡疑體諸器ノ運營機轉。衰弱怠慢ニノ諸液粘稠ナルヨリ發スル諸病ニ的當ス○鑽透衝動ノ細絡織管ヲ開達シ諸液ノ分利排泄ヲ進メ殊ニ腹部諸器ノ分利排泄ヲ扶ク○諸

管ノ運營^{ハタラキ}乏弱怠慢ニノ粘液壅滯スル諸病及内臈^{ハタラキ}虚弱ニノ壞液鬱滯ノ疴ヲ治ス故如此勞瘵ニ用テ多ク驗アリ○微發汗シ胃ヲ健運シ蛇蟲ヲ殺ス○内臈壅塞硬腫。依剝^{イボ}昆垓^{コンゲル}兒。脾病。萎黃病。喘急。咳嗽ヲ治ス○患者強實ニノ壯熱^{ハタラキ}衝^{ハタラキ}ヲ兼ル症ニハ大ニ害アリ。熱症ハ先其熱ヲ解メ後用ベシ○肺病ノ一良藥トス。肺ニ粘痰壅滯スル症ハ左ノ方良驗アリ

没藥糖

没藥越幾斯劑^{後ニ出ツ}沙糖^一 麻屈涅失亞^{過爾拔}

右研和シ一卵匙宛用_レ一日四五次_ド一方_ニ沒藥越幾斯_ス劑四錢_ニ沙糖二弓ヲ研和ス一方_ニ沒藥越幾斯_ス劑四錢_ニ乳糖二弓ヲ研和シ尤_モ良トス○患者粘液質ニノ粘痰多キ勞欬ニ沒藥良効アリ。是肺ノ虛衰弛緩セルヲ衝動ノ強壯スレバナリ。但_レ嗽衝ノ候アル者ハ害アリ○粘液質ノ勞欬ハ亞兒加利鹽及鐵劑ヲ加用_レテ効多シ。後方ノ如シ又經久下利白帶下_ニ甚驗アリ

末爾扶斯沒藥飲

沒藥 上好者 錢

苗香水 七弓

驅風精 二錢

酒石鹽 半錢

右研和シヨク溶化セシメテ左ノ藥ヲ加_フ及_テ嗽衝去爾六錢ヲ加_テ尤_モ効アリ○肺瘍ノ膿ヲ成ス症ハ沒藥効多シ。肺中硬結セル膿腫アリテ嗽衝ノ候大キハ硫黃ヲ加_用テ殊_ニ的當ス左ノ方良驗アリ

珊黃沒藥丸

沒藥 上好者 二錢半

硫黃華 淘洗者

珊篤里越幾斯劑

各二錢

右三弓ヲ一丸トシ蝟蛄石ノ末ヲ衣トス一時ニ三

丸宛服ス○總テ内部ノ膿瘍ニ良効アリ赤痢治メ
後腸ニ膿ヲ成シ尋常ノ藥劑ニテ治セザル症ハ左
ノ劑殊効アリ

蘭苔沒藥飲

依蘭苔 四錢 加密列 三錢

右石灰水半比ヲ以テ煮テ濾過シ三多ヲ取リ左ノ
藥ヲ加フ

沒藥越幾斯劑 一錢半 實亞格日温 三錢

右溶化シ一匙宛用リ日四次○體稟薄弱ニノ感動
シ易キ婦人ノ子宮衝逆ニ沒藥良驗多シ又敗液痰

血ヲ子宮ヨリ驅泄シ催生シ胞衣ヲ下ス○諸管纖
維ノ弛弱ニノ血中粘液多キヨリ發スル經閉ヲ通
ス白帶下ヲ兼ル症ハ殊ニ驗アリ子宮衝逆ヲ兼ル
經閉ニハ阿芙蓉ヲ加テ尤良○寒粘液質ノ經閉ニ
ハ沒藥丁幾去爾殊効アリ或ハ通經ノ藥ヲ加用モ
良假令ハ左ノ方ノ如シ

雜腹蘭沒藥飲

沒藥丁幾去爾 一多 雜腹蘭丁幾去爾

藜蘆丁幾去爾 各四錢 製法健質亞那丁幾去爾ト同シ

右調勻シ三十滴若ハ其餘葡萄酒或ハ啤埵ニ點服

スル_レ日三四次○没藥ノ華爾斯質ハ衝動ノ壅滯
 ヲ驅泄シ凝結ヲ疏解ノ經閉ヲ通ス然_レ水ニハ溶
 化シ難クノ其性能盡ク出ル_レ能ハズ故ニ_レ丁幾去
 爾_レトシ殊ニ効アリ但_レ水様ノ飲劑トシ用_レント欲セ
 バ亞兒加利性ノ藥ヲ加フベシ華爾斯質盡ク溶化
 ノ餘カヲ残ス_レナシ即チ左ノ方ノ如ク製スベシ

酒石没藥飲

没藥 芸香葉 各一弓
 酒石液 四錢

右没藥芸香ヲ搗碎キ酒石液ヲ加テ泥ト爲シ水一
 比ヲ加ヘ浸ス_レ三時ニ_レノ文火ニ上セ煮_レ四分時
 コハシトキ

瀝_レテハ弓ノ液ト爲シ一匙若ハ其餘患症ノ輕重ニ
 隨ヒ加減シ用_レ日三次○纖維諸管弛弱縱緩ナル
 ヲリ水腫ヲ發シ或ハ寒粘液質ノ人水腫ヲ兼ル症
 ハ没藥ヲ用_レテ温壯利水ノ良効ヲ奏ス但_レ其病増劇
 ノ内熱ヲ發シ焮衝ニ傾ク者ハ斯ノ如キ熱性衝動
 ノ藥ハ害アリ○粗工妄ニ胞衣ヲ牽離スニ因テ子
 宮ノ裏面毀傷シ潰爛ノ敗膿汚液子宮ヨリ流泄ス
 ル症ハ此藥ヲ内服外用メ殊効アリ

服量 十氏ヨリ半錢マデ一次ニ用_レフ丸藥ハ三氏ヲ
 一丸トシ四丸宛用_レ日ニ四次

○外敷ニ多ク用フ。愈創ノ拔爾撒謨膏藥類ハ多ク
 沒藥ヲ加テ製造ス。○拔爾撒謨ノ愈創ノ性功ア
 ルヲ以テ臭穢腐爛ノ創傷潰瘍ニ此末ヲ摻シ若ハ
 丁幾去爾トシ施メ腐爛ヲ淨刷シ侵蝕ヲ遏止シ良
 肉ヲ生ス又瘀血ヲ散シ打撲傷ヲ愈シ寒腫ヲ消シ
 壞疽腐骨疽ニ内服外敷メ尤良。○寒壞疽ノ生肉ト
 死肉トノ間ニ此末ヲ摻シ或ハ腐骨ノ部ニ摻シ或
 ハ此丁幾去爾ヲ搗撒絲ニ塗リ貼メ腐壞ヲ除キ治
 ス。○斷及ビ咽喉ノ腐爛ニ甚ダ驗アル藥トス。斷ノ
 腐爛ニ沒藥ヲ嚼云含シ或ハ失苟兒陪苦ノ毒ヨリ

來ル症ハ此末ニ明礬。玫瑰蜜。海鹽精ヲ加テ患處ニ
 塗リ或ハ總テ口中若ハ咽喉腐爛メ漱衝ナキ症ハ
 右ノ劑ヲ幾那煎或ハ擗皮煎ニ溶化シ漱藥トシ捷
 効アリ但微毒ノ咽喉腐爛ハ水銀劑ヲ内服セシメ。
 升汞ヲ漱藥ニ加ヘ施メ治スベシ。
 沒藥ラインキ去爾タル テインキヲラメイルラ 羅
 沒藥上好者細搗一弓燒酒二十度者八弓
 右硝子壘ニ内固封シ置テ六日。其間時々振蕩シ布
 片ニテ濾シ滓ヲ去リ又紙ニテ濾シ硝子壘ニ收メ固
 封シ貯後 ○或云。酒石液若ハ消石液ヲ此劑ニ加製

スレバ没藥ヨク融解ノ其色及藥氣出。其法没藥ノ末ヲ酒石液ニテ濕シ煖處ニ置テ溶化スルニ至。乾シ硝子壘ニ内燒酒ヲ加前法ノ如ク製スルナリ

主治 内藏壅塞ヲ開達シ粘液ヲ解小便ヲ利シ疼痛ヲ止腐壞ヲ除ク○衰弱虛羸ノ病ニ用テ精神ヲ爽快ニ胃ヲ健運シ風氣ヲ驅散ス○諸管纖維ノ弛弱怠慢ニメ粘液壅滯セル諸病ニ用ヒ衝動健運ノ微汗ヲ發シ諸器ノ虛衰ヲ回復ス○卒倒昏睡。非依利昆垓兒。脾病。粘液腫。及壞液諸病ヲ治シ殊ニ經閉ニ効アリ。又白帶下。子宮ノ諸症ヲ治ス○此劑ハ總テ

寒性ノ病ニ効アリ。熱性ノ患者及炊衝ノ候アル者

ハ害アリ○服量六滴ヨリ十五滴マテ飲液ニ點服

ス○外敷メ汚穢ノ潰瘍。創傷及鼻口舌斷咽喉等ノ

臭穢潰爛ヲ淨刷シ治ス○凡患部弛弱虛衰メ排膿

内托ノ勢力ナク荏苒トメ愈サル潰瘍及打撲傷。腐

骨疽。寒壞疽ヲ治ス。寒壞疽様ノ咽喉腐爛ニ漱藥ト

シ効アリ熱壞疽ハ初發ニ患處ヲ刺テ惡血ヲ瀉シ

此劑ニ羯布羅精少許ヲ加施メ良○右ノ亞兒加利

液酒石液或ハ消石液ヲ加ハ製スルヲ云ヲ加ハ製スル劑ハ殊ニ衝動

ノ効多キヲ以テ腐肉多キ潰瘍ヲ淨刷スルニ良

沒藥越幾斯劑

エキスタラクト、メイラ、アキ、ウトリゲ、ゴム、エキスタ、メイラ、ハシ、水身ニ北

製法

沒藥

上好者極細末

水身ニ北

右硝子壘ニ内レ固封シ煖處ニ置、三日。故冷メ其

逆ヲ去リ紙ニテ濾シ其液ヲ慢火ニ止セ水氣ヲ熬

乾メ錠ト爲シ貯メ其溶化セザル渣逆ハ華爾斯質

ナル故ニ下幾去爾ト爲シ用、ベシ

主治 沒藥ト同シ。唯熱性衝動ノ華爾斯質ヲ脱スル

故ニ稍熱性ノ人ニ用テ害ナシ丸藥及煉膏トシ

頓ニ一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

耗シ且華爾斯ヲ脱スル故ニ其効緩弱ナリ。因テ枝
木ノ局方ニハ此劑ヲ収録セズ

沒藥油

オレウム、メイラ、ヘル、テリギ、イウム

製法

煮タル雞卵ヲ縱ニ割リ其黄ヲ去リ沒藥末

ヲ填充シ其白ヲ接合シ絲ニテ縛定シ。害等ノ濕處

ニ懸テ其下ニ鉢ヲ置、ハ沒藥融解メ透亮赤色ノ油

樣液トナリ淋漓ス。是ヲ取リ硝子壘ニ内固封シ貯

又法

沒藥末一北ニ煮タル雞子白ノ搗碎者ニ北

ヲ拌セ温湯少許ヲ濕メ布袋ニ内濕處ニ懸テ其液

ヲ取、下前法ノ如クス。○此藥變敗シ易シ。此液一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

ニ銳烈ノ燒酒一錢ヲ和シ貯レバ腐敗セズ久ク貯
テハシニ益也。傳代湯ハ神效ニ内傷臭ニ類マ其效

主治 技爾撒謨樣ノ揮發油ヲ含創傷。潰瘍等ニ外敷

ノ膿ヲ排ヒ疼ヲ止メ侵蝕腐壞ヲ除キ乾愈ス。○口

中唇舌乳頭ノ坼裂。凍瘡等ニ塗テ速ニ愈。○面部ノ

小皰汚斑ヲ消シ。肌膚ヲ美澤ニシ。頭瘡ヲ治ス。
疔 癩 疔 癩

沒藥 越仙扶亞 沒藥 丁幾去爾ト同シ。去リ其藥木

木炭 カ
ラ
ン
テ
ン
コ
ル
又
ホ
ウ
ト
コ
ル
蘭

製法 質輕キ木炭ヲ搗碎キ陶埴ニ内レ。一孔ヲ穿

タル蓋ヲ覆ヒ。火ニ上セ燒テ通紅ト爲ス。半時許云或

一 時ニ放冷シ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

主治 一切香臭ヲ奪除シ腐敗ヲ遏絶スル奇効アリ。

假令バ阿魏。麝香ノ如キモ新ニ製スル木炭ノ末ヲ

加テ研磨スレバ其氣速ニ消散ス。腐蝕ノ肉類。變敗

ノ水漿等ニ此末ヲ摻シ加フレバ臭氣消メ故ノ如

シ。○凡ソ臭穢腐蝕ノ膿瘍腐骨疽。壞疽等。膿汁汚液

多キ症ハ此末一味患處ニ摻シ若ハ幾那。楊皮。榭皮。

沒食子。枯礬等ノ末ヲ適宜ニ擇加テ摻シ或ハ經久

頑固ノ潰瘍。頭瘡等。臭穢ノ壞液。滲漏浸淫シ或ハ濕

癬ノ膿疱潰爛スル症ニ此末ヲ摻シ。若ハ家猪脂ニ和シ貼スレバ腐爛臭敗ヲ淨刷メ乾愈ス是ヲ外敷ノ初ニ搔痒ヲ發スルコトアリ但是ヲ施ス片ハ石鹼ヲ温湯ニ溶シ毎日患處ヲ洗淨スベシ○瘡瘡様ノ潰瘍汚液漏泄ノ臭氣堪難キ症ニ此末ヲ摻スレバ臭穢速ニ消散ス然レモ藥氣消スレバ復發ス○失苟兒陪苦ノ斷ノ腐爛ニ此末ヲ摻メ良驗アリ○傳染痢等ノ下利ノ穢物ニ此末ヲ摻スレバ臭氣消メ衆人ニ傳染スルコトナシ

遇按

世

消石

「ソットリム」羅 「サルベートル」又「ガルペートル」シエレ。ポットアス蘭

消石ハ亞兒加利鹽ト酸性氣ト抱合混和ノ成ル一種ノ中和鹽ナリ消石ノ末ヲ亞兒加利性ノ液ニ加レモ沸騰セズ。乳汁ニ加レモ凝固セズ。乳汁ニ加レモ凝固セズ。是消石ニ少モ酸性ナキガ如シ。消石ノ末ヲ酸味ノ液ニ加レモ沸騰セズ。是消石ニ少モ亞兒加利性ナキガ如シ。此即亞兒加利鹽ト酸性氣ト自然ニ渾化抱合ノ偏勝ナキ中和鹽ナレバナリ。然レモ製煉術ニテ其質ヲ剖析スレバ其二物顯著ナリ。即是ヲ蒸餾スレバ酷烈ナル酸味ノ消石精出ツ。是

酸性氣ナリ然ニ消石ヲ燒燬スレハ其酸性氣消散
 ノ盡ク酷烈ナルア兒カ利リ鹽即チ後ニ舉ルトナル
 ヲ以テ知ベシ○其酸性氣ハ大氣ニ含ル者ニ自
ア兒カ利リ鹽ニ著テ凝結シ消石トナル○凡、琢磨セ
 ル銅鐵類ノ漸、鏽敗シ瓦磚垣墻等ノ色變シ崩壞ス
 ルモ此大氣ニ含ル酸氣ノ侵蝕スルニ非ルハナシ。
 ○消石ヲ水ニ和スレハ寒氣ヲ生ス是レ消石ト水
 ト抱合スルニ因ル消石清涼ノ性効モ是ニ係ナリ
 ○其ア兒カ利リ鹽ハ即チ剝ダ篤ト亞ア斯スニノ草木ノ燒灰中
 ニ在ル所ノ鹽ト同シ是レ草木ニ稟ル所ノ固性ノ亞
兒加カ利リナリ○凡、鹽ノ質少シモ

風化消散セズ火ニ投メ消滅セズヨ此ア兒カ利リ鹽
 ク火ニ堪ル者ヲ總テ固性鹽ト名ク
 才基資トシ酸性氣ト抱合渾化メ消石トナルナリ
 或云消石ハ酸性氣ト植物固性ノア兒カ利リ鹽ト抱
 合メ成ル海鹽ハ酸性氣ト山物固性ノア兒カ利リ鹽
 ト抱合メ成リ硝砂ハ酸性氣ト動物固性ノア兒カ利リ鹽
 利鹽ト抱合メ成ル○或云消石ニ含ルア兒カ利リ鹽
ハ海鹽ニ多ク含リ又石灰類ニモ是レアリ然レ此
ア兒カ利リ鹽ハ山坑物植物灰類ニ含ル鹽ニノ即、剝、篤
ア兒カ利リ鹽○大氣中多ク消石氣アリ。殊ニ蒸升セル地氣
 ニ多シ。此氣鬱遏メ迅雷ヲ作スト猶火藥ノ如シ○
 植物モ亦消石質ノ鹽氣ヲ含者多シ。假令ハ蒲公英
 失格列乙。碎米薺葛苣紫堇等ノ生汁。清涼性アル者
 ノ如シ○雨露。深井水。瀝水及膏腴ノ地ハ消石ヲ含

又一切動物ノ血液ニモ是ヲ含リ。故ニ尿屎糞其ノ多
 汚セル土地ハ消石ヲ含フ殊ニ多シ○上好ノ消
 石ハ乾淨瑩白。長大。六稜ノ氷柱狀ヲ爲。氣ニ觸テ濕
 ラズ。風化溶消セズ。敲テ響ヲ爲。火ニ投メ爆聲ヲ發
 セズ。唯焯鳴シ速ニ燃テ鮮明ノ焰ヲ發シ。質消化メ
 固鹽少許残り。舌ニ觸テ辛微苦冷徹鑽透ス。消石ヲ
 湯ニ溶シ。剥篤亞斯ヲ水ニ溶シタル液ヲ是ニ滴メ
 其底ニ土沈マザルハ上品トス○火ニ投シ爆聲ヲ
 發スルハ海鹽雜ル徵トス。燃テ質消滅セザルハ土
 氣多微トス。氣ニ觸テ濕ハ亞兒加利鹽多微トス○

粗朴消石ハ必ス土氣海鹽粘液ヲ雜故ニ精製用ベシ

精製消石

「ニ」トリム。デピラチム。ゲソイフ
 ル。デサル。ペトルシユル。ポットアス。蘭

尋常ノ消石ニ多ク沸湯ヲ加テ溶化シ湯云六倍放冷

ノ芒ヲ結バシム若ヨク結芒セザルハ是ニ精製

剥篤亞斯ノ溶液十倍ノ水ヲ加ヘ滴シ加ベシ。初ハ其

底ニ沈ニ降レ。終ニ火モ沈ニ降ラス其底ニ渣

ヲ現スニ至テ其液ヲ紙ニテ濾テ滓ヲ去。文火ニ煮

テ上面膜ヲ生スルニ至リ放冷スレバヨク結芒ス。

其芒ヲ取。乾シ貯。是ニ由テ消石ニ含ル海鹽粘液

等盡ク脱メ明淨ノ質トナルナリ。是ヲ以テ消石精

ヲ製スレバ極テ銳烈ナリ。消石上好ナラザレバ其精。薄弱ニシテ斯的爾苦窠篤兒後ニ出ツトナルナシ精製消石ハ八倍ノ水ニテヨク溶化ス。沸湯ニハ等分ノ量ニテ溶化ス。

主治性寒。壯熱ヲ涼解スル峻藥トス。血液ノ沸騰。強盛ノ運行ヲ降鎮シ。煩渴ヲ止メ。脉ノ洪大強數ヲ減シ腐敗ヲ防護ス。○諸管ニ鑽透メ凝結ヲ溶化シ閉塞ヲ開達シ病毒ヲ分利メ諸竅ニ排泄ス。○血液ノ大過強盛ナル運行ヲ抑制スト雖モ他ノ酸精ノ如クニ收斂セズ。ヨク稠厚ノ血液ヲ稀釋メ壯熱ヲ涼

解ス。○綠礬精。硫黃精ノ如キ礦性ノ酸精ハ收斂ノ血液ノ焔解崩壞ヲ遏止シ腐敗ヲ防護ス。譬バ乳汁ニ酸味ノ液ヲ加レハ凝固スルガ如シ。消石ハ一種ノ中和鹽ナレバ收斂セズメヨク血液ヲ稀釋溶解シ壯熱ヲ清涼ス。○心藏大幹動脈及ヒ諸筋ノ強盛ナル勢力ヲ抑制ス。故ニ動脈ノ温煖急疾ノ運行及ヒ纖維ノ充張力ヲ減損シ又腸。腎。皮表ノ排泄ノ諸管ヲ疏通メ大小便。蒸氣ヲ開達ス。然レテ清涼利水ノ効殊ニ居多。故ニ焔衝壯熱ヲ解スル主藥トシ熾盛熱。胸脇。咽喉。腎。膀胱等ノ焔衝ヲ涼解ス。○凡ソ焔衝

病ハ消石一錢ヲ扁桃乳一弓ニ研和シ用ヒ或ハ左
ノ乳劑良凡、焮衝病ハ瀉下ノ害多シ故ニ乳劑ニ宜シ

桃舎涼解飲

扁桃乳 十六弓 舍利別 六弓 消石 一錢半

右研和シ半時毎ニ一小茶碗ヲ温服ス○劇キ焮衝
病ノ效ナキ症ハ初發、消石ヲ屋施蔑兒ニ研和シ與
テ効アリ○患者精力虚損シ殊ニ肺腎胃腸ノ虚罷
セル諸症ハ消石害アリ○總テ熱病人壯實ナリ諸
症減スルニ隨テ消石ノ服量ヲ減シ、然レ凝結ヲ疏
釋スベキ症ハ硃砂ヲ以テ消石ニ代用ヒ、終ニ虚候

ヲ現スニ至テハ專ラ壯神劑ヲ與ベシ○胸脇焮衝
ノ脉強ニメ數、乾欬ニ血ヲ交ル痰少許略ク症ハ消
石適應ス。一日ニ三四錢マデ用ベシ。但、脉力衰ヘ焮
衝減スルニ隨テ此藥モ減スベシ○胸脇焮衝ノ腐
敗膽液ヨリ發シ、其毒胃腸ニ鬱蓄スル症モ初メ消
石ヲ用ヒ、焮衝減スルニ隨テ其量ヲ減シ、輕キ下劑
ヲ多ク用ベシ○神經胸脇痛ト名ル症アリ、胸脇痛
ハ胸脇
焮衝是ハ初、焮衝ヲ發スレ、ホト無幾精力虧損メ虚候
ヲ見スナリ、故ニ初發消石ヲ用ヒ、虚候ヲ見スニ隨
テ強壯劑ヲ與ベシ○虚弱ノ肝焮衝ハ消石良効ア

リ。然_レ用_テ是_レ用_テ嘔氣甚キ者ニハ用_テ難シ如此症ハ水銀劑ヲ加_テ凝結ヲ溶解シ。阿芙蓉劑ヲ加_テ疼痛ヲ寛解ノ効アリ。○胃及ビ腸ノ焮衝ハ總テ消石類ノ中和鹽ハ害アリ。○子宮焮衝ノ劇盛ナル症ハ消石効アレ用_テ多クハ患者虚憊シ或ハ壞疽トナル故ニ戒慎ヲ加_ベシ。此症ハ酸味收斂ノ藥ヲ用_テ焮衝ヲ治シ。精力逾_レ虚損スルキハ攝爾扁答_ト。纈草_ト等ノ揮發壯神ノ藥ヲ加_フベシ。○孕婦ノ頭痛發熱等。神思ノ感動ヨリ發シ。血液ノ運行過盛ナル者ハ消石良驗アリ。○間歇熱。膽液熱。發斑熱ノ初發。焮衝ノ諸症多

キ者ハ消石ヲ用_ベシ。凡ノ膽液過多ノ症。並ニ壯熱病ニ是ヲ用_レバ膏_ニ其熱ヲ解スルノミナラスヨク發汗ス_レ然_レ用_テ惡性ノ熱病ニ於_テ脉虚シ精力缺脱スル症ニ是ヲ用_レバ病毒排泄ノ汗。斑疹_ト等ヲ効_テ發越セザ_ラシム。○中暑霍亂大渴煩熱甚キ症ニ是ヲ用_テ壯熱ヲ撲滅シ煩渴ヲ涼解ス。○焮衝性ノ痘ハ消石ヲ的當トス。○焮衝性ノ痛風。關節痛。脚痛或ハ其毒。橫膈ニ衝_テ煩悶シ嘔氣ヲ兼ル者ハ是ヲ用_テ尤驗アリ。○焮衝性ノ傷冷毒熱ノ初起。其痛劇_キ症ハ是ヲ用_テ効アリ。然_レ用_テ其劇痛ニ因_テ患者速ニ

遠西名物考 卷二十八 風雲堂藏

虚憊スル故ニ久服セシムルヲ勿レ。寒涼刺戟ノ藥ニ堪ザレバナリ。○發斑熱ノ患者虚憊セル症ニ長ク此藥ヲ用レバ斑疹卒ニ消散メ内攻スルコトアリ。○焮衝性ノ失血ニ是ヲ用レバ血液ノ沸騰メ妄行スルヲ抑制スル故ニ多ク驗アリ然レバ焮衝性ノ症ニ非レバ大ニ血液ヲ稀釋メ逾其脫泄ヲ増劇ス。○徵毒淋疾ノ焮痛甚キ症ニ此藥ヲ稱ス。然レバ其焮熱腫痛劇キ症ニ刺戟驅水ノ峻藥ヲ用レバ却テ其疼増長スルコトアリ。此症ハ粘滑緩和鎮痛ノ劑ヲ施メ大ニ寛解ス。○眼耳齟舌ノ焮衝痛。羅斯等甚クノ發

熱スル者焮衝性ノ頭痛及ビ熱毒發狂等ニハ是ヲ用テ的當ス。○咽喉及ビ口中ノ焮腫ニ是ヲ漱藥ニ加ヘ施メ効アリ。酷厲ナル熱ヲ兼ル症ハ殊ニ良。此藥ハ輕ク衝動メ解凝ノ効アル故ニ咽喉口舌ニ膠布セル粘液ヲ稀釋シ。燥熱ヲ涼散ス。或ハ玫瑰蜜ニ研和シ塗ルモ良。或ハ左ノ漱劑ヲ用ベシ

瑰麥潤涼飲

大麥煎 六勺
玫瑰蜜 一勺
消石 三錢

右溶化シ温メ漱劑トス。○傷冷毒ノ咽喉焮腫ニ消石ヲ漱劑トシ施メ其効。硃砂明礬ヲ調和シ用ルガ

如シ。又懸壅垂人腫脹ヲ消ス。①小兒齒生スルニ由テ齒痛劇ク。發熱咳嗽。便閉。睡中驚悸等ヲ兼ルハ消石的效アリ。又斯ノ如キ諸症ニ左ノ劑驗多シ。

鎮痛清涼飲

右研和シ半時ニ一卵匙宛用ス。①凡ク勞瘵様ノ病及ビ麻疹後ノ勞瘵等ハ此藥ノ刺戟ニ堪ヘズメ害アリ然レ遷延消耗熱及ビ荏苒タル内伏熱ハ左ノ方驗多シ。

爽神涼血散

此散入煎服及以湯毒發疹等ニ用ス。

螻蛄石 一匁 消石 四錢 銀朱 一匁

右調和ノ散劑トシ。硝子壘ニ貯ヘ。一卵匙宛乳汁ニ點服スル。日ニ四次。①發汗劑ニ消石ヲ加ハ能ク發汗ス。又瀉下ノ効アリ。小便ヲ利スル効居多故ニ多ク水腫小便閉ヲ治ス左ノ方良驗アリ。

末爾扶斯消石散

消石 一匁半 格碌屈斯末爾扶斯 一匁

右研和シ每服一匁。日ニ四次。此劑寒性粘液質ノ人ニハ利尿瀉下ノ効少シ。①膽液酷厲ニハ熱毒多キ下痢及腸炊衝ヨリ發スル下利ニ消石ヲ用レハ下

利自之止ム。○熱性ノ經閉及産後惡露壅滯ノ熱ヲ兼ル症ハ是ヲ用テヨク瘀血ヲ下ス。○脾病神思鬱憂病等ニ兼ル煩熱風氣痞滯。擊急心腹痛ヲ解散ス。○消石ヲ温湯ニ溶シ外敷メ凝血ヲ疏散ス。冷水ニ溶シ施セバ血液ヲ凝固ヒシム。○消石ニ醋海鹽ヲ加ヘ蒸溺劑トシ解熱涼散ノ効ヲ稱ス。或ハ醋海鹽屋施茂兒ヲ加ヘ吉利詞參兒トシ施メ大便燥結ヲ通ス。○服量大約一月ヲ一服トシ加テ一錢ニ至ル

霸王鹽
ガルボレイクレスト又「リキニハ、トリ
 ヲラタノルフレア」
 アソウルシレ又「スワヘリゲス
 ヲットアス」
 蘭

製法

消石

精製者

硫黃華

各等分

右各極細末トシヨク合和シ。坩鍋ヲ火ニ上セ通紅トシ。右ノ末一匙ヲ取テ坩ニ投シ焰ヲ發シヨク燒化シ。少シモ煙ナキニ至テ又一匙ヲ投ス。斯ノ如クメ盡ク其末ヲ燒了リ。仍其坩ヲ火上ニ置、下四分時許ニ火ヲ下シ。是ヲ取テ速ニ沸湯ニ溶シ。紙ニテ濾シ。其液ヲ靜定ノ上清ヲ取り渣ヲ去リ。文火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ上面膜ヲ結ブニ至リ。磁壺ニ内レ冷處ニ置、バ瑩白ノ芒ヲ結ブ。其結芒セザル液ヲ取り初ニ除キタル渣ヲ加ヘ沸湯ヲ増シ加テヨク攪和

シ。紙ニテ濕シテ水氣ヲ蒸散スル。前法ノ如クシ。
 放冷ノ結芒セシム。數斯ノ如クノ終ニ少モ結芒セ
 ザルニ至リ。其芒ヲ取り集メ水ニテ洗ヒ乾シ硝子
 礬ニ收メ貯フ。〔按〕或云此鹽潔白ナラズ。黑色ヲ帶ル
 ハ硫黃ヨク燒化セザルナリ。故ニ再ビ是ヲ大ナル
 坩鍋ニ入テ燒煨シ鐵篋ニテ手ヲ住メズ攪セ一時
 半若ハ二時許ニシテ潔白ノ鹽トナル。是ヲ沸
 湯ニ溶シ結芒セシムル。前法ノ如クス。
〔主治〕 是一種ノ中和鹽ニメ解疑ノ峻藥トス。内部諸
 藏ノ壅塞ヲ開通シ。腐敗ノ膽液粘液留飲。停水ヲ稀
 釋ノ小便ニ驅泄シ。微大便ヲ利ス。故ニ實症ノ水腫
 ニ尤効アリ。殊ニ其壯熱及ビ煩渴ヲ治ス。○性功孕

礬酒石ノ如シ。但孕礬酒石ニ比スレハヨク水ニ溶
 化シ稀釋解疑ノ効多シ。○服量半錢ヨリ一錢ニ至

ル
 〔侯叔〕
 〔伍依〕
 〔喝〕

固性消石

〔コトリムヒキシム〕
 〔ハステサルペトル〕
 〔蘭〕

製法

坩鍋ヲ火ニ上セ。漸ク火ヲ加ヘ。精製消石
 ノ末ヲ投メ熔シ。是ニ木炭ノ通紅ナル小片。若ハ其
 細末ヲ以テ少許宛投スレバ爆聲ヲ發メ焚燒ス。數
 是ヲ投メ少モ焚ス消石凝固スルニ至テ逾火ヲ増
 少モ烟氣ナキヲ度トシ放冷スレバ消石ニ含ル鹽
 盡燒化シ白綠色ノ亞兒加利鹽トナリ。氣ニ觸レバ

速ニ溶解ス。是ヲ沸湯ニ溶シ火ニ上テ煮熬メ乾固ノ
白鹽ト爲ス。是ヲ固性消石トス。○此鹽若ハ他人ノ亞
兒加利鹽ヲ水ニ溶シ是ニ消石精ヲ滴シ加レバ沸
騰ス其沸騰止メ度トシ火ニ上テ水氣ヲ熬減シ放
冷スレバ復結芒ノ故ノ消石トナル。○性功酒石鹽
ト同シ。 疾

消石液

一名亞兒加利。精製消石。別利。羅。ホクト。ハン。ハス。テ。サ。ル。ベ。ト。ル。蘭。

製法

固性消石ヲ製シ了テ速ニ蒸餾水ニ溶シ
濃テ渣ヲ去リ火ニ上セ水氣ヲ減メ油ノ稠ト爲ス
是ヲ消石液トス。○性功酒石液ト同シ。 疾

消石錠

ガ。ル。グ。リ。ユ。子。ル。ラ。羅。ヤ。タ。山。蒸。煎。蒸。精。

製法

精製消石ヲ坩鍋ニ内レ。火ニ上テ煇シ。其
量ニ十分一ノ硫黃末ヲ取テ少許宛其坩ニ投メ焚
燒セシメ。是ヲ石上ニ寫シ放冷メ凝固セシム。 匠其

主治

清涼シ渴ヲ止小便ヲ利シ閉塞ヲ開キ粘液ヲ
稀釋ス。○壯熱。喉衝熱。咽喉焮腫及淋疾小便閉等ノ
焮熱ナル症ヲ治ス。○服量半匁ヨリ三錢ニ至ル。

咽喉口舌ノ焮腫ニ是ヲ口中ニ含テ溶シ或亞刺比

亞越謨ト砂糖ヲ加テ研和シ含テ驗アリ。 依云此藥

酸性消耗スル故ニ性功剽悍。 亞刺比。 依云此藥。 清涼ノ効ヲ取ルニハ精製消石ヲ優レリトス。 疾。 匠。 匠。

消石精

スヒリテラスニトリ。アシダウム又「スヒリ」

製法

消石精製乾淨者。細末二十四多。合綠礬油再餾者。

蒸餾水各十二多。右消石ヲ硝子ノ列篤兒多ニ内レ。綠礬油ニ水ヲ和

シ。此液ヲ一滴宛右ノ列篤兒多ニ加ヘ。硝子ノ承餾

壺ヲ接合シ。接際ヲ塗封シ。沙火ニ内レ。初文火トシ

漸ク火ヲ加。蒸餾ノ其精必モ蒸升セザルニ至リ。其

精ヲ取り硝子壺ニ内レ固封シ貯ヌ。○右ノ消石精。

澄清ナラズ微濁ルキハ是ヲ承餾壺ニ内レ。口ヲ開

沙火ニ安シ火候ヲ平等ニシ濁リタル蒸氣蒸散シ

盡キ澄清ナルニ至リ硝子壺ニ入レ固封シ貯フ。

又法 發煙消石精 蒸餾水 各等分

右件合和ス

發煙消石精

製法

消石精製乾淨者。極細末二十四多。

右消石ヲ潤大ナル列篤兒多ニ内テ其半ニ充シメ

嘴長ク彎タル硝子ノ漏斗ヲ列篤兒多ノ頸ニ挿シ。

是ニ綠礬油ヲ一滴宛徐々ニ淋滴メ列篤兒多ノ頸

是ニ綠礬油ヲ一滴宛徐々ニ淋滴メ列篤兒多ノ頸

是ニ綠礬油ヲ一滴宛徐々ニ淋滴メ列篤兒多ノ頸


是ニ綠礬油ヲ一滴宛徐々ニ淋滴メ列篤兒多ノ頸

觸ル下ナク消石ニ加テヨク混和セシメ注一 頰ニ
 兒多逆裂スレバナリ速ニ列篤兒多又沙火ニ内レ
 頸長キ硝子ノ承餾壘三個ヲ連續ス其法第一個ト
 第二個ノ承餾壘ノ頸本ノ側ニ一小嘴アリ先列篤
 兒多ノ彎タル頸ヲ第一個承餾壘ノ頸ニ挿シ一個
 ノ彎リタル硝子管ヲ取テ第一個承餾壘ノ頸側ノ
 嘴ニ挿シ其一端ヲ第二個承餾壘ノ頸ニ挿シ又一
 個ノ彎リタル硝子管ヲ取テ第二個承餾壘ノ頸側
 ノ嘴ニ挿シ其一端ヲ第三個承餾壘ノ頸ニ挿シ連
 續セシムルナリ但第二個承餾壘ニハ其列篤兒多

ノ消石ノ二十分一ノ蒸餾水ヲ内レ九錢第三個承
 餾壘ニハ消石ノ四分一ノ蒸餾水ヲ内レ六分石灰ト
 雞子白ト適宜ニ合和シタル膠泥ヲ布條ニ塗テ諸
 承餾壘ノ接際ニ纏キ貼メ蒸氣ヲ透漏セザラシム
 其承餾壘ヲ連續メ多少ノ水ヲ内レハ其蒸氣ヲ水ニ
 吸収スルガ爲ナリ然メ初ハ文火トシ漸次ニ火ヲ
 加レバ黄色ノ蒸氣出ツ列篤兒多ノ底通紅トナレ
 バ赤色ノ蒸氣升テ酸精溜滴ス終ニ蒸氣必シモ升ラ
 ザルニ至テ火ヲ下シ放冷スレバ第一個承餾壘ニ
 ハ極テ銳烈ナル消石精出ツ此即發烟消石精ナリ

速ニ是ヲ硝子壘ニ内レ。其三分ノ二ニ充シメ。硝子壘ニテ固封シ。冷處ニ貯ベシ。煖處ニ置ハ其精沸溢ナリ。第二個承餾壘ニハ銳烈ナラズメ黄色ヲ帶ル精アリ。第三個承餾壘ニハ澄清ニメ多少消石氣ヲ含メル。精出ツ其精ハ各別ニ硝子壘ニ内レ固封シ貯ベシ。○或ハ兩嘴アル承餾壘ヲ以テ製スルモ良。即左ニ舉ル圖ノ如シ。又是ヲ以テ鹿角精。發烟海鹽。精。硃砂。加石灰精等ノ銳烈揮發ノ精ヲ製スベシ。

イ 列篤兒多
 □ 口爐
 □ 承餾壘
 □ 硝子管
 □ 鉢
 □ 冷水ヲ盛ル承餾壘ノ半水中ニ内ル



○消石精ハ右ノ如ク綠礬油ヲ加ヘ製スレバ消石ニ含ル亞兒加利鹽ヲ以テ其油氣ノ蒸升スルヲ阻遏スル故ニ毫モ綠礬油ヲ含丁ナキ純粹ノ消石精トナルナリ○是ヲ製スルニハ嚴寒ノ時令ヲ最良トス○爐ノ火氣ニテ承餾壘ヲ温ナラシメズ勉テ寒涼ニスベシ○承餾壘ヲ放開スル片其蒸氣口鼻ニ觸レバ呼吸噎塞スル故ニ預メ意ヲ用テ是ヲ避クベシ○此消石精和蘭ニ於テ一斯的爾苦成篤兒ト名ツケ羅甸ニテ亞括忽爾挾斯ト名ク。是ヲ用テ銀ヲ焔解ス○其列篤兒多ニ殘ル渣塊ハ消石ノ亞

兒加利鹽ト綠礬油ノ酸收ト抱合セル中和鹽ナリ

是ヲ**晒多緜赫篤栗次刺黠謨**ト名ク。性功鑽透閉達

病肝病黃疸等經久ノ病ヲ治ス。是ヲ服メ嘔下ス。肝氣ヲ發セハ再服過ノ用ヘシ嘔氣ヲ發セス。是ヲ修

製メ過兒加利鹽需百利加利黠謨ト名ク。此即孕礬酒

リ。酒石ノ條孕礬酒石○消石精ニ植物固性ノ亞兒

加利鹽**利篤亞斯酒石鹽亞爾鮮**ヲ加レバ故ノ消石ト

ナル○此精ハ極テ猛烈ニメ焚カ如キ烟氣ヲ蒸發

ス。諸油類ニ加レバ大ニ熱沸ス亞爾箇兒及丁子油

ノ如キ揮發香竄ノ蒸餾油ニ加レバ忽燃テ焰ヲ發

ス○此精ヨク固封シ貯レバ其焚蒸赤色ノ烟氣一

年モ消散セズ○然レ性大寒ニ消石ニ勝レリ。是
 清凉ノ峻功アルヲ以テ其性寒ナルヲ知ノミナラ
 ス。雪若^{モシ}ハ水ニ此精ヲ加レバ極テ寒冷トナリ。又是
 ヲ以テ氷及ビ雪ヲ作り。或ハ水銀ヲ凝固セシムル
 ヲ以テ知ルベシ○其秤量海鹽精ニ比スレバ重ク。
 綠礬精ニ比スレバ輕クメ酸性モ緩弱ナリ

主治性大寒。味峻酸ニ一切壯熱及ビ焮衝性ノ諸
 病ニ用テ涼解ノ峻藥トシ。津液ヲ生シ煩渴ヲ止メ。
 血液ノ燥涸ヲ潤シ。壅塞ヲ開達シ。小便ヲ利ス○熾
 盛熱。膽液熱。腐敗熱等ノ壯熱ヲ涼解ス○綠礬精。硫

黃精海鹽精ハ收斂清凉ノ纖維諸管ノ弛緩虚弱ヲ
 健固ニス。此精ハ清凉ノ血液ヲ稀釋スル効。殊ニ峻
 ナリ。故ニ焮衝性ノ水腫熱ヲ兼ル症ニ用テ清凉利
 水ノ偉効アリ○或云微毒ニ水銀劑ヲ長服ノ體中
 ニ懸留シ効ナキ症ニ是ヲ用レバ水銀ヨク融解ノ
 其主能ヲ逞發ス水銀ノ條ニ舉ル溶汞劑ノ効アルガ如シ○此精一二
 滴ヲ水一盞ニ加^ハ適意ノ酸味ト爲シ服ス○瘡疹潰

瘍等ニ内服外敷シ又疥癬ニ塗テ良驗ヲ稱侯揚依淑福底叔伍

甘消石精

スポリヲス。ニットリ。ドルシス。羅。ステ。サ
 ル。ペ。トル。グ。イ。スト。又。アル。ヨ。リ。セ。サル。ペ
 テル。ア
 テル。蘭

製法

燒酒

三十度者
二北半

發烟消石精

一北

右燒酒ヲ潤大ナル長頸ノ列篤兒多ニ内レ硝子ノ漏
 斗ニテ消石精ヲ一滴宛其列篤兒多ニ加テ每次振
 蕩シ其頸口ヲ塞キ沙鍋ニ安シ承餾壘ヲ接續シ置
 下數日置云冷處ニ文火ニテ蒸餾シ其燒酒量ノ三
 分二ノ精ヲ取ル若其精ニ酸味アル片ハ是ニ煨製
 麻屈涅失亞ヲ加テ沸騰止ニ至リ列篤兒多ニ内レ文
 火ニテ蒸餾ノ精ヲ取硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

又法 亞爾箇兒 三北 發烟消石精 六多

右亞爾箇兒ヲ潤大ナル硝子壘ニ内レ消石精ヲ取

テ一滴宛加テ每次其壘ヲ振蕩シ頸口ヲ疎ニ塞キ

冷處ニ置テ七日是ヲ列篤兒多ニ内レ承餾壘ヲ接

續シ慢火ニテ蒸餾シ精ヲ取ル下三十二多其精ニ

蒸餾水六多ヲ加テ攪和シ又煨製麻屈涅失亞ヲ表

取テ少許宛加テ少モ液動セザルニ至リ是ヲ列篤

兒多ニ内レ文火ニテ蒸餾シ精ヲ取テ三十多是ヲ

硝子壘ニ收メ固封シ貯フ

酒 亞爾箇兒ヲ云燒酒盡ク水氣ヲニ猛烈ナク消石

精ヲ加レバ宛モ焰ヲ吐カ如ク沸騰スル故ニ一頓

ニ是ヲ加レバ大ニ沸溢メ列篤兒多ヨリ迸出シ其

蒸氣肺ヲ侵刺メ呼吸噎塞ス或云此精ハ製法ニ意ヲ用テ極テ純粹ニス
ト雖モ時日ヲ經レバ必ズ消石精ノ酸味ヲ帶ブ
主治是油質ノ酸精ニノ拔爾撒謨様ノ性能アリ。諸壅塞ヲ開達シ。鬱結ヲ揮散シ。汚液ヲ排除シ。腐敗膽液ヲ疏泄ス。○汗ヲ發シ。小便ヲ利シ。胃ノ諸症。子宮衝逆ヲ治ス。○清涼飲ニ加熱病ニ用テ血液ノ沸騰ヲ降鎮シ。渴ヲ止メ。惡性熱ヲ治ス。○此藥忽弗滿鎮痛液綠蓉ノ條ノ性能アリ。然レハ鎮痛液ニ比スレバ効力緩和ニメ起熱ノ性少シ。故ニ焮衝ヲ兼ザル者ハ熱アル症ニモ皆良効アリ。○此藥鎮症ノ効アルニ因

テ發斑熱ニ多ク効アリ。然レハ赤斑熱ニハ害アリ赤斑熱ハ總身面部ニ極テ赤色ノ斑ヲ發シ欬嗽頭痛等ヲ兼ヌ是多クハ傷冷毒ヨリ發ス是消石精ノ氣アリテ咽喉ヲ刺戟スレバナリ。○利尿藥ヲ加テ水腫ニ殊効アリ。假令タトヘバ左ノ方ノ如シ

杜松驅水飲

杜松實水 六勺

海葱蜜 一勺

甘消石精 二錢

安質沒扭酒 半錢

右調勻シ。一時ニ一匙宛用フ。○荏苒タル胸中諸症。欬嗽痰喘等ノ患者虛衰シ傷冷毒ノ諸症ヲ兼ルハ此精甚驗アリ。○此藥諸腹痛ヲ治シ食ヲ進メ風氣

痞滯ノ疝痛ニ捷効ヲ稱ス。故ニ一ニ是ヲ治疝露ト名ク。但胃腸ノ欬衝ヨリ發スル症ハ斯ノ如キ竄透衝動ノ藥精ハ害アリ○子宮衝逆。脾病。神思鬱憂病ニ兼發スル拘攣痛ヲ治ス○孕婦ノ惡阻ヲ治スル良藥トス○神經感動甚キ人及ビ老人婦人ニ發スル頭眩眩冒。胃ノ虛冷ノ諸症。肢節顫振。腸動等ニ多ク速効アリ。是ニ驅風藥ヲ加テ殊ニ良○性功。大抵甘絲礬精。甘海鹽精ノ如シ○服量三十滴許。葡萄酒若ハ時^ノ堙^テニ點服スル^ル日ニ三四次^{依_侯揭_布福_叔揭_叔}

遠西醫方名物考卷二十八終

