

遠西醫方名物考

世

卷三十一



499, 2
E m - 3
31
No. 1456
12 C 15

樸齋宇田川先生著

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青黎閣發児

葉26

遠西醫方名物考標目

卷三十一

燒酒

燒酒造法

尋常燒酒 再餾銳烈燒酒

尋常燒酒試法

燒酒損敗ヲ復スル法

銳烈燒酒

亞爾箇兒

銳烈燒酒並亞爾箇兒試法

燒酒質 燒酒製煉術主用

主治 禁戒 外敷

消癰露

清涼飲

尋常清涼飲
麝香清涼飲
驅熱清涼飲
揮發清涼飲
和胸清涼飲
發汗清涼飲

龍亞清涼飲

壯神清涼飲

和胸清涼飲

發汗清涼飲

攝絲施那

驅蟲昆設爾弗
攝絲驅蟲散

攝爾扁答利亞

揮發回神飲

攝爾扁答利亞丁幾去爾

遠西醫方名物考卷三十一

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕

榕菴校補

燒酒

[スビリテウス・ヒー] 羅
[ブランドウエイ] 蘭

燒酒ハ葡萄酒ヲ蒸餾シ或葡萄酒ノ糟ヲ泡釀ノ蒸

餾シ製ス 榕按是飲膳正要所
和蘭名コル

謂葡萄燒酒ナリ
義卽チ本邦ノ燒酒ト同シ
燒酒衛藏圖識所

謂青裸燒酒ナリ
是ハ通例小麥ニテ造ルヲ上品ト

ス。裸麥大麥。穢麥。粳米。黍等ニテ造レ。氣味劣レリ。
裸麥ハ小麥ニ比スレバ燒酒出ル少ク又久ク貯

難シ○或、豌豆蠶豆ヲ以テ造レ。氣味佳ナラズ。燒酒出ノ亦少シ。或、林檎、梨實、櫻子、梅、李、楨楂、榅桲、無花果、桑椹、覆盆子等モ泡釀メ。燒酒ヲ製ス○或、山茱萸、薔薇花、接骨木花或、沙糖、咲坪ノ如キモ醞釀ノ蒸餾シ。燒酒ヲ造ル。然ニ氣味各異ナリ。但葡萄酒及穀類ニテ造ル燒酒ハ氣味最佳。ヨク。上好トス○多ク葡萄ヲ產スル國ニテハ葡萄酒ニテ製シ。葡萄ナキ地ニテハ穀類ニテ造ル。二種共ニ較著ノ差別ナシ。

燒酒造法 通例葡萄酒ヲ蒸餾シ或、其糟ヲ泡釀メ蒸餾シ。造ル穀類ニテハ小麥ヲ以テ造ル。其法。ヨク

乾ケル麥麴製法。麥酒後ニ出、取搗テ粗碎ト爲シ、桶ニ入適宜ニ微温湯ヲ加攪テ軟ナル泥ト爲シ。麥酒ノ酵蒸餅蒸餅ノ條或、酒石鹽少許ヲ和シ、緩處ニ置キハ漸泡釀ス。若泡釀セザレバ蒸餅母少許ヲ加ベシ。ヨク泡熟スレバ美好ノ酒氣アリテ酸味ナシ。泡釀足ラザレバ或云泡釀長キ者是ヲ蒸露罐ノ四分ノ三ニ充シメ火ニ上セ熱セシメテ頻ニ攪セ其剽悍氣薰蒸スルヲ度トシ。兜ヲ覆ヒ承餾壇ヲ接續シ膠泥モク若ハ獸ノ膀胱ニテ諸接際ヲ固封シ文火ニテ蒸餾シ。燒酒ノ氣味薄弱ナルニ至テ止ム。武火ニテ蒸餾スレバ沸

騰ノ承餾壘ニ泛溢シ或焦臭ヲ生スレバナリ○初
餾ノ燒酒ハ水氣多ク且濁テ味佳ナラズ故ニ再慢
火ニテ蒸餾シ氣味淡薄ナルニ至テ止ベシ。是ニ由
テ醇精悍烈ニメ澄清トナル。是尋常ノ燒酒十二度
ナリ但數回蒸餾スレバ極テ純粹ニメ氣味銳烈ト
ナル是ヲ再餾銳烈燒酒ト名ク次ニ出ツ

尋常燒酒試法 � 寻常ノ燒酒ハ硝子盞ニ注テ鮮美
玲瓏氣味酷烈ナラズ是ヲ服ノ嘔氣ナシ或是ヲ長
硝子壘ニ内テ其半ニ充チ口ヲ塞キ振掉スレバ多
ク漚沫細泡ヲ生メ久ク消散セズ。或手掌ヲ以テ數

其壘底ヲ敲テバ燒酒ノ上面邊圍ニ細泡輪匝ノ暫
消滅セザルハ皆上好ノ候ト不或燒酒少許ヲ匙ニ
入火ヲ點シ燃了リテ水半分殘ルハ上好ノ燒酒半
ス。水多キホド逾下品トス。若沙糖或舍利別其他夾
雜ノ物アレバ燃テ後其匙ニ焦著ス或阿利襪油扁
桃油等少許ヲ硝子盞ニ内是ニ燒酒ヲ注クニ其油
上面ニ浮ムト速ナルホド逾下品ノ燒酒トス
燒酒損敗ヲ復スル法 烧酒損敗メ氣味變スル片
ハ復文火ニテ蒸餾スペシ其變敗ノ液ハ罐内半殘
ルナリ○穀類ニテ製スル燒酒ハ變敗セザル爲ニ

杜松實ヲ加テ蒸餾スル者多シ故ニ穀類ノ燒酒ヲ
ニセ子フル杜松實蘭名ト曰フ。此ハ杜松實ヲ搗碎キ
桶ニ入適宜ニ温湯ヲ注キ酵ヲ加テ泡釀セシメ是
ヲ麥蘖ニ加テ蒸餾シ再餾スルニモ加ルナリ。是ニ
由テ其氣味亦好美醇厚ナル既ニ變敗セル者モ
右ノ如ク杜松實ヲ加ヘ蒸餾メ尤良。

又法 木灰葡萄蔓ヲ燒爲ス者尤良 灰酒石鹽海鹽ヲ合和メ
多少適宜ニ取り損敗セル燒酒ニ攢和シ數日ヲ經
テ蒸餾スレバ氣味醇厚悍烈ナルナリ。

又法

生石灰ヲ桶ニ入水ヲ加テ石灰上三四掌横

徑ニ至リヨク攢セ靜定ノ上清十貫錢ヲ取り食鹽
二握ヲ加ヘ置一晝夜ニメ又其上清二貫五十錢
ヲ取り損敗セル燒酒四貫錢ニ加ヘ蒸餾ノ燒酒三
貫五六百錢許ヲ取ルナリ

銳烈燒酒

アヒリコスドニレクチヒカ左ス羅
ケソイフルズブランド左イン又左デ

ルオフルゲハルデ
ウインダスト蘭

尋常燒酒ハ水氣酸收等多含テ純精ナラザル故
再三蒸餾メ銳烈純粹トシ製煉術及醫藥ニ用

製法

尋常燒酒大抵十二度許者

適宜

右長頸ノ格兒弗ノ三分ニ充シメ沙鍋ニ内

或重

用兜及承餾壠ヲ接シ大抵温湯ヒ如ノ慢火ニ上セ蒸
餾ノ二十度ノ燒酒トナルニ至リ硝子壠ニ内固封
シ貯フ○或燒酒ヲ蒸餾スル前法ノ如クメ三十
度ノ燒酒トナルニ至リ硝子壠ニ内固封シ貯フ○
右二十度ヨリ三十度ニ至者ヲ概メ再餾銳烈燒酒
ト名久斯ノ如ク銳烈ノ燒酒トナレバ葡萄酒製ノ
燒酒ト穀類製ノ者ト性功毫モ異ナルトナシ合シ
核

亞爾箇兒

製法

燒酒

二十度者

五比

精製ノ能ハ乾ク者或云

臨時焙乾者一比

外
剥
篤
亞
斯

剥篤亞斯

精製ノ能ハ乾ク者或云

臨時焙乾者一比

右合和シ硝子壠ニ内固封シ置丁十二時其間數振
蕩シ剥篤亞斯ヨク溶化スルニ至テ其渣廻ヲ去又
是ニ剥篤亞斯一比ヲ加前法ノ如クス數回斯ノ如
クメ剥篤亞斯少モ溶化セザルニ至レバ水氣盡ク
脱去セル候トス是水氣ハ盡ク剥篤亞斯ニ吸收シ是ニ
燒酒ハ毫モ吸收セザル故ナリ是水氣ハ盡ク剥篤亞斯ニ吸收シ是ニ
於テ濃過ノ滓ヲ去又剥篤亞斯ノ甚乾テ温ナル
者一比ヲ加乾キタル格兒弗ニ内慢火ニテ蒸餾
メ格兒弗殆ト乾ニ至レバ其燒酒三十二度トナル
是卽亞爾箇兒ナリ淑云酒石鹽ハヨク水氣ヲ吸收
是ヲ炎日ニ曝ノ熱スト雖モ大氣中ノ水氣ヲ吸收ノ速ニ濕濡ス故ニ是ヲ亞爾箇兒燒酒モ
大氣中ノ水氣ヲ吸收ノ速ニ濕濡ス故ニ是ヲ亞爾箇兒燒酒モ

ニ投スレバ少モ濕ラズ全乾燥ス故○亞爾箇兒ニ
酒石鹽モ亦剥篤亞斯ニ代用スベシアーレル
固性硝砂硝砂條ノ甚乾テ温ナル者一比ヲ加慢火ニ

テ蒸餾スルノ前法ノ如クメ殆ト乾クニ至ル是ニ
由テ燒酒三十四度トナル是最モ純粹ナル亞爾箇
兒トス是ヲヨク乾シタル硝子壘ニ内固封シ貯ハケ

銳烈燒酒及亞爾箇兒試法

是極テ輕清拂薄風化揮發ノ氣ニ近ク鮮明透澈メ毫ハラシモ粗渣漿濁ナク甚

焰ヲ攝シ易ク氣味燒ハシマツガ如シ羅酒ラフ以廣東新語云^{ハシマツ}云^{ラフ}之云^{ハシマツ}此燒酒之尤烈者是曰火酒又云廣中燒酒皆火酒也亦曰氣酒是ヲ燃モヤスニ烟ナク。

火ニ上テ速カニ煮沸ス○是ヲ匙ニ盛火ヲ點シ燃了タヒ

テ少モ水氣ナク匙モ濕ルノナシ或濕氣ナキ銳藥少許匙ニ内是ニ亞爾箇兒ヌ注キ火ヲ點シハ先亞爾箇兒燃テ後銳藥燃若亞爾箇兒水氣雜レハ亞爾箇兒燃氏銳藥燃ルノナシ或亞爾箇兒六弓許ヲ取テ長頸硝子壘ノ三分ニ充シメ乾淨ノ剥篤亞斯若ハ酒石鹽ヲ焙乾シ一錢ヲ取テ是ニ投シヨク振掉メ傾寫スニ剥篤亞斯少モ濕ラズ或右ノ如久剥篤亞斯等ヲ加テ火ニ上セ殆ト煮沸スル時其壘ヲ取テ振掉スルニ剥篤亞斯等溶化セズ乾テ底ニ沈或高サ五六尺ノ處ヨリ一滴ヲ下スニ盡ク迸散メ少

モ地ニ落ザルハ皆極テ純粹ニメ水氣殆ト脱スル
候トス○此液ヲ硝子壠ニ内水少許ヲ加レバ忽々
色トナリテ自ラ分ルハ油氣多キ候トス○是ニ硝
砂精ヲ滴メ滾動スルハ酸性氣多キ候トス○是ヲ
醋ニ滴メ滾動スルハ亞兒アーリカリ加利鹽多キ候トス
燒酒質古賢云。亞爾箇兒ハ清稀ノ流動物ナレハ水
ヲ以テ其體ヲ成ス。故ニ幾回蒸餾スト雖モ水氣ハ
盡ク脱除スヘカラサル者ナリト。晚近ノ說ニ云。燒
酒ハ亞爾箇兒ニ水ヲ含ム者ナリ故ニ是ヲ焚セハ
水殘ル。亞爾箇兒ハ毫モ水氣ナク唯炭素酸素水素

抱合ノ成ル亞爾箇兒百錢ヲ割解スレハ炭素五十九釐ヲ以テ成ル一錢八分九釐酸素三十四錢三分二釐
水素十三錢七分其炭素ト酸素ハ抱合ノ炭酸ヲ成
ス凡酒類ヲ飲テ酩酊スルハ此炭酸アルニ因ル○
亞爾箇兒ニ火ヲ點ノ焚シ水殘ルトアルハ固ヨリ
是ニ含ム水ニ非ス其焚燒中。亞爾箇兒ノ水素ト酸
素ト抱合ノ生スル水ナリ或亞爾箇兒ヲ硝子壠ノ
半ニ充シメ固封シ貯レハ壠ノ裏面ニ水氣凝テ露
ヲ現ス是亞爾箇兒ノ水素酸素ノ抱合シ生スル水
ニノ微ミモ酒氣ナク蒸餾水ト同シ

燒酒製煉術主用 燃酒ハ製煉術ニ用テ解凝液トシ

諸藥ニ加テヨク其體質ニ鑽透シ其氣味効力ヲ融解シ出スナリ。故ニ植物動物ノ芳香ナル薬品ヲ是ニ浸メ丁幾^{ミシヤ}去爾^{アラル}ヲ製シ或^シ是ヲ以テ蒸餾ノ香竈ノ薬精ヲ製ス。龍涎香、麝香ノ如キ杏竈ノ品ハ格兒^{コル}弗^フ○或華爾斯^{ハルス}技爾撒謨^バ等ニ是ヲ加テ蒸餾油及浸油ヲ製ス。○凡草木類ノ醇厚銳烈ナル薬精假令^{タトハ}迷迭香^{マヌカ}沃刺那^{スイナ}黑栗薩^{リワサ}丁香^{トウカク}桂^{ケイ}等ノ精ヲ製スルニハ銳烈ナル燒酒ヲ硝子壠^{ガラス}ニ内右ノ諸藥ノ蒸餾油少許ヲ加ヘ固封ノ焼處ニ置數振蕩スレバ其油ト燒酒トヨク融和^ハ醇厚ノ精トナリ其藥品ヲ燒酒ニ

テ蒸餾ノ取ル精ヨリハ尤^モ峻ナリ○綠礬油消石精等ニ亞爾箇兒^{アルコール}ヲ加レバ是ヲ以テ其侵蝕酷烈ノ性味ヲ抑制甘和シ一種ノ奇効アル藥液トナル。即チ甘消石精^{ホツフ}忽弗滿鎮痛液^{フジン}亞的兒^{アルカ}ノ如シ○水醋其他酸性ノ諸液油亞兒^{アルカ}加利性ノ揮發鹽ハヨク燒酒ト混和ス○尋常燒酒ニ藥品ヲ浸メ其藥氣融解シ難ク或其質ト混和セザル品類ハ亞爾箇兒^{アルコール}ニ浸セバヨク融解ス諸蒸餾油モ亞爾箇兒^{アルコール}ニハヨク融和ス○凡銳烈ナル燒酒ハ亞兒^{アルカ}加利性ノ諸藥及華爾斯多品ヲ浸スニ宜シ草木ノ乾ケル花葉根皮等ヲ浸

セバヨク其華爾斯及油ヲ融解ス○護謨ト華爾斯
ヲ兼含ル藥品。或趨謨ノミ含テ華爾斯及油ナキ藥
品ヲ浸^スハ水氣多キ尋常燒酒ニ宜シ○藥品ヲ硝
子壘ニ内^イ燒酒ヲ加^ス浸シ其壘ヲ焼處ニ置。或大陽ノ
暖氣ヲ假ラザレバ藥氣融解シ難キ者アリ○禽獸
蟲魚等ヲ亞爾箇兒ニ淹^スシ硝子壘ニ内^イ固封シ貯フ
レバ百歲ヲ經レ疋形質全然トノ腐壞スルヲナシ
主治性熱。慄悍揮發ニノ深ク竄透シ侵刺衝動シ殊
ニ神經ヲ刺戟シ纖維諸管ヲ牽縮收回ノ強壯ニシ
血液ヲ稠厚凝固シ腐敗ヲ遏ム○亞爾箇兒ハ極^メテ

精微揮發ニノ性力殊ニ峻ナリ○燒酒ハ身體ノ諸
液中。水液ト小便ヲ除テ其他ハ皆收斂ノ凝固セシ
ム。卽チ血。乳汁。泌^ス質ノ液ニ亞爾箇兒ヲ滴スレバ
忽チ凝固ス。是ヲ飲服シ若クハ口中ニ含メバ津唾
粘稠トナルヲ以テ知ベシ○燒酒ハ宛毛揮發油ニ
炭酸氣ヲ帶テ竊透ノ收斂スル如ク纖維脉管人弛
緩縱解セルヲ牽縮メ強拘硬固ナラシメ。脉管口人
弛闊セルヲ短縮ノ狹窄大ラシム燒酒ヲ以テ敷肌
膚ヲ洗ヘバ皮硬ク粗糙ニナリテ皺ヲ生ズ。是皮メ
纖維諸管ヲ牽縮メ狹窄ナラシムレバナリ。卽チ外

敷メ創ノ出血或、衄血ヲ止ルニ捷効アルヲ以テ知
ルベシ○燒酒少許ヲ服スレバ神經及、胃ヲ健運シ
鬱塞ヲ閑暢シ蒸氣及、汗ヲ發泄シ血液運行ノ怠慢
ナルヲ進輸シ諸筋ヲ強壯ニシ。瘴疫惡氣ヲ避ク。故
ニ雨濕多々冷氣甚キ時。旅行ヲ爲シ或ハ深山幽谷
等ニ入ルニ臨テ是ヲ服スレバ血液ヲ温煖衝動ノ
蒸氣ヲ揮發シ冒寒傷冷等ノ患ヲ免ル○食後少許
ヲ服スレバ飲食ノ消化ヲ扶ケ或ハ消化シ難キ食
物ヲ用テ停滞シ或ハ胃虛弱ニノ消化シ難キ者ハ
一啜ノ燒酒ヲ服ノヨク消化シ食ヲ進メ風氣ヲ驅

散ス○粘液留飲多キ人ハ少許宛用テ蒸氣及ヒ小
便ヲ排泄シ血液ノ壅滯ヲ閑達ス

禁戒 燒酒ハ内飲外敷ノ効驗多シト雖モ其性能ヲ
察セズ妄ニ用レバ害ヲ爲スト亦少カラズ○蒸餅
泥(麥粉ニ水ヲ加ヘ捏テ泥ト爲ス者)ニ燒酒少許ヲ
和シ壺ニ内蓋閉シ置ハヨク泡釀ス是燒酒ニ炭酸
氣ヲ含ベナリ。斯ノ如キ炭酸ナキ粉麪類ノ食物ヲ
喫メ燒酒少許ヲ服スレバヨク泡熟メ消化ス(諸穀
粉麪ヲ云然庄酸味ノ食物ヲ用テ燒酒ヲ服スレバ逾酸
收ナズ。故ニ消化シ難シ。又燒酒ノ炭酸ハ胃腸ノ纖

維^カ牽縮ノ強壯ニスル故ニ食後少許ヲ服スレバ
其癟釀^カヲ扶^カテヨク消化ス。然^レ是ニ慣^レテ日ニ過飲
スレバ胃腸ノ纖維大ニ牽縮ノ短促シ漸^カク凝聚硬
結メ麻痺不遂シ夫^カノ飲食ヲ消磨シ乳糜ヲ運輸ス
ルニ緊要タル蠕動機轉ヲ爲ス^カ能ハズ。其逾^カ牽縮
シ消磨スルノ餘裕ナキニ至ル。故ニ燒酒ヲ嗜^カ人ハ
飲食ヲ消化シ乳糜ヲ製造スルノ機力漸^カク衰ヘ食
饌日ニ必^カクノ終ニ不食ノ病ヲ發シ或^カ乳糜匱乏メ
營養虧損シ全軀虛羸ノ精力憊極シ斃^カル者亦少^カ

ラズ。或居常剽悍ノ酒齶ヲ用^カレバ是ニ含^カル揮發ノ
精氣ヨク營養メ一旦肌肉充盛顏色壯旺セル者ア
レ^カ是天然資稟ノ強健ナルニ非ズ。日ニ多血ノ禍
胎ヲ釀^カノ暴^カ亡^カル者亦甚^カ多シ。故ニ古人是ヲ馴致
セル獅子ニ喻^カフ。居常愛玩スレ^カ繫鎖ヲ放ツ^カ勿
レ。猛悍ノ性暴卒ニ人ヲ呑ム○燒酒ニ含メル揮發
質血中ニ混^カノ循環スレバ逾^カ剽悍ノ勢ヲ逞^カノ熾熱
ヲ起シ血液ヲ沸騰ノ運行ヲ強盛ニシ。腦ノ運動ト
靈液ノ分泌ト甚^カ急疾ニシ。常調ヲ失ヒ精神錯亂
ス。又其沸騰セル血液腦中ノ血脉ニ盈脹ノ腦及ビ

神經ヲ壓塞スレバ昏睡シ諸筋ノ神經ヲ壓塞スレバ肢體困重痿弱不遂ヲ發ス。其間ニ蒸氣。發汗等ノ諸竅ヨリ酒氣解散シ靈液漸ク回復スルニ至テ醒覺ス。○燒酒ハ眼眩スルヲ殊ニ速ナリ。葡萄酒。麥酒等ハ水氣多クメ其揮發精ノ慄悍氣ヲ緩和スル故ニ。眼眩火シ按ニ本邦造釀ノ米酒ヲ蒸餾スレバ銳烈ノ燒酒出ツ。是酒ノ精氣ナリ。故ニ酒客發スル諸病ト右說ク所ノ燒酒ノ病患ト全ク同シ。

外敷 深ク竊透シ乾燥シ神經ヲ刺戟衝動ノ其端末ヲ牽縮乾固シ知覺運動ヲ失ハシム。又脉管及筋纖維ヲ收縮メ强硬ニシ血液ヲ稠厚ニメ凝固セシム。

○**亞爾箇兒**ハ殊ニ凝體諸器ヲ牽縮強固シ腐敗ヲ遏メ血。乳汁。及ビ沕名イし質ノ液ヲ凝固セシム。故ニ藥性ヲ察セズ。龍腦等。香竈ノ藥精ヲ加テ。唯患部ヲ温煖シ。閉塞ヲ開達シ壅滯ヲ蕩去スル藥トシ過用スレバ害ヲ爲ス。今カラズ。

○眼疾ノ一良藥トス。焮腫眼。翳膜。墮淚眼。晝盲。葡萄膜ノ纖維弛緩瞳孔濶大。或眼瞼緩弛メ外反シ。或上瞼低垂メ蓋蔽入山等ニ外敷メ良効ヲ稱ス。但多ク水ヲ加ヘ稀クシ施スベシ。是ニ由テ刺戟セズ。焮腫眼。其他觸知甚キ部ニ施ス堪ヘ易シ。○痛風。肢節麻痺。

及轉筋等ニ燒酒ヲ溫メ棉布ニ蘸シ蒸湯シ數更換
シ施ノ効アリ或、羯布羅精ヲ加ルモ良。寒粘液質
人咽喉腫懸壅症ノ腫脹メ舌本マデ低垂スル症ハ
燒酒ヲ漱藥トノ治ス。○傷冷毒ノ歎痛ニ施メ捷効
アリ。○凡、搔痒ニ堪ザル症假ト令バ痘ノ落痂或、瘡瘍
類ノ肌膚剥脫赤裸スル等ニテ搔痒ニ堪ザル如キ
ハ乳汁ヲ加ヘ數塗テ速ニ治ス。或、骨傷閃挫。貌僂屈
等ノ久ク縛帶ヲ更換セズノ搔痒甚キ者ハ燒酒ニ
テ洗湯メ速治ス。○久ク卧床ニ在テ腰髋等ノ關節
破脢ヲ生シ焮痛ニ堪ザル症ハ燒酒ニ雞子白ヲ研

和シ塗テ捷効アリ。雞子白乾ケバ宛モ膚上ニ一層
ノ膚膜ヲ被フガ如シ燒酒ハ皮中ノ粘液ヲ稠厚シ
纖維ヲ收固シ患部ノ重壓擦破ヲ防護ス。故預メ是
ヲ施セバ破脢ヲ生セズ。又孕婦ノ臨月以前ヨリ毎
日是ヲ乳頭ニ塗レバ乳頭強固ニメ分娩後乳養ノ
時。乳頭毀傷糜爛ノ患ナシ。○手足等ノ頑硬結腫及
失荀兒陪苦ノ斑ニ白石鹼ヲ燒酒ニ溶カノ數擦リ或
蒸燄メ消散ス。○瘰癧腫人柔ニメ水棉様ナル者及
腺ノ弛緩セルヨリ發スル腺腫ハ燒酒ヲ擦テ殊驗
アリ。○燒酒ハ血液ヲ稠厚凝固スル故ニ總テ堅硬

腫ニ一味施ノ害アリ○脱肛。水液腫。貌僂屈^{レウク}ノ如キ
纖維諸筋ノ括約ヲ失ヒ弛緩セル症。并總テ筋肉ノ
弛弱セル。腫瘍膿瘍ニ施メ甚ダ驗アリ○火傷ノ一
良藥トス。燒酒ヲ棉布ニ蘸メ速ニ貼シ數更換シ
痛止ムニ至ベシ。然ニ患部既ニ黯黑色トナル症ニ
施セバ其毒分利セズ。膿ヲ釀セズ。臭氣ヲ生シ。壞疽
トナルナリ。此症ハ鍼針ヲ以テ刺破スレニ効ナク。
阤^エ日^{デト}多膏ニ燒酒ヲ加貼スレニ膿ヲ釀セズ依然ト
メ乾固ス。故ニ唯軟化ノ効アル軟膏ヲ貼メ化膿セ
シメ其毒ヲ泄泄メ全功ヲ收ムベシ○銃傷モ亦火

傷ト同シ故ニ燒酒ヲ施セバ化膿ヲ妨グ。焮痛ヲ増
シ或壞疽トナル○銳烈ノ燒酒ハ止血ノ捷効アリ。
衄血ニハ是ヲ鼻中ニ吸入シ或水銃ニテ注入スベ
シ。仍治セザル者ハ是ヲ柔^カナル繩^テニ浸シ深ク鼻中
ニ挿入スベシ。但銳烈燒酒及亞爾箇兒^{アルコール}ノ其氣速ニ
風化シ去^ル。故ニ捷ク施スニ非レバ効減ス。尋常燒酒
ハ其氣速ニ耗散セズ。故ニ輕症ハ是ヲ用ベシ○創
傷ノ細血絡ノ出血ニ施セバ其血管ヲ牽縮シ血ヲ
凝固スル故ニ捷効アリ或的列^{レビ}並底那油少許ヲ加
テ良然^レ。大血脉ヨリ出ル血ハ亞爾箇兒^{アルコール}ト雖モ効

ナシ是其脉管ヲ收縮スルノ能ハザレバナリ。或創傷ニ由テ水脉毀傷シ水液滲漏スル症ハ燒酒ヲ施ノ効ナシ。水ハ燒酒ニテ凝固セザレバナリ。故ニ水腫ノ潰瘍瘻瘍等ハ是ヲ施メ効ナシ。○輕キ打撲傷ニ是ヲ施セバ痛ヲ止メ消散ス。但重キ損傷ニ施セバ其細絡破裂ノ脉外ニ溢出セル瘀血ヲ凝固セシメテ疏散セズ筋肉ノ間ニ壅滯スル故ニ外部愈ルガ如シト雖モ一兩月ヲ經テ其諸症再發スル者アリ故ニ打撲傷ハ醋ヲ外敷メ筋肉中ニ泛溢セル瘀血ヲ稀釋溶解シ血脉中ヨリ疏散セシメ。其後是ニ

燒酒ヲ加ヘ施メ其脉管纖維ノ弛緩縱緩セルヲ收固強健ニメ治スベシ。故ニ腫瘍及ビ頑硬腫モ妄ニ多ク外敷スレバ逾血液ヲ凝固ノ消散セザラシム。○閃挫脱臼ハ手術ヲ以テ其骨ヲ故ニ復スヒ氏適宜ニ縛帶ヲ施シ強壯劑ヲ外敷セザレバ腱及ビ韌帶。弛緩虛損スル故ニ其骨復^{モダク}脱出シ或ハ瘦弱シ若ハ不遂スル者アリ。此症ハ燒酒ヲ棉布ニ蘸シ貼ノ縛帶ヲ施セバ速ニ治ス。初速ニ是ヲ施セバ右ノ症ヲ發スル。○燒酒ニ明礬ヲ加ヘ收斂ノ効扶ケテ殊ニ良。○燒酒ハ竄透ノ大ニ刺戟シ血液

ヲ凝固スル故ニ是ヲ焫腫ニ施セバ其症逾増劇ス
然庄多ク温湯ヲ加テ稀^{ウツ}シ蒸湯剤トシ施セバ輕
キ焫腫ヲ消散ス。輕創骨傷閃挫脱臼等ノ焫腫モ是
ニ同シ或硇砂精若ハ羯布羅^{カムラ}精或石灰水ヲ加温メ
施メ殊良○燒酒ハ筋肉ノ弛緩緩弱ヲ收固スル効
アル故ニ創傷潰瘍瘻瘍等ノ膿夥ク漏泄シ或稀膿
多クノ愈難キ症ニ施セバ膿ヲ減シ腐敗ヲ止メ淨
掃ノ乾愈スル偉効アリ一患者肛門ノ邊ニノ瘻
孔アリ水銃ニテ數回燒酒ヲ注輸メ愈ユ乳頭潰瘍ヲ
愈シ凍瘡ヲ治シ且預メ防グニ良但皆水ヲ加ヘ稀

クシ施スベシ否ラザレバ其刺戟ニ堪^ズ或右ノ諸
症甚ダ愈難キ者ハ拔爾撒謨^{バルサム}若ハ的列並底那^ナヲ加
或沒藥盧會^ラ加テ溶シ温メテ數患處ヲ洗淨シ或
棉布或棉撒絲ニ蘸^{タヒ}ノ施シ蓋膏^ハ貼シ繃帶ヲ施ス
ベシ○夏月ノ創大ニ潰爛シ膿夥ク出テ患者羸瘦
虛損シ或潰瘍ノ膿多ク漏泄ノ經久愈ヘズ精力虛
憊スル者ハ幾那ヲ内服シ銳烈燒酒ヲ外敷ノ縛帶
ヲ施セバ精力滋益シ膿漸ク減メ稠厚凝固スル故
ニ其膿ヲ靜脈ニ吸收セズ膿熱ヲ發セス内攻スル
コナクメ治ス但燒酒ハ患部ノ靜脈ニ吸收メ血中

ニ入ル故ニ脉差駄數トナルナリ○骨傷ノ骨腫起
メ柔ナル者ハ燒酒ニ石灰ヲ加ヘ蒸湯劑トシ施メ
消散ス○腐骨疽ニ燒酒ヲ棉布ニ蘸シ貼メ縛帶ヲ
施シ清血劑ヲ内服メ甚タ驗アリ。骨質ヲ強固シ腐
壞ヲ防テ烊解セザラシム或燒酒ノ蒸氣ヲ以テ其
患部ヲ薰蒸メ良効アリ未だ潰破セザル症モ是ヲ
施セバ其氣ヨク竄透メ消散ス○水棉様ノ肉ヲ被
フ腐骨ハ燒酒ヲ棉布ニ蘸シ貼メ速ニ收縮シ硬痂
ヲ結ブ。但尋常ノ燒酒ハ多ク水氣ヲ含ム故ニ銳烈
燒酒ニ宜シ。總テ酸收ノ品ハ骨ノ土質ヲ烊解スレ

バナリ或云酸味ヲ帶ル燒酒ニ骨ヲ淹セバ軟骨ト
ナル○燒酒ハ潰膿腐爛ヲ遏ル効アル故ニ腐骨疽
ハ骨腐蝕ノ碎片トナリ剥脱ノ治スベキ症ニ是ヲ
施セバ化膿ヲ遏テ乾燥シ碎骨ノ剥脱ヲ妨テ治セ
ザラシム○熱壞疽及ヒ腐骨疽ノ汚液多ク出ル症
ニ是ヲ施メ良驗アリ。是筋肉ヲ收固メ強壯ニシ腐
敗ヲ遏レバナリ。龍腦モ亦防腐ノ峻効アル故ニ壞
疽ニ羯布羅精殊ニ驗アリ叔依叔布拔

消癰露

一名驅風精ズビリ秀スカルミナムスセイ
ルヒウス羅コヒイキスピリムス又「穿

背底露

ド・ブーレケンデ・ゲースト・ハ・ンセイルス

製法

桂

丁香

肉豆蔻

一弓

茱沃刺那

洛四錢

胡荽子

一弓

燒酒

十度者

三十二弓

亦改雨水

六弓

山薑

二弓

燒

露

右剉搗浸入刀一日蒸餾

水外取下五十弓

硝子

堊ニ内レ固封シ貯フ

〔校〕

外散瓶

改來冬之出火瓶

水

主治

腦心

胃及健運シ

粘液

寒氣

風氣

蛇蟲等ヨリ起

ル痙痛痞氣鬱蓄

腹肚拘攣

脹痛ヲ治ス

○服量一錢

ヨリ四錢マテ飲液ニ黒服ス

〔校〕

叔

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

又法

的里亞加精

〔校〕

綠礬精

一弓

普燒酒

銳烈者

三弓

右調和シ硝子堊ニ内レ固封シ貯フ

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

主治

風氣痞滯

ノ諸症

腹肚拘攣

脹痛

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

清涼飲

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

尋常清涼飲

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

主治

解毒精

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

〔校〕

右調匀ス毒根

アセトアルデヒド水又蘇打水又鹽酸水又熱湯

主治 健胃驅風發汗利尿ノ良驗アリ○凡丸藥散劑

煉膏等ヲ送下スル飲液トシ用ルニ宜シ疾断

龍亞清涼飲

タルダラキオイヘルガムヘル蘭

龍腦

一錢アラビアガムハ四錢

沙糖

一弓アーチ醋アセトアルデヒド十六弓

右龍腦ニ銳烈ノ燒酒少許ヲ滴メ研末ニ趙謨ニ水四錢ヲ加ヘ溶ノ龍腦ニ研和シ沙糖ニ醋少許宛加溶ノ龍腦ニ加ヘ研合ス淑

主治 疫熱腐敗熱ニ用テ發汗解毒ノ良驗ヲ奏シ衝

逆等總テ龍腦ノ的當スベキ諸症ニ奇効アリ○服量一二匙宛數用フ淑

麝香清涼飲

タルダランキオイトムスクス蘭

麝香

半錢ハーフ薄荷水

桂露

各二弓アーチ揮發香竄精ニ錢

沙糖

四錢

右麝香ヲ沙糖ニ研和シ桂露薄荷水ヲ少許宛加ヘ

終ニ香竄精ヲ調匀スハーフ太ニ武餅一小合ハーフ加ヘ
主治 神經熱ヲ治シ呃逆。搐掣。痙攣ノ諸症ニ奇効アリ。一時若ハ一時半ニ二匙宛用フ淑

又方

麝香

一錢

沙糖

二弓

桂精

四弓

水

十弓

右麝香ニ沙糖ヲ研和シ。次ニ桂精ト水ヲ研合ス。
主治此劑芳烈揮發ノ竄透ニ危篤人搐搦呃逆ニ奇効ヲ奏シ。子宮衝逆。神經病ノ劇症。神思鬱憂病等ニ用テ精神ヲ活潑欣懌ス。服量二匙若ハ三匙寃數用ヒ或ハ臍ニ塗擦ス斯。

壯神清涼飲

桂露

四弓

丁香露

水ニ浸シ蒸餾

スル者

二弓

揮發香竄精

刺賢蛭兒精

各二錢

橙皮舍利別

一弓

右攪和シ二匙寃用ル。日ニ三四次。

主治患者虛羸憊弱。精神虛乏。沈痺。失氣昏曠等。兑

回入

淑

驅熱清涼飲

酒石鹽

二錢

橙汁

濾過スル者

薄荷水

一弓

舍利別

一弓

味陳酸水

二弓

右酒石鹽ヲ橙汁ニ溶シ。沸騰止テ薄荷水。舍利別。水
 ナ攪和ス。

主治 热毒ノ恶心乾嘔ヲ治シ。蒸氣及ビ汗ヲ發シ。諸熱ヲ涼解シ。焮衝性ノ諸症ニ殊効アリ。潤合水

和胸清涼飲

海葱蜜

二弓

趨謨安沒尼亞幾乳

四弓

右調和シ一匙宛用ル。日三二三次。
安沒尼亞幾二錢沙糖二水少許宛加テ研磨シ溶化ス。主
解ノ驅除シ。欬嗽ヲ治ス。二匙宛用ル。日二四次。

主治

粘痰ヲ豁シ欬嗽喘急ヲ治シ。胸中壅塞ヲ開利

大淑味

海蔥蜜

一匙

二匙

三匙

揮發清涼飲

舍利別

二弓

加フ

淑

日

月

年

鹿角鹽 四錢

沙糖 二弓

水 三升

註ス

右調匀ス

主治 汗ヲ發シ。蒸氣ヲ進メ。神經熱、毒ヲ泄泄シ或、冒寒傷冷熱ノ頭痛惡寒ヲ解シ或、勞動甚メ發熱、疲勞。肢節强硬。屈伸不利或、過酒困倦。譖妄或、婦人失血過多虛罷等ニ用ヒ。蒸氣ヲ驅發メ血液ヲ融和シ精力ヲ回復ス。臥床ニ温覆メ一二匙宛用ル。日ニ數次断淑

發汗清涼飲

解毒酸精

解毒精八比

蒸餾醋一比

攪和スル者

六弓

通西醫物考

卷三十一

二十一

橙皮舍利別

三弓

水六ニ比

右調匀ス

主治熱病靈液虛乏。運行微弱怠慢。及胃虛憊セル諸症ニ二三匙宛數用テ蒸氣及汗ヲ發メ病毒ヲ排泄ス。

斯

威脅取申不外大經西醫

病

病

病

清涼湧吐飲

フルタレシデブライクダランキ蘭

韓爾答越黙室

四瓦

舍利別

四錢

水八弓

右調匀ス

主治熱病初發。胃中汚物アリテ熾衝ヲ兼ザル症ハ

此劑半時ニ一匙宛用テ吐ス。度トス。○安質沒扭劑ハ特ニ胃ヲ淨掃シヨク諸竅ノ分利ヲ進輸シ。病毒ヲ排泄ス。

攝絲施那羅

セメン

セドアリア

又セメンサントニ

シ

ロ

ウルカサド

又セヘル

アクトヘベイフート蘭

形狀是小灌木ニモ莖高二三尺許。線楞アリ。枝甚ダ多クノ極ニ分タズ葉纖細ニメ長ク微鋸齒アリ。黃綠色。莖枝ノ兩側ニ排列ス。花小毛茸様ノ小蓇葖穗。穗ノ爲シ裏ニ微細ノ花充ツ。夏月稍長キ細子ヲ結ブ。

滑澤ニメノ黃綠色。此子甚ダ多ク外殆ト莖枝ニ遍シ
舶來ノ品ヲ見ルニ薦ニ似テ莖葉子共ニ不佳ノ氣
アリ。味苦。微辛。此子綠色ヲ帶テ肥實。多ク莖葉花萼
ヲ雜ヘズ。其氣強キヲ擇ベシ。多ク針ノ如キ細梗。毛
様ノ粉屑ヲ雜ルハ下品トス。根鬚多シ。○亞列波產
ノ上品トス。亞列波^{アレボ}ハ亞細亞^{アジア}洲中^{ヨコ}又百兒^{ヒル}西亞^{モロコシ}莫臥^{モロコシ}
兒^{ヒル}鞬靼等東方諸國ノ原野路傍水邊沙地ニ生ス。燒
地ニ新鮮肥實ノ種ヲ下セバ能ク生メ速ニ繁茂ス
或巴爾巴里亞^{バルバリア}等ノ亞弗利加地方ニ產ス。ハ多ク
莖花等ノ粉屑ヲ雜フ。○此藥或艾ノ一種トシ。或青

蒿或亞爾鮮^{アルハン}ノ一種トス。林娜^{リナ}私名是ヲ艾ノ第七種
ニ屬ス。或青蒿子ヲ雜テ偽ル者アリ然ハ青蒿子
ハ淡黃色ニメ甚ダ輕ク^{モミカ}滑ノ如ク苦味微ナリ。ト以
テ是ヲ分ツベシ。真品ハ較肥厚^{モミカ}ノ綠色ヲ帶ビ其
氣強^{モミカ}。○按ニ此藥和漢產未詳ナラズ舶來品ヲ用ベシ
主治子性溫。苦油氣揮發鹽火リ殺蟲^{モミカ}之聖藥トス。腸
子健運シ風氣ヲ驅散シ蟲巢ノ粘液ヲ除キ。小兒蛇
蟲腹痛等其他蟲ノ諸症ニ奇効アリ。但腹肉諸器
焮衝様ノ諸症ヲ兼ル者ハ是ヲ用テ害アリ。大黃

タ加ヘテヨク蛇蟲ヲ下ス。或ハ^{ヤアラ}薬刺巴根^{セシナ}旃那葉^{シナ}ヲ兼用ノ尤良。服量水煎毎日一錢ヨリ四錢まで杳竄ノ藥ヲ加用フ。或ハ水ニ浸シ藥氣ヲ出シ用フ。大抵日ニ一二錢宛用フレバ蟲ヲ下ス細末^{シナ}日ニ一夕ヨリ半錢ニ至ル薄弱ノ小兒ハ此末^{シナ}茶匙ヲ取舍利別或ハ沙糖ニ和シ或ハ適宜ノ飲液ニ加ヘ甘美トシ日二三次用フ。此末^{シナ}用ヒテ大便非夕通利セザル者ハ下劑ヲ兼用シ或ハ殺蟲ノ下劑ニ功用ベシ假令ハ後方ノ如シ^{シナ}前^{シナ}也。此^{シナ}之^{シナ}也。

驅蟲昆設爾弗

攝縣施那^{シナ}末一弓
薬刺巴根^{ヤアラバ}末一日ヨリ一錢ニ至ル
白蜜 一弓半

右調和ノ昆設爾弗ト爲シ小兒ハ一時半毎ニ一茶匙ヲ與フ。但通利ノ多少ニ隨ヒ加減スベシ。大人ハ服用量ヲ加フ或右ノ劑ニ撒兒^{サル}末爾^{マリ}扶斯^{ヨス}二錢ヲ加ヘ大人ハ^タ韓爾答^{タメチ}越^{メチ}默室^{ナカニ}三爻ヲ加用テ蟲ヨリ發スル癪症^{シキ}治シ速ニ蛇蟲ヲ驅泄ス左ノ方亦殊効アリ殊ニ頑固ノ蟻蟲ヲ下ス

攝縣施那二錢

卷之三
盧會二十四兵

撒兒末爾扶斯 煙過ノ白色ナル者
三十六瓦

右調和メ散劑トシ分テ十二服トシ一服宛與ル

日二三次大便通利ノ多少ニ隨テ加減ス
依(度)叔(任)福(物)

攝爾扁答利亞羅
セルペニタリアロ
セルペニタリアヒルギアナ又ア
セルペニタリアロ

アリ。圓莖柔撓ニノ節多ク。勾屈メ蔓延ス。但園ニ培養スル者ハ幹直立ノ蔓様ナラズ葉圓ク稍長ク形常春藤葉ノ如クノ柔ナリ短梗アリ花ハ根ニ傍テ葉根ヨリ生シ萼ナク單瓣ニノ本窄ク末濶ク缺裂ナク稍唇様ヲ爲シ下唇短ク上唇長クメ開展シ狀舌ノ如シ黒綠色或ハ黯藤花色或ハ稀ニ黃色ノ者アリ花後心蕊ノ下底實トナリ形小梨ノ如ク大サ擬指ノ如シ裏ハ縱ニ六房アリテ細小黯黑ノ核多ク疊リ充ツ根ハ幾多ノ長鬚其頂ヨリ分レテ叢束シ屈節多クノ錯綜ス外面赭褐色新鮮ノ者ハ綠色

ヲ帶フ。裏ハ淡白色。香氣龍腦ト纈草ト合シ。夕暉如
シ味微苦辛。香竄様ナリ。此根新鮮ニメ綠色ヲ帶ビ
香氣強キヲ擇ムベシ。或ハ杜衡根ヲ雜ヘテ偽リ敗
ク者アリ。然凡て是ハ黑色ナルヲ以テ分チ易シ。○是
非爾入尼亞邊舍爾法爾加洛里那烘ニ北亞墨利ニ
產ス。

○按ニ此藥和漢產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用
ベシ。或ハ纈草ニ代用スル說アリ。

主治根性温。揮發鹽油アリ。輕ク衝動メ健運シ。蒸氣
及ビ汗ヲ發スル要藥トス。又小便ヲ利シ虛冷ヲ温

メ頭腦神經ヲ強壯ニス。○凡ソ患者精力憊極セル
諸病ニ良驗ヲ稱シ。殊ニ虛脫甚ク脉微細ニシテ診知
シ難キ等ノ症ニ捷効ヲ奏ス。○凡ソ熱病ノ患者虛
弱ニメ病毒排泄セズ。荏苒トノ解ヒガル症及ビ三
日熱ヲ治ス。○惡性熱ノ患者精力虛シ。脉細數。蕩搖
タ定準ナキ症ハ此藥十氏ヨリ半錢マダ數用テ大
効アリ。或ハ是ヲ細末トシ其症ニ隨ヒ麝香。龍腦。阿
芙蓉等ノ壯神藥ヲ擇ム加ヘ用テ速ニ其虛脫ヲ挽
回スル丁甚ダ多シ。○惡性人發斑熱。其他總テ發斑
益兼ル病。或ハ痘瘡麻疹等之虛弱ニメ快發亦難キ

症或ハ精力罷弊ノ發斑消散肉攻スル症モ亦右ノ如ク壯神劑ヲ加ヘ用テヨク發出ス但斯ノ如キ症ハ雜腹蘭丁幾去爾ニ此藥ヲ加ヘ用テ峻効アリ○神經熱及ビ腐敗熱ノ初發ヨリ胃腸ヲ淨掃ノ後此藥ヲ前說ノ如ク用カレバ特ニ其精力ヲ挽回スルノ云大ラズ。血中之病毒ヲ蒸氣及ビ發汗ヨリ驅泄ス。或云幾那ヲ加ヘ殊ニ効アリト然則右人如キ憊極ノ症ハ幾那ニ堪ザレヲアル故ニ日久病性ヲ察メ施スベシ○惡性熱ノ遊走痛ヲ兼川症ハ龍腦末沃刺那ヲ加ヘ用テ大効アリ○此藥ハ發汗ノ殊効

アル故ニ總テ熱病ノ毒漸ク化熟メ汗ヨリ排泄スル症或ハ熱ノ發作ニ適宜ノ發汗ナキ症ニ用テ的効アリ○是ヲ細末トシ煉膏ニ和シ或ハ揮發醇精ノ丁幾去爾トシ。神經熱。腐敗熱ノ虛憊甚キ症ニ用テ大効アリ。假令バ後方ノ如クハ揮發回神飲

揮發回神飲

薄荷水

六弓

橙皮舍利別

一弓

甘草攝爾扁答丁幾去爾

六錢

揮發香竄精

亞的兒 各一錢

右調勻ス。神經熱。腐敗熱ノ患者。精力大ニ虚脱メ死
ニ瀕キ症ハ半時ニ一匙宛。若クハ其餘モ與ヘテ峻
効アリ。○間歇熱ニハ此藥ニ幾那ヲ加ヘ散劑。若ク
ハ浸劑トシ用ヒ。或ハ神經熱。腐敗熱。發斑熱ニハ昆
答刺越兒發根。及ビ鹿角鹽ヲ加ヘ用ヒ。多ク治驗ア
リ。○寒粘液質ノ昏睡病。非不遂ニ用ヒ。間速効アリ
○此藥水煎スレバ揮發香竄ノ藥氣蒸散スル故ニ
散劑或ハ泡劑トシ用ルヲ良トス。散劑ハ半刀ヨリ
一錢マデ一服トス。但末トシ貯レバ効力消散ス泡

劑ハ二錢ヨリ四錢マテ取リ水若クハ葡萄酒八弓ニ
浸シ用フ。或ハ丁幾出_{イシキ}去爾トシ用ルモ良出_{イシキ}次ニ○蝮蛇
咬。狂犬傷。其他毒螫傷ノ解毒藥トシ大効ヲ稱ス。亞
墨利加洲ノ諸國ニ於テハ人常ニ此藥ヲ帶テ諸蛇
ノ毒ヲ解ス。若シ其咬傷ヲ被レバ直ニ是ヲ外敷シ
或ハ内服メ立ニ愈。且其毒再發スルヲナシ_{依福伍}
布_其感_爾扁答利亞子幾去爾_セ患首齶_火蟲_也或_也外固
攝爾扁答利亞子幾去爾_セ患首齶_火蟲_也或_也外固
製法_火攝爾扁答利亞_セ搗碎者_也

古爾千燒酒十五度者更_火六日_也藥_也未_也十

度者更_火六日_也藥_也未_也十

度者更_火六日_也藥_也未_也十

右硝子壘 ニ内 固封 シ 浸ス ト 六日。濃テ薄ヲ去リ聰用ス 括

主治 神經熱。瘡敗熱等ノ患者精力虛脱セルヲ挽回其毒ヲ蒸氣及汗ヨリ排泄シ。發斑等ノ内攻ヲ驅發入肺而峻効アリ。 庚 噎毒再發大熱不退。 庚 毒之輸分。 辛 其炎毒之辨如火屬之數矢飛火墨竹吹散人諸國各醫不入者ニ此藥附帶入蓄。 庚 文殊院。其出毒多而久者此藥之大效也。 庚 大野。 辛 ①熟地黃精根也。葱也。丁幾大爾也。 庚 ②用肉桂枝肉。 庚 ③熟地。

