

遠西醫方名物考

十
三

卷三十四

✕
e 15

499, 2
Em-3
34
No. 1459
12-e-15

葦 26

榛齋宇田川先生著

士篇

遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌



遠西醫方名物考標目

卷三十四

水銀

水銀劑治法括套

升汞

亞括扒瓦埕尼加

升汞水

甘汞

加羅蔑兒

白降汞

遠西名物考

卷三十四 標目



富士川文庫
3301

赤降汞

赤汞消毒丸
驚心驚密堙兒

安質赤汞散

黃降汞

黃汞驅蟲散

越扶屋布斯密涅刺列

越扶屋布斯安質沒扭

斯微甸藥酒方

溶汞舍利別

銀香水

升汞丸

鹼汞丸

溶汞水

過爾託亞溶汞水

赤汞水

溶汞丸



遠西醫方名物考卷三十四

榛齋先生譯述

男

宇田川 榕

榕菴校補

水銀

目

水銀劑治法活套

往古以為徽毒ハ水銀劑ノ吐涎法

ヲ施スニ非レバ根治セズト。晚近ニ至テハ諸明哲

ノ經驗ニ隨ヒ水銀劑ヲ施メ吐涎セザレバ治スル

ヲ逾捷ニメ効驗更ニ確實ナルヲ發明セリ。是吐

涎セズメ水銀速ニ體中ヲ謝去ラズ十分ノ性功ヲ

遲發スレバナリ故ニ水銀劑中ノ吐涎セザル者ヲ

擇用ベシ。然レ凡動モスレバ吐涎スル故ニ時々患者ノ口中ヲ診シ齒牙浮搖。斷腫痛。津唾多キ片ハ速ニ其劑ヲ休ムベシ。○然レ凡水銀劑ハ初メ少許宛用ヒ。漸次ニ服量ヲ加テ稍吐涎ノ候ヲ見スニ至ラザレバ切實ノ効ナシ。是ニ於テ速ニ其劑ヲ休メ其症盡ク去テ後復用ヒ數斯ノ如クノ竟ニ全治ニ至ルベシ。是ヲ一大要鍵トス。○諸症平愈スト雖モ一點ノ惡液遺滯スレバ鬱毒復滋息ノ根治シ難キ故ニ數月ノ間。四日或六日ニ一次前劑ヲ與ベシ。○水銀劑ハ内服シ或外敷メ吐涎セズ大ニ瀉下セズ總テ劑

キ頭眩ナクノ其毒ヲ驅除スルヲ肝要ナリ。効力確實ナル劑ハ甘汞。升汞。華涅滿溶汞散等ナリ。其毒經久頑滯セル症ハ升汞劑効多シ升汞丸。升汞水。斯微甸藥酒方ノ如シ病新ニ發スル者ハ甘汞。華涅滿溶汞散効多シ。○外敷劑亦効用多シ假令ハ腫瘍潰瘍ニハ規吉撒爾弗ヲ施シ咽喉口中ノ諸症ニハ規吉斯麗謨ヲ含漱劑トシ淋疾ニハ規吉撒爾弗ヲ紙捻子ニ塗テ尿道ニ挿スカ如シ。○水銀劑ノニテ治セザル症アリ假令ハ腐骨疽。骨腫。癌樣潰瘍。水棉樣息肉。堅硬腫。久淋等ハ各對症ノ藥劑ニ水銀劑ヲ兼

用スルガ如シ○水銀劑ヲ施スハ飲食ヲ節慎シ殊
 酸味鹽藏ノ品消化シ難キ食物ヲ禁シ起居温煖ニ
 ノ冷氣ヲ避數温湯ニ浴シ時々下劑ヲ用多血家ハ
 刺絡ヲ施シ日常緩和ノ飲劑ヲ用ベシ○患者虚憊
 ノ水銀劑ヲ長服シ難ク或體力充張セズノ病毒排
 出シ難ク荏苒潛滯ノ治セザル症ハ幾那等ノ強壯
 劑ヲ投シ滋養ノ飲食ヲ與テ内托補充シ精力旺盛
 スルヲ須テ水銀劑ヲ用ベシ○古今名哲從來經驗
 シ効用彰著ニノ日常通用セル水銀劑ヲ左ニ舉グ
 升汞 メルキルス・シブリアマラス・コルロシヒス・羅
 フアゲヘヘンデ多イシ又ソットシユレ多イク蘭

製法

水銀

精製者 四弓

消石精

適宜

海鹽

炒乾淨白 者細末

綠礬

陶器内煨過ノ白 色者 各五弓

右水銀ヲ硝子壘ニ内レ消石精ヲ滴ノ水銀盡ク消

化スルヲ度トシ 固水銀十六弓ニ消石精十八弓ヨ
リ二十弓マデ加ヘ微温沙火中ニ

置 水銀ヨク消
化ノ清水ノ如シ 沙火ニ上セ 國慢
徐クニ水氣ヲ蒸

散ノ乾白ノ鹽塊トナルニ至リ海鹽ト綠礬ヲ加ヘ

硝子臼ニテ研和シ頸長ク腹瀾キ硝子壘ノ半ニ充

テ沙鍋ニ内其末アル際マデ沙ヲ被ヒ其壘ノ口ヲ

塞 ナク文火ニ上テ水氣及酸收ノ蒸氣少モ升ラ
サルニ至リ上尖リ下瀾キ紙袋ヲ造テ其硝子壘ノ

口ヲ覆ヒ一時半許ニノ止ム漸武火トシ。壘底通紅トナリ。ヨク升煨シ了テ放冷シ二時半ニノ成ル其壘ヲ毀テ其底ノ赤色ノ渣塊ヲ除キ上部ニ著所ノ潔白光澤アル晶ヲ取り貯フ三

升汞 毒性極テ酷烈ニノ内服外敷共ニ觸ル處穿蝕腐爛シ劇痛ヲ發ス。即チ一二日ヲ服スレバ忽チ咽喉口舌ヲ傷爛シ。胃腸ヲ侵蝕ノ腹痛悶亂シ。速ニ救療セザレバ死スル。礬石毒ヨリ猛烈ナリ。故ニ感觸甚キ人ハ瞑眩少キ水銀劑ヲ用ベシ

主治 頑固ノ微毒。其他經久ノ諸病ヲ治ス。内服劑ハ

斯微ス旬藥酒方ノ條ニ舉ク。外敷ノ腐藥トシ息肉。

頑硬胼胝様肉。疣贅。水棉様肉ヲ消メ結痂セシム。

無花果狀ノ息肉ハ升汞ニ枯礬ヲ加水煮テ其液ヲ

取り棉布ニ蘸シ數貼メ消散ス。額ニ惡性ノ腫瘍

ヲ發シ經久治セズ諸水銀劑モ効ナキ症ニ升汞ヲ

軟膏ニ和シ貼メ全治セリ。升汞ニ阿芙蓉少許ヲ

加ヘ軟膏ニ和シ貼スレバ劇痛ヲ發セズ。腐藥ト

爲スニハ硬膏ヲ攤テ正中ニ一孔ヲ穿チ其孔ヲ腐

蝕スベキ處ニ當テ貼シ升汞末ヲ糊ニ加ヘ丸藥ト

ノ其孔ニ容レ蓋膏ヲ貼シ置ハ五時許ニ腐蝕ス

○升汞礬石等ノ侵蝕毒ヲ内服メ危劇ノ諸症ヲ發スル者ハ速ニ油脂類家猪脂或乳汁ヲ多ク用テ吐セシメ且其酷厲毒ヲ包攝甘和シ又下劑ヲ用ヒ瀉下メ後數日乳汁ヲ温服スベシ

亞搗批厄埤尼加羅 ベイテンデウトル蘭

製法

升汞

半錢

石灰水

一比

右研和スレバ黄色トナル。是ヲ硝子壘ニ内貯ス方升汞一月或二十五日ヲ取リ石灰水一比ニ溶化ス。一方升汞一月ヲ蒸餾水一弓ニ研和シ石灰水一比ヲ攪勻ス

主治 是ヲ棉撒絲ニ浸シ外敷メ膿ヲ排ヒ腐穢ヲ祛

テ乾愈スル峻藥トス。故ニ膿腫潰瘍穿蝕腐爛惡厲臭穢ノ瘡瘍ヲ治シ殊ニ汚液敗膿多ク出ルヲ乾愈ス。○徽毒潰瘍ヲ治スル良藥トス。龜頭潰爛疳蝕等ノ膿ヲ排ヒ腐壞ヲ過テ乾シ或咽喉腐爛ニ漱藥トシ施ス。一ニ二週。眼眩ノ害ナク全愈ス。○洗藥トシ施メ頑固ノ傳染瘡瘍及疥癬ヲ乾愈シ蟲ヲ殺ス。○輕キ侵蝕藥トシ外敷メ息肉潰瘍中ノ贅肉ヲ除キ腺腫骨腫ヲ消ス。悍キ侵蝕藥ト爲スニハ升汞ノ量ヲ増シ蒸餾水ニ溶シ或硃砂ヲ加ヘ施メ峻効アリ。○此劑ハ乾愈ノ効多キ故ニ潰瘍等ノ病毒惡液多

ク體中ニ蘊蓄セル症ニ過用スレバ其毒潛伏内攻
ノ險症ヲ發スルコトアリ故ニ對症ノ藥劑ヲ用テヨ
ク鬱毒ヲ驅除ノ是ヲ施スベシ○升汞半錢ヲ蕃薇
露ニ溶化シ洗藥或塗藥トシ疥癬侵蝕瘡等ヲ治ス
此劑羅甸名「ア多」ヂヒノ「ヘル子リ」和蘭
名「ゴッテレイキ」多トル「ヘル子リ」ウス
升汞水 「ア多」メルキリウス 羅甸 斯 西

製法

升汞 一錢 蒸餾水 二比
右研和ス〔按〕ノ一方、硃砂 此劑ヲ以テ亞括扒瓦埵尼
加ニ代用ス。石灰水ニ溶セバ升汞多ク壘底ニ沈ム
故ニ水ニ溶スヲ尤良トス〔按〕○福云此劑ヲ亞括扒瓦埵尼加ト名ク

主治 外敷ノ水棉様潰瘍ヲ輕ク侵蝕ノ消化ス○惡

厲潰瘍。頑固ノ腺腫。骨腫。諸傳染瘡瘍ニ洗藥トシ施

ノ捷効アリ○此劑ニ水ヲ加稀クシ施ノ潰瘍ヲ淨

掃シ腐爛ヲ過メ乾愈ス○潰瘍ノ汚液敗膿多ク漏

泄スル症ニ此劑ヲ棉撒絲ニ浸シ温貼ノ膿ヲ排ヒ

乾ノ肉ヲ生ス○微毒ノ咽喉腐爛ニ玫瑰蜜ヲ是ニ

加ヘ漱藥トシ殊効アリ○頑癬及癩人洗藥トシ乾

愈ス○頑固ノ焮腫眼或焮腫赤爛或角膜星翳斑

點。翅肉努肉等ヲ除クニ升汞一兵ヲ蒸餾水四多ニ

溶シ數患處ニ點スレバ凝固ノ惡液ヲ溶解メ消散

ス○眼瞼攣急ノ緊閉シ開クヲ能ハザル症ハ此劑
 二阿芙蓉少許ヲ加ヘ布片ニ蘸シ貼メ治ス○升汞
 一ハヲ大麥煎一多ニ溶シ玫瑰蜜ヲ加ヘ外敷スレ
 ハ刺撃セズ疼痛ヲ發セズ其効升汞水ト同シ

甘汞

メルキリウス・ドルシス・シブリ
 マチス・ローアル・ステクウク・ラン

製法

升汞

一此

水銀

精製者

九多

右升汞ヲ硝子臼

或ハニ

内

硝子杵

或ハニ

テ

研磨

極細末ト爲シ水銀ヲ加ヘ亞爾肯兒以許宛滴メ

是研

飛散セザルナリ研和スレバ水銀星ナク黒灰色トナリ

漸熟研スルニ隨白色ヲ帶ビ性緩和トナルナリ

研得

磨中其氣ヲ口鼻

是ヲ頸潤ク短キ硝子壘ニ内テ三

分一充其口ヲ紙ニテ塞

沙鍋ニ内

其末

アル際

マデ沙ニ埋

上テ一茶頃後磁器ニテ其口ヲ蓋閉シ

漸火ヲ加テ

半時餘ニシテ更ニ武火トシ其劑盡升煨ノ上部ニ著

ニ至テ放冷シ

或云武火ト爲テ四分時

其壘ヲ毀テ

升煨セル堅固ノ晶ヲ取細末トシ

或其壘底ニ赤末

銀ノ細珠ヲ雜テ頭ニ著テアリ俱ニ是ヲ除

去ベシ但此劑ヲ研磨スルニ銅器ヲ忌ム是ニ其一

倍ノ蒸餾水ト十分一ノ硝砂ヲ加テ研和シ磁鍋

ニテ煮テ八分時ニシテ其水ヲ傾去リ又蒸餾水ノ沸湯

ニテ淘洗スルヲ二三回ニシテ試ニ其末少許ヲ取石

灰水ニ投ノ黄色若^モハ白色ノ渣ヲ見ス^トナキニ至
 テ其末ヲ取^リ微火ニ乾^カシ硝子壘ニ内固封シ暗處ニ
 貯^ル是升汞ニ水銀ヲ加^テ研磨シ升煨スルニ由^テ其
 質ノ鋸利ノ鋒尖鈍挫メ柔滑トナル故ニ升汞ノ酷
 烈侵刺ノ味盡消スルナリ^技 ○右ノ如ク升煨スレ
 氏或水銀全然トノ升化セズ細珠トナリテ其晶中
 ニ間錯スル^{コト}アリ是ハ破碎メ其水銀ヲ分去^ルヘシ
 ○升汞ハ水銀升化ノ峻酸質トナル者ナリ甘汞ハ
 升汞ニ水銀ヲ加^テ再升煨メ半酸質トナル者ナリ往
 昔ハ^{オモヘラク}以爲甘汞ハ數回升煨スルニ隨^テ甘和シ良性

ニノ危懼ナキ藥トナル即升煨三回ニノ甘汞ト名^ク
 ケ六回ニノ加^カ羅^ロ兒^ニト名^ク加^カ羅^ロ兒^ニト名^ク九回ニ
 ノ^ハ那^ナ設^セ亞^アト名^ク或云升汞ニ水銀一倍ヲ加^テ研和
 ア^ル堅固晶塊ヲ成ス數回升煨セ^バ性甘和ナ
 ラス^ノ升汞ノ酷厲ナル味アリ若^シ常^ニ舌ヲ侵刺ス
 ル者ハ尚^ホ一兩^ニ升煨ス^レハ^ハ但^シ數回升煨然^レ右ノ
 スルニ隨^ヒ瀉下ノ効減^ルノ發汗ノ効多シ然^レ右ノ
 如ク數回升煨スルニ隨^ヒ升汞ノ質減損スルノニ
 ニテ其性必^ズモ變化セザル^{コト}近世製煉家ノ發明ス
 ル所ナリ故ニ唯一回升煨メ沸湯ニテ其粘著セル
 酷烈ノ酸收質ヲ洗淨スルヲ最良法トス
 主治 升汞ニ比スレバ性緩和ナリ輕^ク瀉下シ膠粘液

ヲ溶解稀釋ノ驅泄シ。微毒ヲ治スル良劑トス。一切
微毒諸症ニ通用ノ瞑眩少ク劇症ヲ發セズノ良効
ヲ奏ス。○頑固ノ瘡瘍。疥癬。頭瘡等皮膚病ヲ治スル
ニ多用フ。發汗劑ヲ兼用ノ殊良。或、其毒潛伏内攻セ
ルヲ驅發ス。○諸獸咬傷ニ因テ痙攣發狂スルニ殊
効アリ。○咽喉ノ粘液腫。癰癰。諸腺ノ硬腫及關節痛
ヲ治ス。○蛇蟲ヲ殺シ驅泄ス大人ハ一、二匁ヨリ五
六匁ニ至ル。但時々下劑ヲ用テ吐涎ヲ防ヘシ小兒
ハ半匁若ハ一匁ヲ苦味ノ越幾斯ニ加丸藥トシ毎
日一服宛兩次用フ。○蟲症ニ後方捷効アリ。

驅蟲甘汞錠

甘汞 細末

蘇甘沒扭謨

細末

沙糖

右調勻シ亞刺比亞趨謨漿ヲ適宜ニ加テ研和シ甘
汞二匁ヲ含ル量ヲ一錠ト爲シ風乾ス。一、二歳ノ兒
ハ毎日一錠ヲ與タ。大人ハ日二三錠宛用フ。○甘汞
ハ癩症ニ良効アリ殊ニ蟲ヨリ起ル癩ニ良。幾那ヲ
加ヘ煉膏トシ用フ。○下劑ニ加テ粘液停水ヲ驅泄
ス。故ニ粘液質ノ人ニ用テ粘液壅滯ノ諸症ヲ治シ。
水腫。粘液腫。留飲病ニ偉効アリ。○水腫ニ朝夕三匁

宛用テ微吐涎ノ候ヲ見スニ至レバ粘稠液ヲ稀釋
シ小便ヲ利ス。但吐涎スルキハ此藥ヲ止テ下劑ヲ
用ヒ停水ヲ滌除スベシ。○水腫ニ後方殊効アリ

驅水甘汞散

甘汞 十二匁 大入 沙糖 一四匁 液 服ス ○甘汞

右研和シ分テ三服トシ一時ニ一服宛飲液ニテ送
下ス。大便秘スル者ハ葯刺巴ノ華爾斯一二匁ヲ加

○粘液腐敗液アリテ肢體瘦削スル症其他膠粘ノ
病毒惡液内部ニ頑結セル經久沈滯ノ諸病ヲ治ス

○黑障眼ニ甘汞ヲ内服シ或一匁ヨリ六匁マテ沙

糖ニ研和シ鼻中ニ吹テ嚏藥トシ間奇効アリ ○此

藥ハ蜜或沙糖ニ研和シ或煉膏散劑丸藥トシ或適

宜ノ飲液ニ和シ用フ。過用スレバ吐涎スル故時々

下劑ヲ與ベシ ○服量一二匁ヨリ六七匁ニ至ル。或

十五匁マテ用フアリ 小兒ハ四分匁ノ一ヲ沙糖ニ

加用フ。或一錢ヲ八十丸トシ小兒ハ三四日毎ニ年

數許宛用フ。但殺蟲ニハ毎日二丸宛用フ ○或丸藥

トシ甘汞量三匁宛朝夕用テ吐涎ノ候アル片ハ是

ヲ休テ下劑ヲ用フ。或甘汞一二匁ヲ蝸蝓石ノ末ニ

加適宜ノ服量トシ日一服宛用テ蠱毒諸症ヲ治ス

○吐涎セシムルニハ五六片ヨリ十片マデ一服ト
 シ日二三服用フ或ニ片ヲ取玫瑰昆設爾弗一錢ニ
 研和シ一服トシ日二三服用フ○或甘汞一片ヲ沙
 糖十片ニ研和シ一片ヲ取テ數鼻中ニ吹テ嚏藥ト
 シ徽毒等ノ頭痛ヲ治ス○瀉下スベキ症ハ下劑ニ
 加或其症ニ隨ヒ阿芙蓉龍腦幾那金硫黃ヲ加用ヒ
 或尖鳩答雙鸞菊等ノ越幾斯劑ニ加用フ○徽毒淋
 ハ甘汞ノ末ヲ大麥煎ニ溶化シ水碗ニテ尿道ニ注
 入スル一日一兩次甚驗アリ○疥癬等一切瘡瘍惡
 性ノ潰瘍ヲ乾愈スルニハ甘汞ヲ軟膏或脂油類ニ

研和ノ外敷シ或大麥煎ニ溶化シ洗藥トシ施スベシ
 但預メ内服劑ヲ用ヒ其毒ヲ驅除ノ後乾愈スルニ
 非ザレバ内攻メ險症ヲ發ス○高燥ノ地ニ住人ハ
 水銀劑ノ瞑眩少シ卑濕ノ地ニ住者ハ是ニ久ス○
 甘汞ハ性緩ナル故ニ徽毒深重痼滯シ諸症險惡頑
 結セル者ハ全功ヲ收メ難シ○或云甘汞ヲ用テ大
 吐涎シ或烈キ下利腹痛ヲ發スル者アリ或膽液
 腐敗ノ酷厲毒ヨリ發スル吐瀉病或神經熱等ニ奇
 効ヲ稱スレ凡皆効ナクノ害アル者多シ
 加羅蔑兒 蘭 カロメラス 羅

製法

甘汞ヲ取細末トシ硝子壘ニ内沙火ニテ
 升煨スル_一六七回或十回ニ至ル_{或云八九回}其實
 微透亮潔白或黃色ヲ帶ビ毫モ鹽樣侵蝕ノ味ナク
 舌ヲ刺戟セズ石灰水或酒石液ニ溶スト雖モ黃色
 トナラズ_{或云上好ノ}甘汞亦然リ是ヲ加羅蔑兒トス○右ノ如
 ク數升煨スルニ隨ヒ其性逾緩和トナリ瀉下ノ効
 減メ發汗ノ効多シ

主治 此劑ハ性最緩ニメ微毒諸症ヲ治ス故ニ患者
 虛弱ニメ峻攻ノ水銀劑ヲ投シ難キ症ニ的當トス
 ○膠粘液水樣液ヲ稀釋シ諸管ノ壅塞ヲ開通シ微

毒ヨリ發スル腺ノ壅結硬腫瘰癧便毒淋疾ヲ治シ

其他總テ腺ノ壅塞硬腫ヲ疏散シ殊ニ肝ノ硬腫ヲ

消散ス○疥癬惡性頭瘡經久潰瘍ヲ治シ蛇蟲條蟲

ヲ殺ス○解凝稀釋ノ峻効アルヲ以テ服量少許宛

用テ内藏諸器ノ壅塞ヨリ發スル頑固經久ノ諸病

ヲ治ス○飲食多ク噎塞シ或咽ニ下レハ必ズ吐ス

ル症膈ニ是ヲ用テ間奇効アリ此症ハ胃管若ハ胃

ノ諸腺壅塞ノ頑硬結腫スル故ニ此藥ヲ用テ漸其

硬結ヲ溶解疏散スルハ嚙下ノ機轉故ニ復ノ飲食

梗阻セズ○經久ノ眼疾内障殊ニ黑障ニ此藥少許

死用テ奇効アリ。是眼中ノ筋膜細管ニ壅塞ノ凝結
 セル惡液ヲ稀釋ノ疏散スルニ因ル。○頑固ノ痛風
 傷冷毒痛ニ此藥或甘汞少許宛用テ患部ニ凝結セ
 ル惡液ヲ疏解排泄ノ大効アリ或蘇甘沒扭謨或葯
 刺巴華爾斯ヲ加用テ殊捷効ヲ稱ス。○痙攣ノ運動
 ヨリ發スル疝腹痛ニ此藥少許宛用テ効多シ。○此
 藥二三匁ニ龍腦少許ヲ加用レバ其揮發精微ノ氣
 ヨク此藥ヲ啓導ノ微細ノ脉管ニ竄行スル。○恰モ
 翅ヲ添ルガ如シ故ニ前説ノ諸病ニ殊効アリ。○此
 藥ハ利水ノ一良劑トス。水腫ニ少許宛用テヨク粘

液停水ヲ溶解稀釋ノ小便ニ驅泄ス。下利多キ症ハ
 阿芙蓉少許ヲ加ベシ但患者ノ天質病性起因ヲ考
 究ノ施シ肝要ナリ。○頭水ニ此藥ヲ内服シ規吉撒
 爾弗ヲ擦リ擦法前吐涎セシメテ大効アリ。水腫及
 腹水モ亦吐涎ニ因テ大効ヲ得ル。近來名哲發明
 スル所ナリ。○服量六匁ヨリ半錢ニ至ル。或云十匁
 若ハ十二匁ヲ煉膏ニ和シ夜中臨卧ニ與翌日下劑
 ヲ用フ。○此藥ニ金硫黃ヲ等分ニ加テ研和シ用テ血
 中ノ鬱毒惡液ヲ除キ峻効アル清血劑トス。叔揚叔
白降汞 メルモリウス。ペレシヒタラス。アルビ羅
ウイテ。子デルゲ。アロフ。テ。クウイ。ク。蘭

製法

升汞

硝砂

各等分

右蒸餾水ヲ適宜ニ加テ溶化シ刺鴉亞斯ノ灰汁精製判鴉亞斯一ヲ蒸餾ヲ滴メ其底ニ白末沈ニ微黄色ヲ帶ルニ至テ其末ヲ取り蒸餾水ニテ洵洗シ紙上ニ撒シ陰乾シ硝子壘ニ收メ貯フ

又法

水銀

精製者

消石精

適宜

國水銀六ヲ消石精一トマデ用フ

右水銀ヲ硝子器ニ内消石精ヲ滴シ加テ水銀盡溶化シ澄清ノ液トナルヲ度トシ國煖處ニ置テ溶化蒸餾水ニ二十ヲ加テ用フ

化水ヲ加テ攪和シ紙ニテ漚テ渣ヲ去リ別ニ蒸餾水ヲ取十分一ノ海鹽ヲ加ヘ是ヲ右ノ液ニ滴シ加レバ忽チ濁テ水銀其底ニ沈ニ白末トナル。逾其水ヲ滴メ水銀少モ沈マズ其液澄清トナルニ至テ徐々ニ其液ヲ傾ケ去リ其白末ヲ取テ水ニテ數洗ヒ其水少モ鹹酸味ナキニ至テ其末ヲ取リ紙上ニ撒シ陰乾シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ。此藥偽品アリ。此末少許ヲ取テ炭火ニ投シ其實盡ク消散ノ必モ殘ル者ナキハ真品トス。酷厲毒少シ。然レ

主治

赤降汞ニ比スレバ性緩ニシテ酷厲毒少シ。然レ

瀉下及湧吐ノ効アリ。微毒及粘液病ニ良驗アリ。長服スレバ吐涎ス。○此藥二匁ヨリ十匁マデ丸藥トシ用フ或三匁ヲ沙糖九匁ニ研和シ毎日用ルハ瀉利シ或稍吐涎ノ細管及諸腺ノ壅塞ヲ開達シ粘稠液ヲ溶解シ疥癬類淋疾其他微毒ノ諸症ヲ治シ蛇蟲ヲ殺ス。○此藥一錢ヲ取軟膏一匁ヲ和シ外敷メ微侵蝕シ乾燥ス疥癬類頭瘡疥瘡惡厲ノ潰瘍小胞癢痒等一切皮膚病ヲ消散ス但頑固ノ疥癬類ハ内服劑ヲ用テ其毒ヲ驅除メ後外敷劑ヲ施スベシ。○面部鼻耳等ノ小胞膿腫乾癬汚斑汗皰等ハ此藥ヲ

批顏料ニ加擦テ消散ス。○瘡疥乾癬等一切皮膚病ニ後方ヲ擦テ捷効アリ。

治癬薔薇膏

白降汞 一錢 家猪脂 二匁

薔薇露 五匁 薔薇油 適宜

右研和ス

赤降汞 羅口子

製法

水銀 精製者 消石精 各適宜

右水銀ヲ磁器ニ内徐々ニ消石精ヲ滴メ水銀盡ク消

化シ澄清ノ液トナルヲ候ヒ硝子格兒弗ニ内燒テ

覆^レ接際^ヲ塗封^シ承^餾壘^ニ水^一二^勺許^ヲ内^レ格^兒
 弗^ニ接合^シ其合際^ヲ塗封^セズ^メ爐^ニ上^セ初^メ文火^ト
 シ漸^火ヲ加^テ煮沸^ノ火候^ト爲^ス其液乾固^メ白色
 トナル^是ニ於^テ漸^火ヲ增^スキハ消石精^ノ蒸氣^ニテ
 曇^{タル}格^兒弗^漸清澄^ニメ透見^シ其裏^ノ藥料盡^黯
 赤色^ノ光彩^{アル}凝塊^トナル^ニ至^テ放冷^シ格^兒弗^ヲ
 毀^テ其塊^ヲ取出^シ硝子壘^ニ収^メ固封^シ貯^フ此
 卽^チ赤降汞^{ナリ}但^シ火候極^テ烈^ケレバ復^タ流動^ノ故^ト
 水銀^トナル^故ニ是^ニ意^ヲ用^ベシ○此藥ハ消石精
 ノ酸臭^{アル}故^ニ是^ヲ陶埴^ニ内^レ煨過^メ絶^テ消石精

ノ氣ナキ^ニ至^是ニ十倍^ノ蒸餾水^ヲ加^テ暫^ク煮^テ終^ニ
 火上^ニ於^テ燧^ヒ旬^テ堙^シ羅^偶少許^ヲ加^ヘ微火^ニ上^セ
 置^フ一^二時^ニメ消石精^ノ臭氣盡^消スル^ニ至^リ其
 末^ヲ取^リ數^{温湯}ヲ注^テ淘洗^シ陰乾^メ硝子壘^ニ收^固
 封^シ暗處^ニ貯^フ 羅^旬名^ハヘ^イダ^ラル^ゲイ^ルス^カル^シナ^タス^シ和^蘭名^クウ^イク^カキ^セ
 此劑^ハ溶解^スヘ^キ酸收^ヲ脱除^スレ^バ固^ヨリ侵
 蝕^藥ナ^レバ多^ク外敷^ニ用^フ○大抵水銀六^勺ヲ以
 テ赤降汞七^勺許^ヲ製^ス 按
 又法 水銀精製者 消石精 各適宜
 右水銀^ニ消石精^ヲ滴^メ盡^{消化}スル^ヲ度^トシ磁鍋

ニ内煮熬ノ乾白ノ鹽塊トナルニ至リ研末シ硝子
 ノ格兒弗ニ内燼ニ上セ漸火ヲ増シ初蒸氣升テ
 格兒弗曇ル者漸清澄ニ透見シ殷紅ノ光澤アル
 塊トナルニ至テ是ヲ取リ硝子曇ニ收貯ス
 ○此藥ニ鉛丹ヲ加ヘ降服ノ偽造スル者アリ其試法此
 藥少許ヲ鐵匙ニ内火ニ上セ通紅ト爲セハ盡消散
 ノ殘ル者ナキヲ眞品トス否ラザル者ヲ偽品トス
 或此藥ニ醋ヲ加ヘ微温火上ニ置テ其醋ニ甘味生
 スルハ鉛丹ヲ加ヘテ偽造スル者ナリ
 [主治] 白降汞ニ比スレバ性峻ニ多ク侵蝕シ酸收ヲ

含テ多ク甚乾燥ス○徽毒諸症ニ毎日一二分宛内
 服ノ良驗ヲ稱ス○毎日四分マデ用テ吐涎藥トス
 然レ動モスレバ瞑眩甚キ故ニ是ニ燒酒ヲ久ク
 點シ焚ス下三四次ニ用レバ瞑眩セズ○或一晝
 夜ニ五分マデ用テ良効ヲ稱スル説アレハ間劇症
 ヲ發スル故ニ多ク服スル下稀ナリ○近來ハ服量少
 許宛内服ノ經久徽毒諸症ニ峻効アル一藥トス○
 半分ヨリ二分マデ制酸藥蜚石 蠟殼等ニ調和シ龍腦少
 許ヲ加煉藥トシ用テ徽毒ノ咽喉腐爛ニ大効アリ
 ○經久頑滯ノ徽毒諸症ニ左ノ丸藥殊効アリ

赤汞消毒丸

赤降汞 五匁 蒸餅心 沙糖 各二錢

右研和ノ九十丸トシ甘草末ヲ衣トシ三丸宛服ス
ル下日三次九丸ニ赤降汞半匁ヲ含メリ。失苟兒陪
苦ノ病ナキ人ハ右ノ服量ニテ害ナシ。若シ吐涎ノ
候ヲ見ス片ハ此藥ヲ止メ下劑ヲ用ル下一兩次吐
涎ノ候ナキニ至テ服量ヲ減シ復用ベシ但水銀劑
ノ瞑眩少キ人ハ右ノ服量ヲ倍シ或其餘モ用ベシ
○頑固ノ黴毒ニ因テ肢體疼痛關節腫痛黴瘡潰
瘍等ヲ發スル者ハ扶歇蘭度名後方大効ヲ稱ス

安質赤汞散

安質アンテモ沒扭ムク 二錢 赤降汞 一匁

右研合ノ細末トシ分テ八服トシ朝夕一服宛用漸
服量ヲ加テ吐涎ノ候ヲ見スニ至リ。此劑ヲ休テ下
劑ヲ用其候ナキニ至テ復用ベシ。又土茯苓薩撒弗
刺斯等ノ煎劑ヲ兼用スベシ○此藥外敷ノ侵蝕乾
燥ノ功アレ升汞ニ比スレバ性緩ニメ必モ疹ヲ
發セズ黴毒潰瘍ヲ溶解シ化膿ノ藥トス。息肉水棉
様ノ腐肉硬腫及瘡邊胼胝様ノ硬肉ヲ徐々ニ侵蝕
消化メ結痂スル輕キ腐藥トス○此末ヲ硬膏ニ摻

ケ貼シ或枯礬ヲ加テ摻貼シ或軟膏ニ和シ或蜜ニ
 研合シ貼ス○此藥ハ峻腐ノ効ナシ多ハ拔實栗格
 謨膏ニ加貼メ黴毒潰瘍其他汚穢腐爛ノ潰瘍腐肉
 惡厲ノ瘡瘍ヲ稍侵蝕メ淨掃シ良膿ヲ釀メ治ス○
 黴毒ノ脂肉様ノ潰瘍其他經久潰瘍ニ是ヲ摻ケ或
 軟膏ニ和シ貼メ淨刷シ治ス○此藥ヲ陋日多膏ニ
 和シ枯礬少許ヲ加腺腫ニ貼メ凝結ヲ溶解シ潰破
 セシム○此藥ニ乃ヲ取蜜或軟膏一弓ニ研和シ瘰
 癧腫其他腺ノ硬腫ニ擦バヨク溶化メ焮腫シ終膿
 ヲ釀ス凡腺ノ焮腫メ化膿シ難キ症ニ殊効アリ是

腺ノ凝固セルヲ溶解軟化スレバナリ鼻痔等ノ息
 肉ハ日一次此膏ヲ塗ハ息肉少許死碎テ膿ヲ成シ
 流テ治ス或惡厲頭瘡ニ毎夜此膏ヲ塗テ治ス但水
 銀劑及下劑ヲ内服メ其毒ヲ驅除メ後外敷メベシ
 或經久疥癬瘡疹類ニ塗テ治スル下白降汞ニ勝リ
 ○此藥ニ枯礬上蜜ヲ和シ貼メ潰瘍ノ胼胝様肉ヲ
 消ス○頑固ノ焮腫眼及其膿流泄スル症或眼眦赤
 爛焮腫或角膜星翳膜翳等ニ此末ヲ患處ニ點シ或
 家猪脂若乳汁研和シ點メ焮腫ヲ消シ翳膜ヲ咬
 斷メ治ス○赤降汞枯礬等分ニ研和ス是ヲ整ヒ篤

密瑛兒 ト名ク疣贅息肉ニ摻テヨク消化ス但甚ク

惡厲ニノ癌性ノ息肉硬腫ニハ害アリ 布侯揭拔亞

黃降汞 「五ルヘチム」ニ子ラレシ羅「子好ラレ」

製法 水銀精製者ニ多ク 綠礬油 四多

右水銀ヲ硝子壘ニ内綠礬油ヲ加テ爐ニ上セ漸次

ニ火ヲ加テ水氣ヲ蒸散スレバニ品自混和ノ白色

トナル。終ニ武火トシ盡ク乾固シ火モ烟氣蒸升セ

ザルニ至レバ雪白色トナル。是ニ多ク蒸餾水ノ沸

湯ヲ加レバ 侯ニ十倍餘 忽チ黃色ノ粉末トナル。是

ヲ硝子白ニ寫シ湯ト共ニ熟研シ靜定ノ上清ヲ傾

ケ去リ數蒸餾水ニテ淘洗シ其水少モ味ナキニ至

テ紙上ニ撒シ陰乾シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ 匣

此劑ハ右ノ如クヨク淘洗セザレバ綠礬油ヲ含ム

故ニ腐蝕ノ性峻ニメ内服ニ用難シ 下

主治 吐下ノ峻劑トス血中ニ入バ吐涎ス故吐下或

吐涎ノ微毒ヲ治スルニ用フ○服量少許宛用レバ

吐下吐涎ノ瞑眩ナク其効大抵白降汞ノ如シ○微

毒頑固ノ諸症殊骨ニ侵襲スル症ニ用テ其毒ヲ變

化シ治スル峻効アリ此藥ニ阿芙蓉等分ヲ加二氏

ヲ一丸トシ日一丸宛用ヒ或日兩次用フ○微毒畢

丸腫ノ毒ヲ除クニ偉効アル一藥トス○壯實ノ人
微毒瘡瘍皮膚ノ諸症或腺ノ頑固ノ壅塞硬腫ニ奇
効アル藥トス又微毒淋疾ノ汚液流泄スル症ヲ治
ス○水腫其他經久沈滯ノ病ニ用テ間大効アリ○
服量一匁ヨリ二匁ニ至ル或六匁マデ用テ瞑眩ナ
キ者アリ然レ過用スレバ劇症ヲ發ス○此藥殺蟲
ノ峻効アリ後方ヨク蛇蟲ヲ殺シ大便ニ下ス

黃汞驅蟲散

黃降汞 五匁
藥刺巴 末 二匁
淨白者 一匁
砂糖

右硝子臼内ニ研和シ散劑トシ分テ五服トシ朝夕
一服宛用フ

越 挾屋布斯密涅刺列

羅ニ子ラールヒルヲ左レビト
又クウクシルフルモル藤

製法

水銀 精製者

硫黃華 各等分

右硝子臼或石臼ニ内水少許ヲ加硝子并ニテ熟研
シ水銀星ナクメ黑色トナルニ至ル
其他火氣ヲ
用テ製スル方アレ凡皆良法トセズ

主治

性酷烈ナラズ臭味ナク内服ノ乳糜管吸收管
等ニ滲入セズ血中ニ運輸セズ故ニ吐涎セズ唯下
劑ニ加レバヨク瀉下ス發汗劑ニ加レバ汗及蒸氣

ヲ發ス○殺蟲ノ峻効アリ四匁ヨリ八匁マデ日兩
 次用テ蛇蟲ヲ大便ニ下ス或撮絲施那ト沙糖ヲ加
 用テ殊捷効アリ小兒ハ一匁宛用フ或云二三匁宛
 毎夜六七日モ用ヒ四日毎ニ下劑ヲ用レバヨク蟲
 ヲ下ス○惡厲ノ疥癬類頑癬腺ノ壅塞結腫惡性潰
 瘍等諸頑固ノ皮膚病ヲ治ス四匁ヨリ十匁若ハ二
 匁マデ沙糖ヲ加用フ○或云痛風傷冷毒痛痔痛ニ
 良驗アリ蒸氣ヲ發シ大便ヲ利ス日十五匁ヨリ二
 匁マデ用ヒ四日毎ニ朝夕下劑ヲ用ベシ○服量大
 人ハ六匁ヨリ十匁餘ニ至ル小兒ハ毎夜臨臥ニ三

匁ヲ與ヘ翌朝下劑ヲ用ベシ○下疳便毒等ノ水棉

様ノ潰瘍ニ此末ヲ摻ケ或軟膏ニ和シ貼メ乾愈ス

○此藥一匁ヲ家猪脂三匁ニ研和シ疥癬乾癬禿瘡

腺腫徽毒ノ結腫痔痛ニ擦リ或下疳惡性潰瘍水棉

様ノ腐肉ニ貼メ消散ス○或云此劑ハ内服メ消化

セ不_レ大便_ニ瀉下スル故ニ良驗ナシ或云吐涎スル

ヲアル故ニ外敷藥トシ施スベシ布摺戾 叔福依

越扶屋布斯安質沒扭ゲスワフルデクウク エンスピスカラス蘭

製法 安質沒扭三匁 同 硫黃 二匁

水銀精製者四匁 水銀星十匁

右石臼内研和シ黒末トナリ水銀。星ナキニ至ル

亞按

主治 越扶屋布斯密涅刺列ト同シ

斯微旬藥酒方

製法 升汞 二匁 燒酒 或麥酒 二匁

右研和シ硝子壘ニ内レ固封シ升汞盡ク焔化スル

ニ至テ聽用ス

主治 斯微旬名此劑ヲ製シ一切微毒諸症ニ用テ奇

効ヲ見シ人ヲ救テ舉テ算ヘ難シ獨心都國ノ病院

ニテ此劑ヲ施ス一八年其間ニ微毒全治セル者四

千八百八十人ニ及ベリ皆是ヲ用テ吐涎セズ治ス

ル一吐涎スル者ニ勝レリ。是ヲ用テ効ナキ者ハ吐

涎法モ効ナシ○此劑朝夕一匙宛用フ。是ニ由テ升

汞ノ量毎日半匁ヲ服ス虚羸ノ人及失苟兒陪苦病

アル者ハ此服量ニ堪ザルアリ○患者壯實ニシ

其毒頑固諸症險重ナルハ朝夕一匙半宛用ベシ是

ニ由テ惡症仍減セザル者ハ二匙宛與ベシ或升汞

ノ量毎日三匁ヲ用テ瞑眩セザル者アリ○此劑ヲ

服ノ後每次大麥煎一匕ニ乳汁四匁ヲ加テ用ヒ且

是ヲ日常ノ飲料トスベシ乳汁ナキハ葵根二匁

ヲ取、水八匁ニ煎ノ半ヲ減シ甘草屑一匁ヲ加、濃テ

服スベシ又土茯苓サツサフラス薩撒弗刺斯ホツクホウ朴窟福烏篤トノ煎劑ヲ兼用スベシ○微毒ノ諸症險重ナラザル者ハ此劑ヲ用テ三週ミマニメ治ス沈痼頑滯ノ症ハ久服ノ漸治ス一兩年連服スト雖モ害ナシ○微毒既ニ血脉神經骨節ニ侵襲メ惡症ヲ發スル者モ此劑ヲ用レバ吐涎セスメ全治ス但製法服度法ノ如クナラズ飲食ヲ節慎セザレバ吐涎スルコトアリ若吐涎ノ候アルキハ速ニ此劑ヲ止隔日ニ下劑ヲ與ヘ十日許ヲ經テ吐涎ノ候ナキキハ復マタ此劑ヲ用ベシ○此藥ハ汗ト小便ヨリ病毒ヲ排泄メ治ス瀉下スル者ア

レト稀ナリ○多ク蒸氣ヲ發セント欲セバ此劑ニ龍腦六氏ヲ研和シ用ベシ甘味ヲ好者ハ麗春花舎利別一弓ヲ和スベシ○患者食禁ヲ守リ起居冷氣ヲ避ケ温煖ニ保護スレバ治スルコト速ナリ○癩瘡腐骨疽ヲ兼ル潰瘍ハ此劑ヲ布片ニ蘸ヒタメ貼シ縛帶ヲ施スベシ○燒酒ニ堪ガル人ハ適宜ニ水ヲ加用ベシ服シ易クノ瞑眩セズ小兒婦人及孕婦ト雖モ害ナシ或前説ノ煎劑ニ加服シ或葡萄酒或麥酒ニテ此劑ヲ製シ用ヒ或升汞一匁ヲ適宜ノ藥露ニ与ニ研和シ右ノ藥酒方ノ如ク用ベシ○升汞ノ氣ヲ

惡ム人ハ升汞ヲ蜜或、舍利別ニ研和シ用フベシ或、此劑ノ味ニ堪ズノ久服スルヲ能ハザル者ハ左ノ方ヲ用ベシ

溶汞舍利別

ソルチヲメルモリアリスル

升汞

患者ノ體質感動ノ多少ニ隨ヒ六分ヨリ十二分ニ至ル

水

二比

覆盆舍利別

適宜

右升汞ヲ硝子臼ニ内、水少許ヲ滴シ研和ノ溶シ硝子壘ニ内、水二比ヲ加、能攪和ノ紙ニテ濾シ其液ニ覆盆舍利別少許ヲ調和シ貯、此劑朝夕二錢宛取、大麥煎一茶碗ニ和シ服ス。三日許用テ患者其味ヲ惡

マズ胃ヲ妨、ザル片ハ朝夕四錢宛三日服シ。是モ亦

妨、ザル者ハ四錢宛日三次服シ七日ニ一兩次下劑

ヲ與、毎日大麥煎。土茯苓煎等ヲ飲料トシ多、服スベ

シ羸瘦スル者ハ大麥煎ニ乳汁ヲ加、用ヒ或、雞肉煮

汁ヲ與、ベシ。ヨク蒸氣及小便ヨリ病毒ヲ排泄ス、又

時々下劑ヲ用、吐涎ヲ防、ベシ小兒ハ升汞ノ量半ヲ

減シ此劑半錢宛乳汁ニ和シ朝夕用、時々下劑ヲ兼

用スベシ是ヲ用、テ諸症荏苒タル者ハ尚服量ヲ加

ベシ但、諸症漸快復スト雖モ數日此劑ヲ服セザレ

バ再發ス徵毒頑固深重ノ症或、徵瘡潰瘍等此劑ニ

テ治シ難キ者ハ吐涎ナキ擦膏法出前ヲ兼用スベシ。骨腫。腐骨疽。骨痛。頑滯。便毒等。擦膏法ヲ施メ効ナキ症ハ此溶汞劑ヲ兼用スレバ治ス。此劑ヲ用テ眩運ヲ發スル者ハ斯微旬藥酒方ヲ用ベシ。○或云。斯微旬藥酒方ハ升汞ノ性酷厲ニメ燒酒亦悍烈ナル故ニ調製ノ宜ヲ得ズ。且升汞多ク器底ニ沈テ渣脚甚酷烈ナル故ニ舍利別少許ヲ研和シ用テ尤効アリ。或後方ヲ用ルモ亦良。

銀香水

升汞 三瓦 苗香水 六瓦

過爾訛亞舍利別

右研和シ朝夕一匙宛飲液一盞ニ加ヘ服ス。又土茯苓。薩撒弗刺斯。朴窟福烏篤等ノ煎劑ヲ多ク兼用シ冷氣ヲ避ク温煖ニ保護スベシ。○扶歇蘭度名左ノ丸藥ヲ製ノ斯微旬藥酒方ニ代用シ大効ヲ稱セリ。

升汞丸

升汞 六瓦 蒸餅心 沙糖 各適宜

右升汞ニ蒸餾水ノ沸湯少許ヲ濕メ泥ト爲シ蒸餅心ト沙糖ヲ適宜ニ加搗和メ百八十丸ト爲ス。三十丸ニテ升汞一瓦ヲ含リ此丸藥ハ内服メ速溶化ス。

尋常人糊丸ハ乾固スレバ内服ノ速溶化セズ直ニ大便ニ通泄スル故ニ十分ノ功ヲ爲シ難ク或胃腸ニ停滯ノ一頓ニ溶化スレバ劇諸症ヲ發ス○微毒諸症ニ左ノ丸藥効驗切實ニモ必モ損害ナシ

鹼汞丸

升汞 十八分 白石鹼 四錢 麗春花 舍利別 適宜 右研和シ三分ヲ一丸トシ朝夕三丸宛服ス每次大麥煎或沙糖湯二碗宛用ベシ此劑ハ石鹼ニ含ル亞兒加利鹽ヲ以テ升汞酸性ノ酷厲毒ヲ剋制スル故

ニ服量稍多シト雖モ惡症ヲ發セズ ○升汞劑ハ

潛結頑滯セル微毒及瘡瘍類ニ少許宛用テ殊効ア

リ服量初ハ十六分分ノ一ヨリ八分分ノ一マデ日

一服宛用ヒ漸々加テ半分若ハ其餘ニ至ル若吐瀉腹

痛ヲ發スルキハ桂橙皮龍腦阿芙蓉等ヲ擇加ベシ

○或升汞四分分ノ一ヲ一服トシ乳汁ニ研合シ每

日兩次一服宛用テ微毒諸症ニ良驗ヲ稱ス又乳汁

ヲ兼用スベシ是滋養内托ノ功アルヲ以テ之ヲ腹

痛等ヲ發スル害ナシ ○升汞劑ハ表裏諸器ニ頑凝

潛結セル病毒ヲ疏解シ轉移變化シ表發ノ蒸氣ヲ

開達シ津唾大小便等ヲ進輸スル故ニ經久頑固ノ病ニ間奇効アリ但服量少許ニノ久服スルヲ佳トス假令バ升汞ニ凡ヲ接骨木子昆設爾弗三弓ニ研和シ分テ二十服トシ日一服宛用ルガ如シ或升汞一凡ヲ水四弓ヲ研和シ此水一錢ニ舍利別少許ヲ加分テ三服トシ日三次ニ服スル等ナリ○或云升汞ハ極テ酷烈ニメ害多キ故ニ妄ニ内服スルヲ勿レ但徽毒ノ諸症劇盛ニ至リ或其毒深ク根抵ヲ結テ滋蔓增長セル症ニ尋常ノ緩劑ヲ投スレバ逾増劇ノ撲滅スベカラズ故ニ少許宛升汞ヲ用テ侵刺

衝動シ其頑結セル毒ヲ轉移變化ノ捷効ヲ得ベシ然レ一旦効驗ヲ得ル片ハ是ヲ休テ緩性ノ水銀劑ヲ與全功ヲ收ベシ○或云升汞劑ヲ用テ間惡症ヲ發シ或一旦治スレレ再發ノ險症トナル者アリ故溶汞水ノ諸劑ヲ用ベシ升汞劑ニ比スレバ甚侵蝕セズ惡症ヲ發セズノ良驗アリ即後方ノ如シ

溶汞水

十一 水銀 精製者 消石精 各適宜

右水銀ニ消石精ヲ滴シ加テ溶化シ澄清ノ液トナルヲ度トシ此液二十四滴ヲ取テ蒸餾水一弓ニ和

勻シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ○服量患者ノ強弱ニ隨ヒ定メ難シト雖モ大抵毎日朝午後夜分ニ二十一滴宛服ス。若シ下利腹痛等胃腸ノ症ヲ發スル者ハ服量ヲ減スベシ壯實ニノ感動少キ人ハ三十滴ヨリ漸ク加テ八十滴マデ服メ害大シ。又毎日多ク大麥煎ヲ服スベシ (依) ○左ノ方モ亦良驗アリ

迦爾訖亞溶汞水

溶汞水 上ニ出 十四滴

迦爾訖亞舍利別

右調勻ス。感動甚キ人ハ半匙宛日三次服ス。是ニ由

テ毎日溶汞水一滴半ヲ服ス。感動少キ人ハ每日一

匙宛三次服ス。其餘ハ患者ノ堪ルニ隨加ベシ。虛弱

ニノ感觸甚キ人ハ嘔吐或下利スルコトアリ。此症ハ

緩和劑驅風劑或阿芙蓉劑ヲ加用ベシ (依) ○左ノ方

簡易ニノ且殊効アリ。溶汞水ノ諸劑ニ代用ノ良

赤汞水

メルキリウス。ニットラ。チニス。アトル。イエンデ。サル。ペトル。シユレク。ウイ。ク。蘭

赤降汞

消石精

右赤降汞ヲ取徐ニ消石精ニ加硝子壘ニ内固封

シ慢火ニ上能溶化メ硝子壘ニ收メ貯フ服法溶汞

水ノ如シ○此液ニ蒸餾水一比ヲ調和シ微毒ノ無

花果状ノ息肉等ニ外敷ノヨク消散ス〔依〕○感動甚
 大溶汞劑ノ衝動ニ堪ヘザル者ハ左ノ丸藥ヲ用テ
 良驗アリ〔依〕ハ斜下行感ニ難ニ成ルニ對シテ内固桂

〔溶汞丸〕

赤溶汞水

八七滴

蒸餅心

砂糖

各二錢

右研和ノ八十丸トシ朝夕一丸宛用テ感動少キ人
 ハ漸加テ三四丸マデ與ベシ。此劑ハ砂糖アル故ニ
 乾固ノ溶化シ難キ等ノ患ナシ〔依〕ハ下ノ丸藥ハ
 湯液ニ入ルルニ其緒ハ患者ノ對シニ調成入ルル患

遠西醫方名物考卷三十四終

