


遠西醫方名物考

加

卷七



F
工-16

卷之六

499.2
E n-3
7

No. 1432
12 e 15

樸齋宇田川先生著

三編

遠西醫藥名物考

風雲堂藏版 青藜閣發兌

遠西醫方名物考標目

卷七

甘草膏

芥子泥

葛爾儒別涅實屈室

附 薄荷健胃水

葛爾儒別涅實屈室越幾斯劑


羯布羅 龍腦 檀腦

附 龍消散

龍腦醋



士川文庫
3274



阿腦點眼水

羯布羅精

羯布羅丁幾去爾

羯布羅精

附 羶布羅擦方

羯布羅油

蝕油 溶油 蒸餾油

羯布羅乳

附 龍腦乳

加耶普的油

卷三十五
二十六葉出

羯布羅膏

加耶普的油

卷三十五
二十六葉出

遠西醫方名物考卷七

捺齋先生譯述 男 宇田川榕 榕菴校補

甘草膏

ソックス・リグイリチア又「卫キスタラクト・ゲレイ
セイリリ」羅チッキサツブ・ハン・スト・ホウト蘭

製法

甘草ヲ細ニ剉ヒ磁鍋ニ入レ熱湯ヲ適宜ニ
加ヘ微火ニ上セ浸スト四時許ヨク絞リ濾テ汁ヲ
取り其滓ニ又熱湯ヲ加ヘ汁ヲ取ルト前法ノ如ク
シ前ノ汁ト合シ文火ニ煎熬メ凝固セシム○沙糖
少許加テ凝固セシムレバ尤甘美ナリ○武火ニテ
速ニ煎熬スレバ苦味ヲ生シ或ハ焦著ス或ハ銅鍋



ヲ以テ煮レバ銅氣染^{ウツ}リ是ヲ服メ嘔氣ヲ發ス

主治急迫ヲ緩メ乾燥ヲ潤シ酷厲液ヲ甘和シ乾欬喘急咽喉刺痛ヲ祛キ痰ヲ化シ吐キ易カラシム

亞叔

芥子泥

モスターントバツブ

蘭

製法

大麥粉

十二弓

芥子末 三弓

醋 六弓

右研和ノ泥ト爲ス○一方ニ芥子末蒸餅心醋ヲ以テ製ス○効力峻ニメ捷功ヲ要スル症ニハ芥子末

ニ醋ヲ研和メ泥ト爲シ^{或ハ}餅母ヲ研和ス^{或ハ}芥子ニ海鹽^{アシキ}芫菁^{アラゲ}丁幾^{タケ}去爾^{アタマ}ヲ加ヘ製シ或ハ芥子ニ海葱醋ヲ加ヘ製メ施スベシ

主治外敷ノ其處。焮赤腫痛シ細胞ヲ發ス。六時モ貼スレハ泡ヲ發シ或ハ潰爛ス但芫菁發泡膏ニ比スレバ深ク滲透セズ其刺戟スル刃皮肉血絡ニ過ギズ又是ヲ貼メ速ニ焮腫スル故ニ諸卒病捷効ヲ要スル症ニハ芫菁發泡膏ヨリ勝レリ但芫菁膏ハ速ニ焮腫ヲ發セザレ氏專ク其効ヲ神經ト水脉ニ致メヨク發泡ス○脚腓或ハ蹠ニ貼メ頭腦胸腸等ノ

病毒ヲ下部ニ引降シ且脉勢ヲ憤起増進セシム。故ニ痱ノ部ニ貼メ良効アリ。劇キ頭痛咽喉煥痛胸脇毒ヲ引降ス。○一切瘡瘍類發出スルノ慢緩遲滯スル症テ施メヨク誘發ス又腐敗發斑熱神經熱ニ施メ効アリ。○支節走注痛痛風傷冷痛等ノ患部ニ貼ハ疥癬羅斯等瘡疹類ノ潛攻スルニ貼メ其毒ヲ表部ニ轉移シ或ハ頑癬等總テ惡性ノ皮病ニ施メ其毒ヲ皮表ニ誘發シ或ハ内攻スルヲ驅發シ或ハ疥癬羅斯等瘡疹類ノ潜攻スルニ貼メ其毒ヲ表部ニ轉移シ或ハ頑癬等總テ惡性ノ皮病ニ施メ其酷厲液ヲ外泄シ治ス。○眼焮腫ニハ腕或ハ項ニ施シ胸焮衝ニハ肩胛ノ間ニ施シ咽喉焮腫ニハ頸ヲ痙ノ効アリ。依圖

繞ラシ貼メ皆効アリ。○痘ヲノ多ク面部ニ發セザラシムルガ爲ニ見黒ノ時是ヲ腓ニ貼シ或ハ灌膿ノ時ラ貼メ其毒ヲ引降ス。○痙攣ノ諸症ニ施メ鎮痙ノ効アリ。

カル葛爾儒別涅實屈室羅 ゲセゲンデ デステル 蘭

形狀 是レ薊ノ族ニメ紅藍ノ一種ナリ春月圓莖ヲ抽ス。二三尺。太ノ枝多ク粗糙柔撓ニメ屈シ易ク或ハ地ニ塲ス葉長闊ニメ深ク缺裂シ苦菜ノ如シ邊ニ柔ナル刺及び鋸齒アリ莖葉共ニ遍ク毛茸アリ。

莖枝頭ニ圓錐生シ毛刺多ク且刺ノ如キ細葉及ビ鱗序ヲ以テ圍ム。錐上ニ絲ノ如ク細キ筒瓣ノ黃花叢生シ後白色ノ毛絮トナリ絮每ニ細長褐色ノ子著ク。根細長白色柔脆ニメ鬚多シ。花葉莖根共ニ味甚ダ苦シ春月種ヲ下シ四五月花生シ子熟ス宿根セズ舶來ノ品ヲ見ルニ葉及ビ錐ニ尖刺アレ柔ニメ手ニ觸テ刺ストナシ尋常ノ薊類ト異ナリ○按ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用フベシ物云大薊根葉共ニ味苦ク性功殆ト此草ト同シ江戶郊外ニ產スル大薊ハ根葉共ニ苦味ナク氣味牛蒡ノ如ク稍收澑ス故ニ代用シ難シ

唯苦味ノ者ヲ擇选用フベシ

主治

莖葉性溫味苦揮發鹽油及ビ粘液多シ發汗利尿ニ用ヒ又健胃制酸解凝稀釋ノ効アリ○發汗解

毒ノ良効アルヲ以テ傳染疫毒ヲ表發ノ蒸氣ヨリ發泄シ發斑熱ヲ解シ腐敗ヲ遏ム○痛風及び傷冷毒痛ニ此葉一弓ヲ葡萄酒二北ニ浸シ毎朝臥蓐ニ在テ一二匙ヲ用フレハ發汗メ治ス又吐痰ヲ進メ蒸氣ヲ發スル効アル故ニ一切冒寒病ノ良藥トス○肺ノ粘痰ヲ除キ效ヲ治ス故ニ肺ノ諸症兼々レ輕キ焮衝熱ニ良○咽喉焮腫ニ末トシ喉内ニ吹

テ良○總テ羸瘦病ニ用ヒテ熱ヲ起サズ衰弱ヲ強壯シ粘液ヲ疏解ス○健胃ノ良効アルヲ以テ飲食消化ノ惡キヨリ起ル頭痛萎黃病或ハ胃腸ニ粘液多クノ其觸知ノ鈍キヨリ發スル諸症ニ驗アリ斯ノ如キ症ハ薄荷水ノ如キ衝動驅風ノ藥ヲ加ヘ用ヒテ尤良。或ハ間歇熱ノ胃衰弱スルヨリ蕤草トメ治セサルニ甚ダ驗アリ左ノ方尤良。

薄荷健胃水

此方胃ノ衰弱セル諸症ニ殊効アリ

薄荷水 半匙 橙皮舍利別 土弓
葛爾儒別涅實屈室越幾斯劑 五錢

幾那越幾斯劑 没藥越幾斯劑 各一
亞爾鮮鹽 一錢

右調和シ半時毎ニ一匙ヲ用フ○此草ハ肝脾等。腹藏ノ壅塞及ビ是ヨリ起ル黃疽水腫ニ多ク驗アリ或ハ失苟兒陪苦及ビ經閉ヲ治シ蛇蟲ヲ殺ス○是ヲ末トシ或ハ水煎或燒酒麥酒。葡萄酒ニ浸シ用ス○生汁ヲ取リ或ハ乾葉ヲ水ニ浸シ眼ヲ洗テ白膜ノ凝血ヲ散シ眼ヲ明カニス○諸獸咬傷。毒蠍痛ニ是ヲ葡萄酒或ハ麥酒ニ煮。服ノ効アリ○子ヲ乳劑トシ用ヒテ肺炎衝胸脇痛痘瘡麻疹ニ尤良

物依伍福

葛爾儒列涅實屈室越幾斯劑

製法 蒲公英、越幾斯劑ト同シ

羯布羅 罗「カムボラ」_上 同「カムヘル」蘭

○按ニ羯布羅ハ龍腦樟腦ノ總稱ナリ西洋ニテ
ハ此二品共ニ同一種ニ屬メ「カムボラ」ト稱ス。其
勒泥及ビ蘇門答刺「スモタラ」_{共ニ亞細亞洲ニ屬}等。印度地
方ノ諸島ニ產スル者ハ極テ上好ナリ是モ亦「カ
ムボラ」ト呼ブ。漢人嘗テ其諸島ニ通商シ其地ニ
產スル上好ノ品ヲ以テ龍腦ト名ケ又其原名ヲ

蒸音譯ノ羯布羅或ハ羯婆羅ト稱シ其樹モ亦羯不
查婆律或ハ固不婆律或ハ婆律樹ト名ツケ又其
我邦及ビ支那ニ產スル下品ノ者ヲ樟腦ト名ク
共ニ時珍綱目ニ出ヅ故ニ今其譯名ヲ用ヒ原名
ヲ稱ノ羯布羅トス左ノ譯說ニ考徵ノ其品類ヲ
小辨スベシ

羯布羅二種アリ一種ハ日本及ビ支那ニ產ス一
ハ勒泥及ビ蘇門答刺ニ產ス二種共ニ羯布羅樹ヨ
リ出ル脂ナリ此樹羅甸名「ラウ」_{本產ノ樹ヲアル}其日
ヤホニカレト名ク即チ樟ナリ勒泥蘇門答刺產ノ樹
ヲアルボルカムホリヘラボル子ヲマトテナト

名此樹殊ニ日本ニ多シ其地ニテ久須乃幾^{ハクス}樟^キト名
ク。渤泥及ビ蘇門答刺ニ產スル樹ハ日本產ノ樹ニ
比スレバ矮小多節葉丁香樹葉ノ如ク。子榛子ニ似
テ長ク萼大ナリ是ヲ日本產ノ者ニ比スレバ樹
小ナルト葉ノ形異ナルヲ以テ分ツノニ綿樣物^{コト}云
材固ク日本產ノ樹ノ如シ榕按ニ花戶ニ龍腦樹
呼フ者アリ尋常ノ樟ニ比スレバ葉小ナリ盆種ト
爲ス渤泥產ノ樹ナルベシ○錫蘭^{セイラン}印度島^{アマダラ}名其其他亞細亞洲ノ地方
ニ桂ノ根ヲ鑽刻メ一種ノ羯布羅^{カムフラ}ヲ製ス其脂烈
香。羯布羅ノ如キヲ以テナリ或ハ錫蘭產入山柰ヲ
ニテ桂ノ根ヲ鑽刻メ一種ノ羯布羅^{カムフラ}ヲ製ス其脂烈
香。羯布羅ノ如キヲ以テナリ或ハ錫蘭產入山柰ヲ
蒸餾ノ一種ノ羯布羅^{カムフラ}ヲ製シ或ハ歐羅巴洲^{ヨウロハ}ノ諸地

ニテモ迷迭香。撒爾非亞刺賢塗兒茉沃刺那^{ヒアラ}以上草
ニ迦歇爾格祿乙突依卒布底謨^{カムヘルコロイド}以上草名各條
拔爾撒謨ノ質アル草ヲ以テ羯布羅^{カムフラ}ヲ製ス然^レ皆
常用ノ品ト異ナリ各其性ニ隨テ香氣亦同カラ不
○是ヲ分テ精麤二種トシ上下品ヲ定ム其渤泥及
ビ蘇門答刺ニ產スル者ハ精好ニメ土品トス故ニ
總テ上品ヲ渤泥羯布羅ト名ク最上品ハ其國用^{ボルチヨ}
充テ敢テ他方ニ貿セズ故ニ是ヲ歐羅巴洲土輸^{ヨウロハオタヌ}
コ希ナリ其渤泥產ノ樹ハ小ニメ羯布羅出ル少
シト雖モ日本ノ品ニ比スレバ極メテ上品ナルユ

エニ價モ亦百倍ス。是レ日本ニ於テモ甚ダ貴重シ

王侯貴人ニ非レバ多ク得難シト云

○按ニ渤海ノ羯布羅ハ日本ノ品ニ比スレバ價

百倍スト云者ハ即チ龍腦ナリ又龍腦ハ渤海蘇

門答刺等ノ南海諸島ニ出テ支那ニ產セザル

漢人亦是ヲ言フ東西洋考ニ云渤海蘇門答刺暹

羅舊港亞齊滿刺加柔佛占城彭亨蘇祿婆羅等南

海諸國皆龍腦ヲ產ス。又時珍綱目龍腦條時珍

曰龍腦香南番諸國皆有之頌曰今惟南海番舶賈

之。南海山中亦有之。宗奭曰抹羅短叱國

林羅機兒國也

在南印度境。有羯布羅香略卽龍腦香也。又職方外紀ニ渤海出片腦極佳云

其渤海及ニ蘇門答刺ニ產スル者ハ自テ其樹ノ幹

枝ヨリ流滴シ或ハ幹心ヨリ罅坼ニ沿テ溢泄シ或

ハ其板材ヨリ滲出シ或ハ幹脚ニ凝溜メ塊粒ヲ成

ス。故ニ形狀大小一ナラズ

○按ニ龍腦ハ皆其樹ヨリ滲出ス。樟腦ノ煎煉シ

取ルガ如キ者ト異ナリ時珍綱目龍腦條頌曰香

卽木中脂也香在木心中斷其樹剪取之其膏於樹端流出研樹作丸而承之時珍曰土人解作板板縫

有腦出乃劈取之

或ハ其塊粒ヲ成ス者滴シ下テ漸ク融化凝聚シ大
小ノ片ヲ爲ス。宛毛指間ニテ壓扁メタル者ノ如
シ或ハ細小ニノ泰粒ノ如ク或ハ稍大ナル者アリ
皆上品トス。鹽ノ碎屑ノ如キハ下品トス。土人其樹
下ニ落ル者ヲ掃集メテ沙土ヲ去リ精粗ヲ擇三分
テ上下品ヲ定メ其碎屑ヲ下品ニ屬スレバナリ
○按ニ大小ノ片ヲ爲シ指間ニテ壓扁メタル如
シト云者ハ漢人所謂梅花片ナリ其細粒ノ者ハ
所謂米腦糖片ノ類ナリ時珍曰作梅花片者爲良

故俗呼爲冰片腦。又曰大者成片如花瓣。又曰米腦。
本草原始云大者曰梅花片。小者曰糖片。東西洋考
云華夷考曰片腦有大如指厚如二青錢者香味清
烈瑩潔可愛謂之梅花片鬻至中國擅翔價焉復有
數種其次耳。又勃泥物產條云片腦卽龍腦香。一統
志曰樹如杉檜取者齋浴而往其成片似梅花者爲
上。

或ハ土人初晰ニ耳ヲ其樹ニ接メ自テ嘯鳴スルハ
羯布羅其樹ニ盈滿スル候トシ其樹ヲ伐リ割テ暴
乾シ剝テ碎片ト爲シ其滲出セル羯布羅ノ細塊ヲ

成ス者ヲ取り羅テ沙土木屑ヲ去リ分テ上下數品ト爲ス。但其質麤凶ニメ鹽ノ碎屑ノ如ク或ハ沙土木屑ヲ雜ルハ下品トス○其上品ハ鮮麗瑩徹雪白色ニメ光澤アリ上好ノ消石ノ如ク乾固輕脆。指間ニ摩メ碎ケ易ク速ニ風化消耗セズ但温氣ヲ得レバ盡ク消化シ火ニ投スレバ速ニ燃^ヒテ消散ス香氣極テ竄透味辛微苦。口中爽涼^ヒテ覺エ黃色ヲ帶ビズ汚點ナシ若シ灰褐赭黯等ノ異色アルハ下品トス○按ニ時珍^カ綱目龍腦ノ條。宗奭曰濕時無香。木乾之後循理折之中有香狀類雲母。色如冰雪。時珍曰

白瑩如冰。爲梅花序者爲良。恭曰明淨者爲良○東西洋考云海上耳錄曰。腦樹出東洋文萊國生深山中。老而中空乃有腦。有腦則樹無風自搖。入夜腦行而上瑟瑟有聲。

羯布羅^{カムバラ}ノ麤ナル者ハ日本及ビ支那ニ産ス是ヲ尋常ノ品キシ下品ニ屬ス。日本ニ產スル者ヲ一ニ支那羯布羅ト名ケ又下品ヲモ爾^カ名ク日本ニテ是ヲ製スル法ハ其樹及び根ノ切片ヲ鐵罐ニ入レ水ヲ加ヘ兜ヲ蓋ヒ塗封シ煮テ蒸升スルト二十四時。即チ羯布羅其兜内ニ凝結メ塊ヲ成ス。其質麤ニメ

疏脆頗ル重ク沙糖ノ粗末ノ如ク指間ニ摩スレバ
脂氣アリ透亮白色或ハ黃褐灰色ヲ帶ビ氣味竄透
不佳。辛微苦ナリ是又生羯布羅ト名ク○日本及ビ
支那ニ出ル生羯布羅^{カムブラ}ハ麤^ク鹹^{ソウ}鹹^{ソウ}ニメ鹽ノ碎塊ノ如ク
ナルユエニ皆歐羅巴洲ニテ再製メ上好ノ品ト爲
ス。其法。生羯布羅ヲ取り格兒弗^{コルフ}或ハ陶罐ニ入レ
兜^{カス}ノ形ニ隨テ凝結シ扁圓ノ大塊ヲ成シ或ハ碎粒
ヲ覆ヒ文火ニテ升煖スレバ其精粹ハ兜ニ升リ其
兜ノ形ニ隨テ凝結シ扁圓ノ大塊ヲ成シ或ハ碎粒
ヲ雜^ミス其沙土汚物ハ罐底ニ残リ留ル此品潔白透
亮ニメ光澤アリ按ニ是レ本邦藥舗ニテ樟腦ノ再煉ノ反腦ト呼ブ者ナリ○

日本產ノ羯布羅^{カムブラ}ハ洋舶載歸リテ亞謨斯^{アムス}的爾達謨^{ルダム}
和蘭都^{オランダ}府ノ名ニテ再煉メ極^{マサニ}テ上好ノ品ト爲シ四方ニ貨
シ内外醫藥ニ供ス其精製ノ巧萬國是ヲ擬スルヲ
能ハズ又其法ヲ祕メ他邦ニ傳ヘ不其製スルヲ見
ル=唯生羯布羅ヲ取り底ノ平十^ル硝子壘ニ入レ
沙火ニテ升煖スルノニ他人是ニ倣^{ナラフ}テ製スレニ曾
テ上好ノ品ヲ得ズ然レバ是ニ夾加スル者アルカ
或ハ製煉術ノ精巧ニ出ルカ今ニ至ルマデ是ヲ知
ル人ナシ故ニ拂郎察^{フランス}譜厄利亞^{エンゲリア}等ノ賈船東方諸地
ヨリ下品ノ生羯布羅ヲ貿易シ來ヒ凡自國ニテ上

品ト作スナト能ハズ必ズ和蘭ニ貨シ其精製ヲ仰ク
ト云其精製ノ上品ハ雪白色光澤アリ微透亮ニメ
輕シ是ヲ捻ヒ子レバ粘リ極テ香竈ニ又味清爽大リ云
東方諸國ノ鶴布羅カブロヲ輸シ來テ
亞謨斯的爾達謨アモスティルダムニテ精製スト

○按ニ本邦藥鋪販ク所ノ龍腦三種アリ○第一
一種ハ洋舶ノ品ナリ藥鋪ニ是ヲ洋品ト呼ブ潔
白透亮薄片オランダヲ爲シ或ハ大小碎屑ヲ雜フ是ヲ上
品トス是レ上ノ譯說ニ云所ノ和蘭是ヲ羅フルヒテ細屑ヲ去リ最大ノ薄片ヲ擇取り本梅
花ト呼ブ京攝ニテハ大梅花ト呼ビ江戸ニテハ

大頭ト呼ブ是ヲ最上品トス寶曆中及ビ明和九年。洋舶潔白上好ノ本梅花ヲ輸イタス。是ヲ千二百斤
物ト呼フト云此卽チ漢人所謂梅花片。冰片ナリ
○第二種ハ清舶ノ品ナリ黫澹灰白ニメ透亮ナ
ラズ大小碎塊ヲ爲シ細屑ハ粉ノ如ク沙土木屑
ヲ雜フ洋品ニ比スレバ稍香氣強シ藥鋪ノ說ニ
清舶ノ品ヲ唐品又唐人ト呼ブ灰色ヲ帶テ潔白
ナラズ大小碎塊アレ凡薄片希ナリ其細屑ニ沙
土木屑アリ故ニ洋品ニ比スレバ品價共ニ劣ル
ト云或云先年清舶モ亦潔白ナルヲ渡ス是ヲ藥

舗ニ本梅花ト呼テ上品トス今ハ渡ラズト○按
 ニ龍腦ハ漢土及ビ西洋諸國ニ産セズ皆勑泥蘇
 門答刺等ノ南海諸島ニ産スル前ノ諸説ノ如
 シ故ニ唐品ト呼ブ者ハ清舶。南海諸島ニ貿易シ
 來ルニ論ナシ其諸島ノ鵝布羅樹ハ特ニ上好ノ
 鵝布羅ヲ出スモ素ヨリ其風土ニ係ル所ニメ其
 品灰色ヲ帶テ沙土ヲ雜フト雖玉製煉ヲ經ル者
 ニ非ズ上ノ譯說ニ所謂灰色ヲ帶テ透亮ナラズ
ニ屬スト云者是レナリ○第三種ハ藥舗ニテ白様龍腦ト呼
 ブ者ナリ瑩白透亮ニメ洋品ニ類ス藥舗ノ説ニ

凡メ洋品ハ指間ニ摩シテ碎粉トナリ易シ白様
 ハ碎ケ難シ是レ漢土ニテ樟腦ヲ再煉シ造ル者
 ニメ其價特ニ廉ナリ清舶載來ルト云江都藥舗
 修ム右ノ藥舗ノ説皆是ニ出ツ○按ニ時珍綱目
 龍腦ノ條時珍樟腦再煉ノ法ヲ載テ云如此升兩
 三次可充龍腦又物理小識云世多升打樟腦作水
 片此說ニ據レバ漢土亦樟腦ヲ再煉メ龍腦ニ充
 ツ即チ白様龍腦モ此類ナリ○按ニ龍腦樟腦各
 產地ヲ異ニシ其品同ジカラザレ压西洋ニテハ
 皆一種ニ屬シ通メ鵝布羅ト稱ス唯其精麤ヲ以

テ上下ニ品ヲ分チ其上品ヲ以テ醫藥ニ充ルノ
云上好人品ト爲シ醫藥ニ供スト云右三種ノ龍
腦共ニ其質精微ニテ芬香ナレバ皆内服劑ニ用

フベシ樟腦ハ再煉ヲ經ズ其質麤ニメ多ク汚物
ヲ夾ム故ニ外敷諸劑鴉布羅膏等ヲ云皆後出ツト
雖モ藥鋪ニ所謂没腦ヲ用フベシ按二白様龍腦
試ルニ白樣龍腦ハ効劣リ篤疾ニハ上品用ヘシ又用
鴉布羅ハ密器ニ内レ固封シ貯レバ耗散スルトナ
シ或云亞麻子ヲ以テ其上ニ蓋ヒ固封シ貯レバ消
散セズ其脂氣ヲ以テ鴉布羅ノ揮發翔散ノ氣ヲ阻

遇スレバナリト

性温辛微苦極テ竄透ス硫氣鹽氣アリ○其質趨謨
ニ非ズ華爾斯ニ非ズ又趨謨華爾斯ニ非ズ油及ビ
揮發鹽ニ非ズ唯是レ一種ノ華爾斯様ノ樹脂ナリ
依云華爾斯ノ質多クノ其他種ノ質ヲ含ム者ナリト
油類華爾斯類技爾撒謨類ニ加テ研和スレバ盡ク
溶化ス然レバ其質華爾斯ノ如シ然ニ總テ華爾斯
ヲ溶スベキ所ノ亞兒加利鹽液ニ是ヲ加ルニ絶テ
溶化セズ是レ華爾斯ニ非ル徵ナリ亞兒加利鹽液
鹽酒石鹽ノ類其他總テ淋灰鹽ヲ云斯ノ如キ鹽蓬ハ
水ニ溶シタル液ヲ亞兒加利鹽液ト謂フ酒石鹽液固

消石液ノ如シ。總テ華爾斯ノ質アル者ハ又是ヲ水悉ク此亞兒加利鹽液ニテ溶化スルナリ。又是ビ一切水質ノ液ニ加レバ溶化セズ然レバ是レ華爾斯ノ如シ然ニ亞刺比亞謹謨ヲ水ニ溶シタル粘汁ニ是ヲ加レバヨク溶化ス然レバ是亦華爾斯ニ非ル徵ナリ。○性刺戟衝動ス故ニ過服スレハ其人脉數顏赤。眼焮赤或ハ搐掣或ハ譫妄熱ヲ發ス。然凡少許服スレバ血ノ運行急疾ナルヲ增益スル。ナク却テ焮衝ヲ消シ熱ヲ解シ咽喉焮腫。眼焮腫等ヲ治ス。或說ニ此物一夕ヲ服スレバ血ノ急疾ナル運行ヲ減スト云故ニ古人是ヲ性寒トス然ニ畢竟

多ク服スレバ血ノ運行ヲ増進シ熱ヲ發シ又氣味竄透揮發ニメ火ヲ點スレバヨク焰ヲ攝スルユ卫ニ性温ノ說ヲ確當トス

主治竄透衝動。開發溫煖。發汗。排毒ノ効アリ又膠粘稠厚ノ血液ヲ稀釋シ凝結ヲ疏解シ壅塞ヲ通シ疼ヲ止メ神經ヲ強壯ス。又拔爾撒謨ノ質アリテ血液ノ腐敗ヲ遏メ酷厲毒ヲ消メ煩悶ヲ解シ表發ノ蒸氣ヲ驅發ス。○竄透揮發シ凝結ヲ疏解スルヲ以テ脳及ビ神經ノ抑鬱沈重セルヲ徐々ニ衝動發揚シ血液ヲ體表ニ驅逐ス。是ヲ以テ險痘ノ化膿遲慢シ

或ハ膿色アレニ熟シ難キ用ヒテ奇効アリ○凡ソ熱病ノ性遷延沈滯ノ其毒排泄シ難キ症ニ効アリ是ニ燃衝ヲ兼ルニモ亦良○總テ表發ノ蒸氣壅塞スルヨリ發スル諸症ニ効アリ故ニ傷冷毒ノ諸症類胸脇痛等ニ良○凡ソ脉缺數ナル症ニハ龍腦ヲ禁スレバ是ニ消石ヲ加ヘ用レバ良驗アリ此症ハ左ノ方ヲ用ヒテ尤良

龍消散

龍腦 一刃 消石 一錢

右研和シ分テ直服トシ一時ニ一服。宛乳汁或ハ大

麥煮汁ニテ送下ス○熱毒ヨリ起ル不寐尋常ノ劑ヲ用ヒテ効ナキ症ハ龍腦半刃消石ニ刃研和シ前法ノ如ク用ヒテ効アリ其他頑固ノ不寐ニモ用フ右ノ如ク催睡ノ効アルヲ以テ卒倒病及ヒ昏睡ノ症ニハ害アリ○惡性ノ痘及ビ疥癬或ハ一切瘡瘍ノ陷伏メ内攻シ或ハ是ヨリ蒸發氣壅遏ノ發ス心諸症殊ニ痙攣ノ攀急ヲ兼ルニ用ヒテ峻効アリ○天行疫惡性熱發斑熱ニ効アリ但惡性熱ニハ病毒漸ク排泄ノ汗ヲ發スル頃ニ用フベシ初發ハ害アリ○神經熱或ハ腐敗熱ノ脉沈小ニメ疾數皮膚乾

燥スル症ニハ龍腦ニ纈草根。沙糖ヲ加入用ヒテ効アリ斯ノ如キ症ハ消石ヲ加レトナシ○此藥ハ卒病緩病共ニ衰弱セル者或ハ疼痛ヲ兼ル症ニ用フ即チ神經熱。腐敗熱。傷冷毒熱等ノ虛衰又内部或ハ外部ニ疼痛アル症。或ハ痛風。流走痛或ハ衰弱セル焮衝發斑。經久ノ失血。頑麻不遂。痙攣搐掣。發狂。黑障眼。或ハ内藏衰弱メ荏苒タル諸症。脾病。子宮病。蛇蟲。羌菁毒ノ諸症。水銀ノ吐涎ヲ止ル等ニ用フ○此物ハ發汗起熱ノ効アル故ニ壯熱病ノ初發焮衝ヲ兼子脉強實ナル症ニハ害アリ斯ノ如キ壯熱劇盛ナ

龍腦醋

龍腦 一錢

亞刺比亞趨謨 二錢

沙糖 八錢

蒸餾醋 一升

ル間ハ發汗メ害アレバナリ然凡其症漸ク變シ過盛ノ運動減メ虛弱ニ涉リ痙攣ノ運動ヲ兼スル者ハ醋ヲ加テ殊ニ良。又腐敗ヲ遏。纖維ヲ強固ニス

龍腦 一錢 **亞刺比亞趨謨** 二錢
沙糖 八錢 蒸餾醋 一升

右龍腦。趨謨。沙糖ヲ研和シ醋ヲ加ヘ攪合シ半時ニ一匙宛用フ○龍腦六仄ヲ蒸餾醋一弓ニ溶化シ一匙宛服メ發汗劑トシ或ハ鎮痉劑トス或ハ焮腫ノ初發ニ是ヲ外敷メヨク消散ス○龍腦ハ内部ノ焮

衝ヲ治スル要藥トス殊ニ龍腦乳出_{後ニ}効アリ○諸
焮衝ヲ清涼消散スルニ龍腦一二匁ニ消石二倍ノ
量ヲ加ヘ用フ。殊ニ羅斯_{ロス}ニ適効アリ。此藥速ニ滿肢
體ニ透達メ蒸發氣ヲ排泄シ發汗ノ効有リテ熱ヲ
増發セズ胸中ヲ爽涼ニシ四肢及ビ皮表ニ鬱留停
著スル惡液ヲ驅發シ羅斯_{ロス}ノ毒ヲ消散スレバナリ。
惡厲ナル羅斯_{ロス}ハ血液腐敗シ或ハ變ノ寒壞疽トナ
ルユ卫ニ是ヲ用ヒテ腐敗ヲ遏メ毒ヲ消メ尤_モ効ア
リ○龍腦ニ消石ヲ加ヘ用ヒテ淋疾ヲ治シ小便ヲ
利シ或ハ月經ヲ通スルニ良効アリ○白帶下ニハ

琥珀ヲ加ヘ用ヒテ良○腎膀胱ノ膿瘍ニ用ヒテ驗
多シ○芫菁發泡膏ヲ貼ノ其毒血液ニ浸染シ赤疹
或ハ焮腫_ト發シ或ハ尿道焮痛小便赤澁淋瀝スル
者ハ其發泡メ處ニ羯布羅膏_{カムハラ}ヲ貼シ扁桃乳ニ龍腦
ヲ和シ内服スレバヨク芫菁ノ酷厲毒ヲ制伏ノ治
ス或ハ芫菁膏ニ羯布羅少許ヲ加レバ右ノ諸症ヲ
發セズト云然モ是ヲ以テ的當ノ効ヲ稱シ難シ芫
ノ條ト併考フベシ○龍腦ヲ水銀劑ニ加テ内服スレバ吐涎
セズメヨク其功ヲ爲スト云。是レ龍腦ニ發汗ノ効
アレバナリ然_レ是亦確證シ難シ○發狂或ハ依剥_{イボ}

昆塙兒

内科撰

要出

間大効ヲ得ルコアリ然凡は是ヲ多

ク服メ効ナキ者アレバ是亦百中ノ功ヲ稱シ難シ

○龍腦ヲ内服スルニハ末トシ一瓜ヨリ五瓜マデ

一服トス十瓜マデ用ルコ稀ナリ○沙糖或ハ消石

ヲ加ヘ用フ或ハ亞刺比亞趨謨漿

亞刺比亞趨謨水ト等分ニノ溶

液ニ研和シ用ルモ良或ハ扁桃ノ如キ油氣多キ子

仁一倍ノ量ヲ加テ研磨スレバヨク水ト混和シ扁

桃乳ノ一種トナリ内服スルニ宜シ或ハ雞子黃一

個ニ羯布羅二瓜許ヲ研和スレバヨク水ト混和ス

或ハ羯布羅ニ銳烈ノ燒酒一二滴加テ研和スレバ

ヨク細末トナル羯布羅ハ水及ビ一切水質ノ諸液。

亞兒加利鹽液

上ニ
註ス

並ニ草木類ヨリ製シ取ル酸液

ニハ溶化セズ然レニ綠礬油ニ加レバヨク溶化ス。消

石精ニ加レバ盡ク溶化ノ所謂羯布羅油

後ニトナ

ル。燒酒及ビ油類ニ浸スモヨク溶化ス○羯布羅ハ

患者ノ老少強弱等ニテ服用量ヲ加減スベシ甚ダ衰

弱スル者ハ半時毎ニ一二瓜ヨリ四五瓜マデ用フ。

感觸ノ甚キ者ハ初メ一瓜ヲ用ヒ漸ク其量ヲ加フ

ベシ○過服シ或ハ數用レバ刺戟衝動メ發熱頭痛

眩暈嘔吐痙攣等ヲ發スルコアリ若シ此症ヲ發セ

バ 阿芙蓉劑少許ヲ用ヒテ靜止スベシ。或說ニ一患者龍腦二夕ヲ一服トシ用ルニ劇ク神經ノ諸患ヲ發シ殆ト死セントスル者未見ルト云。○外敷メ齒痛ノ一良藥トス此物少許ヲ取テ醋ニ和シ煮沸メ含漱ス。或ハ齶孔ニ挿テ痛ヲ止ム。或ハ是ヲ醋ニ溶シ温メ塗^{タル}モ良。多血焮衝ヨリ發ス歯痛ニモ効アリ。或ハ是ヲ搗碎キ温湯ニ投シ固封シ燼^{ツキ}入レ固封シ貯ヘ用ルニ臨テ温メク温メ硝子壠^{ツキ}入レ固封シ貯ヘ用ルニ臨テ温メ含漱ス數^{タカ}換^カ含テ尤^モ良。○羯布羅ハ腐敗ヲ遏メ凝結ヲ解キ且^シ衝動メ焮衝ヲ減スル性功アル故ニ外用

ノ焮衝羅斯。小皰斑疹。神經攣痛。傷冷毒痛。頭痛。肢體痛。總テ衰弱メ痛及ビ腫アル諸症ヲ治シ或ハ打撲傷。火傷等ノ熱ヲ解シ痛ヲ止ム。○外敷スルニハ是ヲ布ニ包ミ或ハ毛布ニ摻メ貼シ或ハ乾慰劑ニ加ヘ或ハ接骨木花^{カルミハ}。加密列等ニ加テ蒸漏劑^{ヒゲスリ}トシ或ハ亞麻油。燒酒等ニ溶化シ或ハ軟膏硬膏ニ和シ用フ。○亞麻油ニ溶シ塗テ傷冷毒ノ焮衝痛ヲ消散ス。此物ハ甚^シ々衝動メ驅散スル功アル故ニ劇盛ナル焮腫。總テ壯熱ノ症ニ過用スレハ焮痛ヲ増發ス。唯虛症ノ焮腫或ハ焮衝刺戟ノ勢既ニ減スル症ニ効

アリ或ハ傷冷毒ノ焔衝及ビ羅斯等妄リニ外敷スレバ其毒内攻メ危症ヲ發スルトアリ。但痛ナキ腫瘍ヲ消散スルニハ効ナシ○虛症ノ焔腫眼及ビ眼眵多キ症ハ蜜或ハ薔薇露ニ和シ眼ニ點メ良効アリ○焔腫眼ノ淚多キ症ハ左ノ方尤効アリ

阿腦點眼水
龍腦 五分 甘扁桃 三錢
右水適宜ニ加ヘ研和ノ乳劑乳白色ノ汁トナルト云ト爲シ二十四錢ヲ取り左人ニ味ヲ加フ

阿芙蓉液 二十滴 皓礬 極細末
阿芙蓉液 二十滴 皓礬 十分

右研和メ點眼水トス○羯布羅カムバラハ經久ノ潰瘍及ビ壞疽ニ外敷メ腐壞ヲ遏メ死肉ヲ祛ク。但感觸甚キ人ハ其刺戟ニ堪サルコアリ亞麻油ニ溶シ施メ熱壞疽ヲ遏ヤ惡性ノ潰瘍及ビ寒壞疽ニ此末ヲ厚ク患處ニ摻シ又是ヲ亞刺比亞アラビア亞謨漿ニテ溶シ其上ニ貼メ縛繩ヲ施シ數更換メ偉効アリ或ハ此末ヲ沙糖ニ研和シ寒壞疽様ノ潰瘍ニ摻シ或ハ腐骨疽ニ摻メ良○羯布羅カムバラハ風化シ易シ然ニ燒酒油類オ亞謨ノ粘漿等ニ溶シ施セバ消散セズメ効多シアラビア國依

羯布羅精

スビリナス・ヒニ・カムホウ・羅カムヘル・バ
ランド・左イ・ン・蘭カムヘル・テインキ・ヲル・同

製法

燒酒

二十二度者
一弓

羯布羅

極細末

右研和シ硝子壘ニ收メ固封シ時々振蕩シ浸ス
六日ニメ聴用ス○迷迭香刺賢蛭兒等ノ香竄ノ露
精ヲ以テ右ノ燒酒ニ代用シ製スルモ亦良
拔其土
主治外敷メ滲透閑達シ凝結ヲ疏解シ腐敗ヲ遏メ
弛弱ヲ強固ス○傷冷毒痛打撲傷。閃挫。轉筋。麻痺ヲ
治ス又左ノ擦方尤驗アリ

羯布羅擦方

水十人○藥味根ハ蟲入人貴敷之

羯布羅精

十弓

薄荷油

加耶普的油

各二錢

油刺賢蛭兒油

ト効同レ

圓

硇砂加石灰精

六錢

迷迭香

○寒

右調和シ患部ニ塗擦スル一日三次○羯布羅精ハ
閃挫脱臼。轉筋ノ後筋及ビ韌帶。弛緩痙弱スルヲ強
固スルニ良効アリ○麻痺等總テ觸知ノ鈍ナル部
ニ施シ或ハ痛風。硬腫。諸疼痛攣急等ノ熱ナキ症。其
他神經ノ諸症ヲ消散ス○此藥ハ熱性ニメ衝動シ
凝聚セル血液ヲ疏散スルヲ以テ輕キ焮腫ヲ消散
シ或ハ寒腫ニ尤効アリ故ニ妄リニ劇キ焮腫ニ施
セバ却テ是ヲ增長ス又毒蟻刺咬ニ塗テ良○右火

諸症ハ此劑ヲ布序ニ薰シ患部ヲ蒸湯ヌ尤良○此精ニ茱沃刺那花。刺賢塙兒花。雜腹蘭。阿芙蓉等ヲ浸メ蒸湯劑トシ腹部ニ貼メ風氣痞滯ノ疝痛。攣急痛。嘔吐ヲ治ス○此液ニ石鹼ヲ溶化シ擦藥トシ施セバヨク衝動ノ凝結ヲ疏解シ弛弱ヲ強固シ打撲傷等ニ塗テ瘀血ヲ散シ青瘀ヲ消ス。又未潰瘍ニ塗テ痛ヲ止メ增長セザラシム○此精ヲ以テ頻リニ熱壞疽ヲ蒸湯ノ効アリ或ハ越栗失爾剥祿布利怛ヲ加ヘ或ハ沒藥越仙蟹亞ヲ加ヘ施メ殊ニ良○寒壞疽ノ軟ニメ烊解スル症ニ良効ヲ稱ス是ヲ以テ收

潘ノ硬固ナラシムレバナリ但痴ヲ結ブ片ハ斯ノ如キ銳烈ナル起熱劑及ビ乾燥ノ散劑ハ害アリ唯微衝動ノ軟化釀膿ノ効アル軟膏或ハ芭布等ヲ施メ膿ヲ成スベシ○此精ニ越栗失爾剥祿布利怛ヲ加ヘ内服ノ痛風。脚痛。或ハ遺精淋瀝ニ驗アリ。因國羯布羅油。ガムヘルオリイ蘭。

此油三種アリ即チ蝕油。溶油。蒸餾油ナリ

羯布羅蝕油

オレウム。カウスチキム。カムボラ羅

製法

羯布羅

二弓

消石精 四弓

四弓

右二味硝子壙ニ入レ固封シ焼處或ハ温湯中ニ置
時々振蕩スレバ羯布羅カムラ^{パラ}盡ク溶化ノ上面ニ浮ニ白
油ノ如シ。是ヲ分チ取り硝子壙ニ收メ貯フ此油ニ
消石精四分ノ一ヲ含メリ

褐布羅溶油

製法 阿利襪油 オレイフ
二 代 用 ハルモ 可ナリ
亞麻油或ハ扁桃油

羯布羅蒸餾油

右調和シ硝子壺ニ入レ焼處ニ置テ時々振蕩シ毎
布羅盡ク溶化スルヲ度トシ固封シ貯フ

製法

羯布羅

羯布羅
末
乾燥シ
末トス

海鹽精

四乾
一比燥
北

右研和シ列篤兒多ニ内レ潤キ兜ヲ覆ヒ。承餾曇ヲ
屬シ武火ニテ蒸餾スレバ 獄布羅溶化ノ油トナリ
出ツ。但火力緩ナレハ 獄布羅悉ク兜ニ著テ油出ル
ナシ○右三種ノ油ニ多ク水ヲ加レバ 盡ク故モト

主治

主治 阿利襪油。亞麻油。扁桃油。等ノ緩和ノ性アル搾油ニ溶化シタル者ハ専ラ軟化消散ノ効アリ。凡ソ

寒腫及ビ疼ナキ腫ヲ微衝動メ消散ス○蝕油。蒸餾油ハ專ニ鑽透侵蝕ノ疏散ス。故ニ外敷メ硬肉。堅腫。贊疣息肉。胼胝癰瘤ヲ消散スル良藥トス。少許宛數鳥羽ヲ以テ塗ベシ○經久ハ創瘍ヲ淨刷シ膿ヲ排ヒ肉ヲ生ス軟膏ニ和シ貼メ腐骨疽ヲ治ス○傷冷毒痛或ハ神經病ノ痛處ニ擦テヨク其痛ヲ消ス○棉ヲ包ミ齶孔ニ挿シ或ハ諸歯痛ニ塗テ速効アリ○拳大ノ芭布腫糊ニ此油ヲ塗ルト毎日兩次。四個月ヲ經テ其腫頓ニ消ス。是レ竊透疏散ノ峻力ヲ以テ其粘液ヲ驅逐シ除ケバナリ

傑底遇

龍腦乳

カムヘルメルキ又カムペル。卫ニルシヨ又エミルシイ。メット。カムペル蘭

製法

龍腦

半錢

土好者

甘扁桃

壳皮

去レ者

沙糖

一弓

薄荷水

八弓

右龍腦扁桃ヲ石臼ニ入レヨク搗爛シ徐々ニ薄荷水ヲ加ヘ濃コシテ汁ヲ取り沙糖ヲ加ヘ溶化シ用フ

主治

凡ソ熱病ノ龍腦ヲ用フベキ症。其他發汗排毒スベキ諸病ニ用ヒテ煩悶ヲ解シ痛ヲ祛キ安眠セシム○服量一時或ハ一時半毎ニ一匙ヲ用フ

厥コトノ用法

又法

甜瓜仁 アメハナダレハ半毎ニ一塊を用ひ

大薊子 マクワカリ

上好者

各四錢

或ハ罂粟仁ヲ代用ス

龍腦 リョウボウ

二又

水呑みハ安質没扱若波烈駆寒心へ察出之則又

古蘿蔔消石 コウロウツキシヤク

各一錢

大麥煮汁 オオバヒツヅク

一北

沙糖 サトウ

適宜

右瓜仁。薊子ヲ搗盆ニ内レ大麥煮汁少々、加ヘ搗磨テ乳汁ノ如クシ絞テ汁ヲ取り是ニ餘藥ヲ研和シ沙糖ハ患者ノ口ニ適フヲ度トシ加フ。

主治

一切内部ノ焔衝及ビ壯熱ヲ解シ發汗シ潛伏内攻ノ毒ヲ驅發ス○趨謨規吉ヲ過用ノ頭旋眩暈

肢體振掉スルニ効アリ○半時毎ニ一匙ヲ用フ

羯布羅膏 カムパラ

ユングエンチムアルビハカムホラチム

協

製法 微的撒爾弗 カムテイリル

一弓

羯布羅 カムパラ 十氏阿利襪油少許

ヲ加ヘ研合スル者

右研和ス 拔

又法

鉛粉

三北

家猪脂 カミヂロ

六北

右調和シ煮テ手ヲ住ズ攬セ放冷シ此膏一北ニ

羯 カム

布羅四錢ヲ加フ

亞

主治 外敷メ一切焮熱腫痛ヲ涼解消散シ搔痒ヲ去リ諸瘡瘍潰爛或ハ皮膚剥脱火傷等ヲ乾愈シ瘢痕ヲ消ス或ハ傷冷毒痛ヲ治ス

國

遠西醫方名物考卷七終

