

遠西醫方名物考

世比毛

卷二十八

松
科
別

e 13

世消石

精製消石

桃舎涼解飲
瑰麥潤涼飲
未爾扶斯消石散
鎮痛清涼飲
爽神涼血飲

霸王鹽

固性消石

消石液

消石錠

消石精

發烟消石精

蒸餾器圖四種

斯的爾苦武篤兒

暹羅多倫赫篤栗沃刺黠
過兒加奴護需百利加黠
杜松驅水飲

甘消石精

遠西醫方名物考卷二十八

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

比

百合油

オレウム・レリヲリム

製法

百合花瓣ヲ取製ス。其法加密列煎油ト同

主治

外敷ノ温煖ニ凝結ヲ解キ堅硬ヲ軟ケ疼ヲ

止メ

胸病ヲ治ス

冰絲糖

ホルストソイクル 和胸糖
糖ヲダライイデツイク

糖

アルヘニ 氷絲糖
ノ通稱

大

製法 白沙糖ヲ水ニ溶シ雞子白ヲ加、煮テ泡沫ヲ
 去、放冷メ凝結セシム。○一種大麥煮汁ニ沙糖ヲ加、
 煎煉、凝結セシムル者アリ。是ヲニゲルスト、ソイク
 是ヲト名ク、麥糖ノ義ナリ。
主治 急迫ヲ緩メ疼痛ヲ祛キ、胸中ノ酷厲液ヲ甘和
 シ粘痰ヲ稀豁メ吐易カラシメ、欬嗽、咽痛、口中乾燥、
 聲啞ヲ治ス。○沙糖ハ石鹼ノ質アリテ纖維諸管ノ
 強硬ニメ拘急セルヲ緩弛シ酷厲毒ノ刺戟ヲ甘解
 ス。故ニ乾欬及冒寒ノ諸症ヲ治ス。○沙糖一弓半ニ
 阿利襪油半錢ヲ研和シ用テ欬嗽ニ殊効アリ。石長
 生、舍利別モ亦良。○沙糖、赤石脂、酒石英、各等分極細

毛

末トシ角膜ノ星翳及肉翅ニ點メヨク消散ス。○沙
 糖ヲ鼻中ニ吸引メ嚏藥トス。或ハ吉利詞參兒トシ
 肛門ニ注入メ大便ヲ導通ス。或ハ沙糖ノ末ヲ潰瘍
 ニ摻ケ水棉様ノ壞肉ヲ除キ淨掃ス。
 依伍 伍 伍 伍

沒藥 ノイルラ、**羅**、**メイルレ**、**蘭**

沒藥 ハ阨日多、**黑地兀皮亞**、**共ニ亞弗利亞**、**刺比亞**

亞州、**等ニ産スル一種ノ樹ヲ鑽刻メ採ル**、**越謨華爾**

國名、**依云、大約、越謨七錢**、**其樹ハ**、**三毛**、**ノ一種ニ**

ノ**棘刺アル小木ナリ**、**樹類ノ總稱ナリ**、**西亞、越謨、紅海ノ**

邊及^ビ亞刺比亞^ア沿海ノ諸國殊ニ多シト云○沒藥ハ種々大小ノ碎片顆粒凝固ノ乾硬ノ塊ヲ成ス故ニ形大約圓クノ粗糙昂低ノ稜ヲ爲ス上品ハ淨潔ニメ顆粒多ク赤赭色或黯赭或黃赤或銅色或黃金色等ノ碎片錯雜シ透亮若ハ半透亮ニノ輕ク是ニ觸テ粘潤アリ破碎シ易ク破レバ裏面光澤アリ且白色若ハ灰色ノ條紋斑點ヲ爲シ口ニ含ハ盡ク溶化シ味苦クノ辛ヲ帶^ビ技爾撒謨^ア様ノ香氣アリ火氣ニテ溶解セズ火ニ投スレハ燃テ焰ヲ發ス新鮮ノ者ハ指ニテ壓扁メ易シ○尋常ノ品ハ黑色ノ碎片ヲ雜ス但木屑塵土

沙石等ヲ雜テ重ク香氣微ニメ苦味ナク或惡ベキ味アルハ藥用トセズ宜ク其汚物下品ヲ除キ上品ノ碎片ヲ擇ニ用ベシ或亞刺比亞^ア越謨^ム櫻脂等ヲ雜テ偽造スル者アリ然^レ其質ト氣味トヲ驗スレバ真偽自明白ナリ○此物ハ上下數品相混ノ輸ス故ニ和蘭ノ藥局ニテ上品ヲ擇ニ分テ藥用ト爲ス是ヲ^イヌイルテ^エレク^タ夕^ト擇ニ分ツト名ク上品ハ其量一比ヲ以テ越幾斯劑^ス出^後ニ半比ヲ製スベシ○沒藥ヲ蒸餾スレバ香氣苗杏ノ如キ油出然^レ其甚少シニ比ヲ蒸餾ノ油僅ニ半錢許出故ニ是ヲ用^ルナシ

○按一藥舖ニ煉沒藥ト呼者是ナリ。花沒藥ト云
紫鉞ナリ混スベカラズ○此物多クハ楮黒色
一ニメ香氣微ク。苦味ナク土石木屑等ヲ雜ル故ニ
其中ニ就テ明淨透亮ニメ香氣強ク味苦辛ノ者
ヲ擇ニ藥用ニ供スベシ
主治 温煖衝動ノ衰弱ヲ強壯ニシ。又解凝。稀釋。開達。
防腐。止痛ノ殊効ヲ稱ス○凡凝體諸器ノ運營機轉。
衰弱怠慢ニメ諸液粘稠ナルヨリ發スル諸病ニ的
當ス○鑽透衝動ノ細絡織管ヲ開達シ諸液ノ分利
排泄ヲ進メ殊ニ腹部諸器ノ分利排泄ヲ扶ク○諸

管ノ運營乏弱怠慢ニメ粘液壅滯スル諸病及内藏
ハタラキ
虛弱ニメ壞液鬱滯ノ忘ヲ治ス故如此勞瘵ニ用テ
多ク驗アリ○微發汗シ胃ヲ健運シ蛇蟲ヲ殺ス○
内藏壅塞硬腫。依剥昆垓兒。脾病。萎黃病。喘急。咳嗽ヲ
治ス○患者強實ニメ壯熱熾衝ヲ兼止症ニハ大忌
害アリ。熱症ハ先其熱ヲ解メ後用ベシ○肺病ノ害
良藥トス。肺ニ粘痰壅滯スル症ハ左ノ方良驗アリ

沒藥糖

沒藥越幾斯劑 四錢
沙糖 一匁
麻屈涅失亞過爾拔 一匁

右研和シ一卵匙宛用_レ日四五次_ド一方没藥越幾斯劑四錢沙糖二勺ヲ研和ス一方没藥越幾斯劑四錢乳糖二勺ヲ研和シ尤良トス○患者粘液質ニノ粘痰多キ勞欬ニ没藥良効アリ。是肺ノ虛衰弛緩セルヲ衝動ノ強壯スレバナリ。但_レ嗽衝ノ候アル者ハ害アリ○粘液質ノ勞欬ハ亞兒加利鹽及鐵劑ヲ加用テ効多シ。後方ノ如シ又經久下利白帶下甚驗アリ。

未爾扶斯没藥飲

没藥上好者 二錢
 驅風精 二錢
 酒石鹽 半錢
 茴香 七毛
 薄荷 二毛
 蘇合 二毛
 丁香 二毛
 肉桂 二毛
 胡椒 二毛
 荳蔻 二毛
 白豆蔻 二毛
 小豆蔻 二毛
 大豆蔻 二毛
 小豆蔻 二毛
 大豆蔻 二毛

右研和シヨク溶化セシメテ左ノ藥ヲ加フ
 撒兒末爾扶斯 十二分
 過爾託亞舍利別 一毛
 右調和シ一匙宛用_レ日四次_ド或云此劑ニ幾那丁幾去爾六錢ヲ加テ尤効アリ○肺瘍ノ膿ヲ成ス症ハ没藥効多シ。肺中硬結セル膿腫アリテ嗽衝ノ候ナキハ硫黃ヲ加用テ殊ニ的當ス。左ノ方良驗アリ

珊黃没藥丸

没藥 上好者 二錢半
 珊黃里越幾斯劑 各二錢
 硫黃華 淘洗者
 右三氏ヲ一丸トシ蝸蛄石ノ末ヲ衣トス一時ニ三

風雲堂藏

丸宛服ス○總テ内部ノ膿瘍ニ良効アリ赤痢治メ
後腸ノ膿ヲ成シ尋常ノ藥劑ニテ治セザル症ハ左
ノ劑殊効アリ

蘭苔沒藥飲

依蘭苔 四錢 加密列 三錢

右石灰水半北ヲ以テ煮テ瀝過シニ多ク取リ左ノ
藥ヲ加フ

沒藥越幾斯劑 一錢半 實亞格日温 三錢

右溶化シ一匙宛用テ日四次○體稟薄弱ニ感動
シ易キ婦人ノ子宮衝逆ニ沒藥良驗多ク又敗液痰

血ヲ子宮ヨリ驅泄シ催生シ胞衣ヲ下ス○諸管纖
維ノ弛弱ニノ血中粘液多キヨリ發スル經閉ヲ通
ス白帶下ヲ兼ル症ハ殊ニ驗アリ子宮衝逆ヲ兼ル
經閉ニハ阿芙蓉ヲ加テ尤良○寒粘液質ノ經閉ニ
ハ沒藥丁幾去爾殊効アリ或ハ通經ノ藥ヲ加用モ
良假令ハ左ノ方ノ如シ

雜腹蘭沒藥飲

沒藥丁幾去爾 一錢 雜腹蘭 丁幾去爾

藜蘆丁幾去爾 各四錢 製法 健質亞那丁幾去爾ト同シ

右調勻シ三十滴若ハ其餘葡萄酒或ハ啤埜ニ點服

スル一日三四次○没藥ノ華爾斯質ハ衝動ノ壅滯
 ヲ驅泄シ凝結ヲ疏解ノ經閉ヲ通ス然レ水ニ溶
 化シ難クノ其性能盡ク出ルコト能ハズ故ニ丁幾生
 爾トシ殊ニ効アリ但水様ノ飲劑トシ用ント欲セ
 バ亞兒加利性ノ藥ヲ加フベシ華爾斯質盡ク溶化
 ノ餘カヲ殘スコトナシ即チ左ノ方以如ク製スルシ
酒石没藥飲
 没藥 芸香葉 各一匁 酒石液 四錢
 右没藥芸香ヲ搗碎キ酒石液ヲ加テ泥ト爲シ氷
 北ヲ加ヘ浸スコト三時ニシテ文火ニ上セ煮テ四分時

瀉テハ弓ノ液ト爲シ一匙若ハ其餘患症ノ輕重
 隨ヒ加減シ用テ日三次○纖維諸管弛弱縱緩ナル
 ヲリ水腫ヲ發シ或ハ寒粘液質ノ人水腫ヲ兼ル症
 ハ没藥ヲ用テ温壯利水ノ良効ヲ奏ス但其病増劇
 ノ内熱ヲ發シ焮衝ニ傾ク者ハ斯ノ如キ熱性衝動
 ノ藥ハ害アリ○粗工妄ニ胞衣ヲ牽離スニ因テ子
 宮ノ裏面毀傷シ潰爛ノ敗膿汚液子宮ヨリ流泄ス
 ル症ハ此藥ヲ内服外用ノ殊効アリ
服量 十匁ヨリ半錢マデ一次ニ用テ丸藥ハ三匁ヲ
 一丸トシ四丸宛用テ日ニ四次

○外敷ニ多ク用フ。愈創ノ技爾撒謨膏藥類ハ多ク
沒藥ヲ加テ製造ス○技爾撒謨ノ愈創ノ性功ア
ルヲ以テ臭穢腐爛ノ創傷潰瘍ニ此末ヲ摻シ若ハ
丁幾去爾トシ施メ腐爛ヲ淨刷シ侵蝕ヲ遏止シ良
肉ヲ生ス又瘀血ヲ散シ打撲傷ヲ愈シ寒腫ヲ消シ
壞疽腐骨疽ニ内服外敷メ尤良○寒壞疽ノ生肉ト
死肉トノ間ニ此末ヲ摻シ或ハ腐骨ノ部ニ摻シ或
ハ此丁幾去爾ヲ棉撒絲ニ塗リ貼メ腐壞ヲ除キ治
ス○斷及ビ咽喉ノ腐爛ニ甚ダ驗アル藥トス斷ノ
腐爛ニ沒藥ヲ嚼云含ニ或ハ失苟兒倍苦ノ毒ヨリ

來ル症ハ此末ニ明礬玫瑰蜜海鹽精ヲ加テ患處ニ
塗リ或ハ總テ口中若ハ咽喉腐爛メ嗽衝ナキ症ハ
右ノ劑ヲ幾那煎或ハ拊皮煎ニ溶化シ漱藥トメ捷
効アリ但徽毒ノ咽喉腐爛ハ水銀劑ヲ内服セシメ
升汞ヲ漱藥ニ加ヘ施メ治スベシ
沒藥丁幾去爾テイシキヲラメイル羅依布伍物
沒藥上好者細搗燒酒二十度者

製法 沒藥上好者細搗燒酒二十度者

右硝子壘ニ内固封シ置テ六日其間時々振蕩シ布
片ニテ瀝シ滓ヲ去又紙ニテ瀝シ硝子壘ニ收メ固
封シ貯固○或云酒石液若ハ消石液ヲ此劑ニ加製

スレバ没藥ヨク融解ノ其色及藥氣出。其法没藥ノ
 末ヲ酒石液ニテ濕シ煖處ニ置テ溶化スルニ至。乾
 シ硝子壘ニ内燒酒ヲ加前法ノ如ク製スルナリ
 〔主治〕内藏壅塞ヲ開達シ粘液ヲ解小便ヲ利シ疼痛
 ヲ止腐壞ヲ除ク○衰弱虛羸ノ病ニ用テ精神ヲ爽
 快シ胃ヲ健運シ風氣ヲ驅散ス○諸管纖維ノ弛弱
 怠慢ニメ粘液壅滯セル諸病ニ用ヒ衝動健運ノ微
 汗ヲ發シ諸器ノ虚衰ヲ回復ス○卒倒昏睡。非依利
 昆垓兒。脾病。粘液腫。及壞液諸病ヲ治シ殊ニ經閉ニ
 効アリ。又白帶下。子宮ノ諸症ヲ治ス○此劑ハ總テ

寒性ノ病ニ効アリ。熱性ノ患者及炊衝ノ候アル者
 ハ害アリ○服量六滴ヨリ十五滴マデ飲液ニ點服
 ス○外敷メ汚穢ノ潰瘍。創傷及鼻口舌斷咽喉等ノ
 臭穢潰爛ヲ淨刷シ治ス○凡患部弛弱虚衰ノ排膿
 内托ノ勢力ナク荏苒トノ愈サル潰瘍及打撲傷。腐
 骨疽。寒壞疽ヲ治ス。寒壞疽様ノ咽喉腐爛ニ漱藥ト
 シ効アリ熱壞疽ハ初發ニ患處ヲ刺テ惡血ヲ瀉シ
 此劑ニ羯布羅精少許ヲ加施メ良○右ノ亞兒加利
 液酒石液或ハ消石液ヲ加ヘ製スルヲ云ヲ加ヘ製スル劑ハ殊ニ衝動
 ノ効多キヲ以テ腐肉多キ潰瘍ヲ淨刷スルニ良

沒藥越幾斯劑

エキスタラクト、メイラ、アキヨシ
ム、羅、ウトリゲ、ゴム、エキスタ
ラクト、ハン、
メイラ、
水 二比

製法

右硝子壘ニ内レ固封シ煖處ニ置、三日。故冷ノ其
逆ヲ去リ紙ニテ濾シ其液ヲ慢火ニ上セ水氣ヲ熬
乾ノ錠ト爲シ貯フ其溶化セザル渣逆ハ華爾斯質
ナル故ニ下幾去爾ト爲シ用、ベシ

主治

沒藥ト同シ。唯熱性衝動ノ華爾斯質ヲ脱スル
故ニ稍熱性ノ人ニ用、テ害ナシ丸藥及煉膏トシ一
頓ニ一、二日許用、ベシ或云。煎熬ノ製スル故ニ性力減

耗シ且、華爾斯ヲ脱スル故ニ其効緩弱ナリ。因テ接

木ノ局方ニハ此劑ヲ収録セズ

沒藥油

オレウム、メイラ、ベル、テリギ、イウム

製法

煮タル雞卵ヲ縱ニ割リ其黃ヲ去リ沒藥末
ヲ填充シ其白ヲ接合シ絲ニテ縛定シ。害等ノ濕處
ニ懸テ其下ニ鉢ヲ置、ハ沒藥融解、透亮赤色ノ油
樣液トナリ淋漓ス。是ヲ取り硝子壘ニ内固封シ貯

又法

沒藥末一比ニ煮タル雞子白ノ搗碎者二比
ヲ拌、ゼ温湯少許ヲ濕ノ布袋ニ内濕處ニ懸テ其液
ヲ取、下前法ノ如クス。○此藥變敗シ易シ。此液一

ニ銳烈ノ燒酒一錢ヲ和シ貯レバ腐敗セズ久ク貯
フベシ

主治 技爾撒謨撮ノ揮發油ヲ含創傷。潰瘍等ニ外敷

ノ膿ヲ排ヒ疼ヲ止ノ侵蝕腐壞ヲ除キ乾愈ス

中唇舌乳頭ノ坼裂。凍瘡等ニ塗テ速ニ愈

小胞汚斑ヲ消シ。肌膚ヲ美澤ニシ。頭瘡ヲ治ス

沒藥越仙扶亞 沒藥下幾去爾ト同シ

木炭 カ
ラ
ン
テ
ン
コ
ル
又
ホ
ウ
ト
コ
ル
蘭

製法 質輕キ木炭ヲ搗碎キ陶埴ニ内レ。一孔ヲ穿

タル蓋ヲ覆ヒ。火ニ上セ燒テ通紅ト爲テ半時許

時ニメ放冷シ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

主治 一切香臭ヲ奪除シ腐敗ヲ遏絶ス此奇効アリ。

假令バ阿魏。麝香ノ如キモ新ニ製スル木炭ノ末ヲ

加テ研磨スレバ其氣速ニ消散ス。腐蝕ノ肉類。變敗

ノ水漿等ニ此末ヲ摻シ加フレバ臭氣消メ故ノ如

シ

○凡ソ臭穢腐蝕ノ膿瘍腐骨疽。壞疽等。膿汁汚液

多キ症ハ此末一味患處ニ摻シ若ハ幾那。楊皮。搨皮。

沒食子。枯礬等ノ末ヲ適宜ニ擇加テ摻シ或ハ經久
頑固ノ潰瘍。頭瘡等。臭穢ノ壞液。滲漏浸淫シ或ハ濕

癰ノ膿疱潰爛スル症ニ此末ヲ摻ニ。若シ家猪脂ニ
 和シ貼スレバ腐爛臭敗ヲ淨刷メ乾愈ス。是ヲ外敷
 ノ初ニ搔痒ヲ發スルコトアリ。但シ是ヲ施スルハ石鹼
 ヲ温湯ニ溶シ毎日患處ヲ洗淨スベシ。○瘡瘡様ノ
 潰瘍汚液漏泄ノ臭氣堪難キ症ニ此末ヲ摻スレバ
 臭穢速ニ消散ス。然レハ藥氣消スレバ復發ス。○失荷
 兒陪苦ノ斷ノ腐爛ニ此末ヲ摻メ良驗アリ。○傳滌
 痢等ノ下利ノ穢物ニ此末ヲ摻スレバ臭氣消メ衆
 人ニ傳染スルコトナシ。 遇 技

世

消石

「ソット」トシム。羅「ガルト」トシム。又「ガルト」トシム。ポットアス。蘭

消石ハ亞兒加利鹽ト酸性氣ト抱合混和ノ成ル一
 種ノ中和鹽ナリ。消石ノ末ヲ亞兒加利性ノ液酒石
 ニ加レバ沸騰セズ。乳汁ニ加レバ凝固セズ。 總テ酸
 ヲ乳汁ニ加シ是消石ニ少モ酸性ナキガ如シ。消石ノ
 末ヲ酸味ノ液ニ加レバ沸騰セズ。是消石ニ少モ亞
 兒加利性ナキガ如シ。此即亞兒加利鹽ト酸性氣ト
 自然ニ渾化抱合メ偏勝ナキ中和鹽ナレバナリ。然
 レハ製煉術ニテ其質ヲ剖析スレバ其二物顯著ナリ。
 即シ是ヲ蒸餾スレバ酷烈ナル酸味ノ消石精出ツ。是

遠西名物考 卷二十八 風雲堂藏

酸性氣ナリ然ニ消石ヲ燒燬スレハ其酸性氣消散
 ヲ盡ク酷烈ナルアル亞兒加利鹽即チ後ニ舉ルトナル
 ヲ以テ知ベシ○其酸性氣ハ大氣ニ含ル者ニ自
 亞兒加利鹽ニ著テ凝結シ消石トナル○凡、琢磨セ
 ル銅鐵類ノ漸、鏽敗シ瓦磚垣墻等ノ色變シ崩壞ス
 ルモ此大氣ニ含ル酸氣ノ侵蝕スルニ非ルハナシ。
 ○消石ヲ水ニ和スレハ寒氣ヲ生ス是レ消石ト水
 ト抱合スルニ因ル消石清涼ノ性効モ是ニ係トリ
 ○其亞兒加利鹽ハ即、剝篤亞斯ニノ草木ノ燒灰中
 ニ在ル所ノ鹽ト同シ是、草木ニ稟ル所ノ固性ノ亞
 兒加利ナリ○凡、鹽ノ質少シモ

風化消散セズ火ニ投メ消滅セズヨ此亞兒加利鹽
 ク火ニ堪ル者ヲ總テ固性鹽ト名ク
 ヲ基資トシ酸性氣ト抱合渾化メ消石トナルナリ
 或云、消石ハ酸性氣ト植物固性ノ亞兒加利鹽ト抱
 合メ成ル海鹽ハ酸性氣ト植物固性ノ亞兒加利鹽ト抱
 合メ成リ硃砂ハ酸性氣ト動物固性ノ亞兒加利鹽ト抱
 合メ成リ○或云、消石ニ含ル亞兒加利鹽ト抱合メ成
 ハ海鹽ニ多ク含リ又石灰類ニ含ル鹽ニアリ然レバ此
 亞兒加利鹽ハ山坑物植物灰類ニ含ル鹽ニアリ即、剝篤
 亞兒加利鹽ト抱合メ成リ殊ニ蒸升セル地氣
 ニ多シ。此氣鬱遏メ迅雷ヲ作ス刀猶火藥人如シ○
 植物モ亦消石質ノ鹽氣ヲ含者多シ。假令ハ蒲公英
 失格列乙。碎米薺葛苣紫堇等ノ生汁。清涼性アル者
 ノ如シ○雨露。深井水。瀦水及膏腹ノ地ハ消石ヲ含

又一切動物ノ血液ニモ是ヲ含リ。故ニ尿尿。糞。道ノ多
 汚汚セル土地ハ消石ヲ含ム。殊ニ多シ。○上好ノ消
 石ハ乾淨瑩白。長大。六稜ノ氷柱狀ヲ爲ス。氣ニ觸テ濕
 ラズ。風化溶消セズ。敲テ響ヲ爲ス。火ニ投メ爆聲ヲ發
 セズ。唯焠鳴シ速ニ燃テ鮮明ノ焰ヲ發シ。質消化ノ
 固鹽少許残り。舌ニ觸テ辛微苦冷徹鑽透ス。消石ヲ
 湯ニ溶シ。剥篤亞斯ヲ水ニ溶シタル液ヲ是ニ滴メ
 其底ニ土沈マザルハ上品トス。○火ニ投メ爆聲ヲ
 發スルハ海鹽雜ル微トス。燃テ質消滅セザルハ土
 氣多。微トス。氣ニ觸テ濕ルハ亞兒加利鹽多。微トス。○

粗朴消石ハ必ス土氣。海鹽。粘液ヲ雜ル。故ニ精製用ベシ

精製消石

「ソットリウム。デピュラチウム。羅ゲソイノ
 ルデサルペトルシユルボットアス蘭

尋常ノ消石ニ多ク沸湯ヲ加テ溶化シ湯六倍放冷
 ノ芒ヲ結バシム。若ヨク結芒セザルハ是ニ精製
 剥篤亞斯ノ溶液十倍ノ水ヲ加ヘ滴シ加ベシ。初ハ其
 底ニ沈ミ降レ。底終ニ必モ沈ミ降ラズ。其底ニ逆渣
 ヲ現ハスニ至テ其液ヲ紙ニテ濾テ滓ヲ去。文火ニ煮
 テ上面膜ヲ生スルニ至リ放冷スレバヨク結芒ス。
 其芒ヲ取。乾シ貯。是ニ由テ消石ニ含ル海鹽。粘液
 等盡ク脱メ明淨ノ質トナルナリ。是ヲ以テ消石精

ヲ製スレバ極テ銳烈ナリ。消石上好ナラザレバ其精薄弱ニシテ斯の爾苦窳兒後ニトナルトナシ精製消石ハ八倍ノ水ニテヨク溶化ス。沸湯ニハ等分ノ量ニテ溶化ス。

主治 性寒。壯熱ヲ涼解スル峻藥トス。血液ノ沸騰。強盛ノ運行ヲ降鎮シ。煩渴ヲ止メ。脉ノ洪大強數ヲ減シ。腐敗ヲ防護ス。○諸管ニ鑽透ノ凝結ヲ溶化シ。閉塞ヲ開達シ。病毒ヲ分利ノ諸竅ニ排泄ス。○血液ノ大過強盛ナル運行ヲ抑制スト。雖モ他ノ酸精ノ如クニ收斂セズ。ヨク稠厚ノ血液ヲ稀釋ノ壯熱ヲ涼

解ス。○綠礬精。硫黃精。如キ礮性ノ酸精ハ收斂メ血液ノ焔解崩壞ヲ遏止シ。腐敗ヲ防護ス。譬バ乳汁ニ酸味ノ液ヲ加レハ凝固スルガ如シ。消石ハ一種ノ中和鹽ナレバ收斂セズ。ヨク血液ヲ稀釋溶解シ。壯熱ヲ清涼ス。○心藏大幹動脈及諸筋ノ強盛ナル勢力ヲ抑制ス。故ニ動脈ノ溫暖急疾ノ運行及ビ纖維ノ充張力ヲ減損シ。又腸腎皮表ノ排泄ノ諸管ヲ疏通ノ大小便。蒸氣ヲ開達ス。然レテ清涼利水ノ効殊ニ居多。故ニ熾衝壯熱ヲ解スル主藥トシ。熾盛熱。胸脇。咽喉。腎膀胱等ノ熾衝ヲ涼解ス。○凡ハ熾衝

病ハ消石一錢ヲ扁桃乳一匁ニ研和シ用_レ口或ハ左ノ乳劑良凡焮衝病ハ瀉下ノ害多シ故ニ乳劑ニ宜シ

桃舎涼解飲

扁桃乳十六匁 舍利別 六匁 消石 廿錢半

右研和シ半時毎ニ一小茶碗ヲ温服ス○劇キ焮衝病ノ效ナキ症ハ初發消石ヲ屋施茂兒ニ研和シ與テ効アリ○患者精力虚損シ殊ニ肺腎胃腸ノ虚罷セル諸症ハ消石害アリ○總テ熱病人壯實ナリ諸症減スルニ隨テ消石ノ服量ヲ減シ然_レ夕凝結ヲ疏釋スベキ症ハ硃砂ヲ以テ消石ニ代用_レヒ終ニ虚候

ヲ現スニ至テハ專ラ壯神劑ヲ與_レベシ○胸脇焮衝ノ脉強ニノ數乾欬ニ血ヲ交ル痰少許咯ク症ハ消石適應ス一日ニ三四錢マデ用_レベシ但_レ脉力衰ヘ焮衝減スルニ隨テ此藥モ減スベシ○胸肋焮衝ノ腐敗膽液ヨリ發シ其毒胃腸ニ鬱蓄スル症モ初メ消石ヲ用_レヒ焮衝減スルニ隨テ其量ヲ減シ輕キ下劑ヲ多ク用_レベシ○神經胸脇痛ト名ル症アリ胸脇痛ハ初_ニ焮衝ヲ發ス_レモ無幾精力虧損ノ虚候ナリ是ハ初_ニ焮衝ヲ發ス_レモ無幾精力虧損ノ虚候ヲ見_レスナリ故ニ初發消石ヲ用_レヒ虚候ヲ見_レスニ隨テ強壯劑ヲ與_レベシ○虚弱ノ肝焮衝ハ消石良効ア

リ。然レ是ヲ用テ嘔氣甚キ者ニハ用難シ。如此症ハ水銀劑ヲ加テ凝結ヲ溶解シ。阿芙蓉劑ヲ加テ疼痛ヲ寛解ノ効アリ。○胃及ビ腸ノ焮衝ハ總テ消石類ノ中和鹽ハ害アリ。○子宮焮衝ノ劇盛ナル症ハ消石効アレ。凡多クハ患者虚憊シ或ハ壞疽トナル故ニ戒慎ヲ加ベシ。此症ハ酸味收斂ノ藥ヲ用テ焮衝ヲ治シ。精力逾虚損スル片ハ攝爾扁答。纈草等ノ揮發壯神ノ藥ヲ加フベシ。○孕婦ノ頭痛發熱等神思ノ感動ヨリ發シ。血液ノ運行過盛ナル者ハ消石良驗アリ。○間歇熱。膽液熱。發斑熱ノ初發。焮衝ノ諸症多

キ者ハ消石ヲ用ベシ。凡ソ膽液過多ノ症。並ニ壯熱病ニ是ヲ用レバ皆ニ其熱ヲ解スルノミナラズヨク發汗ス。然レ凡惡性ノ熱病ニ於テ脉虚シ精力缺脱スル症ニ是ヲ用レバ病毒排泄ノ汗。斑疹等ヲ妨テ發越セザラシム。○中暑霍亂大渴煩熱甚キ症ニ是ヲ用テ壯熱ヲ撲滅シ煩渴ヲ涼解ス。○焮衝性ノ痘ハ消石ヲ的當トス。○焮衝性ノ痛風。關節痛。脚痛或ハ其毒。橫膈ニ衝テ煩悶シ嘔氣ヲ兼ル者ハ是ヲ用テ尤驗アリ。○焮衝性ノ傷冷毒熱ノ初起。其痛劇キ症ハ是ヲ用テ効アリ。然レ其劇痛ニ因テ患者速ニ

虚憊スル故ニ久服セシムル勿レ。寒凉刺戟ノ藥ニ堪ザレバナリ。○發斑熱ノ患者虚憊セル症ニ長ク此藥ヲ用レバ斑疹卒ニ消散メ内攻スルヲアリ。○焮衝性ノ失血ニ是ヲ用レバ血液ノ沸騰メ妄行スルヲ抑制スル故ニ多ク驗アリ然レハ焮衝性ノ症ニ非レバ大ニ血液ヲ稀釋メ逾其脫泄ヲ増劇ス。○徽毒淋疾ノ焮痛甚キ症ニ此藥ヲ稱ス。然レハ其焮熱腫痛劇キ症ニ刺戟驅水ノ峻藥ヲ用レバ却テ其疼増長スルヲアリ。此症ハ粘滑緩和鎮痛ノ劑ヲ施メ大ニ寛解ス。○眼耳斷舌ノ焮衝痛。羅斯等甚クノ發

熱スル者。焮衝性ノ頭痛及ビ熱毒發狂等ニハ是ヲ用テ的當ス。○咽喉及ビ口中ノ焮腫ニ是ヲ漱藥ニ加ヘ施メ効アリ。酷厲ナル熱ヲ兼ル症ハ殊ニ良。此藥ハ輕ク衝動メ解凝ノ効アル故ニ咽喉口舌ニ膠布セル粘液ヲ稀釋シ。燥熱ヲ凉散ス。或ハ玫瑰蜜ニ研和シ塗ルモ良。或ハ左ノ漱劑ヲ用ベシ

瑰麥潤涼飲

大麥煎 六勺

玫瑰蜜 一勺

消石 三錢

右溶化シ温メ漱劑トス。○傷冷毒ノ咽喉焮腫ニ消石ヲ漱劑トシ施メ其効。硃砂明礬ヲ調和シ用ルカ

如シ。又懸壅垂ノ腫脹ヲ消ス○小兒齒生スルニ由
テ齒痛劇ク。發熱效嗽。便閉。睡中驚悸。等ヲ兼ルハ消
石の效アリ。又斯ノ如キ諸症ニ左ノ劑驗多シ

鎮痛清涼飲

實亞格日温ダアコダ 十弓 消石 一弓

右研和シ半時ニ一卵匙宛用フ○凡ソ勞瘵様ノ病
及ビ麻疹後ノ勞效等ハ此藥ノ刺戟ニ堪ヘズノ害
アリ然レ遷延消耗熱及ビ荏苒タル内伏熱ハ左ノ
方驗多シ

爽神涼血散

蜩蛄石 一弓 消石 四錢 銀朱 一弓

右調和ノ散劑トシ。硝子壘ニ貯ヘ。一卵匙宛乳汁ニ
點服スル。一日ニ四次○發汗劑ニ消石ヲ加ハ能ク發
汗ス。又瀉下ノ効アレハ小便ヲ利スル効居多故ニ
多ク水腫小便閉ヲ治ス左ノ方良驗アリ

未爾扶斯消石散

消石 一弓半 格碌屈斯コロクノス 未爾扶斯マールチス 一弓

右研和シ每服一弓。日ニ四次。此劑寒性粘液質ノ人
ニハ利尿瀉下ノ効少シ○膽液酷厲ニノ熱毒多キ
下痢。及腸焮衝ヨリ發スル下利ニ消石ヲ用レハ下

利自之止ム。○熱性ノ經閉及産後惡露壅滯ノ熱ヲ兼ル症ハ是ヲ用テヨク痰血ヲ下ス。○脾病。神思鬱憂病等ニ兼ル煩熱。風氣痞滯。攀急。心腹痛ヲ解散ス。○消石ヲ温湯ニ溶シ外敷メ凝血ヲ疏散ス。冷水ニ溶シ施セバ血液ヲ凝固セシム。○消石ニ醋。海鹽ヲ加ヘ蒸溺劑トシ解熱涼散ノ効ヲ稱ス。或ハ醋。海鹽。屋施兒ヲ加ヘ吉利詞參兒トシ施メ大便燥結ヲ通ス。○服量大約一匁ヲ一服トシ加テ一錢ニ至ル

霸王鹽
 ガルボレイケレスト又「リキシハ。ヒトリ
 ヲラタノルフレア「羅。ヘルフルモーゲン
 デソウルト又「スワヘリゲス
 ワ「フルシ「レ「ホット「ア「ス「蘭

製法

消石

精製者

硫黃華

各等分

右各極細末トシヨク合和シ。坩鍋ヲ火上ニ上セ通紅トシ。右ノ末一匙ヲ取テ坩ニ投シ焔ヲ發シヨク燒化シ少シモ煙ナキニ至テ又一匙ヲ投ス。斯人如クメ盡ク其末ヲ燒了リ仍其坩ヲ火上ニ置テ四分時許ニノ火ヲ下シ。是ヲ取テ速ニ沸湯ニ溶シ。紙ヲ濾シ。其液ヲ靜定ノ上清ヲ取り渣ヲ去リ。文火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ上面膜ヲ結ズニ至リ。磁壺ニ内レ冷處ニ置テ瑩白ノ芒ヲ結ズ。其結芒セザル液ヲ取り初ニ除キタル渣ヲ加ヘ沸湯ヲ増シ加テヨク攪和

シ。紙ニテ漚シテ水氣ヲ蒸散スル。前法ノ如クシ。
 放冷ノ結芒セシム。數斯ノ如ク之終ニ少モ結芒セ
 ザルニ至リ。其芒ヲ取り集メ水ニテ洗ヒ乾シ。硝子
 壘ニ收メ貯フ。（按）或云此鹽潔白ナラズ。黑色ヲ帶ル
 ハ硫黄ヨク燒化セザルナリ。故ニ再ビ是ヲ大ナリ
 坩鍋ニ入テ燒煨シ。鐵籠ニテ手ヲ住メズ。攪セ一時
 半若ハ二時許ニシテ潔白ノ鹽トナル。是ヲ沸
 湯ニ溶シ結芒セシムル。前法ノ如クス。

主治 是一種ノ中和鹽ニシテ解疑ノ峻藥トス。内部諸
 藏ノ壅塞ヲ開通シ。腐敗ノ膽液粘液留飲。停水ヲ稀
 釋ノ小便ニ驅泄シ。微大便ヲ利ス。故ニ實症ノ水腫
 ニ尤効アリ。殊ニ其壯熱及ビ煩渴ヲ治ス。○性功孕

礬酒石ノ如シ。但孕礬酒石ニ比スレハヨク水ニ溶
 化シ稀釋解凝ノ効多シ。○服量半錢ヨリ一錢ニ至

ル。（候）（叔）（喝）
 （伍）（依）

固性消石

コトトリム。ヒキシム。羅
 ハステサル。ペトル。蘭

製法

坩鍋ヲ火ニ上セ。漸ク火ヲ加ヘ。精製消石
 ノ末ヲ投メ熔シ。是ニ木炭ノ通紅ナル小片。若ハ其
 細末ヲ以テ少許宛投スレバ爆聲ヲ發メ焚燒ス。數
 是ヲ投メ少モ焚ス消石凝固スルニ至テ逾火ヲ增
 少モ烟氣ナキヲ度トシ放冷スレバ消石ニ含ル鹽
 盡燒化メ白綠色ノ亞兒加利鹽トナリ。氣ニ觸レハ

速ニ溶解ス。是ヲ沸湯ニ溶シ火ニ上セテ煮熬ノ乾固ノ
 白鹽ト爲ス。是ヲ固性消石トス。○此鹽若ハ他ノ亞
 兒加利鹽ヲ水ニ溶シ是ニ消石精ヲ滴シ加レバ沸
 騰ス其沸騰止ヲ度トシ火ニ上セテ水氣ヲ熬減シ放
 冷スレバ復結芒ノ故ノ消石トナル。○性功酒石鹽
 ト同シ。〔庚〕

消石液

一名亞兒加利鹽精製別利羅
 一名亞兒加利鹽精製別利羅

製法

固性消石ヲ製シ了テ速ニ蒸餾水ニ溶シ
 濃テ渣ヲ去リ火ニ上セ水氣ヲ減メ油ノ稠ト爲ス
 是ヲ消石液トス。○性功酒石液ト同シ。〔庚〕

消石錠

ガルブリ子ルヲ羅
 ガルベトルクケシ蘭

製法

精製消石ヲ坩鍋ニ内レ。火ニ上セテ煏シ其
 量二十分一ノ硫黃末ヲ取テ少許宛其坩ニ投メ焚
 燒セシメ。是ヲ石上ニ寫シ放冷メ凝固セシム。〔臣〕

主治 清涼シ渴ヲ止小便ヲ利シ閉塞ヲ開キ粘液ヲ

稀釋ス。○壯熱。喉熱。咽喉焮腫及淋疾小便閉等ノ

焮熱アル症ヲ治ス。○服量半々ヨリ三錢ニ至ル。○

咽喉口舌ノ焮腫ニ是ヲ口中ニ含テ溶シ或ハ亞刺比

亞越謨ト沙糖ヲ加テ研和シ含テ驗アリ。〔依〕云此藥

酸性消耗スル故ニ性功剽寫亞斯ニ近シ故ニ燒煨ノ
 清涼ノ効ヲ取ルニハ精製消石ヲ優レリトス。〔臣〕

消石精

スヒリテラスニツトリ。アシガウム又スヒリ
消石精製乾淨者細末二十四号

製法

蒸餾水 各十二号
右消石ヲ硝子ノ列篤兒多ニ内レ。綠礬油ニ水ヲ和

シ。此液ヲ一滴宛右ノ列篤兒多ニ加ヘ。硝子ノ承餾

壘ヲ接合シ。接際ヲ塗封シ。沙火ニ内レ。初文火トシ

漸ク火ヲ加、蒸餾メ其精必モ蒸升セザルニ至リ。其

精ヲ取り硝子壘ニ内レ固封シ貯フ○右ノ消石精

澄清ナラズ微濁ルキハ是ヲ承餾壘ニ内レ。口ヲ開

沙火ニ安シ火候ヲ平等ニシ濁リタル蒸氣蒸散シ

盡キ澄清ナルニ至リ硝子壘ニ入レ固封シ貯フ

又法 發煙消石精 蒸餾水 各等分

右件合和ス

發煙消石精

スヒリテラスニツトリ。ヒュマンズガウ

ベリローケンデサルペトルシ

又「サルペテリヘ。サルペトルシ」蘭

此精蒸氣升發ノ焚烟ノ如シ故名ク

製法 消石精製乾淨者極細末二十四号

綠礬油 再餾者 十二号


右消石ヲ潤大ナル列篤兒多ニ内テ其半ニ充シメ。嘴長ク彎タル硝子ノ漏斗ヲ列篤兒多ノ頸ニ挿シ。是ニ綠礬油ヲ一滴宛徐々ニ淋漓メ列篤兒多ノ頸

ニ觸ル^ルナク消石ニ加テヨク混和セシメ^{一頭ニ注ギ加}
 兒^レ多^ハ大^ニ沸騰^ノ列^列篤^速ニ列^列篤^兒多^ヲ沙火ニ内^レ
 頸長キ硝子ノ承餾壘三個ヲ連續ス其法第一個ト
 第二個ノ承餾壘ノ頸本ノ側ニ一小嘴アリ先^列篤^ト
 兒^多ノ^ノ彎^{タル}頸^ヲ第一個承餾壘ノ頸ニ挿^シ一個
 ノ彎^リタル硝子管ヲ取テ第一個承餾壘ノ頸側ノ
 嘴ニ挿^シ其一端ヲ第二個承餾壘ノ頸ニ挿^シ又一
 個ノ彎^リタル硝子管ヲ取テ第二個承餾壘ノ頸側
 ノ嘴ニ挿^シ其一端ヲ第三個承餾壘ノ頸ニ挿^シテ連
 續セシムルナリ但^レ第二個承餾壘ニ其列^列篤^兒多^ト


ノ消石ノ二十分一ノ蒸餾水ヲ内^レ九^分錢^{第三個承}
 餾壘ニハ消石ノ四分一ノ蒸餾水ヲ内^レ六^分石^{灰ト}
 雞子白ト適宜ニ合和シタル膠泥ヲ布條ニ塗テ諸
 承餾壘ノ接際ニ纏^キ貼^メ蒸氣ヲ透漏セザラシム
 其承餾壘ヲ連續メ多少ノ水ヲ内^レハ其蒸氣ヲ水ニ
 吸收スルガ爲^{ナリ}然^ルニ初^ハ文火トシ漸次ニ火ヲ
 加^レバ黃色ノ蒸氣出^ツ列^列篤^兒多^ト底^ニ通^紅トナレ
 バ赤色ノ蒸氣升テ酸精溜滴ス終^ニ蒸氣必^シ升^ラ
 ガルニ至テ火ヲ下^シ放冷ス^レ第一^個承餾壘ニ
 ハ極^テ銳^烈ナル消石精出^ヌ此^即發^烟消石精^{ナリ}

速ニ是ヲ硝子壘ニ内レ。其三分ノ一ヲ充メ。硝子壘ニテ固封シ。冷處ニ貯ベシ。煖處ニ置ハ其精沸溢リ。第二個承餾壘ニハ銳烈ナラヌメ黄色ヲ帶ル精アリ。第三個承餾壘ニハ澄清ニメ多少消石氣ヲ含メル精出シ。其精ハ各別ニ硝子壘ニ内レ固封シ貯ベシ。或ハ兩嘴アル承餾壘ヲ以テ製スルモ良。即左ニ舉ル圖ノ如シ。又是ヲ以テ鹿角精。發烟海鹽精。硃砂加石灰精等ノ銳烈揮發ノ精ヲ製スベシ。第一列篤兒多。第二列口爐。第三列承餾壘。第四列硝子管。第五列鉢。冷水ヲ盛ル承餾壘ノ半水中ニ内レ固封

第一




第二



第三



第四



○消石精ハ右ノ如ク綠礬油ヲ加ヘ製スレモ消石
 ニ含ル亞兒加利鹽ヲ以テ其油氣ノ蒸升スルヲ阻
 遏スル故ニ毫モ綠礬油ヲ含ムナキ純粹ノ消石精
 トナルナリ○是ヲ製スルニハ嚴寒ノ時令ヲ最良
 トス○爐ノ火氣ニテ承餾壘ヲ温ナラシメズ勉テ
 寒涼ニスベシ○承餾壘ヲ放開スル片其蒸氣口鼻
 ニ觸レバ呼吸噎塞スル故ニ預メ意ヲ用テ是ヲ避
 クベシ○此消石精和蘭ニ於テ一斯的爾苦威兒
 ト名ツケ羅甸ニテ亞括忽爾扶斯ト名ク是ヲ用テ
 銀ヲ焔解ス○其列篤兒多ニ殘ル渣塊ハ消石ノ亞

兒加利鹽ト綠礬油ノ酸收ト抱合セル中和鹽ト
 是ヲ噎多羅赫篤栗沃刺點謨ト名ク性功鑽透問
 病、脾病、黃疸、等經久ノ病ヲ治ス是ヲ服メ嘔
 氣ヲ發セハ再煖過メ用メシ嘔氣ヲ發セズ是ヲ修
 製メ過兒加利謨需百利加利謨ト名ク此即孕礬酒
 リ酒石ノ條孕礬酒石○消石精ニ植物固性ノ亞兒
 ノ第四ノ製法是ナリ
 加利鹽 剝篤亞斯酒石鹽亞爾鮮ヲ加レバ故ノ消石ト
 ナル○此精ハ極テ猛烈ニメ焚カ如キ烟氣ヲ蒸發
 ス。諸油類ニ加レハ大ニ熱沸ス亞爾箇兒及丁子油
 ノ如キ揮發香竄ノ蒸餾油ニ加レバ忽燃テ焰ヲ發
 ス○此精ヨク固封シ貯レバ其焚蒸赤色ノ烟氣出

年モ消散セズ○然レ性大寒ニメ消石ニ勝ルリ。是
 清涼ノ峻功アルヲ以テ其性寒ナルヲ知ルメニナラ
 ズ。雪若^{モシ}ハ水ニ此精ヲ加レハ極テ寒冷トナリ。又是
 ヲ以テ氷及ビ雪ヲ作り。或ハ水銀ヲ凝固セシムル
 ヲ以テ知ルベシ○其秤量海鹽精ニ比スレバ重ク。
 綠礬精ニ比スレバ輕クノ酸性モ緩弱ナリ。
 [主治]性大寒。味峻酸ニメ一切壯熱及ビ嗽衝性ノ諸
 病ニ用テ涼解ノ峻藥トシ。津液ヲ生シ煩渴ヲ止メ
 血液ノ燥涸ヲ潤シ。壅塞ヲ開達シ。小便ヲ利ス○熾
 盛熱。膽液熱。腐敗熱等ノ壯熱ヲ涼解ス○綠礬精。硫

黃精海鹽精ハ收斂清涼ノ纖維諸管ノ弛緩虛弱ヲ
 健固ニス。此精ハ清涼ノ血液ヲ稀釋スル効。殊ニ峻
 ナリ。故ニ嗽衝性ノ水腫熱ヲ兼ル症ニ用テ清涼利
 水ノ俾効アリ○或云微毒ニ水銀劑ヲ長服ノ體中
 ニ懸留シ効ナキ症ニ是ヲ用レバ水銀ヨク融解ノ
 其主能ヲ逞發ス水銀ノ條ニ舉ル溶汞○此精一二
 滴ヲ水一盞ニ加適意ノ酸味ト爲シ服ス○瘡疹潰
 瘍等内服外敷シ又疥癬ニ塗テ良驗ヲ稱疾揚依
 [甘消石精] スボリヲスニツトリ。ドルシス羅ステ。サ
 ルベイトル。ゲスト。又アルコリセ。サルペ
 テル。ア
 テル。蘭

遠西名物考 卷二十八 風雲堂

製法

燒酒

三十度者
二北半

發烟消石精

一北

右燒酒ヲ潤大ナル長頸ノ列篤兒多ニ内レ硝子ノ漏
 斗ニテ消石精ヲ一滴宛其列篤兒多ニ加テ每次振
 蕩シ其頸口ヲ塞キ沙鍋ニ安シ承留壘ヲ接續シ置
 一數日置^{亞云}冷處ニ文火ニテ蒸餾シ其燒酒量ノ三
 分二ノ精ヲ取ル若其精ニ酸味アルハ是ニ煨製
 麻^グ屈^子涅^シ失^ア亞^アヲ加テ沸騰止ニ至リ列篤兒多ニ内レ文
 火ニテ蒸餾ノ精ヲ取硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

又法

亞爾箇兒^{三北}

發烟消石精^{六多}

右亞爾箇兒ヲ潤大ナル硝子壘ニ内レ消石精ヲ取

テ一滴宛加テ每次其壘ヲ振蕩シ頸口ヲ疎ニ塞キ
 冷處ニ置^{一七日}是ヲ列篤兒多ニ内レ承留壘ヲ接
 續シ慢火ニテ蒸餾シ精ヲ取ル^{一三十二多}其精ニ
 蒸餾水六多ヲ加テ攪和シ又煨製麻^グ屈^子涅^シ失^ア亞^アノ末ヲ
 取テ少許宛加テ必モ液動セザルニ至リ是ヲ列篤
 兒多ニ内レ文火ニテ蒸餾シ精ヲ取^{一三十多}是ヲ
 硝子壘ニ收メ固封シ貯フ^亞○純粹ナル油質ノ燒
 酒^{亞爾箇兒}ヲ云燒酒盡ク水氣ヲ^ニ猛烈ナル消石
 精ヲ加レバ宛モ焰ヲ吐カ如ク沸騰スル故ニ一頻
 ニ是ヲ加レバ大ニ沸溢ノ列篤兒多ヨリ迸出シ其

遠西名生方

醫學堂

蒸氣肺ヲ侵刺ノ呼吸噎塞ス或云此精ハ製法ニ意
ト雖モ時日ヲ經レバ必
ク消石精ノ酸味ヲ帶ブ

主治 是油質ノ酸精ニノ拔爾撒謨様ノ性能アリ。諸
壅塞ヲ開蓬シ。鬱結ヲ揮散シ。汚液ヲ排除シ。腐敗膽
液ヲ疏泄ス。○汗ヲ發シ。小便ヲ利シ。胃ノ諸症。子宮
衝逆ヲ治ス。○清涼飲ニ加、熱病ニ用、テ血液ノ沸騰
ヲ降鎮シ。渴ヲ止メ。惡性熱ヲ治ス。○此藥ウフ忽弗滿鎮
痛液綠ノ性能アリ。然レレ鎮痛液ニ比スレバ効力
緩和ニノ起熱ノ性少シ。故ニレ熾衝ヲ兼ザル者ハ熱
アル症ニモ皆良効アリ。○此藥。鎮痙ノ効アルニ因

テ發斑熱ニ多ク効アリ。然レレ赤斑熱ニハ害アリ赤
熱ハ總身面部ニ極、テ赤色ノ斑ヲ發シ、嗽是消石
頭痛等ヲ兼ヌ是、多クハ傷冷毒ヨリ發ス
精ノ氣アリテ咽喉ヲ刺戟スレバナリ。○利尿藥ヲ
加、テ水腫ニ殊効アリ。假令タトヘバ左ノ方ノ如シ

杜松驅水飲

杜松實水 六勺
海葱蜜 一勺
甘消石精 二錢
安質沒アテ扭酒 半錢

右調勻シ。一時ニ一匙宛用フ。○荏苒タル胸中諸症。
欬嗽痰喘等ノ患者虛衰シ傷冷毒ノ諸症ヲ兼ルハ
此精甚驗アリ。○此藥諸腹痛ヲ治シ食ヲ進メ風氣

痞滯ノ疝痛ニ捷効ヲ稱ス。故ニ一ニ是ヲ治疝露卜名
 久。但胃腸ノ炊衝ヨリ發スル症ハ斯ノ如キ竄透衝
 動ノ藥精ハ害アリ○子宮衝逆。脾病。神思鬱憂病ニ
 兼發スル拘攣痛ヲ治ス○孕婦ノ惡阻ヲ治スル良
 藥トス○神經感動甚キ人及ビ老人婦人ニ發スル
 頭眩眩冒。胃ノ虛冷ノ諸症。肢節顫振。觸動等ニ多ク
 速効アリ。是ニ驅風藥ヲ加テ殊ニ良○性功。大抵甘
 綠。養精。甘海鹽精ノ如シ○服量三十滴許。葡萄酒若
 ハ啤^ノ垓^テニ點服スル。一日ニ三四次_{依^侯揭^布福^収邊^津}

遠西醫方名物考卷二十八終

婦人血弱一此物以補之故一此是治其病之名
 久但胃腸ノ疾候ニ以發スル症ノ如キ實邊衝
 動ノ藥精ハ害スル○子宮衝逆解病神思鬱憂病ニ
 兼發スル物藥是ヲ治ス○孕婦ノ臨阻ヲ治スル良
 藥下ス○神經衰弱甚キ人及ヒ老人婦人ニ發スル
 頭眩眩冒胃ノ重冷ノ諸症候筋脈振動等ニ多ク
 運効アリ是ニ懸及藥ヲ加テ殊ニ良○性味大苦
 味辛○海鹽精ノ如シ○服量三十滴許毎時酒若
 小杯ニ以テ服スル日ニ三四次
 遠西醫學名物考卷十八終

遠西醫方名物考標目

卷二十九

石膽

皓礬

綠礬

綠礬油

淨製綠礬油

再餾綠礬油

綠礬精

皓礬造法

收斂皓礬水

皓礬水

揮發清血飲

爽酸清涼飲

消毒治癬飲

健胃玫瑰煎

爽酸舍利別

亞的兒 揮發壯神飲

收斂亞的兒 亞的兒回生飲

暹設印亞的兒

忽弗滿鎮痛液

密涅刺爾鎮痛液

甘綠礬精

越栗失爾赫篤立沃利

礬紅

蓬礬鹽

膽礬 雙礬收飲水

煨膽礬

遠西醫方名物考卷二十九

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

石膽

「ヒトリヲルム」
「ヒトリ」又「ゴペル」
「ヒトリ」

○按ニ「ヒトリヲルム」ハ膽礬。綠礬。皓礬ノ總稱ナ

リ。漢說ニ此總稱ナキヲ以テ假ニ石膽ヲ以テ是

此ニ充ツ

此物分テ三種トス。膽礬。綠礬。皓礬ナリ。共ニ天工人

工ノ二種アリ。○天工ノ者ハ山坑若ハ地上ニ於テ

硫黃ヲ含ム酸精即チ硫銅鐵亞鉛等ト抱合メ溶化

シ。遂ニ凝固ノ石英狀ノ塊ヲ成者ナリ。其銅ト抱合
 又成者ヲ膽礬トシ。鐵ト抱合メ成者ヲ綠礬トシ。亞
 鉛ト抱合メ成者ヲ皓礬トス。○人工ノ者ハ山坑ニ
 出ル一種礬性ノ礦石。若ハ其性ノ土ヲ採リ搗碎キ
 ニ溶シ淘洗メ濾過シ。其汁ヲ煮テ放冷シ。石英狀ノ
 晶ヲ結シムルト宛モ消石ヲ製スルガ如シ。或山坑
 ニ出ル礬性ノ泉ヲ煮テ晶ヲ結シメ製スル者アリ
 但、其產地ニ隨テ品ヲ異ニス。又其銅鐵等ニ硫黃ヲ含
 多少ニ隨テ其性及色ヲ異ニス。卽是ヲ分別ノ左ニ舉
 皓礬
 ヲトリヲルムアルビュム又「シンキム」ヒトリ
 ヲルム羅 ヲイツテヒトリヲル又スピアウ

テル。ヒトリヲル蘭○「ウイツ」テヒトリヲルハ
 白礬ノ義ナリ。然レ礬石ト同稱ナル故ニ今
 譯ノ皓
 礬トス

是、天造人工ノ二種アリ。天造ノ品ハ亞鉛ト硫黃ヲ
 含ム酸精前出ト抱合シ地中ニ於テ自然ニ凝結セル
 中和鹽ナリ故ニ一是ヲ亞鉛礬ト名ク其質硫黃酸
 性氣土氣水氣ヲ含白色ニメ石英狀ノ小塊ヲ成シ
 或帶白色。乾固淨潔ニメ其狀。沙糖ノ凝塊ノ如ク或
 赤點若ハ綠色ヲ帶ブ味酸澁ニメ甘ヲ帶ビ收斂侵
 刺ス。然レ綠礬ニ比スレバ苛烈ナラズ或ハ未熟ノ
 銅鐵礦。燼甘石。鉛等ヲ夾雜セル者アリ火ニ投スレ

ハ煇テ黄赤色ノ灰トナル。或ハ礮性ノ泉ノ蒸氣。自然ニ凝聚ノ成者アリ。○右ノ如ク銅鐵鉛等ノ礮質ヲ雜ル故ニ藥劑ニハ天造ノ品ヲ用ス。製造メ用フ。○製造ノ品ハ往昔ハ綠礬ヲ煇過メ白色ト爲シ水ニ溶シ濾過シ其液ヲ煮テ熬乾シ製ス。是レ綠礬ニ比スレバ性緩ニノ酷烈ナラズ。或云愕斯刺盧獨歐羅巴洲ニ於テ製スル者ハ山坑ヨリ毳毛ノ如ク綿絮ノ如キ者ヲ採テ水ニ溶シ熬乾メ白色ノ塊ヲ爲ス。沙糖ノ如シト。○今時ハ製煉術ニテ皓礬ノ質ヲ覈知シ新ニ是ヲ製造ノ醫藥ニ供ス。其法左ノ如シ。

皓礬製法

亞鉛 粗末 適宜 綠礬油 再餾者 四弓

蒸餾水 十弓

右綠礬油ニ水ヲ合和シ亞鉛末ヲ取テ少許宛是レニ加レバ熱沸ス。終ニ少モ沸騰セザルニ至リ。温ニ乘メ紙ニテ濾シ其液ヲ火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ上面膜ヲ生スルニ至リ冷處ニ置バ白色ノ晶ヲ結ズ。是ヲ取り乾シ硝子壺ニ收メ固封シ貯フ。此物ハヨク水ニ融解シ又氣ニ觸レハ速ニ溶化ス。○中藥

主治 鎮痙ノ良藥トス。痙痙。搐掣。子宮衝逆。等神經ノ

諸症。及ビ内藏壅塞。蛇蟲等ニ奇効アル。亞鉛花ノ
 主治ニ舉ル如シ亞鉛華ノ條ニ皓礬ノ殊効ヲ稱ス参考スベシ○中毒等
 ノ速ニ吐スベキ症ハ一二日ヲ飲液ニ點服メ快吐
 ス○漱藥トメ鵝口瘡ヲ治ス。或ハ玫瑰蜜ニ研和シ
 塗テ捷効アリ○焮腫眼ニ點メ腫痛ヲ去リ淚多キ
 ヲ治ス或ハ皓礬一錢沙糖二錢研和シ眼ニ點ス○
 角膜曇暗潰瘍等ニ是ヲ胡桃油若ハ乳汁或ハ家猪
 脂ニ研和シ眼ニ點シ或ハ煮タル雞卵ノ黃ヲ去リ
 皓礬ヲ填充シ置バ自ラ溶解メ津液滲流ス其液ヲ
 取り眼ニ點メ皆良驗アリ。但藥性侵蝕スル故ニ一

頭ニ多ク施ス勿レ○疥癬及失苟兒カクル陪苦ガイクノ潰瘍
 ニ皓礬。硫黃。家猪脂。各等分研和シ軟膏トシ貼メ治
 ス。但硫黃ノ臭氣ヲ去ルニハ芳香ノ蒸餾油一二滴
 ヲ加ベシ或ハ硫黃ヲ除クト雖モ亦効アリ頑癬浸
 淫瘡ノ類ハ總テ皓礬良驗アリ○此末ヲ摻テ出血
 ヲ止メ潰瘍ヲ淨掃シ乾愈ス搗福依
 皓礬水アノ多オアノ多オフタルフタルミカミカヒトリヒトリルルウウトトルル蘭蘭
 製法 皓礬 九爪
 水 六勺 一方 薔薇露ヲ用フ
 右研和シ硝子壺ニ内レ貯フ

主治 炊腫眼ノ洗藥トシ微收斂シ酷厲液ヲ淨除シ
 炊腫ヲ消シ疼ヲ止メ熱淚ヲ祛ク○玫瑰蜜ヲ加テ
 口鼻ノ潰瘍水棉様肉鵞口瘡失荀兒陪苦ノ潰瘍腐
 爛ニ塗リ或涎唾多キ症ニ含藥トシ或虛症ノ淋疾
 ハ尿道ニ注入シ或尿管癭ニ灌入ノ皆良驗アリ

收斂皓礬水 アイクヌステイフチカヒットリヲルネイトル蘭

製法 皓礬 五錢 煎汁 亦此煎汁

右研和シ硝子壘ニ内レ貯フ

主治 外敷ノ出血ニ速効アリ殊ニ衄血ヲ止ム其法

棉撒絲ヲ以テ重襲稠密ニ尿管ニ纏キ此水ニ浸シ
 ヨク濡シ鼻孔ニ挿ス一拇指横徑許是ヨリ上部
 ニ向テ徐クニ押シ其絲ヲ留メテ尿管ヲ抜去リ數
 日鼻孔ニ留メ置テ自ラ脱落スルニ至ル

綠礬 ヒットリヲルネイトル蘭

綠礬ハ淡綠色六稜石英狀ノ晶ヲ成シ大小一ナラ
 ズ或長大方形ヲ爲シ或小片碎塊ヲ爲シ或手ニ觸
 テ粘著スル者アリ味酸澁微甘舌ヲ刺戟ス○其質
 ハ鐵性ノ土ト礦類ノ酸性鹽ト抱合セル中和鹽ナ

リ。或多少ノ銅氣ヲ含リ然レ鐵氣ヲ含ム殊ニ多キ
 夫以テ一是ヲ鐵礬ト名ク○鐵屑ニ綠礬精ヲ加テ
 溶シ結芒セシムレバ鮮美上好ノ綠礬トナルヲ以
 テ知ベシ是即チ鐵ノ條ニ舉ル撒兒又綠礬ヲ燒煨
 スレバ赤色トナリ或ハ綠礬一塊ヲ草木ノ煎汁ニ
 溶シ殊ニ沒食子ノ煎汁ニ加ヘ溶セバ漆黑色トナ
 ル和蘭ニ是ヲ以テ墨汁ヲ製ス是皆鐵氣ヲ含ル顯微ナリ○味收
 斂ノ甘ヲ帶ビ深綠色ナルハ鐵氣尤多トス○碧色
 ヲ帶ルハ銅氣多クメ膽礬ノ質ヲ兼ヌ但シ是ヲ蒸
 餾スレバ其精銅臭ナシ○上品ハ大塊ヲ爲シ碎屑

少シ。美綠色透亮ニ汚物ヲ雜ス斯ノ如キ品ハ水
 氣殊ニ多ク其質ノ半ニ過ギ又硫氣土氣多シ是綠
 礬油ヲ製スルニ尤良トス白色ノ碎片ヲ雜ルハ下
 品トス○其品產地ニ隨テ差異ナリモンデリアノ産
 ハ赭綠色ノ晶ヲ成シ鐵氣殊ニ多シ
主治 綠礬ハ稍銅氣等ノ礦氣ヲ含ム故ニ内服藥ニ
 用ス撒兒末爾サール扶斯スヲ用フ是人工ノ綠礬ニ汚物
 ヲ雜ヘズ純粹ノ鐵性礬トス故ニ内服ノ効用甚ダ
 多シ鐵ノ條ニ出ツ○外敷メ諸失血ヲ止ム此末ヲ
 綿撒絲ニ摻ケ大動脈創ノ出血ニ貼スレバ其血凝

固ノ創口ニ被ヒ脉管ヲ縮收ノ痂ヲ結フ○水ニ溶
シ寒壞疽ノ蒸漏藥トシ腐敗ヲ遏ム

綠礬油

オレウムトトリ又アシダウムトトリヲリ
スワイフルシエリ又オリバーハンコーペルロド

○按ニ綠礬。膽礬共ニ油ヲ取レ其藥劑ニハ皆綠

礬油ヲ用フ。是綠礬ハ膽礬ニ比スレハ酸精出ル

ト最モ多ケレバナリ。然レ其銀ヲ焔シ銅ヲ蝕スル

ニ用ル斯的爾苦窠寫兒精ノ條膽礬油ニテ

製スベシ。ト云説アレ其性綠礬ト同シ

製法

綠礬ヲ坩鍋ニ内レ煨過ノ黃色或云トナ

リ乾固スルニ至テ五斗ヲ取リ。陶製ノ列篤兒多ト

三分ノ二ニ充シメ。潤大ナル硝子ノ承留壘ヲ接合

シ。膠泥ニテ其合際ヲ塗封シ乾スト一晝夜。爐ニ内

レ膠泥ノ條ニ出ル第一圖ノ爐初文火トシ。漸ク白色ノ蒸氣出テ

列篤兒多温ナル火候ト爲ス。約三時。其蒸氣消

スルニ至テ温ナル硝子ノ承留壘ヲ以テ換。合際ヲ

塗封シ。火ヲ加蒸留ノ油ノ如ク精ノ如キ液。承留壘

ノ裏面ニ著テ下ルト條縷ヲ引ガ如キニ至ル。此火

候ト爲シ蒸留スルト三時ニノ後。烈火ト爲シ列篤

兒多通紅トナル火候ト爲シ蒸留スルト又三時。其

門ニ稠厚ノ油出ヅ。終ニ其液少モ出ザルニ至テ火

ヲ去リ承餾壘冷テ列篤兒多^ト少温^ル丸^ル片意^テ用^ヒテ
承餾壘ヲ放開シ其油ヲ長頸ノ硝子壘ニ寫シ固封
シ貯フ。其油大抵二十多許アリ。是粘油ノ如ク稠厚
ニシテ甚ダ重ク楮黒色。其氣極テ酷烈ニシテ焚^クガ如ク。
口鼻ニ觸テ效ヲ發ス。水ヲ加レバ大ニ熱沸ス。○其
列篤兒多^トノ底ニハ楮黒色ニシテ土質ノ渣塊四比許
アリ。○初ニ出ル清稀ノ液ハ綠礬精ニ代用ス。○承
餾壘ノ接際ヨリ蒸氣透漏スル^ル片^ハ膠泥ヲ布片ニ
塗リ温^テ貼シ封スベシ。○此油ハ淨潔ナラザル故
ニ再ニ蒸餾メ純粹ト爲シ藥劑ニ供スベシ。

淨製綠礬油

オレウム、ヒトリヲリ、コンセンタラ、
ム、シケソイフル、デ、スワフル、シール、蘭

製法

綠礬油ヲ長頸ノ硝子壘ニ内レ。沙鍋ニ安

シ。初文火トシ漸ク火ヲ加ヘ終ニ水氣少モ升ラザ
ルニ至レハ壘中ノ油澄清トナル。是ヲ硝子壘ニ寫
シ固封シ貯ス。

再餾綠礬油

ア、シ、ダ、ム、ヒ、ト、リ、ヲ、リ、コ、ン、セ、ン、タ、ラ、
タ、ム、レ、キ、チ、ヒ、カ、左、ム、又、ガ、レ、ウ、ム、ヒ、
ト、リ、ヲ、リ、ヒ、リ、ウ、ム、
ソ、イ、フル、ス、ワ、フル、シ、ール、蘭

製法

綠礬油ニ北

右硝子壘長頸列篤兒多ノ半ニ充シメ。沙火ニ内。承
餾壘ヲ接合シ。其合際ヲ塗封セズメ初メニ升騰ス

鎮メ小便ヲ利シ又腐敗ヲ過ルニ峻効アリ。故ニ腐敗熱ノ要藥トス防腐ノ効。硫黃精ニ比スレハ更ニ峻ナリ。○海鹽精ニ比スレハ揮發竄透スルヲ少クシテ收斂ノ効多シ故ニ凡、纖維諸管ノ弛解縱緩ノ虛憊セルヲ收固ノ强健ニシ。兼テ潤涼解熱ノ効ヲ稱ス。但、腐敗ノ症ナキ神經熱ニハ的當セズノ間害アリ。○患者精力虛衰シ纖維諸管弛緩シ酷厲毒アリテ血液腐敗ニ傾ク諸熱病ニ尤効アル藥トス。故ニ腐敗熱ニ殊効アリ但、胃腸ノ病毒汚物ヲ淨掃メ用ニ非バ効ナシ。○腐敗熱ノ血液焔解渙崩スルヲ收

斂メ防護ス。故ニ失血ヲ兼若ハ發斑アル症ニ殊良。○海鹽精ニ比スレバ刺戟スルヲ少キ故ニ總テ發斑熱ニ驗アリ。赤斑熱ノ脉小ニ弱。皮膚青赤色ニシテ氣息惡臭アリ。咽喉内黧積ニシテ殆ト壞疽ノ如キ等ノ腐敗ノ病性アル片ハ此藥尤効アリ。虛憊甚キ症ハ龍腦、麝香、攝爾扁容等ノ壯神藥ヲ兼用スベシ。○焮衝性ナキ間歇熱ノ熱甚キ症ニ間効アリ。然レ壯實ノ症ニハ害アリ。其強壯スル効力ヲ以テ壯熱煩悶等ヲ増發スレバナリ。○壯實ナル焮衝性ノ諸病ニ効ナキト海鹽精ノ如シ。故ニ此藥ハ總テ虛症

ニ適應スト知ベシ○腐敗ノ症アル麻疹ハ此類ノ酸精偉効アリ○惡性ノ痘ニ最奇効アル藥トス凡惡痘ハ見點ノ赤色ニ黯青ヲ帶ビ其形次序ナク患者疲勞甚ク精神困重沈垂スル等ナリ斯ノ如キ症ハ腐敗性ノ痘タルヲ察メ初ヨリ此藥ヲ用ベシ但右ノ諸症ナキ者ハ灌膿ノ時ニ與ベシ此時多ハ其毒ニ因テ血液腐敗シ其膿血中ニ混淆ノ一種ノ腐敗熱ヲ發シ危篤ニ至ル故ニ此藥ヲ用テ血液ヲ收斂メ其腐敗崩壞ヲ阻遏シ壯熱ヲ涼解メ血脉ヲ強固シ以テ其膿ノ血中ニ泛濫スルヲ制止シ且下

利ヲ誘起メ臭穢ノ膿ヲ通瀉セシメ患者ヲメ大ニ輕快ヲ得セシムル等ノ殊効アリ○痘ニ失血ノ症ヲ現シ或ハ紫黑色ノ斑ヲ兼ルハ危險トス此藥ヲ幾那煎ニ加與テ峻効アリ○此藥諸失血ヲ療シ殊ニ崩漏痔血ニ効アリ但劇キ崩漏ハ收瀉入峻藥ヲ用ザレバ捷効ヲ得難シ○患者壯實多血ニハ吐血ヲ發スル症ハ此藥甚害アリ唯腐敗熱失苟兒胎苦等總テ虛弱ニ屬スル血症ニ適應ス○瘧瘵ノ運動ヲ兼ル失血ハ阿芙蓉ヲ加テ良○血脉脆薄ニハ弛解シ發スル失血ニ効アリ即顔色鮮美嬌紅ナル必

年及婦人ノ劇キ效ナクノ吐血スルガ如シ○勞瘵ノ吐血ニ效ヲ得ヲアリ。是ハ肺瘍ノ膿自血中ニ混シ膿熱ヲ發シ血液腐敗スルヲ遏止シ。諸液焔解崩壞ノ發スル自汗盜汗ヲ收斂シ治スルナリ。或越栗失爾シレヒツト赫ト寫立リ後ニ等ノ香竄藥ヲ加ル劑ヲ用レ用レ此症ニハ害多シ。唯此精ヲ十滴ヨリ十五滴マテ適宜人粘滑ナル液亞刺比亞越謨漿過爾若ハ舍利別鹿角膠等攪和シ日ニ數次與テ驗アリ○健胃ノ一良藥トス。腐敗膽液胃中ニ鬱滯スル症ハ是ヲ驅除ノ後此精ヲ用テ尤驗アリ。斯人如キ症ハ越栗失爾シレヒツト赫ト寫立リ等ノ

香竄藥ヲ加劑七良。凡胃虛ノ食進マズ噫氣妨悶重滯不化。心下痞滿等ヲ治シ。脾病依剝イボ昆垤クニヂ兒子宮病ノ諸症ニ間捷効アリ○白帶下ニ左ノ方殊効アリ

揮發清血飲

此藥亞爾筒兒二子

蘇綠礬油再留者三錢

右調和シ十五滴宛冷水一盞ニ點服スル日三次

○痛風ノ劇痛漸減スル時此精ヲ用テ血中ノ毒ヲ

疏散シ胃ノ虛罷セルヲ健運ノ効アリ又左ノ方良

健胃玫瑰煎

玫瑰花 六錢

綠礬油 再餽者 半錢

沸湯 三匙

右玫瑰花ニ沸湯ヲ注ギ蓋閉シ浸ス下一時半。冷テ後。綠礬油ヲ攪和シ一茶碗宛服スル。日ニ三四次。此劑。收斂清爽ノ胃腸ヲ健運シ。惡心嘔氣ヲ鎮メ飲食ヲ進メ。凝體纖維ノ弛緩虛弱セル諸病。或ハ熱病ニ因テ虛羸瘦削セル症或云幾那ヲ兼用ノ良或ハ失血過多崩漏。或ハ傷冷毒。流走痛等ニ用テ殊効アリ。○此精ハ水ニ滴シ適意ノ酸味ト爲シ服スベシ熱病ニハ

水若クハ對症ノ清涼飲四十多ニ此精十五滴若クハ二十滴ヲ加テ酸美ノ味トシ用フ。○是ヲ服ノ腹攣痛シ食ヲ妨ケ若クハ下利スル者ハ香竄ノ露水或ハ舍利別ヲ加ヘ或ハ適意ニ砂糖ヲ加ヘ飲液ニ和シ用ベシ。○水ニ滴シ適意ノ酸味トシ用レ。凡藥力緩弱ニ峻効ナキ片ハ左ノ方ヲ用ベシ

爽酸清涼飲

綠礬精 七錢

過爾託亞舍利別 一匙

沸湯 八多

右調和シ四分時。若ハ半時ニ一匙宛服ス但此劑ノ酸味ニ堪ザル者ハ大麥煎少許ヲ加用ベシ或ハ左ノ方ヲ用ルモ亦良

爽酸舍利別

綠礬精 四錢

過爾託亞舍利別 四錢

右調和シ一匙宛適宜大麥煎ニ加用フ。是ニ由テ其酸味甘和ニ咽喉ヲ刺戟スルヲナシ○瘡疹類諸皮病ニ此精良驗アリ。或久ク發汗劑ヲ用テ効ナキ症ヲ治ス○乾癬類ニ用テ速治スルヲ必カラズ。或

云。乾癬濕癬共ニ効アリ。又汚液多ク出ル浸淫瘡ニモ良。或云。多血人人ニ發スル疥癬ニ効アリ。其症患處焮腫シ多ク膿潰ス但粘液質ニ萎黃病様人人ハ酸性ノ藥ハ害アリ○小兒ノ疥癬ハ是ヲ乳母ニ與テ母子共ニ治ス。然レ其兒薄弱ニハ酸精ノ侵刺ニ堪ズ。腹痛搐掣等ヲ發スル者ハ左ノ方ヲ與ベシ

消毒治癬飲

綠礬油 再留者 一錢

泉水 五錢

右綠礬油ヲ水ニ滴シ沸騰止テ左ノ藥ヲ加フ

右攪和ス。服量一錢ヨリ二錢マデ水一盞ニ加與_ル。日二三_ニ次。其症ニ隨_ニ加減ス。○外敷ノ亦疥癬ニ良効アリ。綠礬油一錢。家猪脂一弓煉和シ貼ス。○此精ニ水ヲ加_テ稀クシ疥癬類ニ外敷_テ淨刷收斂劑トシ殊効アリ。○腐壞性ノ潰瘍ニ綠礬精ヲ水ニ加_テ蜜若_{クハ}玫瑰蜜ヲ溶シ塗テ治ス。○此精ヲ熱壞疽ノ邊圍ニ塗テヨク腐壞ヲ遏ム。○疣贅小肉腫小癩ニ塗テ消散ス。○此精ニ玫瑰蜜ヲ和シ鷺口瘡ニ塗テ治ス。

亞爾箇兒 再醱者 各四北

強的兒 アイテルノルプリキス羅ヒットリ
ヲイルアイテル又スワフルアイテル蘭

製法

亞爾箇兒

綠礬油 再醱者 各四北

右綠礬油ヲ亞爾箇兒ニ滴シ加_ヘ。每滴振蕩ノヨク混和シ冷ルヲ候ヒ滴シ加_ヘ。終テ硝子壘ニ内固封シ冷處ニ置_キ。一兩三日ニ長管アル硝子ノ漏斗ヲ以テ是ヲ硝子ノ長頸ノ列篤兒多_{クハ}其頸本ノ側ニ一嘴ヲ塞_メ。内底ニ一小孔アル承餉壘ヲ接合シ底ノ孔ハ膠泥ニテ其接際ヲ塗封シ又家猪ノ膀胱ヲ襲テ其上ニ纏キ蒸氣ヲノ透漏セザラシメ。其列篤兒多ク沙火ニ内速ニ煮沸スル許ノ火候トシ蒸餾ノ液ヲ

取_レ六_三至_リ。是_レ承_餾壘_底ノ孔ヨリ泄_シ取_リ。
 此液ヲ復_シ其列_篤兒_多中ノ液ニ加_ヘ。頸_側ノ嘴ヨリ蒸
 餾ノ其頸ニ油_様ノ滴_瀝凝_聚セズ唯_枝極ノ如_キ條
 縷ヲ引_リ至_テ火ヲ下_シ。承_餾壘ノ液ヲ硝_子壘ニ入
 是ニ其量ノ半分ノ蒸_餾水ヲ加_ヘ振_蕩ノ上_面ニ浮
 ム亞_的兒ヲ抄_ヒ取_リ小_硝子壘ニ内_必モ空_隙ナク
 充_テシメ硝_子塞ニテ固_封シ水_中ニ倒_置シ貯_フ○若_モ
 其亞_的兒ニ硫_黄ノ臭_氣アルハ黑_蘆斯_汁葉_ハト煨
 製_麻屈_涅失_亞ノ末ト等_分ニ合_和メ少_許宛_是ニ加
 テ必_モ滾_動沸_騰セザルニ至_テ再_ビ蒸_餾シ其亞_的

兒ヲ取_リ前_法ノ如_ク貯_フ 長

又法 亞_爾箇_兒ノ四_北

綠_礬油 再_餾者

右亞_爾箇_兒ヲ硝_子ノ列_篤兒_多ニ内_綠礬_油ヲ一_滴
 宛_加レバ沸_騰メ香_氣ヲ發_ス。每_滴ヨク振_蕩シ。沸_騰
 止_レ冷_定メ硝_子ノ潤_大ナル承_餾壘ヲ接_合シ罅_隙ヲ
 塗_封シ沙_鍋ニ内_慢火ニテ蒸_餾シ其液_六攝_昆度ノ
 間ニ六_滴宛_下ルヲ度_トシ。晝_夜平_分ノ時ノ半_時ヲ
 抽_篤ト云_密抽_篤ヲ六_十分_タルノ時ノ分_ヲ密
 云_三針ヲ具_ル自_鳴鐘ニテ驗_スベシ。六_攝昆_度ハ大
 約_一呼_吸ノ終_ニ列_篤兒_多及_承餾_壘ノ裏_面ニ硫_黄
 間_ニ在_リ

質ノ蒸氣現レ。油氣漸ク疏解シ水様ノ條縷稍凝聚
 滴瀝ノ狀ヲ透見スルニ至テ速ニ火ヲ下シ承餽
 壘ヲ放開スレバ其液大抵二十七八許アリ。是ニ煨
 製麻屈涅朱亞ノ末。少許宛加テ數振蕩シ。此モ滾動
 也。又硫黃ノ酸臭盡ク消スルニ至テ復列篤兒多ニ
 内。底ニ一小孔又心承餽壘ヲ接續シ。底ノ孔ハ罅隙
 ヲ塗封シ沙鍋内。慢火ニテ蒸餾シ液ヲ取リ一坩
 ニ至リ。其液ヲ蒸ノ孔ニ是ニ手留水牛比ヲ加テ三
 夕振蕩シ上面ニ浮ム稀キ油様ノ液ヲ抄ヒ取。硝子
 壘ニ内硝子塞ニテ固封シ貯フ。是亞的兒ナリ。匣

主治 亞的兒ハ極テ輕清精微ノ液ニシテ鎮痙ノ奇効

ヲ奏ス。故ニ失氣昏冒。心動悸。子宮衝逆。太諸症。痙性
 ノ喘急。疫效等ヲ治ス。○神經熱。腐敗熱。子宮病。諸
 症ニ用テ精神ヲ揮活快暢シ。神經ヲ健運充張シ。微
 衝動ノ靈液ノ罷弊怠慢ヲ振起醒覺スル要藥トス
 十滴ヨリ二十滴マデ葡萄酒ニ點服シ或ハ沙糖ニ
 和シ服ス。○凡熱病ノ患者。精力虛脫シ脉細弱。泛然
 トノ飄蕩シ定準ナキ者ハ此藥極テ的當ス。惡性熱。
 腐敗熱。神經熱ニ右ノ症アル者ハ殊ニ驗アリ。或ハ
 揮發衝動ノ藥ヲ加テ尤良。假令バ左ノ如シ

揮發壯神飲

桂露 四勺

桂丁幾去爾

亞的兒

揮發香竄精

各一錢

右調和シ四分時ニ一匙宛與ヘ諸症寛解スルニ至

○痙攣ノ運動ヨリ發スル疝痛ニ亞的兒ヲ用テ捷

効アリ ○痛風毒等ノ肢節痛消散メ内攻シ煩悶腹

痛等ヲ發スルニ用テ速ニ寛解ス此症左ノ方亦奇

効アリ

亞的兒回生飲

亞的兒 一匁

麝香 一匁

桂露 四錢

右研和シ一服トス ○航海ニ慣レザル人船暈ヲ發

シ頭眩胸悶嘔吐等ヲ患ル者ハ亞的兒ヲ冷水ニ點

服メ速ニ治ス預メ是ヲ服スレバ其症ヲ發スル

ナシ又齒痛ニ外敷メ速効アリ

收斂亞的兒

アテリキシソルアリキスアシダムハルレリ又
アテリキシソルアリキスアシダムハルレリ又
ハニハルレキル

遠西名物考 卷二十九

製法 綠礬油 再餾者

燒酒 三十度者 各等分

右燒酒ヲ硝子壺ニ内。意ヲ用テ綠礬油ヲ一滴宛加テヨク合和セシメ。固封シ浸下三日。又聽用ス。

主治 收斂衝動ノ神經ノ感觸知覺已甚ヲ鎮定シ。是ヨリ發スル神經ノ諸症ニ奇効アリ。○神經質人感動シ易キヨリ發スル諸病ニ於テ脉ヲ攣衝ノ候ナク。且諸筋弛緩虛弱ニノ渴ナキ症ニ的効アリ。○子宮衝逆。脾病。依刺昆垓兒等ノ神經感動甚キ症。及肢節各部。顫振。搖掣。頭眩。眩暈等ヲ治ス。○服量十五滴

マデ水ニ加ヘ稀クシ用ル。一日ニ三次。○是ニ鎮痛驅風ノ藥ヲ加テ殊ニ驗アリ。假令バ左ノ方ノ如シ

亞的兒芙蓉飲

其藥性 亞的兒 一錢

薄荷水 三勺

橙皮舍利別 一勺

阿芙蓉 精製者 三錢

顯草 丁幾 去爾 製法 健質 亞那 丁幾 二錢

右調和シ一匙宛用ル。一日ニ四次

過設印。亞的兒

主治此液ハ清稀ノ油ノ如クニ佳香アリ利或云阿
 鎮痙定痛ノ聖藥ナシ。一切神經病ニ奇効ヲ奏
 シ。微睡ラシメ。汗ヲ發シ小便ヲ利ス。○此藥ハ血液
 ヲ收斂清涼セズ凝固セズ。多ク亞兒加利鹽ヲ含テ
 揮發竄透シ。油氣ヲ含テ神經ヲ強壯ニシ。一切劇痛
 ヲ止メ。痙攣搐掣ヲ鎮メ。風氣ヲ驅リ。鬱塞ヲ開通ス。
 故ニ失氣昏冒ヲ醒復シ。精神ヲ欣慰シ。動悸ヲ鎮上
 衝セズ。頭ニ鬱滯セズ。ヨク精力ノ虛衰ヲ挽回ス。○
 痙ノ諸症。小兒痙瘓。子宮衝逆。腸攣急等ヲ速ニ解散
 ス。但先ツ下劑若ハ吉利詞スチル多兒ヲ施シ大便ヲ通利

ノ是ヲ用ベシ。○硃砂精若ハ鹿角精ヲ等分或ハ三
 分一加入用テ失氣眩暈。痙瘓。搐掣ノ諸症ニ速効ア
 リ。○諸劇痛ニ奇効ヲ奏ス。即痙攣性。喘急。疫効。痛風
 毒内攻痛。心腹痛。劇キ疝痛。小兒腹痛。頭痛。齒痛。及痛
 風。結石痛ヲ治ス。○此液ヲ沙糖一撮ニ滴シ加テ口
 中ニ含テ。熱下ノ頭痛ヲ解散シ。神思鬱重ヲ開暢ス。
 ○破氣驅風ノ偉効アルヲ以テ痞氣鬱滯ノ諸症。胸
 腹苦滿。噫氣惡心ヲ治ス。又喘息。脾病。依剥イボ昆垤コンテ兒等
 ノ苦悶。痞脹。嘔氣。嘈雜。吞酸及呃逆ヲ治シ。胃ヲ健運
 シ。諸竅ノ壅鬱ヲ開利ス。○嘈雜吞酸等ノ胃中ノ酸

敗液ノ諸症ニハ十五滴ヨリ三十滴マデ冷水ニ點服スルハ忽チ噫氣ヲ發メ治ス○薄荷水ニ點服メ嘔吐下利ヲ治ス○肉豆蔻未チ加用テ霍亂ヲ治シ。腹肚攣急ヲ解ス○勞瘵肺傷ノ内伏熱ニ用テ精力ヲ補充シ。神思ヲ欣慰ス○頑固ノ不寐三日熱及白帶下ニ用テ驗多シ○止血ノ効ヲ稱シ殊ニ衄血痔瘡ヲ發スル症ニ用テ結石ヲ溶解シ治ス。是ヨク華爾斯ヲ溶化ス。結石ハ華爾斯質ナレバナリ○此藥ハ甚ダ竄透揮發スル故ニ感動シ易キ婦人ハ其藥

氣ニ堪ザルコトアリ○壯熱病及炊衝ノ諸症ハ是ヲ用テ害アリ。血液ノ沸騰ヲ強盛ニシテ運行ヲ増進スレバナリ○服量十滴ヨリ四十滴マデ葡萄酒若ハ冷水ニ點服スル下日ニ數回。其症ニ隨テ加減ス○小兒ハ六滴許。適宜ノ飲液ニ點服ス○頭痛ハ二十滴許ヲ砂糖一匁ニ和シ用フ○痙攣搐掣ノ諸症。痞氣鬱蓄等ニハ十五滴ヨリ二十滴許用フ揭依

甘綠礬精 同上

越栗失爾赫篤立沃利

此藥ハ中キシルトトリチメト
又エリシルトト

リヲリ。アシガム。又「エリキシル。アシガム。アロマ
チキム。羅シユレ。スベセレイ。ティンキタル。蘭

製法 收斂亞的兒 四弓

桂 搗碎者 沸湯 煎煮 同 又 常 能 治 之

薑 搗碎者 各四錢

燒酒 二十度者 用之

右亞的兒 卜燒酒 卜調和シ。桂薑ヲ加へ。硝子壘ニ内レ

固封シ浸ヌ下八日ニメ紙ニテ濾シ。其液ヲ硝子壘

ニ内レ固封シ貯フ **按** 水四十餘ヲ下 煎煮 煎煮 煎煮

又法 シシトトリヲル。エリキシル **蘭**

亞爾箇兒 二比

綠礬油 再餾者 半比

桂 搗碎者 一弓半

右亞爾箇兒 硝子壘ニ内レ。徐クニ綠礬油ヲ滴シ

加へ。固封シ微火ニ上セ浸ヌ下三日ニメ桂薑ヲ加

浸ヌ下六日。紙ニテ濾シ其液ヲ取り硝子壘ニ内レ

固封シ貯フ **亞**

主治 健胃ノ要藥トス。胃ノ虛衰セル諸症ヲ治シ。神

經心。子宮ヲ強壯ニス。病後胃虛ノ食進マザル症

ニ三十滴ヨリ四十滴許用ヒ或ハ肺瘍ノ膿ヲ吐下

テ冷處ニ置バ薄片様ノ芒ヲ結ブ。其餘ノ芒ヲ結バ
 ガル液ヲ取り。煮テ上面ニ膜ヲ生スルニ至リ。冷處
 ニ置テ結芒セシメ。數斯ノ如クノ終ニ少モ結芒セ
 ガルニ至リ。其芒ヲ取り集メ。水ニテ淘洗シ乾シ貯
 フ。是レ潔白ニシテ眞珠色ノ光澤アリ。或ハ是ヲ再ヒ
 沸湯ニ溶シ前法ノ如ク結芒セシムレバ鮮麗ニシ
 大ナル晶ヲ結ブナリ按

又法 蓬砂極細末 六分

綠礬油 再餾者 一分半

沸湯四升

右蓬砂ヲ硝子壺ニ内レ。沸湯ヲ如ク溶シ。沙火ニ上
 徐々ニ綠礬油ヲ滴シ加ヘ。硝子筋ニテ攪セ。温ニ乘
 ノ瀘過シ。其液ヲ文火ニ上セ。水氣ヲ熬散ノ上面ニ
 膜ヲ生スルニ至リ。放冷ノ結芒セシメ。其芒ヲ取り
 蒸餾水ニテ洗ヒ乾シ貯方

主治 是一種ノ酸鹽ナリ。効用蓬砂ノ如クニ更ニ
 鎮痙止痛ノ偉効アリ。蓬砂ノ主治ト 神經血液ノ鬱
 熱上衝ヲ降鎮シ。諸熱ヲ涼散シ。催睡ノ効アリ。故ニ
 下清涼阿芙蓉ト名ク。諸神經病ノ鬱熱ヲ涼解シ。
 譫妄狂躁ヲ靜止シ。子宮衝逆。痙攣搐掣。脾病。依剥昆

堉兒等ノ發動ヲ鎮メ。又ヨク月經ヲ通ス。○服量未
 下シ三氏ヨリ十氏マテ飲液ニ點服シ。或ハ沸湯ニ
 溶化シ用フ。○肺。嗽衝。吐血等ノ肺病ニハ是ヲ禁ス。
 肺ヲ刺戟シ效ヲ發スレバナリ。○外敷ノ疥癬ヲ治
 シ潰瘍ノ息肉ヲ消ス。依疾
膽礬 ヒットリヨルム。クイル。ウム。羅。ブライウ
 ヒットリヨルム。又。コペル。ヒットリヨル。蘭
 是、硫黃ヲ含ム酸精補。硫酸。銅ト抱合メ煇化シ。天藍色。
 石英狀ノ晶ヲ結成セル中和鹽ナリ。味收斂侵蝕メ
 酷烈ナリ。銅氣ヲ含ム故ニ一ニ是ヲ銅礬ト名ク。即
 銅簿ニ硫黃ヲ如ヘ坩鍋ニ内テ燒煨シ。水ニ溶メ煮

熬シ乾固スレバ膽礬トナルヲ以テ知ルヘシ。○是
 ヲ製スル地方ニ隨テ差其品ヲ異ニス。世布兒私亞細
亞州ノニ産スル品ハ石英狀ニノ碧色鮮美ノ大塊
國名ヲ成ス。或ハ尖稜ノ小片ト爲シ或ハ外面黃鏽ヲ被
 ヲ者アリ。但碎ケバ天藍色ナルヲ上品トス。翁加里
亞ノ歐羅巴洲ノ産モ是ニ同シ。或ハ銅坑中ノ泉ヲ煮
 テ製スル者アリ。獨ト都イ同ソ品ハ綠色ニシテ天藍色
 ナリ。帶ビ石英狀ヲ爲ス。或ハ一種鐵鏽色若ハ銅鏽色
 主メ味辛。硫黃臭アル灰樣ノ土ヲ淘洗メ製シ碧綠
 色ヲ爲ス者アリ。總テ碧綠色ノ品ハ銅性ト鐵性ト

主治 外敷メ血液ヲ凝固シ。血脉ヲ牽縮ス。此未ヲ棉
 撒絲ニ摻^フケ貼^ル。右末切出血ヲ止ム。○頑固ノ衄血ハ
 是ヲ水ニ溶シ。水銃ニテ鼻孔ニ注入メ速効アリ。但
 誤テ喉中ニ溢泄スレバ氣管ヲ牽縮メ效ヲ發シ呼
 吸ヲ妨グ。故ニ少許宛徐々ニ注輸スベシ。○大ナル
 創ニ多ク此未ヲ摻スレハ其血止ト雖モ其未。血脉
 中ニ入テ血ニ混シ心肺ニ運行メ其部ニ焮腫息肉
 等ヲ生シ。呼吸不利喘急等ヲ患ル者アリ。
叔揭伍
邊布庚

遠西醫方名物考卷二十九終

遠西醫方名物考標目

卷三十

石灰セキ 石灰水セキスイ

石灰水セキスイ

石鹼セキケン 尋常石鹼セキケン

尋常石鹼セキケン 製法

白石鹼セキケン 製法

石鹼膏セキケン

石鹼軟膏セキケン

舍利別セリベツ

遠西名物考 卷三十 標目

鳳雲堂藏

石長生舍利別

接骨木傑列乙

接骨木昆設爾弗

接骨木水

旃那葉

旃那丁幾去爾

旃那越幾斯劑

旃那舍利別

舍謨字黠謨

遠西舍謨字黠謨舍利別

旃那涼解飲
孕驗旃那飲

遠西醫方名物考卷三十

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

石灰カルキス 羅カルク 蘭

是ハ石灰礦ヲ燒テ製ス。石灰礦ハ燒テ灰トナル一

種ノ石ニメ或ハ堅剛ノ者アリ或ハ土塊ノ如キア

リ或ハ破碎スレバ針眼アリ或ハ麤鹵ニメ光澤ア

ル碎片ヲ間錯シ或ハ貝類。蝸牛殼。石梅。等ノ化石ヲ

夾ム者アリ○石灰礦ヲ燒テ石灰ト爲シ未ダ水ヲ

濕サズ。大氣ニ觸レズメ碎粉トナラザル者ヲ生石

灰ト曰フ。是多ク火氣ヲ含ム。盡ク酸性ヲ脱メ純粹
 大ル亞兒加利性ノ石灰土トナル故ニ其礦石ノ秤
 量ニ比スレバ半ヲ減シ。又亞兒加利性ノ酷厲鹽ヲ
 含ム故ニ氣味極テ慄悍猛烈ニシテ侵蝕スルヲ焚カ
 如シ。是ヲ酸味ノ液ニ加レテ毫モ沸騰セズ。是盡ク
 脫除メ純粹ノ亞兒加利性トナル故ニ。然レ是ト水
 沸滓セス沸滓ハ炭酸ヲ含ムニ因ル。又注ダバ忽チ焚焯メ碎粉トナリ。或ハ大氣ニ觸レテ
 濕氣ヲ受レバ亦碎粉トナリ。其性水ヲ沾ス者ト同
 シ。故ニ生石灰ハ硝子壘ニ入密封シ貯ベシ兒加利
 土ト交カ強カ強キ故ニ水ヲ注クハ此ニ物緊合ノ
 生石灰ニ含所ノ火氣花水中ノ溫素共配偶ヲ喪ヒ

游逸熱ヲ生シ。或焰ヲ發ス。○其既ニ水ヲ注テ碎粉トナル者ハ即チ
 尋常人石灰ナリ。是性緩和ナルヲ以テ酸味ノ液ニ
 加レバ沸騰ス。又石灰水出ツト爲セバ内服外用メ
 侵蝕セズ。○蠣殻ヲ沸湯ニテヨク洗ヒ粘穢ヲ去リ
 燒テ灰ト爲セバ其性生石灰ト同シ。其燒テ冷定セ
 ル時少許ヲ取り醋ニ摻ケ少モ沸騰セザルハ即チ生
 石灰ト同様ナル徵トス。或ハ尋常ノ石灰ヲ燒テ通
 紅ト爲シ冷定メ少許ヲ取り醋ニ投メ少モ沸騰セ
 ザルハ亦其性生石灰ト同シ。是酸性脫メ純粹ノ亞
 兒加利鹽トナル候トス。此モ亦濕氣ニ觸レバ復尋

遠百名物考
 風雲堂藏

常ハ石灰トナル故ニ硝子壘ニ收メ固封シ貯ヘシ
 ○總テ亞兒加利鹽ヲ以テ製スル藥品ニ生石灰ヲ
 加レバ其氣極テ銳烈トナリ。若ハ腐蝕ノ品トナル。
 假令バ急製硃砂精。硃砂加石灰精。蹙乙典埵羅屈ノ
 如シ。是生石灰ヲ以テ其質ニ含メル酸性ヲ奪除ス
 レバ大リ「蠟殼卵殼。蝸蝓石等皆石灰性土ヲ含メリ
 [主治] 生石灰ハ多ク製劑ニ用フ。又外敷メ腐藥トシ
 腐蝕乾燥シ。疣贅息肉ヲ消ス。往古ハ惡厲ノ潰瘍ヲ
 淨刷スルニ用フ○生石灰ニ蜜ヲ煉和シ傷冷毒痛
 腕股痛ニ貼メ多ク驗アリ○面部ノ斑ヲ消スルニ

生石灰ト勿^ヘ搦^ナ祭亞石鹼。各等分。細末トシ。研和メ膏

藥トシ。先^{フタカツヤ}蓋膏ヲ攤テ斑大ノ孔ヲ截^{キリ}開キ貼メ斑ヲ

露シ。是ニ其石灰膏ヲ貼シ縛帶ヲ施セハ大抵六時ヲ

經テ腐蝕シ痂ヲ結ブ。是ニ於テ其膏ヲ去^リ。拔^バ實栗膏

ヲ貼メ膿潰セシメ愈スベシ。其斑大ナル者若ハ隴

起セル者ハ右ノ膏ヲ數貼メ漸次ニ侵蝕シ除^ッベシ

石灰水 ^ア多^クカルキス ^羅カルクウトル ^蘭

製法 生石灰 一比

水 十五比

右。石灰ヲ陶器ニ内レ。水少許宛加テ手ヲ住メズ攪

七。終ニ靜定スルヲ六時。其間時々振蕩シ。並沈ムヲ候ヒ上清ヲ取り硝子壘ニ内レ。固封シ貯フオリ。按石灰水一多中ニ精微ノ石灰四分ハヲ含メリ

主治性收瀋ス。内服メ酸敗液ヲ消スル良藥トス。○下利荏苒トメ治セズ。胃腸ノ汚物ヲ疏滌メ後對症藥劑ヲ處スレハ効驗ナキ症ニ多ク驗アリ。○乳汁ヲ加甘和シ服メ刺戟セズ衰弱ヲ強壯ニシ内傷ヲ治ス。又下利赤痢淋疾及結石腎痛ニ甚驗アリ。石灰水二十多許ニ乳汁ヲ適宜ニ加テ毎日朝夕兩次ニ服ス。但乳汁及石灰水モ冷飲シ若ハ微温ニメ服ス

ハシ。煮テ熱セシムルヲ勿レ。○腎膀胱ノ結石ヲ溶解シ其疼ヲ消ス。但結石ヲ溶解スルニハ蠟殼灰水尤効アリ。結石ノ尖稜ヲ溶消メ刺戟セザラシム。日ニ二三北宛内服ス。但是ニ堪ザル者ハ乳汁十分一ヲ加ベシ。○經久淹滯ノ酷厲毒アル病。瘰癧毒ノ諸症及癰瘡ニ良驗アリ。是酸酷渣敗ノ汚液ヲ消スルニ因ル。凡腺腫瘰癧ハ弛弱ノ腺ニ酸敗ノ粘液凝聚ス。故ニ石灰水ヲ用テ強壯ニシ粘液ヲ溶解シ酸敗毒ヲ消メ良効アリ。○服量。四多宛用リ日ニ數次。但是ヲ製メ速ニ硝子壘ニ固封シ貯ヘ。若ハ臨時ニ製

スベシ。氣ニ觸レバ精微ノ藥氣消散ノ効驗ナシ○
 外敷又侵蝕セズ。稍收瀦シ乾燥メ纖維ヲ強壯ニシ
 粘稠液ヲ稀釋シ。酸敗毒ヲ消シ。腐壞ヲ遏メ。敗膿ヲ
 淨掃ス○凡、潰瘍瘻瘡等ノ纖維弛緩虛衰ノ愈難キ
 症ニ外敷スレバ筋肉充張ノ勢力ヲ生シ膿ヲ排テ
 乾愈ス故ニ乾カシ愈メ害アル症ハ是ヲ禁ス○頑固
 惡厲ノ潰瘍。失苟兒陪苦及癩瘰ノ潰瘍。腐骨疽。壞疽
 等ニ蒸扇劑トシ施メ甚驗アリ○濕ヲ乾カス効ヲ以
 テ總テ腐爛ノ潰瘍及水樣腫ヲ治ス○瘻瘡ニ注入
 ノ敗膿壞液ヲ淨刷シ新肉ヲ生ス○稀膿ヲ稠厚ニ

スル効アリ。故ニ潰瘍。腐骨疽等ノ稀涼ノ壞液多ク
 滲漏スル症ニ施メ良膿ヲ生セシム又粘稠ヲ稀釋
 スル効アリ故ニ粘稠液ヨリ發スル腫瘍ヲ消散ス
 ○燒酒少許ヲ加。若ハ綠礬油一二滴加寒壞疽ニ外
 敷メ腐壞ヲ遏ム○石灰水四等ニ羯布羅精一等ヲ
 研和シ蒸濕劑トシヨク焮腫ヲ解散ス○創ヲ愈シ
 及火傷ヲ治スルニ蒸濕劑トシ甚驗アリ。但火傷ハ
 温テ施スベシ。ヨク其焮痛ヲ消散ス○石灰水ニ阿利
 襪油。若ハ亞麻油ヲ適宜ニ和シ。硝子壘ニ内テヨク
 振蕩スレバ拔爾撒謨ノ如キ稠厚ノ液トナル。是ヲ

布片ニ蘸シ數外敷ノ火傷及焮腫ヲ消散シ。又汚液
 多ク滲漏スル潰瘍ニ捷効アリ。○石灰水ヲ黃銅ノ
 器ニ内置バ銅氣出テ美碧色トナル。是ヲ取テ潰瘍
 及小瘡疥癬若ハ眼赤痒等ニ塗或ハ硃砂少許ヲ加
 眼眇及淚多症翳膜痘眼等ニ點メ良驗アリ。○石灰
 水一斗ニ升汞一匁若ハ二五氏ヲ研和スレバ黃色
 トナル。是ヲ亞括扒瓦埵尼加ト名ク水銀條ニ出外敷ノ
 潰瘍膿腫ノ穿蝕腐爛臭穢ノ症ヲ淨刷シ膿ヲ排テ
 良肉ヲ生シ乾愈ス但其毒多鬱蓄セル症ニ是ヲ過
 用スレバ其毒ヲ内攻セシム。○膀胱尿道ノ潰瘍

及遺精淋疾ニ水銃ヲ以テ是ヲ尿道ニ注輸シ洗藥
 トシ排膿強壯ノ良効ヲ奏ス。○微毒淋ニ是ヲ以テ
 陰頭及包皮ヲ洗淨ソ預下疳ヲ防ニ尤良。○吉利詞
 參兒トシ直腸ニ注輸メ蟻蟲ニ奇効アリ。馱福依而

石鹼 サポ 羅 セフ 蘭

石鹼ハ亞兒加利鹽ト油ト合煮テ製ス。其鹽ハヨク
 油ヲ翕收シ油ハ其酷厲ナル亞兒加利鹽ヲ甘和シ
 相抱合メ速ニ粘結凝固シ石鹼トナル。○其亞
 兒加利鹽ハ鹼蓬鹽剥篤亞斯酒石鹽等ヲ擇取生石

灰ヲ加テ水ニ溶シ灰汁ト爲者ナリ○其油ハ阿利
 被油。榛子油。胡桃油。亞麻油。大麻油。薑油。罌粟子油
 等ノ火氣ヲ假ラスノ搾取者ヲ擇ニ用臭氣アリテ
 下品ナル石鹼ハ鯨油或ハ獸類ノ脂膏ヲ用テ製ス
 ○亞兒加利鹽ニ乾性ノ土質ヲ加バ其鹽中ノ酸性
 ヲ剋制ノ極テ銳烈性トナル故ニ必是ニ石灰ヲ加
 ルナリ亞兒加利鹽銳烈ナレハ油ト合和スルニ甚
 密ニ速ニ凝固ス鹽氣劣弱ナレバ油ト合和スレ
 在凝固セズ故ニ此鹽ノ強弱ハ石鹼ヲ製スルニ大
 要鍵ニ特ニ注意スベキ所ナリ○多ク酸收ヲ含

ル油ハ灰汁ト和スレ在凝固シ難シ斯ノ如キ油ハ
 慢火ニ上水氣ヲ蒸散ノ稠厚ト爲シ用ベシ○此物
 ハ各國製法ヲ異ニシ鹽油ノ性分量配合ノ多少同
 カラザル故ニ其品亦一様ナラス○尋常ノ灰白色
 及帶黑色ノ石鹼ハ味苛烈ニメ舌ヲ刺戟ス故ニ内
 服メ害アリ但外敷藥トシ或ハ布帛ヲ晒メ潔白ニ
 シ或ハ衣服ヲ浣洗メ脂垢汚點等ヲ除キ或ハ毛類
 ノ粘脂ヲ去リ羅紗毛布類ヲ淨刷スルニ必用トス
 皆石鹼水水ニ溶トシ用フ尋常ノ灰汁ニ比スレバ
 悍烈ナラスメ布帛ノ質ヲ損セズヨク污垢ヲ去ル

尋常石鹼製法是ヲ製スルニハ先ヅ固性亞兒加利
鹽ヲ製スベシ。其法生石灰一比ヲ鐵壺ニ内レ精製
ノ鹹蓬鹽一比ヲ加コレヲ以テ其上ニ被ヒ固封シ
置テ石灰盡ク碎粉トナルニ至リ是ニ水一貫六百
錢ヲ加攪セ煮ル一時。綴布ニテ數瀝テ澄清ノ液
ト爲シ火ニ上セ水氣ヲ蒸散メ乾固ノ鹽ト爲シ是
ノ坩鍋ニ内レ武火ニ上セ坩通紅トナリ烟氣ナキ
ニ至レバ其鹽烱解ス。是ヲ温タル鐵版ニ寫シ。未ダ
全ク凝固セザル片ニ截テ小片ト爲シ温乾シタル
硝子壘ニ收メ諸ニテ其口ヲ塗封シ貯ス。此鹽外數
種

シ腐肉肝胝様肉贅疣等ヲ侵蝕スル極テ捷ニ
其効刺必斯加烏斯蟄屈斯ト同シ。又硫氣アル金石
類ヲ侵蝕消化ス。右ノ亞兒加利鹽ヲ取リ。少許宛
温湯ニ溶シ是ニ雞卵ヲ投メ浮ムヲ度トシ其汁ヲ
適宜ニ分チ取テ水ヲ加ヘ雞卵ヲ投メ沈ムニ至リ
是ニ油ヲ等分ニ攪和シ慢火ニ煮テ漸ク凝結スル
ニ至テ餘殘ノ灰汁卵ヲ投メ油ノ三倍量ヲ取テコ
レニ加ヘ手ヲ住メ攪セ煮テ凝固セシメ。試ニ少
許ヲ取テ放冷スルニ溶解セズ。水ニ溶メ油氣ヲ見
ハス下ナキニ至レバヨク烹熟スル候トス。是ヲ於
テ火ヲ下シ稍冷定メ適意ノ錠ト爲シ風乾ス。若シ

水ニ溶メ油ヲ見ハス片ハ右ノ灰汁ヲ取テ少許宛
 加ヘ煮テ油氣ナキニ至ルベシ。或ハ其石鹼ノ味酷
 烈ニテ舌ヲ侵刺スル片ハ油ヲ加ヘ煮テ甘和スヘ
 シ。○此劑ヲ煮テ凝固シ難キハ其灰汁弱キ候トス
 故ニ少許宛灰汁ヲ加ヘ煮テ凝固スルニ至ルベシ
 ○凡ソ上好ス石鹼ハ亞兒加利鹽。純粹ニテ油良性
 ナルヲ用ルナリ。○上品ハ乾固淨潔ニテ黄色ヲ帶
 ニ。澁敗セズ。粉樣ナラズ柔軟ナラズ又印記アリ勿
 搦祭亞石鹼及ビ白石鹼製法次ハ最上品トス。氣味
 香美ニテ甘脂ノ如シ。他ノ石鹼ニ比スレバ性緩和

ニノ專ニ内服藥ニ用ス來ハ石鹼ニ高ヤリ

○按ニ依福云勿搦祭亞石鹼及ビ技ノ白石鹼ハ

鹹蓬鹽。生石灰。阿利襪油ヲ以テ製シ特ニ内服藥

ニ用ス。ト然ハ其本品ノ性功同様ナル故ニ次ニ

舉ル白石鹼ト勿搦祭亞石鹼ト互ニ相代用スベ

シ。○榕按ニ勿搦祭亞石鹼。舶來アリ。方形。長三寸

許。潤二寸餘。面ニ二寸許ノ印記アリ。微透亮。鮮黃

淨潔ニテ蠟ノ如シ。又一種。龍動龍動ノ都府。製ノ白

石鹼アリ。形方長ニテ長二寸餘。潤一寸二三。分。秤

量十四錢許。面ニ一雙ノ立獅。其國ノ識號ヲ圍ム

圖アリ。其下ニ西文四行ヲ印記ス。共ニ陰識ナリ。白色微黄。每個紙ニ裹ニ紅條ニテ結束ス。右ノ二品共ニ佳香アリ。削レハ屑片雪白色。味毫モ舌ヲ刺戟セズ。芳美ニシテ乾酪ヲ嚼ガ如シ。○本邦古來未ダ石鹼ヲ製セズ。予近時次ニ舉ル^{ナカ}技ノ製法ニ倣ヒ上好ノ石鹼ヲ創製シ居常内服劑ニ供ス。勿擲祭亞石鹼ト異ナルヲナシ。但製煉家宜ク阿利襪油等ノ清稀ニシテ良性ナル油ヲ以テ製スベシ。否ザレバ性味苛烈ニシテ内服藥ニ用難シ。○又按本邦藥舖ニ尋常舶來ノ石鹼二品アリ。角樣

ト稱スル者ハ方形五六寸許白色光澤アリ。丸樣ト呼ブ者ハ灰白色ニシテ光澤ナシ。角樣ニ比スレバ下品トス。但二品共ニ味發クメ舌ヲ侵刺シ鹽氣多ク。白色ノ沙土ヲ雜ヘ久ク貯レバ鹽芒ヲ生

ス故ニ内服藥ニ用ヒズ

白石鹼

サボメデカ左ス羅 ヲ又ウツテスパンセ。セーブ蘭

製法

生石灰 各四北

水 二十北

右鹼蓬鹽晶ト生石灰ヲ攪セ水ヲ加ヘ煮テ布片ヲ

以テ瀝テ渣ヲ去リ。硝子壘ニ内レ固封シ静定メ逆
 ヲ去リ此灰汁ヲ慢火ニ上セテ水氣ヲ減蒸シ。試ニ此
 液ヲ分テ取り水六弓ヲ容ル量器ニ盛テ重サ八弓
 トナルヲ度シ。灰汁ノ量水ニ比ス火ヲ下シ冷定メ
 磁鍋ニ内レ冷處ニ於テ左ノ油ヲ加フ

阿利襪油 新鮮上好者 灰汁ノ一倍

右木棍ニテ手ヲ住メズ攪セテ混和セシメ。漸ク凝
 結スルヲ候ヒ。扁キ木型ニ寫シ。凝固スルニ至テ取
 出シ。適宜ノ截片トシ冷處ニ貯フ

主治 性温。是油質ト亞兒加利鹽ト抱合融和シ成ル

ト雖モ多ク亞兒加利鹽ノ効用ヲ爲ス。但油質ヲ以
 テ其鹽ノ酷厲質生石灰ヲ以テ鹹蓬鹽ノ亞兒加利
 包攝ノ其刺戟ノ性ヲ抑制スル故ニ是ヲ内服ノ侵
 蝕セズ。且體中ノ油膩脂膏ト交和シ。亞兒加利鹽ヲ
 啓導ノ其効力ヲ逞發セシメ。諸器脉管ニ牢著セル
 膠粘凝汚ヲ溶釋メ淨掃ス故ニ一切粘稠凝結ノ病
 毒ヲ疏解シ。堅硬ヲ軟化スル要藥トス。○酸敗液。乳
 糜。乳汁等。胃中ニ凝滯メ發スル諸症ニ用レバ其亞
 兒加利鹽ヲ以テ酸敗毒ヲ消シ。膠粘ノ汚物ヲ溶解
 ノ滌除ス。殊ニ薄弱ノ小兒ハ乳汁。胃中ニ停滯メ酸

敗シ其毒。胃腸ヲ侵刺ノ腹痛。吐乳。搐搦等ヲ發ス。此
 症ハ石鹼十五匁若ハ二十匁ヲ適宜ノ飲液ニ溶シ
 毎日用テ殊効アリ○凡ソ小兒ノ腹痛。痞脹。便秘等。
 多クハ酸敗液ヨリ發スル故ニ此藥良効アリ。茴香
 水。其他。芳香ノ露水ニ溶シ用テ尤良○酸敗液。腸中
 鬱積メ發スル諸症ハ石鹼ヲ吉利詞參兒トシ施
 ノ良○此藥ハ肺。肝脾。腸間膜等ノ内部諸器及ビ諸
 腺ノ頑固ナル壅塞凝結硬腫ヲ疏解シ治スル要藥
 トス。大黃若ハ越謨安沒尼亞幾。沒藥。瓦爾技奴謨等
 ノ解凝藥。及ビ苦味ノ越幾斯劑健實亞那珊葛爾儻等ノ越

幾斯劑ヲ加テ殊ニ良○石鹼ニ越謨安沒尼亞幾海
 葱ヲ加頑固ノ諸病ニ用テ治驗多シ。即チ短氣喘息
 經久愈ス。或ハ荏苒タル黃疸。或ハ胸腹諸器壅塞硬
 結シ膠粘液凝固ノ諸脉管ニ壅塞シ。神經液ノ融活
 順運ヲ阻遏スルヨリ發スル諸病ニ奇効アリ。又驅
 水ノ偉効アルヲ以テ肝脾等壅塞ノ依剝昆垚兒ノ
 症アル水腫ニ尤驗アリ依剝昆垚兒ハ上腹ノ兩側
 即重訂内科撰要。此藥品皆纖維諸管ニ鑽透シ膠粘
 第六十九章ニ出。液ヲ稀釋シ汚滯ヲ淨掃スルノ峻効アレバナリ即
 左ノ方尤良

越謨解凝丸

白石鹼

三錢

越謨安

沒尼亞

幾末二錢

海葱

一錢

若海葱

缺ル

同量

舍利別

適宜

右研和ノ丸藥トシ十二氏ヨリ一月マデ一服トシ

朝夕一服宛用テ○瘞學ノ運動ヨリ胃痛ヲ發シ一

處ニ頑滯ノ轉移セザル症ハ左ノ劑奇効アリ

石鹼解凝丸

石鹼

四錢

○百

水銀

條

出

失鳩答越幾斯劑

越扶屋布斯安質沒扭

瓦爾拔奴謨

牛膽 各半錢

右三氏ヲ一丸トシ四丸宛用ル一日ニ四次○萎黃

病様ノ諸症ニ石鹼半錢若ハ一錢宛毎日一兩次用

テ良驗アリ其失性ノ粘稠液ヲ溶解ノ小便ニ利ス

○痛風傷冷毒ノ劇痛スル症ニ毎日三錢マデ用テ

大効アリ其痛極テ劇キ者ハ雙鸞菊越幾斯劑ト阿

芙蓉ヲ加用セ或ハ水銀劑其他解凝劑ヲ加ヘ用テ

峻効アリ。假令ハ左ノ方ノ如シ補其陰...

大鹼硫丸

○蘇石鹼... 每日三錢...

其的列並底那... 各三錢

越扶屋布斯密涅刺列... 水銀ノ條ニ出ツ

右三氏... 朝夕十丸宛用...

安没厄亞幾... 孕鹼酒石ヲ丸藥トシ用ルモ良患者粘

稠液多ク若ハ胃腸ニ酸敗液アル症ハ右ノ諸劑殊

ニ驗アリ... 傷冷毒及ヒ痛風ノ熱解散ノ其痛減セ

不遊走スル症ハ石鹼ヲ丸藥トシ每朝日中夜分ニ

半錢若ハ一錢宛薩撒弗刺斯白檀甘草ノ泡劑ニテ

送下ノ殊効アリ○膽管ニ結石生ノ梗塞シ膽液逆

流ノ血中ニ泛濫シ黃疸ヲ發スル者甚タ多シ其候

腹ノ右邊疼痛スル等ナリ此症ハ石鹼ニ大黃ヲ加

テ服量多ク用ヒ温湯若ハ乳汁ニテ頻ニ患部ヲ蒸

湯スベシ其結石溶解ノ自ラ大便ニ通利シ回復ス

○血液焮衝甚ク若ハ神經ノ感觸甚ク纖維諸管強

硬乾燥ノ壅塞スルヨリ黃疸ヲ發スル者亦少カラ

ス粘液壅塞ノ症此症ハ石鹼ノ如キ熱性衝動ノ藥

ニ非ザルヲ云

遠西名物考 卷三十 風雲堂藏

ハ害アリ。宜ク答未林度。酒石英。蘆根。等ノ清涼解凝
ノ藥ヲ的當トス。○小便ノ質ニ酸敗毒アルヨリ腎
痛結石ヲ生シ。若ハ小便ニ沙石ヲ通泄ノ淋痛スル
症ハ石鹼三錢宛毎日用テ結石ヲ溶解シ治ス。○石
鹼ハ酷厲毒ヲ解ス。殊ニ升汞。礬石等ノ毒ヲ解スル
効アリ。○凡ソ壯熱熾衝ノ諸病。及ビ諸失血ヲ患ル
者ニ是ヲ用レバ其病勢ヲ增長ス。又是ヲ久服スレ
バ飲食消化ノ機力ヲ害ス。○往古ハ以爲ク此藥ノ
解凝ノ効諸藥ニ超過シ諸壅塞頑固ノ病ニ久服セ
シメテ内部ニ膠著セル粘液汚物ヲ溶解スルト宛

モ皮上ノ粘臍脂垢ヲ淨刷スルガ如シト然レ是附
會ノ臆説トス。此藥ハ唯其亞兒加利鹽ヲ以テ纖維
諸管ヲ衝動ノ其運營ヲ増發シ是ニ凝滯牢著セル
粘液ヲ推盪運輸シ驅除スルニ因ル。○尋常ノ石鹼
ハ勿擲祭亞石鹼及ビ白石鹼ニ比スレバ更ニ酷烈
ナル故ニ多ク琶布及ビ蒸湯劑等ノ外敷藥トス。大
抵琶布若ハ藥草三弓ニ石鹼四錢或ハ一弓許ヲ加
施スベシ。○外敷ノ解凝消散ノ峻藥トス。粘稠液ヲ
解キ酸敗液ヲ消シ堅硬ヲ軟化ス。○燒酒ニ溶シ琶
布トシ貼ノ傷冷毒痛。臈股痛。脚痛。硬結塊腫等ヲ消

散スルニ殊効アリ○失鳩答ヲ加ヘ乳房結核。關節
塊腫脚痛ニ貼ノ良驗ヲ稱ス○乳汁ニ溶シ蒸湯劑
トシ堅硬腫。瘰癧腺腫ニ施ノ消散ス○温乳汁若ハ
迷迭香精ニ溶シ或ハ乳汁ヲ加テ琶布トシ若ハ膏
藥ノ如クシ諸瘡瘍ニ貼ノ弛緩軟化シ腐穢潰爛ノ
膿瘍。疥癬等ニ貼ノ膿ノ排泄ヲ扶ケ淨刷ス○乳汁。
粘液類。油類ニ溶シ施セバ緩和ノ効ヲ爲シ又其劑
ヲメ酸敗セザラシム○的列竝底那油。燒酒ヲ適宜
ニ加ヘ。寒腫及ビ汚液滲漏ノ止ザル瘡瘍ニ施メ疏
散シ治ス○小兒ノ大便閉ニ坐藥トシ施メヨク通

刺ス

石鱖膏

エムブラスト。ガボ子ス。羅
ヒフ。フレイステル蘭

製法 密陀僧 三比

黃蠟 六考

白石鱖 三比

右文火ニ上セ煇解ノ煉和シ火ヲ下シ。稍冷ルヲ候
ヒ龍腦四錢ニ阿利襪油少許ヲ研和メ本劑ニ煉和
シ硬膏ト爲ス

又法 若把兒麻膏 三比

白石鱖 細末 六考

龍腦 六錢

右若把兒麻膏ヲ文火ニ上テ煇シ。石鹼ヲ下シ。水少許ヲ加ヘ煉熬ノ硬膏ト爲シ。火ヲ下シ冷ルヲ候ヒ龍腦ニ油少許ヲ研合シ。本劑ニ加テ煉和ス。

主治 外敷ノ解凝消散ノ良藥トス。疼痛ヲ止メ。酸敗毒ヲ消シ。膜瘤。乳房結核或ハ頑硬腺腫。韌帶硬腫。或ハ肢節拘直。攣急或ハ關節強痛。屈伸シ難ク或ハ痛風。遊走痛ヲ消散ス。

石鹼軟膏

製法

石鹼

三匁

龍腦 一錢
迷迭香精 十二匁

右研和シ軟膏トス

主治 外敷ノ傷冷毒痛。一切肢節痛。痲不遂。凍瘡等ヲ

治ス

又法

石鹼 一匁
的列竝底那油 二匁
剥篤亞斯 三匁

右研和ス

主治 溶解疏散ノ捷効アリ。肢節強直。硬強。牽痛。打撲

傷等ニ一ヲ水ニ溶シ一時毎ニ患部ニ擦テ捷効アリ

舍利別

セイロプス羅^ロン
ホウヂヘシロプ^ロ蘭

製法

砂糖 淨白者 八北

沸湯 四北

右調和シ文火ニ上テ烱化シ。漚過ノ渣ヲ去リ。煮テ

蜜ノ稠^ト爲ス

主治 急迫ヲ甘メ。枯燥ヲ潤シ。粘痰ヲ豁ノ吐シ易カラシメ。欬嗽ヲ治ス。又諸藥ニ加テ甘美ニシ。服シ易

カラシム

石長生 舍利別

セイロプス^カピル^ルス^ス子^リス^ス羅^ン
シロプ^ロハン^ブロ^ンハイ^ル蘭

製法

石長生

甘草 剉者 二多

砂糖 四北

右石長生。甘草ニ適宜ノ沸湯ヲ加ヘ浸ス。一晝夜。漚テ滓ヲ去リ砂糖ヲ溶化シ。又漚テ液ヲ取り。煮テ

舍利別ノ稠^ト爲ス

主治 胸中ヲ開利シ。寧急ヲ甘メ。粘痰ヲ稀豁メ吐シ

易カラシメ。欬嗽。喘急。冒寒傷冷毒ノ諸症ヲ治シ。沸湯ニ攪和シ服メ汗ヲ發シ小便ヲ利ス（疾）

接骨木傑列（ゲレ）乙（イ） 「ロツプ。サム。ロキ。ス。羅。ゲレ。イ。ハン。フ。リ。ル。蘭。」

製法 接骨木子ヲ適宜ニ取り搗爛シ。水少許ヲ加。

慢火ニ上セ手ヲ住メズ攪セ。徐々ニ煮ル（コハン）四分時

ニノ篩ニ内レ。温ニ乘ノ押シ絞リ瀝シ。其汁十五

ニ淨白ノ沙糖三弓ヲ和シ。速ニ煮沸セシメテ浮沫

ヲ抄（スク）ヒ去リ。火ヲ下セバ即チ傑列（ゲレ）乙ノ稠トナル。是

ヲ磁壺ニ收メ貯フ（技）

主治 輕キ發汗ノ良劑トス。凡ノ熱病。傷冷毒等ニ劇

キ發汗劑ヲ用レバ血液ノ運行ヲ衝動シ。壯熱。嗽衝

ヲ發スベキ症ニ此劑四錢ヨリ三弓マデ與レバ其

熱ヲ増發セズ。蒸氣及ビ汗ヲ發ノ必モ害ナシ。又肺

ノ攣急ヲ緩解シ。胸中ノ粘痰ヲ疏豁シ。大小便ヲ利

ス。○熱病。膽液腐敗ノ諸症。疫熱。羅斯。痘瘡。麻疹。嗽衝

病。胸脇痛等ニ用テ血液ノ沸騰ヲ鎮メ。清涼緩和鎮

痛ノ良効アリ（叔） （邊）

接骨木昆（コン）設爾弗（セルフ） 接骨木傑列（ゲレ）乙（イ）ト同シ

接骨木水 **製法** 薄荷水ノ條ニ出ツ

主治 蒸氣及ヒ汗ヲ發ス 依叔

旃那葉 センナ 羅 セイ子ブライデン 蘭

形状 是一種ノ灌木ニノ幹二三尺若ハ四尺許數枝

互生シ葉四對若ハ五六對細柄アリテ枝ニ排列ス

ル下甘草ノ葉ノ如シ厄日多 洲亞弗利加ノ國名ノ產ヲ最上

品トス是ヲセンナアレキサンデリナト稱ス アレ

ン多ノ地名此品葉小クノ末漸ク尖リ長廿五六分

潤二分餘硬厚滑澤淡綠ニノ黃色ヲ帶ビ氣味佳ナ

注ス微苦辛粘滑ニノ明盧己子ヲ爵カ如シ夏月枝

梢ニ五瓣ノ黄花攢生シ 或云黃色ニノ赤ヲ帶 花後

小莢ヲ結ブ形チ彎リテ新月ノ如ク扁クノ汚點ア

リ核四個若ハ六個アリ葡萄核ノ如シ香氣ナク味

微苦宿根セズ一年若ハ一年半ニノ枯ル多ク熱國

ニ産ス ○得里步利 洲亞弗利加意太里亞福撈察 歐共

巴洲ノ產ハ葉大ニノ圓ク末尖ラズ綠色粗糲ニノ

脉理多ク莢小ク黯綠ニノ楮色ノ斑アリ是皆下品

ニノ瀉下ノ効微ナリ故ニ藥用トセズ或ハ他葉ヲ

雜テ偽ル者アリ亞刺比亞ノ默加地名ノ產ヲ莫斯箇

未亞旃那ト名ク其葉厄日多產ノ上好ノ品ニ比ス

レバ殊ニ狭ク長クノ尖レリ。此亦薬用トセス。○右ノ如ク葉形ニ随テ上下品ヲ分ツ故ニ葉形全クノ破碎セザルヲ擇ムベシ。

○榕按ニ蛇滅門草。略旃那ニ似タレ。葉大ク柔

薄ニノ味淡。不佳。氣ナク。莢ヲ結バズ。角ヲ生シ

大小指ノ如ク直ニノ彎ラズ。圓クノ扁ナラズ。核

扁ニノ葡萄核ノ如クナラズ。其葉少モ瀉下ノ効

ナシ。角ハ圓長ニノ裏ニ縱隔膜及臍帶アリ。莢ハ

○旃那。和漢産未ダ詳ナラズ。舶來ノ品ヲ用ベシ。

主治 性平。瀉下ノ良薬トス。効力大。黄ノ如クニノ腹

痛ヲ發セズ。且瀉下後便秘ノ患ナシ。揮發鹽及ヒ

華爾斯質刺戟ノ瀉下。粘液酸敗液酷厲ナル。洩

等ノ鬱蓄スルヲ滌除シ。胃腸ヲ害セズ。劇疾緩病

ニ用テ妨ゲズ。○膽液熱。紫斑熱ノ如キ連綿タル瀉

下ヲ要スル病ニ尤良。○粘稠ヲ稀釋シ凝結ヲ疏解

スル効アル故ニ水腫停水及ヒ膽液質ノ敗液ヲ瀉

下シ。藥性酷厲ナラザル故ニ老人虚人孕婦ニ用テ

害ナシ。小兒ハ此細末ヲ舍利別。若ハ砂糖ニ和シ與

テ服シ易シ。○大便閉ノ諸症及留飲停水等ハ左ノ

劑殊効アリヨク瀉下ノ清涼シ腹痛ヲ發スルヲナ

スル効アル故ニ水腫停水及ヒ膽液質ノ敗液ヲ瀉

下シ。藥性酷厲ナラザル故ニ老人虚人孕婦ニ用テ

之故。大便閉。諸焮衝。蓄留熱。咽喉焮腫。痔痛等。兼用之。亦的効アリ。諸症及醫藥不効。全式。

旃那煎 四錢

酒石英 三錢

益智 二錢

水 一匕

右煮沸スルヲ候。火ヲ下シ。稍冷ルニ至。具滓ヲ去

リ。三弓宛服ス。○大便閉及瘧氣鬱滯ノ症ニ旃那丁

幾去爾良驗アリ。或ハ是ヲ葡萄酒ニ加服。又瘧瘵ノ

運動。寒粘液。酸敗液。等ヨリ發スル胃痛。疝痛ヲ治ス

旃那丁幾去爾

海那葉 四弓

葛縷子 半錢

益智 十片

乾葡萄 四錢

燒酒 一匕

右浸ノ藥氣ヲ出シ。濃テ滓ヲ去リ。分テ四服トス。○

又右ノ旃那煎一匕ニ旃那丁幾去爾二弓ヲ合和シ

用テ前説ノ諸症ニ甚ダ驗アリ。○壯熱病。膽液熱。發

斑熱ハ答末林皮ヲ加良驗アリ。左ノ方モ亦良

旃那涼解飲

旃那 二錢半 枸橼皮 生鮮ノ黄皮 四月

枸橼汁 二錢 沸湯 七勺

右調和ノ微火ニ上セ藥氣ヲ出シ。瀝テ滓ヲ去リ。次

ノ藥ヲ加フ

覆盆舍利別 一勺

右調和シ半時毎ニ一小茶碗ヲ與フ○旃那ニ中和

鹽石鹼質驅風ノ藥ヲ加ヘ瀉下ノ効ヲ扶テ尤良。假

令ハ左ノ方ノ如シ

孕鹼旃那飲

旃那葉 三錢 孕鹼酒石

胡荽子 各二錢

右水適宜ニ加ヘ浸メ藥氣ヲ出シ。瀝テ其液一匕ヲ

取リ次ノ藥ヲ加フ

薄荷舍利別 一勺半 甘消石精 四月

右攪和シ半時毎ニ二匙宛用テ瀉下スルヲ度トス

旃那ヲ服メ嘔氣ヲ發スル者ハ甘消石精ヲ用テ速

ニ治ス○旃那ニ茴香。消石ヲ加ヘ泡劑トシ鼓脹ノ

便秘ニ殊効アリ○神經ノ感動シ易キ人ハ大黃ヲ

用テ腹痛昏眩スルコトアレハ旃那ハ其患ナシ。但シ一
 頓ニ多ク服スレバ腹痛スルコトアリ。然レ水煎及泡
 劑トスレバ其揮發鹽及華爾斯質^{ハル}耗散スル故ニ其
 害ナシ。但シ香竄藥ヲ加ヘ用レバ殊ニ良○服量一錢
 ヨリ一錢半許。泡劑若^{モシ}ハ水煎トシ用フ。但シ一頓ニ多
 服スレバ嘔氣ヲ發ス○凡ソ熱性ノ病便秘ノ症ハ
 二三錢ヲ取り香竄驅風ノ藥ヲ加ヘ沸湯六多許ヲ
 以テ泡劑若^{モシ}ハ煎劑トシ用フ或云濃煎スレバ粘稠
 トナル故ニ泡劑トス
 ルヲ良○峻下ノ劑ヲ忌ム症ハ半錢若^{モシ}ハ一錢ヲ泡
 劑トシ用テ良或ハ酒石英一二錢。滿那一多若^{モシ}ハ大

黃ヲ加ルモ良○散劑ハ半錢ヨリ一錢許用フ○或
 云莢及^ハ葉柄ヲ雜ヘ用レバ腹痛ヲ發スト。然レ是
 ヲ試ルニ否^ハラズ。効力葉ト同シ。故ニ是ヲ雜ヘ用ル
 モ害ナシ○旃那ノ華爾斯質^{ハル}ハ刺戟ノ性アル故ニ
 壯熱炊衝ノ諸症ニハ清涼藥ヲ加ヘ。失血過多ノ症
 ハ緩和劑ヲ加テ尤^モ良叔 叔 叔 叔
 物 依 伍 福

旃那越幾斯劑 **製法** 蒲公英越幾斯劑ト同シ○此
 劑一錢ヲ服ノヨク瀉下ス。未ニテ用ルト同シ。丸藥
 トシ若^{モシ}ハ飲液ニ溶シ用ルニ尤^モ簡便トス依 疾

旃那舍利別

風雲堂藏

旃那葉

ハ多

沙糖

淨白者
三北

沸湯 四北

四北

右旃那ヲ沸湯ニ浸ス_一時。絞リ瀝シ。其液ヲ靜定
ノ_一塗ヲ去リ。沙糖ヲ加ヘ。文火ニ煮テ舍利別ノ稠_一
爲ス_一。○此劑甘美_一ヲ服シ易クヨク大便ヲ通利
ス。感動甚キ症及ビ小兒ニ用テ良_一。疾

舍謨字黠謨 羅

コソソリダマヨル
ウトルトル蘭

形状 此草莖二三尺許。太サ指ノ如ク毛茸アリテ粗
糙。中虛。線稜アリ。數枝ヲ分ツ葉ハ根ヨリ生シ又莖

枝ニ著テ互生シ。葉柄ナシ。長濶ニメ末尖リ。黯綠色。

土木香葉ニ似テ皺及ビ毛茸アリ。手ニ觸レバ刺ガ

如クニ柔ナリ。邊平等ナラズ夏月莖枝ノ梢ニ數

花簇生ノ穗ヲ爲シ懸垂ス。筒様ニメ鐸ノ如シ。單瓣

ニメ五刻缺アリ。或云本末窄クノ中差濶シ或云未

ハ莖枝梢ノ偏面 黯赤或ハ白色或ハ紫赤青等ノ變

色アリ或ハ稀ニ黃色アリ。五鬚蕊アリテ短ク末尖

テ白シ。一心蕊萼底ヨリ生シ。其色花ト同シ。花謝_一

心蕊。萼底ニ残り。其本ニ黯灰色。滑澤ナル四ノ小子

生ス。萼筒様粗糙。深ク缺裂シ尖テ刺ヲ知シ根外面

黒、裏肉白色。太廿指ノ如ク長クメ枝極メ分以膠様
 ノ粘汁多シ。香氣ナク味淡ニメ粘著ス或云根白色
ノ粘汁稠厚トナレバ赤色ヲ帶フ○一種。莖短ク葉小ク花黄色。根塊節様ノ者アリ○此草叢林陰地水邊濕土ニ自
 ラ繁茂シ。礫确瘠地ト雖モヨク長ス。或ハ春月種ヲ
 下シ或ハ根ヲ分チ培植ス中葉開クニ至ルニ味
 ○按ニ依福云。此草粘汁多ク殊ニ根ニ多シ。邊嶺
 託亞根ノ粘汁ノ如クニメ微收瀦ス。性功大抵過
 爾託亞及ビ葵根ノ如シト。代用メ可ナリ○榕按
 二鰕夷ニ産スル「エラノイバ」ト名ル草始ト是

ニ近シ又按ニ此草略地黄ニ似テ異ナリ。地黄ノ
 生根黄色ニメ少シモ膠粘ノ汁ナシ。其他充當セザ
 ルヲ右ノ譯説ニ就テ知ルベシ

主治 根ヲ用フ。性涼。滋潤。緩和。收瀦ス○粘稠ノ質ヲ

以テ稀涼ノ血液ヲ稠厚ニシ。酷厲液ヲ甘和シ。枯燥
 ヲ滋潤シ。急迫ヲ寛解ス○血液ノ酷厲ナルヨリ發
 スル諸失血。殊ニ吐血ニ良効ヲ奏ス○下利。赤痢。痔

血。崩漏。尿血。膀胱潰瘍。血淋。痔痛。脫肛。或ハ痛風。關節

痛ヲ治ス血液ニ酷厲毒アレバ侵刺ノ疼痛ヲ發シ

各部ニ壅滯ノ瘡瘍ヲ發シ。熱病ニ在テハ腐○乾欬
 敗ヲ爲シ。肺ニ在テハ欬嗽ヲ發スル等ナリ

遠西醫方名物考卷三十終

肺傷。勞嗽。肺瘍。或ハ傷冷毒效嗽等。醋厲液。稀涼液ヨ
 非發スル胸中ノ諸症ヲ治ス。○生根ヲ水煎シ或ハ
 舍利別トシ或ハ沙糖若ハ蜜ヲ加ヘ搗テ煉膏トシ
 用フ。○此藥ハ軟化シ收瀦スル故ニ外敷ノ諸、創傷。
 骨傷。潰瘍ヲ愈シ。劇キ痔血等ニ偉効アリ

舍利別ハゲシ 製法 過爾託亞舍利別ト同シ

主治 醋厲液ヨリ發スル諸症ヲ治シ殊ニ吐血ニ大
 効アリ服量四錢ヨリ一匁許服スル一日ニ數次

伍勃 貳 物度

東都書林青藜閣發行醫書豫顯目錄

和蘭和蘭 醫範提綱棟齋宇田川先生著 全三冊醫學入門 植學啓原宇田川榕庵先生著 全三冊

同 內象銅版圖同上 全一帖 舍密開宗同上 全五冊

增補和蘭藥鏡同上 全六冊 醫療正始沖齋伊東先生著 全五冊

遠西醫方名物考同上 全十冊 泰西名醫彙講熱川其行先生著 全六冊

同 補遺同上 全九冊 要術知新玄軒大槻先生著 全三冊

瘍醫新書玄澤大槻先生著 全四冊 西音發微同上 全二冊

書賈 青藜閣 須原屋伊八

江戸淺草茅町二丁目

