

遠西醫方名物考

世
四

卷三十一

枚
科
附

✕
e 13



富士川文庫
3314

遠西醫方名物考標目

卷三十一

燒酒焼酎 燒酒造法焼酎の造り方
 尋常燒酒尋常焼酎 再釀銳烈燒酒再醸鋭烈焼酎
 尋常燒酒試法尋常焼酎の試法
 銳烈燒酒鋭烈焼酎 銳烈燒酒鋭烈焼酎
 亞爾箇兒アールカニ 亞爾箇兒アールカニ
 銳烈燒酒鋭烈焼酎 並亞爾箇兒試法並アールカニの試法

遠西名物考 卷三十一 標目

風雲堂藏

18 e 13 499.2
Fm-4
11
No. 1406

榛齋宇田川先生著



遠西醫方名物考

風雲堂藏版

青藜閣發兌



燒酒質 燒酒製煉術主用

主治 禁戒 外敷

消疝露

清涼飲

尋常清涼飲 龍亞清涼飲
麝香清涼飲 壯神清涼飲
驅熱清涼飲 和胸清涼飲
揮發清涼飲 發汗清涼飲
清涼湧吐散

攝絲施那

驅蟲昆設爾弗
攝絲驅蟲散

攝爾扁答利亞

揮發回神飲

攝爾扁答利亞丁幾去爾

遠西醫方名物考卷三十一

遠西醫方名物考卷三十一

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

燒酒

スビリテウスヒニ
フラン ドウエイニ

燒酒ハ葡萄酒ヲ蒸餾シ或葡萄酒ノ糟ヲ泡釀シ蒸

餾シ製ス

榕按是飲膳正要所
謂葡萄酒燒酒ナリ
或穀類者以テ造釀ス

和蘭名

謂葡萄酒燒酒ナリ
本邦ノ燒酒ト
同シ榕按物理小識所謂麥

義即チ

燒酒衛藏圖識所
謂青稞燒酒ナリ
是ハ通例小麥ニテ造ル夫上品

謂青稞

燒酒衛藏圖識所
謂青稞燒酒ナリ
是ハ通例小麥ニテ造ル夫上品

裸麥ハ小麥ニ比ス

ハタカニキ
モナキ
裸麥天麥糯麥粳米黍等ニテ造ル用氣味劣シ

遠西名物考 卷三十一 風雲堂藏

難シ○或豌豆蠶豆ヲ以テ造ル其氣味佳ナラズ燒
 酒出テ亦必シ或林檎梨實櫻子梅李榎楂楨棗無花
 果桑椹覆盆子等モ泡釀ノ燒酒ヲ製ス○或山萸菜
 薔薇花接骨木花或冰糖吟埤ノ如キモ醞釀ノ蒸餾
 シ燒酒ヲ造ル然レ其氣味各異ナリ但葡萄酒及穀類
 ニテ造ル燒酒ハ氣味最佳ノ上好トス○多ク葡萄
 ヲ産スル國ニテハ葡萄酒ニテ製シ葡萄ナキ地ニ
 テハ穀類ニテ造ル二種共ニ較著ノ差別ナシ
燒酒造法 通例葡萄酒ヲ蒸餾シ或其糟ヲ泡釀ノ
 蒸餾シ造ル穀類ニテハ小麥ヲ以テ造ル其法ヨク

乾ケル麥蘖製法麥酒ノ後ニ出ヲ取搗テ粗碎ト爲シ桶ニ入
 適宜ニ微温湯ヲ加攪テ軟ナル泥ト爲シ麥酒ノ酵
 蒸餅條或石鹽少許ヲ和シ煖處ニ置キハ漸泡釀ス
 若泡釀セザレバ蒸餅母少許ヲ加ベシヨク泡熟ス
 レバ美好ノ酒氣アリテ酸味ナシ泡釀足ラザレバ
燒酒醇厚ナラズ
 或云泡釀長キ者ハ三日ヲ經ベシ是ヲ蒸露罐ノ四分ノ三ニ充シメ
 火ニ上セ熱セシメテ頻ニ攪セ其慄悍氣薰蒸スル
 ヲ度トシ堯ヲ覆ヒ承餾壘ヲ接續シ膠泥若クハ獸ノ
 膀胱ニテ諸接際ヲ固封シ文火ニテ蒸餾シ燒酒ノ
 氣味薄弱ナルニ至テ止ム武火ニテ蒸餾スレバ沸

騰ノ承餾壘ニ泛溢シ或焦臭ヲ生スレバ大リ○初
餾ノ燒酒ハ水氣多ク且濁テ味佳ナラズ故ニ再慢
火ニテ蒸餾シ氣味淡薄ナルニ至テ止ムベシ。是ニ由
テ醇精悍烈ニノ澄清トナル。是尋常ノ燒酒十二度以下者
ナリ但數回蒸餾スレバ極テ純粹ニノ氣味銳烈ト
ナル是ヲ再餾銳烈燒酒ト名ク出ツ
尋常燒酒試法 尋常ノ燒酒ハ硝子盞ニ注テ鮮美
玲瓏氣味酷烈ナラズ是ヲ服メ嘔氣ナシ或是ヲ長
硝子壘ニ内テ其半ニ充テ。口ヲ塞ギ振掉スレバ多
ク漚沫細泡ヲ生メ久ク消散セズ。或手掌ヲ以テ數

其壘底ヲ敲テバ燒酒ノ上面邊圍ニ細泡輪匝ノ鬱
消滅セザルハ皆上好ノ候トス或燒酒少許ヲ匙ニ
入火ヲ點シ。燃了リテ水半分殘ルハ上好ノ燒酒ト
ス。水多キホト逾下品トス若砂糖或舍利別。其他夾
雜ノ物アレバ燃テ後其匙ニ焦著ス或阿利襪油。扁
桃油等少許ヲ硝子盞ニ内ニ燒酒ヲ注クニ其油。
上面ニ浮ムト速ナルホト下品ノ燒酒トス
燒酒損敗ヲ復スル法 燒酒損敗ノ氣味變スル片
ハ復文火ニテ蒸餾スベシ其變敗ノ液ハ罐内ニ殘
ルナリ○穀類ニテ製スル燒酒ハ變敗セザル爲ニ

杜松實ヲ加テ蒸餾スル者多シ故ニ穀類ノ燒酒ヲ
 一ニセ子^ルノ^{杜松實}蘭名ト曰フ。此ハ杜松實ヲ搗碎キ
 桶ニ入^ル適宜ニ温湯ヲ注キ酵ヲ加テ泡釀セシメ是
 ヲ麥蘖ニ加テ蒸餾シ再餾スルニモ加ルナリ。是ニ
 由テ其氣味亦好美醇厚トナル^ル既ニ變敗セル者モ
 右ノ如ク杜松實ヲ加ヘ蒸餾メ尤^モ良^ク也
 又法 木灰^{葡萄蔓ヲ燒テ灰} 酒石鹽 海鹽ヲ合和メ
 多少適宜ニ取り損敗セル燒酒ニ攪和シ。數日ヲ經
 テ蒸餾スレバ氣味醇厚悍烈トナルナリ
 又法 生石灰ヲ桶ニ入^ル水ヲ加テ石灰上三四掌横

徑ニ至リ。ヨク攪セ靜定ノ上清十貫錢ヲ取り。食鹽
 二握ヲ加ヘ置^キ一晝夜ニノ^{ウハズ}又其上清二貫五十錢
 ヲ取り損敗セル燒酒四貫錢ニ加ヘ蒸餾ノ燒酒三
 貫五六百錢許ヲ取ルナリ
 銳烈燒酒 ^{スピリタス、トニ、レク、チ、ヒ、カ、エ、ス、ロ、}
^{ゲ、ソ、イ、フ、ル、デ、フ、ラ、ン、ド、を、イ、シ、又、ウ、レ、デ、}
^{ル、オ、フ、ル、グ、ル、デ、}
^{ウ、イ、ン、ゲ、ス、ト、蘭}
 尋常燒酒ハ水氣酸收等ヲ多ク含テ純精ナラザル故
 再三蒸餾メ銳烈純粹トシ製煉術及醫藥ニ用^ルナリ
 製法 尋常燒酒 大抵十二度許者
 右長頸ノ格兒弗ノ三分ニ充^タシメ。沙鍋ニ内^ニ湯ヲ

本草綱目 卷三十一 鹿雲堂藏

用甕及承餾壘ヲ接シ大抵温湯如ノ慢火ニ上セ蒸餾ノ至十度ノ燒酒トナルニ至リ硝子壘ニ内固封シ貯フ○或燒酒ヲ蒸餾スルノ前法ノ如ク又三十度ノ燒酒トナルニ至リ硝子壘ニ内固封シ貯フ○右二十度ヨリ三十度ニ至者ヲ概ノ再餾銳烈燒酒ト名ク斯ノ如ク銳烈ノ燒酒トナレハ葡萄酒製ノ燒酒ト穀類製ノ者ト性功毫モ異ナルトナシ

亞爾箇兒

製法

燒酒 二十度者 五比 又其水 二十貫正十餘 剝篤亞斯 精製ノ能ク乾ク者 或云 臨時焙乾者 一比

右合和シ硝子壘ニ内固封シ置テ十二時其間數振

蕩シ剝篤亞斯ヨク溶化スルニ至テ其渣塗ヲ去リ又

是ニ剝篤亞斯一比ヲ加前法ノ如クス數回斯ノ如

クノ剝篤亞斯少モ溶化セザルニ至レバ水氣盡ク

脱去セル候トス是水氣盡ク剝篤亞斯ニ吸收シ

是ニ於テ漚過メ滓ヲ去リ又剝篤亞斯ノ甚乾テ温ナ

ル者一比ヲ加乾キタル格兒弗ニ内慢火ニテ蒸餾

又格兒弗殆ト乾ニ至レバ其燒酒三十二度トナル

是即亞爾箇兒ナリ云酒石鹽ハヨク水氣ヲ吸收

大氣中ノ水氣ヲ吸收ノ速ニ濕濡ス故ニ是ヲ亞爾箇兒

ニ投スレバ少シモ濕ラズ全ク乾燥ス故
酒石鹽モ亦剝篤亞斯ニ代用スベシ
固性礬砂ノ條ノ甚ク乾テ温ナル者一坵ヲ加慢火ニ
テ蒸餾スルノ前法ノ如クメ殆ト乾クニ至ル是ニ
由テ燒酒三十四度トナル是最モ純粹ナル亞爾箇
兒トス。是ヲヨク乾シタル硝子壘ニ内固封シ貯後

銳烈燒酒及亞爾箇兒試法

是極テ輕清稀薄風化

揮發ノ氣ニ近ク鮮明透澈ノ毫モ粗渣塗濁ナク甚
焰ヲ攝シ易ク氣味燒カ如シ格按ニ廣東新語云暹
羅酒以燒酒後兩燒之
云此燒酒之尤烈者是曰火酒又云廣中燒酒皆火酒也亦曰氣酒是ヲ燃スニ烟ナク
火ニ上テ速ニ煮沸ス○是ヲ匙ニ盛火ヲ點シ燃了

テ少モ水氣ナク匙モ濕ルナシ或濕氣ナキ銃藥
少許匙ニ内是ニ亞爾箇兒ヲ注キ火ヲ點レハ先亞
爾箇兒燃テ後銃藥燃若亞爾箇兒水氣雜レハ亞爾
箇兒燃田銃藥燃ルナシ或亞爾箇兒六弓許ヲ取
テ長頸硝子壘ノ三分ニ充シメ乾淨ノ剝篤亞斯
若ハ酒石鹽ヲ焙乾シ一錢ヲ取テ是ニ投シヨク振
掉メ傾寫スニ剝篤亞斯必モ濕ラズ或右ノ如ク剝
篤亞斯等ヲ加テ火ニ上セ殆ト煮沸スル時其壘ヲ
取テ振掉スルニ剝篤亞斯等溶化セズ乾テ底ニ沈
或高五六尺ノ處ヨリ一滴ヲ下スニ盡ク迸散ノ必

モ地ニ落ザルハ皆極テ純粹ニメ水氣殆ト脱スル
候トス○此液ヲ硝子壺ニ内水少許ヲ加レバ忽チ白
色トナリテ自ラ分ルハ油氣多キ候トス○是ニ硝
砂精ヲ滴メ滾動スルハ酸性氣多キ候トス○是ヲ
醋ニ滴メ滾動スルハ亞兒加利鹽多キ候トス
燒酒質古賢云亞爾箇兒ハ清稀ノ流動物ナレハ水
ヲ以テ其體ヲ成ス故ニ幾回蒸餾スト雖モ水氣ハ
盡ク脱除スヘカラサル者ナリト。晩近ノ説ニ云燒
酒ハ亞爾箇兒ニ水ヲ含ム者ナリ故ニ是ヲ焚セハ
水殘ル亞爾箇兒ハ毫モ水氣ナク唯炭素酸素水素

抱合メ成ル亞爾箇兒百錢ヲ割解スレハ炭素五十
一錢八分九釐酸素三十四錢三分二釐
水素十三錢七分其炭素ト酸素ハ抱合メ炭酸ヲ成
九釐ヲ以テ成ル
又凡酒類ヲ飲テ酩酊スルハ此炭酸アルニ因ル○
亞爾箇兒ニ火ヲ點メ焚シ水殘ルトアルハ固ヨリ
是ニ含ム水ニ非ス其焚燒中亞爾箇兒ノ水素ト酸
素ト抱合メ生スル水ナリ或亞爾箇兒ヲ硝子壺ノ
半ニ充シメ固封シ貯レハ壺ノ裏面ニ水氣凝テ露
ヲ現ス是亞爾箇兒ノ水素酸素ノ抱合メ生スル水
ニメ微モ酒氣ナク蒸餾水ト同シ
燒酒製煉術主用燒酒ハ製煉術ニ用テ解凝液トシ

諸藥ニ加テヨク其體質ニ鑽透シ其氣味効力ヲ融
解シ出スナリ。故ニ植物動物ノ芳香ナル藥品ヲ是
ニ浸メテ幾去爾ヲ製シ或是ヲ以テ蒸餾メ香竄ノ
藥精ヲ製ス。龍涎香麝香ノ如キ香竄ノ品ハ格兒弗
○或華爾斯技爾撒謨等ニ是ヲ加テ蒸餾油及浸油
ヲ製ス。○凡草木類ノ醇厚銳烈ナル藥精假令迷
迭香。萊沃刺那。點栗薩。丁香。桂。等ノ精ヲ製スルニハ
銳烈ナル燒酒ヲ硝子壘ニ内右ノ諸藥ノ蒸餾油少
許ヲ加ヘ固封メ煖處ニ置數振蕩スレバ其油ト燒
酒トヨク融和メ醇厚ノ精トナリ其藥品ヲ燒酒ニ

テ蒸餾メ取ル精ヨリハ尤峻ナリ。○綠礬油。消石精
等ニ亞爾箇兒ヲ加レバ是ヲ以テ其侵蝕酷烈ノ性
味ヲ抑制甘和シ一種ノ奇効アル藥液トナル。即チ
甘消石精。忽弗滿鎮痛液。亞的兒ノ如シ。○水。醋。其他
酸性ノ諸液。油。亞兒加利性ノ揮發鹽ハヨク燒酒ト
混和ス。○尋常燒酒ニ藥品ヲ浸メ其藥氣融解シ難
ク或其質ト混和セザル品類ハ亞爾箇兒ニ浸セバ
ヨク融解ス。諸蒸餾油モ亞爾箇兒ニハヨク融和ス
○凡銳烈ナル燒酒ハ亞兒加利性ノ諸藥及華爾斯
多品ヲ浸スニ宜シ。草木ノ乾ケル花葉根皮等ヲ浸

セバヨク其萃爾斯及油ヲ融解ス○**護謨**ト萃爾斯
 ヲ兼含ル藥品。或**越謨**ノ含テ萃爾斯及油ナキ藥
 品ヲ浸ニハ水氣多キ尋常燒酒ニ宜シ○藥品ヲ硝
 子壘ニ内燒酒ヲ加浸シ其壘ヲ煖處ニ置或大陽ノ
 暖氣ヲ假ラザレバ藥氣融解シ難キ者アリ○禽獸
 蟲魚等ヲ亞爾箇兒ニ淹シ硝子壘ニ内固封シ貯フ
 レバ百歳ヲ經レ其形質全然トノ腐壞スルヲナシ
 主治性熱慄悍揮發ニノ深ク竄透シ侵刺衝動シ殊
 ニ神經ヲ刺戟シ纖維諸管ヲ牽縮收固ノ強壯ニシ
 血液ヲ稠厚凝固シ腐敗ヲ遏ム○亞爾箇兒ハ極テ

精微揮發ニノ性力殊ニ峻ナリ○燒酒ハ身體ノ諸
 液中。水液ト小便ヲ除テ其他ハ皆收斂ノ凝固セシ
 ム。即チ血。乳汁。泌イ質ノ液ニ亞爾箇兒ヲ滴スレバ
 忽チ凝固ス。是ヲ飲服シ若クハ口中ニ含メバ津唾
 粘稠トナルヲ以テ知ベシ○燒酒ハ宛モ揮發油ニ
 炭酸氣ヲ帶テ竄透ノ收斂スル如ク纖維脉管ノ弛
 緩縱解セルヲ牽縮ノ強拘硬固ナラシメ。脉管口ノ
 弛開セルヲ短縮ノ狭窄ナラシム燒酒ヲ以テ數肌
 膚ヲ洗ヘバ皮硬ク粗糙ニナリテ皺ヲ生ズ。是皮ノ
 纖維諸管ヲ牽縮ノ狭窄ナラシムレバナリ。即チ外

敷ノ創ノ出血或ハ吐血ヲ止ルニ捷効アルヲ以テ知
 ルベシ○燒酒少許ヲ服スレバ神經及胃ヲ健運シ
 鬱塞ヲ開暢シ蒸氣及汗ヲ發泄シ血液運行ノ怠慢
 ナルヲ進輸シ諸筋ヲ強壯ニシ瘴疫惡氣ヲ避ク故
 ニ雨濕多ク冷氣甚キ時旅行ヲ爲シ或ハ深山幽谷
 等ニ入ルニ臨テ是ヲ服スレバ血液ヲ温煖衝動メ
 蒸氣ヲ揮發シ胃寒傷冷等ノ患ヲ免ル○食後少許
 ヲ服スレバ飲食ノ消化ヲ扶ケ或ハ消化シ難キ食
 物ヲ用テ停滯シ或ハ胃虛弱ニシ消化シ難キ者ハ
 一啜ノ燒酒ヲ服メヨク消化シ食ヲ進メ風氣ヲ驅

散ス○粘液留飲多キ人ハ少許宛用テ蒸氣及ヒ小
 便ヲ排泄シ血液ノ壅滯ヲ開達ス
禁戒燒酒ハ内飲外敷ノ効驗多シト雖モ其性能ヲ
 察セズ妄ニ用レバ害ヲ爲ス丁亦少カラズ○蒸餅
 泥麥粉ニ水ヲ加ヘ捏テ泥ト爲ス者是ヲ炮テ蒸餅ヲ造ル蒸餅ノ條ニ燒酒少許ヲ
 和シ壺ニ内蓋閉シ置ハヨク泡釀ス是燒酒ニ炭酸
 氣ヲ含バナリ斯ノ如キ炭酸ナキ粉麩類ノ食物ヲ
 喫メ燒酒少許ヲ服スレバヨク泡熟メ消化ス諸穀類ノ
 粉麩然レ酸味ノ食物ヲ用テ燒酒ヲ服スレバ1逾酸
 收ヲ増故ニ消化シ難シ又燒酒ノ炭酸ハ胃腸ノ纖

遠西各物考 卷三十一 風雲堂藏

維ヲ牽縮ノ強壯ニスル故ニ食後少許ヲ服スレバ
 其烹釀ヲ扶テヨク消化ス。然レ是ニ慣テ日ニ過飲
 スレバ胃腸ノ纖維大ニ牽縮メ短促シ漸ク凝聚硬
 結ノ麻痺不遂シ夫ノ飲食ヲ消磨シ乳糜ヲ運輸ス
 ルニ緊要タル蠕動機轉ヲ爲ス不能ハズ。其逾牽縮
 スルニ隨テ胃中漸ク狹窄ニナリ終ニ飲食ヲ受容
 シ消磨スルノ餘裕ナキニ至ル。故ニ燒酒ヲ嗜ム人ハ
 飲食ヲ消化シ乳糜ヲ製造スルノ機力漸ク衰ヘ食
 饌日ニ少クメ終ニ不食ノ病ヲ發シ或ハ乳糜匱乏ノ
 營養虧損シ。全軀虛羸ノ精力憊極シ斃ル者亦少カ

ラス。或居常慄悍ノ酒醬ヲ用レバ是ニ含ル揮發ノ
 精氣ヨク營養メ一旦肌肉充盛顔色壯旺セル者ア
 レレ是天然資稟ノ強健ナルニ非ズ。日ニ多血ノ禍
 胎ヲ釀メ暴ニ亡ル者亦甚多シ。故ニ古人是ヲ馴致
 セル獅子ニ喩フ。居常愛玩スレレ繋鎖ヲ放ツト勿
 レ。猛悍ノ性。暴卒ニ人ヲ吞ム。燒酒ニ含メル揮發
 質血中ニ混メ循環スレバ逾慄悍ノ勢ヲ逞メ炊熱
 ヲ起シ血液ヲ沸騰メ運行ヲ強盛ニシ。腦ノ運動ト
 靈液ノ分泌ト甚ダ急疾ニメ常調ヲ失ヒ精神錯亂
 ス。又其沸騰セル血液。腦中ノ血脉ニ盈脹メ腦及ビ

神經ヲ壓塞スレバ昏睡シ諸筋ノ神經ヲ壓塞スレ
 ハ肢體困重痿弱不遂ヲ發ス其間ニ蒸氣發汗等ノ
 諸竅ヨリ酒氣解散シ靈液漸ク回復スルニ至テ醒
 覺ス○燒酒ハ眩スルヲ殊ニ速ナリ葡萄酒麥酒
 等ハ水氣多クノ其揮發精ノ慄悍氣ヲ緩和スル故
 ニ眩眩少シ按ニ本邦造釀ノ米酒ヲ蒸餾スレバ
 酒客ノ發スル諸病ト右説ク
 所ノ燒酒ノ病患ト全ク同シク

外敷 深ク竄透シ乾燥シ神經ヲ刺戟衝動ノ其端末
 ヲ牽縮乾固シ知覺運動ヲ失ハシム又脉管及筋織
 維ヲ收縮メ強硬ニシ血液ヲ稠厚ニシ凝固セシム

○亞爾箇兒アルコイルハ殊ニ凝體諸器ヲ牽縮強固シ腐敗ヲ
 遏メ血乳汁及ビ沔タ質ノ液ヲ凝固セシム故ニ藥
 性ヲ察セス龍腦等香竄ノ藥精ヲ加テ唯患部ヲ温
 煖シ閉塞ヲ開達シ壅滯ヲ蕩去スル藥トシ過用ス
 レバ害ヲ爲ス下必カラズ

○眼疾ノ一良藥トス炊腫眼翳膜墮淚眼晝盲葡萄
 膜ノ
 纖維弛緩シ瞳孔潤大 或眼瞼緩弛ノ外反シ或上瞼
 ニノ收縮セザル症 低垂ヲ蓋蔽スル等ニ外敷ノ良効ヲ稱ス但多ク水
 ヲ加ヘ稀クシ施スヘシ是ニ由テ刺戟セズ炊腫眼
 其他觸知甚キ部ニ施メ堪ヘ易シ○痛風肢節麻痺

及轉筋等ニ燒酒ヲ温メ棉布ニ蘸シ蒸湯シ數更換
 シ施メ効アリ或羯布羅精ヲ加ルモ良○寒粘液質
 ノ咽喉腫懸壅垂ノ腫脹メ舌本マデ低垂スル症ハ
 燒酒ヲ漱藥トノ治ス○傷冷毒ノ齒痛ニ施メ捷効
 アリ○凡搔痒ニ堪ザル症假令ハ痘ノ落痂或瘡瘍
 類ノ肌膚剥脫赤裸スル等ニテ搔痒ニ堪ザル如キ
 ハ乳汁ヲ加ヘ數塗テ速ニ治ス或骨傷閃挫。跛屈
 等ノ久ク縛帶ヲ更換セズメ搔痒甚キ者ハ燒酒ニ
 テ洗滌メ速ニ治ス○久ク卧床ニ在テ腰腕等ノ關節
 破爛ヲ生シ焮痛ニ堪ザル症ハ燒酒ニ雞子白ヲ研

和シ塗テ捷効アリ。雞子白乾ケバ宛モ層上ニ一層
 ノ層膜ヲ被フガ如シ燒酒ハ皮中ノ粘液ヲ稠厚シ
 纖維ヲ收固シ患部ノ重壓擦破ヲ防護ス。故預メ是
 ヲ施セバ破爛ヲ生セズ。又孕婦ハ臨月以前ヨリ每
 日はヲ乳頭ニ塗レバ乳頭強固ニメ分娩後。乳養ノ
 時。乳頭毀傷糜爛ノ患ナシ○手足等ノ頑硬結腫及
 失苟兒陪苦ノ斑ニ白石鱗ヲ燒酒ニ溶メ數擦リ或
 蒸湯メ消散ス○瘰癧腫ノ柔ニメ水棉様ナル者及
 腺ノ弛緩セルヨリ發スル腺腫ハ燒酒ヲ擦テ殊驗
 アリ○燒酒ハ血液ヲ稠厚凝固スル故ニ總テ堅硬

腫ニ一味施ノ害アリ○脱肛水液腫。豹僕屈ノ如キ
 纖維諸筋ノ括約ヲ失ヒ弛緩セル症。并總テ筋肉ノ
 弛弱セル腫瘍膿瘍ニ施ノ甚ダ驗アリ○火傷ノ一
 良藥トス。燒酒ヲ棉布ニ蘸メ速ニ貼シ數更換シ燃
 痛止ムニ至ベシ。然レ患部既ニ黯黑色トナル症ニ
 施セバ其毒分利セズ。膿ヲ釀セズ。臭氣ヲ生シ。壞疽
 トナルナリ。此症ハ銀針ヲ以テ刺破スレレ効ナク。
 厄日多膏^{エデト}ニ燒酒ヲ加貼スレレ膿ヲ釀セズ依然ト
 ノ乾固ス。故ニ唯軟化ノ効アル軟膏ヲ貼メ化膿セ
 シメ其毒ヲ排泄メ全功ヲ收ムベシ○銃傷モ亦火

傷ト同シ故ニ燒酒ヲ施セバ化膿ヲ妨ゲ焮痛ヲ増
 シ或壞疽トナル○銳烈ノ燒酒ハ止血ノ捷効アリ。
 衄血ニハ是ヲ鼻中ニ吸入シ或水銃ニテ注入スベ
 シ。仍治セザル者ハ是ヲ柔ナル^糸ニ浸シ深ク鼻中
 ニ挿入ス^ハ但銳烈燒酒及亞爾箇兒^{アル}ハ其氣速ニ
 風化シ去故ニ捷ク施スニ非レバ効減ス。尋常燒酒
 ハ其氣速ニ耗散セズ。故ニ輕症ハ是ヲ用ベシ○創
 傷ノ細血絡ノ出血ニ施セバ其脉管ヲ牽縮シ血ヲ
 凝固スル故ニ捷効アリ或^テ列竝底那油^レ必許ヲ加
 テ良然^レ大血脉ヨリ出ル血ハ亞爾箇兒^{アル}ト雖モ効

ナシ是其脉管ヲ收縮スルヲ能ハザレバナリ或創傷
 傷目由テ水脉毀傷シ水液滲漏スル症ハ燒酒ヲ施
 ノ効ナシ。水ハ燒酒ニテ凝固セザレバナリ。故ニ水
 腫ノ潰瘍瘻瘡等ハ是ヲ施メ効ナシ○輕キ打撲傷
 ニ是ヲ施セバ痛ヲ止メ消散ス。但重キ損傷ニ施セ
 バ其細絡破裂ノ脉外ニ溢出セル瘀血ヲ凝固セシ
 メテ疏散セズ筋肉ノ間ニ壅滯スル故ニ外部愈ル
 ガ如シト雖モ一兩月ヲ經テ其諸症再發スル者ア
 リ故ニ打撲傷ハ醋ヲ外敷メ筋肉中ニ泛溢セル瘀
 血ヲ稀釋溶解シ血脉中ヨリ疏散セシメ。其後是ニ

燒酒ヲ加ヘ施メ其脉管纖維ノ弛虛縱緩セルヲ收
 固强健ニメ治スベシ。故ニ腫瘍及ビ頑硬腫モ妄リニ
 多ク外敷スレバ逾血液ヲ凝固メ消散セザラシム
 ○閃挫脱臼ハ手術ヲ以テ其骨ヲ故ニ復スレト適
 宜ニ縛帶ヲ施シ強壯劑ヲ外敷セザレバ腱及ビ韌
 帶。弛緩虛損スル故ニ其骨復脱出シ或ハ痿弱シ若
 ハ不遂スル者アリ。此症ハ燒酒ヲ棉布ニ蘸シ貼メ
 縛帶ヲ施セバ速ニ治ス。初速ニ是ヲ施セバ右ノ症
 ヲ發スルヲナシ。或ハ燒酒ニ明礬ヲ加ヘ收斂ノ効
 ヲ扶ケテ殊ニ良○燒酒ハ竄透メ大ニ刺戟シ血液

ヲ凝固スル故ニ是ヲ炊腫ニ施セバ其症逾増劇ス
 然レモ多ク温湯ヲ加テ稀クシ蒸湯劑トシ施セバ輕
 キ炊腫ヲ消散ス。輕創。骨傷閃挫。脫臼。等ノ炊腫モ是
 ニ同シ。或、硃砂精。若、ハ羯布羅精或、石灰水ヲ加、温メ
 施ノ殊良。○燒酒ハ筋肉ノ弛虛緩弱ヲ收固スル効
 アル故ニ創傷。潰瘍。癭瘡等ノ膿夥ク漏泄シ或、稀膿
 多クノ愈難キ症ニ施セバ膿ヲ減シ腐敗ヲ止メ淨
 掃ノ乾愈スル偉効アリ。一患者肛門ノ邊ニ二ノ癭
 孔アリ。水銃ニテ數、燒酒ヲ注射メ愈ユ。乳頭潰爛ヲ
 愈シ凍瘡ヲ治シ且、預メ防グニ良。但、皆水ヲ加ヘ稀

クシ施スベシ否ラザレバ其刺戟ニ堪ズ。或、右ノ諸
 症甚ダ愈難キ者ハ拔爾撒謨若、ハ的列竝底那ヲ加
 或、沒藥盧會ヲ加、テ溶シ温メテ數、患處ヲ洗淨シ或、
 棉布或、棉撒絲ニ蘸メ施シ。蓋膏ヲ貼シ。繃帶ヲ施ス
 ベシ。○夏月ノ創大ニ潰爛シ膿夥ク出テ患者羸瘦
 虛損シ或、潰瘍ノ膿多ク漏泄メ經久愈ヘズ精力虛
 憊スル者ハ幾那ヲ内服シ銃烈燒酒ヲ外敷メ縛帶
 ヲ施セバ精力滋益シ膿漸ク減メ稠厚凝固スル故
 ニ其膿ヲ靜脈ニ吸收セズ膿熱ヲ發セス内攻スル
 一ナクメ治ス。但、燒酒ハ患部ノ靜脈ニ吸收メ血中

二入ル故ニ脉差駛數トナルナリ。○骨傷ノ骨腫起
 ノ柔ナル者ハ燒酒ニ石灰ヲ加ヘ蒸湯劑トシ施シ
 消散ス。○腐骨疽ニ燒酒ヲ棉布ニ蘸シ貼リ縛帶ヲ
 施シ清血劑ヲ内服メ甚タ驗アリ。骨質ヲ強固シ腐
 壞ヲ防テ焯解セザラシム。或燒酒ノ蒸氣ヲ以テ其
 患部ヲ薰蒸メ良効アリ未ダ潰破セザル症モ是ヲ
 施セバ其氣ヨク竄透メ消散ス。○水棉様ノ肉ヲ被
 フ腐骨ハ燒酒ヲ棉布ニ蘸シ貼リ速ニ收縮シ硬痂
 ヲ結ブ。但尋常ノ燒酒ハ多ク水氣ヲ含ム故ニ銳烈
 燒酒ニ宜シ。總テ酸收ノ品ハ骨ノ土質ヲ焯解スレ

バナリ或云酸味ヲ帶ル燒酒ニ骨ヲ淹セバ軟骨ト
 ナル。○燒酒ハ潰膿腐爛ヲ遏ル効アル故ニ腐骨疽
 ノ骨腐蝕ノ碎片トナリ剝脫メ治スベキ症ニ是ヲ
 施セバ化膿ヲ遏テ乾燥シ碎骨ノ剝脫ヲ妨テ治セ
 ザラシム。○熱壞疽及ヒ腐骨疽ノ汚液多ク出ル症
 ニ是ヲ施メ良驗アリ。是筋肉ヲ收固メ強壯ニシ腐
 敗ヲ遏レバナリ。龍腦モ亦防腐ノ峻効アル故ニ壞
 疽ニ羯布羅精殊ニ驗アリ。

消疔露

一名驅風精。スビリ。カス。カル。ニナ。ス。セ。イ
 ル。ヒ。ウ。ス。羅。コレ。イ。キ。ス。ヒ。リ。テ。ス。又。ウ。ン

製法

桂 丁香 肉豆蔻 各四錢
胡荽子 一匁

茉莉刺那 十度者
燒酒 三十二匁
雨水 六匁

右到搗。浸ス。二日。蒸餾ノ露水ヲ取。二十匁。硝子

壘ニ内レ固封シ貯ヌ

主治 腦。心。胃ヲ健運シ。粘液。寒氣。風氣。虻蟲等ヨリ起

ル疝痛。痞氣鬱蓄。腹肚拘攣脹痛ヲ治ス。服量一錢

ヨリ四錢マデ飲液ニ點服ス

又法 的里亞加精 龍腦ヲ加ル者

主治 腦。心。胃ヲ健運シ。粘液。寒氣。風氣。虻蟲等ヨリ起

生 綠礬精 一匁

燒酒 銳烈者 三匁

右調和シ。硝子壘ニ内レ。固封シ貯ヌ

主治 風氣痞滯ノ諸症。腹肚拘攣痛ニ捷効アリ。服

量二月許。適宜ノ飲液ヲ點服ス

清涼飲

清涼飲 八總テ冷服スル飲劑ヲ云

尋常清涼飲

尋常清涼飲 子羅

王 橙皮舍利別

解毒精 亞鉛ノ條。解毒水ノ藥料ヲ燒酒ニテ蒸餾シ精ヲ取ル者 一匁

右調勻ス

主治 健胃驅風發汗利尿各良驗アリ○凡丸藥散劑

煉膏等ヲ送下スル飲液トシ用ルニ宜シ

龍亞清涼飲

クルダランキオイトカムヘル蘭

龍腦

一錢 亞刺比亞護

四錢

沙糖

一匁 醋

右龍腦ニ銳烈ノ燒酒少許ヲ滴メ研末シゴム護ニ水

四錢ヲ加ヘ溶メ龍腦ニ研和シ。沙糖ニ醋少許宛加

溶メ龍腦ニ加ヘ研合ス

主治 疫熱腐敗熱ニ用テ發汗解毒ノ良驗ヲ奏シ。衝

逆等總テ龍腦ノ的當スベキ諸症ニ奇効アリ○服

量一二匙宛數用フ

麝香清涼飲

クルダランキオイトムスクス蘭

麝香

半錢 薄荷水

桂露

各二匁 揮發香竄精

沙糖

四錢

右麝香ヲ沙糖ニ研和シ。桂露薄荷水ヲ少許宛加

終香竄精ヲ調均ス。ニ匙合ス

主治 神經熱ヲ治シ。呃逆。搐掣。痙攣ノ諸症ニ奇効アリ。

一時若クハ一時半ニ二匙宛用フ

又方 麝香 一錢 二沙糖 用二三

主治 此劑 芳烈 揮發 以竄透 危篤 少搖 搦 呃逆 奇

右 麝香 三沙糖 研和シ。次ニ桂精ト水ヲ研合ス

効ヲ奏シ。子宮 衝逆。神經 病ノ劇症。神思 鬱憂 病等ニ

用テ 精神ヲ 活潑 欣慰ス。服量ニ匙若ハ三匙宛數

用ヒ 或ハ臍ニ塗擦ス。刺賢 堙兒 精各二錢

壯神 清涼 飲 桂露 四勺 丁香露 水ニ浸シ 蒸餾

揮發 香竄 精 刺賢 堙兒 精 各二錢

右攪和シ 二匙宛 用ル 日ニ三四次

主治 患者 虛羸 憊弱。精神 虛乏。沈垂。失氣 昏瞢 等ヲ挽

回ス。驅熱 清涼 飲 酒石 鹽 二錢 橙汁 瀘過スル者

薄荷 水 一勺 舍利 別 三勺

右酒石 鹽ヲ 橙汁ニ 溶シ。沸騰 止テ 薄荷 水。舍利 別。水

ヲ攪和ス

遠西名物考 卷三十一

風雲堂藏

Kitasato Memorial Medical Library

主治 熱毒ノ惡心乾嘔ヲ治シ。蒸氣及ビ汗ヲ發シ。諸熱ヲ涼解シ。焮衝性ノ諸症ニ殊効アリ。合味水

和胸清涼飲 海葱蜜 二勺 護謨安沒尼亞幾乳 四勺

右調和シ一匙宛用ル。一日ニ二三護謨安沒尼亞次。安沒尼亞幾二錢。沙糖一勺。水八勺。幾乳方。右護謨沙糖ニ水以許宛加テ研磨シ溶化ス。主治 膠痰ヲ疏解ノ驅除シ。効嗽ヲ治ス。二匙宛用ル。一日ニ四護謨次。久効ハ沙糖ヲ去リ。罌粟舍利別ニ多ヲ加フ。護謨

主治 粘痰ヲ豁シ。効嗽喘急ヲ治シ。胸中壅塞ヲ開利。護謨

揮發清涼飲

鹿角鹽 四錢 解毒精 上ニ註ス 三勺

沙糖 二勺 水 三比

右調勻ス

主治 汗ヲ發シ。蒸氣ヲ進メ。神經熱毒ヲ排泄シ。或冒

寒傷冷熱ノ頭痛惡寒ヲ解シ。或勞動甚メ發熱疲勞。肢節強硬。屈伸不利。或過酒困倦。譫妄或婦人失血過多。虛罷等ニ用ヒ。蒸氣ヲ驅發メ。血液ヲ融和シ。精力ヲ回復ス。臥床ニ温覆メ。一二匙宛用ル。一日ニ數次。護謨

發汗清涼飲

解毒酸精 解毒精 八比。蒸餾醋 一比。ヲ攪和スル者 六勺。

橙皮舍利別

三多 水 六一比

右調勻ス

主治熱病靈液虛乏。運行微弱怠慢。及胃虛憊セル諸

症。二三匙宛數用。元蒸氣及汗ヲ發メ病毒ヲ排泄

ス。斯時發熱風軀不降。或困倦。或嘔吐。或入火。或

清涼湧吐飲。煎ブルクレシテ。ブライクダランキ。蘭

生。或干。韃爾答。越默室。四瓦。舍利別。將四錢。入胃

水。八多。

右調勻ス

主治熱病初發。胃中汚物アリテ。喉衝ヲ兼ガル症ハ

此劑半時ニ一匙宛用テ。吐スルヲ度トス。①安質没

拮劑ハ特ニ胃ヲ淨掃シ。且久諸竅ノ分利ヲ進輸シ。

病毒ヲ排泄ス。

攝絲施那羅

又セヘルサド又セヘル。又セヘルサド又セヘル。又セヘルサド又セヘル。

形狀是。小灌木ニ。莖高二三尺許。線楞アリ。枝甚ダ

多ク。ノ極。又分々。葉纖細ニ。メ長ク。微鋸齒アリ。黃

綠色。莖枝ノ兩側ニ。排列ス。花ハ。毛茸様ノ。小蕾。莢。穗

ヲ。爲シ。裏ニ。微細ノ。花。充メ。夏月。稍長キ。細子ヲ。結ブ。

滑澤ニノ黄綠色。此子甚ダ多クノ殆ト莖枝ニ遍シ
舶來ノ品ヲ見ルニ藕ニ似テ
小多ク莖花等ノ粉屑ヲ雜ル莖葉子共ニ不佳ノ氣
 アリ。味苦微辛。此子綠色ヲ帶テ肥實多ク莖葉花萼
 ヲ雜ヘス。其氣強キヲ擇ベシ。多ク針ノ如キ細梗。毛
 様ノ粉屑ヲ雜ルハ下品トス。根鬚多シ。○亞列波產
西亞細亞洲中
又百兒西亞莫臥
兒韃靼等東方諸國ノ原野路傍水邊沙地ニ生ス煖
地ニ新鮮肥實ノ種ヲ下セバ能ク生ノ速ニ繁茂ス
或巴爾巴里亞等ノ亞弗利加地方ニ產スレモ多ク
莖花等ノ粉屑ヲ雜ル○此藥或艾ノ一種トシ或青

蒿或亞爾鮮ノ一種トス。林娜私名是ヲ艾ノ第七種
 ニ屬ス。○或青蒿子ヲ雜テ偽ル者アリ然レ青蒿子
 ハ淡黄色ニノ甚ダ輕ク稈ノ如ク苦味微ナルヲ以
 テ是ヲ分ツベシ。眞品ハ較肥厚ニノ綠色ヲ帶ビ其
 氣強シ

○按此藥和漢產未詳ナラス舶來品ヲ用ベシ
 主治子。性温。苦。油氣揮發鹽アリ。殺蟲ノ聖藥トス。腸
 ヲ健運シ風氣ヲ驅散シ。蟲巢ノ粘液ヲ除キ。小兒疔
 蟲腹痛等其他蟲ノ諸症ニ奇効アリ。但腹内諸器ニ
 熾衝様ノ諸症ヲ兼ル者ハ是ヲ用テ害アリ。○大黃

ヲ加テヨク虻蟲ヲ下ス。或ハ葯刺巴根ヤアバ。旃那葉センナヲ兼用ノ尤良。服量水煎ハ毎日一錢ヨリ四錢マテ香竄ノ藥ヲ加用フ。或ハ水ニ浸シ藥氣ヲ出シ用フ。大抵日ニ一二錢宛用フレバ蟲ヲ下ス。細末ハ日ニ一月ヨリ半錢ニ至ル。薄弱ノ小兒ハ此末一茶匙ヲ取。舍利別或ハ沙糖ニ和シ或ハ適宜ノ飲液ニ加テ甘美トシ日ニ三次用フ。○此末ヲ用ヒテ大便ヨク通利セザル者ハ下劑ヲ兼用シ或ハ殺蟲ノ下劑ニ加用ベシ。假令ハ後方ノ如シ。

驅蟲昆設爾弗

攝絲施那セシシナ末一弓
葯刺巴根ヤアバ末一弓ヨリ一錢ニ至ル
白蜜 一弓半
右調和ノ昆設爾弗ト爲シ小兒ハ一時半毎ニ一茶匙ヲ與フ。但通利ノ多少ニ隨ヒ加減スベシ。大人ハ服量ヲ加フ。或右ノ劑ニ撒兒末サエ爾扶斯エルフス二錢ヲ加ヘ大人ハ鞭爾答ベルダ越默室エムメ三氏サシヲ加用テ蟲ヨリ發スル痛症ヲ治シ速ニ虻蟲ヲ驅泄ス。左ノ方亦殊効アリ殊ニ頑固ノ蟻蟲ヲ下ス

攝絲驅蟲散

遠西名物考 卷三十一 風雲堂藏

攝爾絲施那 二錢

盧會 二十四氏

撒兒末爾扶斯 三十六氏

右調和ノ散劑トシ分テ十二服トシ一服宛與ル

目ニ三次大便通利ノ多少ニ隨テ加減ス

攝爾扁答利亞羅

セルペンタリアア
リストロシタリア
アヒルペンギア
ナア

是蔓生ノ灌木ナリ 林ノ小水ニオス
是蔓生ノ灌木ナリ 林ノ小水ニオス

兜鈴ヲ其第一種ニ屬シ攝爾扁答利亞ノ第一種ニ屬ス
兜鈴ヲ其第一種ニ屬シ攝爾扁答利亞ノ第一種ニ屬ス

アル説 圓莖柔撓ニメ節多ク勾屈ノ蔓延ス但園ニ培
養スル者ハ幹直立ノ蔓様ナラズ葉圓ク稍長ク形
常春藤葉ノ如クノ柔ナリ短梗アリ花ハ根ニ傍テ
葉根ヨリ生シ萼ナク單瓣ニメ本窄ク未潤ク缺裂
ナク稍唇様ヲ爲シ下唇短ク上唇長クノ開展シ狀
舌ノ如シ黑綠色或ハ黯藤花色或ハ稀ニ黃色ノ者
アリ花後心蕊ノ下底實トナリ形小梨ノ如ク大サ
拇指ノ如シ裏ハ縦ニ六房アリテ細小黯黒ノ核多
ク疊リ充ツ根ハ幾多ノ長鬚其頂ヨリ分レテ叢束
シ屈節多クノ錯綜ス外面赭褐色新鮮ノ者ハ綠色

ヲ帶フ。裏ハ淡白色。香氣龍腦ト纈草ト合シタル如シ。味微苦辛。香竄様ナリ。此根新鮮ニシテ綠色ヲ帶ビ香氣強キヲ擇ムベシ。或ハ杜衡根ヲ雜ヘテ偽リ賤ク者アリ然レ是ハ黑色ナルヲ以テ分チ易シ。是非爾入尼亞邊舍爾法爾加洛里那如洲ノ北亞墨利産ス。按ニ此藥和漢産未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用ベシ。或ハ纈草ニ代用スル説アリ。主治根性温。揮發鹽油アリ。輕ク衝動ノ健運シ。蒸氣及ビ汗ヲ發スル要藥トス。又小便ヲ利シ。虛冷ヲ温

メ頭腦神經ヲ強壯ニス。凡ソ患者精力憊極セル諸病ニ良驗ヲ稱シ。殊ニ虛脱甚ク脉微細ニシテ診知シ難キ等ノ症ニ捷効ヲ奏ス。凡ソ熱病ノ患者虛弱ニメ病毒排泄セズ荏苒トシテ解セザル症及ビ三日熱ヲ治ス。惡性熱ノ患者精力虛シ。脉細數。蕩搖ノ定準ナキ症ハ此藥十匁ヨリ半錢マデ數用テ大効アリ。或ハ是ヲ細末トシ其症ニ隨ヒ麝香龍腦阿芙蓉等ノ壯神藥ヲ擇ミ加ヘ用テ速ニ其虛脱ヲ挽回スルト甚ダ多シ。惡性ノ發斑熱。其他總テ發斑ヲ兼ル病。或ハ痘瘡麻疹等ノ虛弱ニメ快發シ難キ

症或ハ精力罷弊ノ發斑消散内攻スル症モ亦右ノ如ク壯神劑ヲ加ヘ用テヨク發出ス但斯ノ如キ症ハ雜腹蘭丁幾去爾ニ此藥ヲ加ヘ用テ峻効アリ○神經熱及ビ腐敗熱ノ初發ヨク胃腸ヲ淨掃ノ後此藥ヲ前説ノ如ク用フレバ特ニ其精力ヲ挽回スルノ云ナラス。血中ノ病毒ヲ蒸氣及ビ發汗ヨリ驅泄ス。或云幾那ヲ加テ殊ニ効アリト。然レ右ノ如キ患極ノ症ハ幾那ニ堪ザルコアル故ニヨク病性ヲ察メ施スベシ○惡性熱ノ遊走痛ヲ兼ル症ハ龍腦末沃刺那ヲ加ヘ用テ大効アリ○此藥ハ發汗ノ殊効

アリ故ニ總知熱病ノ毒漸ク化熱メ汗ヨリ排泄スル症或ハ熱ノ發作ニ適宜ノ發汗ナキ症ニ用テ的効アリ○是ヲ細末トシ煉膏ニ和シ或ハ揮發醇精ノ丁幾去爾トシ。神經熱。腐敗熱ノ虛憊甚キ症ニ用テ大効アリ。假令バ後方ノ如クハ用テ亦大効アリ

揮發回神飲

薄荷水

橙皮舍利別

攝爾扁答丁幾去爾

揮發香竄精

亞的兒 各一錢

右調勻ス神經熱腐敗熱ノ患者。精力大ニ虛脱ノ死ニ瀕キ症ハ半時ニ一匙宛若クハ其餘モ與ヘテ峻効アリ。○聞歇熱ニハ此藥ニ幾那ヲ加ヘテ散劑。若クハ浸劑トシ用ヒ。或ハ神經熱腐敗熱發斑熱ニハ昆答刺越兒發根。及ビ鹿角鹽ヲ加ヘ用テ多ク治驗アリ。○寒粘液質ノ昏睡病。非不遂ニ用テ聞速効アリ。○此藥水煎スレハ揮發香竄ノ藥氣蒸散スル故ニ散劑或ハ泡劑トシ用ルヲ良トス。散劑ハ半匁ヨリ一錢マデ一服トス。但末トシ貯レバ効力消散ス。泡

劑ハ二錢ヨリ四錢マテ取リ水若クハ葡萄酒ハ弓ニ浸シ用フ。或ハ丁幾去爾トシ用ルモ良。出ツニ○蝮蛇咬。狂犬傷。其他毒螫傷ノ解毒藥トシ大効ヲ稱ス。亞墨利加洲ノ諸國ニ於テハ人常ニ此藥ヲ帶テ諸蛇ノ毒ヲ解ス。若シ其咬傷ヲ被レバ直ニ是ヲ外敷シ或ハ内服ス。立ニ愈。且其毒再發スルヲナシ。

(依) (過) (按) (淑) (福) (伍)

其毒ニ蒸煉スルニ行ヒリ。其毒ニ蒸煉スルニ行ヒリ。其毒ニ蒸煉スルニ行ヒリ。

攝爾扁答利亞丁幾去爾

製法 攝爾扁答利亞 搗碎者

攝爾扁答利亞 搗碎者 一弓

攝爾扁答利亞 搗碎者 一弓

攝爾扁答利亞 搗碎者 一弓

右硝子燻ニ内固封シ浸ス_レ六日。瀝_レテ滓ヲ去リ聽

用ス_レ技

附主治 神經熱。腐敗熱等ノ患者精力虛脱セルヲ挽回

ノ其毒ヲ蒸氣及汗ヨリ排泄シ。發斑等ノ内攻ヲ驅

發ス_レ峻効アリ_レ疾

本毒ニ精_レヲ去_レ其_レ熱_レヲ散_レハ直ニ其_レ毒_レヲ去_レル_レ也
墨_レヲ燻_レハ其_レ毒_レヲ去_レル_レ也
燻_レハ其_レ毒_レヲ去_レル_レ也
燻_レハ其_レ毒_レヲ去_レル_レ也
燻_レハ其_レ毒_レヲ去_レル_レ也
燻_レハ其_レ毒_レヲ去_レル_レ也
燻_レハ其_レ毒_レヲ去_レル_レ也
燻_レハ其_レ毒_レヲ去_レル_レ也
燻_レハ其_レ毒_レヲ去_レル_レ也
燻_レハ其_レ毒_レヲ去_レル_レ也

遠西醫方名物考卷三十一終

遠西醫方名物考標目

卷五十二

蘇甘液相讓

吉保慶膏藥

附 蘇甘液

蘇甘液

斯百兒液

如美森馬形狀

林氏藥

青板油

蘇甘液相讓

吉保慶膏藥

蘇甘液

斯百兒液

如美森馬形狀

林氏藥

青板油

遠西醫方名物考標目
卷五十二
蘇甘液相讓
吉保慶膏藥
附 蘇甘液
蘇甘液
斯百兒液
如美森馬形狀
林氏藥
青板油

遠西醫方名物考標目

卷三十二

寸蘇甘沒扭謨

蘇甘沒扭瀉水飲

若傑禮需謨

附格碌董篤

格碌董篤解凝散

格碌董篤越幾斯劑

斯百兒麻攝的

加失碌篤形狀

採收說

精製法

主治斯百兒麻膏

水銀日煉法

汞坑日

純汞日

汞礦煨煉法

銀朱煉汞法

鉛煉汞法

奇汞質夾雜鑒法

甘草精製法

卷三十汞質純粹鑒法

遠西醫方名物考卷三十二

產地

汞礦

汞礦

煉法

煉法

鑒法

鑒法

遠西醫方名物考卷三十二

蘇甘沒扭謨

蘇甘沒扭謨

羅甸和蘭通稱

是一種蔓草入根汁ヲ曝乾ノ凝固セル者ナリ此草

旋花ノ一種ニノ形狀モ亦相似タリ但旋花ニ比ス

レハ莖葉差柔脆。一梗二三花簇生シ。根長三四尺許。

太姆指ノ如シ或云最大ノ者外面灰色或黯赭ヲ帶

裏白色ニノ乳様ノ汁アリ此草羅甸名コンホルヒ

義又セイリリセウインテ是西里亞國旋花ノ義其根ノ上頂

遠西醫方名物考卷三十二

ヲ斜ニ截リ其處ニ瓶ヲ附ケ置キ一晝夜不間ニ乳
様ノ汁盡ク瓶ニ滴溜ス。然レ此一根ヨリ僅一二錢許
出ルノニ或根ヲ搗キ絞テ汁ヲ取ル者アリ此汁ヲ
取リ集テ曝乾メ凝固セシメ塊片ト爲ス。是即チ蘇甘
沒扭謨ナリ。○上品ハ淨潔ニ汚物ヲ雜ヘズ大塊
ヲ爲シ外面灰色或黃色ヲ帶ビ乾固メ輕ク。脆脆ニ
シテ破碎シ易ク。破バ光澤アリテ牛皮膠ノ如ク。研
磨メ散末トナリ易ク。指間ニ摩スレバ淡灰色ノ碎
粉トナリ。或津唾若クハ水ヲ以テ其塊片ニ濕シ摩
スレバ乳白色トナリ。或云淡黄ノ水ニ浸セバ其麤
痕ヲ爲ス。

謨質ハ盡ク溶化シ乳白色ニノ綠色ヲ帶ビ燒酒ニ溶
セバ渣渣少シ。然レ此品稀ナリ。其氣味酷烈ナラズ
辛苦ニメ嫌フベク嘔スベキ不佳ノ氣アリ其質華
爾斯多クノ麤謨少ナシ。上品ヲ燒酒ニ溶セバ此物
十六弓ヨリ華爾斯十一弓。麤謨二弓半出ツ。或云此
物六弓ヨリ華爾斯五弓出ツ。○下品ハ黑色華爾
ク。破碎シ難ク細末トナリ易カラズ。汚物多ク華爾
斯少シ。是莖葉根共ニ搗絞テ其汁ヲ曝乾シ或粉麪
類。麪糊。灰沙等ヲ雜ヘ乾固シ製スル者ナリ。或黑色
ニメ炒焦セル如ク若ハ焦臭アルハ木炭ヲ雜ヘ製

スル者ナリ。或全偽造ノ品アリ。是ハ瀟湘龍骨木脂ノ白汁ヲ加若ハ藥刺巴木炭等ヲ加テ氣味効力ヲ擬造スルナリ故ニ精細ニ鑒試ノ上品ヲ擇ベシ。上品ハ西里亞セイリヤ亞細亞洲アジヤ地中海邊國名亞列波アリアボ西里亞セイリヤ多産ス。但粉麩ヲ雜ル故ニ蛀刺ノ品多シ。然レ凡蟲ハ華爾斯ヲ蝕スルノ必キ故ニ其効力ヲ減スルノナリ。○搭按ニ此物オホヒルガホ和漢產未ダ詳ナラス。舶來ヲ用ル。○淑云長藤苗モ亦乳白色ノ汁アリテ味苛烈。是ヲ曝乾ノ一ノヲ服スレバ瀉下ノ効アリト云。主治性熱峻攻ノ下劑トス。留飲停水。粘稠液。膽液質。

ノ惡液ヲ瀉下ス。故ニ水腫。粘液腫。胸痰喘鳴。發狂等總テ惡液鬱積ノ病ヲ治シ。條蟲ヲ下ス。○膠粘液腸ニ鬱聚ノ諸症ヲ發シ經久治セザル者。或頑固水腫等ヲ快瀉ノ治スルノ藥刺巴華爾斯ノ如シ。又格碌キント董篤藤黃蒲里阿尼亞アニアモ其効アリ。○凡腸ノ運動怠慢ニシテ粘液留飲夥ク腹部ニ壅滯シ便秘スル症ニ的効アリ。是瀉下ノ効ノミナラズ其劇キ衝動ニ因テ頑固ノ壅塞ヲ疏解スレバナリ。○服量四匁ヨリ十二匁ニ至ル凡峻下スベキ症。或ハ咽喉焮腫ノ如キ速ニ瀉下スベキ症ハ十六匁若ハ一ノヲマテ用ベ

シ但他人炊衝病ニハ害アリ○過服スレバ大ニ胃腸ヲ刺戟シ腹痛ヲ發シ或ハ腸ニ炊衝ヲ生ス○一味用目ハ瞑眩甚キ故ニ此藥十匁ニ沙糖若ハ甘扁桃半月ヲ研和シ或ハ此藥十二匁ニ甘草煎五弓ヲ研和シ瀝過ノ半時ニ一匙宛用フ○水腫粘液腫ニ左ノ劑ヲ用テ峻下ノ良効アリ

蘇甘沒扭利水散

蘇甘沒扭 蘇甘沒扭 蘇甘沒扭

藥刺巴華爾斯

各十

薄荷油

六滴沙糖二

右研和ノ散劑トシ一服トス此劑壯實ニノ感動少

キ人ニ用ベシ感觸シ易キ者ハ服量ヲ減スベシ○膠粘液或ハ膽液瀉敗ハ酷厲液ヲ疏解ノ滌除スルニ飲劑トシ用ルモ亦良假令バ後方ノ如シ

蘇甘沒扭瀉水飲

答末林度

右水一比ニ煮瀝テ其液七弓ヲ取リ左ノ藥ヲ加フ

旋那舍利別

蘇甘沒扭謨

七匁

大黃越幾斯劑

半錢○製法大黃剉一北沸湯十六比ニ浸ス下十二時上清

下十二時上清ヲ瀝ニ取リ前ノ液ト合シ

熬乾ノ錠

右研和シ半時ニ一匙宛用ヒ瀉利ノ多シニ隨ヒ服
量ヲ加減ス 度叔按福 叔伍依

若傑禮需謨 是ハ蘇甘沒扭謨ヲ再製ノ峻下ノ効ヲ
緩和スル者ナリ

製法 蘇甘沒扭ヲ適宜ニ取リ刮テ小薄片ト爲

シ針ヲ以テ適ク細孔ヲ穿タル紙上ニ撒シ是ヲ炭

火ニ焙リ其火ニ硫黃末少許宛投メ其烟氣ヲ薰シ

篋ニテ手ヲ住メズ攪セ淡白色ト爲ルニ至ル 或云

分時 **又法** 蘇甘沒扭ヲ細末トシ紙ヲ篩内ニ敷テ其

末ヲ撒シ焙テ硫黃ノ烟氣ヲ薰スルヲ前法ノ如クシ

其末焯解スルニ至ル 此製法ヨリカハモニソノカハモニ

又法 甘草煎汁若ハ甘草膏ヲ水ニ溶シ蘇甘沒

扭ヲ適宜ニ加慢火ニ煮テ溶化シ漉テ滓ヲ去リ熬

乾シ錠ト爲ス **又法** 蘇甘沒扭ヲ玫瑰煎汁ニ溶シ漉

テ滓ヲ去リ熬乾シ錠ト爲ス **又法** 楨楂ヲ瓢ヲ剝リ

去リ是ニ蘇甘沒扭ノ末ヲ填充シ麥粉泥ヲテ外圍

ヲ覆シ熱灰ニ煨熟メ取出シ用フ **又法** 蘇甘沒扭ニ

楨楂ノ粘汁ヲ加ヘ搗テ溶シ漉テ熬乾ス 往昔ハ

右ノ如ク蘇甘沒扭ヲ製シ用テ腹痛等ノ瞑眩チカ

ラシム。硫黃烟ヲ薰シ製スルヲ殊ニ良法トス。然レ

是ニ因テ良性トナルニ非ズ唯其膠粘大ル華爾斯
質ヲ甘和者峻攻疏滌以性能ヲ減殺スルハ其
諸法亦其峻効ヲ爲ス所入華爾斯ヲ除テ護質ノ
瀉取リ華爾斯質ハ水ト混和セズ故ニ瀉テ或煎
蒸ノ藥氣多ク蒸散シ効力脱失スル故ニ近來此劑
ヲ廢メ用ルヲ稀ナリ①蘇甘沒扭用テ腹痛ヲ恐
ル者ハ大黃越幾斯劑出ツテ加テ其華爾斯質ヲ疏
滌スベシ。是ニ由テ其効力ヲ減スルヲチ或蘇甘
沒扭ニ沙糖若ハ甘扁桃或甘扁桃油ヲ少許宛加テ
研和シ毛篩ニテ羅ヒ用ベシ或患者感動甚クノ瞑

眩ニ堪ザルキハ其華爾斯質ヲ去リ用ベシ。其法蘇甘
沒扭モヲ甘草煎汁ニ研和メ溶シ靜定メ上清ヲ取用
フ或甘草一弓ニ水十弓ヲ加慢火ニ煮テ半ヲ減シ
滓ヲ去リ蘇甘沒扭十二瓜ヲ研和メ溶シ布片ニテ
瀉テ滓ヲ去リ半時ニ一匙宛用ヒ下利ノ多少ニ隨
ヒ加減ス依(侯)亞(叔)按
格磔堇鷲 蘭 トモキニスコロキヤン左ス羅コロキヤン
是胡瓜ノ一種ナリ林娜秘是ヲ胡瓜類ノ第一種莖
圓ク粗糙ニ線楞アリ蔓延スルヲ胡瓜ノ如シ卷

鬚アリヨク接ニ絡フ葉。西瓜葉ニ似テ小ク。深ク缺
裂シ毛茸アリテ灰白色。粗糙。白點アリ。背殊ニ白色
ヲ帶ビ。長柄アリ。花。胡瓜花ノ如ク淡黄色。花後。實ヲ
結ブ形圓ク大拳ノ如シ或云大サ橙ノ如シ或長ク
或扁圓或小ニノ鶯卵ノ如
キアリ是皆其皮滑澤ニ薄ク固シ生淡綠。熟淡白
色。或黄綠色ヲ帶ビ或斑紋アリ其瓢白色輕鬆。燈心
ノ如シ味苦烈ニ辛ヲ帶ビ不佳ノ氣アリ。横斷ス
レバ六瓠アル瓜類ノ如シ是ニ許多人子アリ大
胡瓜子ノ如ク短ク厚固。淡白色或黄赤色ヲ帶ビ
或黯褐色ナルアリ此瓢甚ダ粘著ス燒酒ニ浸セバ

其汁粘テ棉布ニ透過シ難シ莖葉子圧ニ甚苦シ。此
草宿根セズ○瓢新鮮多肉。白色ハヨク乾キ輕虚
未メ破碎シ易ク苦烈ナルヲ擇ムベシ○此草西里
亞亞列波ニ多ク産ス。皮ヲ去リ瓢ヲ乾シ四方ニ貨
ス。或亞歷山德兒地名或伊斯巴尼亞亞意太里亞等
ニ産ス。格按ニ此物和漢產未詳ナ
ラズ舶來ノ品ヲ用フベシ

主治 瓢ヲ藥用トス。末トシ二匁ヨリ四匁マデ用テ

峻攻下劑トス。膠粘液。腐敗。膽液ヲ瀉下シ腸中ノ
細管ヲ鑽開ノ頭腦神經肢體諸藏ニ頑結壅鬱セル
惡液ヲ導泄驅除シ經久淹滯ノ諸病ニ間大効アリ。

假令^ト經久頭痛。頭旋。偏頭痛。或卒倒昏睡。癩癩。喘急。或傷冷毒痛。肢節拘強。攣痛。或微毒劇痛。腰覽痛。結石腎痛。等ノ如シ。但患者體稟壯實^ト。虛憊ナキ症ニ適應^ス。又諸蟲ヲ下シ墮胎セシム。故ニ孕婦ハ是ヲ禁ス。○過用スレバ此藥ノ粘稠ナル華爾斯質。腸ノ穢積^ト。膠著ノ劇キ腹痛ヲ發シ。或腸ノ細血絡ヲ穿破ノ血ヲ下ス。故ニ香竄健胃ノ藥品ヲ加。其毒ヲ甘和シ用ベシ。○此藥ヲ末トシ服量甚些少ニ用レバ瀉下セズ。唯解凝ノ効ヲ爲シ神經ヲ衝動揮發シ諸器血液ヲ健運闊達ノ大ニ全軀ノ運動ヲ變化シ。

麻痺不遂等廢痼ノ症。膠粘ノ惡液壅滯セル經久ノ病。或婦人經閉^ト。用テ開捷効アリ。假令^ト後方ノ如シ。

格磔堇篤解凝散

格磔堇篤 細末 六分

沙糖 三錢

右研和シ分テ十八服トシ一時半每ニ一服宛用フ若^モ下利スル者ハ服量ヲ減シ或阿芙蓉少許ヲ加フ○或是ヲ丁幾去爾^トシ服量些少ニ用テ亦効驗多シ假令^ト傷冷毒ノ内鬱。或元運力ノ虛乏怠慢。或血液甚ダ粘稠ニ凝體諸器ノ運營虧損スル等ニ因テ發スル諸頑固ノ壅塞病。或經久ノ頭痛。齒痛。自餘

在再タル疼痛或痺不遂。痛風傷冷毒痛。微毒痛。發作

次序ナキ間歇熱。或婦人萎黃病。寒粘液質ノ諸症或云

此症ニハ丁香ニ多ク奇効アリ。是瀉下ノ効ノ云ナ

少許ヲ加テ良ニ多ク奇効アリ。是瀉下ノ効ノ云ナ

ラズヨク衝動刺戟ノ解凝疏散ノ峻効ヲ為セバナ

ト假令バ後方ノ如シ

格碌董篤丁幾去爾

格碌董篤 一弓半 角茴香 一弓

燒酒 二十弓

右硝子壘ニ内燄處ニ置浸メ藥氣ヲ出シ漚テ滓ヲ

去リ十五滴宛飲液ニ點服スル一日四次大便通利

スルニ至ル或云初ト五滴宛用其後ハ毎日一格

碌董篤ヲ細末トシ達刺侃篤漿或亞刺比亞越謨漿

ニ研和メ錠ト為ス。是ヲ篤碌幾失亞爾漢達兒ト名

ク。此劑亦經久頑固ノ諸病ニ良効ヲ稱ス○格碌董

篤一錢或一錢半ヲ取沸湯ニ浸シ藥氣ヲ出シ吉利

詞爹兒トシ施メ腸ヲ刺戟シ神經ノ運動ヲ増發ノ

頭中ノ病毒ヲ下部ニ導泄ス。即粘液腦中ニ壅塞メ

發スル卒倒昏睡ヲ蘇復シ痺不遂等頑固ノ大便閉

ニ良驗ヲ稱ス○此藥ヲ越幾斯劑トシ用バ瀉下ノ

効較緩ナリ。六七瓦ヲ一服トシ與テ眼眩ノ恐ナシ

格磔董篤越幾斯劑

製法 格磔董篤 一比 燒酒 尋常者 六比

右硝子壘 內浸三日。瀘テ其液ヲ取。其滓ニ水六比ヲ加。暫煮テ放冷シ。渣沈ムヲ候。瀘テ上清ヲ取。前ノ浸劑ト合和シ。文火煮テ熬乾シ。錠ト爲ス。○ 格磔董篤子ハ瀉下ノ効ナク。胡瓜子ノ如シ。○ 淑度依

ス百兒麻攝的 羅 ヲル ス ヲト 又 ヲル ヒ ス グレ イ ン サド

○按ニ斯百兒麻攝的ハ鯨ノ一種。加失磔篤ト名。クル大魚ノ腦髓ヲ取り。淘洗ノ粘膩鯨穢ヲ去リ

キ潔白乾固又碎片ト爲ス者ナリ。此魚本邦紀州

熊野。肥前五島。平戸等ノ海濱ニテ漁スル眞甲鯨

ト呼ブ大魚ノ類ナリ。紀州熊野ニテ此魚ノ腦髓

蠟ト稱シ。蠟燭ヲ造リ。又金創ニ塗テ血ヲ止。創ヲ

愈シ。潰瘍ニ塗テ痛ヲ止。肉ヲ生ス。ト云。和蘭ニ於

テモ斯百兒麻攝的及ビ其油ヲ以テ蠟

此物往古未詳ナラズ。唯數海上ニ漂漾スル者ヲ採

用ヲ以テ是鯨類ノ精液。海上ニ凝聚シ。或鯨死ノ腦

髓破碎シ出者トス。故是ヲ鯨精或鯨腦ト名ク。或魚

巢。海膠。海沫ノ稱アリ。ルヒス。サド。俱ニ鯨精ノ義ヲ

ハ此物加失碌篤ト名クル大魚ノ腦髓タルヲ覈知セリ然レ仍舊名ヲ襲用ノ斯百兒麻攝的ト稱ス

加失碌篤形狀 カセイロト又カシロト蘭 カセイロト又カシロト蘭

是鯨ノ一種海ノ品類多シ然レ大約頭濶大ニ鈍

圓下顎齒排列シ上顎内齒ナク或アレレ必ク唯凹

窪アリテ下齒ヲ容ル上喙ニ一噴潮孔アリ是鯨ト

異ナル所トス或云鯨ハ齒ナク上顎ニ凹窪ナク噴

項部ニ在リ加失碌篤ノ類○此魚大率分テ四種ト

ハ噴潮孔頭前喙上ニアリ○此魚大率分テ四種ト

ス第一種ハ最小ナリ是ヲ小加失碌篤ト名ク其大

ナル者モ二丈四尺ニ過ギス脊ニ鱗ナク頭圓ク喙

上一噴潮孔アリ下顎ニ齒アリテ僅ニ半按指横徑

許其端尖ラズ扁平ナリ此一種白加失碌篤又白魚

ト名クル者アリ白色ニメ黄色ヲ帶ブ長一丈五六

尺形質殆ト鯨ノ如ク頭隆起ス唯頭差尖ルノニ一

噴潮孔アリ下顎ノ兩側各小齒八枚アリ扁圓ニメ

稍勾ル上顎ニ齒ナシ脊緒ナクメ稍長キ鬚アリ魴

亦鯨ノ如シ○第二種ハ剝篤赫斯 鈍圓魚 又剝篤頰

兒赫斯 鈍圓鯨ノ義共ニト名ク是ニ五種アリ其一

加失碌篤中ニ於テ頭其體ニ比スレバ最大ニメ

鈍圓ナリ往年是ヲ漁ス長五丈二三尺圍三丈餘頭

喙鈍圓。頭巔ヨリ眼マデ一丈五尺許。下喙七尺許。下顎内ニ齒二十四枚アリ其端尖ラズ扁平ナリ。上顎ニ齒六ク唯凹窪二十四アリテ下齒ヲ容ル。舌端ノ大麥酒桶ノ如シ一桶麥酒三十六貫八百六十四錢ヲ容ル頭ニ一噴潮孔アリ。濶三尺許。眼。體軀ニ準スレバ甚ダ小ク。鬣ヲ違ル。四尺許。鬣四尺餘。臍ヲ違ル。一丈六尺許。陰莖長六尺許。肛門ヲ違ル。三尺半許。肛門ヨリ魴マデ一丈三尺半許。魴濶一丈三尺許。全軀黯黑色。腹淡白色ナリ。此魚七丈許アル者ヲ見ル。又往年二丈許ノ者ヲ漁ス。皮黑赭色。腹白色。體短ク頭鈍圓ニ壺

ノ如シ。喙少ク突出ノ其本末太同シ上下顎内ノ兩側各四齒アリ。後部ニ一二ノ臼齒アリ但上齒ハ小ナリ項ニ一噴潮孔アリ鬣及脊鰭アル。鯨ノ如シ其二ハ全軀帶綠色ニノ堅硬ノ頭蓋骨アリ此魚四丈許アルヲ漁ス其三ハ全軀灰色ニノ腹白色。頭前ニ一噴潮孔アリ。頭蓋骨ナク唯厚一指横徑許ノ硬靱ナル膜ヲ以テ頭蓋トス。此魚六丈許アルヲ漁ス。脊ノ魴ニ近キ處ニ三昂起アリ前部ノ者ハ高一尺八寸許。其次ハ六寸許。其次ハ三寸許アリ其四ハ頭大ニノ全軀ノ半ニ居リ其狀鳥銃ノ床尾ノ如シ喙

上ニ一噴潮孔アリ。脊ニ一昂起アリテ鱗ノ如シ。下
 顎内ノ周圍ニ齒排列シ前部ヲ齒ハ尤大ニシ。是ヲ
 抜取レバ大ナル胡瓜ノ如シ。又上顎ノ兩側ニ齒
 二三枚アリ其餘ハ凹窪アリテ下顎ノ齒ヲ容ル。此
 魚ノ大ナルニ準スレハ舌小ナリ。但咽門濶大ニシ
 半ヲ吞ニ或七八尺ノ魚ヲ吞テ半消化シ骸骨トナ
 リテ胃中ニ在リ肉甚ダ硬クノ銛モ透ル處少シ。是
 硬靱ナル腱ニ神經多ク間錯スレバナリ其五ハ通
 例六七文許圍三四文許アリ往年四丈九尺アルヲ
 漁ス。全軀灰白色鯨ニ比スレバ瘦削ス。頭甚大ニシ

全軀ノ半ヲ爲シ上喙濶大平坦。一噴潮孔アリ或云
 齒下顎ニ排列シ濶大ニシ長五六寸。白色象牙ノ
 如シ。脊ニ一昂起アリ高一尺餘。畢丸長一尺餘。陰莖
 ヲ違ル一四五尺許。肛門ヲ違ル一三四尺許此魚性
 敏捷ニシ他魚ト闘ヘバヨク背ヲ以テ抵リ喙ヲ以
 テ拒グ其脂肉ヨリ取ル油ハ鯨油ニ比スレバ尤潔
 白鮮美ニシ甘味ヲ帶ブ其頭ニ斯百兒麻攝的殊ニ
 多シ或云此魚ヨリ故ニ是ヲ斯百兒麻攝的頷兒赫
 斯ト名ク斯百兒麻攝的又其腹中ヨリ龍涎香ヲ採
 ル。檢弗兒人ノ著ス日本紀事ノ書ニ云。加失碌篤ノ

一種。日本ニテ「モソコス」按ニ是、眞甲ト呼ブ大魚ノ腹ヨリ龍涎香ヲ採ル其質蒸餅心ノ如クニノ膠粘アリ。是、鯨糞ト共ニ日本ノ海濱ニ漂漾スル故ニ土人概シテ「クジラノフント」呼ブ是、鯨糞ノ義ナリト龍涎云。香ハ如ク失碌ワカノ勝脱中ニ生ス。膀胱ハ卵圓形ニノ下部漸ク窄ク一管トナリテ尿道ニ連ル。上部モ亦管アリテ腎ニ連ル。膀胱中、黯橙皮色ノ液アリ。油ノ如クニテ臭氣甚タシ。液中、龍涎香ノ圓塊浮漾ス。是其液ノ凝固セル者ニノ結石ノ類ナリ。新ニ採ル者ハ臭氣アリ。其數多キモ四個ニ過ギズ。一個ノ秤量ハ五比ヨリ二十比許アリ。但ニ過ギズ。一個ノ秤量ニ老成ノ魚ニ非レバ生セズ。龍涎香中、小嘴蝸牛甲介類ノ碎片ヲ雜ル者アリ。是、此魚ノ吞ム所ノ潮沫ニ雜ル魚ノ嘴片。甲介等ナリ。龍涎香ハ實ニ此魚ニ出ル。下數、歴觀シ且、檢弗兒ノ説モ亦一證トスベ

シ。其他詳ニ龍涎香ノ條ニ舉グ。第三種ハ小眼加失碌ワカト名ク。眼甚小ナリ。是ニ二種アリ。一ハ齒尖利ニ直ナリ。是ヲ直齒加失碌ワカト名ク。一ハ齒勾カリテ鎌狀ヲ爲ス。是ヲ鎌齒加失碌ワカト名ク。○往年其直齒ノ者ヲ漁ス。長七丈許。八丈或十丈許ノ者アリ。背淡黑色。腹帶白色。頭甚大ニノ全魚ノ半ヲ成シ其狀異常ニノ鳥銃ノ末尾ノ如シ。頭前ニ一噴潮孔アリ。喙ニ比スレバ大ナラザレ。咽門濶大ニノ一丈二尺許ノ沙魚ヲ吞ム。下喙ハ前部狹窄ナル故ニ上喙ニ比スレバ小ク見ユ。然レ長一丈六尺餘アリ。是ニ大ナル齒二十五枚

排列シ其端尖テ鋸ノ如シ。上顎内ノ凹窪ト吻合ス
 レバ下顎ハ悉ク上顎ニ容ルガ如シ。一齒ノ量ニ比
 アリ。眼小ニメ鯨ノ如シ黄色ヲ帯ビ閃光アリ。舌圓
 ク尖リ此魚ノ大ニ準スレバ小ナリ鬣長一尺五寸
 許。每指七節アリ五節ハ脊ニ一昂起アリ又鯨ニ近キ
 處昂起ノ鱗ノ如シ。皮薄フメ半指横徑許。肉甚硬韌
 ニメ鉛透ル處必シ。頭ニ上好ノ斯百兒麻攝的及油
 多シ。往年其鎌齒ノ者ヲ漁ス。頭甚大ニメ全魚ノ
 半ヲ成シ其圍體ニ過ク。下顎ニ齒二十四枚アリ皆
 狭クメ鎌狀ニ勾屈ス。上喙ハ下喙ヨリ長キヲ三尺

許。鼻端ノ差上部ノ正中ニ一噴潮孔アリ。裏ニ中隔
 アリテ兩孔ヲ爲シ。蓋アリテ閉シ。脊ニ一個ノ長ク
 隴起セル椎骨アリ又往年此魚四五丈或六七丈ア
 ル者ヲ漁ス皮赭色。下顎ニ齒四十二枚アリ皆勾リ
 尖テ狼牙ノ如シ長七拇指半横徑。太七拇指横徑。皆
 上顎ノ凹窪ニ容ル但下顎ノ齧齒ハ短クメ上顎ニ
 觸レズ故ニ又上顎ノ後部ニ一二ノ齧齒アリ。頭ヨ
 リ斯百兒麻攝的ヲ採ルメ五桶餘又往年此魚ノ一
 種ヲ漁ス。長四丈八尺。高一丈二尺。最太キ處圍三丈
 二尺。鯨潤一丈二尺。下顎ノ齒正中ニ一枚。兩側各二

十五枚。合ノ五十一枚皆勾テ鎌状ヲ爲ス。○第四種
 未斯篤赫斯トヒス名クノ義魚往年是ヲ漁ス長六丈許。
 圍五丈二尺許高二丈二尺許或此魚十丈許ノ者大
 全軀黯青色。腹帶白色。頭蓋骨アリ。脊一直鱗アリ。
 頭前ニ一噴潮孔アリ。潤一尺半許。上唇ヨリ頭頂マ
 テ一丈六尺七寸許。下喙一丈五尺許。下顎ノ齒直ニ
 ヲ其端扁平ナリ。咽門高六尺餘。潤四尺餘。魴厚一尺
 四寸許アリ。外骨ハ又非平魚ハ四尺六寸大。
 採收說 右第二種中ノ三ニ舉ルカ失碌篤ヲ剖テ斯
 百兒麻攝的ヲ採ル說ニ云ク喙皮ヲ剥去レバ脂肪厚

二尺餘。頭ノ脂肪ハ厚。三指横徑許。是ヲ剥去レバ厚
 膜アリ。厚一指横徑許。是ヲ截開ケハ小膜室二十八
 個アリテ叢簇疊累ス小膜室ハ厚膜ノ展是ヲ截レバ
 清稀透亮ニ油ノ如ク燒酒ノ如キ液アリ。此即チ
 上好ノ斯百兒麻攝的ナリ或云此液乳白色ノ油ノ
ノ間ニ是清稀ノ液ナルヲ以テ是ヲ採ル人以爲ク
 腦髓アルヲナシト。然レ是ヲ取り出セバ忽チ凝固
 ノ雪片ノ状ヲ爲ス。脂肪中ニモ凹窪アリテ此液充
 チ小粒状ヲ爲ス。○右第二種中ノ四ニ舉ルカ失碌
 篤ヲ剖テ斯百兒麻攝的ヲ採ル說ニ云ク頭皮ヲ剥去

レバ脂肉アリ厚一掌横徑許。是ヲ去レバ堅固硬靴
 ナル神經質ノ厚膜アリ厚一掌横徑許。是ヲ以テ頭
 蓋骨ニ充ツ。是ヲ去レバ又厚一掌横徑許ノ神經質
 ノ厚膜アリ。喙ヨリ全頭ヲ被テ項ニ至リ。又此膜ヲ
 以テ頭中ヲ區分メ兩腔ト爲ス。即チ其厚膜ヲ截開
 ケバ第一腔ナリ腔中甚ダ軟脆ナル腦髓充ツ此即
 上好ノ斯百兒麻攝的ナリ。其腔ノ墻壁ハ小膜室疊
 累叢簇メ成リ是ニ澄清潔白ノ油ヲ藏ム。故ニ盡ク
 其腦髓ヲ採リ去レバ腔内裏面ノ小膜室ヨリ油夥
 ク滲出ス。是ヲ水ニ投スレバ凝固メ乾酪ノ如シ。然

レ是ヲ取出セバ復流動メ故ノ如シ或云是ヨリ第
七桶ノ油出
 一腔ノ下。蓋顎ノ上部ニ當テ第二腔アリ。魚ノ大小
 ニ隨ヒ深ウハア四尺ヨリ七尺餘。腔内。小膜室疊累叢簇シ
 是ニ精樣ノ腦髓充ルヲ宛モ蜂窠ニ蜜アルガ如シ
 第一室ハ後腦ナリ第二室ハ前腦ナリ猶人ノ前後
 腦アルカ如シ。人類ノ外。俯行ノ生族ハ後腦上部ニ
 在リ。或云七丈許ノ加失碌篤ノ頭ヨリ斯百兒麻
 攝的二十四桶ヲ採ル。一桶ノ量三十六貫八百六十
 錢。其腦髓ヲ盡ク採了レハ腔内裏面ノ小膜室ヨリ
 精樣ノ鮮明清白ナル油夥ク滲出ス。是ヲ汲取レバ
 又隨テ湧出シ十一桶ヲ汲取レバ湧溢セズ然レ仍
 其小膜室ヨリ稍々滲出メ止メナシ其油ノ出ル所

ヲ究レバ太サ人股ノ如キ大管。頭ヨリ起テ脊椎下
 又沿ヒ循行ノ漸ク狹窄トナリ。魴ニ至テハ太指ノ
 如シ。即チ其油ハ此管ヨリ頭中ノ小膜室ニ流溢ス
 ルナリ。此大管ハ支別甚ダ夥クメ全軀ニ彌蔓ス。脂
 肉。筋肉中ニモ幾多ノ小膜室アリテ油充テ其細支
 別連ル。故ニ此大管ハ腦液即其清稀ヲ滿肢體ニ運
 輸スル宗源トス。若シ脂肉ヲ截取ルモ誤テ其大支
 別ヲ破レバ油夥ク迸出ス。或此油ヨリ亦斯ス百兒ル麻
 攝的ト分泌シ製スト云。又其脂肉。筋肉等ヲ蒸餾シ
 油ヲ取り或ハ魴ヲ以テ魚鰾ヲ製スト云。○斯ス百兒ル

麻攝的ハ數海上ニ漂漾スルヲ採ルコトアリ。是或此
 魚死ノ頭腦壞破シ出ル者アリ或同類ノ大魚ト闘
 ヒ若クハ劍魚鋸鯊。一角魚等ト戰テ其頭ニ創ヲ被
 リ此魚頭蓋トク唯厚膜ヲ腦髓漏泄メ凝聚スル者
 ナリ。然レ其頭ヲ剖テ採ル者ニ比スレバ下品トス
 或云尋常ノ鯨ノ腦髓ヲ取テ斯ス百兒ル麻攝的ト製ス
 ル者アレハ潔白ナラズ黃色ヲ帶ビ腥穢粘膩多キ
 故ニ極テヨク製スルニ非レバ用ヒ難シ。○劍魚和
 蘭名スワールドトヒト即チ劍魚ノ義ナリ。鯨ノ和蘭名
 ガグヒスト即チ鯨魚ノ義ナリ。格按ニ劍魚ノ和蘭名
 云。嘴長丈許有齧刻如鋸。猛而多力與把勒亞魚戰海
 水皆紅。此魚輒勝以嘴ノ觸船則破。海船甚畏之。○此魚多ク臥蘭的亞ニ於テ
 漁シ其腦髓ヲ採テ第ニ那瑪爾ノ加蘇ノ亦齊ノ洲ノ歐羅巴ニ

亞^ア謨^ム斯^ス的^テ爾^ル達^ダ謨^ム和^和蘭^蘭都^都等^等輸^輸之^之精^精製^製之^之四^四方^方二^二貨^貨ス

精製法 利^リ篤^ト亞^ア斯^スニ生^生石^石灰^灰少^少許^許ヲ加^加ハ水^水ヲ注^注テ

灰^灰汁^汁ト爲^爲シ其^其上^上清^清ヲ取^取テ漚^漚過^過シ加^加失^カ碌^ロ篤^トノ腦^腦髓^髓

ヲ取^取集^集テ布^布袋^袋ニ内^内レ絞^絞テ其^其油^油脂^脂粘^粘穢^穢ヲ去^去リ取^取リ

出^出メ右^右ノ灰^灰汁^汁ニ投^投シ攪^攪セ浸^浸ス一^一晝^晝夜^夜脂^脂油^油ハ盡^盡

ク灰^灰汁^汁ト相^相和^和シ斯^ス百^百兒^兒麻^マ攝^セ的^的ハ灰^灰汁^汁ト混^混セズ自^自

ラ分^分泌^泌メ凝^凝固^固シ疏^疏脆^脆ノ質^質トナル是^是ヲ取^取テ復^復布^布袋^袋

ニ内^内レ絞^絞テ灰^灰汁^汁ヲ去^去リ布^布上^上ニ排^排ベ乾^乾シ貯^貯フ

又法 加^カ失^カ碌^ロ篤^トノ腦^腦髓^髓ヲ取^取リ悍^悍キ灰^灰汁^汁ニ投^投シヨ

ク攪^攪セ文^文火^火ニテ煮^煮ル片^片ハ脂^脂油^油ハ自^自ラ分^分泌^泌シ腦^腦髓^髓

ハ凝^凝固^固ス是^是ヲ取^取テ漚^漚テ汁^汁ヲ去^去リ磁^磁壺^壺ニ内^内レ置^置バ冷

ルニ隨^隨テ油^油滲^滲出^出メ上^上面^面ニ浮^浮ム是^是ヲ抄^抄ヒ去^去レバ自

ラ潔^潔白^白トナリ凝^凝固^固ス是^是ヲ截^截テ鱗^鱗片^片ノ如^如クシ貯^貯フ

又法 加^カ失^カ碌^ロ篤^トノ腦^腦髓^髓ヲ取^取リ桶^桶ニ内^内レ鹽^鹽ト水^水ヲ

加^加ヘ攪^攪テ上^上面^面ニ浮^浮ム鯉^鯉臍^臍粘^粘穢^穢ヲ去^去リ其^其鹽^鹽水^水ヲ換^換

テ淘^淘洗^洗スルヲ三^三四^四次^次ニノ潔^潔白^白トナルニ至^至リ又^又清

水^水ニテヨク洗^洗ヒ鹽^鹽氣^氣ナキニ至^至テ紙^紙ニテ漚^漚シ數^數絞^絞

テ水^水氣^氣ヲ去^去レバ自^自ラ鱗^鱗片^片ノ如^如クナル是^是ヲ取^取リヨ

ク乾^乾シ貯^貯フ

○此^此物^物右^右ノ如^如ク淨^淨製^製メ粘^粘臍^臍鯉^鯉油^油ヲ去^去レバ潔^潔白^白鮮

美ニメ雪片ノ如ク光澤透瑩ニメ滋潤アリ乾固脆
脆ニメ薄片疊襲シ味粘脂ノ如ク油氣アリ較著ノ
香臭ナシ是ヲ上品トス潔白オラズメ黄色ヲ帶ヒ
或臭氣アルハ陳久ナル者ニメ藥用トセズ此藥
封シ貯レバ久ク損敗セズ然レ氣ニ觸レバ黃氣
帶ビ味亦澁敗ス○其色及味變スルキハ變典塔
掘若ハ燒酒ニ暫浸シ水ニテ淘洗スレバ復潔白柔
脆トナルナリ○或此物ニ白蠟ヲ雜偽造スル者ア
リ然レ真物ハ白色透亮ニメ鱗片狀ヲ爲シ偽品ハ
軟ニメ蠟臭アルヲ以テ辨スベシ或鯨腦若ハ他魚

ノ腦髓脂肉等ヲ灰汁ニテ淘洗シ晒シ偽ル者アリ。
然レ近來真品ノ價甚廉ナル故ニ偽品稀ナリ
主治是脂ト蠟トノ質アリ又油氣ヲ帶ビ稍揮發鹽
アリ甚軟化柔緩シ諸管纖維ノ攣急ヲ縱弛シ枯燥
ヲ滋潤シ凝結ヲ融解シ酷厲液ヲ甘和シ諸疼痛ヲ
止ム○效嗽ニ捷効アル藥トス故ニ劇キ效嗽ニ用
○傷冷毒等ノ稀涼ヲ酷厲液肺ヲ侵刺シ發スル乾
效或肺傷勞效喘急ヲ緩メ痰ヲ化熟メ略易カラシ
ム○肺膿瘍ヲ淨刷シ又胸脇痛等ヲ緩和メ膿瘍ト
ナレバ預メ防ニ用ヲ○内部ノ膿瘍及打撲傷ニテ

内部毀傷セルヲ愈シ凝血ヲ疏散ス○腹擗急及ビ腸痛ヲ治ス下利赤痢ニ於テ腸中ノ滑液剝脱シ膽液等ハ酷厲液浸刺ノ腹痛スル症ニ殊効アリ○婦人産後腹痛或腎膀胱尿道擗痛其他一切酷厲液刺戟ヲ發スル痛ヲ寛解ス○小兒腹擗痛ヲ緩メ驚口瘡ヲ治ス○服量一因ヨリ二刃マデ適宜ノ飲液ニ研和シ用フ否ザレバ嘔氣ヲ發スル者アリ或扁桃油。亞刺比亞。越。謨。漿。雞子黃。沙糖等適意ニ擇ニ取テ研和シ乳汁ノ如クシ用テ尤良或緩和劑和胸飲劑。煉膏丸藥等ニ加用フ水ニハ溶化シ難シ○外敷ノ

緩和ノ良藥トス。甘扁桃油。阿利襪油。亞麻油等ニ研和シ塗テ打撲傷ヲ治シ凝血ヲ散シ腫痛ヲ消ス○潰瘍ニ塗テ膿ヲ排ヒ肉ヲ生ス○乳房結核及乳頭毀傷剝爛ニ塗テ痛ヲ止メ速ニ治ス○阿利襪油。亞麻油等ニ研和シ痘瘡落痂後敷是ヲ塗テヨク醜痕ヲ消ス○肌膚ヲ滑澤ニシ皺摺粗糙ヲ消シ粧顏料トシ塗テ小皰雀斑等ヲ除ク○婦人乳汁過多ニ乳房腫脹結核ヲ生シ或乳頭毀傷潰爛スル等ニ左ノ膏藥良驗アリ

斯百兒麻膏

斯百兒麻攝的 半比 白蠟

家猪脂 各一比

右文火煎上七煇解之煉和之 斯百兒麻攝的 今新

鮮ナルヲ擇ムベシ陳久ニシテ澁敗スレバ緩和人効

ナキ飲マナラズ酷烈ナル侵蝕毒トナリ内服外敷

木害アリ 伍 依 炭

水銀

アルゲンタムヒム又ハイダラ

汞坑 水銀ハ石灰様ノ白色ノ軟石ヲ被フ山ニ多ク

産ス。但、汞坑邊ノ樹ノ葉ヲ生スルヲ遲久花開實ク

結、稀ナリ。或云、春月早且水銀産スル山ヲ望、バ

一處ニ濃蒸氣升テ霧ノ如シ。但其氣稠、重キ故ニ

甚、高ク升ラズ、乃、其處ヲ尋索、ノ極、レ、バ、必、水銀アリ

又云、常ニ北風ヲ受ル山陰ノ地ハ汞礦肥テヨク熟

ス其坑邊ニ水多ク、レ、バ、山脚ヲ掘テ水ヲ疏導シ、或、

汲去テ後、礦場ヲ開クベシ

產地 四大洲中、水銀坑、他ノ諸金坑ニ比スレバ、甚、少

シ、亞細亞洲ニハ、應帝亞支那歐羅巴洲ニハ、翁加里

亞齊西里亞博厄美亞伊斯把尼亞佛郎私加爾泥阿

刺、意、地、太、里、亞、墨、利、加、洲、ニ、ハ、弗、里、阿、烏、爾、伯、西、兒、波、多

西^{地名}等ナリ○齊西里亞翁加里亞ニハ三年間
ニ水銀六百九十五万三千五百斤餘ヲ採ルト云
純汞水銀ハ純質ノ者アリ礦石ヲ煨煉ノ採者アリ
○純質ノ者ハ一種白色ノ土塊及礦石等ヲ打碎ケ
バ水銀ノ細粒迸出シ或云朱砂礦ヲ碎ケバ水銀迸出ス或巖罅石縫
ノ汞脉ヨリ迸流ス是皆礦石ヲ煨煉ノ採ル者ニ比
スレバ極テ純潔ニ汚物ナシ偶此坑ヲ得レバ日
ニ水銀三十六斤餘ヲ採ト云其巖罅石縫ニ出ル者
ハ土石ノ隙ニ走漏ノ撒失シ易ク是ヲ蹤跡ノ深ク
地ヲ掘採ル故ニ他ノ坑場ニ比スレバ甚艱勞ニ

人功ヲ費ス^ト殊多シ○其礦石ヲ打碎テ水銀ヲ取
又其礦ヲ細ニ碎キ臼ニ内レ搗テ末トシ水ヲ注テ
淘汰シ餘殘ノ水銀ヲ取ナリ○阨エ以イ埵デ利亞ア泥ニ亞ル馬マ
地名ノ山脚溪邊ニ汞坑多シ往昔土人偶桶ヲ造テ溪
流ニ浸ス^ト一夜翌早是ヲ提ルニ甚重シ恠テ是ヲ
見レバ桶中水銀充ツ是ヨリ其地多久水銀アルヲ
知ルト云○右ノ如ク純質ノ者ヲ採ルヲアレ甚
稀ナリ今時ハ多ク汞礦ヲ煨煉シ採ルナリ
汞礦水銀ノ礦石二種アリ俱ニ山坑ニ出ツ其一ハ
朱砂礦ナリ其色黯赤光彩アリ水銀質ヲ帶テ重ク

硫黃氣多キ石塊ナリ燒テ硫黃氣アル者是水銀ト硫黃ト自
ラ凝結ノ成ル者ニメ通例是ヨリ水銀ヲ採ルナリ
或云此礦青色ヲ帶ビ鐵ニテ磨スレバ赤色ヲ見ス
者ヲ上品トシ且其礦重キヲ貴ブ水銀ヲ含フ多ク
レバナリ或泥様ノ塊ヲ成ス者アリ其他種類多シ
其種類後ノ朱砂ノ條ニ舉グ其一ハ鉛色ノ凝塊ヲ成シ石ノ如
ク且粘潤アリテ稍軟ナリ是ヲ軟石礦ト名ク
汞礦煨煉法 朱砂礦ヲ取り石臼内ニ搗テ細末ト
シ生石灰或木炭或鐵粉或礬蓬鹽或酒石鹽等ノ細
末ヲ等分ニ攪勻シ頸窄キ陶壺ニ内レ其口ニ鬆疏

ナル鮮綠ノ樹苔類ヲ厚ク蓋ヒ又差大ナル陶壺ヲ
取テ其口際マデ土中ニ埋メ右ノ礦ヲ内タル壺ヲ
倒ニノ接合シ陶土ニテ其合際ヲ塗封シ其外圍ニ
炭火ヲ積テ燒ク片ハ其加ル所ノ石灰等ニテ礦中
ノ硫黃ヲ吸收スル故ニ礦ハ凝結ノ上壺ニ留リ水
銀ハ分テ樹苔ヲ透漏シ下壺ニ溜滴ス或樹苔ヲ用
ヒス一個ノ鐵版ニ遍ク細孔ヲ穿テ下壺ニ蓋ヒ上
壺ヲ倒ニ接合シ前法ノ如ク燒モ亦良
又法 朱砂礦ヲ細末トシ石灰等ヲ加ル前法ノ
如クシ鐵ノ列篤兒多ニ内レ燼ニ上セ承留壺ニ水

半、内レ接合メ塗封シ武火ニテ升煨スレバ水銀焔
 解ノ承留壇ノ水中ニ下リ硫黄質ノ礦類ハ皆殘リ
 留ルナリ。若シ水銀ニ黑灰雜ルハ水ニテ淘洗シ
 淨潔ト爲スベシ
 又法 悍キ亞兒加利鹽ノ灰汁生石灰剝篤亞斯等
水ニ溶シ灰汁ト
 爲スヲ以テ朱砂礦ヲ煮レバ水銀分テ細珠トナリ
 其底ニ沈テ凝聚ス。是ヲ瀝テ水銀ヲ取り其灰汁ニ
 蒸留醋ヲ滴シ加レバ硫黄其底ニ降、沈ムナリ
 又法 硫黄氣ナキ鉛色ノ軟石礦ハ石灰等ヲ加ヘ
 ズ唯其礦ノ細末ヲ列篤兒多ニ内レ承留壇ニ水半、

盛テ接合シ適宜ノ火候ニテ升煨スレバ水銀ハ承
 留壇ノ水中ニ下リ或列篤兒多ノ底ニ聚ルナリ○
 凡、礦類ヲ燒、キハ硫黄ノ臭烟薰蒸ノ近邊ノ草木凋
 枯シ蔬果皆食料ト爲シ難ク禽獸亦體小、長育シ
 難シ故ニ烟氣ノ風散セル曠野ニ於テ燒煨シ是ヲ
 口鼻ニ吸入スル、勿レ○水銀ハ銀朱ヲ升煨シ取
 ル者、夾雜ノ汚物ナク、最モ純粹ナリ
 銀朱煉汞法 銀朱ハ製造ノ朱砂ナリ
 製法後ノ朱砂ノ條ニ出、
 銀朱 細末 生石灰 細末 或一倍ヲ以テ石灰ニ代、
 右攪勻シ硝子若ハ陶製ノ列篤兒多ノ三分、二ニ充、

或云三分一ニ充ツ或云格兒弗^ハ半ニ充ツ硝子ノ承餾壘ニ水半内テ接合シ其接際ヲ塗封セズ爐ニ上セ漸ク武火トシ升煨スレバ水銀升テ承餾壘ノ水中ニ下ル終ニ水銀火モ下ラザルニ至リ其水銀ヲ取り貯フ是レ承餾壘中ノ水氣ヲ以テ蒸升セル微細ノ水銀ヲ清涼ニスル故ニ自ラ凝聚ノ滴シ下ルナリ○上好ノ朱一匕ヲ升煨メ水銀一匕餘出ツ是ヲ水ニテ洗ヒ乾シ革ニ包ミ絞リ漚シ貯フ○承餾壘ノ接際ヲ塗封セザル所以ハ其朱ニ含メル硫黃氣漏散スルガ爲ナリ否ラザレバ硫黃ト水銀牢著メ剖折シ難ク動モ

スレバ灰色ノ泥トナレバナリ○硫黃ノ酸收ハ水銀ヲ繫縛結束スルヲ極テ牢固ニメ剖折シ難シト雖モ火力ヲ以テ焔化スレバ生石灰鐵屑等ニ含ル亞兒加利鹽ヲ以テ其酸性ヲ吸收スル故ニ水銀自放解メ蒸升スルナリ○天造ノ朱砂モ亦前法ノ如ク升煨メ水銀ヲ得ルヲ銀朱ト同シ然レ天造ノ品ハ山坑中ニ在テ多ク硫黃礬石等ノ礦質ヲ含ム故ニ是ヲ升煨スレバ礦質ノ渣塊多ク列篤兒多ノ底ニ殘ルナリ○或鉛ヨリ水銀ヲ取ル法アリ左ニ記ス
鉛煉汞法 鉛屑一匕 硃砂四馬 赤瓦末三匕

右攪和之列篤兒多ニ内レ潤大ナル硝子ノ承餾壘
 ニ水半充テ接合シ漸ク火ヲ増シ升煨スルコト六時
 終ニ武火トシ火モ蒸升スル者ナキニ至テ承餾壘
 ヲ放開スレバ水銀其底ニ沈結ス
 又法 生石灰 剝篤亞斯 各一斗 水灰 四斗
燒テ灰ト爲ス者是レ 硯材ト爲ス石ノ總稱
 右生石灰 剝篤亞斯 木灰 結ケ石ヲ攪勻シ 蒸餾醋ヲ
 適宜ニ加テ灰汁ト作シ鉛屑ヲ投メ溶化シ灰汁白
 色トナルニ至テ又蓬砂ヲ加テ溶化セシメ是ヲ列

篤兒多ニ内レ蒸餾スレバ水銀四斗許 承餾壘ニ出ツ
 汞質夾雜鑿法 水銀ハ多ク硫黃鉛錫等夾雜シ又能
 諸金類ト合和スル故ニ姦商動モスレバ鉛錫等ヲ
 雜ヘテ販賣ス○水銀ヲ盤ト寫疾逆流セス或
 其底ニ粘著シ或蕩搖攪滾スレバ分裂スレバ圓珠
 ヲ爲サズ長ク尾ヲ曳テ小蟲狀ヲ爲シ或青色藤花
 色ヲ帶心或銅器寫セバ膜ヲ被フカ如ク或上面
 曇リテ鉛ノ如ク或底圍ニ渣濁殘リ或指ニテ摩ス
 七々細珠粘著シ或革ニ包ニ絞リ瀝セバ渣脚アル
 者ハ皆硫黃鉛錫塵土等ノ汚物アルナリ汚物甚ダ

多キ者ハ革ニ包ニ絞ルト雖モ透過シ難シ或云
 水銀ハ諸金ヲ含メリ是ヲ銀匙ニ内レ武火ニ上テ
 其烟綠色若ハ黄色ナルハ黄金ヲ含メリ其烟青色
 ナルハ銀ヲ含ニ紫色若クハ赤色ナルハ銅ヲ含ニ
 白色ナルハ錫ヲ含ニ暗白色ナルハ鉛ヲ含ニ濃黄
 色ナルハ鐵ヲ含メル候トス

精製法 水銀ハ諸金類及ビ硫黄礬石等ノ礦質ヲ

含ム故ニ藥用トスルニハ内服外敷ヲ論セズ必ズ
 精製スベシ否ラザレバ水銀精微ニ碎分セズ粘結
 凝聚ノ諸器ニ壅滯シ大害ヲ致スナリ○初テ山坑

ニ採テ多ク土質等ノ汚物雜ル者ハ是ヲ鐵ノ格兒
 弗ニ内レ爐ニ上セ承餾壘ニ水ヲ盛テ接合シ武火
 ニテ蒸餾スレバ水銀升化ノ其壘ノ水中ニ溜滴シ
 淨潔トナルナリ○土質多ク雜ラザル者ハ革ニ包
 ニ絞リ漉スベシ○或醃醋ニ海鹽ヲ溶シ是ヲ以テ
 數水銀ヲ淘洗シ汚物ヲ脱除シ其醋少モ濁ラザル
 ニ至テ取リ乾シ革ニテ絞リ漉ス○或水銀ヲ石臼
 ニ内レ海鹽ヲ加ヘ木杵ニテ攪セ搗クノ半時許ニ
 ノ革ニ包ニ絞リ漉ス○或剝ハット篤亞斯若ハ生石灰ヲ
 水ニ溶メ灰汁ト爲シ是ヲ以テ水銀ヲ淘洗ス○右

ノ諸法ヲ用テ水銀ニ含メル粘脂塵土等ハ盡ク除
クト雖モ其質ニ含孕セル鉛錫等ノ礦類ハ水銀ト
共ニ革ヲ透過スル故ニ極テ純粹トナルニ至ラズ
然レ水銀ニ生石灰或鐵屎ヲ加ヘ列篤兒多或格ヲ
以テ蒸餾スレバ其夾雜セル礦質盡ク脱又極テ純
粹トナルナリ即チ後法ノ如シ
水銀 鐵屎 細末各等分或云淨潔ノ鋼粉或ハ
生石灰ヲ以テ鐵屎ニ代ルモ良
右研和シ硝子若ハ鐵ノ列篤兒多ニ内承餾壘ニ水
半盛テ接合ノ固封シ蒸餾スレバ純粹ノ水銀ハ承
餾壘ノ水中ニ下リ汚物ハ列篤兒多ノ底ニ留ナリ

汞質純粹鑿法 水銀精純ニノ毫モ汚物ナキ片ハ光

瑩美白ニノ銀ノ如ク逆流滾動スル下ノ水ノ如シ
是ヲ紙上ニ寫セバ疾ク運轉ノ渣滓ナク上面必モ
濁色ナシ○是ヲ硝子壘ニ内テ傾ケ寫スニ壘底必
モ膜樣ノ渣滓ナシ○是ニ蒸餾水ヲ加テ研磨ス
ルニ其水汚汚セズ渣滓ナク水銀必モ濕濡ナシ○
是ニ醃醋ヲ加テ研磨或醋ニ浸スニ必モ甘味
ヲ生セズ若シ甘味ヲ生スルハ鉛ヲ含メル徵トス
○水銀ヲ格兒弗ニ内レ蒸餾スルニ盡ク升化又承
餾壘ニ下リ格兒弗ノ底ニ殘止者ナシ○水銀ヲ銀

匙或鐵匙ニ内レ文火ニ上セテ爆聲ナク盡ク蒸升
 飛散ノ火モ殘ル者ナキ最モ純粹トス但風氣開
 達ノ處ニテ是ヲ試シ其烟氣ヲ吸引スルコ勿レ
 尋常貨賣ノ水銀ハ右ノ試法ヲ歷テ一二純粹ノ微
 アル者モ仍諸金質ヲ含ム者多キ故ニ醫藥ニ供ス
 ルニハ前法ノ如ク蒸餾ノ用ルヲ尤確實トス

遠西醫方名物考卷三十二終

是或鐵起... 內... 火... 人... 上... 去... 煇... 磨... 才... 夕... 出... 出... 升
 飛... 散... 之... 火... 三... 環... 止... 者... 乃... 中... 為... 最... 正... 純... 粹... 者... 大... 但... 風... 氣... 則
 遠... 入... 屢... 二... 牙... 是... 牙... 試... 王... 其... 烟... 氣... 又... 吸... 引... 不... 止... 勿... 勿... 勿...
 尋... 常... 貨... 貴... 之... 水... 銀... 之... 者... 試... 法... 其... 歷... 之... 也... 二... 純... 粹... 之... 銀
 乃... 此... 者... 也... 乃... 諸... 會... 其... 乃... 合... 之... 者... 多... 也... 故... 二... 醫... 藥... 之... 供... 入
 此... 之... 八... 前... 法... 之... 如... 之... 禁... 錫... 之... 也... 尤... 確... 實... 上... 也...

遠西醫方名物考卷三十二終

遠西醫方名物考源目

卷三十三

水銀

汞質

水化

重量

寒熱

暗室

汞毒

性功

汞性

流動

噴射

揮發

溶解

禁食

性功

遠西醫方

遠西醫方名物考標目

卷三十三 毒藥膏試

水銀

目

汞質

汞性走竄揮發

溶化諸金

流動原由

重量

喻引力

寒熱過甚

極寒凝固

暗室現光

溶解消化

汞毒

禁戒

性功原由

性功括套

内藏壅塞腺腫 刺血法

水腫 拔爾撒謨驅水丸

皮膚病 殺蟲膏

大便閉塞 狂犬咬傷

吐涎法 内服劑吐涎法

外敷吐涎法 内外兼施吐涎法

薰烟吐涎法 吐涎調護法

水腫吐涎法試効 吐涎患害

卷三十 徽毒擦膏治法

遠西醫方名物考卷三十三

遠西醫方名物考卷三十三

榛齋先生譯述 男 宇田川 榕 榕菴校補

水銀

汞質 水銀 諸金ニ屬ス小雖モ全金類ニ非ズ半

金ニ屬ス是一種ノ流動體ニ鑄鎔錫錘琢スベカラ

ザレハ母リ○水銀ハ香臭及味ナク其質純粹大

ル一種ノ元素ナリ但古説ニ是ヲ剖解スレバ舉

石質土硝子性土硫黄ヲ以テ體質ヲ成ス者トス○

礬石質土羅甸名テラテアルナア其量甚々重シ水

銀重キハ此土アレバナリ。是製煉術量云剖析ニ微
 スル所ナリ或云水銀ノ質ニ子イムト云ル或先
 哲ノ説ニ云水銀ハ礬石氣ヲ帶ルメニナラズ是
 種ノ流動セル礬石ナリ○悍ツヨキ木灰汁ヲ以テ水銀
 ヲ煮テ其上清ヲ取リ是ニ蒸餾醋ヲ滴ニ加レバ硫
 黄分レテ其底ニ沈ム。是水銀ニ硫黄ヲ雜スル微ナ
 小此硫黄ハ水銀ノ光彩ト流動體トヲ成ス者ナリ。
 其故ハ久ク水銀ヲ研磨シ或燒煨スレバ其硫黄質
 消散ノ汞灰トナリ水銀ノ光彩ト流動體ヲ失フ然
 ニ是ニ硫黄質ノ物ヲ加レバ復光彩ヲ生メ流動體

トナルヲ故ノ如シ。即汞灰ニ木炭是硫黄ノ末ヲ加
 テ燒煨スレバ忽チ流動ノ光彩ヲ生スルガ如シ○
 大ナル火燧鏡ヲ以テ水銀ヲ燒ケバ烟トナリテ盡
 ク消散スヒトリメガキ或水銀ヲ長頸ノ陶壺ニ内蓋フタナクメ慢火
 ニ上セ燒煨スレバ初灰色トナリ漸々黄色トナリ終
 ニ赤色ノ汞灰トナル是水銀大氣ノ酸素ヲ引テ酸
 化シ其光彩ヲ失フ者ナリ。此汞灰ヲ木炭上ニ置キ
 火燧鏡ニテ燒ケバ焔解メ流動セル水銀トナリ其
 光彩復生ス木炭ノ炭素ハ酸素ト合メ炭酸トナ或
 其汞灰ヲ瓦磚上ニ置キ右ノ如ク燒煨スレバ亦焔

解ノ硝子トナル然レ光彩ナク唯烟ヲ生ノ速ニ升
 散シ終ニ赭色ノ未少許残り或赭色ノ硝子トナル
 凡金屬酸化過度ニ至レハ光彩ヲ失ヒ硝子トナル
 ○右ノ説ニ因テ觀レバ水銀ハ硝子性土ヲ基趾ト
 シ硫黃氣ヲ含テ銀様ノ光彩ヲ生スルニ非ルヲ知
 ベシ○水銀ハ些少ノ水氣ヲ含リ是ヲ火上ニ溫レ
 バ水氣消散ス然レ冷レバ復氣中ノ水氣ヲ吸收ス
 汞性走竄揮發水銀ハ流動スルヲ水ノ如クナレレ
 其性甚ダ揮散ノ無量數ニ分析ス。是ヲ火上ニ置バ
 速ニ烟氣トナリ微細ニ分析ノ升散ス然レ毫モ其

體ヲ變スルヲナシ即チ革ニ水ヲ濕ノ其烟氣ヲ覆
 へバ水銀悉ク是ニ著テ微細ノ珠ヲ爲シ或水銀ヲ
 蒸餾スレバ精微ノ蒸氣トナリ升騰スレレ承餾壘
 ニ下レバ復故ノ水銀トナルガ如シ○升汞降汞溶
 汞等ノ水銀劑モ水銀微細ニ分析ノ溶化シ或乾固
 ノ鹽體トナレレ顯微鏡ニテ是ヲ見レバ其體變セ
 ス光輝アリテ迸流スベキ細珠間錯ス升汞甘汞等
 ノ細珠ヲ指頭ニテ磨スレバ漸ク相聚テ大珠ヲ成
 シ眼鏡ヲ假ラスノ分明ナリ故ニ水銀ハ一種ノ奇
 異ナル質ニシテ三富ノ萬類。是ニ比スベキ者ナシ○

遠西名物考 卷三十三 風雲堂藏

或云水銀一滴胡荽子大ナルヲ取テ磨碎シ顯微鏡ニテ算スレバ其碎粒二千七百万アリ

溶化諸金 水銀ノ體質極テ微細ニ揮發竄透スル

故ニ純粹ノ水銀ヲ以テ金銀鉛錫銅鋅等ニ加レバ

其體質ニ竄透シ密ニ混和シ溶解シ泥トナリ磨碎

スベキニ至ル殊ニヨク黄金ヲ軟化ス銀是ニ次グ

鉛錫又是ニ次グ銅鋅及ビ安質没扭ハ速ニ軟化シ

難シ鐵ニハ絶テ合和セズ○或云諸金ノ火力ヲ以

テ溶化スルハ皆其質ニ多少ノ水銀ヲ含ニ因ル故

ニ水銀ハ諸金ノ基趾タリ又云金銀ノ質ハ水銀ト

硫黄ヲ以テ成ル或云金銀ノナラズ諸金類モ亦

然リ○水銀劑ヲ内服シ口ニ黄金ヲ含メハ體中ノ

水銀是ニ著テ銀色トナリ水銀劑ヲ服シ吐涎スル

人黄金ノ器ヲ帶レ其蒸氣ニテ黄金軟ニメ白色

トナル是皆水銀ノ性微細ニ分裂又走漏竄行スル

ニ因リ一ニハ些少ノ煖氣ニテ升化飛散スルニ因

リ一ニハ水銀ト黄金ト相吸引スルニ因ル

流動原由 水銀ハ至微至細ノ圓體ナリ因テ相抵

觸メ滑脱シ固著スルヲ能ハズノ轉動因ルナリ

水銀ハ微細ニ割折スルヲ究極ナク故ニ是ニ觸テ

遠西名物考 卷三十三 廣雲堂藏

逆流碎分シ又些少ノ火氣ニテ速ニ揮散蒸升ス他
 ノ諸金類ヲ成ス體質ハ其形種々異ニ圓體ナラズ
 故ニ凝聚スレバ相附著スル固密堅牢ニ又火力
 ヲ用ルニ非レバ焔化セザルナリ
 重量 水銀ハ黄金ニ次テ重シ。水銀ヲ器ニ盛リ是レ
 黄金ヲ投スレバ沈ミ他ノ諸金類ヲ投スレバ浮ム
 ヲ以テ知ルベシ。○黄金四十錢ヲ容ル器ニ水銀ヲ
 充テ衡レバ三十錢ニ足ラズ。○水銀ハ水ヨリ重キ
 十三倍。○冬ハ其量重シ夏月十一乃至七ハ水銀
 冬至夏十乃至三十二ハアリ。○諸金類ニ水銀

噲引力 水銀ヲ平滑ナル盤上ニ瀉セバ逆動走散ス
 卜雖モ微窪キ處アレバ忽チ相聚リ或其區分セル
 細珠相近ケバ速ニ合和ノ一體トナル。是ヲ噲引力
 ト曰フ。一切流動物。水漿類亦此噲引力アレバ水銀
 殊ニ甚シ。○金石類一切堅實ナル者ノ重キ所以ハ
 其形體ヲ造成セル物質ノ噲引力多キニ因ル。又此
 勢力ノ多少ニ隨テ物體ノ肌理ニ疎密ヲ爲スナリ
 凡萬物中。肌理ノ極テ固密ニメ氣眼ナキニ至ル者
 ナシ。黄金ハ肌理最密ニメ其量最重シト雖モ氣眼
 アル故ニ水銀ヨク透漏ス。○水銀ハ噲引力多クメ

重量ナレバ其體微細ニ分析ノ轉動奔流スル故ニ

凝固ノ堅剛ノ體ヲ成スヲ能ハザルナリ

寒熱過甚 諸流動物中ニ於テ水銀最モ寒冷ナリハ

燒酒ヨリ冷水 然レバ火ニ上テ熱勢最モ烈ク且速ニ

銀ハ水ヨリ冷 熱ス。但火ニ上テ煮沸ノ度下爲セバ烟氣トナリテ

速ニ飛散ス 金ニ勝一山望實

極寒凝固 極寒ノ地ニ於テハ水銀凝固シ柔撓ノ打

展スベク又線ト爲スベシ 伯多球勃爾孤 魯西亞ノ

地五十九度五 於テ一千七百五十九年 本朝寶ノ

十六分ノ地 嚴寒ニ水銀右ノ如ク凝固ス。爾後此理ヲ推究シ雪

ヲ取テ發烟消石精ニ加ヘ水銀ヲ硝子管ニ充テ是

ヲ浸セバ水銀凝固ノ鉛ノ如ク打展スベク又線ト

爲シ堪タリ。流動ノ水銀ニ比スレバ其量重シ是

以テ觀レバ水銀ノ流動スルハ大陽ノ暖氣ヲ假

者ナリ

暗室現光 水銀ノ精製純粹ニモ毫モ水氣類キ者

取テ乾ケル驗氣器ニ於テ倒置シテ暗室内ニ懸

振掉スレバ水銀升降ノ光輝閃發スルヲ越列幾的

爾ノ如シ但管中ノ水銀降ル片其光殊多シ此理

ヲ考究スルニ是水銀ノ所爲ニ非ズ唯其振掉ノ水

銀ノ升降スルニ隨ヒ管中無氣ノ處一種ハ激迫カ
 生ノ光ヲ現スルナリ水銀ニ非ト雖無氣激迫スレ
 バ光ヲ現スルヲ猶越列幾的爾ノ如シイテ
 溶解消化凡酸性ノ諸液ハ水銀ヲ溶化ス即消石精。
 海鹽精。綠礬精。醋其他草木類ヨリ製スル酸味液
 ハ皆ヨク水銀ト混和ノ溶化スルガ如シ消石精ハ
 比スレバ水銀消石精ニ
 溶化シ難シ。○消石。綠礬及ビ亞兒加利鹽ハ水銀
 ト合和セズ。○硫黃ハ殊ニヨク水銀ト合和ス又硫
 黃氣アル諸品及海鹽ハ稍水銀ヲ凝固ノ消化ス
 永毒坑戸ハ天稟壯實ナル人ト雖ト四年無病人者

力シ。水銀毒ハ殊ニ神經ヲ侵襲シ頭面手足ノ諸筋
 顫振掣引シ痒ヲ發メ慘酷ノ死ヲ致ス。故ニ二週毎
 ニ其人ヲ更代セシムベシ。○或云坑戸ハ水銀ト硫
 黃ノ毒氣ヲ被リ病ヲ發ス。此猶酒客ハ酒ノ炭酸氣
 神經ニ侵襲メ痒ヲ發スルガ如シ。或云鍍金匠。鏡匠
 等常ニ水銀ニ觸ル人ハ多ク痒ヲ患フ。○或云水銀
 ヲ内服スレバ直ニ大便ニ通シ其量少シモ減セズ故
 ニ大害ナシ。坑戸ハ水銀ヲ吞テ腹ニ竊ニ大便ニ通
 スレバ是ヲ淘汰シ取ク者多シト。然レ水銀ハ實ニ
 神經ノ仇敵トス即坑戸ハ必ズ神經ヲ傷損メ病ヲ

發スルガ如シ○水銀ヲ服スレバ諸脉神經ヲ刺戟
 ノ一種ノ熱ヲ發シ血液ヲ焔解稀釋ノ壞液トナリ
 諸竅ニ漏泄ス殊ニ唾管ニ滿溢ノ吐涎シ斷頸腫痛
 腐爛シ宛モ失苟兒陪苦ノ如キ腐敗ノ諸症ヲ發ス
 ○水銀ハ内服外敷ヲ論セズ誤用スレバ神經ヲ毀
 損シ諸筋攣縮掣引ノ肢節顛振拘強麻痺ノ痲ヲ發
 シ或血液ヲ溶解崩壞ノ漏汗及危篤ノ下利等驚異
 スベキ惡症ヲ發シ或其餘ノ良血液モ崩壞ノ諸液
 ニ驅逐セラレテ細絡ニ歷行シ漸ク壅滯ノ驅除シ
 難ク終ニ諸管ノ充張力衰弊ノ復健輸セズ頑固不

治ノ病ヲ發スルニ至ル
禁戒凡血液ノ稀涼酷厲ナル者或壞液及腐敗病ア
 此者ニ水銀劑ヲ用レバ血液逾焔解崩壞ノ死ス○
 凡血液虚損ノ補充スベキ症或失血脱液ノ病アリ
 テ虚憊シ體稟脆弱ニメ感動甚キ者或神經病失苟
 兒陪苦癌瘡等ノ血液焔解崩壞ノ諸症ヲ兼ル者ハ
 皆水銀劑ヲ用テ害アリ老人孕婦及咳嗽アル者ハ
 戒懼ヲ是ヲ用レシ○微毒ノ患者右ノ諸症アル片
 ハ先ヅ對症ノ藥劑ヲ投メ是ヲ治シ水銀劑ノ害ナ
 キヲ察メ用ルテ肝要ナリ○水銀劑ハ殊ニ失苟兒

陪苦^{ホイ}大害アリ服量少許ト雖モ大ニ吐涎^シ劇症
 ヲ發スル^レト恰モ猛烈ナル毒ノ如シ或云一患者微
 毒ニ因テ水銀劑ヲ用フ。失苟兒陪苦^シノ一患者是ニ
 同居シ伏枕スル^レト數日ニ大ニ吐涎^シ頭面腫起
 口中腐爛ノ終ニ寒壞疽トナリ死ス。是水銀ノ蒸氣
 一室ニ薰^ルノ失苟兒陪苦^シノ患者ニ侵襲スルナリ○
 或云一徭卒微毒ニ失苟兒陪苦^シヲ兼ヌ。因テ一夜規
 吉撒爾弗^キ出^ルト擦ル^レト僅ニ一錢許。翌朝吐涎^シ連
 綿歇マザル^レト十日餘。斷頸唇舌大ニ腫起^シ腐穢ノ
 血ニ斷肉ヲ雜テ吐キ臭氣堪難ク齒牙殆ト脱落セ

トス小便粘稠ニ臭氣甚ダシ數、昏眩シ危殆ニ
 又纒^マニ死ヲ免ル^レト頑固ノ堅硬腫ニ水銀劑ヲ施セ
 バ變^ルノ瘡瘡トナリ或瘡瘡ニ水銀劑ヲ施メ速ニ潰
 爛シ諸症増劇セル者アリ本藥ノ毒ハ難クイ合
 性功原由古來水銀ノ効用ヲ爲ス原由ヲ研究スレ
 氏確實切當ニ適從スベキ説ナシ或云水銀ハ
 血液ノニナラズ凝體モ亦焔解メ壅結潛滯セル病
 毒ヲ分利變化シ涎唾ト爲テ排泄スル^レト恰モ製煉
 術ニテ諸物ヲ焔解變化シ其液ヲ分泌シ出スカ如
 シト譬ハ消石ニ酸液ナシト雖モ製煉術ニテ其質
 ヲ焔解メ變化シ酷烈ナル酸精ヲ出スカ如シ

然_レ是唯吐涎_ニ因_テ微毒ヲ治スル効カヲ推索ス
ル_ノ未_キ水銀ノ全能ヲ最知スル_ニ足_ラズ。其故ハ
水銀劑ヲ用_テ必_ズモ吐涎セザレ_レ其効カヨク凝流
二體_ニ普達シ微毒ヲ消化_メ治スレバナリ。或云。
微毒ハ一種ノ酸性毒_ニ酒石様ノ粘稠液ナリ此
毒血液ヲ沸釀_メ侵蝕腐壞シ諸惡症ヲ發ス。水銀ノ
性ヨク酸收_ト合和ス。故_ニ水銀_ト微毒ノ酸收_ト合
和スル_ト恰モ水銀ヲ消石精_ニ加_レハ忽_チ相和_メ
溶解スル_カ如シ。是_ニ由_テ水銀_ト微毒ノ酸收_ト合
和スレバ即_チ升汞様ノ毒_トナリ體中ノ溫煖_ト血液

循環ノ勢_ニ因_テ速_ニ頭腦_ニ升騰スル_ト恰モ水銀
ノ消石精_ニ消化セル白末ヲ硝子壘_ニ内_テ升煖シ
升汞_ト作_スカ如シ。故_ニ水銀劑ヲ過用スレバ患者
頭面腫起シ其升汞様ノ酷厲液頭腦ヨリ唾管_ニ下_リ
テ吐涎_シ斷頸ヲ侵蝕_メ焮痛スル_ト恰モ升汞ヲ肌
膚_ニ貼スル_カ如シ_ト然_レ水銀劑ヲ施セバ微毒ノ
有無_ニ因_ラズ吐涎スル_故ニ此說モ亦妥當ナラズ
○或云水銀_ト亞兒加利性ナル_ヲ以_テ微毒ノ酸收
ヲ制_メ治ス_ト然_レ微毒ハ亞兒加利性_トス其故
ハ微毒ノ吐涎_ニ莖菜舍利別_ヲ加_レバ綠色_トナリ

酸味ノ品ヲ加レバ沸騰シ銅ニ塗レバ腐蝕スル
 亞兒加利鹽ノ如シ此皆亞兒加利性ノ微ナリ又水
 銀ノ亞兒加利性ノ効力ナシ水銀ニ酸性若ハ亞兒
 加利性ノ藥品ヲ加テ製劑トシ用ヒ或添加ノ品ナ
 久一味用レバ皆微毒ニ効驗ヲ奏ス然ハ水銀ハ酸
 性或亞兒加利性ナルニ由テ効驗ヲ致スニ非ル
 明白ナリ○水銀ニ首稱スベキ兩個ノ主能アリ即
 無究微細ニ分析スルト究竟圓體ヲ爲ストナリ是
 ヲ以テ此物ヨク凝流ニ體ニ滑利竄行ヲ鬆解疏釋
 スルヲ猶金銀鉛錫ニ水銀ヲ加レバ其氣眼ニ滲漏

メ溶化シ泥トナルカ如シ故ニ水銀劑ヲ用レバ
 ニハ竄透侵刺ノ諸脉管ノ運動ヲ増發セシメ一
 ハ微毒等ノ敗液汚血ノ脉管口ニ粘結凝滯スルヲ
 溶解疏釋ス是ヲ以テ動脈健輸入精力ト血液充灌
 活運ト云由テ是ヲ推盪轉移シ細管ニ分排メ水
 銀ト共ニ諸竅ニ攘除ス但其膠粘稠厚ノ液ハ多ク
 腸腺ト唾腺トノ輸泄管ニ出ツ此兩管ハ尤粗大ナ
 大便ト涎唾ニ出ルヲ云唾腺ハ觸知殊ニ銳敏ニメ其
 流溢セル酷厲液ノ刺戟ニ堪ヘズ自牽縮メ其液ヲ
 搾出ス腎ト皮ノ輸泄管ハ甚微細ニメ稀薄ノ液ノ

排出スルナリ。即、**性功括套**水銀劑ヲ用、**水銀劑**ハ脉管ヲ刺戟ノ其運動ヲ増進シ粘稠凝固ノ諸液ヲ溶解稀釋ノ諸竅ニ分排ス故ニ涎唾ヲ湧起シ汗ヲ發シ大小便ヲ利ス。一切動物植物ノ發生長育ノ機ヲ壞滅ス。故ニ諸蟲ヲ殺シ微毒瘡疥類ノ根莖ヲ剷絶スル効アリ。又微毒ノ三ナラス審ニ病性ヲ察メ活用スレバ頑固險重ノ諸病ニ大効アリ。即、膠粘凝固ノ惡液ヲ稀釋シ内藏諸器ノ壅塞ヲ開達シ腺及水脉ニ關ル諸病頑固ノ水腫肝脾腸間膜等ノ塊腫經久ノ流走痛或關節

痛ノ患者粘液質ニ傷冷毒様ノ焮衝ヲ兼ル症或肝焮衝或惡厲ノ瘡疥類頑癬等經久ノ皮膚病。虻蟲犬咬傷眼疾等ノ諸病ニ殊効アル。他藥ノ比スベキ者ナシ。左ニ略其病患ヲ舉ク。

内藏壅塞腺腫 水銀劑ハ諸腺ノ細管ヲ疏通シ膠粘

液ヲ溶解シ殊ニ遠未諸部ノ細管水脉ニ普達ノ粘稠ノ水液ヲ稀釋ス故ニ肝脾腸間膜等ノ諸腺壅塞ノ硬結塊腫シ或頸項等ノ腺壅塞ノ瘰癧腫トナルヲ治スルニ良藥トス。

水腫 水銀劑ハ峻効アル解凝藥トス。凝體纖維ヲ刺

戟衝動ノ壅滯ヲ疏開シ粘液ヲ稀釋シ大小便ヲ利
 ス。故ニ水腫ニ用テ恰モ利水ノ峻藥ノ如シ或、海葱
 等ノ驅水藥ヲ加テ殊ニ捷効アリ○水腫ニ後方治
 驗多斗ヨク小便ヲ利シ兼テ大便ヲ通ス

按爾撒謨驅水丸

精製者 三錢 按爾撒謨的列底那 適宜

右研和ノ星ナキニ至リ漿粉ヲ適宜ニ加ヘ三仏ヲ
 六丸トシ夜分二丸ヨリ七丸マデ與ヘ翌朝大黃末
 ヲ用フ或、金雀花根杜松實白芥子ノ水煎若クハ浸
 劑ヲ兼用ノ殊ニ良

皮膚病 水銀劑ハ肺管ヲ刺戟ノ其運動ヲ增進シ皮

表ノ細管ニ膠粘ノ惡液壅塞セルヲ溶解メ排除シ
 血液ノ酷厲毒ヲ消化スル殊能アリ。故ニ黴毒ノ瘡
 瘍ノミナラズ頑固惡厲ノ瘡疥乾癬或、濕癬ノ膿潰
 糜爛ノ浸淫スル症或、惡性ノ頭瘡經久ノ潰瘍等内
 服外敷ノ良効アリ○然レ右ノ諸病ハ酷厲ニ粘
 稠ナル物^ズ乙^イ諸部ニ鬱聚壅滯メ浸淫増展スル故ニ
 預メ刺絡ヲ施シ或、下劑ヲ用ヒ或、解疑稀釋ノ清血
 劑ヲ用テ血液ヲ稀渙シ脉管ヲ緩弛シ惡液ヲ導泄
 ノ後水銀劑ヲ施スベシ否ラザレバ其毒内部ニ滿

溢ノ細絡支末ヨリ大管心藏ニ返流シ病毒内攻ノ
 惡症ヲ發スルコトアリ故ニ水銀劑ヲ用ル間モ時々
 下劑ヲ與ヘテ其鬱毒ヲ驅除シ且患人ヲノ煖室ニ
 保護シ表發ノ蒸氣ヲ抑遏スルコト無ラシム
 殺蟲水銀劑ハ殺蟲ノ殊効アリ往昔牧人畜類ノ蟲
 ヲ殺スニ始テ水銀ヲ外敷シ又内服セシメテ大効
 ヲ得タリ爾後水銀膏ヲ塗テ人ノ虱ヲ除ク蚤ハ効ナシ
 ○小兒ノ蟲症ニ水銀二匁ヨリ一錢マデ内服セシ
 メテ良驗ヲ稱ス或水銀ニ沙糖ヲ加ヘ硝子臼ニテ
 研和ノ星ナキニ至リ一月ヨリ一錢マデ用テ虻蟲

ヲ驅除ス但甘扁挑油一二滴ヲ加テ研磨スレバ水
 銀復星ヲ見ハスコトナシ○或云水銀一匁半ヲ水三匁
 ニ投シ磁罐ヲ以テ煎煮シ或水銀一匁ヲ水六匁ニ
 投シ煮ルコト半時許其水ヲ日常ノ飲料トシ虻蟲ヲ
 殺スニ大効ヲ稱ス或水銀一匁ヲ水十五匁ニ加ヘ
 煮ル四分時其水ヲ硝子壺ニ貯ヘ小兒ハ一匙大人
 ハ二三匙宛用テ日兩三次或水銀ヲ乳汁ニ煮ル前
 法ノ如クシ沙糖ヲ加朝午夜ニ一小碗宛温服セシ
 メテ殺蟲ノ良驗ヲ稱ス○然レ純粹ノ水銀ハ水ニ
 テ熟煮シ若ハ浸漬スレバ秤量毫モ減セズ其質少

水ニ融和セズ。氣味ナクノ白湯ニ異ナラズ。故ニ
 其性能少モ出ナシ。若シ其水ニ氣味染色アル者
 ハ水銀純粹ナラズノ其粘著セル鉛錫等ノ酸收質
 ノ溶解シ出ルナリ。故ニ其水古來殺蟲ノ効ヲ稱ス
 レ凡功用ナシ又微毒諸症ニ試用ルニ寸効ナシ
大便閉 或云純粹ノ水銀ヲ内服スレバ其重量ト刺
 撃ノ性ニ由テ腸ヲ衝開シ直ニ大便ニ通利ノ其量
 少モ減セズ。故ニ二三比ヲ頻服スレバ害ナシ。凡結
 腸ニ激衝ナク大便閉ヲ患ル者。是ヲ服スレバ直ニ
 腸ニ下テ滯尿ヲ導泄ス。或云疝痛ニ頑固ノ大便閉

ヲ兼ル症ハ水銀六弓若ハ一比マデ服メ速効アリ
 或云吐糞病ノ如キ腸室塞メ大便緊閉スル病ハ水
 銀半比若ハ一比ヲ頻服スレバ其重量ヲ以テ腸ノ
 穢積ヲ擠開シ服量減セズ盡ク通利ノ病治スト。然
 凡右ノ諸説皆信用シ難シ若シ水銀腸中ニ停止メ
 大激衝ヲ發スレバ壞疽トナリテ死ス。或云腸ノ攣
 急甚フノ緊縮セル症ニ是ヲ用テ腸激腫ヲ發シ壞
 疽トナリテ死スル者アリ
狂犬咬傷 水銀劑ハ犬咬傷及諸獸咬傷ノ解毒藥ニ
 ノ奇効アルヲ明哲多ク試験セル所ナリ其毒劇盛

本草綱目卷之三十三
 風雲堂藏

ニノ搐掣或發狂スト雖モ是ヲ内服外敷スル片ハ
 創口及血中ニ襲入スル毒モ共ニ排除シ治後再發
 スルナシ其法水ニ海鹽ヲ加ヘ創口ヲ摩擦ノ洗
 滌シ創處及其邊圍ニ規吉撒爾弗ヲ擦ル下毎日一
 錢且技實栗膏ニ赤降汞ヲ加ヘ貼メ縛帶ヲ施シ大
 ニ膿潰セシムル下半年許ニノ長ク其毒ヲ排泄シ
 又水銀劑ヲ内服ノ其鬱蓄セル毒ヲ驅除スベシ○
 患者飲液ヲ服シ難ク痙搐狂躁ヲ兼ル片ハ越謨規
 吉ニ麝香龍腦阿魏若ハ阿芙蓉ヲ加丸藥トシ用レ
 シ斯ノ如キ鎮痙藥ヲ加用レハ其神經ヲ襲撃スル

劇症ヲ鎮定シ奇効アル解毒藥トス○或ハ規吉撒
 爾弗ヲ擦テ吐涎スル下三四週ニ至ルモ極テ驗ア
 リ擦法後其創ハ一月許モ膿潰セシムベシ○蝮蛇
 咬ニ越謨規吉ヲ用テ奇効ヲ稱ス或云越謨規吉ヲ
 健質亞那ノ越幾斯劑ニ研和シ内服セシメテ此危
 症ヲ救活セル經驗甚ク多シ或攝爾扁答阿利襪油
 扁桃油揮發鹽類沙糖等ヲ用テ皆危篤ノ諸症ヲ挽
 回スル說多シ
 吐涎法吐涎法ハ微毒及幾多ノ病ニ捷効ヲ稱ス其
 法水銀劑ヲ内服シ或外敷シ或朱砂ヲ薰スルナリ

是ニ由テ水銀血中ニ滲入シ大ニ刺戟ノ汞熱ヲ發シ血液溶解ノ壞液様ノ涎唾湧出ス○此法ヲ施ス
 片ハ預メ土茯苓薩撒弗刺斯朴窟福烏篤等ノ煎湯
 及下劑ヲ數日用ヒ多血家ハ刺絡ヲ施シ且數温湯
 ニ浴スベシ是ニ由テ脉管ノ強硬ヲ緩弛シ血液ノ
 粘稠ヲ疏釋ス又飲食ヲ節慎スルヲ緊要タリ
 内服劑吐涎法 内服劑ハ甘汞尤切實ニノ害ナシ丸
 藥散劑煉膏等ニ和シ患者ノ強弱ニ隨ヒ甘汞ノ量
 五匁ヨリ十匁マデ日兩三次用ベシ是ニ由テ斷頸
 焮痛齒牙浮搖氣息臭氣アリテ吐涎スル片ハ此劑

ヲ休テ大麥煎等ヲ與ヘ患者ノ強弱ニ隨ヒ吐涎ノ
 量一晝夜ニ二比若ハ三四比ニノ三四週ヨリ五六
 週許連綿シ各部疼痛腫起潰瘍等ノ顯著ノ症治ス
 ルニ至ルベシ若シ吐涎歇之或ハ少クノ諸症減セザ
 ル片ハ復前法ノ如ク甘汞ヲ服シ或ハ毎夜更ニ一匁
 宛用ヒ是ニ由テ仍吐涎必キ者ハ黃降汞後ニ二匁
 若ハ三匁ヲ加ベシヨク吐涎ス毒深キ者ハ吐涎速
 ニ歇ムヲアリ總テ長ク吐涎スルニ非レバ一旦治
 スト雖モ再發シ患症更ニ險惡ナリ○此法ハ外敷
 及薰烟法ニ比スレバ惡症ヲ發セズ且吐涎ノ多少

諸症ノ輕重ニ隨ヒ服量ヲ加減スルヲ得。又吐涎
モ緩慢ナル故ニ虛人ハ此法ヲ良トス

外敷吐涎法 此法ハ吐涎スルヲ速ナリ是ハ腓、踝、跗。

ヲ熅ニ温メ規吉撒爾弗一ヲ取テ毎日一頓ニ擦

リ或分テ兩三次ニ擦リ布片ヲ温テ纏縛スベシ。若

兩三日ヲ經テ吐涎ナキ片ハ撒爾弗ノ量ヲ増シ肘

ト耳腺在耳下ヲ温メ擦リ適宜ニ吐涎スル片ハ擦

法ヲ休ムベシ。但吐涎減スル片ハ夜分殊ニ多ク擦

スベシ。又法。初日ハ脛、膝、鼠蹊ニ擦リ第二日ハ臀。

肘、肩ニ擦リ第三日ハ復初日ノ如シ。初日吐涎スル

者アリ或三三日ニモ吐涎スル者アリ

内外兼施吐涎法 内服劑ニテ吐涎少キ者ハ外敷擦

法ヲ兼施ノ適宜ニ吐涎セシムベシ。擦法ニテ吐涎

少キ者ハ内服劑ヲ兼用スベシ。或擦法ヲ脊推ニ

施ス者アレハ間惡症ヲ發スル故ニ是ヲ禁スベシ

薰烟吐涎法 是ハ朱砂ヲ取テ炭火ニ投シ其烟氣ヲ

患者ニ薰メ吐涎セシムルナリ。其法後ノ朱砂ノ條ニ舉

吐涎調護法 吐涎中ハ毎日温湯或大麥乾葡萄或苗

香、甘草等ノ煎湯ニテ數合漱シ且多服スルヲ肝要

トス。又土茯苓、薩撒弗刺斯等ノ煎劑ヲ朝、午、夜ニ用

テ尤良[○]精力虚憊セ^ル者ハ壯神ノ露水。乳劑。滋養
 各傑列^乙鹿角^{膠類}乳汁等ヲ毎日用ヒ若ハ右ノ飲劑ニ
 加用ヒ或滋養良性ノ肉羹汁及^ニ雞卵等ヲ與ヘ^テ食料
 淡薄軟脆ニ^シ消化シ易キ物ヲ用^ハベシ[○]鹽藏。酸
 味。辛熱香竄粘稠ノ品。總テ硬韌^ク消化シ難ク停
 滯シ易キ物ヲ禁シ飽食冷飲ヲ戒メ起卧温煖ニ^シ
 冷氣ヲ避ケ表發ノ蒸氣ヲ扶クベシ[○]吐涎過盛ニ
 ノ咽喉斷舌大ニ腫痛シ呼吸ヲ妨ク飲食下リ難ク
 或^ニ下利腸痛等ヲ發スル者ハ數緩和ノ吉利詞^ス參兒
 ヲ施シ或^ニ下劑ヲ與^テ上湧セル涎唾ヲ導泄メ劇症

減スルニ至ルベシ[○]數日吐涎ノ諸症減セザレバ
 患者厭倦^ニ堪^ズメ全功ヲ收^ル不能^ス斯^ノ如^キ者
 ハ暫ク是ヲ休^テ患者ノ氣力復スルヲ候^ヒ再^テ施ス
 ベシ[○]微毒ニ勞瘵熱ヲ兼^テ子或^ニ血液甚ダ稀薄ニ^シ
 自汗多ク精力虚損スル者ハ吐涎法ヲ禁ズベシ水
 銀劑ハ血液ヲ溶解メ稀釋スル^ニナリ殊^ニ失^テ苟兒^陪
 苦ノ病アル人ハ縱^ト血液膠粘稠厚ナル者モ是ヲ
 施セ^テ血液崩壞メ虚脱^シ死ス^ヘ胡^ト其^ノ弊^ヲ察^スル
 吐涎法試効吐涎法ハ微瘡潰瘍下疳便毒淋疾骨疼
 骨腫腐骨疽等其他頑固險惡ノ諸症ヲ速^ニ治ス[○]

微毒ノ硬腫。久キヲ經_レハ吐涎中ニ消散ス。是
 規吉撒爾弗_ヲ擦_テ殊ニ良。若シ消散セザルハ
 是ヲ截斷シ赤降汞ヲ軟膏ニ加ヘ貼_テ排膿淨掃シ
 治スル_ト他人潰瘍ノ如シ。○諸液甚_ク膠粘凝滯セル
 頑固ノ諸病。假令ハ惡厲ノ疥癬類。經久ノ傷冷毒痛。
 水腫。胸水。粘液腫。腺腫。癰癤。或血液甚_ク酷厲ナラズ
 ノ疏解スベキ内藏硬腫。或黑障。灰白障ノ初發。或經
 久潰瘍。諸獸咬傷等ニ施_テ治驗多シ。○往古始テ微
 毒潰瘍ニ規吉撒爾弗_ヲ擦_テ齒牙浮搖口中腐爛_ノ
 大ニ吐涎ス。因テ大ニ恐怖シ以爲水銀ノ中毒ナリ

卜。然_レ凡其病回復スルニ由テ吐涎ノ捷効アル_ト又
 發明シ爾後久ク世ニ行_ル。然_レ凡吐涎ノ諸症劇盛_ニ
 ノ間死スル者アル故ニ先哲製煉術ノ智巧ヲ究_テ
 升汞。甘汞。赤白降汞等ノ水銀劑ヲ製造シ少許宛用_シ
 テ瞑眩ナク治スル_ヲ稱シ吐涎法ヲ廢セリ。然_レ凡其
 製劑ニ或猛烈ノ毒アリ_ト又危懼シ或惡症ヲ發シ
 或吐涎セザレバ根治シ難シ_トスル故ニ吐涎法復_シ
 近來マデ世ニ行_ル。○
 吐涎患害 水銀劑ヲ用_テ吐涎ス_レハ一種ノ蓄留熱
 ヲ發シ口中焮熱。齒牙浮搖。或脱落シ咽喉斷頸唇舌

腫痛潰爛。口臭甚。面部腫起。或一匙稀粥。咽
 下難。一吸。水漿。嘔噎。苦悶。或瞬息。聞
 涎沫湧溢。睡難。稍睡。膠粘。涎沫喉間。
 梗阻。氣息。妨。或。口舌拘強。言語艱澁。呼吸不利。
 促迫。或。下利赤痢。腸痛吐血。發。或。吐涎連絲。數週。
 至。患者疲瘁困倦。舉動難。或。羸瘦骨立。
 經年起。或。乾欬勞熱。發。斃。或。肢節僵硬。不
 遂。顫振。麻痺。痲。吐涎法。施。一兩次。
 諸症脫然。暫。快復。得。凡舊病宿毒再。萌
 發。險症前。倍。終。廢。者。必。不。是

吐涎法。水銀速。吐涎。隨。漏泄。故。其性
 力。遲。盡。微毒。驅除。能。唯。多。體
 中。粘液。吐泄。或。水銀。體中各部。懸留滯著。
 遍。血液。融和。其故。吐涎。初。
 於。患者。掌中。黃金。握。四分時。淡
 白色。其涎中。黃金。投。亦。然。既。
 數日。吐涎。至。其色。變。是
 水銀既。初。流涎。隨。盡。體中。脫去。或。諸
 部。凝聚。潛滯。吐涎。交。唯。粘液。之。溶解。シ
 出。バ。ナリ。或。以。爲。微毒。徑。其。粘液。混。排

本草綱目卷之三十三
 風雲堂藏

出スル故ニ吐涎饒多ニノ累日連綿スル者ハ病毒
 一掃淨盡メ諸症根治ス下然レ水銀劑ヲ用テ毫モ
 吐涎セシメズ療スルキハ微毒根治スル下殊_ニ的實
 ニノ再發セズ是日常歷試スル所ナリ然レハ吐涎法
 ハ確實妥當_ニ療法ニ非ル下知ベシ又孕婦小兒老
 年及高貴人或胸病アリ或體稟薄弱虛羸ノ者痲痺
 等ノ患者ハ絶テ此法ヲ施ス下能ハズ○從來吐涎
 セル患者ヲ診視スルニ或險重ナル骨病ヲ發シ或
 水銀筋肉中ニ滯溜メ惡症ヲ發スル者アリ或云水
 銀劑ヲ内服シ或外敷メ吐涎セル患者ノ屍ヲ數剖

觀スルニ腦蓋中或頭蓋骨ノ二襲ノ間ニ水銀多ク
 溜留シ或肺藏中水銀六寸許凝聚メ其部大ニ焮腫
 シ或冠血脉ヨリ水銀一多餘ヲ搾出シ且心藏大ニ
 焮腫セリ或關節ノ韌帶中或脛骨中ニ水銀溜留セ
 ル者アリ其人生前骨疼焮腫シ或肢節顫振觸動シ
 或拘攣不遂メ痲ヲ發シ或卒倒痲痺ヲ發セリ○或
 云水銀劑ヲ過用スレハ平人ト雖モ臭穢ノ涎ヲ吐
 下微毒ノ患者ト全同シ故ニ微毒ノ患者吐涎スト
 雖モ微毒排泄ノ候ト言難シ又諸病ニ於テ自然ニ
 多ク痰唾ヲ吐テ病毒排泄シ治スル者甚々多シ微

毒ニ於テハ自然ニ多ク涎唾ヲ吐テ其毒排泄シ治
 スル者ナシ是唾管ハ微毒ノ自然ニ排泄スル順路
 ニ非レハナリト全同ニ如シ

微毒擦膏治法

往昔以爲^{オモヘラ}少微毒ハ吐涎法ヲ施シ酷

厲滿敗ノ惡液ヲ吐泄シ治ス下然^レ吐涎ニ由テ危
 劇ノ諸症ヲ發シ或治スレ^レ再險惡ノ病ニ陥ル者
 アル故ニ晚近ニ至テ明哲ノ經驗ニ隨ヒ規^キ吉撒爾
 弗ノ擦法ヲ以テ吐涎セズメ治スル^ルヲ發明ス法
 ノ如ク是ヲ施セバ水銀吐涎ニ漏泄セズ暫ク體中
 ニ留テ遍ク血液ニ融和シ漸ク蒸氣ト大小便ニ排

泄ス故ニ患者憊勞セズ危懼スベキ惡症ヲ發セズ。

治ノ後再發ノ患ナシ胃虛弱ニメ飲食消化シ難キ

人及水銀劑ヲ内服シ難キ者ニ是ヲ的當トス○其

法先ツ下劑ヲ與ル^ル四五日ニメ胃腸ヲ淨掃シ多

血家ハ刺絡ヲ爲シ擦法ヲ施ス四五日以前ヨリ擦

法中毎日朝夕半浴湯^{半身以下温}ヲ施シ長ク湯中

ニ坐スルヲ佳トス但患者疲勞メ浴湯ニ堪ハサル片

ハ毎日一次浴シ諸症劇キ者ハ一兩日浴メ擦法ヲ

施スベシ孕婦ハ浴湯害アル者多シ○規^キ吉撒爾弗

製法ハ水銀ヲ家猪脂ニ加ヘ研磨スル^ル三日許ニ

ノヨク混和スルヲ肝要トス。否サレバ水銀血中ニ入テ復相聚テ唾腺ニ滯滞シ刺撃メ吐涎ヲ發スレハナリ。但熟研ス。ト雖モ水銀多ク其底ニ沈ム故ニ時々研和スベシ。○擦法ハ患者ノ室ヲ温煖ニシ病ノ輕重ニ隨撒爾弗一錢半ヨリ二錢ヲ取リ。初日ハ遍ク左脚ニ擦リ二日或三日ヲ間テ又遍ク右脚ニ擦リ。又以後兩三日宛間テ左腰ニ擦リ次ニ右腰。次ニ左膝鼠蹊。次ニ右膝鼠蹊。次ニ左腕肘臂。次ニ右腕肘臂ニ擦リ終テ復初日ノ部ニ還リ。逐次ニ擦テ大抵七八個月ニ至リ諸症全治スルヲ度トシ休ム。○

骨腫等ノ外症アル部ハ常法ヨリハ數擦ルベシ。○預其部ヲヨク摩シ手ヲ温テ撒爾弗ヲ擦ルベシ。○擦テ後半時或一時許モ卧蓐ニ温覆メ冷氣ヲ避クベシ。○晚間ニハ温湯ニ石鹼ヲ溶シ燒酒少許加テ其擦リタル部ノ皮膚毛竅ニ粘著セル撒爾弗ヲ洗去ルベシ。是ニ由テ皮表ノ蒸氣管開通メ蒸氣ヨク發泄シ。且翌日擦ル撒爾弗ノ水銀ヨク滲入ス。○每日前說ノ浴湯ヲ施ス。一大緊要トス。蒸氣及汗ヲ發スルガ爲ナリ故ニ此療法ハ夏月尤効多シ。○虚人孕婦小兒等ハ常法ヨリハ間日ヲ多クスベシ。速

効ヲ要ノ毎日はヲ擦レバ吐涎ノ水銀速ニ漏泄シ。病毒根治セズ。故ニ間日多キヲ佳トス。多ク時日ヲ經レば全愈ノ功確實ナレバナリ。但毒淺キ者ハ三個月ニシテ治スベシ。或五六日若ハ七日ニ一次是ヲ擦テ七個月ニシテ全治スル者アリ。或微毒ニテ頭蓋骨ニ一孔ヲ生スル者八箇月中ニ撒爾弗五弓ヲ擦テ全治セリ。或微毒ノ諸症劇盛ナル者。四十五日ニ撒爾弗ヲ擦ル。二十五次。毎日半浴湯ヲ施シ時々下劑ヲ與テ全愈セリ。○或云。二日ニ一次撒爾弗ヲ擦リ三日ニ一次下劑ヲ用ヒ毎日半浴湯ヲ施ス。一

次是ニ由テ吐涎セズ微毒ヲ治スル。一確實ナリ。或云輕症ハ撒爾弗半錢宛。毎夜脚ニ擦リ。虛入ハ二日ニ一次擦テ治ス。或云下劑及發汗劑ヲ數與レバ劑中ノ水銀大便ト發汗ヨリ漏泄スル。故ニ効驗少シト。○飲料ハ大麥煎ニ乳汁ヲ加ヘ。或大麥蘆根。蒲公英根。甘草。或朴窟福烏篤薩撒弗刺斯ノ煎湯ヲ與ベシ。○食料ハ穀類乳汁雞卵及消化シ易キ蔬菜ヲ良トス。○過食ヲ戒メ鹽藏酸味。炮炙肉。厚脂油膩。辛熱香竄ノ品。硬韌ニシテ消化シ難キ物。酒類ヲ禁スベシ。○諸症全治シ擦法ヲ休ル。凡ハ數下劑ヲ用ヒ漸ク平

長百子勿考 卷三十三 二十四 風雲堂

常ノ飲食ニ復スベシ。愈後過食シ或食禁ヲ慎マズ
 ノ死スル者多シ。○孕婦徽毒ヲ患レバ墮胎シ或死
 胎トナリ或娩後育セズ或母子共ニ死ス。故早ク此
 療法ヲ施シ其毒ヲ除クベシ。一婦人徽毒アリ。數懷
 孕スレバ皆墮胎ス。其後孕テ既ニ六個月ニ至リ此
 療法ヲ施シ徽毒ヲ治スルニ因テ安産ノ母子共ニ
 恙ナシ。爾後數受胎ノ皆長育セリ。○初生兒遺毒ア
 ル者ハ生母或乳母ニ此療法ヲ施セバ其兒ヨク長
 育ス。但十歳以上ノ兒ハ直ニ擦法ヲ施シ或麴ゴム謀ム規
 吉キ後ニ一錢宛日一兩次與フベシ。○小兒水銀劑ヲ
 出ツ

服ノ下利腹痛吐涎等アル者ハ此擦法ヲ佳トス。但

是モ亦施シ難キ症ハ加羅カ羅ロ兒ル後ニ出ツ久服セシム

ベシ。○水銀ニ感觸シ易キ人ハ動モスレバ吐涎ス

ル故ニ數患者ノ口中ヲ診ヒ。若シ口中焮熱斷腫痛。

津唾多ク面部赤色。睡眠多キハ是水銀一頓ニ多ク

血中ニ滲入セル症ニ吐涎ノ候トス。速ニ擦法ヲ

休メ一兩次下劑ヲ與テ瀉下セシメ或云便秘スレ

皮膚ニ粘著セル撒爾弗ヲ洗淨シ汗衫シユヲ更カへ。脉強

盛ナル者ハ刺絡ヲ行ヒ半浴湯ヲ施シ毫モ吐涎ノ

候ナキニ至テ常法ヨリハ一兩日間日ヲ多クシ再

遠西名物考 卷三十三 二十五 風雲堂藏

