

遠西醫方名物考

安

卷十六

松
科
別

✕
e 13

富士川文庫
✕
499.2
En-4
6

亞爾鮮鹽

田川先生著

阿芙蓉上

製法亞含產地

撰品亞質

試性說 瞑眩說

禁戒 稟賦異効

亞服量亞解毒法

遠西醫方名物考 卷十六

禁戒 稟賦異効

遠西醫方名物考

遠西醫方名物考卷十六

榛齋先生譯述

男 宇田川榕 榕菴校補

亞刺比亞ア越ラ謨ビ蘭ア 是ハ亞ア刺ラ比ビ亞ア 弗フ利リ加カ洲ア 滴ツタルル越コ謨ムナリ

是ハ亞ア刺ラ比ビ亞ア 弗フ利リ加カ洲ア 滴ツタルル越コ謨ムナリ

顆カ粒リヲシ爲シ或ハ碎ク塊クヲシ爲シ大ト鵝カ卵ノ如ク或ハ胡コ

透トウ瑩エイ殆ダ下カ硝シ子ノ碎ク片ノ如クシシ研ケン磨バスレババ碎ク粉ノ小ト

桃トウノノ如クシシ淡タン黃ワウ或ハ赤セキ色シキヲシ帶ビ鮮セン麗レイニシ破クレバ顔ガン

透トウ瑩エイ殆ダ下カ硝シ子ノ碎ク片ノ如クシシ研ケン磨バスレババ碎ク粉ノ小ト

透トウ瑩エイ殆ダ下カ硝シ子ノ碎ク片ノ如クシシ研ケン磨バスレババ碎ク粉ノ小ト

リ易シ是ヲ嚼カム片ハ粘滑ニメ香味ナク水ニ浸セハ
 速ニ盡ク溶化ス是ヲ真品トス○一種形ハ細長
 縮メ蟲ノ如キ者アリ是レ最上品ニメ稀ナリ此品
 ハ自然ニ其樹ヨリ流滴スル者ナリ碎塊ヲ爲スハ
 其樹ヲ鑽刻メ取ル者ナリ○此脂淨潔ナラスノ緒
 赤色ヲ帶ビ或ハ淡黑色ノ汚物ヲ雜メ或ハ水ニ溶
 化シ難キハ桃櫻梅李等ノ膠液ヲ混メ偽製セル者
 ナリ是ハ藥用ニ充テズ○亞刺比亞アラビヤ越謨ヤムヲ取ル樹
 ハアカシアアカシアエグヰエグヰフチカフチカ羅ラエグヰエグヰフチケフチケドールドールンン又ホホ
 フレキテアカシアアカシア蘭ト名ク是レ一種ノ喬木ニシ

高二丈許枝多ク葉細ク羊齒様ニ兩對シ諸枝ノ本
 ニ一勁刺アリ略ホ皂樹ニ似タリ花淡黃或ハ白色纖
 細ニメ毛如ク圓ク攢簇シ宛モ楓毬ノ如シ花後
 短莢ヲ結ビヘイゲボ子ボ子ノ莢ヨリ小ナリ豆ノ名未ダ詳
 ナラズ其莢蠶豆蠶豆ノ裏ニ豆二三粒アリ葉花實實ニ味
 ノ莢ヨリ小ナリ裏ニ豆二三粒アリ葉花實實ニ味
 辛ク發シ發シ榕榕按ニ是レ皂樹ト異ナリ皂樹ハ花長穗
 鑽刻スレレ越謨越謨○此樹ノ一種アカシアアカシアアメリカ
 出ルコトナシ
 ナ口ビニト名ル者アリ大抵前種ノ如クニメ枝ノ
 本ニ三刺アリ花ハ穗ヲ爲シ形ハ豆花ノ如シ莢扁
 長ニメ毛アリ榕按ニ是亦皂樹ニ似タレ花大ニ
 莢小ナリ皂樹ノ種類ナルベシ

本草綱目卷之六 風雲堂藏

○榕按ニ此樹脂 本邦藥舖ニ舶來アリ。又香椿
 人膠淚。形色氣味亞刺比亞アキラヒ越コト謨ト異ナラズ。水ニ
 浸セバ盡ク溶化シ畫料ニ用ヒテ光澤ヲ生ス。江
 白虹齋最上氏嘗テ香椿ノ膠ヲ試 又花戸金合歡
 始テ亞刺比亞越コト謨ニ代用ス。ト呼コト樹アリ。合歡ニ似テ花ハ黃絲圓ク攢簇シ楓
 毬ノ如シ。莢圓ク豌豆ノ如シ葉本硬刺雙生ス。樹
 ヲ斫キレバ越コト謨出ツ性甚寒ヲ畏ル。元琉產ト云。是右譯
 說ノ亞刺比亞越コト謨ヲ採ル樹ノ本種ニ確當セリ
主治 性涼。滋潤シ肺ヲ和シ胸ヲ利シ粘痰ヲ豁シ酷
 厲毒ヲ和解シ。傷冷毒欬嗽。咽喉刺痛或ハ赤痢下血。

淋疾痛。焮腫眼ヲ治ス○一切酷厲毒ヲ甘和スル
 亞爾アル託タ亞ア根ノ如シ○此末一錢ヨリ一弓マデ乳汁
 或ハ適宜ノ飲液ニ溶化シ酷烈ナル藥劑ニ加ヘ用
 レバヨク其毒ヲ甘和ノ適宜ノ効ヲ奏セシム○赤
 痢ノ劇シキ腹痛ニ此物四錢許水煎シ用ヒテ其痛ヲ
 祛クキ治ス○腎膀胱。尿道等ニ酷厲侵刺ノ毒アリテ
 發スル諸症及ビ石淋痛ニ用ヒテ其疼痛寧急ヲ緩
 解ス○此樹脂ハ純粹ノ越コト謨質ナル故ニ燒酒及ビ
 油類ニ浸スト雖モ溶化セズ又火力ニテモ盡ク烱
 化セズ唯ヨク水ニ溶化ス總テ中和鹽及ビ酸性鹽

ハ越謨ノ溶解スルヲ妨ゲズト雖モ亞兒加利鹽ハ是ヲ妨碍ス。故ニ亞兒加利鹽ヲ加ヘタル水ニ越謨類ヲ和スレバ其粘滑ノ質ヲ失ヒ溶化スルコトナシ

○水銀ニ此越謨一倍ヲ加ヘ水ヲ滴ノ研磨スレバヨク混和ス其說詳ニ水○凡ソ油類ニ水ヲ加テ乳劑ヲ製スルニ此越謨ヲ加フレバ水ト油トヨク混和ス

○油類及ビ華爾斯類、技爾撒謨、羯布羅ハ水ト混和セズ。然レ亞刺比亞越謨漿次ニヲ加ヘ研レバ盡ク混和ス。故ニ技爾撒謨ヲ内服シ或ハ外敷スルニ是ヲ等分ニ加ヘ水ニ研和スレバ盡ク混合ノ果

仁乳扁桃乳ノ類ノ如クナリ飲服シ易シ。又金創等ニ外敷メ痛ヲ止メ創ヲ愈シ或ハ技爾撒謨ニ加テ良効アリ。技爾撒謨一味用レバ氣味辛熱ノ其侵刺ニ堪ザレバナリ

○亞刺比亞越謨ノ細末ニ沸湯等分ヲ加ヘ研和シ膠漿ト爲ス是ヲ亞刺比亞越謨漿ト名ク一方越謨一弓水七弓研此液一錢阿利襪油和ノ舍利別ノ稠ト爲ス

二錢水一弓ヲ研和スレバ油氣ヲ含メル一種ノ乳劑トナリ内服或ハ外用ノ滋養甘和鎮痛滑利ノ良驗ヲ稱ス

○華爾斯ノ類或ハ龍腦麝香ノ如キ乾固ノ物モ此越謨漿ニ研合ノ水ヲ加レバヨク溶化メ

服シ易シ達刺侃篤前ニ出モ此類ノ趨謨ナレ右ノ
諸品ヲ研和ノ水ニ溶化シ難シ○此趨謨漿ニ搾油
扁桃油阿利四倍量ヲ加ヘ研磨スレバ乳劑トナル
機油等ヲ云
○此漿ニ龍腦ヲ研和シ是ヲ幾那煎ニ加ヘ用ヒテ
防腐ノ飲劑トシ殊効アリ腐敗熱等ノ血液腐敗ニ
進ムヲ防止スルナリ
○此趨謨ハ飲液ニ溶シ用ヒ或ハ丸藥トシ用ヒテ
傷冷毒ノ效ヲ治スルノニナラズ凡ソ乾效。聲。嘔。咽
喉口中ノ諸病或ハ痛刺。腎膀胱尿道ノ疼痛等一切
酷厲液ヲ包攝甘和ノ治スベキ諸症ハ是ヲ一味用
ヒ或ハ阿芙蓉ヲ加ヘ用ヒテ速効アリ又左ノ方尤良

趨謨消厲飲

亞刺比亞趨謨漿

阿利機油 新者

白罌粟。舍利別

右合和シ半時或ハ一時ニ一匙宛用フ右ノ症ニ扁
桃油モ亦甘和ノ良効アレ圧動モスレバ澁敗シ是
ヲ服シ害ヲ爲スコアリ若シ阿芙蓉ノ害アルベキ
症ハ右ノ劑中罌粟舍利別ヲ去テ實亞格日温或ハ
過爾託亞舍利別ヲ加フベシ若シ鎮痛催睡ノ効ヲ
要スル症ハ右ノ劑中ニ舍電發謨阿芙蓉液ヲ加フ

ベシ斯ノ如キ酷厲液ノ刺戟ノ疼痛ヲ爲ス諸症ニ
ハ此粘滑甘和ノ劑ニ斯百兒未攝的及ビ拔爾撒謨
碌加的刺ヲ加ヘ用ヒテ大効ヲ得ルコトアリ。然レ此
ニ品動モスレバ遊敗ノ氣味酷烈トナリ害ヲ致ス
コトアル故ニ意ヲ用ヒテ新鮮ナルヲ擇ムベシ○此
趨謨漿ハ酷厲液ヲ包攝ノ侵刺セザラシムルガ故
ニ特ニ乾效ニ効ヲ稱ス。左ノ方尤モ驗アリ

趨謨和胸錠

亞刺比亞趨謨

沙糖

各ハ多

右研和シ水少許加テ溶シ濾テ鍋ニ入レ文火ニ上
セ攪テ水氣ヲ減シ又雞子白ニ橙花露少許ヲ加ヘ
溶シタル液四弓ヲ煉和シ錠ト爲ス○乾效アリ此勞
瘵ニ左ノ方殊効アリ

趨謨和胸飲

大麥煎

甘消石精

亞刺比亞趨謨漿

右調和シ一時毎ニ一茶碗ヲ温服ス或ハ趨謨漿ヲ
乳汁ニ溶化シ沙糖雞子黃ヲ加ヘ用ルモ良左ノ方

亦良驗アリ

越謨桃罌飲

甘扁桃

亞刺比亞越謨漿

白罌粟舍利別

右扁桃ニ水十六弓ヲ加テ搗爛シ絞リ濾テ乳様ノ

汁ト爲シニ品ヲ合和シ一時毎ニ一茶碗ヲ温服ス

或ハ雞子黄一二個ヲ調和シ用ヒテ殊ニ良○此越

謨或ハ越謨漿ヲ吉利詞參兒ノ劑並如ヘ直腸ニ注

輸メ下利赤痢ノ痛ヲ甘メ重墜努責ヲ治シ或ハ羸

瘦病疝痛腎痛等ニ是ヲ施メ滋潤榮養シ酷厲刺戟

ノ毒ヲ甘和メ偉効アリ○此越謨漿ヲ尿道ニ注輸

メヨク淋疾ノ痛ヲ消ス○徽毒淋劇痛ニ堪ヘズ陰

莖焮腫スル症ハ此越謨漿ニ阿芙蓉龍腦消石ヲ適

宜ニ加ヘ内服メ捷効アリ又菴菁ヲ用テ劇小便淋

瀝スルヲ治ス○焮腫眼或ハ鼻口斷舌ノ潰爛侵蝕

スルニ此越謨漿ヲ外敷メ痛ヲ止メ瘡ヲ愈ス○瘡

瘍ノ膿汁酷厲液傍邊ノ皮膚ニ浸淫メ其瘡滋蔓シ

或ハ乳頭坼裂焮痛及ビ潰爛スルニ此越謨ノ末ヲ

搽シ或ハ越謨漿ト爲シ塗テ速ニ愈ス○此越謨漿

ニ雞子白ヲ和シ火傷ニ塗テ焮痛ヲ止メ小胞潰爛

ヲ消ス 叔布伍度 福底依按

過爾託亞羅 ヘムスト

過爾託亞羅 ヘムスト

按ニ是葵ノ一種ナリ 依云性功大抵葵類ト同

錦葵蜀葵 福云錦葵花葉共ニ性功過爾託亞ノ

如シト其種類形狀等和蘭藥鏡ニ載ス

主治 根及ヒ花葉皆藥用トス

花葉根共ニ粘液ヲ

リテ酷厲液ヲ甘和シ堅硬ヲ軟化シ急迫ヲ緩弛ス

此効アリ此液殊ニ根ニ多シ

全軀諸器ニ賦與シ

アル所ノ粘滑液枯燥乾澁シ若クハ甚ダ稀薄ナル

ヨリ發スル諸症ヲ治ス

凡ソ酷厲毒ノ刺戟スル

ヲ緩和スル良藥トス殊ニ肺胃腸ヲ侵刺スル諸症

ニ効アリ故ニ肺焮衝胸脇痛效嗽咽喉痛冒寒傷冷

毒ノ諸症及ビ酷厲液ノ侵刺又下利小便淋瀝焮痛

スル等ヲ治ス

傷冷毒ノ效ニ左ノ方甚驗アリ

過爾託亞和胸飲

過爾託亞根 甘草 各一匁 點失刺獲 一握

白罌粟球

二個

薄荷

麗春花

各二錢

右判之調合之泡湯トシ服ス炊衝熱ヲ兼ル者ハ方
 中、罌粟球ヲ去ルベシ斯ノ如キ粘滑劑ハ病性ヲ論
 セズ總テ酷厲毒ヨリ發スル疝痛下利赤痢等ニ良
 効アリ然レ其毒胃腸ニ鬱積スル者ハ適宜ノ下劑
 ニ緩和及ビ驅風ノ藥ヲ加ヘ用ヒテ是ヲ滌除シ治
 スベシ○腎、膀胱、尿道ニ結石、或ハ酷厲毒アリテ攀
 急刺痛ヲ發シ或ハ小便淋澁焮痛ヲ患ル者ハ右ノ

泡劑捷効アリ○遏爾託亞ニ亞麻子ヲ加ヘ水煎シ
 用ヒテ一切淋疾痛ヲ解散ス○徽毒淋ニテ陰莖挺
 起緊痛シ或ハ尿道ノ滑液脫除ノ小便淋痛スル症
 ハ此根或ハ花葉ヲ判之一弓ヲ取テ水十六弓ニ加
 ヘ煮テ十弓ト爲シ服メ速効アリ○根或ハ花葉、水
 煎メ蒸濕劑トシ或ハ琶布トシ外敷メ一切堅硬腫
 ヲ軟化シ攀急ヲ緩弛シ且、膿ヲ成スニ尤モ良故ニ膿
 潰スベキ腫瘍或ハ劇痛アル腫瘍或ハ酷厲毒ニテ
 侵刺乾澁セル焮腫等ニ施メ其毒ヲ包攝シ緩和鎮
 痛及ビ化膿ノ殊効ヲ稱ス○咽喉口中ノ膿潰スベ

キ腫瘍ニ含漱劑トシ或ハ吉利詞參兒ノ液ニ加ヘ
 下利痢痛ニ施メ軟化滋潤シ攀急ヲ緩解ス又峻攻
 瀉下ノ吉利詞參兒ニ加レハ腸ノ攀急ヲ弛メテ曰
 久滑利セシム(依) (福)
 過爾託亞舍利別アレルタアセリア
 製法 過爾託亞根アレルタア 生鮮者生鮮者 剉剉
 沙糖沙糖 三比三比
 沸湯沸湯 六比六比
 右過爾託亞根ニ湯ヲ加ヘ煮テ半ヲ減シ放冷シ絞
 リ漉シ靜定メ底渣ヲ去リ沙糖ヲ加ヘ又煮テ溶化

シ毛篩ニテ漉過シ貯フ(按)
 又法 過爾託亞根アレルタア 六弓六弓
 甘草甘草 一弓一弓
 石長生草石長生草 一弓半一弓半
 沙糖沙糖 六比六比
 水水 十比十比
 右過爾託亞根ニ水ヲ加ヘ煮テ三分ノ二ヲ減シ甘
 草石長生ヲ加ヘ暫ク煮テ絞り漉シ其液ニ沙糖ヲ
 攪和シ煮テ舍利別ノ稠ト爲シ貯フ(医)
 主治 酷厲液ヲ消シ急迫ヲ緩メ疼痛ヲ止メ痰ヲ疏

豁ノ吐キ易カラシメ欬嗽咽喉胸肋痛。冒寒傷冷毒痛等總テ肺ノ諸症ヲ治シ淋疾痛ヲ甘ゲ小便ヲ利シ大便ヲ滑ニス

過アチイ泥子ス蘭アニシムム羅

形状 此草洋芹ノ一種ニシテ形状甚ダ相似タリ春月圓莖ヲ抽ヒテ三四尺許中虛枝多ク粗糙ニシテ條理アリ。脚葉ハ圓潤ニシテ鋸齒アリ。漸ク莖梢ニ至テ葉長ク細ニ缺裂シ三叉若クハ五七叉ヲ爲シ毛茸アリ洋芹葉ニ似テ白色ヲ帶ビ香氣アリ。夏月莖頭五瓣

ノ小白花。繖ヲ爲ス。苗香或ハ葛縷草ノ如シ花後子ヲ結ブ梗キアリ。苗香子ニ似テ大ク條理アリ。最大ナルハ麥粒ノ如シ。綠色ニシテ灰白ヲ帶ビ香氣アリ。味辛甘微苦竄透ス。根細ク鬚ノ如シ。毎年種ヲ下シ生ス。○**厄日多**エジト亞ア弗フ利リ加カ西シ齊シ里リ亞ア其他キタ。歐オ羅ロ巴バ洲シュハ諸國ニ生ス。○其子新鮮肥大香氣強ク味辛甘舌ニ滲透スルヲ擇ムベシ

○按ニ此草和漢產未ダ詳ナラズ舶來ノ品ヲ用和スベシ**物叔**云角苗香ト効同シ**福依**云性功苗香至ト同シト。代用スベシ

主治 子性温。精微油。揮發鹽アリ。此鹽ハ粘脂様ノ甘味ヲ含ミ緩和ノ効アリ。微刺戟スレバ酷厲氣ヲ夾ムトナシ。故ニ是ヲ用ヒテ炊衝ヲ發セズ凝結ヲ解キ堅硬ヲ軟ゲ粘液ヲ稀釋ス。○肺ノ汚液ヲ排除シ稠痰ヲ疏釋ノ略易カラシム。欬嗽喘急及ビ經久乾欬ニ驗アリ。和胸劑ニ加ヘ用フ。或ハ水ニ浸シ或ハ泡湯トシ用ヒテ胸中ヲ淨刷シ冒寒ノ諸症及ビ諸寒性ノ閉塞ヲ疏通ス。○破氣驅風ノ要藥トス。又鎮痙ノ効アリ。胃中痞氣鬱悶。噫氣腹鳴。攣急痛。風疝。子宮衝逆ヲ治シ。飲食消化ヲ扶ケ婦人乳汁ヲ増シ乳

房結核ヲ散シ酸敗液ヲ消ス。○小兒癩瘻及ビ腹痛ニ尤モ効アリ。○小便ヲ利シ水腫。淋疾。白帶下ヲ治ス。○水煎メ漱藥トシ咽喉膿腫ヲ化熟ス。是ニ蜜ト醋ヲ加ヘ漱藥トメ咽喉焮腫ヲ消散ス。○焙リテ蜜ニ浸シ服メ能ク痰ヲ咯出セシム。○**製法** 蒸餾法。薄荷油及ビ茴香油ト同シ。**主治** 遏泥子ノ効力。專ラ此油ニアリ。○肺病。胸中諸症。胸肋痛。欬嗽。胃痛腸痛。甘ゲ。破氣驅風ノ良効アリ。六滴許ヲ砂糖ニ和シ燒酒ニテ服シ或ハ葡萄酒

遇泥子油 オレウム アニシム 羅

或ハ適宜ノ飲液ニ點服メ過泥子アチニス主治ノ諸症ニ殊効アリ補云性功苗○此油ヲ過服スレバ譫妄ヲ發ス。斯ノ如キ者ハ吐劑ヲ與ヘ吐セシムレハ速ニ治ス。○外敷メ凝血ヲ散シ打撲傷青癍及ビ諸腫ヲ消散ス。○過泥子アチニス蒸餾油ハ子ノ皮ヨリ出ヅ香氣アリ。寒氣ニ凝テ酪ノ如シ苗香油。芸香油モ然リ。搾油ハ仁ヨリ出ヅ是ハ藥用トセズ。○此油ヨク硫黃ヲ溶化ス故ニ是ヲ以テ硫黃拔爾撒謨ヲ製ス因依

過泥子精アチニス スピリテウス。アニシム羅

製法 過泥子アチニス 新者搗碎半比 燒酒十度者

右格兒弗ニ内レ固封シ熱灰上ニ置日一宿。沙火ニテ蒸餾シ十九度ノ精ヲ取り硝子壺ニ收メ固封シ貯フ。○葛縷子精カリユイ杜松實精ノ製法モ是ニ同シ。○蒸餾中。乳白色ノ精出ルハ速ニ火ヲ下スベシ否ガレバ焦臭ヲ生シ味變スレバナリ

主治 過泥子アチニス 主治ノ諸症ニ殊効アリ叔我

亞爾鮮蘭アルシム アブシンテム羅 アルスト蘭

○按ニ此草數種アリ唯藥用トスル者三種ヲ舉

形狀 第一種ハ「アブシンテム」ヒルガレヲチホルム

亞爾鮮ノ尋常潤ト名ク。是レ尋常大葉ノ者ニノ春
 葉ナル者ノ義。月宿根ヨリ新苗生シ莖ヲ抽リ三四尺灰白硬韌ニ
 ノ線楞アリ枝多ク分敷ス葉ハ艾葉ニ似テ深ク分
 裂シ細ニ數又ヲ爲シ手ニ觸テ柔ナリ。初メ緑。老ス
 ルニ隨ヒ下ヨリ漸ク繭細色トナル。夏月梢頭ニ小
 枝ヲ分チ黄色ノ小蕾是レ細花攢ヲ生シ累次ノ
 穂ヲ成ス。萼鱗甲ノ如シ萼底幾多人細子ヲ結ビ香
 氣アリ根硬クノ鬚アリ宿根ス。葉穂凡ニ味甚ダ苦
 ク微收瀋シ盧會ノ如シ。
 ○榕按ニ此種和産未ダ詳ナラズ。舶來ノ品ヲ見

ルニ葉及ビ花穂ノ形。右ノ譯說ニ差ハズ味甚ダ
 苦シ林娜リシナウス私人名是ヲ艾蒿類ノ第十七種ニ屬セリ
 故ニ艾蒿或ハ野艾蒿ヲ代用ノ可ナリ此草略ホト
 本邦佐渡産ノ白蒿ヨモギニ似タリ白蒿ハ高ニ三尺或
 四五尺許ニ至リ莖硬ク木ノ如ク牡蒿或ハ萋蒿シキヨモギ
 ニ類シ葉刻裂シ。夏月梢頭黄色ノ蕾是レ生シ穂
 ヲ成シ細子ヲ結ブ。是亞爾鮮ニ似タリ然レ葉深
 ク又裂セズ菴藺葉ニ似テ厚ク。面背凡ニ遍ク白
 毛アリ萼雪白色。莖亦白茸アリ。是亞爾鮮ニ比ス
 レバ白色ニ過ギ且葉及穂生乾凡ニ其氣菊ニ類

ノ苦味ナク水ニテ濃煎スレバ微苦シ。是アル亞爾鮮セム
 ト異ナリ度ノ「アムアムセアルセム」次ニ舉ル第二種者ノ附録
 ニ云、一種全苗「ボムボムアツチヘアヘ」口子一是種ヲガ
ヨモニ似テ小木ノ如ク。花大葉ノ亞爾鮮ノ如ク
 葉亦是ニ似テ小ク白色多シ冬凋落セズ但嚴寒
 ニハ枯ルアリ宿根ス。味微苦メ葯氣アリト是木
 様ノ亞爾鮮アル鮮セム木様繆云一種全苗白色ニメ即チ白蒿ナリ
 第二種ハ「アムアムセアルセム」アムセ國ノト名ク。一根
 數莖叢生シ一尺許或ハ二三尺ナルモアリ。葉第一
 種ニ比スレバ纖細ニ分裂ノ毛ノ如ク柔ニメ淡白

色背ニ毛茸アリ莖及ビ花ハ第一種ノ如シ。葉及ビ
 穂ノ苦味第一種如ニ甚シカラズ根細クノ蔓延シ
 多ク藥ヲ生シ宿根ス
 ◎榕按ニ是花戸ニ朝霧草或鰓夷茵陳ト呼草ナ
 リ。高尺許或ニ三尺ナルモアリ。一根數莖叢生シ
 藥多シ。初生ノ葉ハ潤メ第一種ノ葉ノ如シ。長ズ
 レバ分裂纖細ニメ尖叉ヲ爲ス。花黄色ノ莢莢ニ
 ノ梢ニ穂ヲ成シ花葉生乾ニ味苦シ然ニ第一
 種ニ比スレバ減セリ。其他右ノ譯説ノ如シ
 第三種ハ「アムアムセム」海邊ニ生スルト名ク全形

大約第二種ノ如クニメ葉更ニ纖細柔薄淡白色莖頭數極ヲ分チ莖莢穗ヲ成シ子ヲ結ブ但葉色產地ニ隨テ差異ナリ味苦シ

○摺按ニ此草和産未ダ詳ナラズ(度)物等ノ圖說

ニ就テ考ルニ葉ハ茵陳ニ似タレ花穂ノ形質

大ニ異ナリ又茵陳ノ花葉生乾ニ絶テ苦味ナ

シ水ニテ濃煎スレバ微苦クノ鹹ヲ帶故ニ茵陳

ニ充テ難シ○亞爾鮮ノ一種(物)ノ第九版ノ圖ニ

出ルアブシンチウムテニイホリウム細葉亞爾鮮ノ義

一ニナルボニセアブシンチウム亞爾鮮ノ義

ト名ル者即茵陳ナリ其圖ヲ熟察スルニ微塵ノ

碎花攢テ穂ヲ成シ六葉或ハ八九葉莖ヲ圍テ車

輻狀ヲ爲シ恰モ蘊藻ノ如シ茵陳モ七八葉宛莖

ヲ圍テ對生ス故ニ漢說ニ八角茵陳ノ名アリ然

ハ茵陳ハ亞爾鮮ノ一種ニメ且濃煎スルバ微苦

味アル故ニ絶テ亞爾鮮ノ功ナキニ非ト知ベシ

主治花穂及ビ葉ヲ用テ鑽透解凝ノ鹽氣多シ性温

味苦ク稍衝動スル油ヲ含テ胃ヲ温煖シ尤健胃ノ

効ヲ稱ス凡ソ胃腸ノ運營衰弱ニメ飲食消化シ難

キヨリ發スル諸病ニ殊効アリ故ニ萎黃病粘液病

水腫。或ハ肝脾壅塞。依利昆垺兒。失苟兒陪苦。酸敗液
 ノ諸症ヲ治ス。○脚痛風及ビ其他ノ痛風。効アリ
 ○熱毒ヲ驅逐シ間歇熱ヲ治ス。殊ニ間歇熱及ビ粘
 液ヨリ起ル水腫。黃疸及ビ蛇蟲ニ驗アリ。○葡萄酒
 或ハ燒酒ニ浸シ用ヒテ胃弱ノ諸症及ビ間歇熱ヲ
 治スルニ多ク良驗ヲ稱ス。○此藥末トシ用ルニ稀
 ナリ大抵葉穂一多ヲ取テ温湯十六多ニ浸シ用フ
 水煎スレバ藥氣蒸散メ脱スレバナリ或ハ越幾斯
 劑 總ヲ用フ。製法。蒲公
 英越幾斯劑ト同シトシ一月ヨリ二月マデ佳香
 アル露水ニ溶シ或ハ丸藥トシ用フ不佳ノ味ナク

トノ服シ易シ。○此藥硫黃氣ヲ含メリ故ニ神經感動
 シ易キ人ハ動モスレバ頭ニ上衝ス故ニ多血家或諸
 脱泄及ビ失血ノ患アル者ニハ害アリ。○蒸湯劑或
 ハ琶布トシ外敷メ粘液腫。水腫。傷冷毒痛。羅斯樣ノ
 焮衝等ヲ治ス。 度 福 淑
 亞爾鮮鹽 レ セム サル。アブシンチ 羅 アルセム。ソヴト 蘭
製法 亞爾鮮草ヲ採リ乾シヨク塵土ヲ洗ヒ去リ。淨
 キ石上ニテ燒テ灰ト爲シ温湯ニ投シ灰汁ト爲シ
 靜定メ上清ヲ取り。糊ナキ紙ヲ篩内ニ藉キ其液ヲ
 入レ絞ラズ徐々ニ漏瀝セシメテ瀝シ其清液ヲ取

以磁鍋ニ内レ煖火ニテ煎熬シ乾鹽ト為スナリ
此鹽尤潔白ニ為ト欲セバ再ビ温湯ニ溶シ前法ノ
如ク濃テ熬乾スベシ

主治 粘液ヲ鑽截シ胃神經ヲ衝動メ健運シ嘔吐ヲ

止ム又汗ヲ發シ小便ヲ利ス。性功酒石鹽ト同シ。凡

此類ノ亞兒加利鹽ハヨク酸敗液ヲ消ス○但亞兒

加利鹽ノ腐敗酷厲毒アル諸病ニハ大ニ害イリ

物 加利鹽ノ腐敗酷厲毒アル諸病ニハ大ニ害イリ

阿芙蓉 **國** オヒウム又テハイモム **羅** へウルサフ

製法 罌粟ノ生草ニ就テ能ク熟セル球ヲ擇ニ小刀

ニテ數處ヲ鑽刻スレバ乳様ノ液滲出ス。此液速ニ

太陽ニテ乾キ凝結メ黃褐色トナル。是ヲ刮リ取リ

集メ錠ト為シ乾シ貯フ或云。晚間罌粟球ヲ刻スレ

ベ其液滲出メ夜中ニ凝固ス。翌朝是ヲ取り日乾ス

斯ノ如クメ一球ヲ鑽刻スルコト六七タナリト

產地 亞刺比亞。百兒西亞ニ多ク産ス。上品ハ厄日多

都兒格ニ産シ其他亞細亞洲ノ諸地ニ多シ○百兒

西亞等ノ熱國ニテハ罌粟莖高四丈許ニ至リ。亞刺

比亞ニテハ其球大三比ノ液ヲ容ル許ニ至ルト云

往古阿芙蓉日多阿芙蓉上謂ル地ニ多ク産ス。故ニ阿芙蓉ヲ阿芙蓉ヒウ阿芙蓉ラバ阿芙蓉イモムト名ク。今ハ總テ上品ノ者ヲ阿芙蓉テバ阿芙蓉イモムト呼ブ

撰品 上品ハ純潔ニ汚物ヲ雜ヘズ乾固メ重ク。破

レバ粘潤光澤アリ赭黒ニメ黄色ヲ帶ビ味苦ノ辛

ヲ帶ビ嫌フベキ一種ノ臭氣アリ。是ヲ温メ或ハ暫

握レバ融柔ギテ丸藥ト爲ベク。火ニ投メヨク燃エ

水或ハ燒酒ニ浸セバ半溶化シ赤色ヲ帶ブ。或ハ是

ニ唾ヲ濕メ摩スレバ微綠色ノ白沫ヲ生ス。○燥硬

ニ粘潤ナク疏脆ニメ碎ケ易ク臭氣微スナク或ハ

焦臭アリ味甘澁或ハ沙土汚物ヲ雜ルハ下品トシ

或ハ罌粟球及莖葉ヲ煎熬シ或ハ其絞汁ヲ煎熬シ製

スル者トス是ヲ阿芙蓉メコニウムト名ク。皆藥用トセズ

質 阿芙蓉ノ質ハ華爾斯ト阿芙蓉越謨ト相混ス。故ニ燒酒

ニ浸バ其華爾斯ノニ溶化ス。水ニ浸バ其越謨ノニ

溶化ス。右ニ液ニ浸メ盡溶化スルガ如クナレバ靜

阿芙蓉毒總說 阿芙蓉ハ鎮痙止痛催睡發汗驅風等

ノ奇効アリテ醫家日用闕ヘカラザル藥トス然レバ

對症的當ノ病患ヲ鑒識セズ。施用宜ニ適セザレバ

害ヲ爲ス。淺少ナラズ。輕病ハ危險ニ進ニ。篤疾ハ

死期ヲ促ス。故ニ是ヲ投メ過誤ナク偉効ヲ取ント
欲セハ先古今名哲ノ經驗メ論定セル諸說ヲ查考
シ其主能功用氣味寒熱ヲ辨晰シ或ハ是ヲ誤用シ
瞑眩ノ發スル患狀ニ就テ一種非常ノ毒藥タルヲ
ヲ覆知シ又人ノ稟賦ニ隨テ効驗ヲ異ニシ瞑眩ヲ
殊ニシ服量モ亦一樣ナラザルヲ審察シ。是ヲ用
テ奇効ヲ得ル所ノ諸說ヲ參考メ對症の當ノ病患
ヲ領解シ是ヲ隅反類推メ擴充運用スル片ハ斯ニ
始テ百中差誤ナキ一良藥タルヲ得ベキナリ
試性說或云阿芙蓉ヲ嘗ニ味辛熱胡椒ノ如ク良久

含バ口舌咽喉焮熱ノ潰爛ス○或云。多ク是ヲ嘗レ
バ味苦ノ嘔氣ヲ催シ津唾湧起シ次ニ舌焮熱ノ漸
唇顎咽喉ニ及消セザルヲ一時許或ハ嘔ヲ發ス○
或云。是ヲ皮膚ニ貼スレバ痒ヲ發シ次テ焮熱腫痛
シ或ハ小胞ヲ生シ或ハ潰爛ノ漸壞疽トナル或云。
是ヲ小指大ノ膏藥ト爲シ上臂ノ内側ニ貼スルヲ
一夜少モ焮衝セズ麻痺スルヲナシト是恐クハ皮
膚極テ頑硬ナル人ニノ發泡藥ヲ貼スト雖モ焮腫
セザル者ナリト○右ノ諸說ヲ以テ觀バ阿芙蓉ハ
熱性侵蝕ノ酷厲毒アリテ宛發泡藥ノ如ク焮熱腫

痛ヲ起ス者タルヲ明白ナリ。昔人はヲ寒性ノ麻藥トスルハ其稟性ヲ諦試セザルナリ。但此物一種ノ麻毒ヲ含テ神經靈液ノ運動ヲ阻遏スル故ニ適宜ニ用レバ病毒ノ侵刺衝動スル知覺ヲ奪失ノ疼痛癢等ヲ鎮定ス。○或云。阿芙蓉ノ性。酒ノ如シト。是共ニ醉眠ノ効アレバナリ。然レ其神經ニ關涉スルヲ甚異ナリ。凡酒ノ類。總テ醞釀セル慄悍ノ飲液ヲ服スレバ脉馱數トナル。阿芙蓉ヲ服スレバ脉遲緩トナル。狗ニ酒ヲ與テ醉シムレバ脉疾數トナル。是ニ阿芙蓉ヲ與レバ脉甚遲澁ニノ時ニ一止ス。曾テ一

人精製阿芙蓉後ニ出一匁ヲ服スルニ脉變セズ。二匁ヲ服スレバ脉沈遲トナル。又一人阿芙蓉一匁ヲ服ス其脉ヲ診タテテニ漸沈遲トナリ遂ニ絶脉昏睡ノ死スル者アリ。○然レ此亦人ノ稟賦ニ隨テ一様ナラス。或ハ稀ニ脉疾數ヲ爲ス者アリ。或ハ的テ里リ亞ア加カ及香竄阿芙蓉液後ニ出ヲ用レバ劑中ノ辛熱香竄ノ藥ニ因テ脉馱數トナル。アハ或ハ是ヲ用テ其病ニ的當セザレバ元運生氣是ヲ堪タズ以抗拒シ是ヲ驅逐シ除ンガ爲ニ自ラ血液ノ運行ヲ增發メ脉馱數トナル者アリ。阿芙蓉ヲ煎衝病ニ用レバ脉殊ニ數

其症增劇スルガ如シ酒ノ類ヲ用ルモ亦是ニ似
 冬ハ用ルヲ以テ其効驗太キ異ナリ。假令ハ産後ノ惡
 露崩漏腹痛發熱等ノ症ニ阿芙蓉劑ヲ用テ良驗多
 シ。酒ノ類。慄悍ノ液ヲ是ニ用レバ大ニ害アリテ其
 症増劇スルガ如シ自餘ノ麻藥モ或ハ刺戟衝動
 或ハ鎮痙催眠ノ効ヲ爲ス下阿芙蓉ニ似タリト雖
 モ皆各自ノ才能アリテ効用ヲ異ニスルガ故ニ一
 概ニ混視スベカラザル。是ヲ以テ察スベシ。或
 云。阿芙蓉ハ甚ク膠粘ニシテ精微揮發ノ硫黃質ヲ含
 其精微ノ氣。腦中ニ竄入シ其膠粘ノ質ヲ以テ精氣

ヲ凝澁シ靈妙活潑ノ運動ヲ阻遏ノ神經ノ知覺ヲ
 奪除シ昏睡セシムル者ナリト

瞑眩說 麤工服量ヲ慎マズ妄ニ是ヲ過用シ或ハ長

服スレバ患者昏睡ノ醒寤セズ肢體厥冷或ハ搖擗
 痙瘓或ハ下利多汗。其汗阿芙蓉ノ臭アリ或ハ遍體
 搔痒ニ堪ズ或ハ惡心嘔吐呃逆或ハ口舌燥渴或ハ
 諸筋縱緩肢體痿軟。麻痺不遂。或ハ頭眩暈。頭痛。上
 衝。耳鳴。面赤或ハ胃中焚カ如ク胸腹煩滿。短氣息迫。
 或ハ言語蹇澁口顎ノ筋抽掣。下顎縱弛。唇腫。或ハ眼
 昏。物ヲ視テ分明ナラズ或ハ精神錯亂譫語或ハ昏

曠冒味或ハ痙攣ノ諸症ヲ發シ脉沈遲結代冷汗出
 走死ス○或云一男子齒痛ヲ患ヒ阿芙蓉ヲ以テ數
 齧孔ニ挿シ其溶化セル津唾ヲ嚥下スニ因テ昏睡
 ノ死ス○一婦人資稟強健但時ニ疝腹痛ヲ發シ毎
 杳竄阿芙蓉液ヲ服メ治ス偶劇キ齒痛ヲ發ス因テ
 阿芙蓉二匁ヲ取テ膏藥ニ加ヘ顛顛ニ貼ス忽チ口
 顎抽掣メ發狂ス是ヲ去レバ狂即治シ齒痛復發ス
 ○或云此藥一匁ヲ取テ食物ニ和シ狗ニ與レバ全
 軀振掉直視耳低口白沫ヲ流シ後脚痿軟歩ム不能
 ハズ昏睡三時許ニメ蘇ス是ヲ剖觀スルニ胃大ニ

膨脹シ阿芙蓉全ク胃中ニ在テ消化セズ○或云狗
 ノ股皮ヲ截テ小劊ヲ作り阿芙蓉末二十四匁ヲ摻
 ケ縛帶ヲ施セバ全軀顛振眼光異常耳低沫ヲ吐キ
 昏睡シ尾烈ク抽掣メ全身ニ及ビ遂ニ斃ル是ヲ解
 剖スルニ胃腸大ニ膨脹メ風氣充テ宛モ阿芙蓉ヲ
 服メ死セル人ノ如シ○或云阿芙蓉半匁ヲ取テ水
 ニ溶シ狗ノ直腸ニ注輸メ少モ漏出セシメザレバ
 亦前ニ説ク諸症ヲ發シ吠テ驚怖セル如ク腰脚痿
 軟稍前脚ニテ跛歩シ翌朝故ニ復ス因テ意ラク其
 毒直ニ血中ニ入ルハ尚劇キ諸症ヲ發スベシト乃

狗ノ脚ニ刺絡ノ血ヲ瀉スルヲ半錢。阿芙蓉半斤ヲ
水半錢ニ溶シ血如^{ホト}ニ温メ水銃ヲ以テ徐々ニ其瀉
血セル絡ニ注入シ縛帶ヲ施スニ其全軀振掉メ沫
ヲ吐キ眠ルヲ^{レバ}少間ニ^{レバ}故ニ復ス。右ノ如クニ^{レバ}數
狗ニ試ルニ是ヲ内服スル者ニ比スレバ其症皆輕
易ナリ。○或云總テ畜類ニ是ヲ與ヘテ死セル者ヲ
解剖スルニ皆胃腸炊腫メ潰爛シ或ハ壞疽トナル
處アリ宛モ阿芙蓉ヲ過服メ死セル人ノ如シ也。
〔禁戒〕大抵阿芙蓉ヲ禁スベキ病ヲ舉レバ總テ壯實
ノ熱病。熱毒未タ排泄セザル者。一切炊衝病。多血及

血ノ稠厚ヨリ發スル諸病或ハ勞效。肺瘍。或ハ卒倒
昏睡或ハ諸藏内部ノ壅塞結腫或ハ惡液蘊蓄ノ未
排除セザル症或ハ惡液多ク頭中ニ鬱聚スル者或
ハ嗜眠多汗血液腐敗ニ進ム者等皆阿芙蓉大害ヲ
リ或ハ喘息。痛風。水腫ニ於テ妄ニ是ヲ投スレバ諸
症逾増劇ス。○凡^{レバ}催睡藥ヲ用レバ血ヲ沸騰メ熱ヲ
生シ大小便ヲ閉塞セシムル故ニ右ノ諸病ニ害ヲ
此ヲ知ベシ。○此藥ハ胃腸ニ壅滯ナク大便ヨク通
利スル者ニ用テ効アリ若シ病毒汚物胃腸ニ鬱積
メ未ダ排除セズ大便秘スル者ニ用レバ其毒ヲ閉

滋ノ其症ヲ增長ス○諸病ニ於テ自然ノ良能ヲ以テ
テ病毒惡液ヲ汗小便大便痰唾等ヨリ分利ノ排泄
スル候アル時ニハ此藥ヲ禁スベシ否ラザレバ其
自然ノ排泄ヲ妨碍ノ病毒ヲ閉澁スレバナリ○此
藥ハ諸劇痛ニ用テ捷効アリ然レ數用ルニ隨テ其
痛モ亦數發シ或ハ増劇シ遂ニ頑痺不遂ス故諸筋
痿弱觸知減損スル者害アリ○劇痛アル病ニ於テ
其痛止ム片ハ忽チ危篤ニ至ル者アリ預メ意テ用
ヒテ此症ヲ察スベシ假令バ痛風傷冷毒等外部ノ
痛止テ内攻シ或ハ内部ノ
衝痛止テ壞疽トナルカ如キヲ云○羸弱虛乏ノ患者是ヲ長服シ或

ハ過用スレバ其垂絶ノ元力日ニ減損シ死期ヲ促
ス下アルヲ預メ察スベシ○此藥ハ催睡止痛鎮痙
等人効ヲ以テ一旦ノ劇症ヲ弭メ暫時ノ輕快ヲ取
テ患者ヲ安眠セシメ其精力ヲ保續メ虚脱セシメ
ス其間ニ對症の當ノ主劑ヲ施シ全功ヲ收ルニ多
ク是ヲ用ルナリ○或去。腦創ニ阿芙蓉ヲ用レバ精
神錯亂ノ死ス或去此藥ハ熱性衝動ノ酷厲毒ヲ含
皮膚ニ貼スレバ焮腫ヲ發ス然レ是ヲ焮腫羅斯重
訂
内科撰要精神錯亂篇火傷金創等ニ外敷スレバ其
第百三十二章ニ註ス痛ヲ増發ス又云是ヲ水ニ溶シ數金創或ハ潰瘍ニ

外敷スレバ、焮痛、燻か如く、徒々焦燥スルノニテ、毫モ輕差ヲ得ル、ナシ、或云、痔及火傷ノ焮痛ニ是ヲ外敷スレバ、逾其症ヲ増ス、或云、一患者脚焮腫ノ痛ニ堪ス、阿芙蓉アキヤラヲ幾去シテ爾ヲ外敷スルニ、其腫更ニ甚クメ、遂ニ壞疽トナリ、其部脱落ス、○右ノ諸說ヲ以テ觀レバ、蠱工クモ的當ノ病症ヲ辨セズ、妄ニ焮腫ニ外敷シ、或ハ創ノ痲症ニ用、或ハ腐藥及發泡藥ニ是ヲ加テ、痛ナク其功ヲ取トスルハ、皆危殆ノ事トス、外敷メ必モ麻痺セシメズ、却テ熱性衝動スレバナリ、○阿芙蓉ノ峻毒、右所說ノ如クナレバ、往古

是ヲ用テ、多ク誤治ヲ致シ、人命ヲ害スル、極テ酷ダシ、故ニ久ク廢メ用ル、稀ナリ、然レ施用過誤ナク、ヨク病患ニ應スレバ、苛毒ハ即其雄悍ノ才能ニ、捷効立驗、復比スベキ者ナシ、故ニ百年以來、再ビ其効用ヲ擴充シ、殊効ヲ發明ノ、險痾篤疾ヲ救フ、勝テ算ヘ難シ、○但先其瞑眩誤治ノ諸說ニ就テ、此非常ノ毒藥タルヲ、叢知スル、即チ其効用ヲ領會スル、ノ一大要務タリト知ルベシ、
稟賦異効 此藥ハ患者ノ稟賦ニ隨テ、効用ヲ異ニシ、瞑眩亦一様ナラズ、或ハ適宜ニ是ヲ用レバ、每次速

効アリテ諸藥是ニ若シカザル者アリ或ハ少許服スレ
 凡嘔吐頭痛眩運渴等ヲ發シ翌日マデ解セザル者
 アリ或ハ是ヲ用レバ暫時發狂スルヲ宛モ醉狂ノ
 如キ者アリ○一男子阿芙蓉ヲ買テ自ラ器ニ收メ
 貯ヘ其氣ニ觸レ忽チ昏冒シ睡ルヲ四分時許ニメ
 省復スル者アリ○或ハ疼痛攣急等ヲ治スルニ多
 服セザレバ効ナキ者アリ一婦人七日毎ニ此藥一
 錢ヲ服シ或ハ都トル兒コ格コ名名ノ一婦人毎日是ヲ服スル
 一三錢或ハ一婦人四錢ヲ服ノ神思爽快ヲ得ル者
 アリ是稟賦ニ因ルト雖モ亦是ニ慣ルガ故ナリ○

此藥ハ睡ラシメ痙攣ノ運動ヲ鎮ルヲ主功トス然
 凡其功ナク却テ痙攣搖掣ヲ發スル人アリ或ハ是
 ヲ服メ劇痛等止ミ神思爽了ニシテ少モ睡ラザル者
 アリ○一男子小瘡ヲ發メ搔痒ニ堪ズ安眠センガ
 爲ニ此藥四匁ヲ服ノ少モ眠ズ却テ其痒増劇セリ
 服量通例半匁ヨリ一匁マデ用フ稀ニ二三匁用ガ
 レバ効ナキ者アリ○瞑眩シ易キ人ハ八分匁ノ一
 或ハ四分匁ノ一ヲ用テ効ヲ得ル者アリ○是ニ慣
 ザル人ハ一匁ヲ用テ瞑眩ス故ニ初ハ半匁ヲ用フ
 ベシ是ニ慣ルキハ二匁ヨリ四匁マデ用テ瞑眩セ

ズ○半錢ヲ服スレバ昏睡ノ死ス○頑固ノ長病ニ
 テ常ニ用ヒ慣ル人ハ一ノマデ用テ瞑眩セザル者
 アリ或ハ麝香龍腦亞的兒ノ如キ精微揮發ノ藥ヲ
 加テ良効アリ或ハ一味沙糖ニ研和シ用ス○疼痛
 ニ用ヒテ速効アリト雖モ藥氣消スレバ復痛ムカ
 故ニ數用ルニ隨ヒ是ニ慣テ漸ク服量ヲ加ルニ非
 レバ効ナキ者アリ故ニ長病ハ自多ク服スルト宛
 モ常ニ酒ヲ飲片ハ漸ク習慣ノ多量ニ堪ルガ如シ
 然レ氏日常多ク阿芙蓉ヲ用レバ全身ノ衆器諸液ノ
 運營漸ク常調ヲ失ヒ衰弊ノ遂ニ危險ニ至ル者少

衰カラズ凡毒藥ヲ用ヒテ奇効ヲ得ル所以ノ者ハ唯
 其服量宜ニ適フニ在ルノミ此藥ノ如キ殊ニ奇効
 夫稱スト雖モ醫家ノ巧拙ニ隨ヒ功害途ヲ異ニス
 ル故ニ畢竟良工其術ヲ操テ是ヲ施スニ非レバ曾
 テ百中ノ効ヲ證シ難シト知ルベシ毒ニ大外ニ
解毒法阿芙蓉ヲ過用シ昏睡ヲ醒覺セズ或ハ搗掣
 痙攣等ノ諸惡症ヲ發ル者ハ速ニ刺絡ヲ施シ或ハ嘔
 下スベキ者ハ吐劑ヲ與快吐セシメテ即効アリ即
 韃爾答越默室ノ安質沒扭五氏ヲ取テ水四錢ニ溶シ
 舍利別少許ヲ加用ヒ或ハ乙百葛格安那ヲ用ヘシ

若シ吐セズ或ハ吐スレバ醒覺セザル者ハ醃醋ヲ
 顔ニ撒ケ或ハ橙汁若ハ醃醋半比ヲ取テ八分時ニ
 一二匙宛飲シムベシ醋ハ諸麻藥ノ毒ヲ解スルノ
 峻効アリ是ニ由テ仍効ナキ者ハ硃砂精ヲ鼻下ニ
 接メ其氣ヲ吸引セシメ若ハ是ヲ鼻中ニ吹入レ或ハ
 嚏藥ヲ施或ハ吉利詞爹兒ヲ施メ其毒ヲ大便ヨリ
 導泄スベシ皆捷効アリ○葛私多樓謨及龍腦ハ阿
 芙蓉毒ヲ解スル一良藥トシ醫家多殊効ヲ稱ス
 其劑量宜シ
 遠西醫方名物考卷十六終

君少壯世不或八四... 服... 下... 後... 按... 竟... 續... 天... 遠...

此方... 治...

遠西醫方名物考標目

卷十七

阿芙蓉

阿芙蓉主治

催睡 腹痛 頭痛 牙痛 齒痛 風傷 冷毒 痛
 頭痛 耳痛 諸症 于宮 衛逆 芙蓉 拔爾 撒謨 丸
 嘔吐 血 效嗽 吐血 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲
 崩漏 血 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲
 赤痢 下利 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲
 阿芙蓉 加下劑 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲
 間歇熱 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲 芙蓉 散飲



アリ○少許用レバ揮發衝動ノ性カヲ以テ神經血
脉ノ運動ヲ増發ノ精神ヲ活潑欣慰ス。或云都兒格
名國ノ徭卒。戰場ニ臨テ阿芙蓉ヲ服スレバ精神欣愉
メ少シモ恐怖セズ勇悍。常ニ倍スト

催眠 諸病ニ於テ疼痛或ハ痙攣ノ運動 重訂内科撰
要痙攣摘掣

篇第二十一アルニ因テ患者睡ルヲ能ハズ精力是
章ニ詳ナリ

カ爲ニ罷勞ノ其病逾增長スル者ハ適宜ニ阿芙蓉
ヲ用ヒテ安眠寢息セシメテ其精カヲ回復スベシ

然レ凡患者多血焮衝ノ候アリ或ハ胃腸ニ病毒鬱蓄
シ大便閉滯スル者ニ用レバ安眠ヲ得ス。其症増劇

ス。斯ノ如キ症ハ刺絡ヲ施シ清涼下劑ヲ用ヒテ其

焮衝ヲ治シ胃腸ヲ淨刷スベシ。爾後仍不寐スル者

ハ阿芙蓉ヲ用フベシ

疼痛 各部ニ酷厲液アリテ侵刺シ劇痛スル症ニ用

ヒテ速効アリ。但焮衝ノ候ナク胃腸鬱滯ナキ者ニ

用フベシ○患者疲勞ノ感動甚ク其痛一處ニ住リ

移轉セザル症ニ用ヒテ殊ニ良

腹痛 胃腸ニ焮衝及鬱滯アリテ腹痛スル者ハ阿芙

蓉害アリ。吐下劑ヲ用ヒ胃腸ヲ淨掃ノ後是ヲ與ハ

速ニ治ス○傷冷毒ノ酷厲液内伏ノ疝腹痛ヲ發ス

此者多シ此症ハ阿芙蓉ニ龍腦雜腹蘭ヲ加用シ其毒ヲ皮表ニ發泄スレバ治ス○腸ノ攣急ヨリ發スル疝痛焮衝ノ候ナク唯荏苒沈滯ヲ治セザル症ニ是ヲ用テ大効アリ○胃痛心腹痙攣ノ運動ヨリ發スル者ハ阿芙蓉甚ダ驗アリ然レ粘液或ハ酷厲液虵蟲等胃中ニ滯著セルヨリ發スル者多シ是ニ阿芙蓉ヲ用レハ胃ノ運動觸知ヲ減損スル故ニ其消化運輸ノ機轉ヲ失ヒ惡液虵蟲等逾滯著ノ其痛增長ス○或云疝痛ニ數是ヲ服スレハ内藏麻痺ノ化物轉送セス便秘ヲ爲シ其他險重ノ諸症ヲ發ス○

霍亂腹痛ハ淡稀ノ飲液ヲ多ク與テ膽液ノ酷厲毒ヲ稀釋潤渙ノ吐瀉シ易カラシメ。吐下ノ後速ニ阿芙蓉ヲ與テ其劇症ヲ救ベシ。輕症ハ多ク飲食停滯ヨリ發スル故ニ吐下ノ劑ニテ是ヲ驅除スルハ治スベシト雖モ真ノ霍亂ハ膽液腐敗シ酷厲苛烈ノ毒トナリ胃腸ヲ侵蝕メ劇痛悶亂擗掣ヲ發シ精力卒ニ虛脱メ斃ルガ故ニ是ヲ用テ其危症ヲ救ナリ

痛風傷冷毒痛此病壯熱ヲ兼ル症ハ焮衝熱ト同シ故ニ阿芙蓉害アリ。然レ其劇痛ニ因リ或ハ久ク替留スルニ因テ神經牽引攣急スルヲ甚ク是ガ爲ニ

發熱煩悶等ヲ發スル者ハ此藥ヲ用テ治スベシ。總
テ炊衝ノ候ナク虛弱ニ屬スル症ニ良効アリ。但此
病熱ナク寒性ニ在再タル症ハ阿芙蓉ヲ用ヒズ
唯刺戟衝動ノ健運強壯ニスル藥劑ヲ的當トス。然
レ夜分劇痛ヲ發ノ睡ルヲ能ハザル者ハ權ニ阿芙
蓉ヲ用テ其痛ヲ除クベシ。或ハ乙百葛格安那ヲ加
或ハ韃爾答越默室ヲ加ヘ發汗ヲ殊ニ良其痛遊走
スル者モ亦阿芙蓉良効アリ。或ハ龍腦。纈草。薄荷油
等熱性衝動ノ藥ヲ加テ良。此症多クハ患者虛弱ニ
ノ神經ノ感動甚キニ因リ且表發ノ蒸氣壅塞ノ發

スレバナナリ。○痛風ニ妄ニ阿芙蓉劑ヲ投ノ的當セ
ザレバ患部拘強攣縮ノ頑麻不遂シ或脚痛ニ是ヲ
外敷メ痛増發スル者アリ。故ニ尤戒慎ヲ加フベシ
頭痛耳痛偏頭痛耳痛ノ炊衝ナク病性沈重潛滯セ
ル症ハ阿芙蓉効アリ。○痙攣ノ運動ヨリ發スル頭
痛ハ此藥ヲ膏藥ニ加ヘ患部ニ貼スレバ治ス。○傷
冷毒ヨリ發スル耳痛ハ阿芙蓉丁幾去爾テインキテタル後ニ綿
ニ浸シ耳中ニ挿テ速効アリ。○耳中ノ炊腫痛ニハ
是ヲ施メ害アリ。一患者耳中炊腫メ劇痛ス。是ヲ耳
孔ニ挿テ其痛逾甚ク肢體顫振セリ

齒痛 傷冷毒ヨリ發スル齒痛ハ阿芙蓉一匁ヲ丸ト
 シ其齒ニ挿シ或ハ阿芙蓉丁幾去爾ヲ綿ニ濕メ齒
 孔ニ入レ若クハ是ヲ痛アル方ノ耳中ニ挿シ或ハ
 此藥一匁ヲ膏藥ニ和メ患處ノ外部或ハ耳後ニ貼
 メ効アリ。是レ阿芙蓉ノ酷厲毒ニテ患部ヲ刺戟衝
 動メ其痛ヲ驅散シ或ハ唾涎ヲ湧起メ其毒ヲ排泄
 スルナリ或ハ發泡藥ヲ痛處ノ外部ニ貼シ其毒ヲ
 引泄メ後阿芙蓉ヲ膏藥ニ加ヘ貼メ効アリ○總テ
 焮衝ヲ兼ル齒痛ハ是ヲ外敷メ焮痛増發ス
 痙攣諸症 胃痙 在再タル心腹痛ノ發止時ア 八痙攣
 リ留飲停滯ノ嘔吐ヲ兼ル症

リ運動ヨリ發スル者多シ此症ハ阿芙蓉良効アリ
 但患人壯實胃中粘液留飲鬱滯スル者ハ先吐劑ヲ
 與テ吐セシメ胃ヲ淨刷メ後是ヲ用ベシ○痙攣ノ
 運動ニ因テ心動悸喘急 重訂内科撰要喘急篇 小便
 不利小便閉 重訂内科撰要尿管閉篇 大便閉 子宮衝逆
 症多ヲ發スル者多シ皆阿芙蓉殊効アリ但小便閉
 ハヨク其原由ヲ察スベシ。痙急ヨリ發スル症ニ非
 レバ此藥甚ダ害アレバナリ○痙攣ノ運動ニ因テ
 子宮口。攣縮シ難産ニ罹ル者ハ阿芙蓉ヲ用ヒテ良
 効アリ

子宮衝逆 此症發作スレバ通例阿芙蓉ヲ用ヒ鎮痙ノ良藥トス。但數發作スル症ニ殊効アリ。稀ニ發メ患者壯實脈強。顔面貫盈。赤色ヲ帶ル症ニハ害アリ。其他痙攣ニ屬スル諸症。脾病等ノ發作ニモ實症ニハ的當セズ。又長服ノ病ヲ根治スル藥ニ非ス。嘔吐 胃中汚物惡液ナク唯胃ノ攣急逆行ノ運動ヨリ發スル嘔吐ハ是ヲ用ヒテ速効アリ。呃逆モ是ニ同ジ。或ハ龍腦ト阿芙蓉ヲ膏藥ニ加ヘ。若クハ阿芙蓉^{ライキ}幾去^ラ爾ニ温タル毛布ヲ蘸シ心窩ニ貼メ効アリ。○然レハ阿芙蓉ノミナラズ總テ麻藥ハ刺戟衝動

スルヲ以テ輕キ嘔吐ヲ起スヲアリ。故ニ胃中停滯アル症ニ用レバ嘔吐ヲ増劇ス。○効嗽 効劇クノ安眠スルヲ能ハザレバ患者虛憊ノ諸症増發ス。故ニ此藥ヲ用テ其効ヲ鎮ムベシ。但嗽衝ノ症アル者ハ嗽衝解散メ後用ベシ。○傷冷毒等總テ酷厲液ノ肺氣管ヲ衝動メ發スル効ニハ阿芙蓉劑良驗アリ。○疫効^{百日}ノ初發。病毒惡液過盛ナル症或ハ嗽衝ヲ兼者ハ阿芙蓉害アリ。此症ハ吐劑及下劑ヲ用ヒ或ハ粘痰ヲ驅除スル劑ヲ用ヒ大抵病毒去レハ其効在再タル症ハ此藥ヲ一味與ヘ或

乙百葛格安那ヲ加ヘ用テ良又左ノ方殊効アリ

芙蓉按爾撒謨丸 各十五丸

阿芙蓉 各十五丸

按爾撒謨格洋霍 適宜

右調和ノ三十丸トシニ時ニ一丸宛服ス。但其症ノ

輕重ニ隨テ増減ス。○凡胸ノ狹窄ナル人。或ハ呼吸

短促ノ患アル者ニ阿芙蓉ヲ用レバ其症逾増劇ス

○勞瘵様ノ羸瘦病多クハ効ヲ兼ヌ。此症阿芙蓉劑

ヲ用レバ効嗽不寐等暫ク快愈ヲ得レハ是畢竟死

ヲ促スナリ其故ハ多ク勞瘵ノ患者ヲ觀ルニ貧家

ハ阿芙蓉ヲ用ル能ハズノ効嗽不寐等ヲ耐忍ヒ

日ヲ消ル間。自然精良能ヲ以テ病毒ヲ諸竅ニ排

泄シ諸症大ニ輕差ヲ得ルヲ見リ然レ其症全治ス

ベキニ非レバ日ニ痰沫ヲ吐キ漸ク罷極ノ終ニ死

然レ病ノ進リ綏慢ニテ諸症亦劇シカラズ。瘦削ス

ル下骸骨ノ如クナレハ死ニ臨テ精神亂レズ。較著

ノ患苦ナシ富貴ノ徒ハ僅ノ患症ニモ耐忍フ。能

ハズ。衆醫會議シ每症捷効ノ藥ヲ要メ暫時ノ寛解

ヲ取り或ハ不寐効嗽ニ堪ザレバ阿芙蓉劑ヲ與テ

一旦ノ輕快ヲ得レバ漸ク慣ルニ隨ヒ服量ヲ加ヘ
 ガレバ効ナク終ニ是ガ爲ニ精力衰弊シ諸症増劇
 シ睡中安カラズ常ニ神思朦昧ノ悒悶シ頭重ク眼
 昏ク呼吸促迫或ハ精神錯亂下利等ヲ發メ死ス
 或ハ肺瘍ノ酷厲液侵刺ノ效甚キ者ニ阿芙蓉ヲ用
 レバ效差堪易シト雖モ其敗膿壞液ヲ吐キ除ク
 能ハズ鬱積ノ肺ヲ壓迫シ更ニ激衝ヲ生メ呼吸促
 迫シ或ハ其膿肺ノ靜血脈ニ吸收セラレテ血中ニ
 泛濫シ膿熱ヲ増發メ血液逾腐敗ニ幾多ノ惡症患
 苦死ニ至ルマデ休メテ大シ熱ハ患ヲ除クニ資ス

失血 諸失血ヲ止ルニ阿芙蓉峻効アリ。然レ患者多
 血ニメ失血少キ症ニ早ク是ヲ用レバ瘀血ヲ閉澁
 ノ大害ヲ致シ或ハ其血ヲメ熱沸セシムル故ニ却
 テ失血ヲ増發スルコトアリ。下血赤痢等亦此ニ同シ
吐血 此症阿芙蓉良効アリ。然レ多血ノ症ハ刺絡ヲ
 施メ後。是ヲ與フベシ。○痙攣ノ運動ヨリ吐血ヲ爲
 スト甚ダ多シ。此症阿芙蓉尤驗アリ肺藏大ニ擧急
 メ氣管喉頭ヲ衝動シ效休メノ吐血スル者ハ甚ダ
 危篤トス。此症亦阿芙蓉良効アリ。○神思ノ勞動ニ
 因リ或ハ子宮衝逆ヲ兼ル吐血ハ胃腸ニ鬱滯セル

汚液ヲ疏滌メ後。是ヲ用テ捷効アリ。○痔血或ハ月經等閉滯スルヨリ吐血ヲ發スル。亦多シ。痔血壅滯ヨリ來ルハ此藥ニ硫黃ト苦鹽馮利鹽。芒硝。霸王鹽。孕藥。酒石。人類ヲ加ヘ用ヒテ其痔血ヲ通メ治スベシ。經閉ヨリ來ルハ經血ヲ通シ兼テ肺病ヲ治スル藥ヲ用フベシ。假令バ沒藥。瓦爾拔奴謨。雜腹蘭ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用ルガ如シ。皆良驗アリ。

嘔血此症ハ阿芙蓉ヲ桂ノ製劑桂ノ露水。丁香。幾去。加ヘ用テ其危篤ヲ防キ或ハ適宜ノ強壯劑ヲ兼用シ或ハ其酷厲液ノ侵刺衝動ヲ緩和シ血絡ノ破綻

ヲ收斂スル藥ヲ加ヘ用ベシ。假令バ左ノ方ノ如シ

芙蓉桂麥飲五ノ

桂丁幾去爾二錢

大麥煮汁六勺

舍電發謨。阿芙蓉液一錢

薄荷。舍利別六錢

拳參根。越幾斯劑二錢

右調和シ四分時ニ一匙宛用ヒ。其症治スルニ隨ヒ服量ヲ減スベシ。○嘔血ニ大熱ヲ兼子或ハ血液腐敗ニ進ミ殊ニ患者熱性ニ膽液過多ノ候アルハ

右ノ劑ニ明礬少許ヲ加ヘ或ハ收斂亞的兒アテルノ條レヲ加ヘ用ヒテ大効アリ血ニ大効アリ
婦人崩漏崩漏ニ子宮衝逆ノ症ヲ兼ルハ阿芙蓉良効アリ。殊ニ脉數ニノ牽縮シ。顛振顛動。罷勞困倦。手足冷テ血。大ニ子宮ニ走注スル症ハ前サキノ芙蓉桂麥飲。峻効アリ。○崩漏已甚ハナハシク且連絲ノ歇ヤマザル症ハ阿芙蓉ニ明礬ヲ加用ヒ或ハ阿芙蓉ヲ越栗失爾ヒツト楮篤立リ沃利リ條ニ溶シ用テ速効アリ但此症數日替留スレバ危篤ニ至ルガ故ニ收斂鐵液鐵ノヲ用テ速ニ閉止スルモ亦良○產後崩漏ノ治法モ亦右ノ如

シ。痙攣ノ運動ヨリ來ル崩漏ハ阿芙蓉殊ニ適効アリ

赤痢下利 赤痢ハ通例。膽液熱或ハ傷冷毒ヨリ發ス

ル者居多ホシ膽液腐敗シ酷厲毒トナリ熱病ヲ發ス是

傷冷毒内鬱ノ腸ヲ侵此症ハ胃及ビ腸ニ鬱蓄セル

酷厲腐敗ノ毒ヲ滌除ノ後阿芙蓉ヲ用テ腸ノ攪擾

感觸ノ甚キヲ靜止シ且表發ノ蒸氣ヲ排泄ノ殊効

アリ○大抵痢ノ初發ニ於テ炮大黃ヲ加ル下劑ヲ

用テ腸ノ汚物ヲ淨刷シ爾後阿芙蓉劑ヲ用テ腸ノ

攪擾ヲ靜止スベシ○炊衝熱ヲ兼子或ハ病毒汚物

胃腸ニ鬱積セルヲ驅除セズ早ク阿芙蓉ヲ用レバ

腸ニ激衝ヲ生シ精力速ニ脱缺ノ死ス。故ニ此病ニ
ハ最モ戒慎ヲ加フベシ。○然レ悪性ノ痢ハ酷厲腐
敗ノ毒。甚ダ夥キ故ニ隨テ下セバ隨テ聚リ。日夜努
責下注ノ休歇ノ期アルヲナク患者遂ニ虚脱ノ斃
ルカ故ニ速ニ多ク阿芙蓉ヲ與ヘテ其精力ヲ保護
スベシ。假令バ阿芙蓉十二匁許モ一晝夜ニ用ヘシ
或ハ桂露亞刺比亞趨謨漿ニ溶シ用ヘ尤良。○或ハ
發熱下利腹痛等ノ發止増減スル症アリ。多クハ夜
分増劇シ朝ハ寛解ス。此症ハ毎夜發作ノ初ニ阿芙
蓉ヲ與フベシ。○或ハ腹痛發止ナク連綿ノ休ザル

症ハ此藥ヲ以テ少許宛頻々ニ與フベシ或ハ左ノ
方良驗アリ

芙蓉定痛飲

黙栗薩水 四勺
亞刺比亞趨謨末 二勺
阿芙蓉 二匁
阿利襪油 各四錢
過爾託亞舍利別 各四錢
右調勻シ半時ニ一匙宛用フ
○下利ニ發熱激衝ヲ兼ルヲナク數日休マザル症

ハ動モスレバ爾後發熱シ次テ諸症ヲ發スルコトアリ。此症ハ初起未ダ發熱セザル時ニ於テ阿芙蓉劑ヲ用ヒテ其下利ヲ治スベシ。○傷冷毒ニ由テ蒸發氣ヲ壅遏シ痢疾ヲ發スル者多シ。此症ハ阿芙蓉一味少許宛用ヒ或ハ乙百葛格安那亞刺比亞越謨等ヲ加ヘ用ヒテ良効アリ左ノ方尤良

越謨芙蓉散

亞刺比亞越謨

甘草 各四ツ

乙百葛格安那

阿芙蓉 二ツ

右散劑トシ分テ八服トシ一時ニ一服宛飲液ニテ送下ス。○凡ソ下利ハ初發ニ下劑ヲ用ヒ病毒ヲ掃除ノ後治セザル者ハ阿芙蓉劑ヲ與テ下利ヲ止メ患者ヲ安眠セシメテ治スベシ。但下利及痢疾共ニ病毒惡液漸次ニ腸ニ聚リ鬱積スルコトアル故ニ此藥ヲ連服スレバ毒ニ其毒ヲ閉澁スルノミナラズ其熱性ノ沸蒸ヨリ風氣ヲ生メ胃腸大ニ膨脹シ或ハ腸ニ激衝ヲ生メ熱壞疽トナリ。腹滿煩燥ノ死スル者少カラズ。故ニ其病毒ノ鬱滯ニ意ヲ用ヒテ時々

下劑ヲ兼用シ或ハ阿芙蓉ヲ投ノ諸症減セザル者
 ハ仍不病毒鬱滯ノ候トシ更ニ下劑ヲ與フベシ。能ク
 胃腸ヲ淨刷メ後。少許是ヲ用レハ其擧急速ニ緩弛
 シ痞氣自ラ消散シ腹脹亦隨テ治ス
 [阿芙蓉加下劑] 凡阿芙蓉ヲ用レバ大便秘結ヲ患故
 ニ頑固ノ劇痛アル諸病ニ用ヒテ便秘スル者ハ是
 ヲ下劑ニ加ヘ用フベシ一婦人子宮ニ癌様ノ潰瘍
 ヲ生シ。穢液浸淫流泄ノ劇痛ニ堪ズ。阿芙蓉ヲ用
 バ便秘ノ腹滿ヲ患フ。因テ左ノ劑ヲ製シ用ルニ其
 痛消メ安眠シ。大便ヨク通利ノ殊効ヲ得タリ

芙蓉旃那飲

芙蓉旃那葉 三錢

右水適宜ニ加ヘ浸メ藥氣ヲ出シ。漚過メ其液六分
 ヲ取リ左ノ藥ヲ加フ
 大相覆益舍利別阿芙蓉液 四
 味電發謨阿芙蓉液 四
 既密涅刺爾鎮痛液 二
 右調和シ一時ニ一匙宛用フ。但其症ニ隨テ加減ス
 [開歇熱] 患者天質薄弱若クハ衰老ノ人。惡性ノ開歇
 熱ニ罹レバ動モスレバ速ニ危篤至ル死スル者

アリ。此症ハ揮發衝動ノ藥ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用ヒ
峻効アリ。幾那^{キナ}勝^シリ。○胃腸ニ粘穢惡液鬱積
セル諸症^{嘔噦不食口苦舌苔心下痞硬腹滿便閉等}。ア非^ア或^ハ發作ノ熱
過多ニノ熾衝ノ候アル者ハ阿芙蓉ヲ禁ス。○發作
ノ初起。惡寒戰慄^アレ^レ是^ニ對抗スル大熱ヲ發セ
ズ。脉小^ニノ振惕^ト動スル症ハ阿芙蓉ヲ用テ大効
アリ。○患者開日^ニ於テモ肢體大ニ勞倦シ精力虛
乏ヲ覺^ス。動^モスレバ眩運シ汗ナク小便^ニ黧澹色^ト。或
ハ神經熱樣ノ諸症ヲ發シ。幾那^{キナ}ヲ用レ^レ効ナク。或
ハ一處^ニ著^テ變移セザル疼痛アリ。或ハ痙攣運動

ノ諸症アル者ハ是皆神經ノ感動スル^ト甚キ候ト
ス。斯ノ如キ症ハ其初惡寒ノ時。服量稍多ク阿芙蓉
ヲ與レバ治スル^ト速ナリ。或ハ是ヲ揮發衝動ノ藥
續草^{山奈昆荅刺越兒發桂}。肉豆蔻^{鹿角鹽龍腦麝香等}ニ加ヘ發作ノ四分時前
ヨリ半時^毎ニ用ヒテ其熱盡ク解散スルニ至ルベ
シ其熱ナキ間ハ幾那^{キナ}ヲ用ヒ或ハ幾那^{キナ}ニ阿芙蓉及
ビ金硫黃ヲ加ヘ用ヒテ峻効アリ。
神經熱 神經熱ノ患者疲勞倦卧ノ睡ル^ト多キ症ハ
阿芙蓉的當セズ然^レ其症變ノ神思ノ感動甚ク。精
神醒了。夜間耿々トノ睫ヲ交ヘズ。物響光輝ノ耳目

ニ徹スルコト太甚。脉疾數。牽急。肌膚乾燥スル等ノ症
ヲ見ハス者ハ是レ痙攣ノ運動ヨリ發スル症ニ
阿芙蓉良驗アリ○遷延神經熱ハ阿芙蓉總テ的當
シ害アルコト稀ナリ。此病最モ險重ニ至リ痙攣ノ運
動ニ因テ不寐煩悶譫語。脉小弱。皮膚乾燥スル症ハ
此藥殊ニ驗アリ○總テ遷延緩慢ナル神經ノ諸症
及ビ虛弱ニ屬スル痙攣搐掣ノ諸症ハ此藥偉効ア
リ○神經熱及ビ腐敗熱重訂内科撰要及本ノ患者
虛脫衰弊ノ痙衝及ビ肢節痛ヲ兼ル者ハ阿芙蓉ヲ
用ヒテ効多シ

胃腸熱

胃及ビ腸ニ腐敗酷厲ノ毒アリテ發スル熱病ナリ。重訂内科撰要熱病篇第十五章第十

六章 出 此病。壯熱痙衝ノ症アル間ハ阿芙蓉的當セズ
吐劑或ハ下劑ヲ用ヒテ胃腸ヲ淨刷スベシ但シ其病
末。患者虛憊ノ下利ヲ發シ或ハ既ニ病毒ヲ驅除ス
レ氏治セズ。虛罷ノ神經熱トナル者ハ此藥ヲ用ヒ
テ良効アリ
痙衝病 重訂内科撰要黃疸篇第六十七章ニ註ス 痙衝熱ハ患者壯實ニ
疼痛アル症ニ阿芙蓉ヲ用レバ其症逾増長メ譫
語或ハ昏睡等ヲ發ス。但シ劇症退キ脉和シ漸ク蒸氣
ヲ發メ遍體津潤アリ。舌苔去リ小便多ク通利スル

二至天唯感觸甚久不寐苦煩疼痛等又患此者ハ
 此藥ヲ與ヘテ良驗アリ○焮衝熱ニ數刺絡ヲ施シ
 或ハ清涼下劑等。法ノ如ク用レテ其脉仍強ニテ牽
 急。肌膚燥キ小便黦澹色ナル者ハ阿芙蓉ヲ用ヒテ
 其痙攣ノ運動ヲ靜止メ治スベシ
 腦焮衝 重訂内科撰要精神錯亂篇第百三十三章ノ腦膜焮衝是ナリ 此病ハ阿芙
 蓉害アリ。但適宜ノ通利アレバ痙攣ノ運動ニ因テ
 病勢依然トメ減セズ譫語等休マザル者。或ハ脉小
 ニ弱肢體顫振調動シ元運氣ノ沈垂乏弱ナル症
 ハ此藥ヲ用ヒテ良効アリ

胸脇焮衝。肺焮衝

重訂内科撰要胸脇痛篇第百八十七章。肺痛篇第百八十七章ニ出ヅ

此焮衝劇盛ナル者ハ阿芙蓉害アリ。但刺絡ヲ施シ
 清涼和解ノ劑ヲ用ヒテ其劇症解散スレバ脉小ニ
 ノ牽急シ。疼痛煩悶休ザル者ハ是痙攣ノ運動仍解
 セザル候トス阿芙蓉ヲ用ヒテ其痙攣ヲ靜止シテ
 治スベシ○其焮衝解散スレバ嗽劇クメ休ザル
 ハ此藥殊ニ効アリ○咽喉焮腫ニ阿芙蓉ノ効アル
 日亦右ノ諸症ト同シ
 胃焮衝 胃及ヒ腸焮衝ノ症治重訂内科撰要心腹痛篇第百三十三章ニ註ス 此病。胸脇
 焮衝。肺焮衝ニ比スレバ阿芙蓉ヨク適應ス。初發焮

衝ノ劇盛ナル諸症退クハ速ニ是ヲ用ヒテ其疼

痛攣急等ヲ静止スベシ。此病ハ亞刺比亞アキア護漿ゴム及

ド汞劑規吉等ヲ加ヘ用ヒテ殊ニ良。又病末ニ至

テ患者感動甚ク。痙攣ノ運動ヨリ發スル諸症多者

ハ此藥尤的當ス。○腸焮衝ニ此藥ヲ用ル標的亦右

ノ焮衝ト同シ其焮衝ノ用ハ其焮衝ノ補止ニ

肝焮衝重訂内科撰要呃逆篇其焮衝ノ諸症退キ唯

患者虚罷ノ痙攣ノ運動ヨリ發スル諸症ヲ兼ル者

ハ此藥良驗アリ凡、肝焮衝ハ是水銀劑加用テ効多シ

黄疽痙攣ノ運動ヨリ膽液管攣急ノ黄疽ヲ發スル

者多シ重訂内科撰要黄疽篇第六十五章ニ出或種々ノ起因ヨリ攣急

ヲ發シ黄疽險重トナル者亦少カラズ。斯ノ如キ症

ハ阿芙蓉殊効アリ總テ焮衝壯熱ナク患者虚弱ニ

ノ拘攣掣急ノ症即、痙攣ノ運動アル黄疽ニ用テ良効アリ

腎焮衝重訂内科撰要尿閉篇第此病モ亦法ノ如ク

治療ヲ施シ焮衝大抵退キ唯患者罷勞ノ痙攣ノ運

動ヨリ發スル患症アル者ニ此藥ヲ用ヒテ殊効ア

リ○腎膀胱尿道ノ焮衝痛及ビ結石アリテ焮衝痛ス

ル者ハ一兩回刺絡ノ十分瀉血シ必モ焮衝ノ恐レ

ナキニ至テ甘和ノ藥ニ阿芙蓉ヲ加ヘ用ヒテ速効

アリ。左ノ方亦驗多シ

芙蓉消厲飲

阿利襪油 新者

白罌粟舍利別

斯百兒麻攝的

雞子黃

右研和シ四分時ニ一匙宛用フ。但其症ニ隨加減

焮腫眼 初發焮腫劇キ時ハ此藥ヲ施メ害アリ。但其

焮腫減スレバ其痛解セザル者ハ是ヲ眼劑ニ加ヘ

外敷メ良驗アリ。或ハ加羅蔑兒若クハ韃爾答越默

室^チ或ハ龍腦ヲ加ヘ施メ尤良。又左ノ方峻効アリ

點眼芙蓉乳

其龍腦 五瓦

甘扁桃 二錢

右水適宜ニ加ヘ細ニ搗テ乳白色ノ液ト爲シ。漉過

シ此液四弓ヲ取テ左ノ藥ヲ加フ由テ此藥

鉛糖 七瓦

舍電發謨阿芙蓉液 四十滴

亞鉛華 一瓦

右研和シ是ヲ四襲ノ布ニ濕メ眼ニ貼シ數更換ス

狂癩患者壯實ニノ脉強盈。狂躁強暴荒亂劇盛ナル
 症ハ刺絡或ハ吐下劑ヲ施シ其後狂症仍休ヤザル者
 ハ阿芙蓉ヲ饒多ニ用ヒテ間大効アリ。但、神經衰弱
 ノ諸症アル者尤効多シ。○神思ノ擾動。恐怖。驚駭。怒
 慍。懊恨等總テ思慮ノ抑遏鬱結ニ由テ沈黙憂悶シ
 狂錯スル症ハ此藥効多シ。但、是ヲ用ヒテ十分熟睡
 スルニ非レバ驗ナシ。故ニ漸ク服量ヲ加テ一ノ或
 ハ其餘モ與フベシ。○此藥。癩ニ用ヒテ驗多シ。然、
 亦服量多カラザレバ効ナシ。但、是ヲ用ヒテ的當セ
 ザレバ發狂スル者アリ

胎産

阿芙蓉ハ孕婦産婦及ビ産後乳婦ノ諸症ヲ治
 スル一良藥トス。○孕婦。神經ノ感動甚キ者。輕キハ
 惡阻ヲ爲シ重キハ頭旋昏眩等ヲ發ス。此ハ阿芙蓉
 ヲ揮發香竄ノ藥ニ加ヘ用ヒテ捷効アリ。此症殊ニ
 甘消石精良驗アリ。○孕婦ノ墮胎シ易キハ多クハ
 子宮ノ感動甚キヨリ發ス。是ヲ防護スルニハ幾キナ那
 ニ阿芙蓉ヲ加ヘ大抵受胎ノ後三月頃ヨリ毎日少
 許宛用ヒ漸ク子宮ノ感動ヲ鎮定ノ臨月ニ至ルベ
 シ。○臨産ノ婦人ハ適宜ノ時節ニ阿芙蓉ヲ用レバ
 ヲク難産ヲ防護ス。其故ハ子宮ニ攣急ヲ發シ逆換

ノ運動ヲ爲シ兒頭ノ常位ヲ變セシメ。以テ難産ヲ致スガ故ニ阿芙蓉ヲ用ヒテ預メ其痙攣ヲ鎮定スレバナリ○此藥ハ分娩ノ陣痛ヲ進起メ催生シ又産後ノ腹痛ヲ靜止スルニ驗アリ是其効相反スルガ如シト雖モ其拘攣ヲ緩解スルニ於テハ一ナリ

痘疹 虛痘ハ總テ阿芙蓉良驗アリ。患兒虛弱ニシテ痘色黪澹或ハ陷塌スルニ尤良○惡性ノ痘ヲ驅發スルニ龍腦ヲ加ヘ用ヒテ峻効アリ○血液ノ運行怠慢乏弱ニシテ痘發越シ難ク或ハ發メ起脹セス或ハ善膿ヲ醸シ難キ等皆此藥ヲ用ヒテ尤良○但灌膿

ノ時。膿熱甚クノ内藏焮衝ノ候アル者ハ此藥大ニ害アリ。此症ハ下劑ヲ用ヒ内部ヲ疏通ノ壅滯セシメザルヲ肝要トス○痘毒過多ニシテ熱多キ症ハ刺絡ヲ的當トシ阿芙蓉ヲ禁ス。但刺絡ヲ施シ或ハ吐下劑ヲ用ヒテ瞑眩甚キ者ハ此藥ヲ用ヒテ其諸症ヲ鎮定スベシ○或云。痘色灰白陷塌スル症ハ是ヲ水銀劑ニ加ヘ用ヒテ効アリト。然レ水銀劑ハ血ヲ焯解メ稀薄ナラシメ宛モ險痘ノ血液腐敗メ焯解セルガ如ク爲ス故ニ妄ニ是ヲ用ヒ難シ○麻疹ハ其壯熱焮衝去テ後。欬劇クメ休ザル症ニ此藥ヲ

和胸劑ニ加ヘ用ヒテ捷効アリ
微毒 往古阿芙蓉ヲ微毒ノ諸症ニ用ヒテ良効ヲ稱スルヲ宛モ水銀ノ如ク殆ト微毒ヲ治スル藥ノ如クス。晚近ニ至テハ唯其毒肢體各部ニ著テ疼痛ニ堪ザルヲ治シ或ハ陰頭包皮罩丸等ノ劇キ腫痛ヲ止ルニ用フ○微毒ニ多ク水銀劑ヲ投メ後各部疼痛ヲ發シ或ハ夜中其疼増發シ荏苒トハ解セザル症或ハ患者虚憊ノ痛ニ耐ザル等ヲ治スルニ用フ
佝僂 小兒稟賦薄弱ニハ佝僂ノ候アリ或ハ腺腫瘰癧アリテ下利ヲ發スル者ハ制酸土質ノ劑鐵劑幾

那劑等其症ニ隨テ擇ニ是ニ阿芙蓉少許ヲ加ヘ用ヒテ殊効アリ
水腫 凡ハ水腫ニ痙攣ノ運動ヲ兼ル者ハ阿芙蓉間大効アリ或ハ是ヲ驅水ノ峻藥ニ加ヘ用ルモ良。又能ク發汗ス○或ハ峻攻ノ驅水藥ヲ投メ劇痛ヲ發スルニ用フ○阿芙蓉一匁ニ羌朮末半匁ヲ加ヘ丸藥トシ一服下シ朝夕一服宛水腫ニ用ヒテ驅水ノ峻藥トス。間良効アリ
癌 此瘡治シ難シト雖モ唯其劇痛ニ堪ザル氏ハ阿芙蓉ヲ用ヒテ暫ク其痛ヲ除ク人ニ是宛モ醉人ノ

痛痒ヲ知覺セザルガ如シ○或云乳癌其他癌様腐爛ノ潰瘍劇痛アル症ニ數阿芙蓉ヲ内服シ或ハ外敷スレバ其痛大ニ寛解スレバ藥氣消スレバ復痛云其瘡增長シ或ハ惡症ヲ發シ畢竟死期ヲ促スト
貌儂屈 貌儂屈ハ重訂内科撰要第百二章ニ註ス又口中轉屎篇第二百五十四章ニ出此病
腹筋攣急牽縮シ或ハ腸ノ位置ヲ失ヒ緊搾スルニ因テ嘔吐呃逆等ヲ發シ少モ焮衝ノ候ナキ者ハ阿芙蓉ヲ用ヒテ良驗アリ然レ痞氣鬱蓄或ハ大便閉滯或ハ腸ノ下墜突出甚キヨリ右ノ諸症ヲ發シ或ハ腸ノ膨突緊搾又焮腫スルヨリ發スル者多シ此

症ハ清涼瀉下ノ吉利詞參兒ヲ施シ疏滌メ治スベシ。是ニ阿芙蓉劑ヲ用レバ其壅塞焮腫等ヲ増發ノ寒壞疽トナリ死ス或云貌儂屈ニ此藥ヲ用レバ其絞痛及ビ呃逆増劇ス又云一患者腸貌儂屈ニ因テ腸ニ焮衝ヲ發ス一外科手術ヲ以テ其挺突セル腸ヲ腹内ニ納テ本位ニ復スルニ因テ其痛大ニ減ス。是ニ阿芙蓉ヲ與レハ忽チ大腹痛ヲ發ノ言語蹇澁シ半日許ニシテ死ス是皆審ニ其因症ヲ察セザレバナリ○陰囊ノ貌儂屈 漢人所謂癩疝ヲ收納ルニ就テ痛ニ堪ス或ハ其痙攣ノ運動ヲ鎮定スルニ阿芙蓉ヲ破

氣驅風ノ藥氣加へ用ヒテ良驗アリ。又此症左ノ方殊効アリ

荷蓉定痛飲

長薄荷水四多

舍電發謨阿芙蓉液二十滴

密涅刺爾鎮痛液一錢

右調和シ一匙宛用テ半時ニ十匙許用ヒ其症全愈

スルニ至ルベシ頑固ノ症ハ阿芙蓉液ノ量ヲ加フ

ベシ

石淋痛此病ノ劇痛ヲ止メ攀急ヲ弛メテ輸尿管膀胱

胱ニ懸留セル結石ヲ導下スニ阿芙蓉液五十滴ヨ

リ六十滴マデ用フ。少許用レバ却テ攀急ヲ増ス

犬咬傷咬傷ニ瘡ヲ發スルハ死候トス然レ阿芙蓉

ヲ用ヒテ開奇効アリ。初メ少許宛用ヒ漸ク加テ半

時ニ一匁宛用ベシ○此病嚙下ヲ妨ハ咽喉焮衝ニ

因ズメ瘡攀ニ係故ニ阿芙蓉丁幾去爾即チ阿芙

蓉液ナリニ油ヲ加へ口顎頸等ノ肌膚ニ塗テ良効アリ○或云。

速ニ其創口ヲ切斷メ是ヲ用ザレバ効ナシ○或云。

犬咬傷。蝮蛇咬等ニ的里亞加其他阿芙蓉劑ヲ内服

シ或ハ外敷メ奇効ヲ稱スルト古今定説ノ如シ。是

遠西各物考 卷十七

ヲ研究スルニ凡、阿芙蓉劑ヲ其創ニ外敷スレバ專
 之侵刺衝動ノ膿ヲ釀シ其毒ヲ排泄ス。内服スレバ
 發汗ノ其毒ヲ血中ヨリ驅發スルニ因テ良驗ヲ得
 ルナリト
 創傷 神經ヲ毀傷シ或ハ骨傷ノ碎骨侵刺シ或ハ壞
 疽ノ肢節ヲ截斷シ或ハ結石ヲ截出ス等ニ因テ疼
 痛ニ堪ズ若クハ瘡ヲ發スル者ハ阿芙蓉。服量稍多
 ク用ヒテ是ヲ鎮定スベシ。○創ヲ被リ瘡ヲ發ノ牙
 關緊急スル者ハ危症トス間阿芙蓉ヲ用ヒテ救フ
 可アリ。○或云。創ヲ被リ失血過多ニテ瘡ヲ發スル

者ハ此藥ヲ用ヒテ効ナシ其出血止ム片ハ滋養ノ
 肉羹汁及ビ葡萄酒ヲ與テ患者ノ精力ヲ回復シ治
 スベシト。○或云骨傷ノ部焮腫スレバ患者轉リ難
 夕睡レバ驚悸惕動ノ寤メ自ラ患部ヲ動揺スル故
 ニ傷骨相摩シ鳴テ疼痛ニ堪ズ。是ニ由テ未熟ノ醫
 ハ多ク縛帶ヲ施シ緊禁シ又睡中驚悸ヲ治センガ
 爲ニ阿芙蓉ヲ内服セシム。然レ是ニ由テ諸症逾増
 長シ縛帶ノ緊禁ニ由テ患部遂ニ壞疽トナル者多
 シ此症ハ嚴ニ熱性ノ劑及ビ阿芙蓉ヲ禁シ縛帶ヲ
 緩クシ刺絡ヲ施シ清涼劑ヲ與ヘ飲食ヲ減スレバ

諸症自_レ回復ス○或云。壞疽等ノ肢節ヲ截斷スル
 一就_レ天_レ其_レ一時若_レ夕ハ一時半前ニ阿芙蓉ヲ用_レバ
 其痛減_レノ堪_レ易_レシ但_レ截斷_レノ後數_レ是_レヲ用_レハ害_レアリ
 若_レシ神經多_キ部ヲ截斷_レノ攀急搐掣ヲ發_レシ或_レハ血
 ノ運行急疾ニ_レ發熱スル者ハ速ニ刺絡ヲ施_レ下
 劑ヲ用_レテ清涼ノ効_レアル飲食ヲ與_レテ治スルヲ尤
 良トス○或云。壞疽ノ部ヲ截斷スル等ニテ怯弱ノ
 患者ハ其疼ニ堪_レズ或_レハ搐掣ヲ發スル故ニ患者ヲ
 ヲ昏睡_レ又其痛ヲ知覺セザラシムルガ爲ニ阿芙蓉
 ヲ用_レル者アリ。然_レニ多_ク與_レ患者ヲ昏睡_レノ肢節

ヲ割斷ス_レニ毫_モ主_レ知覺ナ_キニ至_レシ_レハ其_レ竟ニ
 蘇復スルヲ得_レズ是_レガ爲ニ服量ヲ減_スルハ患者
 速ニ省寤_レノ其疼ニ堪_レズ設_レ使_レ是_レヲ用_レテ其_レ功_レアル
 ガ如_キモ爾_後創熱ヲ發_レシ或_レハ其_レ創焮腫ヲ安眠ヲ
 得_レス○或云。肢節ヲ截斷_レノ後患者ヲ安眠セ_シメ_ン
 ガ爲ニ是_レヲ用_レテ肢體筋_ノ揚肉_ノ腫_ノ眠_ルヲ能_ハズ
 稍_レ眠_レハ驚悸跳動_シ患部焮腫拘攣_ス者_ハ此
 症ハ阿芙蓉ヲ用_レテ唯刺絡ヲ施_レテ清涼下劑ヲ用
 七。縛帶ヲ緩クスルヲ肝要ト_ス大抵其_レ創焮腫ス_レ
 ハ睡中驚悸モ甚_クシ是ニ膿ヲ成_ステ_ハ右ノ諸症

速ニ治ス。其膿ヲ成ス者ハ、焮腫既ニ解散スル不候
 ナレバ、大リ按ニ脱血ノ瘡ヲ發スル症ハ血液ヲ滋
 清涼ノ劑ヲ施シ、疏滌ノ治スベク、概
 ノ阿芙蓉劑ヲ用フベカラザルヲ云
外敷拈套 阿芙蓉ハ蒸湯劑。琶布軟膏。硬膏ニ加、外敷
 ノ諸疼痛ヲ止ム。琶布パップニ加、貼スレバ乾燥セズ凝結
 ヲ疏散スルニ良効アリ。○大麥粉ニ阿芙蓉水水ハ
 精製阿芙蓉三錢ヲ和シ、潰瘍ノ水綿、椽肉ニ傳テ
 溶化スル液ヲ云。ヨク消化ス。○精製阿芙蓉出次ア
 ヲ刺比亞、越、謨、漿、或
 尿道ノ焮腫ハ水銃ニテ是ヲ尿道ニ注輸ノ其痛ヲ

止ム按ニ阿芙蓉ヲ外敷ノ害アル説前ノ禁戒ノ條
 奪去シ、又、記ス如シ、然レモ、麻痺催睡ノ藥ニノ知覺ヲ
 敷ノ輕淺ノ焮腫疼痛ヲ治スヘキニ論ナシ、然レモ、外
 毒惡液過多ニノ焮腫甚キ者ハ、外敷ノ麻藥ヨク消
 散スベキニ非ズ、其熱性刺戟ノ所爲ニテ、焮熱腫痛
 ノ増長スルニ、隨テ、功害相及スト、知ルベシ、少
 諸症ノ輕重ニ、隨テ、功害相及スト、知ルベシ、少
阿芙蓉 吉利詞、參兒、阿芙蓉ヲ服スレバ、嘔吐ヲ用
 難キ者ハ、是ヲ吉利詞、參兒、ト爲シ、施者効ヲ取、成
 アリ。但其藥液少許ヲ注入ノ長ク腸中ニ留メ置ク
 ヲ專要トス。速ニ漏泄スルハ効ナシ。又粘滑ノ藥ヲ
 加テ、阿芙蓉ノ刺戟衝動スルヲ緩和スベシ、假令バ
 左ノ方ノ如シ、

芙蓉吉利詞爹兒

阿芙蓉丁幾去兒

四十滴

亞刺比亞越謨

三錢

湯

右越謨又湯ニ溶シ丁幾去兒又加。吉利詞爹兒

爲ス水銃ニテ肛門ヨリ注輸スルナリ。但阿芙蓉又吉利詞爹兒劑

ニ加ハ數注入ノ昏睡スル者ア則故ニ戒慎シ施ス

ベシ

遠西醫方名物考卷十七終

遠西醫方名物考卷十七

此卷內容為遠西醫方名物考卷十七之正文，包含多列垂直排列的醫方名稱與相關考證，因字跡極為模糊，具體內容難以辨識。

遠西醫方名物考卷十七

此卷內容為遠西醫方名物考卷十七之正文，包含多列垂直排列的醫方名稱與相關考證，因字跡極為模糊，具體內容難以辨識。

遠西醫方名物考標目

卷十八

阿芙蓉

下

精製說
阿芙蓉製劑說
精製阿芙蓉

阿芙蓉液

舍電發謨阿芙蓉液

芙蓉薄荷飲

阿魏

盧會驅蟲丸

阿魏丁幾去爾

安息香華

亞鉛

亞鉛華

鎮痙定嗽丸
皓黃膏
掃蟲銀華丸

亞兒尼加アールニカ 亞兒尼加排毒飲アールニカハイツトク

亞爾箇兒アルコホル 燒酒アールコホル

亞的兒アルテール 綠礬アルテール

亞括別涅實アルパベチ 屈多律蘭地アルパベチ 安質沒アルパベチ

亞括扒瓦アルパバ 堙尼アルパバ 升アルパバ

亞括忽爾アルホトル 扶斯アルホトル 消石アルホトル 亞爾瓦アルカワ 碌アルカワ 扶散アルカワ 安質沒アルカワ

亞兒加歌アルカカ 私寫アルカカ 瓦アルカカ 老別アルカカ 利アルカカ

過兒アルル 加奴アルル 謨アルル 需百利アルル 加アルル 點アルル 謨アルル 消石アルル

罌粟アルル 白罌粟アルル 利別アルル 罌粟子アルル 上アルル

遠西醫方名物考卷十八

榛齋先生譯述 男 宇田川榕 榕菴校補

阿芙蓉 下

精製說 阿芙蓉ヲ服ノ惡心嘔吐ヲ發スル等其他瞑

眩ニ堪タザル人ハ是ヲ精製ノ用ベシ是ニ由テ其瞑

眩ヲ爲ス所ノ華爾斯質ハル 脫ルノ趨ゴ謨ム質ハトナル故ニ性

緩和トナリ且其雜ル所ノ塵土汚物去テ淨潔トナ

ル是ヲ以テ感觸ノ甚キ人ト雖モ嘔吐ヲ起スコナ

夕生阿芙蓉ニ比スレバ危懼ナキ催眠止痛ノ良藥

トス。内服外敷ノ其効。前ニ說所ノ如シ。○服量一匁ヨリ二三匁ニ至ル。○然レ生阿芙蓉ヲ用テ嘔氣ナキ人ハ上好淨潔ノ生阿芙蓉ヲ用ベシ峻効アル。精製ノ者ニ勝レリ。或醋。橙汁。綠礬精。鹽類等ノ性功相反スル者ヲ加製ノ其悍烈ナル毒ヲ抑制スル者アリ然レ此皆其峻効ヲ奏スル所ノ主能ヲ減損スルナリ。故ニ瞑眩ヲ恐ル人ハ服量少許用ルヲ良トス。

精製阿芙蓉

ゲソイフルデヘウルサフ

阿芙蓉 一匕

沸湯 二匕

右阿芙蓉ヲ湯ニ浸シ溶化シ布片ニテ絞リ瀝シ渣ヲ去リ文火ニ上セ乾シ貯フ

又法 阿芙蓉

適宜

右硝子蟻ニ内レ水三倍量ヲ加テ文火ニ上セ。烱解ノ蜜ノ稠トナルニ至リ。温ニ乘シ絞瀝シ滓ヲ去リ復微温火ニ上セ乾固シ貯フ。○庚云。多ク湯ヲ加テ溶シ瀝過スレバ華爾斯ノ質多ク分テ渣トナリ。布片ニ殘留ルナリ湯少キハ華爾斯多ク分離セズ。是ヲ瀝スト雖モ趨謨ト混和ノ布片ニ透漏スト

又法

ヲウダニム。オホアテム。芙蓉ノ華爾斯質ヲ

遠西名物考 卷十八

又去

去ラス。唯塵土等ノ汚物ヲ除クナリ

阿芙蓉

上好者。細剉

雨水

或ハ蒸餾水ヲ用フ

右格兒弗

内レ固封シ沙火ニテ煮ル。一時許。温

乘ノ瀝シ液ヲ取り其布片ニ殘ル阿芙蓉

華爾斯

質ナヲ陶器ニ内レ文火ニ上セテ乾シ是ヲ硝子壘

内レ燒酒ヲ加テ阿芙蓉ノ上。四指横徑ニ至リ。其

口ヲ固封シ是ヲ少温ノ沙火ニ内レ置。一時許ニ

其壘ヲ取出シ。其液ヲ傾ケ寫セバ粘穢土沙等其

壘底ニ殘ル。是ヲ棄去リ其液亦前ニ取タル液ヲ各

別ニ硝子ノ鉢ニ入レ沙火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ蜜

ノ稠ト爲シ此兩個ノ液ヲ合和シ文火ニ上セ煎熬

ノ乾シ貯フ 伍 ○或云。右ノ諸法ノ如ク是ヲ精製ス

ト雖モ其嘔吐ヲ起ス所ノ華爾斯質ヲ脱スルヲ能

ハズ。盡ク其華爾斯ヲ脱メ純粹ノ麴謨質ト爲シ感

動甚キ人ニ用テ少モ妨害ナキ者ト爲シテ欲セ

バ左ノ如ク製スベシ。其法。前ニ説ク如ク是ヲ沸湯

ニ浸メ溶シ微温火上ニ置テ泡醸スル。一月許。其

間ニ液減スル片ハ時々温湯ヲ加フベシ。是ニ由テ

華爾斯質ハ盡ク其底ニ沈ミ麴謨質ノニ其湯ニ烱

化ス。即チ其底塗ヲ除キ上清ヲ取テ文火ニ上セ乾固スルナリ。又法。阿芙蓉ヲ亞爾箇兒アールグン燒酒ノ條ニ出脱ノ純精ナニ浸ス。三四日則チ其華爾斯質ハ盡ク溶化シ。越ゴ謨質ハ溶解セズ。是ニ於テ瀝テ其溶化セザル者ヲ取り乾ス。片ハ即チ純粹ノ越ゴ謨質トナリ。其性効殆ト罌粟球ノ越エ幾斯劑ノ如シ。球是レ罌粟熬固ノ膏ト爲ス者ナリ。白國越國布國福國叔國伍國罌粟ノ條ト參考スベシ。

阿芙蓉製劑說 古人以爲阿芙蓉ハ性大寒ニシテ生

活ノ温煖氣ヲ撲滅ス。故ニ過服スレハ肢體厥冷ノ死ス。ト。是ヲ以テ其寒性ヲ抑制スルガ爲ニ多ク熱

性香竄ノ藥ヲ加ヘ以テ的里亞加及密篤利太多實アスグレ亞斯格爾アスグレ需謨ニ阿芙蓉ノ如キ多味繁雜ニシテ性功相及スル藥品ヲ調和シ是ヲ以テ汗ヲ發シ下利ヲ止ル等ニ用フ。晚近ニ至テハ的里亞加劑中ノ刺長無用ノ藥品ヲ除テ簡徑適實ノ方ト爲シ是ヲ阿芙蓉昆設爾弗コンセルフト名ケテ局方ニ載ス天部ニ出ス。國ノ

○阿芙蓉液次ニ出ツヲ製スルニ精製阿芙蓉ヲ用フ。是劑中香竄ノ藥品ナキ故ニ生阿芙蓉ヲ用レバ動モスレバ惡心嘔吐ヲ發スレバナリ。舍電發謨阿芙蓉液次ニ出ツハ劑中香竄ノ藥品アル故ニ生阿芙蓉ヲ

用フ。其香竄ノ品アルハ阿芙蓉ノ寒性ヲ抑制スル
為ニ非ズ。其生阿芙蓉ノ嘔氣ヲ起スコトアルヲ静止
スルガ為ナリ

阿芙蓉液

即チ阿芙蓉アヘン下シヤ幾カ去ク爾ニ木キリラウウダダニニムムリ
ククイイダダムム又又テテイインンキキララウウララオオピピウウムムヒヒノノササ

製法

阿芙蓉 精製者 二多

葡萄酒 十五度者 四多

右硝子壺ニ内レ浸メ二日。漚過メ其液ヲ取、硝子壺

ニ内固封シ貯ス此液十氏ニ阿芙蓉一氏ヲ含リ

又法

阿芙蓉 精製者 一多

燒酒 尋常者 十多

右長キ硝子壺ニ内レ微温火ニ上セテ溶シ紙ニテ
漚シ硝子壺ニ内レ固封シ貯フ

主治 大抵舎電發謨阿芙蓉液出ツ及精製阿芙蓉ノ

如シ○服量十八滴マデ用フ是ニ慣ル者ハ三十滴
許モ用フ○此液ニ硝砂精或羯布羅油ヲ加ヘ胃瘧

前ニ疝痛。頭痛等ノ患部ニ塗テ其痛ヲ止ム○焮腫
眼ニ此液ヲ取テ二三滴宛眼ニ點ス。毎日二次或三

次其症ニ隨テ増減ス。初ハ痛ニ堪ス淚多ク出レ

固封シ貯フ疾

又法

「テイニキタルテバイカ」畢阿芙蓉赤...

阿芙蓉

精製者
二勺

桂精

十八勺

右硝子壘ニ内レ浸ス一四日。漚過メ滓ヲ去リ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ○此液十匁ニ阿芙蓉一匁許ヲ含メリ依

主治鎮痙。催睡。止痛。發汗。驅風。ノ良藥トス。嘔吐下利ヲ止メ痙攣搐掣子宮衝逆。疝痛等ヲ治スル一阿芙蓉ノ如クニノ嘔吐等ノ妨害ナシ。劑中香竄ノ品ア

レ凡阿芙蓉ノ効減セズ。又虛冷ノ病ニハ尤モ驗アリ○服量四五滴ヨリ二十滴ニ至ル○阿芙蓉ヲ服ノ嘔吐ヲ發スル患ヒアル者ハ左ノ劑ヲ用フベシ

芙蓉薄荷飲

桂露

薄荷舍利別

各二錢

阿芙蓉液 二十滴

右調和ス○痙攣ノ運動ニ因テ嘔吐休マズ藥汁咽ニ下リ難キ者ハ舍セイデン電發謨阿芙蓉液ヲ温メテ毛布ヲ蘸シ心窩ニ貼メ効アリ頭痛ニハ顛顛ニ塗リ咬

牙ニハ顯ニ擦ノ良○大便秘閉セル者ハ先ヅ下劑ヲ用ヒヨク通利ノ後此劑ヲ用フベシ。否ラザレバ諸症解散シ難シ
依(依) 疾(疾) 叔(叔) 國(國) 因(因) 藥(藥) 十(十) 日(日)

阿魏 「アサフチダ」 羅 「ドイフルス」 デレキ 蘭

是ハ百兒西亞等ノ熱國ニ産スル草根ノ脂液ヲ取曝乾ノ凝固シ大小碎塊ヲ成者ナリ。上品ハ黄色ニノ赤色或赭色ヲ帶ビ。是ニ白色若クハ帶赤色ニノ透亮光澤アル顆粒。間錯シ或淡紫ノ斑アリ。乾ケハ粘潤アリ嚼タハ齒ニ粘著ス暫ヒナク手ニ握ヒナバ軟ナル

蠟ノ如シ。然レ年ヲ經レバ稍固クノ赭黑色ヲ帶フ。其氣ニシテ蒜ノ如ク甚ダ竄透ノ嘔噦スベキ烈臭アリ。火ニ投スレバ臭氣殊ニ甚シ。其臭烈キホド逾上品トス。固封シ貯レバ數年ヲ經レハ臭氣及効力減セス。味辛苦。舌ニ鑽透ス此物黯黑色ニ汚物ヲ雜ヘ或軟ニノ脂膏ノ如ク或枯燥ノ粘潤ナク臭氣微スナキハ藥用トセス○或白色ノ華爾斯類ニ蒜ノ絞汁ヲ加搗テ乾シ下品ノ阿魏ニ雜ヘ偽者アリ是ハ疏脆ニノ碎易ク光滑多ク燒酒ニ浸バ盡溶化スルヲ以テ知ベシ○此草ノ生汁ハ臭氣極テ甚シ生汁一錢ノ

臭氣ハ乾固ノ者百北ヨリ甚シト云○其質ハ越謨
 華爾斯ナリ大約華爾斯二分越謨三分アリ。故ニ燒
 酒ニ浸セバ溶化スレモ渣脚多シ。水ニハ其越謨質
 盡ク溶化ス。醎醋ニ浸バ盡ク乳白色ノ液トナル。油
 ニ浸バ少許溶化ス。此皆越謨質多キノ徵ナリ。又精
 微ノ油及揮發鹽アリ○此脂液ヲ取草ハヘルラアッ
 サフチダ羅ペルシアンス。ホルストク蘭ト名ク。百
 兒西亞西里亞共ニ亞細亞洲國名其他印度地方ニ産ス。初根
 ヨリ葉生シ長一尺五寸許。粗糙ニシテ形芍藥ノ如ク。
 質刺發斯葉ニ似タリ葉ノ梗大指ノ如ク殆ト圓ク

是ヨリ小梗ヲ分チ小葉生ス。其後莖ヲ抽キ年ヲ經
 レバ高五六尺許。太腕ノ如シ。中實ノ髓充ツ。莖頭ニ
 大ナル繖花ヲ開キ子ヲ結ブ。此草生ノ四年ヲ經バ
 根長五尺許太人脚ノ如ク或極ヲ爲ス。外面栗殼色。
 裏白色ニシテ蘿蔔ノ如シ。是ニ乳白色ノ汁多ク。蒜臭
 極テ烈シ。根年ヲ經ニ隨ヒ其汁多ク且粘稠ナリ。氣
 ニ觸テ自ラ凝固シ黃褐色トナル。此草多年枯レズ。
 土人初夏ノ頃莖葉ヲ截去リ。根ニ土ヲ被フ。一月
 餘復新芽ヲ生スルヲ候ヒ根ノ頂ヲ截斷スレバ白
 汁滿溢シ太陽ノ暖氣ニテ自ラ乾固ス。是ヲ取復其

頂ヲ截斷ノ其汁ヲ乾固セシメ取ル。斯ノ如ク逐次ニ
 截取テ終ニ少モ其汁ナキニ至ル。是ヲ取曝乾ノ凝
 固セシム。土人は是ヲ飲膳調理ニ加テ葱蒜ノ如シト云
 〔主治〕竄透ノ壅塞ヲ開達シ刺戟衝動ノ凝結ヲ疏解
 スル効尤峻ナリ。又ヨク表發ノ蒸氣ヲ排泄ス。○子
 宮衝逆及痙攣ノ諸症ヲ治スル一良藥トス。又經閉
 及痔血壅滯ヲ通スルニ峻効アリ。○此藥粘液ヲ疏
 解シ輕ク瀉下シ且臭氣烈キニ由テ殺蟲ノ峻効アリ。其臭味ニ由テ蟲ヲ侵刺シ遂ニ其巢ヲ剿絶ス。此
 物三錢ニ藤黃二刀ヲ加三氏ヲ一丸トシ三丸宛日

四次瀉下ノ多少ニ隨テ加減シ用フ。又是ヲ長服ノ
 ヨク條蟲ヲ殺ス。○或一味丸トシ用テ亦ヨク蛇蟲
 ヲ殺ス。是ヲ用レバ蟲其藥氣ニ堪ズノ騷擾シ腹痛
 擗掣神經ノ諸症ヲ發スルアリ。然レ在蟲死スレバ
 其症頓ニ治ス。胃弱キ者ハ苦味ヲ越幾斯劑健質亞
 里幾那葛爾等或鐵劑ニ加用フ酸敗液ノ症ニ
 ノ越幾斯劑蚶石麻掘等ニ加用フ腹部諸藏ノ壅塞
 ハ制酸劑失亞等ニ加用フ胃部諸藏ノ壅塞
 硬腫ニハ其症ニ隨テ中和鹽霸王鹽孕等水銀劑安質
 及扭等ニ加蟲症ニハ驅蟲劑瀉下劑ニ加用日或
 ハ吉利詞參兒兼守施ス又鼓脹ノ一良藥ト

遠西名物考

卷十八

風雲堂藏

ス。毎日三錢許用。時々大黄ヲ丸藥ヲ用。大便ヲ順
利ノ治スル者多シ。此病粘液鬱積。或ハ蟲入ル
因テ發スル者亦少カラズ。此症ハ左ノ方殊効アリ

盧會驅蟲丸

右研和シ三丸ヲ一丸トシ甘草末ヲ衣トシ三丸宛

用。一日三次瀉下多キ片ハ服量ヲ減ス。蟲入ル

格失亞丸方

盧會スカムモラム 蘇甘沒各二 担謨各二 格碌董篤一 馬一
覇王鹽各二 丁香油各二 丁香油各二 丁香油各二

右細末トシ丁香油ヲ和シ亞刺比亞アラビヤ 麩ゴ 漿ムヲ加テ
泥ト爲シ三丸ヲ一丸トシ金箔或ハ甘草末ヲ衣ト
シ三丸宛用ル。一日三次。但大便ノ多少ニ隨テ加減
ス。阿魏過服スレバ吐シ或瀉下ス。寒粘液質ノ人ハ
瞑眩少シ。○腹部諸藏ノ壅塞。頑硬腫。并ニ是ヨリ起
ル腹脹水腫ニ阿魏峻効アリ。但癌瘡毒樣ノ硬腫ハ
効ナシ。○疝腹痛ヲ治シ。風氣痞滯ヲ散シ。風疝腹脹
ヲ消ス。胃腸ノ運營衰弱ニシテ疝痛ヲ兼ル症ニ尤モ良
○胃中ニ粘液。酸敗液鬱滯スル諸症及胃脛心腹痛
ヲ兼テ治ス。○痛風脚痛ニ用テ驗多シ。○頑固ノ間

遠西名物考 卷十八

歇熱及是ヨリ起ル水腫ニ阿魏一味丸藥トシ或ハ
幾那ヲ加ヘ用テ多ク治ス○痰欬及經久ノ痰欬喘
急等ノ胸病ニ効多シ○腐骨疽其他惡厲ノ潰瘍ニ
是ヲ内服シ或ハ外敷ノ良驗アリ○服量ニ乃マデ
一服トシ用テ害ナシ然レ通例ニ氏ヨリ十氏マデ
ヲ丸藥トシ用フ或ハ是ヲ適宜ノ舍利別ニ和シ或
ハ芳香ノ露水ニ加ヘ或ハ雞子黃ニ研和シ用ヒ或
ハ龍腦越謨安沒尼亞幾纈草等ニ加ヘ丸藥トシ用
ヒテ良。但是ヲ用テ四日毎ニ適宜ノ下劑ヲ與フベ
シ○諸失血其他脫泄ノ患アル人ニ此藥ヲ用レバ

其症ヲ增長ス○癩ノ發作ニ此烟ヲ嗅シメテ醒復
ス○外敷ノ寒腫ヲ温散シ且凝結ヲ疏解スル峻効
アル故ニ瘰癧等諸頑硬腫ヲ消散シ痛ヲ止ム。一味
膏藥トシ貼メ良○腐骨疽汚穢潰爛ノ瘡瘍ニ此末
ヲ摻ケテ腐壞ヲ祛キ膿ヲ排ヒ淨刷ス
阿魏アウイ 幾キ 去キ 爾ル

製法 阿魏 搗碎者 燒酒 二十度者

右潤ヒキ格コ兒ル弗フノ半ニ充シメ厚紙ニテ其口ヲ蓋封
シ。鍼ニテ其紙面ヲ穿テ幾多ノ細孔ヲ作シ。格兒弗
ヲ微温火上ニ置テ時々振蕩シ浸ス。六日ニノ滲

過シ滓ヲ去リ硝子壘ニ内レ固封シ貯フ

又法 阿魏ニテ硝砂加燒酒精十二

右硝子壘ニ内レ蓋閉シ浸ス六日濾テ滓ヲ去リ

固封シ貯フ○服量十滴日十六滴許葡萄酒或ハ

阿咩イデ等ニ點服ス或ハ阿芙蓉液ヲ等分ニ加ヘ十二

滴或ハ十五滴許用エテ尤効アリ

主治 子宮衝逆及ビ痙攣搐掣等葛私多レ僂謨主治

諸症奇効アリ依依

安息香華

フロレスベソイニニ羅
ソインブルニ蘭

是ハ安息香ヲ升煨メ汚物ヲ去リ純粹ノ精華ト爲
ス者ニノ其質精微ナル酸性ノ揮發鹽ナリ安息香
十北ヨリ華一北出ツ

○按ニ安息香偽品多シ洋船ノ品ヲ擇ニ用ベシ

藥舖ニ古渡ト稱スル者間真品アリ和蘭說云安

息香ハ應帝亞地方ニ産スル一種ノ樹ニ生スル

華爾斯ナリ二種アリ第一種ハ自然ニ其樹ヨリ

流滴ノ顆粒ヲ爲シ虛脆ニ碎ケ易ク外面黃色

裏ハ白色ニ紅白ノ條理アリ甚芳香ニ味淡

ナリ是ヲ最上品トス又一種顆粒ヲ爲シ鮮麗淨

遠西名物考 卷十八 風雲堂藏

潔。硬固ニシテ黃白色雜リ或ハ赤色ヲ帶ビ白點アリ
 リ芳香ニシテ甘味ヲ帶ル者アリ此亦上品トス。然
 レ右二品_レ_レニ甚稀ナリ。○第二種ハ乾固ノ大塊
 ヲ爲シ淨潔ニシテ汚物ナク硬脆ニシテ破碎シ易ク
 光澤アリ黃白色及赤赭色ノ碎塊間錯ス。多ク鮮明
 ナル顆粒ヲ夾ミ且破碎セル扁桃ノ如キ白點多
 者ヲ上品トス。味油樣ニシテ甘ク帶ビ佳香アリ。是
 ナク磨_ル或ハ温_ムレバ殊ニ香氣多シ。但_シ赭黑色ヲ帶
 ハテ汚物ヲ雜ヘ鮮麗ノ碎粒。白點多キ者ハ下品ト
 ス。○錫蘭_{セイロン}印度島名ノ產ハ赭赤色ノ者多シ暹羅_暹蘇門

答刺_タ瓜_ヤ哇_ハ同上ニ多ク產ス。亞墨利加洲ノ產ハ黑色
 ナレ_レ_レ香氣強シ。○此脂ヲ生スル樹ハ喬木ニシ
 葉。枸櫞葉ニ似テ小。光澤ナク。背白色ヲ帶ビ花四
 瓣黃色。山茱萸花ノ如ク實大。肉豆蔻ノ如クニシ
 扁圓ナリ。或云。蘇門答刺_スニ於テハ此樹生メ五六
 年ヲ經テ幹六指橫徑ヨリ八指橫徑許ニ至
 レバ其皮ヲ縱ニ鑽_キリ。脂液流淌メ皮ニ著キ乾_クハ
 是ヲ小刀ニテ刮_クリ取ル。其初ニ出ル脂ハ柔ニシ
 白色。香氣尤_モ竄透ス然_レ此品他國ニ輸_イスコナシ
 其後數_ニ此脂ヲ取_ルニ隨テ漸ク黃色トナリ終ニ赭

本草綱目卷十八
 風雲堂藏

色トナル。又老木ヨリ出ル脂ハ赭黒色ナリ其黄
白赭赤等種々ノ碎塊間錯スルハ其流滴セル脂
ノ前後早晚アル者ヲ集取テ大塊ト爲ニ因ル。大
抵一樹ヲ鑽刻スルヲ十年或ハ十二年ニメ其脂
三比許出ツ。○第一種ハ甚ダ稀ナル故ニ多ク第
二種ヲ藥用トス黒色燥硬ニメ香氣ナキハ他ノ
樹脂ヲ雜テ偽ル者ナリ。○其質華爾斯ナル故ニ
水ニ溶化セズ。油ト燒酒ニハ溶化ス。

製法

二法アリ一ハ溶化法。一ハ升煨法ナリ。

溶化製法

安息香

上好者極細末
適宜

右磁鍋ニ内レ手ヲ住メス攪セ煮テ四分時ニメ火
ヲ下シ靜定メ上清ノ液ヲ取り其渣ニ水ヲ加ヘ前
法ノ如ク煮テ上清ヲ取り其清液ヲ合シ文火ニ上
セ水氣ヲ蒸散ノ遂ニ安息香ノ一倍ノ量ト爲シ火
ヲ下シ是ニ綠礬精ヲ滴シ加テ其液黄色ヲ帶ビ乾
酪ノ如ク凝固スルニ至リ。是ニ數沸湯ヲ加テヨク
溶化セシメ冷處ニ置片ハ柔ニメ薄キ芒ヲ結ズ。是
ヲ取り紙上ニ撒シ乾ノ硝子壘ニ收メ固封シ貯ル。

罌蓬鹽晶

安息香ノ
四分一

雨水

安息香ノ
六倍

升煨製法 安息香 上好者粗末 適宜

右陶壺ノ長ク筒ノ如クシテ口窄キ者ニ入レ厚ク
硬キ紙ニテ△形ノ蓋ヲ作り是ヲ以テ固ク壺口ヲ
覆ヒ氣ヲノ透漏セザラシメ其壺ヲ沙火或ハ熱灰
ニ入レ華爾斯ノ烱ル程ノ火候ト為ス片ハ安息香
融解ノ其精華升騰シ其蓋ニ著テ銀白色ノ芒ヲ為
ス乃チ一時毎ニ蓋ヲ換テ其華ヲ拂ヒ取り終ニ其
華赭褐色ニノ粘リ油ノ如クナルニ至テ火ヲ下シ
速ニ其華ヲ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ

又法 安息香 極細末 五弓 沙 乾淨者 安息香ノ四分一

右攪和シ陶壺ニ内レ蓋ヲ覆ヒ文火ニ上レ華ヲ取ル
前法ノ如クス ○安息香華ハ白色ニノ灰色ヲ帶ヒ
光澤アリ味初甘ク後酸ヲ帶ヒ頗ル琥珀鹽ノ如シ

主治 是安息香ノ酸性鹽ナリ安息香ニ比スレバ功
力尤峻ニ揮發鑽透スルヲ龍腦ニ似タリ ○粘痰
敗液等ノ肺ニ凝滯スルヲ稀豁ノ疏散シ喘急肺傷
欬嗽及ビ肺瘍等總テ肺病ニ殊効ヲ奏シ又腦及ビ
神經ヲ強壯ニス但肺炊衝等ノ危險ノ欬ハ寛解シ
難シ ○服量五匁ヨリ八匁ニ至ル

亞鉛 トタン ジンモム又「シンキ」スロ スピアウテル又ピアウテル蘭

亞鉛ハ其性諸金類ニ屬スル一種ノ元素七補ナリ。鉛ニ比スレバ堅固ニ破碎シ難シ。其色鉛ノ如クニ青色ヲ帶ビ。銀様ノ光澤アリ。稍打展スベシト雖モ鍛鍊シ難シ。火ニテ熔易シト雖モ鉛ノ如ク流動セズ故ニ銘鑄シ難シ。燒煨スレバ淡綠ノ焰ヲ發シ輕虛鬆疏ニ綿絮ノ如ク白毛モレ若クハ蜘蛛絲ノ如クナリテ其質盡ク消散ス。是ニ硫黃夾雜ス即是ヲ坩鍋ニ内レ煨ケバ熔解シ鐵筋ニテ攪レバ火屑ヲ發シ白烟生スルヲ宛モ硫黃ト消石トヲ合和メ燒

ガ如シ○此物一切酸液ニ溶化ス。水及ビ油ニハ溶化セズ○亞鉛ハ多ク愕イ斯刺盧獨ドノ歐羅巴洲ノ鉛坑ニ出ヅ。然レ下品トス。東方諸國ニ産スル者ハ美白ニメ大塊ヲ爲シ上品トス。銅鐵等ノ雜リタルハ殊ニ下品ニメ用ヒ難シ○亞鉛ハ醫藥ニ供セズ唯是ヲ製ノ華ト爲シ藥用トス
亞鉛華 アプロレス。シンキ又「シン」モム。カルシナシムシ羅
製法 亞鉛ヲ適宜ニ取潤シ深キ坩鍋ニ内レ火ニ上セ初蓋ヲ覆ヒ亞鉛熔ル頃ニ蓋ヲ去。上面ニ焰ヲ生スルニ至テ他ノ坩鍋ヲ倒ニメ覆ヒ緊ク閉ルヲナ

ク稍蒸氣ノ漏ル許ニシ其焰盡ク熄ヲ候ヒ上坩ヲ
 取去レバ輕虛ニシ白絮ノ如キ華其坩及熔タル亞
 鉛ニ著ク悉是ヲ取り其坩ノ渣塊ヲ去リ新ニ亞鉛
 ヲ投シ熔ス下前法人如クニメ華ヲ取數斯ノ如ク
 ノ多少適意ノ量ヲ付ルニ至リ是ヲ陶壺ニ内レ冷
 ルヲ候ヒ水ヲ加テ溶シ濾過メ其最モ輕虛ナル者
 ヲ取意ヲ用テ乾シ硝子壘ニ收メ固封シ貯フ亞鉛
 ハ少許宛坩ニ投メ熔スベシ一頓ニ多煨クキハ火
 氣徹セズ熔化シ難クメ華ヲ得ル少ケレバケリ
 主治 發汗劑トス或ハ吐劑下劑トシ用テアリ服量

四氏ヨリ十二氏ニ至ル○又鎮痙ノ良藥トシ痙
 搐掣ノ諸症ニ奇効ヲ稱ス近世名哲ノ經驗說甚ダ
 多シ胃腸ノ粘穢汚液ヲ驅除ノ後二氏ヨリ五六氏
 マデ用フ然レバ痙衝ノ疔ヲ兼ル者是ヲ用テ勿レ○
 腹部諸藏ノ壅塞及神思ノ感動等ヨリ發スル痙攣
 搐掣子宮衝逆其他神經ノ諸症ヲ治ス○小兒蛇蟲
 及酸敗液ヨリ起ル搐搦ニ捷効アルヲ鹿角精ニ勝
 レリ○痘ノ初熱ノ搐搦甚キニ用テ速ニ解ス○一
 婦人二十四歳痙ヲ患ルヲ三年其症二十日毎日
 一發ノ卒倒ス治痙鎮痙ノ諸藥寸効ナシ因テ亞鉛

華五瓦宛用ル。一日兩次。漸ク加テ十二瓦ニ至レ。此
瞑眩セズ唯服後稍惡心ヲ覺ル。是ヲ用キテ後
兩回ノ發作ハ以前ヨリ甚シ。然レ爾後漸ク減シ稍
筋惕肉瞤ヲ覺ルノニテ卒倒ニ至ラズ。是ヲ用ル
一半年許ニ全愈シ既ニ一年ヲ經レ。此微恙ナシ
○亞鉛華ヲ綠礬精ニ溶シ結芒セシメテ皓礬ヲ製
ス。一ニ是ヲ亞鉛礬ト名ク。鎮痙ノ良効アル。一亞鉛
華ト同シ。皓礬二種アリ。ハ自然生ニ山坑ニ出
條。皓礬ノ○一少年大ニ驚怖ノ後。心動悸ノ歇マズ
下ニ出。○神思鬱憂病ニ罹ル。皓礬製造ニ刃ヲ取テ單方
竟ニ

解毒水四弓ニ溶シ一匙宛用ル。一日三次。一月許ニ
ノ回復ス。解毒水ハ單方複方アリ。單方、羅甸名、ア、ク
荷葉一匙、半、亞、爾、鮮、德、白、芷、葉、各、一、匙。○頑固ノ傷冷
右水適宜ニ加ヘ蒸餾メ露水ヲ取ル。○頑固ノ傷冷
毒痛及ビ是ヨリ發スル喘急。小兒痘效ニ用ヒテ治
驗多シ。○腹内諸藏ノ壅塞スルヨリ攀急ノ乾效ヲ
發シ荏苒トメ治セザル症ハ左ノ丸藥偉効アリ

鎮痙定嗽丸

著艸。越幾斯劑。一錢半。○著ハ坊間ノコギリサ
穗ヲ採リ。越幾斯劑トモサト呼ビ。葉及ビ花
法。蒲公英。越幾斯劑ト同シ。其
律比丸料。一錢

阿魏 半錢

亞鉛華 十五分

右二氏ヲ一丸トシ、蝮蝨石ヲ衣トシ、五丸宛用ル。

日_二兩次、或ハ其症ニ隨テ四次ニ至ル。○小兒蝮蝨ノ

諸症ハ左ノ丸藥甚ダ驗アリ。

掃蝨銀華丸

水銀 二錢

的列並底那 一錢

亞鉛華 二錢

右汞ト的列並底ヲ研合メ、星ヲ見ザルニ至リ。亞鉛華

及桂末少許ヲ研和シ、三氏ヲ一丸トシ、初ニ丸ヲ用

日一丸宛増シ、患者惡心ヲ發スル片ハ健胃下劑ヲ

與ヘ、惡心歇ニ至テ稍丸藥ノ數ヲ減シ用ベシ。○頑

固ノ下利、大黃、乙百葛、格安那等ヲ用テ効ナキ症ニ

皓礬一味用テ大効ヲ得テアリ。○焮腫眼ノ良藥ト

ス、亞鉛華一錢ヲ薔薇水五多ニ溶シ、眼ニ點メ、皓厲

液ヲ消シ、痛ヲ止治ス。○鶯口瘡ニ皓礬半刀ヲ水ハ

多ニ溶シ、漱藥トシ、良驗アリ。舌甚乾燥セズ、稍焮衝

ヲ兼ル症ニ尤良。○乳頭坼裂若クハ潰爛腫痛スル

ニ皓礬ヲ水ニ溶シ、稀クシ塗、或ハ亞鉛華ノ末ヲ摻

木ノ如ク乾ク者ハ太サ鶯管ノ如シ鬚多シ。花葉根
共ニ味苦クノ辛ヲ帶ビ生鮮ノ者ハ不佳ノ氣アリ
揉テ嗅キ或ハ搗テ末トスレバ嚏ヲ發ス。歐羅巴洲
諸國ノ原野ニ生ス。○按ニ此草和產未詳ナラズ舶來ノ品ヲ用ベシ
○主治花ヲ藥用トス。葉モ亦効アリ。根ハ吐ヲ發スル
故ニ用ルル稀ナリ或云根モ亦花ト同シ下利及腐
敗諸病ニ殊効アリ。末トシ沙糖ヲ加ヘ或ハ泡劑ト
シ用フ○是ヲ嗅キハ嚏ヲ發シ。多ク服スレバ吐ス
ルヲ煙草類ノ如シ。故ニ鑽透刺戟ノ經久ノ壅塞ヲ

開通シ惡液ヲ分利シ汗ヲ發シ小便ヲ利シ月經ヲ
通ス○脉管纖維及神經ノ弛弱虛衰ノ血液壅滯シ
或ハ血中粘液多クメ醇精ノ質ヲ失フ諸病ニ是ヲ
用レバ刺戟衝動ノ壅滯ヲ疏解シ惡液ヲ分利ノ排
泄ス。故ニ總テ虛弱ニ屬スル熱病。神經熱。腐敗熱。粘
液留飲過多ノ熱病ニ偉効アリ○痰ヲ疏解ノ吐セ
シムルニ殊効アリ。故ニ肺及ビ胸脇焮衝熱ノ劇症
退キ。病勢衰へ唯專ラ粘痰ノ吐出ヲ要スル症ニ甚
驗アリ。又虛弱ニ屬スル咽喉焮腫。久效痰喘等ニ是
ヲ泡劑トシ蜜ヲ加用テ良○扶歇蘭度人云惡性ノ

神經熱ニ於テ患者虛脱シ危篤ノ諸症ヲ發スルニ
 至テハ揮發衝動ノ藥劑幾那ノ條ヲ法ニ如ク用テ
 其垂絶ノ元運力ヲ挽回スルコト一大緊要タリ是ヲ
 用テ脉漸緩ニメカヲ生シ諸器ノ機轉漸次ニ故ニ
 復スルノ時ニ至テハ更ニ亞兒尼加根一錢ヨリ二
 錢許ヲ取、纈草、攝爾扁答利亞四部ヲ等分ニ加、泡劑
 下シ用テ良効アリ。若シ其罷極危劇ノ時ニ當テ亞
 爾尼加ノ刺戟シ幾那ノ收固スル藥劑ヲ用レバ虚
 憊ノ胃腸是ヲ消化スルコト能ハズノ壅滯シ生氣揮
 發セズメ逾、危篤ニ至ルナリ○凡、熱病ノ患者虚衰

シ生氣ノ運行怠慢ニメ病毒排泄シ難キ症ハ此藥
 ヲ幾那ニ加用レバ其鑽透衝動ノ効力ヲ以テヨク
 壅塞ヲ開達シ病毒ヲ驅逐メ排泄ス○胃腸ノ虚弱
 ニ因リ或ハ腸間膜壅塞スルヨリ發スル經久ノ下
 利ヲ治ス○赤痢ノ惡性ニメ腐敗ヲ兼ル症腐敗熱
 云ハ此藥尤効アリ其刺戟衝動ノ功力ニ由テヨ
 ク病毒ヲ排泄ス。否、ザレバ其毒鬱積メ腸ヲ侵蝕シ
 寒壞疽トナリテ救レザル者アリ。此症ハ左ノ方殊
 ニ良驗アリ

亞兒尼加排毒飲

神亞兒尼加花 三錢

右沸湯九勺ニ浸ス七八分時瀝過テ滓ヲ去リ次ノ

二品ヲ加フ 此藥之効ハ...

醋 此藥之効ハ...

過爾託亞舍利別 此藥之効ハ...

右調和シ四分時ニ二匙宛用每次大麥煎汁ニ綠礬

精ヲ滴シ加テ適意ノ酸味ト爲與フ○痲病及各部

麻痺殊ニ半身不遂ノ症ニ効アリ是ヲ服メ患部搔

痒或刺痛或筋惕ヲ發ス此ハ良候トス或經久ノ傷

冷毒痛風或痙攣ニ亞兒尼加ヲ内服外用ノ効多

○黑障眼ニ多ク治驗ヲ稱ス數日是用テ眼痛

ヲ發スルハ善徵トス是ヲ以テ視神經ヲ衝開シ壅

塞セル粘液ヲ驅除スレバナリ○打撲傷ニテ内部

ノ血脉破裂ノ吐血衄血尿血等ヲ發シ或其血内部

ニ凝滯ノ諸症ヲ發シ或皮下ニ泛溢ノ青斑トナル

者ハ皆此藥ヲ内服外用ノヨク其瘀血ヲ驅散シ治

○凝血ヲ疏解スル効アルニ由テ經閉ニ用テ効多

服量花一錢ヨリ二錢マデ沸湯八勺ヲ加テ泡劑ト

シ服ス或香竇揮發ノ藥ヲ加用ス甚濃ク泡出スレ

バ吐ヲ發ス或花一錢ヲ取泡劑若クハ浸劑トシ朝

夕一服宛用ヒ漸加テ二錢ニ至ル感動必キ人ハ四
 錢マデ用。或末トシ二錢若ハ三錢ニ蜜ヲ加煉膏ト
 シ毎日服ス○或越幾斯劑製法蒲公英越トシ毎日
 二錢ヨリ六錢ニ至ル或花若ハ葉四錢ヲ取リ麥酒葡
 萄酒等四十ヲ浸用フ○此花ニ麴コ及華爾斯多
 ○胃ノ感動シ易キ人ハ此藥ヲ服テ嘔吐腹痛等ヲ
 發スルトアリ此症ハ初少許宛用テ漸慣レバ大抵
 自ラ止或緩和ノ効アル藥ヲ加用フ。然レ過服スレ
 バ其症ヲ發スルノミナラズ或胃腸激衝煩悶失血
 眩冒麻痺等ヲ發スルトアリ。若此症ヲ發セバ醋橙

汁ノ如キ酸味ノ液ヲ用レバ速ニ解ス或此花ニ微
 細ノ毒蟲著トアリ誤テ是ヲ服スレバ右ノ症ヲ發
 ス。ヨク意ヲ用テ是ヲ除ベシ○此藥ハ熱性ニノ鑽
 透刺戟スル故ニ一切壯實多血ノ症。激衝病。内因ヨ
 リ發スル諸失血。胃腸ノ感觸シ易キ者ニハ皆害ア
 リ○外用ニハ濃煎ノ蒸湯劑トシ或燒酒少許ヲ加
 温テ施シ或琶布トシ外敷ス殊ニ麻痺不遂或膀胱
 ノ麻痺ヨリ起ル小便閉及打撲傷ニ良効ヲ稱ス或
 花及葉ノ末ヲ嚏藥トシ鼻ニ吸入ノヨク頭中ノ惡
 液ヲ排泄ス○特伊滿名ノ經驗說ニ云間歇熱ハ初

發其症ニ隨テ吐劑或下劑ヲ用テ胃腸ヲ淨刷シ飲
 食ヲ節慎ノ幾^キ那^ナヲ用レバ大抵治ベシト雖モ極テ
 頑固ノ症ニ至テハ多^ク幾^キ那^ナヲ連服スレバ効ナク或
 腹部ノ諸器壅塞硬結ノ塊腫ヲ生シ諸液腐敗ノ日
 虛羸ニ就ク者アリ。是病性頑固ニシテ神經勞弊シ内
 藏ノ諸管壅塞ノ敗液滯積スレバナリ。此症ハ專壅
 塞ヲ通シ腐敗ヲ除^キ神經ヲ強壯スルニ非レバ全功
 ヲ收難シ故ニ幾^キ那^ナノ功ナキ症ニ亞^ア兒^ル尼^ニ加^カヲ用テ
 殊効ヲ得ル者甚多シ左ニ其治驗ヲ舉^ル一婦人年三
 十五。四月下旬ニ三日熱ヲ患フ。初^メ下劑ヲ與テ胃腸

ヲ淨掃シ次テ幾^キ那^ナノ濃煎劑ヲ用ヒ。或安^イ質^シ沒^ト扭^ニ劑
 ヲ加^フ與^フレバ効ナシ。因テ幾^キ那^ナノ末ヲ取テ其間日ニ
 一^ク多^ク宛^ツ用^レレバ治セズ淹滯ノ翌年六月ニ至ル。終ニ
 亞^ア兒^ル尼^ニ加^カ花^カ四錢ヲ取テ泡劑トシ間日ニ服セシム。
 次ノ發作。以前ニ比スレバ遲^キ一^ク時。且諸症劇盛ニ
 ノ終ニ大ニ粘汗ヲ發ス。爾後此劑ヲ用ルニ次ノ發
 作ノ後。小便多ク逆ヲ生ス。是ニ於テ其花三^クヲ取
 テ泡劑トシ間日ニ盡^ク服セシム。是ヨリ其熱再發セ
 ス諸症脫然タリ。一婦人年四十二。初冬。日發熱ニ罹^ル
 リ下劑及對症ノ藥劑ヲ用テ其熱治ス。然レ爾後飲

食ヲ慎マズ藥劑ヲ怠ニ由テ黄疸ヲ發シ食進マズ
 腹脹右脇鈍痛ス因テ解凝劑及下劑ヲ用テ腹脹減
 シ食稍進メ凡黄疸及脇痛荏苒トメ治セズ翌年三
 月下旬ニ至リ又三日熱ヲ兼發ス因テ亞兒尼加花
 ヲ以テ間日ニ用テ前法ノ如クシ黄疸漸減スレ凡
 熱ノ發作更ニ増劇シ患者虛憊甚シ故ニ幾那煎ヲ
 用テ數日ニメ精力稍復スレ凡其熱減セズ黄疸亦
 增長シ遷延替留メ七月中旬ニ至ル是ニ於テ又亞
 兒尼加花六錢ヲ取テ泡劑トシ間日ニ用テ是ヨリ
 第八日ニ當テ又三ヲ取テ泡劑トシ與フ其後熱

ノ發作並ニ黄疸大ニ減シ時粘痰ヲ吐シ或發汗シ
 發作ノ終リニ於テ殊ニ甚ク且臭氣アリテ粘著ス爾後
 此藥ヲ連用スルト三週ニメ其熱發セス諸症盡治
 ス一婦人年十八四月下旬三日熱ヲ患ヒ諸藥効ナ
 ク六月下旬ニ至ル因テ此花ノ泡劑ヲ用ニ其發作
 殊ニ甚ク且患者湯液ヲ嫌ヒ惡ニ因テ此花ヲ未トシ
 二錢ヲ取テ蜜一多半ニ和シ間日ニ服セシム是ヨ
 リ其熱漸減シ第十發ニ至テ悉平復ス一婦人年七
 十二三日熱ニ罹リ多幾那ヲ服スレ凡驗ナシ因テ
 輕下劑ヲ用テ胃腸ヲ淨掃シ此花六錢ヲ泡劑トシ

間日ニ用フ。是ヨリ漸、發汗ノ熱減スレ、凡患者甚、勞
 倦ノ舉動ニ堪ヘス。爾後此藥ヲ連進スル、十四日ニ
 メ總身夥久斑疹ヲ發ス。是ヨリ勞倦頓ニ治シ其熱
 モ亦再發セズ。是其酷厲ナル熱病毒、驅發セラレテ
 斑疹トナリ排泄スル顯徵トス。一婦人年六十一。資
 稟薄弱ニテ子宮衝逆ノ患アリ。偶、頑固ノ間日熱ヲ
 患ヒ發作スレバ、痙攣ヲ發メ言、不能ハズ。予是ヲ診
 ノ以爲是其熱病頑固ニテ神經大ニ罷勞シ子宮衝
 逆ヲ兼ルナリ。故ニ其發作ニ隨テ神經ノ諸症、痙攣
 發スルノ云。乃、神經劑並ニ幾那ヲ投シ或龍腦ヲ加

與、レ凡寸効ナシ。是ニ於テ亞兒尼加花ノ泡劑ヲ用
 ルニ嘔吐ノ服スル、能ズ。因テ左ノ丸藥ヲ製用フ

幾那亞兒尼加丸

亞兒尼加花 末

幾那 末 各二錢

拔爾撒謨 亭露 適宜

右調和シ三瓜ヲ一丸トシ銀箔ヲ衣トシ發作ナキ
 時、半時ニ五丸宛用フ。其後多、發汗シ是ヨリ第四發
 ニ至テ痙攣ノ症減シ。言語ヲ妨、ズ調治二十餘日ニ
 ノ熱病全治シ爾後暫、此藥ヲ服メ痙攣ノ症悉、愈

○右ノ經驗說ニ因テ考レバ血液中酷厲毒アルヨ
 リ發スル經久ノ諸病或腐敗ヲ兼ル熱病及腐敗熱
 ノ如キハ此藥ヲ用テ其酷厲毒及腐敗液ヲ分利排
 泄ノ殊効ヲ得ベキヲ類推ノ知ベシ或ハ胃腸ニ汚
 物敗液鬱滯スル者ニ是ヲ用レバ嘔吐ヲ發スルヲ
 アリ故ニ預メ下劑ヲ與ヘ胃腸ヲ清刷ノ用ベシ但
 胃腸淨潔ナレバ吐ヲ發スル者ハ服量ヲ減シ用テ
 漸ク慣シムレバ吐スルヲナシ

叔 叔
 依 福

遠西醫方名物考卷十八終

東都書林青藜閣發行醫書豫顯目錄

和蘭醫學西範提綱 棟齋宇田川先生著 全三冊 醫學入門 植學啓原 宇田川榕庵先生著 全三冊

同 内象銅版圖 同上 全一帖 舍密開宗 同上 全一冊

增補和蘭藥鏡 同上 全八冊 醫療正始 沖齋伊東先生著 全十五冊

遠西醫方名物考 同上 全三冊 泰西名醫彙講 熱川其作先生著 全六冊

同 補遺 同上 全九冊 要術知新 玄軒大槻先生著 全三冊

瘍醫新書 玄澤大槻先生著 全四冊 西音發微 同上 全二冊

書賈 青藜閣 須原屋伊八

江戸淺草茅町三丁目

