

遠醫方名物考補遺

卷一



499.2
E m-5
No. 1408

月 14 3 冊



高士川文庫
3316

樺齋宇田川先生著

初篇

遠西醫方名物考補遺

風雲堂藏版 青藜閣發兌

遠西醫方名物考補遺標目

卷一

牛膽

牛膽鹼 黃丸
解凝魏膽丸

牛膽解凝健胃飲
健胃殺蟲丸

盧膽驅蟲膏

膽液稟性說

實芝答利斯

實芝葱利水散
實芝消杜飲

實芝姜驅水散
實芝驅水散

實芝驅水散
實芝驅水散

實芝桂驅水散
實芝桂驅水散

實芝黃驅水散
實芝黃驅水散

實芝利水散
實芝利水散

實芝答利斯丁幾劑

複方

單方

複方

複方

複方

複方

薩爾沙根

薩朴排毒煎
薩朴瑞香煎

薩朴瑞香煎

薩朴瑞香煎

薩朴瑞香煎

薩朴瑞香煎

薩朴瑞香煎

薩朴瑞香煎

華尼利

華尼利

華尼利

華尼利

華尼利

華尼利

華尼利

華尼利

- 引用書符號。名物考藥鏡ニ遺漏セル者ヲ左ニ舉ク
 依依百乙舍密全書 篤篤隆母斯獨爾弗舍密局方
 家家篤爾藥性主治書 涅涅塙爾獨乙都局方
 治泊爾拔烏兒藥性論 葛葛華戾私經驗書
 蒲蒲爾母羅塙兒經驗書 昆昆斯蒲律倔內科書
 別別爾林治療書 呂呂乙詞物產說
 施施迄蒲斯治療經驗書
- 撰** 重訂外鏡和蘭名遠西醫方補同上
科撰要 鏡藥鏡名物考補遺
- 客歲甲午仲冬 棣齋先生病篤シ章湯藥ニ左
 右ニ侍ス病間章ヲ召テ囁曰名物考凡例載ル所

藥品ノ分量ハ家藏亞謨斯的爾達謨ノ藥秤ニ據
 テ考定スト雖モ其法馬各少差アリ意フニ其製
 未タ精巧ヲ盡ス者ニアラズ加之彼邦近來ノ著
 書。往々新ニ度量ヲ革ルヲ載ス然ハ新舊差異
 アルヲ知ベシ是ヲ以テ再ヒ其度量ヲ算メ從前
 一ノ脱漏ヲ補ニ意アリ奈セン余算數ニ拙シ子素
 リ數學ニ長ス願クハ諸書ヲ考証メ新舊ノ度量
 ヲ算定シ余カ志ヲ繼ケト章唯々ス臘月上漸
 先生溘焉トソ館舎ヲ捐ツ豈料ヤ先生ノ囁竟
 ニ遺命トナラントハ章不才何ソ遺命ノ重キ奉

スルニ耐ヤ但薰蒿悽愴復夕辭スベキ所無シ乃
 ポルクスマートキンデ子ーデルドイツセ・アボテイキ
 等ノ書ニ據テ度量ヲ算定シ更ニ其要領ヲ略載
 ス天保六年乙未孟春 備中繕方三平章謹識
 一千七百九十八年(寛政十年)佛蘭西。伊斯把尼亞。和蘭意
 太里亞。第那瑪爾加。雪微。設兒。トスカーン(以上ノ學士
 輩大ニ集會ノ盡ク闔國度量ノ舊制ヲ改革シ新ニ
 歐邏巴諸國通用新制ノ度量ヲ建シト議リ一千七
 百九十九年(寛政十一年)竟ニ羣賢ノ衆議決著シ其制全
 成ルト云其法地周ノ四千萬分一ヲ會爾ト名ケ尺

度量衡皆此ヨリ算出ス

會爾

按ニ

本邦天學家地

六萬九千九百二十定尺ニ然レバ地家地

二寸八分九釐百二十尺ニ然レバ地家地

八分八釐八毛九弗弱尺ニ當ト比ナリ然

千萬分三度

八百八十五里

尺十二

耳塙

十會爾

我三丈九尺當ト比ナリ然

較スルレ

正今船來

八百八十五里

尺十二

迷爾

百耳塙

八間八寸譯ス

釐九釐

我九尺當ト比ナリ然

較スルレ

正今船來

把爾半

會爾之十分一

一毛八釐九毫八分八釐

我三丈九尺當

ト比ナリ然

較スルレ

正今船來

兒母

把爾半之十分一

一毛八釐九毫八分八釐

我三丈九尺當

ト比ナリ然

較スルレ

正今船來

私多列比

兒母之十分一

一毛八釐九毫八分八釐

我三丈九尺當

ト比ナリ然

較スルレ

正今船來

○凡ソ容器ニ液料乾料ノ別アリ秤量ニ雜貨藥品

ノ別アリ液料ノ容器ハ

罕 把爾牟立方我五合四

末苴 罕之十分一我五才弱四

寶僕爾粥度 未苴之十分一我五才

發篤 罕之十倍我五升四合八勺八才弱

○乾料ノ容器ハ

骨弗 罕ト同シ

末苴 液料ノ末苴ト同シ

失結兒百爾 發篤ト同シ

冊屈 又繆的 失結兒百爾之十倍我五斗四升八合七勺九才弱

刺斯篤

三十冊屈

我十六石四斗六升三合六勺七才許

○雜貨ノ秤量ハ坊間商賈ノ通用スル處ナリ蒸餾

水把爾牟立方ノ重ヲ 封度トシ此ニ基テ其他定ム

封度

前日念佛尺ノ寸立方容器數様ヲ造テ蒸餾

蒸餾水ハ我二百六十六分一 我二錢一十八分ニ彼把爾牟立方ノ

穩斯 封度之十分一我二錢一十八分一弗四分六錢六分四弗四

釐四弗四

羅獨 穩斯之十分一我二錢一十八毛一弗四分六錢六分四弗四

釐四弗四

瓦蘭馬又微苦齒 納獨之十分一我二

釐毛二分六釐六

古爾列兒 瓦蘭馬之十分一弗八

釐毛二分六釐六

○藥品秤量 士平四平大升十碌蘭王國中一令入

大分一百年

一
柔谷百十七年文化十
四年和蘭王國中ニ令ノ舊制ノ
藥秤ヲ改革ス其制商賈通用封度トノ八分三即三百
毛蘭ニ以テ新制藥秤ノ封度トスト云今左ニ新舊
馬

藥秤比較ノ表ヲ載ス

新封度

三百七十五毛蘭馬

我百錢零零零
五釐五毛強

舊封度

三百六十九毛蘭馬

一二七分八釐八毛強
我九十八錢四

新穢斯

封度之十二分一。即三十一毛蘭馬

二五八
我

舊穢斯

三十毛蘭馬

七六
我八錢二分
零七毛強

新達刺屈末

穢斯之八分一。即三毛蘭馬

九零六
我一

錢零四釐
二毛強

舊達刺屈末

三毛蘭馬

八四五
我一錢零二
釐六毛許

新須屈爾百兒

達刺屈末之三分一。即一毛蘭馬

三
我三分四
釐七毛強

舊須屈爾百兒

一毛蘭馬

二八二
我三分四
釐二毛許

新傑列伊

須屈爾百兒之二十分一。即毛蘭馬

人半
我一釐七
毛三弗強

分之六十五

我一釐七
毛三弗強

舊傑列伊

毛蘭馬

千分之六十四
我一釐七
毛一弗弱

右ハ尺度ニ原テ算定スル所ナリ尺度ニ毛弗ノ差
無キヲ能ハズ是人目ノ得重視カラザル所ナリ

尺度ニ毛弗ノ差アレハ重量。亦必ス差無^ヤト能ハズ
故ニ和蘭新制藥秤ノ如キ。他日精巧ノ器ヲ得テ
始テ其密合ヲ言ベシ。尚別ニ證說アリ
○按ニ本編採用入ル所篤窓涅泊昆福等ノ如キ一
千八百十七年藥秤改革以後ノ鏤板ニ係ル書ハ其
方法ノ分量。新制藥秤ニ憑ルベク其余ハ皆舊制ノ
藥秤ナリト知ベシ

○其陳風末之卷一。唯一玉蘭湖三
書其陳風末十三歲歸學人四正月
六日癸亥零二

遠西醫方名物考補遺卷一

牛膽ウツダク
左ハ羅シラタケセガル蘭セガルラン
牛膽ノ性甚人膽ニ近シ。綠色膠粘ニメ臭氣アリ味
甚苦ニ生鮮才者ハ腐敗シ易故ニ磁鍋ニ入火ニ
上セ水氣蒸散ニ越幾斯ス剝離稠通シ貯フ。然モ大
氣元觸ヒニ濕氣引テ麝臭ヲ生ニ腐敗スル故ニ
固封財カシマ病牛人膽ハ臭味不佳アヒメ毒アリ
内服スレハ毒氣侵襲スルト宛モ傳染毒ノ如シ故

兵無病ノ牛膽ヲ擇安用ヲヘ定。其參事ノ味ニ姑
固。○按ニ藥鋪清雅大坂屋四郎兵衛云。眞ノ牛膽ハ近江彦
萬根ヨリ出。牛膽ヲ取り速ニ竿ニ掛け日乾ス。四
季共ニ粘潤甘味ヲ帶。藥鋪ニ販ク。此品闕ニ遇
甚少。藥鋪ニ甘琥珀ト呼フ。熊膽ヲ用ヘシ。是牛膽ヲ
壓扁メ乾入者ナリ。鱗片狀也。臭濃也。味苦也。
半試効性石鹼様ニノ竄透刺戟衝動シ苦味強壯解凝
淨刷ノ効力アリテ鎮痙ノ一良藥トス。○諸酸酸味
酸性塩明礬酒等類硫酸苦土凝水等金屬塩綠礬皓礬升汞等
鹽酸加爾幾重土共及單寧蘭名ロイスト植物ノ
味アル者皆是ヲ舍

ノタ含タル液ヲ牛膽ニ加用ヒ。外膽ノ稟性崩壊ノ
効為脱失ス○胃虛粘液過多。酸敗液。風氣痞脹大便
閉ヲ治ス○肝脾及門脈ノ壅塞。黃疸依剥昆蛭兒諸
蟲症。腸間膜腺閉塞。小兒腹脹四肢羸瘦等腹内諸器
ノ病ヲ治ス○諸藏壅塞中殊ニ肝ノ壅塞ヲ疏解シ
膽液ノ虛乏ヲ資補ノ酸敗液ヲ消シ。飲食烹釀消化
ヲ扶ケ又殺蟲ノ効ヲ稱不○腹内諸藏壅塞アリテ
大便閉ヲ兼ル症ハ牛膽ヲ解凝下劑ニ加用ヘシ。即
牛膽紫董丸鏡卷十五或牛膽鹼黃丸次出ノ如竟○肝
壅塞黃疸粘液留飲病。牛膽鹼黃丸ノ朝夕半錢ヨ

聖塞乃宣テ興、冒ノ砒劑殊計黃疸キ峻効アリ

牛膽

石鹼勿擗祭亞者

大黃一錢

右研末シニ瓦ヲ一丸トス人通泄ノ飲食ハ常一腸中
粘液ヲ稀釋シ其刺戟衝動ノ性ヲ以テ胃腸ノ蠕動
機制發シ飲食ヲ消化ノ故ニ膽液虧損シ或其性
力之弱ナレハ飲食消化セス酸敗液粘液風氣等鬱
滯外藏漸ク壅塞ノ遷延諸病ノ生ス然ハ飲食消
化シ難ク酸敗液アル症ハ牛膽ヲ健胃

劑ニ加用ハ膽液ヲ資補シ治ス下シ○胃中酸敗
液刺戟ノ胃痙痛心腹ヲ發シ衆藥効ナク經年不治。其
症發動スレハ心胸苦滿心下刺疼痞氣衝逆。吞酸懊
悶惡心或酸汁ヲ吐シ大便秘閉スル症ハ牛膽ニ阿
魏大黃ヲ加用テ効多シ即其治驗ヲ左ニ舉ク○一

學士三十六歲諸症前說ノ如ク時ニ發動ノ酸汁ヲ
吐シ大便秘結シ酒ヲ飲ハ頗發シ百藥驗ナク數年
往來タリ先左ノ健胃解凝劑ヲ與フ

解凝健胃飲

亞爾鮮越幾斯劑

酒石液

各三錢

薄荷水

四錢

甘消石精

一錢

右調和シ一匙宛服スルト日三次又毎夜麻煩涅失
亞^ア一名木一匙宛用ヒ蔬菜類ヲ減シ肉類ヲ許與ヘ數
日ヲ經テ諸症漸ク寛解ス因テ後方ヲ與フ

解凝魏膽丸

牛膽

阿魏 上好者
細末

大黃

細末 各四錢

右研和シ三瓦ヲ一丸トシ朝夕十九宛用^ル數週ノ心下苦悶刺痛。吞酸盡ク治シ大便順利ス。因テ漸蔬菜類ヲ許シ酒少計宛與、テ病發動セ^ス。然ニ此丸劑ヲ長服セレメテ全治^ス。患者精神輕爽面白色健旺ス。或酸物ヲ食メ稀ニ其症發動スルトアレ此丸劑ヲ用テ即^チ治^ス。其病原ヲ推究スルニ膽液ノ分利匱乏ノ胃ノ消化力ヲ失ヒ酸敗液ヲ釀生メ便秘スルナリ。大婦人五十餘歲。胃癰ヲ患^ス。三年時々

胃痛ヲ發シ飲食消化シ難ク萎黃病。胃虛ノ諸症ヲ發シ大便毎常三四日^{ツヨニ}通^ス。鎮痙止痛ノ諸藥。阿芙蓉液^名等ヲ與^フハ劇痛休^ムト雖モ復^ス發動シ制酸解凝ノ諸藥亦驗ナシ。因テ前說ノ魏膽丸朝夕十九宛與ヘ連服十四日ニメ胃痛盡ク休ミ大便日順利シ今既ニ半歲ヲ經テ再發セス萎黃病ノ諸症及色澤回復ノ精神健旺セリ。○一男子五十歲居常大便閉^ス。患ヒ其屎灰白色ナツ此症亦膽液ノ分利匱乏シ諸管寧急ノ發スルヲ察シ前方丸劑ヲ用^ル三週ニメ全愈ス。○牛膽ハ殺蟲ノ殊効アリ峻下ノ藥ヲ加

テ能蟲ヲ驅泄シ且其崩生ヲ制止ス。卽_{アヤ}薬刺巴_{ラツバ}名_{アヤ}等分ニ加ヘ小兒ハ二氏ヨリ四氏_{アヤ}テ用ヒ大人ハ量ヲ増ス。或丸藥トシ與フ。後方ノ如シ

牛膽驅蟲丸

牛膽 二錢

薬刺巴_{ラツバ}細末
名_{アヤ}一錢

右研和メ三氏ヲ一丸トシ五丸宛用_{アヤ}日三次或朝夕十九宛與フ。但諸症ノ輕重ニ隨ヒ增減ス。小兒ハ二味等分一氏ヲ一丸トシ桂末ヲ衣トシ四丸ヨリ八丸_{アヤ}テ舍利別等ニテ送下ス。右ノ丸劑ニ苦味健胃ノ藥ヲ加テ尤良。否サレハ瀉下已甚ク且蟲症

ハ胃腸ノ運營罷弱メ元力健運充張セサルヨリ生スル故ニ特ニ胃腸ヲ健運シ一ハ內藏ノ壅塞ヲ疏通シ酸敗液ヲ驅除スヘシ喻ハ後方ノ如シ

健胃殺蟲丸

健質亞那_{クナ}

名_{アヤ}

括失亞_{アエ}越幾斯劑_{ラツバ}

補_{アヤ}

乾白撒兒_{ルーテ}末爾扶斯_{ラツバ}

名_{アヤ}

牛膽 一錢半

薄荷油_{ラツバ}十二滴

右研和メ三氏ヲ一丸トシ蟇石末ヲ衣トシ四丸若_{アヤ}ハ其餘用ル_{アヤ}日四次_{アヤ}〇或經久遷延ノ神經病癪症等ニ牛膽ヲ用テ良効ヲ稱_{アヤ}然庄蛇蟲若_{アヤ}ハ內藏

壅塞ヨリ發スル症ニ非レハ効ナシ

服量生牛膽ハ日一錢ヨリ四錢マテ香竄人露水或
葡萄酒ニ加ヘ服ス乾牛膽ハ丸藥トシ或他藥ニ加
日一二錢用フ吉利詞爹兒ハ半錢許ヲ藥液一弓ニ
溶シ施ス軟膏擦藥ハ二錢ヨリ四錢マテ家猪脂四
弓若ハ六弓ニ和シ擦ス○苦味竄透ノ藥ヲ腹部ニ
擦ハ殺蟲ノ効アルト猶峻下ノ藥ヲ腹ニ擦レハ直
ニ腠理ノ喰收管ヨリ腸中ニ吸入メ劇々渴下スル
力如レ故ニ左ノ劑ヲ腹部ニ擦テ驅蟲ノ殊効アリ

格驅蟲膏

牛膽

格
碌
董
篤

名細

奇羅盧會細各未

半
加
猪
脂

卷一
廿

右研合ノ軟膏トス是ヲ腹部ニ擦レハ瀉下スル故ニ大人大便閉ノ症ニ適應ス。但シ小兒感動シ易ク瀉下メ害アル者ハ左ノ膏ヲ擦スヘシ。

盧膽驅蟲膏

卷之二十一

好者極細末

牛膽

卷之三

四

十一

右先文火ヲ以

以元家猪脂

ト
烊
トカ
シ

盧會牛膽

八

加、手、
之

休メス攬和シ火ヲ下シ放冷メ石腦油ヲ和ス○或
牛膽ヲ水ニ溶シ臍部ニ塗モ亦太便ヲ通シ小兒蛇
蟲ヲ殺シ下ス或此液ニヨ許ヲ吉利詞爹兒トシ施
スモ良○牛膽ヲ外敷メ腺ノ硬腫ヲ疏散ス○牛膽
ニ蜜ヲ和シ角膜斑點ニ擦メ消散ス○牛膽ニ乳汁
ヲ研和シ綿絮ニ蘸シ耳孔ニ挿テ耳鳴ヲ治ス○鰻
鱖膽性効牛膽ノ如シ按ニ鼈及鯉ノ膽亦牛膽ノ効アリ

依國

膽液稟性試說 分析術ニテ牛膽ヲ剖解スレハ水液
苦蜜味甘苦是ヲ以テ膽液味ヲ作ス 黃色ノ華爾斯是ヲ以テ膽液色及臭ヲ作ス

塩酸磷酸硫酸炭酸ヲ含ル曹達塩酸ハ海塩精磷酸ハ後ニ出シ硫酸

硫酸炭酸ハ後ニ出シ硫酸

ハ綠礬油曹達ハ礬蓬塩 磷酸加爾幾少許酸化鍊共ニ出アリ 此諸
物混和抱合ノ膽液ノ石鹼質ヲ結成ス殊ニ曹達ハ
華爾斯合水ト水ヲ合和セシメテ石鹼質ヲ成ス故ニ能
水ニ溶化ス。膽液ヲ諸酸酸性ニ加フレハ稍滾動ス。是
膽液ニ炭酸曹達ヲ含ムニ因ル篤○或云人類獸類
ノ膽液ヲ試ニ全ク石鹼ト同様ニメ亞兒加利性
一液ナリ。即動物ノ油ト山物亞兒加利塩礬蓬灰基
資トシ海塩乳糖性塩及少許ノ鍊ヲ含ル加爾幾石
動物ノ傑列ヨリ傑列ヒニ錢餘出少許混和 成ル○膽液ヲ燒テ灰ト爲シ水ヲ加テ灰汁トシ
メ成ル○膽液ヲ燒テ灰ト爲シ水ヲ加テ灰汁トシ

煮テ放冷スレハ亞兒^ア加利塩^アヲ結フ。其性尋常石鹼ニ含ル鹹蓬塩晶^{名同シ}○石鹼^ア鹹蓬塩晶^ア此石灰ト油ヲ以テ製ス^{名出}○白石鹼ハ初メ水^ア以テ鹹蓬塩晶ト生石灰^アヲ合ノ煎スル故ニ石灰^アヲ以テ鹹蓬塩ニ含ル炭酸^{後出}ヲ吸收シ去リ鹹蓬塩^ア亞兒^アカリ性極^アテ悍烈十ナル。是^ア濾^アノ渣^石^アヲ去則更^ア火^ア止セ水氣^ア蒸散シ油^ア加^ハ速^ア○亞兒^アカリ性^アタル^ア知^ル抱合ノ凝結シ石鹼^アナ^ル故貲^ア亞兒^アカリ性^アタル^ア知^ル○綿布ニ染汚セル油膩脂膏類^ア膽液ニテ洗^ハ速^ニ淨潔^トナリ尋常石鹼^ア雖モ潔雪^シ

難キ汚垢モ能^ハ除ク。是^ア石鹼質ノ明證ナリ○凡酸物^ア膽液ノ亞兒^アカリ性^ア制^ス。體中酸敗液アレハ是^ア以テ膽液ノ油質^ア分離シ亞兒^アカリ性^ア虧損^スノ凝固スル^ト宛モ石鹼ニ酸味ノ液^ア加^レハ其油質^ア分離ノ凝固スルカ如シ故ニ胃腸ニ酸敗液ア^レテ膽液ノ性力虧乏シ發スル諸症ハ牛膽^ア用^デ其膽液ヲ資補スレハ酸敗液自テ消化メ治^ス○或云數^ア膽液ヲ試ルニ曾テ酸性ノ徵ナシ。即^ハ左ノ試說ノ如シ○牛^ア屠テ尚溫ナル膽液ニ^テ取テ牛乳十

弓ニ加ヘ能振蕩メ良久ク靜定スレ。氏乳汁微モ粒塊ヲ生セス。〔ラ 分泌汗酸液ヲ加レハ稀稠自尚是ヲ火ニ上。煮沸一時半許ニメ放冷スレ。氏凝塊ナシ。唯膽液ノ脂油斯ハ爾ニテ酥ノ如キ者ヲ生スルハミ。牛乳ニ蒸餾醋一二滴加レハ忽チ凝聚メ粒塊ヲ生ス。是ニ牛膽液ノ加火ニ上。煮沸スレハ粒塊忽チ消散ス。是膽液ノ亞兒加利性ニテ酸性ヲ制服スル顯徵ナリ。或右ノ醋ヲ加タル牛乳ヲ火ニ上。前說ノ膽液燒灰汁ヲ加レハ其粒塊消散ス。是レ尋常蓬塙汁。酒石鹽汁〔名〕酒石液等ヲ加ルト同シ。或新ニ取タル牛膽液

ニ三四倍ノ水ヲ和シ是ニ青紙〔藥鋪〕紙ト云。一名ハ
館水ニ浸シ稀キ青汁ト爲シ。白紙ト云。是ヲ蒸
紙ヲ染メ用フ。是ヲ青紙ト云。ト浸セハ綠色トナル。是膽液酸性ナキ徵ナリ。若微モ酸性アレハ青紙必ス赤色トナル。即右ノ膽液ハ弓中僅ニ綠礬油一滴ヲ加。是ニ青紙ヲ浸セハ忽チ赤色トナルヲ以テ知ヘシ。然ハ膽液ハ毫モ酸性ナク。亞兒加利性タル。〔明白ナリ〕。然右ノ乳汁酸敗スルカ。若ハ膽液腐敗セル者ヲ合スレハ粒塊ヲ生シ酸性ノ徵ヲ見。スナリ。即陳久變敗ノ石鹼ハ油質酸敗セル故ニ。是ヲ乳汁ニ加レハ凝塊レ新製ノ石鹼ヲ加レハ些モ凝

塊セサルカ如シ。○膽液ハ腐敗シ易シ。夏月秋初ハ
殊ニ泡釀變敗ノ酷厲トナル。猶陳腐ノ石鹼ノ如
シ。○無病健康ノ人ハ膽液黃色。亞兒^{ルカ}加利性ニノ石
鹼様苦味甚ク。膠粘ニメ水^ヲ溶化シ易久。牛乳ニ加
テ酸性ノ微ナシ。膽液綠色サルハ膽液變敗ノ酷厲
トナリ且酸敗液アル候トス。

實^チ
艾^ギ
答^{タリ}
利^ス

[「]デギタリス[」]。呈^ル葉^{レア}羅[」]蘭[」]

形狀此草高二三尺。莖太^サ拇指ノ如ク稜様中虛。數枝
ヲ分^チ微赤色粗糙毛茸アリ。葉闊大。橢圓。黯綠柔ニ

ノ皺糙毛茸及刻缺アリ。香臭ナシ味或云氣味辛微苦。
葉ノ絞汁ヲ服スレハ口舌咽喉胃熖腫ス。夏月鐘様
五出ノ唇花ヲ開キ^ク四出形^チ和蘭^ニ用ル^{アリ}テ
如^シ四雄蕊ニハ一雌蕊アリ。第十四綱^ニ用ル^{アリ}テ
ハ心蕊^ト不^可是^テ據^テ等^ト家^ニ林^ナ斯^テ雄蕊^ヲ生^ス故^ニ雄蕊^ハ鬚^ニ附^ス。第^二目^〇皮^ラ籠^テ
種^類木^ヲ以^テ徵^テ等^ト分^ツ。非^レハ確^當ノ攷證^ニ辨^ハ重^ラノ又少^ニ雌形^ヲ百蕊^十餘^目有^フ分^立多^テ少^ニ○^〇雌榕^ヲ此種^十西心蕊^按ノ圓^ス
花紫色。裏面白點アリ。莖梢ノ偏^{カタ}面^ニ攢^ハ生^ス長穗^ヲ。此種^十西心蕊^按ノ圓^ス
草採網子目ノ^ハ心蕊^ト不^可是^テ據^テ等^ト分^ツ。非^レハ確^當ノ攷證^ニ辨^ハ重^ラノ又少^ニ雌形^ヲ百蕊^十餘^目有^フ分^立多^テ少^ニ○^〇雌榕^ヲ此種^十西心蕊^按ノ圓^ス
花紫色。裏面白點アリ。莖梢ノ偏^{カタ}面^ニ攢^ハ生^ス長穗^ヲ。此種^十西心蕊^按ノ圓^ス

ヲ爲シ萼五瓣。萼葉及短梗アリ。花後被子ヲ結フ木草ノ子ニ被子裸子アリ。被子ハ其子。被室ニ在ルヲ云。喻ヘハ胡麻牽牛等ノ子ノ如シ裸子ハ子室ナク直ニ萼中ニアルヲ云。喻ヘ紫蘇荆芥等ノ子ノ如卵圓シ第十四綱第二目ニ屬スル者皆被子ナリ。西卵圓ニメ細毛アリ。熟スレハ破綻分裂ノ二室トナリ。幾多ノ細子ヲ收ム。根鬚多ク味苦シ。二年ニメ枯ル。歐羅巴洲諸國ノ山地林中ニ生ス。

麻痺毒眼眩此草酷厲ノ麻痺毒アリテ神經ヲ刺戟ス故ニ過服スレハ恶心嘔吐或劇ク吐下シ或口舌咽喉胃腸焮腫ノ涎沫ヲ吐キ。頭痛眩暉。眼昏。瞳子散大。眼花閃發。視物綠色ヲ現シ小便過多。粘冷汗漏泄。

呃逆。肢體顫振厥冷搐搦ヲ發ス。○麻痺毒ヲ以テ心動脈ノ運動ヲ弛弱シ。脉動遲緩澁滯ス故ニ服量適宜ニ與レ。氏一日或兩三日ヲ經テ脉遲緩トナリ。休藥後モ尚數日遲脈退カサル者アリ。

試効花前ニ葉ヲ採リ藥用トス。或花及莖味辛苦侵蝕ス。此藥麻痺ト利尿ノ兩効ヲ兼又故ニ醫家是ヲ麻藥ニ屬シ或利尿藥ニ屬ス。○醫家多ク利尿バ効アリ。或云利尿ノ効アレ。氏害アルト少カラス。故ニ他ノ通藥ニ優リテ殊効ヲ推稱シ難シト。但是モ

幾多ノ水腫ニ質驗スルニ患者ノ體稟各異ナルニ
隨ヒ當否功害一樣大ラス。大抵患者體質虛弱ニ
黓澹色。脉弱。或間歇ニ肌膚冷テ弛弱。瘧然トノ浮腫
スル症ニ効アリ○水腫ノ腹内諸藏壅塞ヲ兼ル症
或衰弱ヨリ發スル遷延ノ水腫。經閉ヨリ發スル水
腫殊ニ胸水ニ効アリ。是利尿ノ効ノミナラス多ク
右ノ諸病ニ兼ル痙攣ノ運動ヲ降鎮スレハナリ○
此藥ノ酷厲毒ヲ以テ諸腺イ壅塞ヲ疏通シ尿道ノ
諸器ヲ開達シ又劇々大便ヲ瀉下ス故ニ水腫ニ用
テ利尿ノ一峻藥トス。但患者煥衝性大ラス脉亦強

實ナラサル水腫ニ効アリ多ク左ノ方ヲ用フ

實芟驅水散

實芟答利斯 細末

沙糖 一弓半

右研和メ散劑トシ分テ二十服トシ朝夕一服宛用
患者資稟薄弱感動甚キ症ハ右服量ノ半ヲ用ヒ。壯
實ニメ感觸鈍ナル者ハ漸々服量ヲ増スヘシ是ヲ
服ノ嘔氣若ハ下利甚キ者ハ阿芙蓉少許ヲ加テ藥
氣ヲ抑制スヘシ○一少年間歇熱ヲ患ヒ淹滯ソ終
ニ腹水トナリ患者虛憊メ瀉水術_{腹部ニ針ノ水ヲ}
施ス1能ハス。因テ右人實芟驅水散ヲ與レハ小便

速ニ快利ノ治ス或云此藥ヲ服メ腫脹ノ部ニ規吉
撒爾弗タラ擦レハ利水ノ効更ニ駿捷ナリ○小便

ヲ利シ水腫ヲ治スルニ左ノ數方皆捷効アリ

芨黃驅水散

實芨答利斯

一氏

金硫黃

半氏

安米

甘汞

四分氏

沙糖

半量

水腫用

右研和メ散剤一服トシ朝夕一服宛與ス一鼎涼用

芨姜驅水散

實芨答利斯

一氏

乾姜

末八氏

水腫用

沙糖

一刃

水腫用

右研和メ一服トシ日ニ二三服宛服ス

芨桂驅水飲

實芨答利斯

一錢

桂丁幾劑

一弓味

右先ツ實芨答利斯ニ沸湯半杯ヲ加^ミ浸ストニ二時津
ヲ去^フ桂丁幾劑ヲ和シ二匙宛用^フ日^ニ兩次〇近來海
葱ヲ加^ミ用^フ屢^ニ奇効ヲ得タル卽^モ後方ノ如シ

芨葱利水散

酒石英

末三錢

海葱

末十二氏

右調和メ散剤トシ分テ六服ト濟一服宛用^フ日^ニ三

次飲液ニテ送下ス。海葱ノ驅水劑中。此劑尤著實ニ
メ危懼ナシ。是ヲ服メ惡心嘔吐ヲ發スル者ハ半劑
或四分一ヲ與フヘシ。

實茭驅水煎

實茭答利斯 一弓 水 一升半

右煮減シ濾過メ。其液三分一トナルニ至リ。燒酒鑑
諸四錢ヲ攪和シ貯ヘ。用丸ニ臨テ此劑一弓。薄荷水。
洋芥水鏡各二弓。過爾托亞舍利別名二錢ヲ和匀シ
一時毎ニ一匙。宛服ス。

實茭利水飲

實茭答利斯 一錢 沸湯 八弓

右調和シ。緩處ニ置テ浸ス。八分時。濾テ燒酒者再鑑
一弓ヲ攪和シ。朝夕二匙。宛服ス。

實茭消杜飲

甘消石精圓 二錢 杜松實油圓 半錢

實茭答利斯。丁幾劑 一錢

右調和シ三十滴。宛服ス。ル。1日四次。○赤癰瘡羅斯種
和蘭名ロードランノ後。發スル水腫及頭水。腦水ハ此
藥ニ甘汞及清涼藥ヲ加用。テ殊効アリ。○頑固ノ黃
疽ハ左ノ方ヲ用テ。惡心或嘔吐ヲ發シ。或下利ノ諸

症解散シ治スル者多シ

斐翁解凝飲

實斐答利斯葉絞汁一弓

白頭翁水

芭葉ヲ蒸餚ス製法
薄荷水ト同シ

六弓

舍利別圖少許

右調和シ一時毎ニ二匙宛服ス○胸水腹水ニ此葉末二錢ヲ取リ水百六十錢ニ浸ノ藥氣ヲ出シ一時毎ニ一匙ヲ服シ吐瀉スルニ至レハ小便快利ノ治ス腹水ハ腫脹減スルニ隨ヒ腹部ニ繩帶ヲ施シ水ノ停ルヲ防クヘシ

○此藥ノ麻痺ノ効力ハ脉管質ノ抗張力ヲ減損メ脉動ヲ遲緩シ熱及譫語ヲ減ス故ニ誓留熱間歇熱ノ肌膚甚夕熱シ乾燥。脉疾數。譫語。舌燥渴。小便稀少或失血ニ傾ク症ヲ治ス。然ニ數脉減スルキ服量ヲ減シ脉六七十動ナルキハ此藥ヲ休ムヘシ○煥衝病ノ煥衝中ハ此藥必ス害アリ多ク防煥衝法刺下劑等清涼ヲ施ノ諸症減スヒ血液ノ煥衝莊再ナル者ハ此藥劑中ニ水銀劑ヲ加用テ尤効アリ○或云壯熱煥衝病其他劇病ニハ的當セス。且瞑眩スレ

ハ其害速ニ除カス數日復シ難シ○凡盧罷衰弱ノ諸病殊ニ神經感觸甚ク諸筋ノ觸動機劇キ諸症見シ或初血液運行過盛ニメ脉駛數ナル者漸々減ノ虛衰シ緩和降鎮ノ諸劑ヲ與レ氏治セサル症ハ此藥ヲ與テ間偉効ヲ得ルフアリ○此藥ハ心藏或觸動機ヲ減除メ動脈ノ搏動ヲ遲緩ス故ニ心藏或大幹動脈ノ狼僂ラウカウ_届タマツ百息肉塊腫等ヲ生メ烈キ心動悸ヲ發スル症ハ是ヲ用テ動悸ヲ鎮定スル一良藥トス○神經感觸甚キヨリ發スル欬血吐血等諸失血ヲ治ス○虛症ノ失血。脉管痙攣様リラク急ノ衝動ヲ

兼ル脱血。殊ニ婦人崩漏及墮胎ヲ恐ル症ヲ治ス○肺藏結腫及吐血ヨリ發スル勞欬ヲ鎮靜ス○肺勞ノ患者天質感觸甚ク或吐血或先天毒ヲ兼子。屢冒寒ニ罹リ胸痛スル症ヲ治ス。然既ニ虛憊シ多ク敗膿ヲ咯キ消耗ノ漏汗下利ヲ發スル症ハ害アリ○經久欬嗽。癲癇。頑固ノ神經病精神錯誤。或黑障眼。內藏膿瘍。頑癬侵蝕瘡等ニ効ヲ稱ス○總テ腺病ニ殊効アリ能水液及渴乙ヲ分利シ腺ノ塊腫乳房腫。腸間膜腺腫。鼠蹊腫等ヲ消散ス○肺氣管咽喉等ノ腺腫腺病毒瘰疬等ノ喘急或小兒腹膨脹硬滿ノ惡液多未症ニ

効多シ○瘻瘻毒ノ諸症ニ是ヲ内服外敷メ殊効アリ。一少年瘻瘻腫ヲ發シ數處膿潰シ愈サル。既二十年。又其毒右脚ニ蔓延メ腐爛劇痛シ衆醫是ヲ不治ニ屬ス。終ニ此草ノ絞汁一匙ヲ大麥煎十弓ニ和ノ温服シ其絞滓ヲ取テ毎日脚ノ患處ニ換貼。是ニ因テ患者劇ク吐瀉シ又涎沫ヲ吐キ口中糜爛ス。然ニ一兩日ヲ經テ其疼止ミ膿減シ諸症輕差ス。十四日ヲ經テ又其絞汁ヲ内服ノ吐瀉ス。是ヨリ諸症漸々退キ不日ニ全治セリ。其他頑固ノ瘻瘻腫二人皆此藥ヲ用テ治ス。或云。一少年遺毒ニ因テ險重ノ

瘻瘻ヲ發シ此藥ノ煎劑ヲ長服ノ表被剥脱シ全治セリ。○近來頑硬腫ニ此草ノ絞汁ヲ用テ殊効ヲ稱ス。但乳癌ニハ効ナシ。一婦人兩乳房ニ硬腫ヲ生シ乳癌トナルヲ恐テ是ヲ截リ除ントス。然ニ先試ニ此草ノ絞汁一匙ヲ與レハ大ニ吐ス。是ヨリ十二時中數夥ク赭色ノ膠粘液ヲ吐シ隨テ乳房硬腫一ハ盡ク消散シ一ハ縮收ノ移動ス。是其病毒。上腹ノ諸器ニ壅鬱ノ發セル。灼然タリ。○一婦人乳房及。頸ニ幾多ノ頑硬腫ヲ生シ又耳下腺腫起硬結スル。既ニ二年失鶴答。良若石灰水石鹼水銀劑等ヲ用

氏寸効十ニ終ニ實斐答利斯ノ花葉根ノ絞汁一匙ヲ水十六弓ニ攬和メ稀シ早朝頻々ニ服ス。是ニ由テ夥ク粘液ヲ吐シ眩運及痙攣ノ諸症ヲ發シ次テ劇々下利シ翌日ベテ止マス。糊ノ如ク灰色ニメ宛モ黃疸ニ瀉スル如キ汚物ヲ夥ク通利ス。因テ毎日其絞汁ノ服量四分一宛與ヘ。是ヨリ十二時中瀉下十次吐一次アリ。是ヲ連服スルト十八日ニメ大便平常ノ如ク。硬腫盡ク消散シ全治セリ。右兩件ノ經験說ヲ熟察スルニ此藥癌性ノ硬腫ヲ消散スルト信據シ難シ。其初症ハ眞ノ頑硬腫_癌タルト分明ナ

ラス。後症ハ瘰癧腺腫ニ近シ然ハ是レ癌腫ヲ治スルニ非ス。經久硬結ノ瘰癧腺腫ニ効アルカリ故ニ諸藥効ナキ。經久頑固ノ腺腫ハ是ヲ試用ノ性功ヲ推廣スヘシ。殊ニ峻吐下ノ効アル故ニ解凝疏散ノ偉効アリ然氏劫擊ノ毒性アル故ニ_{ツチニ}每常戒慎ノ妄投セス。患者資稟ノ強弱年齢ノ壯衰ヲ料リテ服量ヲ増減シ瞑眩ニ因テ自然良能ノ機力ヲ損壊セサルヲ肝要トス。○或云此藥ハ多量ニ與テ吐瀉スレハ捷効アリト。然氏是ニ由テ胃腸及神經ヲ虛損ノ復シ難キ者アリ故ニ少許宛與テ漸其量ヲ加ヘシ

服量葉ヲ取り散劑。泡劑。浸劑。煎劑。丁幾劑トシ用フ
○散劑。丸藥ハ患者ノ強弱ニ隨ヒ八分瓦ヨリ三瓦
一テ一服トス或云初メ四分瓦宛日兩三次與ヘ漸
加テ日四氏興ヘ連用ノ功ヲ見ズニ至ル但功驗少
多少ニ隨テ増減シ。瞑眩スルキハ暫ク休メ其症退
軒復用ヘシ。○煎劑泡劑ハ一刀身ヨリ一錢下斯水六
弱身ヨリ十弓叔以テ製ス。○連服スルニハ香竈揮發
ノ藥ヲ加テ瞑眩財防ク。○浸劑分二十氏ヨリ
一錢或一錢半ヲ取り水四弓ニ浸メ藥氣ヲ出シ薄
荷水或桂水一弓若ハ二弓ヲ加ヘ用フ是ニ由テ吐

瀉等ノ瞑眩ナシ或症ニ隨ヒ甘消石精。阿芙蓉。甘汞
等ヲ擇ミ加フヘシ。○或此葉一錢ヲ沸湯十六弓ニ浸
ス。一二時許ニノ萍ヲ去リ一匙宛日二三次服ス。○
丁幾劑八十滴ヨリ二十滴ニ至ル但單方複方アリ

實芨答利斯丁幾劑

單方

實芨答利斯葉細剉者一弓宋燒酒十五度者

右硝子壠ニ内レ煖處ニ置テ浸ス。一二日搾リ濾テ
ハラ去リ固封シ聽用ス。酒

複方

實芨答利斯葉細剉者二弓燒酒十五度者

桂水

各三弓

右硝子壠ニ内レ煖處ニ置テ浸ス。一四日。搾リ濾テ淳ヲ去リ固封シ聽用ス。

外敷腺腫。瘰癧腫。潰瘍。腐爛ノ浸淫瘡。頑癬等ハ此草生葉ヲ搗テ貼シ或煮テ芭布トシ或乾葉ノ末ニ脂糸ヲ和メ軟膏トシ或花葉共ニ家猪脂ニ加煮テ軟膏トシ患部ニ摩擦ノ峻効アル。多ク先哲ノ試說

ニ載ル如シ

華淑叔泊歐

薩爾沙根

スミラクス・サルサパリル・ヒ蘭

○榕按ニ薩爾沙根。和產未夕詳ナラス。先輩是ヲ

金剛刺或粘魚鬚ニ充レ凡確當セス。薩爾沙根。羅甸スミラクス。サルサパリル。ト名ク。スミラクスハ此類ノ統名ナリ。サルサパリル。ハ其一種ナリ。此類十三種アリ。其中充當スル者四種アリ。即チスミラクス。シナハ土茯苓。スミラクス。プロセウドシナハ牛尾菜。スミラクス。シホデハ細葉牛尾菜。スミラクス。ヒルロサハ和名ヒメカガラ。山兒ノナリ。往歲門人芬木尚雲牛尾菜根ヲ採リ。薩爾沙根ニ髣髴タル。以テ予ニ當否ヲ質ス。予應テ曰。牛尾菜ト薩爾沙ト固ヨリ同屬異種ナレ。凡此

根ノ形質氣味ヲ熟察スレハ薩爾沙根ト殆ト差異ナシ是ヲ以テ薩爾沙根ニ代用スル片ハ効驗必ス相伯仲ノ薩爾沙ノ下ニ在サルヘシト云。形状蔓生ノ灌木。數莖叢生シ綠色硬勒。小柔刺アリ。葉互生。橢圓ニノ未微尖リ長^サ三四寸或六七寸。點綠三縱道アリ葉梗ノ本ニ兩卷鬚アリテ傍木ニ絡ヒ。小莖ニ小白花攢簇シ瓣ナシ。萼六瓣アリ。此木雌雄株ヲ異ニス。雄木ハ雄花ノ之生シ雌木ハ雌花ノ之生ス。雄花ハ雄蕊アリ。雌花ハ雌蕊アリ。雄花ハ六雄蕊。雌花ハ三雌蕊アリ。網第二十二雌木ハ軟實ヲ結フ。大櫻子ノ

如メ繖ヨ爲ス初綠後紅終ニ黑色ナル。裏核アリ。或云裏三室アリ。各ニ子房收ム。○根頭。拇指大ニメ塊節勁硬是^{ヨリ}柔勒メ細根叢生錯綜メ。土中ニ蔓延シ長一二尺許。太キ者ハ鶯管メ如^シ細鬚縱橫交錯シ外面皺糙褐色裏白色。其質粉様ニメ指間ニ摩スレハ碎テ落葉松耳ノ如シ較著ノ香臭ナク味淡微甘。嚼テ粘滑ナリ上品ハ太鶯管メ如^シ纖鬚少々淨潔ニメ黑色^{アガリ}帶ヒス裏實ノ白色破碎シ易ク輕虛空疏ナラ^ス。李露伯西兒墨是可非爾入尼亞^{ヒルギニア}洲^ニ國名等^ア。產^ス

試効頭根ノ塊節ヲ去リ長條細根ヲ取用フ。○發汗清血ノ一良藥也。能ク粘液ヲ稀釋分利ス。水煎若ハ浸劑十シ用テ黴毒經久痼滯ノ諸症ヲ治ス。黴毒未タ久立經サル症ハ水銀劑ヲ用テ治ス。○氏經久頑固之症ハ峻効アル發汗排毒メ煎劑ヲ長服スル非セ。更治シ難ニ動ス。○効力劣弱ナル緩性ノ煎劑ヲ久服メ無益ノ治療ニ施ス。○誤用スル症ハ此根ヲ用銀劑ヲ投メ治セズ或提テ誤用スル症ハ此根ヲ用テ効アリ。大抵山牛蒡根、朴窟福鳥篤、薩撒弗刺斯、瑞香、蜀羊泉等ヲ加ム。卦二弓ヲ取テ水一比ニ投シ煎。

服ス。○冰銀劑ヲ用ヒ難牛痘。喻ハ冰銀劑ヲ久服メ虛憊甚者或夜分頭痛若ハ骨痛劇キ症ハ此藥ヲ用テ殊効アリ。○此藥ハ水銀劑ノ胃腸ニ侵襲スル害ヲ防キ。能ク水銀ノ効力ヲ皮表ニ布達ス。○尋常ノ黴毒諸症ハ此藥ニ水銀劑ヲ兼用メ治ス。殊ニ近來醫家升汞ヲ兼用メ多ク治驗用稱ス。○土茯苓、薩撒弗刺斯ノ如モ薩爾沙根ニ比スレハ峻効ナシ。此根及朴窟福烏鵲ハ能ク黴毒ヲ根治ス。或云此兩品中一品アレハ殆十治功ヲ濟スニ足ル。故ニ二品合劑トシ用フ。喻ハ後方ノ如シ。

薩朴排毒煎

中

薩爾沙根

二
四
十
弓

朴窟福烏鴉

各
一
弓

合

外

薩撒弗刺斯

四
十
弓

烏鴉

各
一
弓

右剗

冰四十弓加テ慢火上ニ置キ藥氣ヲ出ス

約十年時ニメ無十弓取リ服用ス

○微毒經久ニ

メ頑固潛結スル症ハ左

之飲劑尤驗アリ

害

護謨薩朴煎

水

朴窟福烏鴉

各二弓

圓

薩爾沙根

水

朴窟福烏鴉

各二弓

並

沸湯

水

朴窟福烏鴉

各二弓

右二味沸湯ニ浸ス

十二時ニメ後藥ヲ加ヘ煮テ

半弓減シ服用ス

亞刺比亞護謨

四
錢

薩撒弗刺斯

二
錢

又右煎劑ノ滓ニ水適宜ヲ加ヘ煮テ日常ノ飲料用

ス

每日午前ハ右ノ煎劑百六十錢ヲ服シ午後ハ再

煎ヲ飲料トシ適意ニ服ス

壯實多血ノ患者ハ刺絡

下劑及浴湯ヲ施スヘシ

但体稟薄弱瘦削若ハ纖維

弛緩スル者ハ刺絡下劑等適應セス

飲食ハ緩和ス

ル者消化シ易キ者

粉麪類ヲ與ヘ

保護溫煖ニメ能

ク蒸氣ヲ發スヘシ

朴窟福烏鴉ノ辛味ヲ嫌フ者ハ

亞刺比亞護謨或魚膠四錢ヲ加テ緩和シ或沙糖ヲ

適意ニ加テ發汗舍利別トシ與ヘ。殊ニ著實ノ効ヲ取ント欲セハ升汞溶劑等ノ水銀劑ヲ兼用スヘシ。徽毒輕重アレ由右ノ煎劑大抵三月許モ連服セサレハ特効ナシ。尚且居恒溫煖ニ保護ノ蒸氣ヲ驅散スルヲ肝要トス。若^ニ冷氣ニ觸テ蒸氣ヲ抑遏スレハ多服スレ氏驗ナシ。○遷延頑固ノ痛風。傷冷毒痛ニ是ヲ煎服ノ汗ヲ發シ血中ノ毒液ヲ泄泄シ治ス。殊ニ水銀劑ヲ多服メ功ナキ症ニ良。○水銀劑ヲ長服メ發スル疼痛或硬結腫。瘰癧腺腫ノ諸症。子宮ノ硬腫。膿瘍ノ潰瘍。頑癬類。惡厲ノ膿瘍等經久ノ皮病ニ

効アリ左ノ煎劑モ亦排毒清血ノ殊効アリテ治驗多シ。

薩朴瑞香煎

薩爾沙根 剁搗者

朴窟福烏鵲

鮑屑

甘草 各一弓

水 一升

右水ニ浸ス^ト三時煮テ半^ト減シ後藥ヲ加フ

薩撒弗刺斯 一弓

瑞香皮 鏡 三錢

右二味ヲ加テ火ヲ下シ蓋閉^テ冷定シ濾過ノ津ヲ去リ四五弓宛服スル一日三四次

[服量] 散劑ハ一刀ヨリ一錢マテ日三四次服ス○煎

劑ハ一弓ヨリ一弓半マテ水十弓或十二弓ニ加ヘ
煎服ス

薩爾沙根越幾斯劑製法健質亞那越幾斯劑圖下同

布依漢泊利華密

華尼利エビデンドラムハールラ羅ハテリイ又ハニルレバニルレ蘭

形狀一種ノ蔓草ニメ常春藤ノ如シ。蔓莖徑三四分許硬勒破折シ難ク綠色粘汁アリ每節數枝分テ蔓延シ節ニ卷鬚生メ傍木ニ絡ヒ木皮ニ著テ津液ヲ吸收シ滋蔓ス葉橢圓末尖リ老利兒葉拘櫞葉多羅葉ノ如キナ

云ノ如ク厚ク柔勒滑澤美綠色二葉節ヲ抱テ生ス花五瓣枝梢ニ生ス外面白帶綠裏面白清白中心白色ノ一瓣尾ノ如ク勾リ垂ル是蜜槽ナリ蜜槽图蜜ノ條花中ノ一瓣垂テ蜜槽ヲ爲ス者多萼ナク苞アリニシ蛾眉草風蘭石斛等ノ花ノ如シ萼ナク苞アリニ雄蕊ノ下端一雌蕊ニ著テ生ス第一目第二十綱花謝ノ莢ヲ結フ是ヲ藥用トス太小指ノ如シ差勾屈ノ本末狭ク扁ニメ長四五寸許濶半拇指横徑或云一分柔脆肉様微粘著シ縱理アリ熟スレハ赭赤或黒赭光澤アリ裏沙粒ノ如キ幾多ノ細子充チ黑色光澤佳香李露拔爾撒謨ノ如シ味香竈様ニメ微酸ヲ帶ヒ

脂氣アリ。秋冬莢ヲ取り乾ス。半月若ハ二十日許。時々掌間ニ摩メ徐々ニ壓扁ましノ半乾ク。代椰子油ヲ擦リ再乾シ貯フ。否サレハ濕氣ヲ含テ腐敗シ易シ。此莢五十個ヲ以テ一裹トシ販ク。熟スル頃採摘セサレハ自ラ拆裂シ黑色佳香ノ拔爾撒謨樣液滴滴。是ヲ鉢ニ承テ取貯ハ漸ク凝結ス。是ヲ拔爾撒謨ト。用フ。○上品ハ新鮮ニノ佳香竄透シ太ク長クノ重ク肥實ノ皺紋少オク黑色ナラス。油氣粘著セス。微柔ニノ甚タ乾枯セス。莢ヲ破レハ拔爾撒謨ノ如キ液アリ。是ニ細仁充ツ。此莢乾淨ノ處ニ貯。

ヘシ濕氣ニ觸レハ黴生ノ損敗シ佳香脱ス。但外面鹹味ノ粉生スルトアリ。是黴ニ非ス。莢ニ含メル揮發塩鬱蒸メ溢泄スルナリ。夏月殊ニ多シ。○牙埋加ヤイカ加冕涅エニネ等。南亞墨利加洲ノ諸國及印度地方ノ樹陰。水邊。濕地。自生ス。四月モハ月ニテ與大薦合。○榕按。ヒデンドウ。此草類ノ統名ニノ種屬三十餘種アリ。華尼利ハ其第一種ナリ。和產未詳ナラ。此種屬中。和產アル者ハ石斛。麥斛。蘭花。釵子股。白及等ナリ。然ニ皆華尼利ニ代用シ難シ。但是ヲ以テ其花形等ヲ類推メ知ルヘシ。

試効莢ヲ藥用トス。香竄揮發。拔爾撒謨性ノ油ヲ含ミ壯神溫補ノ古良藥トス。揮發衝動ノ壯神劑。當ノ諸病ニ用テ精力ヲ補充シ殊効ヲ稱ス。神經熱及虛冷ノ腦病。神經病。依剝昆姪兒イボコシノブタチ等ヲ治ス。○神經熱ハ神經感動ノ敏銳ト遲鈍ヲ論セス用テ峻効アリ。一時毎ニ四氏ヨリ八氏マテ與フ。峻効ノ揮發衝動劑ヲ與テ捷功ナキ症ニ間奇驗ヲ得タリ。○胃ヲ健運シ飲食ヲ消化シ風氣ヲ驅散シ不化ノ惡液ヲ化熟シ總テ胃虛ノ諸症ニ効ヲ奏ス。○虛症ノ經閉ヲ通シ。催生分娩シ。胞衣剥下ス。叔格刺亞度ラード竄香。

ノ飲料ノ名。撰第ニ加テ香竄料トス。○煥衝熱ニ過用スレハ煥熱增劇ス。○服量散劑ハ一錢マテ一服トス。或水。葡萄酒。其他適宜ノ飲液ニ浸シ二錢マテ

用フ

淑華

依叔

涅

東西醫交合論卷之三

神溫病氣之變換者不輕大病動

清病則用乎精力少德充於外故失精及神經

病神經病微細此謂先病第六等

達西醫方名物考證選輯

卷二

菲阿斯泰靈

桂香鎮癆飲

菲亞定痛飲

莊家定痛丸

安貧菲阿斯飲

兼門斯鎮癆散

甘亞兼門斯散

治例六則

菲阿斯鎮癆飲

蘿草健胃湯

菲阿斯起效斯劑

基阿斯膏

遠西醫方名物考補遺標目

卷二

菲阿斯失亞密

菲香鎮痙飲

菲亞定痛飲

菲汞定痛丸

安質菲阿斯飲

菲阿斯鎮痙散

甘亞菲阿斯散

治例訣六則

菲阿斯鎮痙飲

纈草健胃湯

菲阿斯越幾斯劑

菲阿斯膏

菲阿斯油

菲阿斯子
樊洪濟

催睡菲阿斯乳

菲阿斯失亞密圖

黑列僕利

黑列

拔設利丸

黑列僕利丁幾劑

攝爾列拔爾撒謨丸

5

遠西醫方名物考補遺卷二

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

ヒ
ヲ
シ
ア
ミ

スヒ
ワラスシ・アミム・ニグム・ロ
ルセ・ビアルセ・コロイド蘭

形狀此草圓莖叢生

葉長ク潤大。缺又多シ莖ヲ抱テ生シ粗糙遍ク毛茸

被ヒ厚ク柔脆ニメ

或
黑
綠
或
青
色
帶
ヒ

志。一雌志アリ 第五

第五綱 花梗ナク或短梗アリテ莖梢

ニ攢簇シ。萼五齒様。花開ケハ萼腫脹シ卵圓ノ蒴ヲ
結ヒ頂ニ蓋アリテ閉^フルカ如シ。熟スレハ閃開シ裏
ニ房ニ分レ灰白色。圓様ノ細子多ク充ツ根長直。太
ク粗糙。黯赤。裏白色。歐羅巴洲諸國ノ原隰廢苑荒野。
路傍籬邊ニ自生繁衍シ二年ニメ枯ル○此草嫌フ
ヘキ麻痺毒ノ臭氣アリ鼠甚夕其氣ヲ惡ミ避ク。味
微苦甘ニメ辛ヲ帶ヒ燒ケハ焚^{モエ}テ爆鳴シ消石ノ如
シ。此草ノ絞汁ニ青紙ヲ浸セハ赤色トナル。是酸性
アル徵ナリ○莖葉根子皆麻毒アリ殊ニ根ニ多シ
但多ク莖葉子ヲ藥用トス

麻痺毒瞑眩生草。毒尤峻。乾葉亦性力甚タ減セス過
服スレハ恶心嘔吐シ大ニ脳神經ヲ麻痺メ精神憊
昧。眼昏眩暈。瞳子散大。顏筋搐掣顫振。脉細數。頑麻昏
睡或精神錯亂譫語狂躁搐搦等ノ危症ヲ發ノ死ス
感觸劇クノ虚憊甚キ症ハ殊ニ危篤ノ諸症ヲ發レ
其害阿芙蓉ニ減セス^レ或云其毒。茛菪ニ減セス然^レ
茛菪ニ比スレハ害少^シ或云妄ニ此藥ヲ投スレ
腦ヲ抑壓メ溫素ヲ減損シ。諸器脈管ノ機轉ヲ減損
ノ血液稀釋溶崩。諸液脫泄。不利尿崩。漏汗等ヲ發ス
或云此藥ハ大ニ脳質ヲ損壊メ精神狂錯。昏憤。下血

等ヲ發ノ死ス然ニ牛馬羊豕等ノ畜類ニハ害ナシ
解毒此藥ヲ過服ノ瞑眩甚キ者ハ速ニ吐劑ヲ與テ
吐セシメ或醋等ノ酸液類ヲ與レハ速ニ醒解ス○
過用スレハ大害アルト右ノ如シテ雖モ服量ヲ慎
其病症ヲ精察ノ用レハ醫家日用ノ要藥トス
試効葉ヲ越幾斯劑十レ用フ○此藥ハ麻痺毒ヲ以
テ脳及神經ヲ鎮壓シ人ノ麻痺昏睡セシム。故ニ
服量少許宛用レハ鎮痉止痛催眠ノ一要藥トス阿
芙蓉ニ比スレハ心藏及血脉ヲ刺戟衝動セス血液
ノ運行ヲ增進セス熱ヲ發セス大便ヲ壅塞セス唯

神經ヲ麻痺メ感觸ノ銳敏ヲ鈍ニシ鎮痉止痛ノ効
ヲ爲シ却テ諸管血液大過ノ運動ヲ減損シ酷厲液
ノ刺戟ヲ抑制ス故ニ煥衛壯熱等一切運動過盛ノ
諸病ニ用テ動脈ノ感觸甚キヲ鎮定シ劇痛ヲ祛キ
寧急ヲ緩弛シ失血脫泄ヲ靜止シ總テ神經ノ常調
ヲ失シ感動大甚諸筋ノ觸動機劇盛大ル諸症ニ奇
効ヲ奏ス○凡阿芙蓉ヲ用ヒ効ナク或害アリテ用
ヒ難キ症ハ毎常此藥ヲ用ス先哲是ニ阿芙蓉ト比
較ノ優劣ヲ論シ或互ニ換用ノ功害ヲ驗シ各自主
能ノ異同ヲ辨晰セリ即チ左ノ所說ノ如シ○阿芙

蓉ハ劇痛ヲ止メ痙攣擣掣ハ運動。顫振瞶動等ヲ鎮メ諸液ノ脱泄。特ニ虚憊ノ下利。失血。多汗ヲ止メ皮表ノ蒸氣ヲ發メ肌膚枯燥ヲ滋潤シ不寐。精神罷勞セルヲ安眠セシム。精力ヲ資補ス。然ニ熱性ノ酷厲毒アリテ血液ノ運行ヲ増盛シ内熱ヲ釀成大便ノ壅閉スル等ノ妨害アル故ニ施シ難制症多。帝或云阿芙蓉ハ焮衝ヲ制止スト。然ニ是諸筋ノ觸動機メ大過テ降鎮ス。故ニ焮熱ノ刺戟暫ク寛解スルナリ。焮衝ヲ制スル藥ニ非ス。又劇痛ヲ止メ擊急ヲ解スル故ニ緩和ノ効ヲ稱スレバ暫時過レハ再發

メ故ノ如シ。且遷延病ニ數用ヒ或久服スレハ其麻痺毒ニ因テ諸竅ノ分利漸々壅滯シ水腫ヲ發ス。○阿芙蓉ハ華爾斯質ニ熱性閉澁ノ酷厲毒アリテ諸竅ヲ壅塞ス。菲阿斯ハ華爾斯ナキ故ニ起熱ノ性ナク酷厲毒アレ。氏閉澁壅塞セス却テ大便ヲ瀉シ小便ヲ利シ表發ノ蒸氣ヲ增進ノ病毒ヲ排泄ス故テ大便等壅滯ノ害天ノ症ハ是ヲ用。○或云菲阿斯ハ阿芙蓉ニ比スレハ麻痺スルヲ少々緩弛ノ効多ヒ故ニ是ヲ用テ神經虛憊スルヲ少々又少許ノ阿芙蓉ニテ瞑眩スル症モ菲阿斯ハ較著ノ瞑眩ナシ。○

痴腹痛。貌樓屈擗百吐糞病。霍亂。失血等。人神經感觸
ノ劇症刺痛。痙攣。擊搘。掣ノ鎮止スルニ阿芙蓉ヲ用。ビ
ハ諸竅壅塞メ害アル症ハ菲阿斯ヲ用テ劇痛ヲ鎮
メ撓急ア弛メ音大小便等壅閉ノ患處キ力如甚○
諸熱病。殊ニ神經熱ニ痙攢ノ運動。神經ノ諸症。劇キ
頭痛。譫語。不寐。搖掣。痙性ノ欬嗽。嘔吐等。兼此症ヲ
靜止ス。○焮衝熱ハ多ク防焮衝ノ治法前後施外後。
痙攢ノ運動。刺戟疼痛仍休。サルヲ祛クニ用ス。○
神經熱等ニ虛焮衝鏡卷十。焮衝合併編。出ノ發ニ精神蒙昧。譫
語アル症ヲ治ス。○此藥壯熱焮衝病ハ固ヨリ適

應セ又防焮衝法然ニ眞虛ノ病。眞虛ノ熱病ニモ的
當セス。唯假虛ノ症病毒壅鬱。若ハ痙攢ノ運動ニ因
ノ眞ノ虚脱云及熱病ノ虛實交錯セル症。或神經感觸
甚久。痙攢ノ運動。疼痛不寐等ヲ兼ル症干的効アリ。
凡熱病人神經諸症ヲ兼ル者ハ此藥適應スル。ア
芙蓉ニ勝レリ。○此藥鎮痙止痛人効大抵阿芙蓉ヲ用。
ヒ薦逾罷勞ス。菲阿斯ハ其害微血漏。消耗汗津。虛脫。漏
泄ス。全如キハ特ニ是乃推稱久。○凡精神知覺而係
牛若ハ痙攢搐掣人如キ諸筋ニ關ル病ハ皆神經病

ニ屬ス。總テ痙攣ノ運動アレハ血液凝泣ノ流利セス。病毒ノ分利ナ妨久。此藥ヲ用テ痙急ヲ除キ神經ノ諸症寛解ス。柴筋脉舒暢メ血液流利シ諸竅開通ス。殊ニ腸ノ分利ヲ増進ノ病毒能ク排泄ス故ニ阿芙蓉及自餘ノ鎮痙藥ニ超過ノ良驗外稱ス○小兒發熱搐掣或生齒透出シ難久之發寒止搐搦等ヲ治ス。此類ノ諸症ハ左ノ方殊ニ捷効アリ。即ち
菲香鎮痙飲 柴筋脉舒交散 **大蘇打**
當歸茴香水 一两半錢 **麻僵涅失亞** 一錢
消石精製者 半錢 **丸真滿那** 名

薄荷舍利別

各四錢

菲阿斯越幾斯劑

ニ氏

右調和シ半時毎ニ二三茶匙宛用ノ○劇キ搐掣。阿芙蓉ヲ用テ験ナク或小兒發熱搐搦。阿芙蓉ヲ用。難キ症ハ此藥特ニ効アリ○神經病ニ熱ヲ兼ル症及不寐。偏頭痛ニ効アリ。阿芙蓉ハ血ヲ頭腦ニ上衝シ動ス。レハ厥衝ヲ發ス。レハナリ○神經病。殊ニ子宮病ノ劇キ偏頭痛。其他一處ニ滯著スル頭痛ハ此藥ヲ神經劑ニ加用テ効アリ。喻ハ後方ノ如シ。

菲亞定痛飲

亞的兒

纈草丁幾劑

鏡

各二錢

菲阿斯越幾斯劑

一錢

右研和シ時々十五滴宛服ス。或患者ノ堪ルニ隨ヒ
増減ス。凡遷延病人輕キ鎮痛藥ヲ用フヘキ症ハ此
劑尤良。劇キ傷冷毒痛、痛風、顔痛、齦齒痛等ヲ治ス
殊ニ痛風傷冷毒痛及腺腫ハ扶歇蘭度ラシード人此越幾斯
劑ヲ用テ試験ノ稱ス。又安質アシット菲阿斯飲ラシード後或後方ヲ
與テ其劇痛ヲ祛キ病毒ヲ疏解メ多ク治ス。

菲永定痛丸

朴窟福烏篤脂

名

失鳴答越幾斯劑

名

阿魏

各一錢

甘汞

十五氏

菲阿斯越幾斯劑

半錢

右研合メ百丸トシ三丸宛用。一日三次。吐涎ノ候頃断
歛腫アレハ服用ヲ減ス。雙鸞菊越幾斯劑名ノ効ナ
キ症ハ殊驗アリ。○菲阿斯ハ胸腹諸器攣急ノ諸症
ヲ治ス。殊肺氣管ノ攣急ヲ治スル故ニ咳嗽、痙攣、喘急
ヨリ發ス。喉中怕痒メ發スル欬ハ一二氏用。テ治ス。○胃寒傷冷毒ノ欬嗽、胃欬、勞欬等劇メ呼吸
壅悶スル症及疫欬百日小兒痘喘羅アスラ、左ムミルラ
ト治ス。○頑固ノ疫欬ニ特効ノ一藥トス。但初發
病毒過盛ニメ熱性若ハ歛衝ヲ帶ル者日ヲ經テ漸

虛衰シ寒粘液性及痘欬發急ヨリトナル者ハ此藥

寧急ヨリ

的當ス。然ニ肺氣管大罷弊シ弛弱シ欬嗽荏苒トメ治セサル症ハ適應セス。專ラ幾那等ノ強壯劑ヲ

用テ治スヘシ○劇キ欬嗽。疫欬。痘欬。痘喘ハ此藥ニ

安質沒扭酒ヲ加用テ甚夕験アリ此剤服シ易クメ
毎常幾多ノ患兒ヲ救治セリ又痘撲搖擊等總テ神

經ノ諸症ヲ治ス即チ左ノ二方共ニ殊効アリ

安質菲阿斯飲

菲阿斯越幾斯劑

安質沒扭酒

右研和シ五滴ヨリ十滴ハテ用フ

菲阿斯鎮痉散

菲阿斯越幾斯劑

一丸ナカム

甘乙百葛格安那

細末

半瓦

沙糖 半刀

右研和メ散劑トシ一時毎ニ一服宛與フ○劇キ欬

嗽喘急及胸脇焮衝等ハ菲阿斯越幾斯劑ニ安質沒

扭劑

答越黙黙各等若ハ乙百葛格安那ノ末少許

ヲ加ヘ亞刺比亞護謨漿

名阿利穢油等ニ研和シ用

ヒ或安質菲阿斯飲

前出ヲ用テ欬ノ鎮メ吐痰ヲ進ム

○或肺嗽衝ノ困難ナル痙攣ヲ鎮メ吐血ヲ防クニ
用フ○或云胸脇嗽衝ハ此藥ニ消石硝砂ヲ加用テ
良効アリ○麻疹效及是ヨリ發スル勞嗽様ノ症ニ
効多シ○勞嗽様ノ熱病ハ嗽嗽吐血及痙攣ノ運動
力鎮定スルニ用フ或和胸藥鎮痙攣藥ヲ加テ尤効ア
リ喻ハ後方ノ如シ

甘亞菲阿斯散

伊里斯
弗魯連底
補一謨
末○缺ル
細ハ
用ス
代ニ
亞刺比亞
蘆

甘草

卷之二

亞鉛華名

古羅菲阿斯越幾斯劑

名
氏

4

右調勻ノ散劑トシ時々一小刀尖宛服ス○欬血ノ
症神經感觸甚ク。肺氣管ノ劇キ攣急ヨリ發スル者
ハ此藥ヲ用テ胸腹諸器ノ攣急ヲ靜止シ牽痛ヲ緩
弛メ治ス○吐瀉霍亂劇キ吐血其他失血過多等痙
攣ノ運動甚キ症ハ此藥ヲ與テ攣急ヲ緩弛シ治ス
○遷延諸病ノ發熱焮衝ナク唯痙攣ノ運動及鈍痛
ヲ兼ル症或内部攣急牽痛アリテ經年治セス葛^カ松^ス
多僂謨^{トレウム}阿魏^{アヘイ}庵爾拔奴謨^{アーバヌム}等ノ鎮痙藥ヲ長服メ
驗ナキ症ニ此藥効アリ。總テ頑固人病ハ阿芙蓉^{アーフロジウム}
如キ壅塞スル藥ハ久服シ難シ菲阿斯ハ服量ヲ慎

テ數用且長服スレ氏發熱煥衝便秘ノ害ナク却テ諸竅ヲ疏通シ病毒ヲ排泄スレハナリ○瘻症、痘症、胃症心腹痛、子宮衝逆、劇キ嘔吐或ニ攣急ニ因テ尿閉若ハ小便澁滯スル等ハ此藥ヲ用テ其發動ヲ靜止シ治ノ後大便瀉シ或痔血通スル者アリ○腹内諸器ノ攣急、腸痛等、阿芙蓉ノ驗力キ症ハ此藥ヲ用テ治ス但過用スレハ下利ス。故ニ阿芙蓉大同効トシ矣、ニ下利痢疾ニ投スレハ害アリ○神經病ノ肩痛若ハ腸痛ヲ兼ニ飲食化シ難ク風氣痞脹噫氣苦満ノ患者ハ毎夜此越幾斯劑ヲ取テ一匕ヨリ二三匕

テ用ヒ朝食亦少許宛用テ治スヘン。阿芙蓉ニ比スレ止痛ノ効少シト雖モ便秘ノ害ナシ○痘腹痛ハ嫩衝人候ナク粘液壅滯及攣急ヲ兼ル症共効アリ每發阿芙蓉ヲ用テ効アル症ハ漸ク是ニ慣テ多量ヲ用ヒ其外驗亦殊。此症少量メ菲阿斯ノ用レハ每次効ナル多量ノ阿芙蓉ニ勝リ○痘攣性ノ痘痛ニ大便閉若バ、貌傳屈前外兼此症、阿芙蓉能ク其疼ヲ鎮止スレ氏逾壅塞ヲ増ス。故ニ菲阿斯並瓦ヲ取テ一服ナシ與レハ其疼立ニ消ノ太便利シ。痔血壅滯アル者ハ痔脉開破ス。故ニ痘痛ノ攣

急甚ク及。瘡血壅滯ヨリ發スル症ハ此藥ヲ用テ攀急弛解シ壅塞開達スレハ瘡血通メ治ス。或此藥乳汁ニ煮エ吉利詞爹兒^{アリス}十日施メ亦良。内外諸部之腺毒^{瘰癧等}壅塞結腫。腺腫。瘰癧。癌樣硬腫ノ疼痛若ハ頑固メ燃衝^ヲ兼ル症。總肝腺及水脉沕^ク乙管多キ部ノ病ヲ治ス。此藥鎮痛軟化ノミナラス解凝疏散メ効アリテ腺ノ壅塞ヲ開通スレハナリ。殊ニ肺藏中ノ結腫及是ヨリ發スル欬嗽ニ効ヲ稱ス。此藥腦神經ヲ麻痺壓鎮スル故ニ搐掣攣急アル遷延神經病。瘡症。癪。發狂。神思憂悶病。痴迷等ノ精神及諸筋

無係ル病ヲ鎮定ノ酷厲毒ノ内鬱ヲ排泄ス。故ニ未經久沈痼セサル症ハ治スル者多シ極テ險惡ノ症^ハ固ヨリ藥力ノ治スヘキニ非ス。然ニ此藥ヲ投メ毫モ効ナク或害アリトシ擯斥スル者アレ氏其的効ヲ知^ラサルニ因ル左ニ舉ル如シ○傑列陳^{ザシグ}人云、神思鬱憂痴迷錯狂及癪ニ狂ヲ兼ル症ニ此藥ヲ試用ルト四十人許。大抵初一氏宛日^ニ三次。長服スルニ隨ヒ漸久加^テ十八氏ニ至レ^ハ驗ナシ或頭腦ノ患症差減シ或陰症輕差ヲ得ル者アレ^ハ究竟患人ノ體稟ヲ損害シ危殆ノ瞑眩ヲ爲スニ非レハ効十シ

然ハ是著實穩當ノ藥ニ非ス貨墨ホーメー人モ亦云是ヲ搗
掣ノ諸病ニ用テ良功ナシ或云此藥癪ニ大効ヲ稱
スレバ是ヲ投シ却テ増劇ノ危症ヲ現シ或暫ク發
作ヲ抑遏スルトアレ此無幾劇發ス○然レ古來諸
名哲癲癇發狂神思憂悶痴迷等ニ用テ治驗ヲ得ル
說甚多シ殊ニ右ノ貨墨ホーメー人說ハ僅ニ兩三人ニ
試ミ且ヒアス子ヲ越幾斯劑ホーメー人多ク歴試
徵ヲ取ルニ足ラス又高明ノ斯篤爾窟ホーメー人多ク歴試
メ癰癥諸症ニ確實ノ治驗ヲ稱ス卽チ云癪發狂
神思鬱悶痴迷及搖掣失血等ニ此藥初一氏宛日兩

三次與之漸久加テ十五氏ニ至リ治スル者十三人
其後又从人ニ試ミ不治ノ症アレ此驗アル者居多
凡癇及小兒驚駭ヨリ發スル搐搦ニ殊ニ治驗多シ
○或云神思抑鬱慍怒等ヨリ發スル狂病ニ此越幾
斯劑上氏ヲ取テ沙糖半錢ニ和シ與之十數日ニ
治ス扶歇蘭度ラント人云發狂諸藥驗ナタ阿芙蓉亦効大
キ症此藥半夕薄荷水六弓ニ溶化シ與之漸ク加
テ一刀ニ至全治セリ○或云神思鬱悒悲悶錯狂
不寐擊急シ筋肉强硬肌膚乾燥スル症此藥的効
アリ阿芙蓉ノ如キ起熱ノ品ニ鬱熱壅塞メ諸症增

發ス。○谷爾林名云、痙攣發狂神思錯誤迷罔及失血等ニ此藥ヲ與テ殊効多シ。一僧六十歳、頭瘡乾愈ノ頭旋眩運ヲ患ニ殆ト二十年。衆藥効ナシ乃此藥ヲ與ル。一日一氏漸ク加テ連服。一月餘ニメ宿患脱然。爾後再發セス。○凡、鎮痙劑必用ノ症ニメ阿芙蓉驗ナク菲アス。ヲ用テ効アル治例左ニ六則ヲ舉ク。

第二一婦人癲衝病ニ罹リ清涼劑ヲ投シ刺絡ヲ施シ治メ。後時々劇キ搐搦又發スル。半時餘或終日暫留ス。諸鎮痉ノ峻劑及衝逆ヲ降鎮スル劑ヲ內服

外敷スレ。氏寸効ナシ。但阿芙蓉ヲ與レハ差驗アレ。氏全治ノ功ナシ。因テ菲アス。越幾斯劑ヲ取テ初朝夕半氏宛與ヘ漸ク加テ五氏ニ至レハ搐搦發スレ。氏速ニ醒解シ且病勢漸ク減メ其驚怖スヘキ劇症十四日ヲ經テ全治セリ。

第二之男子五十八歳。稟賦虛弱矮小。蚤歲ヨリ聰敏不凡。一兩年以來哮喘ニ罹リ且膝脚刺痛メ暫留シ夜中劇痛堪難ク短氣促迫殊ニ甚ク毎朝起坐スル不能ハス。十月頃十八六年百喘息短氣增長シ不食虛羸季肋下亦鈍痛シ吸氣ニ胸痛スル。肺創ノ刺戟ス

ルカ如シ又腕臂及膝以下冰冷シ溫毛布ヲ纏ヒ或
毛皮ニテ裹ムト雖モ溫ガラス。發作劇キテハ肢節
顫振心動悸苦悶烈ク呼吸促迫ノ窒塞ヲ恐レ或暫
ク知覺ヲ失フ。大抵發作四分時ニノ解散ス。一晝夜
一發或二發尚其餘數發スルコアリ。始終毫モ熱ナ
シ。從來鎮痙藥阿芙蓉葛私多僂纈草阿魏等ヲ試テ
微功ナク發作逾增劇ス因テ先ツ試ニ菲阿斯越幾
斯劑十氏ヲ取テ纈草濃浸劑六弓ニ溶化シ一時每
ニ一食匙宛與テ次ノ發作大ニ減ス。是ニ由テ其越
幾斯劑十五氏或二十氏六テ纈草浸劑六弓ニ溶化

シ葛私多僂丁幾劑亞的兒各四錢ヲ加ヘ用ヒテ烈キ
喘急盡ク解散ス。其後越栗失爾赭鴛立沃利名ヲ用
テ全治セリ。爾後四年間喘息發スルコアリ兩次仍前劑
ヲ用ヒテ治シ竟ニ再發セス

第三 一貴婦五十歲稟賦強壯肥胖シ神思爽輕ナリ。
十一月千八百 診察ス其症体軀甚夕羸瘦虛憊。脉遲
ニメ一密扭篤ニ三十八動或四十動許密扭篤名卷
二十一ニ註
ス精力虛乏語音續セス聽了シ難シ脚ニ粘液腫ヲ
發シ臍部ヨリ心下ノ右邊ヘテ重痛ヲ患ヒ數年毫
モ休テス今漸ク增長シ劇キテハ屢死セントス。然

氏其疼截^カ如ク焚^カ如クナラス唯鈍痛ノ腹底ニ
在リ。又子宮病ヲ兼テ神思鬱重憂悶シ。時ニ錯誤ス。
此症或^ア阿芙蓉ヲ取テ散劑若^ハ下幾劑ニ加ヘ與レ
ハ毎ニ其疼止ムト半時許ニメ復劇發ス。或^ア鹿琥精^{ツコ}
鹿琥漿ト同シ補葛^{カス}私^{トル}多僂^ル阿魏^ヲ丸トシ多服メ驗ナシ。且
諸醫ヲ延キ多年施療スレ由輕差^ヲ得ス。終ニ患婦
危篤ニメ數日續命シ難ク見^ユ予意^ヲク阿芙蓉服
量足^ラスノ効ナシト。因テ一時毎ニ工氏宛與レハ
患者吐スルノ三次大ニ憊困ス。故ニ又阿芙蓉丁幾
劑ト香竄丁幾劑ヲ等分ニ和ノ一時毎ニ三十滴宛

與ルノ兩次復吐ス。是ニ於テ菲^ヒ阿^ヲ斯^カ越^キ幾斯劑ト薄
荷等分溫葡萄酒ニ和ノ琶^バ布^ブトシ胃部^{心下}ト腹肚ニ
貼シ。又菲^ヒ阿^ヲ斯^カ越^キ幾斯劑十氏^ヲ取テ桂水一弓ニ溶
シ四分時毎ニ十滴宛用フ。是ヨリ患者精力回復シ。
三日ヲ經テ欒痛盡ク消散シ。爾後唯一次發動スル
ノエ。其脚腫モ亦對症ノ藥ヲ與^テ全治シ患者復肥
腴ノ體力壯健。精神輕爽ナリ。惠^ベ。燐^シ。膏^シ不^シ
第四一貴婦五十二歲體軀矮小。資稟薄弱。神思溫柔
寬裕。八月^{千八百}天行下利ニ罹^カ。治メ三月後復下
利シ亦治メ後屢瀉利メ僅ニ粘液ヲ通シ肛門及腸

絞痛裏急後重ヲ兼子下利セサレハ大便秘結シ久
ク閉滯メ治セス衆醫投藥經年驗ナシ但下利劇發
スレハ舍電阿芙蓉液名十滴宛數日與テ劇症ヲ靜
止スルノミ是ニ由テ便秘ヲ患フ。數醫診メ皆不治
トス予吉訥キ護謨コム格綸ボ僕アング安倨斯ス黒刺カ葛斯加栗刺カ共
等ヲ單用シ或ハ對症ノ劑ニ合シ阿芙蓉ヲ加用ヒ
刺戟性ノ軟膏ニ綠礬ヲ加テ少腹ニ擦シ又槲皮ノ
浸劑ヲ以テ少腹ヲ蒸湯シ互ニ施スノ一月餘ニノ
病勢寬解セス其後煅鉛鉛ヲ陶坩ニ入セ煅テ灰
色ノ細粉トナル者、羅甸名灰
オセイデ一錢ヲ取テ薄荷水四弓ニ溶シ亞刺比亞
アリムヒ

護謨三錢阿芙蓉一錢ヲ加ヘ一時毎ニ一茶匙宛與
テ諸症大ニ寬解セリ然ニ連服十四日ニノ下利再
發ス仍此劑ヲ與ルノ四週ニノ煅鉛總計一弓ヲ用
ヒ下利往苒タリ是ニ於テ阿芙蓉劑ヲ休メ菲阿
斯ス越幾斯劑キス元鉛醋名少許ヲ和シ與レハ腸痛頓ニ
消シ裏急後重休ミ下利モ亦治メ大便秘閉セス。今
既ニ一年ヲ經テ壯健ナリ

第五一婦人二十二歳天資薄弱十歲頃ヨリ胃痙心
痛ア患ニ數醫施治メ全愈セス。二年以來阿魏葛私
多樓。亞鉛華。鹿琥精。收斂亞的兒名等ヲ屢試之用テ

驗ナシ。但患婦去歲始テ懷姪シ其間諸症退キ藥劑ヲ服セス壯健ノ兒ヲ產シ躬ラ乳養セリ。然ニ產後舊病再發甚クメ一切食物ヲ惡ミ些モ強テ與レハ胃口牽縮攣痛メ恶心嘔噦ス三月十一日千八百九年予診治ヲ請フ。產後四週ヲ經テ今尚卧床ニ在リ。予阿芙蓉液ヲ取テ一時毎ニ四滴宛與ヘ都合一錢ニ至レ氏驗ナシ。患者云前醫モ亦屢此藥ヲ用レ氏驗ナシト。因テ菲阿斯ヲ試シト欲シ後方ヲ作テ一時毎ニ十五滴宛用ヒ又湯劑ヲ兼用シ前說ノ第二治例中ノ芭布ヲ胃部ニ外敷セリ。

菲阿斯鎮痘飲

菲阿斯ヒアス越幾斯劑 十二氏

纈草糖油劑 一錢○纈草蒸餾油ニ沙糖ヲ和
條ヒダ一出ツハ鏡纈草ノ條ニ出ツハ鏡薄荷油
薄荷ヒハ細末 一弓

葛私多僂カスコト丁幾劑四錢

右調匀ス

纈草健胃湯

纈草根ヒハル

錢

白芷ハイチ

各等分

右調和シ四錢ヲ取テ沸湯百六十錢ニ投シ蓋閉シ

浸スヲ半時。其液ヲ取り連用十四日ニノ諸症回復
シ爾後發動ノ候ナク健康ナリ

第六 一貴官ノ處女十四歳未夕月經ヲ見ス二月十四日十年百顯著ノ起因ナクノ大ニ噫氣ヲ發シ響鳴ノニ密扭篤ノ間。連繙シ毎ニ休ムヲ八分時ニメ復發ス。是胃管ノ劇キ痙攣ノ運動ニ因テ風氣ヲ生シ胃中ヨリ奔騰シ出ルナリ。初發餘症ナシト雖モ日ヲ經テ漸ク心部疼ニ。歩行スレハ勞倦ノ脚痠痛シ心部ノ疼。日ニ増劇シ噫氣スレハ大ニ苦悶シ頭痛ヲ兼ヌ然ニ寒熱ナク食味變セス渴及恶心ナク

舌苔生セス診脉及大小便平全ノ如シ但表發ノ蒸氣減ノ肌膚潤澤ナシ。予下劑ヲ投シ大便通スル十六回ニノ午後幾那複方丁幾劑鑑卷七丹一葉ト越栗失爾赫篤立沃利卷二十九等分合ノ用^ト二日半。諸患減セス其疼逾增劇ス。因テ阿芙蓉液ヲ取テ三滴宛半時毎ニ與^ト二日。患症毫モ減セス。是ニ於テ菲阿斯越幾斯劑十氏ヲ取テ桂水ニ溶シ一時毎ニ五滴宛與ヘ漸ク加テ患者眼昏暗ナルマテ試ミ用ントス。然ニ十二時ヲ經テ噫氣劇疼大ニ寬解シ唯微ク噫鳴頻發スルノミ。次テ此劑一時毎ニ十五滴^トテ

用ニ至テ諸、患症全治シ爾後些モ發動ヲ見ス

服量越幾斯劑。三氏ヨリ漸加テ十五氏或其餘モ用フ。或云半氏ヨリニ氏マテ一服トス。或、症ニ隨ヒ漸加テ五六氏若ハ十二氏ニ至ル。芳香ノ露水或適宜ノ飲液ニ溶シ用。或丸藥トス。○小兒。一氏ヨリ漸加テ四氏ニ至ル。或云一歲ノ兒ハ日ニ二氏寃與ヘ二歲以上ハ漸ク加テ日ニ四五氏下テ用フ小兒ハ多量ニ耐テ瞑眩少シ。

菲阿斯越幾斯劑製法

花前ニ莖葉ヲ採リ搗爛シ布巾ニ包ミ榨器ニ内搾テ稠粘ノ汁ヲ取り磁鍋ニ

内慢火ニ上セ水氣ヲ蒸散ノ稠厚ト爲シ火ヲ下メ放冷シ。菲阿斯乾葉ハ細末ヲ取テ右ノ榨汁四分一ノ容ヲ加テ攪和シ適宜ノ越幾斯劑ノ稠トナシ硝子壠ニ内固封シ貯フ。此劑揮發塩多シ故ニ日ヲ經テ凝固スルニ隨ヒ其塩ノ結芒ヲ現ス。

外敷菲阿斯越幾斯劑ハ外敷ノ鎮痛緩和軟化解凝疏散ノ良藥トス。肢節痛。顫振ヲ兼ル症或脚麻痺等ニ失禮答。加密列亞麻子粉ヲ加ヘ琶布或蒸湯藥トシ施メ治ス。其他葉ノ効ト同シ。○葉ハ外敷ノ血液過盛ノ運行ヲ鎮靜シ焮腫ヲ消シ清涼止痛鎮痙緩

和軟化疏散ノ峻藥トス ○ 痛風傷冷毒等ノ劇痛ヲ
止メ或硬結腫。癌瘡。腺腫。瘰癧腫等ヲ軟化シ或消散
シ或其疼ヲ祛キ或其疼アル潰瘍ヲ治シ或瘰癧毒
ノ熾衝眼。羅斯様ノ熾腫。劇痛アル腫瘍。乳房硬結腫
痛ヲ消散シ若ハ化膿ス ○ 乾葉ハ花前ニ採リ速ニ
乾シ或細末トシ硝子壘ニ内レ固封シ聽用ス。生葉
ハ搗テ貼シ或莖葉花根子共ニ採リ用或蒸湯劑。琶布。細末。或軟
膏トシ或加密列接骨花ヲ加ヘ搗テ沸湯若バ乳汁
ニ擂和シ琶布トシ貼ス ○ 痛風。傷冷毒痛等ニ此葉
ヲ水ニ煮テ蒸湯シ或乳汁ヲ加煮テ琶布トシ患處

ニ貼ノ治ス。一男子頭痛劇ク且手臂痛險重ニメ經
久治セス此琶布ヲ貼ノ捷効アリ。一女兒流走痛ヲ
患ル。三年衆藥驗ナシ此藥ニ蒸餅心ト乳汁ヲ加
ヘ煮テ琶布トシ頻ニ貼ノ治ス ○ 一婦人全軀顫振
甚クノ嘔噦休マス面部ニ汗淋漓ス。右ノ琶布ヲ肢
節ニ貼シ三日ニメ治ス ○ 乳房硬結腫痛ニ此葉ヲ
貼メ速ニ消散ス ○ 芫菁ヲ過用ノ小便頻數淋瀝劇
キ症。右ノ琶布ヲ内服外敷ノ治ス又龍腦阿芙蓉ヲ
兼用メ尤良。○小便閉ニ劇痛或熾腫ヲ兼ル症ハ此

偉効ヲ稱シ血液過盛ノ運行ヲ靜止ス或此油ヲ越
没里膏名ニ和シ擦藥トス○腹部ニ擦テ蛇蟲ヲ殺
シ婦人月經過多ニ腹腿合縫ノ部及腰ニ擦テ治ス
腺腫ニ擦テ消散ス○腸歛衝ノ劇痛攣急メ大便閉
八日諸藥効ナキ症ニ此油ヲ溫ノ頻ニ患處及背ニ
擦テ諸症速ニ解散ス○一婦人產後身體下部風氣
鬱蓄メ壓迫シ大ニ攣痛ス此油ヲ溫メ頻ニ患處ニ
擦テ治ス○菲阿斯子ハ搾リテ油ヲ取ルトナシ此
搾油ハ麻痺ノ効微ナク罂粟子油蓖麻子油ノ如キ
滑利緩和ノ効ノミナレハナリ

菲阿斯子試効麻痺毒尤峻ナリ鎮痙止痛催睡ノ一
藥トス細末トシ一二氏ヨリ一刃々テ服ス○癪ニ
此末日六氏ヨリ一刃々テ數日連服ノ治驗ヲ得
痛風傷冷毒痛腎痛ヲ治ス○此末ニ麝香甘汞ヲ加
テ丸藥トシ或桂水若バ安質沒扭酒ニ加テ飲液ニ
滴シ用テ鎮痙解凝ノ峻効アリ○乳劑トシ催睡止
痛ノ一良藥トス後方ノ如シ

催睡菲阿斯乳**菲阿斯子**

一刃

甘扁桃去皮

各二錢

右研和ノ乳劑

製法鏡卷十四

清涼子ノ條トシ濾メ六弓トシ半

時ニ一匙宛服ス○吐血崩漏勞欬等ニ左ノ煉膏奇効ヲ稱シ又鎮痙止痛催眠ノ良劑トレ通用ス

菲臘玫瑰膏

白臘粟子 ホウサク 菲阿斯子 各半錢

麗春花舍利別 リョウブ

玫瑰昆設爾弗 ルフ 各一弓

右研和シ胡桃大宛服スル丁日兩次○齶齒痛ハ此子ニ蠟少許ヲ和シ炭火ニ投其漏斗ヲ蓋テ其烟ヲ

齶齒ニ薰メ即効アリ

依福潤拔

菲阿斯失亞密寫真圖



舶來乾腊菲阿失亞密圖

榕菴寫



黒列僕利

「ヘルレボラス・ニグラム」
羅
「スワルテニースユロイド」
蘭

形狀

此草長莖叢生。多液。紫斑アリ。莖頭六七葉或九葉攢生シ。長キ梗アリ。繖布ノ手指ヲ開ク如シ。老利兒葉ニ似テ鋸齒アリ。黯綠滑澤厚固硬勒。春月太キ莖ヲ抽ト一指長。莖頭一二花或數花攢生ス。五瓣(或アリ)者。薔薇様。淡紅或白色(或白色ノ條紋或紫紅白斑駁アリ)。雄蕊二十以上。多雌蕊アリ(第十三綱第七目)。花後角様ノ子室四五個簇生ノ直立シ。穂斗菜角ノ如シ。裏ニ多ク卵圓黑色ノ種子アリ。根塊球様。大サ肉豆蔻ノ如シ。是ヨリ

枝節アル幾多ノ條根生シ是ニ遍ク毛様ノ鬚根生
ス外黒色。裏白色。味簽辛微苦。嘔スヘキ臭氣アリ。鬚
根ヲ藥用トス。球根條根ハ峻効ナシ○或此根ニ似
タル草根ヲ以テ偽ル者甚多シ。偽品ハ鬚根直ニ塊
根ヨリ生シ。眞品ハ鬚根皆條根ヨリ生ス。偽品ハ塊
根小サク纖鬚甚夕多ク。特ニ黑色ニメ裏甚夕白色。味
辛苦。微甘ヲ帶ヒ臭氣甚シ○此草經年枯レス獨ヒ
都諸國雪微設兒蘭上スツイツセツルシンド歐羅巴ノ牙而白ルビンジ地名ニ生ス
試効細根ヲ用フ。吐下ノ峻効アリ但藜蘆ニ比スレ
ハ酷厲毒少ナクノ危懼ナシ。生根ヲ過用スレハ烈

ク吐瀉シ。眩運嘔逆。胃腸煥衝ヲ發ス。故ニ煥衝病ニ
ハ害アリ。乾根ハ其毒減耗ス○水腫ニ用テ大小便
ヲ利シ停水ヲ除クニ駄効アリ殊ニ脉管纖維ハ虛
弱縱緩ノ粘液留飲壅滯シ發スル症ニ的當ス此症
ハ差多量ヲ用テ停水ヲ大小便ヨリ驅除スヘシ○
此藥散劑トシ用ルヲ稀ナリ。通例二錢ヲ取り水六
引ニ煮テ滓ヲ去リ用フ○此根越幾斯劑トシ用レ
ハ藥力緩ニメ危懼ナク其効亦著實ナリ水腫ニ三
氏ヨリ八氏マテ日兩三次用テ能ク小便ヲ利ス或
云散劑ノ量十氏ニ過レハ眼眩ス。越幾斯劑ハ半錢

若バ其餘モ與テ妨害ナシ

黒列僕利越幾斯劑 製法 健質亞那越幾斯劑 名

水腫ニ左ノ丸剤利水ノ峻効アリ 水腫ニ主

拔設利丸

黒列僕利越幾斯劑

没藥 上好者

各二錢

葛爾儒 名

細末十氏

右調和シ一氏ヲ一丸トシ毎日一丸ヨリ三十九六
テ用ヒ其効ノ多少ニ隨ヒ増減ス 依一方 **黒列僕利**
越幾斯劑 没藥越幾斯劑 名 各本考 葛爾儒 細末六
錢 右一氏ヲ一丸トシ朝夕丸宛與ヘ漸々加テ

日八丸或十丸ニ至ル。水腫ニ峻効ヲ稱ス 涅 ○此根
八經閉ノ一良藥トス。體稟虛弱。血脉縱弛メ血液健
運セズ稠粘トナリテ壅滯シ或粘液腹内諸器ニ壅
塞ノ發スル經閉ハ殊ニ是ヲ用テ脉管ヲ衝動シ血
液ヲ稀釋メ子宮ニ驅逐ス。其壅塞疏通スレハ肢體
懈惰。腰痛。腹脹等ノ症ヲ發ス是月經通スル前候ニ
メ此藥ノ効アルナリ。痔瘡壅滯ノ諸症ヲ發スル者
モ是ヲ用テ通泄スルノ經閉 主同レ ○此根ヲ丁幾
劑トスレハ服シ易ク。前說ノ經閉ニ効ヲ稱シ通經
ノ一峻藥トス大抵二十滴宛適宜ノ飲液ニ點服ス

ル一日、兩次。漱次ニ加テ惡心嘔噦下利等ノ眼眩ア
止至ル。或云此劑一卵匙宛與ヘ或三十滴ヨリ八
十滴マテ飲液ニ點服ス。或云是ヲ服メ効サキ者
瘀血ヲ他部出驅逐失血ヲ發スルトアリ小普
黑列僕利越幾劑

製法

黑列僕利 水 細剉或細剉適宜 燒酒十五度者

右硝子壠ニ内固封板浸スル八日或云四日濾テ渣去リ貯フ瓶。○經閉及痔血壅滯黑列僕利越幾斯
劑三氏ヨリ八氏マテ用テ能通利收或攝爾列名
拔爾撒謨丸亦殊効アリ。

攝爾列拔爾撒謨丸

黑列僕利越幾斯劑

上好者盧會

大涼根

鐵礮鍊華 水 各四錢

雜腹蘭

二錢

其餘

阿芙蓉 精製者

名十刃

大黃丁幾劑

鏡

捏和シ

右各別細末メ合和シ大黃丁幾劑鏡ヲ加テ捏和シ
テ服ス依。○痔血壅滯ニ因テ瘀血上衝シ心胸苦
悶等ノ諸症ヲ發スル者ハ**黑列僕利越幾斯劑**盧
會越栗失爾上好盧會ニ一錢ヲ蒸錙ス
直腸ヲ衝動シ瘀血ヲ導洩メ治ス。○經久頑固ノ痛

風脚痛ノ熱ナキ症ニ間偉効アリ○此根峻吐下ノ効アル故ニ癇。癲狂。脾病。黑膽液病。神思憂悶。錯狂痴迷等。諸器脉管ノ觸動機。頑鈍ナル症ニ用テ膠粘液黑膽液等ノ病毒ヲ蕩滌シ治スルニ卓異ノ大効ヲ稱ス。然ニ過用スレハ瞑眩甚キ故ニ服量ニ注意スヘシ○神思鬱憂病撰第六十九章黑膽液病羅甸名黙朗格里亞卽十神思鬱憂悲悶ノ症ハ此越幾斯劑五氏ヲ盧會越栗失爾出上ニ加用テ効アリ○癲狂ニ治驗多シ。一婦人ノ發狂ニ此越幾斯劑一刀ヨリ一錢下テ七日ニ一次或ニ二次宛用テ治ス。或云此浸劑或散劑ヲ狂躁ノ患者四人ニ用

テ皆全治セリ。或云黑膽液ヨリ發スル神思鬱憂悲悶錯亂ノ症ニ此根ヲ煎劑或越幾斯劑トシ用ル。一日十五氏ニ至リ其毒ヲ瀉下ノ治驗ヲ得ル者甚タ多シ。或此根ノ丁幾劑ニ酒石葉名ヲ加用テ極テ偉効ヲ稱ス○或惡厲ノ頑癖類ヲ治ス。一小女惡厲ノ癖ヲ發シ潰爛臭穢甚タシ此越幾斯劑ヲ長服ノ愈ニ。或云此藥癩ニ用テ治驗甚タ多シ○小兒蛇蟲諸症ニ此越幾斯劑一刀撒兒末兒抉斯名半刃葛爾儒水一茶匙ヲ用テ殊効アリ○粘液質ノ睡痱卒倒ニ此

根ノ煎湯ヲ吉利詞^{キリ}爹兒^{ターリ}トシ腸^ヲ刺戟^メノ大便^ヲ導^ス
泄^シ醒復^ス○潰瘍瘻瘍ハ此煎湯ヲ蒸湯藥^{トシ}排^ム
膿淨刷^ノ良藥^{トシ}或^{堅腫^ヲ}軟化^ス○小兒惡厲潰
爛^ノ頭瘡ハ此煎湯ニテ蒸湯^シ清血劑^ヲ內服^ノ治^ス
○此根ヲ搗^テ麥粉^ト葡萄酒^ヲ加^エ琶布^{トシ}腹部^ニ
貼^メ水腫^ノ停水^ヲ驅泄^シ治^ス

服量細末ハ一二氏ヨリ十氏マテ服^ス。越幾斯劑^ハ
半錢或二刀マテ用フ泡劑浸劑^ハ三四錢マテ用フ

依^ロ叔^ソ淑^サ華^ハ依^ロ施^ア

遠西醫方名物考補遺卷二 終

相ノ煎湯 吉利朝參兒

泄し醒復大便清揚寒瘧此煎湯以桂枝桂皮
膚淨刷之良藥トニ或堅便久故也久日兒惡瘧瘧
瘧久頭瘧此煎湯以桂枝湯シ諸加剤以保

不○此根ノ獨テ支分者也酒及加薑力

貼水腫得此治久

眼瘡目久一二十日服

耳瘡耳乃火氣用之泡劑

瘧瘧之解散藥也

瘧瘧之解散藥也

瘧瘧之解散藥也

遠西醫方名物考補遺標目

卷三

魚膠

附
獸膠

骨膠 鹿角膠

諸厄利斯膏

安息香丁幾劑

括失亞

括失亞皓姑參

括失亞越幾斯劑

括失亞丁幾劑

附
強壯藥總說

保固強壯藥

單苦味藥

粘苦味藥
香竄苦味藥
蘇

葛斯加栗刺

收濇苦味藥

葛斯加栗

葛斯加栗健胃煎丸
葛斯加栗芙蓉丸
葛斯加栗收斂丸

安倔斯黜刺

安倔斯黜刺安桂美蓉飲

吉訥護謨

吉訥收斂散

吉訥護謨丁幾劑

二方

遠西醫方名物考補遺卷三

• 梣齋先生譯述

男 宇田川榕菴校補

魚膠

一名魚鰓 又 鰓膠

イクティオコルラ 羅

製法

レ イムヒス

膠魚ノ義一名「ホイセンブラス」羅

自文獻

レ 甸名「アシペンセルヒソ」或云鯨ノ羅

種一ト名「クル大魚」ノ鰓ヲ取り洗淨シ半乾シ卷纏重
襲ノ圓條ト作シ乾シ貯フ或其腸モ亦右ノ如ク疊
襲ノ製ス或「ベリウガ」ト名「クル魚」ノ鰓ヲ取り製シ或
其皮腸胃鰓尾等ヲ取テ截剗ミ湯ニ浸シ慢火ニ煮
テ盡ク溶化シ糊ノ如クナルニ至テ展テ幘ニ張リ

殆ト乾キタル片縑索ノ如ク巻テ能ク乾^カシ固封シ貯フ。大氣ニ觸レハ漸ク濕リテ黴腐ス○上品ハ透亮白色乾固シ臭氣ナツ味淡沸湯及水燒酒ニ溶化ス。尋常ノ品ハ微黃白色下品ハ黃色ニメ臭氣アリ。黑色ヲ帶ル者ハ亞硫酸^{硫黃}ノ蒸氣ヲ薰スレ^ム故ノ如ク清白色^{ナツル}○葡萄酒濁ルキハ魚膠ヲ以テ清澄ト爲ス。其法魚膠ヲ適宜ニ溶シ是ヲ葡萄酒ノ桶中ニ注キ加レハ自ラ膜ヲ結ヒ酒中ノ渣獨ト共ニ漸ク沈テ凝結ス是ヲ毛篩ニテ濾シ去レハ其酒清澄ナリ○魚膠ヲ水ニ溶シ沙糖ヲ加ヘ煮テ黄

色透明ノ膠汁トシ是ヲ紙ニ塗布シ乾シ適意ニ小ク截テ貯ヘ臨時ニ口津ニテ濕シ書簡ノ封膠ニ用テ簡便トス○獸膠ノ上好ニメ潔白透亮ノ者バ性効魚膠ト同シ藥用トスヘシ譜厄利亞^{アントワーヌ}國名ニテ上好ノ獸膠ヲ製ス其法左ノ如シ

獸膠製法井池等ニ石灰ヲ投シ是ニ老獸ノ皮ヲ浸漬シ^{石灰ヲ加ルハ皮ノ脂油ヲ除ク爲ナリ少壯ノ老獸ハ皮骨筋肉等ノ纖維硬勒乾固ノ上好ノ膠ヲ製ス}取出メ能ク乾^カシ大ナル銅鍋ニ水ヲ入レ其皮ヲ投メ煎煮シ取出メ能ク搾リ其汁ヲ煎熬メ稠厚^シ爲シ是ヲ平濶ノ銅鍋ニ

寫シ放冷メ凝固セシム〇或、獸骨。鹿角。象牙。野猪牙。鮫皮。特
掛テ乾固セシム〇或、獸骨。鹿角。象牙。野猪牙。鮫皮。特
牛脚。獸尾。革類ヲ以テ上好ノ膠ヲ製シ或、兔皮エテ
透亮清白ノ膠ヲ製ス。此類多ク、屠肉舗諸骨近象
牙匠。皮革匠等ノ屑片ヲ取集メテ製ス。或、諸獸ノ膜
腱。軟骨。關節ノ勒帶等ノ白色柔勒ノ者モ亦粘膠ア
リ且、水ニ煮テ溶化シ易ヤ故ニ多ク膠ヲ製ス。〇獸
骨ヲ以テ亦上好ノ膠ヲ製シ魚膠ニ代用ス。但尋常
人品ハ多ク黒色ヲ帶フ。故ニ上好骨膠ノ製法ヲ左
ニ舉ク。象牙膠。鹿角膠。モ是ニ同シ。

骨膠製法獸骨細屑六比 水二十四升 右鍋ニ入
浸ス丁二日ニメ火ニ上セ煮。一四時半許。火ヲ下シ
放冷亦四時半許。渣盡ク沈ミ上清澄明ナルニ至
テ是ヲ傾寫シ其滓ヲ除ケハ上清十四斤アリ滓ヲ
絞レハ又二斤出ツ是ヲ鍋ニ内レ火ニ上セ水氣ヲ
蒸散メ稠厚ト爲シ火ヲ下シ放冷スル。一四分時ニ
メ是ヲ淺濶ノ盤ニ寫シ冷處ニ置。凝固スルニ至テ
適意ニ截リ位置スレハ大抵十四日許ニメ乾固ス
骨屑六比ニテ透白膠十五弓半許ヲ製ス。象牙屑ハ
六比ニテ膠一比ヲ製ス〇尋常下品ノ膠ハ水ノ量

ヲ多クメ皮骨等ニ含メル膠質ヲ盡ク煎出シ或武火ニテ速ニ稠厚ト爲ス故ニ黃赭色トナル。凡膠人黃赭色トナルハ水多クメ久ク煎熬スルニ因リ又長久風乾スルニ因ル。上好透白ノ膠ヲ製スルハ水量ヲ少クスル故ニ煎煮久シカテスメ稠厚トナリ又盤ニ寫スモ薄ク展テ速ニ乾固セシム尚是ヲ鮮白色ト爲ニハ亞硫酸硫精少許和シタル水ヲ加へ能ク振蕩メ混和シ煮ルナリ。或初皮骨等ヲ浸ス水ニ亞硫酸少許ヲ加レハ膠質能ク融解メ透白色トナル。○上好ノ膠ハ水ニ浸スト一兩日ニメ溶化セ

ス唯膨脹スルノミ然ニ沸湯ニハ速ニ溶化ス硝子器ノ破裂ヲ鋸ワギテ固著シ能ク水ニ堪フ或膠水ニ略

綠波尼亞結麗土共ヲ等分ニ加ヘ鋸テ尤良

○榕按ニ魚膠洋舶ノ品ハ腐衣ノ如キ薄片ヲ卷テ圓條ト爲シ長四五寸許徑五六分許勾屈メ輪狀ヲ爲シ其兩端接スル處ヲ外側ニ反折メ是ニ錮ヲ刺シ掛テ乾シタル者ナリ。微透亮潔白ニメ臭味ナシ本邦ノ弓江等用ル者ノ比ニ非ス然ニ魚膠戶ニ命メ精製セシメハ多ク洋品ノ如キ精好ノ膠ヲ出スヘシ本邦弓工用ル所ノ海鰻

鱠及鮫鱠サカナ稱ナル者ハ共ニ魚膠ウニリ海鰻鱠ウニヲ
火土品野シ鮫鱠是ニ次ク鮫鱠ハ方二寸許厚四五
分許淡黃褐色微透亮ニメ腥臭ナク味淡泊洋品
民中次陳故西洋品二代用メ可ナリ此物藥鋪ニ貯
珍ス寫材寫弦等ノ鋪店ニアリ藥鋪ニ販ク鮫鱠
魚鱠サカナ云者ハ皆黑濁ニメ汚臭アリ藥用ニ堪ヘ
ス寫工ノ鮫鱠サカナ混シ錯モレ勿レ○漢渡ノ黃明膠。
古渡新渡ノ阿膠上品ハ洋舶ノ魚膠ニ代用スヘ
シト雖モ近來上品稀ナリ尋常ノ品ハ臭氣アリ
テ性味魚膠ニ劣ル故ニ藥用ニ究難シ○和製ノ

牛皮膠鹿膠及下品ノ鹿角膠龜膠等其質黑濁ニ
ノ腥臭アリ藥用ニ堪ヘス○又按ニ弓工用ル鮫
鱠ハ洋品ニ次ト雖モ是ヲ精製ノ鹿角膠ニ比ス
レハ劣レリ鹿角膠ハ西洋ニテ飲膳調理ニ供ス。
故ニ食膠ト曰フ。腥臭ナク清潔ニメ味佳シ尚且
潤涼滋養効忍ハ魚膠ウニ下在ラス。予西洋法
ニ擬メ試ニ鹿角膠ヲ製ス。味清淡ニメ香臭ナシ
性味西洋ノ魚膠ト異ナラス即チ左ニ舉ル如シ
鹿角膠製法清潔淨白ノ鹿角屑ヲ取り清楚ノ磁
鍋キ内水適宜少加煮テ軟化スルヲ候ヒ濾テ渣

去。清液ヲ取テ放冷スレハ凝固ス是謂截テ適意ノ
形朴シ陰乾シ貯ワ異ナム。粗陳ヤ立味舉
角膠試効滋養潤補ノ消化和暢起熱病類ノ胃腸
触甚ク。飲食藥劑堪サル症或嘔吐下利腹痛
兼好或諸脫泄失血過多ニ因テ虛脱スル症ヲ
ス或沙糖。杓汁。列印設酒等ヲ加。美味ナス○鹿
煎モ亦効力鹿角膠ト同シ多ク後方ヲ用フ
鹿角煎テコクチム・アルミム・セイデニハミ
鹿角屑テコクト・カルヌ・セルゼ・コムボシト・羅
白蒸餅心各二弓

去物清液ヲ取テ放火煎熬シ。粥鴨稀錫ノ
如キニ至テ放冷スレハ凝固ス是ヲ截歛適意ノ
形朴シ陰乾シ貯フ是十ニ程良ヤ立味舉一叶品
鹿角膠 試効滋養潤補メ消化和暢シ熱病類ノ胃腸
感觸甚ク又飲食藥劑ニ堪サル症或嘔吐下利腹痛
等々兼好或諸脫泄失血過多ニ因テ虛脱スル症ヲ
治ス或沙糖拘橼汁列印設酒等ヲ加美味ナス○鹿
角煎モ亦効力鹿角膠ト同シ多ク後方ヲ用フ
鹿角煎 テコクちム・アルミム・セイデンハミ
白蒸餅心 各二弓

舗ニテ海鰻鰓ヲ製シ又泉州堺ニテモ製スト云。是皆魚鰓ナリ○藥舗ニ京鰓ト呼フハ鯨鰓ヨリ出タル名ナルヘシ。曝鰓ト呼フ者ハ黃色ナリ是ヲ黃鰓ト云。上品ナリ。一種灰色ノ者アリ黃鰓ニ次ク○又鹿膠。毛膠ハ大坂北方穢多町ニテ鹿皮及牛馬皮ヲ以テ製スト云。

試効魚膠獸膠効同シ凝體諸器ヲ滋養シ血液虧損ヲ補充シ寧急ヲ緩弛シ酷厲液ヲ包攝シ枯燥ヲ津潤シ疼痛ヲ和解シ諸液ノ稀涼酷厲ヨリ發スル諸病。勞欬及羸瘦消削病。或諸管弛虛ノ發スル諸竅ノ

分利脫泄過多ノ症ニ用フ但動物ノ藥類ハ腐敗ヲ助ル故ニ腐敗ニ傾ク症ハ適應セス○欬嗽胸痛吐血或淋疾小便難澁刺痛或下利痛痢ヲ和解メ治ス○咽喉口中胃管。胃腸等ノ裏面剥脱潰爛ヲ愈シ赤痢ニ用ルアリ亞刺比亞。護謨等ノ樹膠類ノ如シ故ニ愈創ノ一良藥トス○酷厲毒及酸敗液ヨリ發スル胃痛。腸痛ヲ治ス。沸湯或水ニ溶シ服ス。此藥ヲ嫌フ者ハ桂水等ヲ加與フ○酸敗液胃ヲ刺戟ノ嘔吐休マサル症ハ制酸藥ヲ加用テ殊効アリ喻ハ後方ノ如シ

吹鱈亞蟬姑飲

蟬姑石 或蟬姑爪

水二三錢 溶水者

茴香水 六弓

魚膠漿

水二弓 溶水者

亞的兒 二十五滴

右調和シ半時毎ニ一匙宛服ス。但毎次其硝子壠ヲ振蕩スヘシ。否サレハ蟬姑石塗渣トナル〇勞欵様ノ病ニ酸敗液ヲ兼ル者ハ左ノ方治驗多シ

制酸膠麥飲

大麥煎

十二弓

魚膠漿 水二弓

溶水者

桂舍利別

一弓 鐘

蟬姑石 末

四錢

阿芙蓉液

二十滴

右調和シ半時若バ一時毎ニ二匙宛服ス〇近來間歇熱ニ魚膠ヲ用テ殊効ヲ稱シ幾那ノ代用藥ノ如クス。其法上好ノ魚膠十錢ニ水二弓ヲ加ヘ文火ニ溶化ノ糊ノ如シ沙糖及香竄藥桂末等ヲ適宜ニ加テ甘美トシ分テ三服トシ一服ヲ取テ發作ノ四分時前ニ與ヘ。一服ハ發作後十二分時ヲ經テ與、一服ハ其後六分時ヲ經テ用フ。次ノ發作亦右ノ如ク服ス。此劑間歇熱ノミナラス總テ往來熱。暫留熱ニモ良駿ゲ列ヒノ精製淨潔ナル者皆右ノ如ク服ノ効アリ。蟬姑列ヒノ精製淨潔ナル者皆右ノ如ク服ノ効アリ。

ト云然。此藥幾那ノ如キ効アル。遵信シ難シ患者原失血脱泄等ノ病アリテ血液虧損シ或貧家衣食匱乏ノ饑寒ニ堪ヘス體力虛損メ專ラ滋養補充スヘキ間歇熱良効アルナリ。○魚膠ヲ吉利詞爹兒トシ危篤ノ赤痢ヲ救フ多シ其方魚膠細判
錢ヲ適宜ノ大麥煎ニ加文火ニ煮濾テ八弓ヲ取リ阿利穀油一蜂蜜半ヲ攪和シ兩次施ス。○膀胱直腸等ノ潰瘍亦吉利詞爹兒殊効アリ其方魚膠水二溶ス没藥油錢蒸餽水六右調和シ施ス。外敷皮膚損傷剝脱或枯燥皺揭破裂及火傷未治ス。

○此藥細末或水ニ溶シ或硬膏トシ施ス

白譜厄利斯膏肌皮摩傷刺傷淺膚ノ創傷等ハ此膏ヲ貼メ粘固牢著シ剝脱セス能ク蓋封メ愈合ス。輕キ刃創ハ是ヲ貼メ針線縫合ノ術ヲ施サス能ク乾愈ス。水或津唾ニ濡レ患處ニ貼スヘシ。

製法 魚膠一两 安息香丁幾劑各等分

右合ノ磁鍋ニ内レ慢火ニ上セ膠能ク烊化スルニ至リ毛刷ニテ黒色ノ洗絹ニ塗リ貯ヘ聽用ス。

安息香丁幾劑

製法

安息香末

適宜

燒酒

二十度者

右硝子壠ニ内蓋閉シ浸ス一六日。渣ヲ去リ固封シ

貯フ

拔依福窓
叔叔伍施

括失亞

ア・エラスヒルサ・ロ・ダシイホウト・蘭

形狀南亞墨利加洲ニ產スル灌木ナリ葉小ニソ長ク柳葉狀三四對宛莖ニ排生シ皂葉狀ヲ爲ス梢末葉大ニシ葉梗ノ兩側托葉葉耳ノ如者似テ少アリ花十雄蕊一雌蕊第十綱第一目木皮灰白薄ク粗糙剝ケ易シ木材淡白或灰黃硬固ニメ輕シ根材ハ灰色味甚夕苦ク香氣ナシ細キハ羽管ノ如ク太キハ腕ノ如シ太キ者苦味甚

根材形狀幹ト同シ○黒灰青色赭色ノ者或帶黑色ノ條理アリテ苦味微ナルハ朽敗セル者トス或アリスメトピラム樹名ノ材ヲ以テ偽リ販ク者アリ偽品ハ皮滑澤ニメ黑色ノ斑點アリ水ニ浸メ綠礬ノ溶液ヲ加レハ黑色トナル真品ハ色微シモ渝變セス○此樹須里那模及加利比設嶋共ニ南亞墨利加洲ノ地名ニ產試効幹材根材皮共ニ用テ單苦味ノ保固強壯藥トス性刺戟セス虛弱ヲ強壯シ胃ヲ健運シ飲食消化ヲ扶ケ胃腸ノ敗液ヲ復シ苦味甚シト雖モ他ノ苦味藥ニビスレハ緩性ニメ胃ヲ妨ケス脉管血液ヲ

刺戟セス。熱ヲ増發セス。大便ヲ瀉利セスノ胃腸ヲ健運ス。凡ツ苦味健胃劑的當ノ症ニ殊効アリ。是ヲ以テ間歇熱。胃虛及酸敗液ノ諸症。或腹痛ヲ兼子。或風氣痞脹苦滿或萎黃病。依剝昆姪兒。子宮病。白帶下。黃疽。痛風傷冷毒痛ニ甚夕験アリ。或云性効健質亞那 指失亞^那、珊^那、駕^那、理^那、性味^那、効力^那。○劇病後及漸々回復スル症ニ用テ健胃ノ効ヲ稱ス。他ノ苦味藥ニ比スレハ尤^モ胃腸ニ堪^シ易シ。○春月ノ間歇熱ハ是ヲ用テ治ス。或云間歇熱ヲ治シ殊ニ發作次序ナキ頑固ノ往來熱ニ用テ熱毒ヲ驅除スルト殆^シト幾那ノ如シ。○或

云顯著ノ發作ナクメ遷延暫留シ。感觸甚フノ虚罷スル熱病ニ多ク驗アリ。○黃疸及腸ノ虛罷セル下利ヲ治ス。○頑固ノ下利及勞瘵様ノ諸液溶崩ノ發スル下利。或食泄多汗羸瘦スル症ニ此藥殊効ヲ稱ス。制酸收斂ノ品ヲ加テ尤良。喻^ハ後方ノ如シ。

指失亞皓姑飲

指失亞^ア 一錢半

右沸湯五弓ニ浸シ藥氣ヲ出シ濾テ後藥ヲ加フ

桂丁幾劑^鏡 三錢

蛤礬 七氏

一錢

右調和シ能ク攬合シ分テ三服トシ一眼宛服スル
1日三次○劇キ下利ハ阿芙蓉ヲ加用テ捷効アリ
斯ノ如キ症ハ大抵煎劑トシ用フ然瓦散劑ヲ好ム
者ハ後方ノ如ク製シ與ヘシ

括失亞麻橙散

麻僵涅失亞或蜘蛛石

圖

各二錢

括失亞

四刀

橙皮

黃

各二錢

右各別細末ノ合和シ分テ十四服トシ適宜ノ飲液
ニテ一服宛服スル1日四次○水腫ハ海葱ニ此藥
ヲ加用ヒ殊効アリ○胃腸虛罷諸管弛弱ノ諸病及

血液脫泄下利等收斂劑的當ノ症ハ後方尤良

括失亞拳參丸

括失亞越幾斯劑

三錢

拳參根

末

一錢

右研和メ三氏ヲ一丸トシ桂末ヲ衣トシ一時毎ニ
六丸宛服ス○一婦人六十二歳既ニ二十年以來胃
虛弱メノ輕軟ノ食物モ重滯シ呼吸不利ス其後劇
キ胃痛ヲ發シ頻ニ嘔噦シ飲食受容シ難ク時ニ冷
水或赤葡萄酒白蒸餅少許ヲ嚥下スノミ精力虛罷
脉弱搏度齊ハス其疼ニ由テ安眠セス小便黯澹ニ
メ差濁リ大便平常ノ如シ是胃ノ神經纖維虛脆ニ

ノ感觸甚々。大ニ痙攣ノ運動ヲ發スル症トス。故ニ括失亞丁幾劑三弓ヲ取リ一時毎ニ五十滴宛。赤葡萄酒少許ニ滴シ與レハ此劑末夕三弓ヲ服シラスメ胃痛嘔吐解散シ能ク食ノ重滯セス因テ尚飲食ヲ節慎メ不日ニ全愈セリ○一男子四十四歳。資稟壯實。七週以來食進マス。僅ニ食スレハ胃中ニ重滯メ妨悶シ或胃口ニ梗塞メ下ラス。故ニ飲食甚タ少。ク或屢食ヲ絶フアリ是ニ由テ顏色黯澹。精力虛疲。全身羸瘦シ僅ニ舉動スレハ困倦メ臥床ニ偃シ或倚坐ス脉小數。大便軟。小便平常ノ如シ。乃括失亞丁幾

劑二弓ヲ取リ一時毎ニ五十滴宛。葡萄酒少許ニ點服スル。ト三日ニノ精神輕爽。食ヲ欲メ胃ニ重滯セス。但大便三日通セス故ニ飲食ヲ節慎セシノ健胃下劑ヲ兼用ス。其方瓦爾拔奴謨^{ガルバヌ}律比丸料^{リュウヒ}各二錢。右越栗失爾^{エリキシル}剝祿布利^{ボロブリ}坦^{タム}適宜ヲ加テ三氏ヲ一丸トシ。沒藥末ヲ衣トシ毎朝四丸宛服ス。尚其丁幾劑ヲ與フル。ト數日ニノ諸症回復シ全治セリ。其他焮衝ノ症ナキ胃病ニ此丁幾劑ヲ與テ治験ヲ得ル者甚タ多シ。

〔服量〕散劑トシ用ヘ稀ナリ多ハ泡劑。浸劑トス。一刃

ヨリ半錢マテ沸湯或水八弓ニ投メ藥氣ヲ出シ用
フ。浸劑ハ一二匙宛服スル。1日數次。或此藥四錢ヲ
取り水十二弓ニ浸^ス。一夜ニメ用フ。水ニ浸シ擂ハ
苦味。沸湯及水煎ヨリ多シ。○越幾斯劑ハ一刀ヨリ
一錢マテ丸藥トシ。或桂水。薄荷水。葡萄酒等ニ溶シ
用フ。○丁幾劑ハ十滴ヨリ六十滴ニ至ル。○此藥水
ニテ蒸餾スレハ黃色苦味ノ露水出ツ
括失亞越幾斯劑

製法 括失亞^{クッシヤ}細屑^{ニヒ}水^{二十比}

右煮テ半^弓減シ濾テ液ヲ取リ其滓ニ水二十比加

煮テ半^弓減シ液ヲ取ル。斯ノ如ク四回ニノ其液ヲ
合シ再濾シ慢火ニテ水氣ヲ蒸散メ密ノ密ノ稠トシ。此
液五錢ニ亞刺比^{アラビ}亞叢謨^{アラグモ}ニ刀ヲ合和シ聽用ス^匪。此
材十六弓ヲ煎熬スル。1四回ニメ越幾斯劑三弓半
出ツ。皮ハ是ニ倍ス。此劑僅ニ一氏ヲ取テ水四比ニ
溶セハ其水盡ク苦味トナリ黃色ヲ帶フ。○或云此
劑前法ノ如クメ兩回煮レハ純粹ノ越幾斯劑上ナ
ル。若三四回煮レハ必ス酒石酸^{純精酒}。石英^名酢漿酸^{酢漿}
ノ如キ酸性塩ノ加爾^{カル}。幾其液ニ出テ純粹ナラス
括失亞丁^{クッキヤ}幾劑 涅

製法

括失亞

搗碎者

燒酒十五度者

一弓六弓

右硝子壠ニ内レ固封シ煖處ニ置ア三日。渣ヲ去リ
 固封シ貯フ 涅拔華叔施
 降ノ按ニ括失亞ノシヨ格綸僕等ハ苦味ノ保固強壯藥ニ
 屬ス但強壯藥ヲ數種ニ分ツル其說ヲ舉ク
 強壯藥總說凡神經筋纖維其他諸器ヲ衝動シ生運
 元力ノ頽弛沈衰セルヲ警發振起シ各自ノ運營ヲ
 回復スル藥ヲ統テ衝動藥 蘭名「アカルケレン」 強壯藥ハ總稱ト
 曰ノ是ヲ分テ二種トス。一ハ揮發衝動藥トシ一ハ
 保固強壯藥トス

揮發衝動藥

蘭名「ブリムクタフ・ブリ」

此藥ハ全身諸器

殊ニ神經ヲ刺戟衝動ノ揮發活潑シ保固強壯藥ニ
 ビスレハ虛脫ヲ挽回スルト迅速峻捷ナリ然ニ精
 微揮發竄透ノ性多キ故ニ保固強壯藥ノ如ク體中
 ニ保住持重スルト能ハスメ速ニ揮散ス。即揮發衝
 動人諸藥。香氣竄透ノ鎮痙藥皆是ニ屬ス 揮發衝動
藥
 卷七
 此藥ハ虛脫危劇ニメ速ニ峻補セサヒハ回
 生シ難キ諸症或劇病ニテ諸液脫失精氣虛竭或虛
 懊甚メ自然良能。病毒ヲ分排ス生ト能ハサル症或
 元運力罷弊沈衰ノ全身若ハ各部觸覺ヲ失ヒ昏冒

不省人更。或諸器ノ運營衰損ノ壅塞若ハ脫泄ニ罹
リ或粘液質ニノ諸器ノ運營遲緩怠慢遷延病ニ傾
ク症ニ用ア。但虛極ノ症ニ用テ一旦的効ヲ得ル片
ハ怡然トメ是ヲ連進スルト勿レ否サレハ此藥ノ
峻力ヲ以テ大ニ生氣ヲ揮發ノ驅散シ逾危極ニ至
ルト宛モ生氣ヲ攻伐スル藥ノ如シ故ニ保固強壯
藥的當ノ症ハ揮發衝動藥害アリ又初緩性ノ品ヲ
用ヒ効ヲ得ルニ隨テ漸々峻藥ニ移リ既ニ的効ヲ
得ルキハ復漸々緩藥ニ轉スヘシ。又時々藥品ヲ變
更スヘシ同性ノ藥ニ慣テ峻効ナケレハナリ。又外

敷藥モ長ク一處ニ施スアタク其部ヲ變易スヘシ

保固強壯藥

蘭名トニセ・フルステルケニ

アミックテレシ 鏡卷七ニ出ツ此藥ハ收

固性アリテ効力體中ニ保住持重シ人身諸器ノ纖
維殊ニ筋纖維ノ張力 筋纖維ノ運營ヲ 弛虛メ縱緩
セルヲ保固メ強健ニス然モ保固力收濇藥ニ比ス
レハ緩弱ニノ衝動強壯力揮發衝動藥ニ比スレハ
銳敏ナラス速ニ揮散セス唯自性ノ衝動力ニテ生
氣ノ衰弊頽弛ヲ強壯保固シ諸器ノ運營ヲ增發シ
平全ノ常調ニ復セシム○植物ノ保固強壯藥ニ含
メル苦味質ハ胃腸ヲ衝動健運メ飲食消化ヲ獎起

ス故ニ一二健胃藥十名^{ツク}。但苦味ノ多少ニ隨ヒ是
ヲ分ツ。左ノ如シ。

單苦味藥保固強壯藥中ノ苦味質尤多キ者ナリ
卽^{ナシ}括失亞^ア格綸^コ僕^ボ_後健質^{ケンチ}亞那^ナ珊^{サン}篤^ト里^リ睡菜^{スイ}共^共鏡^{ミラ}等

粘苦味藥保固強壯藥ノ苦味質ニ粘液質ヲ含テ
滋養緩和ヲ兼ヌ但發熱煥衝アリテ脉管大ニ刺
戟^スヲ被ル症ハ害アリ^レ卽^{ナシ}依蘭^{イラン}苔^{カモメ}等ノ如シ
鹹苦味藥苦味質ニ鹽質ヲ含ム者卽^{ナシ}單苦味質
土中和塩土合併ス故ニ保固強壯ニ解凝ノ効力
ヲ兼ヌ殊ニ胃腸ヲ衝動健運メ粘液ヲ分利疏解

ス。胃腸ノ虛弱及粘液壅滯ノ發スル諸症ニ用フ
卽^{ナシ}葛爾儒^{カルル}失格列^レ乙^イ_共紫董蒲公英^{スイボウ}共^共麻爾羅歇^{マーロ}
傑尼斯託^{ゲス}_タ動物^{ドウ}ハ牛膽等ナリ

香竄苦味藥苦味質ニ華爾斯質^{ハーリス}及精微揮發ノ油
ヲ含メ衝動起熱ノ性アリ故ニ保固強壯藥ナレ
氏揮發衝動藥ニ近シ多血煥衝性ニメ大ニ脉管
ヲ刺戟^ス外諸症ハ戒慎メ用ヘシ粘液質ニメ血
液運行遲緩溫煖氣減ニ諸器ノ運營怠慢ノ症
適應^ス卽^{ナシ}桂土木香水楊梅根菖蒲根櫻皮杓^ク
皮^共葛斯加栗刺^{カルラ}安倔斯點刺^{アンブル}共^セ攝爾扁答^セ加密^{ミヤツ}列

亞爾鮮撒爾非亞共名ノ如シ

中

收濁苦味藥苦味ノ保固強壯質ト收濁質ノ合併

スル者ナリ總ア弛虛衰弱ノ諸病ニ用フ。但胃腸ニ敗液汚物若ハ膽液質ノ惡液壅鬱スル症。煥衝病體質壯實ノ諸症飲食消化シ難キ症ニハ害アリ然ニ瀉下劑揮發衝動劑單苦味藥等ヲ加合シ用レハ間良効ヲ得即チ幾那楊皮七葉樹皮共ウ霍烏爾失補等ナリ收濁苦味藥及香竇苦味藥共一鏡卷七ニ出○凡苦味ノ保固強壯藥ハ劇疾緩病ヲ論セス病後若ハ病勢漸ク退キ險症解散ノ後虛憊ヲ回復シ諸器

ノ運營ヲ助長シ或胃腸ノ虛弱ヲ強健ニメ飲食消化ヲ增進シ或輕キ間歇熱ヲ制服シ或解凝ノ効力ヲ以テ腹内諸器ノ壅塞ヲ疏解シ或惡液質ノ水腫失苟兒陪苦諸腺病ヲ治スルニ用フ。外敷多血厥衝性ノ症ハ是ヲ禁ス

斯加栗刺コロトン・カカリルラテアヘ

形狀亞墨利加洲ニ產スル灌木メ皮ナリ此樹高七
八尺許葉狹長ニノ末尖リ刻缺大ク梗アリ淡綠色

背毛茸アリ。一樹ニ雄花雌花生ス。雄花ハ五瓣或云六瓣

ノ小白花ニメ雄蕊十ヨリ十五ニ至リ上分下合メ
一體ナル。萼圓柱狀ニメ五齒アリ。雌花ハ瓣ナク
一雌蕊分テ三頭トナル。萼瓣多シ花後實ヲ結フ淡
綠色。大豌豆ノ如ニ三室ニ分ヒ三子ヲ收ム第二十
一綱第
九
目○此皮卷テ管ヲ爲シ長ニ三寸許。厚ニ一分許。秤量
特ニ重シ。外面白苔アリ糙皺淡白。裏面滑澤。黯赭。粗皮
ヲ去ハ鍊銹色。破碎スレハ肌理滑澤ニメ華爾斯様
ナリ。味苦微辛。香竄様。燒ケハ殊ニ佳香アリ或云此
皮ヲ燒ケハ微麝香及ヒ龍涎香ノ氣アリ是
ノ真品トス或煙草ニ雜テ佳香ヲ稱ス○此樹字露把

刺寥アキ乙イ共ニ南亞墨アフリカ利加洲國名花地アフリカ北亞墨利等ニ產ス○此皮

護謨及華爾斯多シ。一比ヨリ護謨七弓五錢二刀出。

越幾斯劑エキストスレハ苦味エキス越幾斯質其皮ノ三四分

出水ニテ蒸餾スレハ精微揮發ノ油出。綠色竄透ニ
メ拘櫻ノ香氣アリ。但多ク露水ニ混スル故ニ純粹

ノ油ヲ得ルヲ甚タマナシ。又酸性塩及些少ノ土質ア

ヒ燒テ淋灰汁トスレハ亞兒アーリ加利塩トナル

試効香竄苦味ノ保固強壯藥トス

温煖收濬壯神健

胃ノ効ヲ稱シ生力ヲ活潑シ汗ヲ發ス○温煖氣減
シ諸器ノ運營遲弱ノ症ニ適應ス○古來鎮痉ノ効

ヲ稱シ又幾那ノ代用藥トス今尚是ヲ襲用ス○性
功幾那ノ如クニメ精微揮發ノ油及拔爾撒謨質ヲ
含ム故ニ幾那ニ比スレハ揮發衝動性多クノ壯神
健胃ノ効アリ是ヲ以テ幾那ニ堪サル症ニ用フ其
揮發油及華爾斯質ルス
拔爾撒謨人性熱メ溫壯收濁シ大便
ヲ閉澁ス○體稟薄弱。胃腸感触甚キ者ニ幾那ヲ投
メ消化シ難ク重滯スル症ハ此藥ヲ與テ効ヲ取ル
アリ故ニ或幾那ニ勝ルト云○胃腸虛弱ニ因テ發
スル遷延病ニ用フ喻ヘ飲食消化シ難ク或酸敗液
ヲ生シ或風氣痞悶。胃痙心腹痛一種ノ症腹痛或屢嘔吐ス

ル等ノ如シ。○凡、温
方ヲ擇ミ用フヘシ

ル等ノ如シ。凡、溫壯健胃ノ劑的當ノ症ハ左ノ數
方ヲ擇ミ用フヘシ。
葛斯加粟健胃丸
葛斯加粟 未
健質亞那越幾斯劑 二錢
右研和ニニ氏ヲ一丸ナシ。二十丸宛用。一日三次。

葛斯加栗健胃丸

葛斯加栗未

健質亞那越幾斯劑 二錢

右水十弓ヲ加ヘ煮減ノ六弓ヲ取り後藥ヲ加フ
桂丁幾劑名二錢

桂丁幾劑

名
二
錢

粘稠液過多ノ諸病。下利諸失血。神經熱。間歇熱。發斑熱。胃腸熱等ノ虛憊スル症ハ是以テ幾那ニ代用スル粘液熱胃腸及諸液中粘液壅滯スル。膽液熱。神經熱等ノ熱退テ後精力虛憊。殊ニ胃腸ノ罷弱ヲ復スルニ用フ。間歇熱ニ良効ヲ稱ス然ニ驅熱ノ効。幾那ニ比スレハ劣リ。唯胃腸甚々虛憊メ幾那ニ堪サル症或數惡心嘔吐シ或劇ク下利シ或閉塞ヲ兼テ幾那ヲ用ヒ難キ症ニ適應ス。頑固ノ間歇熱ハ此藥功ナシ。但幾那ニ加レハ大ニ其効力ヲ扶ツ。腹内諸藏壅塞アリテ幾那ノ害アル症ハ此藥ニ石。

鹼質ノ解凝藥ヲ加。與フヘシ。○此藥溫壯衝動ノ性多シ。然ニ過服スルニ非レハ熱ヲ發動セス。肺氣管等ニ粘液痰飲過多壅滯セル。經久ノ粘液病ニ用ヒ痰ヲ豁メ。咯易カラシム。故ニ遷延ノ冒寒歟。痰歟。涎壅盛ノ喘急疫歟。ノ病毒ヲ驅除メ後用。且、頑固ノ傷冷毒ヲ緩解シ治スルノ鎮瘻藥ノ如シ。○胸肺ノ諸症ハ此藥ヲ丁幾劑トシ三四十滴宛與。テ駁アリ海葱蜜ヲ加ヒ。八肺ヲ疏豁シ。吐痰ヲ湧起メ尤良。○此藥ノ越幾斯劑一錢ヲ水一弓ニ溶シ用。テ胸肺ノ諸症及。吐血下血等諸失血ヲ治ス。○瘦削病殊ニ粘

液勞多ク痰此藥能適應シ他ノ強壯藥ニ勝レ
リ又幾那ニ比スレハ堪易クメ妨害ナシ○腸弛虛
ノ發スル諸症。大便不調。屢瀉下シ或下利蕁再トノ
宿疾トナリ或食消化セス溏泄スルヲ治ス○下利
及赤痢ニ効多シ殊ニ病末。腸弛虛ノ保固ノ機力ヲ
失ク症ニ用テ強健シ遷延頑滯セサラシム○下利
痢疾ハ病毒汚物ヲ滌掃メ後此丁幾劑ヲ用ヒ胃腸
ヲ健運メ多ク治ス或忽弗滿液ホツフミンヲ加毎日二三次
用テ尤良○赤痢ノ胃腸ヲ淨刷スレ氏其毒尚除
サル症ハ毎夜左ノ丸藥ヲ與テ罷勞ヲ防護シ晝日

ハ排毒疏滌ノ劑ヲ與テ治ヘシ

葛斯加栗芙蓉丸

葛斯加栗越幾斯劑ニ氏 阿芙蓉精製者 一氏

右研和メ丸藥トシ一服トス○下利赤痢。腸虛罷メ
蓀再タル症ハ此越幾斯劑ニ對症ノ藥ヲ加用テ殊
効アリ喻ハ左ノ二方ノ如シ

葛斯加栗西蓉丸

西瑪爾拔皮名 二錢

半

拔爾撒謨篤露トトウ一錢半

阿芙蓉精製者 八氏

葛斯加栗越幾斯劑ニ氏 三錢

右研和メ百二十丸トシ。石松子鏡末ヲ衣トシ五丸

宛興^ル日四次

葛斯加栗桂蓉飲

阿芙蓉液

半刀

桂水

四弓

橙皮舍利別

半弓

葛斯加栗越幾斯劑

三錢

右調和シ一時毎ニ一匙宛服ス○斯ノ如キ劑ニ大
黃ヲ加用ル者アレ氏的當セス。既ニ胃腸ヲ疏滌メ
効ナク收濇劑ヲ與ル故ニ下劑ハ與フ當ラサレハ
ナリ○腸瘍及腎膀胱尿道ノ膿瘍患部弛虛メ遷延。
治セサル症ニ用テ健運強壯ノ治ス○月經痔血過
多。下血其他諸液脫失。諸竅排泄過度或潰瘍敗膿影

ク漏洩スル勞瘵様ノ熱病或失血過度後及劇病後
ニ發スル諸症ヲ治ス○血脉弛弱ノ發スル粘液腫。
萎黃病白帶下。或痘癬諸症。依剝昆姪兒失苟兒陪苦
等ヲ治ス○諸脫泄失血過多ニ左ノ方捷効アリ

葛斯加栗收斂飲

明礬

一錢

加密列水

四弓

亞刺比亞趨謨

橙皮舍利別

各四錢

葛斯加栗越幾斯劑

一錢

右調和シ一時毎ニ一匙宛服ス。增ハ始生差悶也。

服量散劑ハ一刀ヨリ一錢ニ至ル或他藥ノ末苦味

越幾斯劑ヲ加ヘ丸藥十ス○泡劑煎劑ハ一弓ヲ水

八弓ニ煮テ濾過シ服ス。藥氣蒸散スル故ニ蓋閉シ
製スヘシ或揮發ノ藥液ヲ加用フ。水ニテ浸劑ト爲
スモ其量同シ○越幾斯劑ハ苦味ニメ香氣ナシ一
刀若ハ一錢ヨリ二錢ニ至ル。丸藥トシ或他藥ヲ加
或桂末桂浸劑阿芙蓉液亞的兒其他健胃藥ヲ加用
藥ヲ粗末トシ煖處ニ置ゴ十二時ニメ濾シ用フ
○丁幾劑ハ三十滴ヨリ六十滴ニ至ル○浸劑ハ此

葛斯加栗丁幾劑

製法 葛斯加栗細末一弓 燒酒二十度者

右硝子壘ニ内レ固封シ煖處ニ置キ浸ス丁六日、滓
ヲ去リ固封シ貯フ(涅)

葛斯加栗刺越幾斯劑製法健質亞那越幾斯劑(谷)

同上 涅 拔福叔 淑華 涅別

安倔斯點刺コルテクスアンギスチラアンギスチ

形狀南亞墨利加洲ニ產スル一種ノ樹皮ナリ。此皮

卷テ圓管狀不爲シ徑殆ト一拇指半横徑(或云一長四
五寸許厚一分許(或云五厘許或云皮平潤指橫徑長四
凹條アリ灰黃或淡白色ニメ灰色ノ斑アリ裏面滑

澤淡黃赭色肌理緻密破碎スレハ纖條様ノ肌理ナ
ク滑澤ニメ華爾斯様ナリ味苦微辛鑽透シ稍香竄
様桂ニ似テ不佳ナリ較著ノ香氣ナシ細末トスレ
ハ其色大黃末ノ如シ○姦商間大毒アル樹皮ヲ雜
ヘ販ク是ヲ用レハ大害アリ或死ス此品膚理麤ク
眞品ニ比スレハ滑澤ナラス纖條様ニメ灰白或鏽色ノ
破碎スレハ滑澤ナラス纖條様ニメ灰白或鏽色ノ
斑點アリ味甚タ苦クメ嘔スヘタ香竄様ナラス研
末スレハ乙百葛格安那或薬刺巴ノ末ノ如シ綠礬
ヲ水ニ溶シ是ヲ浸セハ黒綠色ヲ帶テ底ニ沈ム是

ヲ以テ偽品ヲ辨スヘシ○此樹屈媽那及加祿泥亞
爾答瓦刺那多麻垤爾安倔斯黜刺嶋共ニ南亞墨
產ス○此皮苦味ノ越幾斯質多シ是ニ粘液及華爾
斯。香竄質少許ヲ含メリ故ニ煎熬メ光澤アル苦味
ノ越幾斯劑多々出ツ。但收濁質ナシ

試効香竄苦味ノ保固強壯藥トス。性功葛斯加栗刺
ト一般ニメ揮發性アル故ニ葛斯加栗刺ノ効アル
諸病ニ用ヒ亦幾那ニ比スレハ性溫熱メ揮發衝動
シ重滯壅塞ノ害少シ○間歇熱。膽液熱。腐敗熱。殊キ
發歇往來アル熱病ノ胃腸ヲ淨刷スレヒ虛憊メ淹

滯スル症。飲食消化ノ機力尚存スル症ハ殊ニ能ク此藥ニ堪テ良驗ヲ得。間幾那ニ勝リテ効ヲ取ル。アリ。○間歇熱ノ胃腸大ニ虛罷シ幾那ニ堪サル症或劇キ下利ヲ兼ル症ヲ治ス。○凡熱病胃腸ヲ疏滌メ虛罷スル症ハ散劑十セス越幾斯劑若ハ煎劑トシ用フ。喻ハ後方ノ如シ。

安飴橙荷飲

硝砂一錢、安飴斯皮越幾斯劑三錢、
橙皮水六錢、薄荷舍利別六錢。
右調和シ一時ニ一匙宛服ス。劇病後虛憊退カサ

ル症或胃腸虛衰ノ發スル下利其他胃虛ノ諸症。飲食消化シ難キ症。依剝昆蛭兒。子宮病。總テ幾那ノ効アル症ニ驗アリ。越幾斯劑トシ用テ尤良。○發歇往來アル頭痛。耳痛。齒痛。眩暉ヲ治ス。○諸管纖維弛虛シ血液酷厲毒アリテ發スル諸竅ノ漏泄病。殊ニ赤痢ニ効アリ。輕症ハ大黃ヲ加テ治ス。○痢疾腐敗性ニメ穢物稀ク水ノ如ク臭氣甚ク。黯赭色ニメ黒點ヲ雜ヘ或多く血ヲ下シ小便赭色。脉細弱。肌膚燔熱。大粘著スル症ハ此藥適應ス。喻ハ後方ノ如シ。

安桂芙蓉飲

安倔斯皮

桂

各四錢

右沸湯八弓ニ煮減ノ六弓トシ濾テ次ノ藥ヲ加フ

亞刺比亞護謨ニ錢小舍電阿芙蓉液名一錢

橙皮舍利別一弓

右調和シ半時毎ニ一匙或症ニ隨ヒ服用ヲ增加ス
用量散劑ハ一刀ヨリニ錢ニ至ル。或一刀宛日數次
用フ但消化シ難キ故ニ香竄驅風ノ藥ヲ加用フ是
ニ由テ胃ニ痞滯セス○煎劑泡劑浸劑ハ半弓ヨリ
一弓マテ水八弓ヲ加ヘ製メ滓ヲ去リ亞的兒等ノ
揮發劑ヲ等分ニ加ヘ用フ。或香竄ノ露水若ハ葡萄

酒ニ浸シ用フ○越幾斯劑ハ丸藥トシ或他藥ニ合
シ一二錢宛用フ

安倔斯黙刺越幾斯劑

製法

健質亞那越幾斯劑

名注ト

同シ○外敷メ經久腐敗ノ潰瘍壞疽等ヲ治ス

華依福

吉訛護謨

「ギュムミキノロ」
「キノゴム」ガムビセゴム蘭

形狀

一種ノ樹脂ニノ其質護謨華爾斯鏡凡例ナリ

三種アリ○第一種ハ亞弗利加洲ノ瓦模毘亞河ノ

邊ニ產スル樹ヲ鑽刻メ採ル。故ニ是ヲコムガムビ
シレスト名々。此品小塊ニメ硬固疏脆。黑赤帶黑色

透亮ナラス。然ニ微赤透亮ノ細塊ヲ雜フ。嚼メハ響アリテ半溶化シ津唾染色セス。甚夕收濁ノ佳味アリ。香氣ナシ○第二種ハ北亞墨利加洲ニ產スル樹ヨリ出ツ。此品大塊ヲ爲シ黯赭色破碎スレハ光澤アリ。華爾斯様ニゾ邊透亮磨ノ碎ケ易ク赤赭色ノ末トナル。嚼テ響アリ。初酸ヲ帶ヒ次テ甚夕苦ク收濁シ終ニ甘ヲ帶フ。二種共ニ燒酒若_ハ水ニ溶化シ味收濁ニメ赤色トナル。是ニ綠礬ノ溶液_{水ニ溶液ス}加レハ綠色ノ塗トナリテ器底ニ沈ム○或華爾斯類ヲ以テ是ヲ偽リ販ク者アリ。是ハ嚼テ粘著シ種

く香氣アルヲ以テ知ルヘシ或血竭ヲ雜ル者アリ是ハ水ニ溶化セス眞品ハ能_ハ水ニ溶化ス○第三種ハ新和蘭ヨリ輸ス。其塊大小齊シカラス。汚物ヲ雜ヘ黯赭色。嚼テ響ナク齒ニ粘著ス。但細砂雜リテ響ヲ爲者アリ味收濁シ後甘ヲ帶フ是ヲ下品トス試効性收濁シ經久下利。虛脫ノ失血婦人崩漏淋疾疼痛焮衝治メ後膿樣ノ液止_ハサル症及白帶下ヲ治ス○經久頑固ノ下利ハ毎朝_イ百葛格安那末ニ氏ニ沙糖少許ヲ和ノ服シ毎夜阿芙蓉劑ヲ用テ治シ或胃腸粘污鬱滯ノ候アル者ハ吐劑若_ハ下劑ヲ

與テ胃腸ヲ淨刷シ次ニ炒大黃ニ阿芙蓉ヲ加テ數日用ヒ。仍治セサル症ハ收歛鎮痛劑ヲ與テ効ヲ取ルヘシ喻ハ後方ノ如シ。

收歛鎮痛飲

桂水

六弓

忽弗滿鎮痛液

四

吉訥護謨

二錢

赤石脂

三錢

阿芙蓉

精製者
名三氏

遏爾託亞舍利別

四

右調和シ硝子壠ニ内封シ貯ヘ用ルニ臨テ其壠ヲ振蕩シ一時毎ニ一匙宛與ヘ且症ニ隨ヒ増減ス○劇キ失血及諸竅脫泄過多ノ症ハ左ノ二方極テ

捷効アリ

東吉訥蓉礬散

明礬 一錢

吉訥護謨

二十二氏

ア芙蓉

二氏

右散剤十シ分テ六服トシ一時半毎ニ一眼宛用フ

吉訥收歛散

固

大

半

右研和メ一服トシ一時半毎ニ一眼宛用フ

苦味健胃ノ藥ヲ加ヘ間歇熱ニ用ヒ良効ヲ稱ス

服量細末八十氏ヨリ半錢ニ至ル或ニ三氏

寳明礬

吉訥護謨

固

大

半

右研和メ一服トシ一時半毎ニ一眼宛用フ

吉訥收歛散

固

大

半

苦味健胃ノ藥ヲ加ヘ間歇熱ニ用ヒ良効ヲ稱ス

ト沙糖ヲ加ヘ散劑若バ丸劑トシ用フ○丁幾劑ハ一錢ヨリ二錢テ一服トス

吉諏護謨丁幾劑

粗牛革ニ一
粗牛革ニ一

〔製法〕

吉諏 捣碎者
ニ弓

燒酒二十度者
八弓

右硝子壠ニ呑レ固封シ煖處ニ置キ浸ス

三日。濾

テ渣ヲ去リ聽用ス

涅

〔又法〕

吉諏 一弓
ニ弓

燒酒

六弓

右硝子壠ニ内レ固封シ浸ス。三日。濾過シ其液ヲ取ル是ヒ醇厚ノ丁幾劑ナリ。又其滓ノ護謨質ニ水ヲ加浸メ醇厚ノ溶劑浸四弓ヲ製ス

外敷

吉諏護謨ニ亞刺比亞護謨ヲ加ヘ水ニ溶シ施

シ吉諏ハ水ニ十分溶化セス一分ハ底ニ沈ム創傷

是ニ亞刺比亞護謨ヲ加レハ能ク溶化ス

創傷

失血ヲ止ム○此藥ヲ以テ阿煎藥或血竭ニ代用ス

ルトアリ

〔依〕
〔昆〕
〔福〕
〔涅〕
〔拔〕

右附子鹽水煎服一錢半日服十次

製法

吉赤利研者

右附子鹽水煎服一錢半日服十次

右附子鹽水煎服一錢半日服十次

右附子鹽水煎服一錢半日服十次

右附子鹽水煎服一錢半日服十次

右附子鹽水煎服一錢半日服十次

青藜閣藏叢書目錄

江戶淺草書門二二日

須原程伊

四書集註

道春點系讀本
大字最勝堂板

全冊

同集註

朱錫旂校正
齋先生覆詳

全冊

周易古註

魏王弼注
昔韓康伯注

全冊

同正文

穀山先生校正

全冊

物理小識

明朝方密之著

全冊

文子全書

入江南溟先生校
金冊

全冊

七經孟子考文補遺

山井鼎先生撰
物叔達先生補

全冊

易經詩經書經春秋禮記孝經孟子
七種合刻

漢朝桓寬撰

全部三十二冊

鹽鐵論

明朝程采校

全冊

關尹子

白井真純校

全冊

孝經會通

漢土歷代人訟事裁斷二ノツノリ名故事
李翰ガ蒙求例二做テ編集ニタル書ナリ

全冊

新定儀禮圖

高田侯孺臣
村松先生著

全冊

冷齋詩話

宋朝僧惠洪著

全唐詩逸

市河寛齋先生輯

洪公譽テ東坡山谷ト交リヨヒ清淡佳謡喜ベク

驚ベシ一度此書ヲ覽テ愈快ト貴歎セサルハシ

隨園詩鈔

市河寛齋先生撰

金冊

小倉山房詩鈔一千五百首ノ中ヨリ初學解

詩四百餘首ヲ拔萃セシモナリ隨園

萬初ノ詩風ヲ一變セシ乾隆年間詩人ノ大家也

當今詩志スノ君子此詩鈔必人讀ベキ書也

寛齋先生遺稿

生夷先生編次

全冊

先生六道世ノ詩宗ニメ當時流行スル詩風ノ鼻

祖ナリ妙作至テ多ニ異ニ數種列成テ盛ニ

行ハシ此編ハ中年ヨリ晩年ニ至ルニテ數千首

中ヨリ鈔錄ス奇趣絶調ハ一讀ミテ知ルハシ

作詩志穀

山本北山先生著

全冊

唐宋明ノ詩作異ナルヲ論ニ附錄ニ祖模

南郭ノ詩文章ノ謬誤ヲ舉ケ示セシ書也

作詩字例

芝水先生著

小冊

章考有之精選且出所ノ記入詩人全集又書也

一字平仄而用ノ字ヲ選ミ訣ヲ附シ實に簡便メ

孝經樓詩話

北山先生著

全冊

先生非常ノ論ヲ載シ唐宋詩學ノ真偽ヲ辨折

又更アリ作詩立意ノ要領ヲ付シ又考證ニ益アリ

頤文齋兩韻便覽

天民先生著

小冊

清ノ彭元瑞カ詩韻是同辨ニ本ズキ佩文韻府中音

集會且ツ旅遊ノ懷寶ニ備

頤悟詩傳

葉玄之先生著

小冊

此書ハ時令ノ門部ヲ分ケ亦贈答即事等ノ趣

ヲモアゲ熟字ヲ附シ韵譜ヲ属シ又轉句及シ平仄

ヲ記ス初學師傳ナクトモ作詩ノ自在ヨリスベシ

詩學小成

一葉先生著

小冊

此書ハ時令ノ門部ヲ分ケ亦贈答即事等ノ趣

ヲモアゲ熟字ヲ附シ韵譜ヲ属シ又轉句及シ平仄

ヲ記ス初學師傳ナクトモ作詩ノ自在ヨリスベシ

四聲韻選

芸闇先生著

小冊

初ニ詩題千餘種ヲ出ヘ一字ヨリ三十字ニ至ル

且成語熟字地名異稱等ノ部類ヲ分ツ都

詩作セシニ貞材ト云ルハ此書ナリ

西域聞見錄

清ヒ十一椿園著

全冊

李太白杜子美ノ平韻仄韻ノ作例ヲ鈔出シ

附錄ニ兩韻ノ字義ヲ述ル

清ノ康熙雍正乾隆ノ間西域固部ノ諸八國

ヲ往々平定ニ成ク版圖入り内地トナリ

ヲシルス日ツ其諸部ノ山川人物風俗物産

等ヲヒ詳ラカニシルス

幼學詩韻續

蘭園先生校閲

全冊

前件ニシルス詩韻日々盛ニ流行ス然トイニ

諸君子詩題并ニ韻字ノタラザルコトヲ惠ア依テ

先書ニ洩タル題ヲ設ケ韻ヲ附シ不足ヲ補フ

アリ得ラルベキ詩道教育ノ書ナリ

初學文軌

大典禪師著

全三册

尺牘錄

鈴木瀧州先生著

全三册

禪師積年、精研以テ漢文ノ雅、舉ヶ云々和習ノ淳俗ヲ脱出ス、ト諱々ト教授シ玉ノ書也

作文志穀

北山先生著

小判全一冊

和漢諸尺牘中ヨリ初學日用ニ便利語ヲ採集、和解ヲ附ス語ヲ求ルニ甚速ナリ

作文志穀

北山先生著

小判全一冊

漢文ヲ和譯ノ覆文、法ヲ示シ和文ヲ漢譯死活勢ヲ悟ラム、國三術談巷説、戲作ノ作文、難事ヨリノリ知らず、文草小成

芸閣先生著

小判全一冊

諸大家ノ良材ヲ選ミ叙懷存問錢別慶賀時候其余數々条ノ部門ヲ分キ大成ノ國字ヲ附ス且篤平和俗漢雅ノ作例ヲ對照、變化自在、妙用ヲ知ラム

經史子集ノ他群籍ノ釣録、佛典ニ至ル盡ク書目ヲ標シ門部ヲ分キ是メ來歷ノ類似且印解ヲ附、取用弊便宜ナリ、誠ニ杳々ノ焼テ限ト、席上ニ頓作セム今成文二篇ヲ舉テ一章ノ機軸ヲ知ラシム實作文、捷徑ヲ直筆頭花ヲ生シ妙用神ノ如レ

文藻行潦

北山先生著

小判全一冊

文章尺牘ニ用ヒベキ古今ノ雅語ヲ平常ノ俗言ヲ以テ集ソ其語ノ出所ヲ記シ部門ヲ分キ伊呂波寄文初學作文ニ臨ミ急速ニ其語ヲ求ム、且便利ノ書ナリ

含飴紀事

台州先生載作

全一冊

日本兒童ノ伝、舊誌ヲ漢文ニ面白ク綴り俗譯書頗る事ノ諸客傳寫を珍奇トシテ秘藏變玩ス、茲ニ慮ラスモ昌弘先生ノ賢孫ヨリ真本ヲ惠賜セラレテ世ニ公ニス

經史摘語

鈴木瀧州先生著

全三冊

經史ノ摘要、諸子百家衆流ノ書ニ至ルマテ悉ク抜撮ミテ其出所ヲルを専ラ作家ノ咄嗟ノ辨ゼニタノ伊呂波寄文ニシテ探討シ易カラシム博物ノ君子モ必遺忘ニ備フキ書ナリ

紀効新書

明朝戚南塘著

全三冊

單騎西要略製作辨

利井昌弘先生著

全三冊

享保中被甲辨八印行成テ世ニ行ひ、且盛り此書頗る事ノ諸客傳寫を珍奇トシテ秘藏變玩ス、茲ニ慮ラスモ昌弘先生ノ賢孫ヨリ真本ヲ

騎士用本

并圖說

關重秀先生著

全三冊

騎馬上二件ノ書ニシテ馬具兵具ニ至ルマテ製作且用ヒ方ノ便利或武術執行ノ肝要等ノべ將九字ノ極秘ヲモ論セリ

新刀辨惑錄

董木一滴齋著

全三冊

自利心得ヲ初トゾ性昔ヨリ世三行父所ノ新刀鑄畫其余鍛工ノ評書誤名説或漏充裏等ノ真義著ス

西洋火攻神器說

明朝何汝賓著

全三冊

西洋火攻神器說

平子龍先生校訂合刻

金三冊

徃昔ヨリ舶來スル所ノ書三種アリ、各異同アリテ諸君子疑評スルト多年古今茲ニ翻刻充所ハ戚將軍晩年ノ定本ニシテ東伍篇ヨリ水兵篇ニ至テ通計十八篇アリ、寶三刪定ノ全書ナリ

國字解

征株物先生著

金三冊

巨炮ニ攻守戰ノ三法アル事ヲ論シツマビラカニ

其器ノ形状ノ圖シ、大小銃筒ノ鑄造彈丸ノ輕重火藥ノ煉造法ヨリムテ放チヤウニ至ルマテ其製作秘術ヲ載ス

ス

中古甲冑製作辨

柳原香山先生著

金三冊

此製入文ヨリ變長、古中古戰國時用テ矢石ヲ避ケ坐作進退ニ武威顯ル所ノ利用ヲ宗シテ古代武器ノ悉ニ變セシム圖式ヲ加々懇ニ辨ス

王羲之 樂毅論 合刻 小楷 全冊

曹娥碑

行書 全冊

米九章蕭閒堂記

市河三丈先生輯 全冊

米家書談

市河三丈先生輯 全冊

米家書談

市河三丈先生輯 全冊

米元章家法

市河三丈先生輯 全冊

中書楷訣

明朝姜立綱著 全冊

永字八法、初一、體勢運筆、妙要、

集外書、嗜人君子常機上安置

其結體骨格、煉磨五、自其

處會得墨道佳境入、

書述 東江源鱗先生著 全冊

米元章家法ノ始ト前賢論、名言活句

ノ生悉ク自テ鑒試シ精確至當ノル

蒐輯ノ且ツ李陽、榆林審論用筆法二十四

條ノ增補ノツイ二附錄不實二書家希代

ノ寶鑑十

草書禮部韻 宋高宗御書 全冊

古體ヲ博采セレ書ニテ運筆結體、至

寶タリ

金聲巧聯 明朝徐公仁輯 小刻

賀向陵先生校 全冊

歷朝詩書諸百家集中三就テ舊說ヲ解

新意秀逸、句々精撰、部門ノ下ア大門

共二案頭ニ備テ珍愛スベキ書ナリ

米菴墨談

市河三丈先生著 全冊

地理月令樓閣江橋書齋僧堂或諸藝

術家山家村居漁家農家賈人並卓人馬

獸等ノ專用ナル者ヲ集ム花晨月夕四時ノ雅

遊或ハ書画會等ノ席上ニ置テ聯語篇額ソ

ノ乞ニ應シ頃ニ搜索シテ雲烟ヲ生スルノ懷

室ナリ且ツ當時詩人、風調ニモカ十九語最モ

多レ獨リ書家ミナラス詩作ノ嗜ムノ君子モ

トスルニナラス好事ノ君子亦此書ヲ覽テ

千載、奇遇ト云

略可法

市河三丈先生著 全冊

宋元以來諸名家ノ真跡等ニ就テ額聯

扇面豎物橫物五種ノ体裁サマク異ナル

ビ、先生年來臨摹シオカレタルヲ縮寫

ノ丸シテ臨池ノ一助トス書家ノ机案ニ

ボセ座右ノ闕クカラサル必用ノ書ナリ

書學ノ君子一覽シタマワハ更ニ一段ノ好處

ヲ得ベシ

皇國州名歌

米菴先生撰

全一帖

三體千字文

米菴先生書

全冊

此墨帖ハ日本ノ州名ヲ七言長篇ニ綴リ楷行ニ體ニテ大字ニ書シ童蒙ニ便ナラシム只書學ニ益アルノミニ非ス帝ニ此篇ヲ熟讀スル時ハ凡ソ五畿七道ノ形勢ヲ居トカラ知シムベシ

試毫帖

市河米菴先生書

全一帖

先生平生筆工ニ命シテ楷筆行草筆ヲ製スルナソノ筆ヲ試ミテ諸体ヲ書セラヒシナ筆工乞請テ刻セムナリ其後來舶人張秋琴云閣等末ニ詩跋ヲ附ミテ又彼邦へ持歸リ侍講學士梁同書モ又跋文ヲ附シ並ニ書論一帖ヲ先生ニ寄入今發行セル三家書論中ニ其書論ヲ全ク刻セリ實ニ帝代珍事ナリ

敝帚帖

市河米菴先生書

全一冊

平日諸君子工贈答セラレシ雅俗ノ書牘ヲ其マ・門生集々刻スルモノニテ書簡ノ手本トスクニ便ナリ

墨場必携

米菴先生輯

全冊

唐宋明清諸名家ノ詩文集中ニヨリ凡ニ地日用ヨリ山林人物花果鳥虫ニイタルアラユ少画題ノ妙句ニ三字ヨリナ四字ニ至ルモノヲ剣出シ且銘箴間雅語及ヒ對聯佳句數百條ヲ載ヒテ常ニ懷中セラヒソノ乞請テ蓬ニ公梓入墨場ニ才ナ諸君ニ一覽シテ必携ノ虚ナラサハタカリタ可矣

陽寒論類方

清朝徐靈胎著

全二冊

此書方ヲ以テ類ヲ分リ症ヲ以テ分ニ係シ加減消息ニ至ルマテ精當簡核ニシテ傷寒論ノ津梁タルニアラズ實ニ症ヲ見テ治ヲホトコソノ模範ナリ吳江ノ徐先生權奇英發ノオヲ以テ八十餘年ノ工夫ヲコラシ著述セル所ニソ近世未曾有珍書ナリ

經穴彙解

南陽原先生著

全六冊

往昔ヨリ俞穴ノ書夥シトイヘトモノノ説支離顛倒有テ定所明クナラズ因テ先生素問甲乙千余外臺ヲジノトソ明清ノ諸書ニ至ルノデ世々經絡俞穴ノ説アル書ヲ搜羅レ又本邦古今諸家ノ説ヲ執捨シ同身寸非ノ照シ異同ヲ辨リシアマリヲ訂ス次テ十二經脈任督ニ脈竒經ニイタルマデ圖ヲモツテ示ノ或ハ脚氣ハ所四化患門ノ俞穴マデモ盡クツビラカニ説示サレタモ古今ノ規則タル寶鑑ナリ

難經經釋

清朝徐靈胎著

全二冊

難經ノ書ハ古來ヨリノ經ノ精要ニ本ギアリ其蘊奧ヲ發ストス今此書ハソノ素問靈樞義ト相乖クトコロヲ辨駁シ定ソテ秦越人ノ作トセバ據テ經文ヲモツテ經文ヲ釋し經文ノ證スベキ十キハマ、仲景氏ノ書ヲ引テ一語モ舊注ヲ襲ハズ深大奧義片言半句ニ燦然トシテ得失ヲ摭ヒ鉢錠ヲ校入九

此書ハ古河三喜翁ノ著ス原先生ノ家ニ藏ノテ歷試極メテ多シ且記スニ國字ノ以テシ卷冊浩大ラズ披尋甚ば便ニソ單方ノ最を簡要ナル著ナリニ喜翁ハ甲斐德本翁並ヒ称シラル弘治年中明ニ渡テ醫術ヲ鑿テ二十年帰朝ノ後道ニ翁ノ師ト尤高名ノ長

醫也是ヲ以テコノ書醫家帳秘丸更身名ニ

三喜直指篇

南陽原先生補訂

全二冊

此書ハ古河三喜翁ノ著ス原先生ノ家ニ藏ノテ歷試極メテ多シ且記スニ國字ノ以テシ卷冊浩大ラズ披尋甚ば便ニソ單方ノ最を簡要ナル著ナリニ喜翁ハ甲斐德本翁並ヒ称シラル弘治年中明ニ渡テ醫術ヲ鑿テ二十年帰朝ノ後道ニ翁ノ師ト尤高名ノ長

和蘭醫範提綱

宇田川標齋先生著

全部三冊

內象銅版圖

標齋先生著

售入一冊

西洋解剖術ノ説ニヨツテ人身内景諸臟器實驗ヲ講明シシノ形質官能、秘編ノ開發ニ同好ノ髦士ヲ誘導シ從來摸索ノ聲爭ヲマヌガレテ内景ノ真面目ヲサトラシム尚アタソノ諸器ノ虚實變故ニヨリテ諸病ノ原由ヲトキシメシマタ其ノ器械損敗スレバ某ノ患病ヲ悉スルエニシテ推究シ刀圭家ヲシテソノ方法技術ヲホドフスノ端緒ヲ啓發シテ捷徑簡便ニゾノ要旨ヲ領解ヒシヘコレミト往籍ノイマダ載ヒザルトヨリ々實ニ醫家内景究理ノ撰範ト称スベキノ書ナリ

瘍醫門新書

杉田玄白先生起業
人楨玄澤先生翻譯

西醫内外科ノ名哲老楞佐協乙速的盧ノ著述ナリ初學入門ノ規則ヨリ百般ノ治療療法ヲヨビ縛帶諸式使用ノ器械等凡ソ外科ニ關係スルモノソノ説ソノ圖

醫事小言

南陽原先生著

全冊

此圖ハ醫範提綱ニ就テ或形ヲ對照シ内象解剖ノ精微ヲ著シ粲然トノ直ニ其真面目ヲ机案ニ展觀シテ頓ニ領會シ易クアリ且本邦銅版ノ魁首ニシテ海内此圖ニ比モノナレ考證ニ至ヘタマフ甚卓見、隨筆ナリ

叢桂偶記

南陽原先生著

全冊

諸書ニ出ル仲景ノ事跡ヲ參訂シ廣東人參伊吹父等ノ考ヘ神農祭ノ説、庖瘡八夫島ノ流行ノ事並ニ庖瘡神ノ考、傷寒ノ名義ソノ餘和漢ノ羣籍ヲ搜索シ後世ノ書、正醫門ニ裨益アルヤ、ヲ採テ尚ヲ附案シテ

テヨーリク載セテ遺漏トニ于古未發玄妙タツクセシ宇宙第一ノ奇書ノリ因テ杉田大楨二老先生多年ノトノテ仲思ヲ焦勞シ譯定、効金ノ落成ス總目、自五一編卷五十冊ニ及ブ數百年、今此書流行スル】先生ヒトニニ濟世ノ志ミシノ厚キコト諸君子熟覽シテ其仁術ノ偉ナルコトヲ深察シタマフベシ篇中判成タルヲ世ニ公ニス其目左方ニ闇判ス尙ラ屢篇日ヲ遡ヒ年ヲ積テ刺成ス

誘導編

金四册 近刺

手術編

金四册

外醫部

要術知新

骨傷脫臼編

金五册

近刺

癰狗傷考

南陽原先生著

全一冊

病犬ニ歎タリ藥物灸法創法接忌治驗ニ至ル追其術ノ著人附々之毒蛇諸虫毒鼠咬等ノ呻吟ノ方法ノ舉ク急救回生ノ珍書ナリ

瘍寒考

山伯園南先生著

全二冊

傷寒論

疑義考證ノ諸傳記サム

張仲景車跡ヲ舉シ奇書ナリ

新訂 增補 和蘭藥鏡 棘齋先生著 全冊未定

每篇以三冊為第一帙

西洋說 據アラヒ、當今金瘡撲打損傷弱
其藥品、皆和漢ニアリテ木邦尋常ノ藥
鋪ニ販ヒ、或ハ園圃ニ栽培ヒ又、山野ニ採
リテ用エベキモハミヲ擇ニ、醫家用施
華ノ考據ニ備ウルモノナリ舊板和蘭藥鏡
既ニ刊行スト雖モイ、又其繁少
切要ナル功能ヲ簡便ニ記述ニ西洋附近
來經驗發明セシ奇効創說ヲ增補ニ再
梓ニシテ、公行スル世ニ於處濟生ニ端ニ及
和漢古今之謂也、補之未嘗有ノ本草書也

遠西醫方名物考補遺

棘齋先生著

每篇以三冊為第一帙 冊數未定

先之發見之名物考ニ遺漏ヒ、西洋ノ藥
品ヲ載テ其性質効用ヲ詳ニ説ク、丁前則
本ノ同ニク和漢古今未タ曾テ説カ其品
物乎、藥ヲし集メシテ譯外ノ書

和音 西音發微

吳柳圓先生著

全書

對註

附西洋字原考

本邦五十音ヲ辨ニ和音唐音各臟音
ニ通シ語譯ノ必的ズル説ナテビニ蘭字輯
韻ノ法萬國音韻 通曉ヒイ等ヲ
ツブロニ著述入蘭書讀法譯文ノ意味
先哲イニタ發セサルトツリノ公論ノ書也
東洋國學家ナムモ字音ノ疑惑ヲ解

南陽原先生著 生冊

岩草

- 東都書林青藜閣發行醫書豫顯目錄
和蘭醫範提綱
- 棘齋牛田川先生著 全三冊
- 內景醫範提綱
- 牛田川裕庵先生著 全三冊
- 同 内象銅版圖
- 同上
- 增補和蘭藥鏡
- 同上
- 遠西醫方名物考
- 同上
- 同 补遺
- 同上
- 瘍醫新書
- 玄澤大槻先生著 全四冊
- 全一帖 舍密開宗
- 同上
- 全二冊 醫療正始
- 同上
- 全五冊
- 全六冊
- 全九冊 要術知新
- 玄澤大槻先生著 全三冊
- 全二冊 西音發微
- 同上
- 全二冊

書賈

青藜閣

江戸淺草茅町二丁目

須原屋伊八

