

西遠

醫方名物考補遺

卷四

松
科
別

×

e-14.

F 2
五-18



富士川文庫
3317

499.2
Em-5
2

No. 1409

遠西
醫方

榛齋宇田川先生著

名物考補遺

風雲堂藏版

青藜閣發兌

二篇

遠西醫方名物考補遺標目

卷四

石腦油

那布答

魏腦掃蟲飲

魏腦掃蟲丸

格綸僕

格綸僕健胃飲

格綸僕揮發飲

膽液熱

格綸僕排毒散

嘔吐

吐瀉病

下利赤痢

治例

五則

格綸僕試性說

名物考補遺

卷四

標目

風雲堂藏



格綸僕浸液試說

格綸僕越幾斯刺

格的刺皮 附白桂

拔爾撒謨篤露

拔爾撒謨篤露

拔爾撒謨篤露下幾刺

拔爾撒謨篤露舍利別

拔爾撒謨加拿太

拔爾撒謨刺加失刺

西拔爾撒謨默加

遠西醫方名物考補遺卷四

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕菴校補

石腦油

「ペトロレウム」
「ベテロオリイ」
「アールドオリイ」

性 毘黥密那名琥珀一種。土中華爾斯質の液ナリ。

地中ニ涌出スルヲ土油ト曰フ。巖石ノ罅隙ヨリ流

滴スルヲ石油ト曰フ。性琥珀油ノ如シ。赭赤或赭黑

色琥珀油ノ氣アリ。近臭氣甚ク。黥黑色多キハ其質

粗劣稠粘ニシテ精微揮發ノ氣少ク下品トス。一種

那布答名クル者ハ石腦油敗出品ニシテ氣味上好

ノ琥珀油ノ如ク精微稀薄透明白色ナリ但是亦黄色ヲ帶ル者多シ或云其白色ト云者モ大抵黄色ヲ帶ル者ト云ハ透白ナリ但蒸餾スルハ然レ性能尋常ノ石腦油ニ勝レリ是ニ白色トナルハ然レ性能尋常ノ石腦油ニ勝レリ是ニ硫酸油綠礬ヲ滴シテ黑色トナラズ熱淬ス亞爾箇兒及燒酒ニハ溶化セス上面ニ浮テ膜ノ如シ煮沸スレハ蒸升メ飛散ス水ヲ雜シテ上面ニ浮ム或他ノ油類ヲ雜テ偽ル者アリ赭色ノ琥珀油ヲ雜ル者ハ是ニ消石酸精消石ヲ滴スレハ麝臭ヲ生ス的列竝油ヲ雜ル者ハ火ニ上セ熱ノ的列竝ノ臭ヲ發シ且亞爾箇兒ニ滴シテ溶化ス其他粘油ヲ雜ル者ハ

硫酸ヲ等分ニ合和スレハ黑色稠厚ニメ亞硫酸精ノ臭氣生スルヲ以テ知ルヘシ○或云那布答ニ硫酸若ハ消石酸ヲ加レハ大ニ熱淬ノ一種ノ華爾斯ストナリ麝香氣ヲ生ス琥珀油ヲ以テ製スル名ノ製造麝香ト同シ是ヲ以テ石腦油ト琥珀油ト同性○那布答ニ水ヲ加ヘ蒸餾スレハ清稀ニメ精微竄透殆ト亞的兒ノ如キ油出ツ植物ノ油兒亞的兒比スレハ質重ク微酸性アリテ琥珀塩ノ酸性ト同シ焚燒スレハ烟ニ煤多シ其蒸餾壘底ニ黑色華爾斯様ノ土質殘ル此油久ク日ヲ經テ精微ノ氣消散メ漸ク黑色ヲ帶ヒ粘稠トナル

大氣ニ暴セハ凝固ノ詣ノ如シ○石腦油ハ那布答
此スハ粘稠黧褐色臭氣甚シ又硫黃ヲ含ミ能
火氣ヲ引テ焰ヲ發ス此油ノ出ル地ハ深ク掘レハ
硫黃石炭鑿琥珀等アリ是皆土中ノ華爾斯ノ成ル
所ニメ同種類ノ者トス○石腦油ハ油類拔爾撒謨
類華爾斯類ニハ混和シ易シ其氣甚夕竄透シ木石
磁器等ニ入貯レハ速ニ透漏ス故ニ硝子壘ニ内固
封シ貯ヘシ是亦大氣ニ暴セハ凝固ノ詣ノ如シ○
此油ニ水ヲ加蒸餾スレハ精微稀薄ニメ揮發竄透
スル油出ツ黃白色ニメ香氣アリ

試効甚夕竄透刺戟シ小便ヲ驅泄シ性効殆ト琥珀
油ノ如シ又強壯驅風稀釋淨刷愈創ノ効アリ○驅
蟲ノ峻藥トス竄透ノ臭味ヲ以テ能蟲ヲ刺戟シ膠
粘ノ油質ヲ以テ蟲ノ氣孔ヲ遏絶シ大便ニ驅泄ス
虻蟲ニハ五滴許宛飲液ニ點服ス條蟲ハ八十滴マ
テ用フ又是ヲ臍部ニ擦テ殊ニ良○一男子條蟲ヲ
患殺蟲劑ヲ投スルヲ數週唯蟲ノ碎片ヲ下スノミ
因テ石腦油ト的列竝油各半錢ヲ調和シ分テ三服
トシ用テ蟲ノ全形盡ク下リ治ヌ○一婦人條蟲ヲ
蟲ニ早朝右ノ油劑三十滴ヲ用テ蟲下ラス因テ午

時頃四十滴ヲ與レハ死蟲一丈四尺餘ヲ下ス○蟲
症ニハ阿魏ヲ加用テ殊ニ良凡、虵蟲、條蟲共ニ左ノ

方峻効アリ由テ此方並ニ各半錢ニ歸味、白朮、

魏腦掃蟲飲

石腦油

半錢

阿魏丁幾劑

六錢

右調和シ一時毎ニ一卵匙宛白湯ニ點服ス○此臭
氣ヲ惡ム者ハ丸劑ト用ヘシ後方ノ如シ

魏腦掃蟲丸

石腦油

二錢

阿魏

三錢

健質亞那

末

適宜

阿魏

三錢

健質亞那

右研和シ三氏ヲ一九トシ一時ニ三九宛服ス○條

蟲八月ノ下弦ニ石腦油二十滴若ハ三十滴ヲ水ニ

テ一次ニ服シ是ヲ三日連服ノ第四日ニ下劑ヲ用

レハ蟲大便ニ下ル。若シ下ラサレハ又翌月ノ下弦

ニ前法ノ如ク服スヘシ蟲必ス下ルナリ

○痛風、傷冷毒痛、流走痛、腰痛等ノ熱性焮衝ノ候十

ク纖維諸管弛弱ノ症ハ此油ヲ内服シ若ハ患處ニ

擦メ治ス○水腫、小便閉ニ是ヲ内服シ或臍及腎部

ニ擦リテ能ク小便ヲ利ス○婦人經閉ヲ通スル一良藥

トス、十滴ヨリ十五滴マテ飲液ニ點服ス

外敷 溫暖強壯ニ凝血ヲ疏散シ疼痛ヲ止ム。効力的
 列茲底那油ニ減セス。○肢節麻痺不遂或寒腫冷痛
 焮熱ナキ痛風等ノ患部ニ擦メ効アリ。○凍瘡皸裂
 靴跟等。此蒸餾油ヲ擦ハ精微ノ硫氣竄透ノ壞液ヲ
 排除シ潰爛ヲ過テ乾愈ス。或酷寒風雪ヲ冒メ各部
 腫起強拘。瘳痺疼痛スル者ハ是ヲ患部ニ擦テ治ス
 ○齧齒痛ハ是ヲ綿ニ浸シ齧孔ニ挿テ治ス。○角膜
 斑翳ニ是ヲ點メ消散ス。
羅依福威 淑叔伍

格綸僕 「ラ」ヲ「ク」ス。コロムボ「又」コロムボ「羅」
「コ」ロムボ「多」ルト「ル」蘭

〔形狀〕 灌木ノ根ナリ然氏尚未詳ノ植物ニ屬ス或云

蒲里阿尼亞名ノ一種ニシテ始メ亞墨利加洲ニ産シ。

錫蘭ノ格弄坡ニ移植シ是ヨリ諸國ニ培植ス錫蘭

度南海ノ島名格弄坡ハ故ニ其地名ヲ以テ稱ス。或

錫蘭ノ西南瀕海ノ都府云。メニスベルナム。バルマ左ムト名クル灌木ノ根

ナリ。瑠利樹斯嶋亞弗利加洲ノ島名ニ産ス。○此根太ク長シ

是ヲ横斷メ扁圓ノ切片トシ曝乾ス。徑小ナルハ四

五分許。大ナルハ二寸三四分許。兩面粗糙。淡黃色或

綠黃。中心髓樣綠黃ニ柔嚼メハ粘滑。其外圍ハ木

樣黃色。其邊ハ皮ニメ厚ク水棉樣ニ皺縮シ外面黯

赭色。右三個ノ質。各帶黑色ノ輪紋。周匝ノ區分ス。乾固スレハ邊高ク中凹ナリ。厚キ切片ハ小孔ヲ穿キ串ニ貫キ乾固ス。○味苦。微辛。收瀉不佳。稍白芥子ノ味ニ似テ微香竄氣アリ。陳久ニシテ揮發油脱スレハ鑽透セス。硝子壘若ハ益ニ於レ固封シ貯サレハ香氣脱シ蛀敗ス。○此根苦味ノ越幾斯質多シ。亞兒加利塩ヲ帶テ赭赤色粘滑ノ粉麩質ヲ含テ粘液多シ故ニ煎劑ハ腐敗シ易シ。○水ニ浸ハ香氣アリ然レ蒸餾ノ精微ノ油出ルナシ。

試効單苦味ノ保固強壯藥トス。虛弱ヲ強壯シ胃腸

ヲ健運シ腐敗ヲ防止シ粘滑質ヲ含テ緩和鎮痛ノ効アリ。○腐敗酷厲ノ膽液ヲ回復シ酸敗液ヲ消シ嘔吐下利ヲ止メ吐瀉霍亂ヲ治シ風氣ヲ驅散ス。○胃腸虛罷ノ消化ノ機力虧損シ食欲ヲ失フ症殊ニ膽液變敗ノ諸症ヲ兼ルニ用フ。○飲食消化シ難クノ汚液ヲ生シ惡心嘔吐腹痛。風氣痞悶。心下苦滿。腹脹等ヲ患ル者ハ此藥ヲ散劑トシ香竄ノ藥ヲ加用テ殊効アリ。或症ニ隨ヒ大黃丁幾劑鏡若ハ壯神健胃ノ下劑ヲ兼用ノ良。○膽液虧乏ノ飲食消化セス右ノ諸症ヲ發スル者ハ牛膽ヲ加丸藥トシ用ヘシ

飲食能ク消化ノ食欲生シ諸症治ス○善饑異嗜及
 口味失常ノ症ヲ治ス○胃中酸敗液アリテ風氣痞
 悶腹痛不食等ヲ患ル者ハ此藥ニ香竄佳味ノ藥ヲ
 加殊ニ橙皮桂等ノ健胃藥ヲ加ヘ或症ニ隨ヒ蠅蝨
 石麻屈涅失亞等ノ制酸藥ヲ加ヘ或亞刺比亞蘆謨
 等ノ粘滑緩和藥ヲ加ヘ或甘酸精越栗失爾赫篤立
過設印亞的兒等揮發壯ヲ加ヘ或阿芙蓉液等ノ鎮
神爽涼劑ヲ云皆名ニ出痙止痛藥ヲ加ヘ用ヘシ○右ノ諸症ニ後方多ク治
 驗アリ○

格綸僕健胃飲

格綸僕越幾斯劑 一錢

扁桃舍利別 四錢

桂水 四錢

右調和シ一時毎ニ一匙宛服ス○依剝昆垚兒ニ此
 根及括失亞偉効ヲ稱ス是ヲ用テ酸敗液ヲ驅除シ
 風氣痞滿大便不調下利等ヲ治ス感觸甚キ症ハ煎
 劑トシ亞刺比亞蘆謨等ノ粘滑緩和ノ藥末ヲ溶化
 シ用フヘシ感觸遲鈍ノ症ハ能ク刺戟ノ藥ニ堪テ良
 驗アリ喻ハ後方ノ如シ

格綸僕揮發飲

格綸僕 四錢

亞兒尼加花

一錢半

右水適宜ヲ加、煮テ五ヲ取り滓ヲ去リ後藥ヲ加
揮發香竈精一錢半 橙皮舍利別五錢

右調和シ半時毎ニ一匙宛服ス○此根、膽液腐敗ヲ
挽回スル奇効アリ故、膽液酷厲毒ノ諸病ヲ治ス

膽液熱、膽液熱ノ一良藥トス。此熱病ニ罹レハ大抵

此藥ヲ投メ病毒ヲ驅除シ治ス。殊ニ腹痛アル症ハ

中和塩ヲ加テ酷厲毒ヲ驅泄メ尤良、喻ハ後方ノ如

格綸僕排毒散

格綸僕

細末

孕鹼酒石

各一錢

右研和シ分テ六服トシ二時毎ニ一服宛冷水ニテ

服ス或此根十五氏若ハ二十氏ニ中和塩孕鹼酒石

霸王等分若ハ一倍量ヲ加ヘ一服トシ其症ノ緩急

ニ隨ヒ二時或二時半或三時毎ニ服スヘシ。凡、中和

塩ハ焮熱ヲ涼解シ煩渴ヲ滋潤シ大便ヲ滑利ノ熱

毒ヲ驅逐シ格綸僕ハ虛罷ヲ資補ノ保護シ速ニ胃

腸中腐敗ノ沸釀ヲ制止ノ惡心嘔噦ヲ降鎮ス。此劑

ヲ服メ大便開利スル片ハ此根ヲ泡劑トシ收斂亞

的兒名ヲ加テ微酸味ト爲シ用ヘシ○近年一種ノ

膽液熱流行ス。勉テ胃腸ノ汚物、酷厲ノ膽液ヲ驅除

スレト仍惡寒發熱往來歇メス。其症宛正間歇熱ノ

如シ。幾那ヲ與レハ熱勢却テ増劇シ舌乾燥ス。然ニ格綸僕ヲ與レハ惡心嘔噦懊懷苦悶忽チ寛解熱勢漸ク潰散シ諸症隨テ輕快ス。是膽液ノ腐敗酷厲ヲ回復シ。熱毒ノ虐勢ヲ挫剋シ胃及全體ノ諸管纖維ヲ收固強健シ病毒復存陷ノ襲戟スルヲ防止スル殊能アレハナリ故ニ幾那及安質沒扭ノ如ク驅熱ノ偉効アルヲ毫疑ナシ○亞墨利加地方ハ極テ惡厲ノ膽液熱流行ス。其症惡心懊懷烈ク頻ニ嘔逆ノ夥ク膽液ヲ吐シ或嘔吐連綿ノ少瀾モ休マズ或暫時ニ驚異スヘキ多量ノ膽液ヲ湧吐シ。熱勢兇

猛煩悶極テ烈ク幾那ヲ與レハ毫モ胃ニ受容セズ咽ニ下テハ即吐ス。此病總テ格綸僕ヲ與レハ能ク受容テ諸惡症速ニ寛解シ回生ノ奇効ヲ得ルヲ邦人必知ル所ナリ。加ニ野並身ノ藏熱ノ積余ノ受容^{和蘭}嘔吐酷厲ノ膽液ニ因テ嘔吐ニ腹痛ヲ兼ル症^{各ガ}ルコレハ此藥殊効アリ但吐^{イキ}急持症ハ乙百葛格^{イキ}安那^{イキ}少許ヲ與ヘ次テ格綸僕^{イキ}泡劑ヲ用テ不胃ヲ灌刷メ能ク吐スルヲ加^{イキ}密列泡劑ヲ與ル如シ是膽液湧溢ノ刺戟ニ因リ若ハ吐劑ニ因テ發スル劇キ^{イキ}攣急ヲ防止スレハナリ或腹痛ニ乙百葛格^{イキ}安那

少許宛用也。微惡心ヲ發スルニ至テ鎮痛ノ効ヲ取
 1アリ。然レ或是ニ由テ大ニ嘔吐ヲ發シ更ニ險重
 ノ諸症ヲ啓發スル者アリ。然レ乙百葛格安那ニ香
 竈佳味ノ藥ヲ加ヘ。格綸僕ノ泡劑ヲ以テ送下スレ
 ハ右ノ如キ過誤味也。○胃ノ感觸甚クノ發スル嘔
 吐及酸敗液ヲ兼ル嘔吐ハ此藥ニ香竈藥ヲ加用ヒ
 テ治ス。○遷延嘔吐。或胃虛衰ノ麻痺シ飲食ヲ受容
 スレト轉輸スルヲ能ハサルニ因リ。或胃ノ感觸甚
 フノ飲食ノ受容ニ堪サルニ因リ。或津唾汚液アリ
 テ口味惡キニ因リ。或酸敗液。酷厲ノ膽液。脾液過多

腐敗等ニ因テ發スル經久淹滯ノ嘔吐ハ此藥ニ香
 竈藥若シ銀劑。制酸劑ヲ加ヘ用テ治ス。○腎痛
 ニ因テ屢嘔吐スル症ハ緩和劑及輕キ利尿劑効ア
 リ。然レ格綸僕ヲ稀キ薄荷水ニ浸シ用テ捷効ヲ得
 ルヲ多シ。○妊婦ノ惡心嘔吐甚キ症モ亦此藥ヲ稀
 キ薄荷水ニ浸シ用テ効アリ。但麻偏涅失亞ヲ用テ
 常ニ大便ヲ通利ス甚夕多血症ハ刺絡ヲ捷効アリ
 吐瀉病此藥吐瀉霍亂ニ奇効アリ。腐敗膽液ヨリ發
 スル吐瀉病ヲ治ス。ハ疾リ。○兇猛ノ吐瀉病羅甸
 屬ス。即大膽液腐敗酷厲ノ病ハ預夕吐下劑ヲ用テ

膽液酷厲毒ヲ驅除スルニ及ハス。直ニ此藥ヲ用テ
 吐利。急腹痛等危劇ノ諸症ヲ寛解ス。胃腸失常ノ運
 動ヲ靜止ス。頓ニ精力虛脱ヲ挽回ス。印度地方ノ賈
 船時ニ此病一般流行シ。毎日死スル者甚ク多ク治
 スル者稀ナリ。然レ始テ此藥ヲ試用スル者鮮
 ク大抵救活セリ。斯ノ如キ必死ノ病ニ夕回生ヲ得
 ルニ實ニ此藥ノ殊能ニ係ルヲ顯然タリ。此根細末
 下ニ病勢ノ緩急ニ隨ヒ半錢ヨリ二錢ニテ一服ト
 シ。一時半或二時毎ニ用テ○虛弱ノ小兒嘔吐及下
 利劇キ者ハ麻屈涅失亞。蚶。蝸。石。等ヲ加用テ多ク驗

アリ○小兒生齒ニ因テ嘔吐或下利ヲ發シ諸藥効
 ナキ症ハ此藥ヲ用テ治ス此症大抵酸敗液ヲ兼ヌ。
 此藥ハ酸敗液ヲ消スル効極テ峻ナリ麻屈涅失亞。
 若ハ結麗土少許ヲ加テ尤良。
 下利赤痢此藥諸腸ノ弛虛罷弱ヲ強健ス。經久下利
 或赤痢。痛痢。重墜努責等ノ病末ニ用テ効アリ。症ニ
 隨ヒ阿芙蓉ヲ加テ良○此藥收斂スルニ鎮痙ノ効
 アル故ニ胃腸失常ノ運動ヲ鎮靜ノ下利赤痢ヲ治
 シ初發收瀉劑害アル症ト雖モ閉澁ノ妨害ナシ但
 專ラ虛憊ヲ挽回シ腐敗ヲ防ニハ病毒大抵減ノ後

用テ殊ニ良○膽液酷厲毒ヨリ發スル下利赤痢ハ中和塩類ヲ加ヘ症ニ隨ヒ増減シ用テ治スヘシ○勞瘵ノ病末發スル溶崩下利ヲ止ルニ良藥トス○下利ニ風氣痞滯ヲ兼子漚沫ヲ雜テ水瀉シ食欲ナキ症遷延ノ滯患トナル者ハ是ニ肉豆蔻若ハ乙百葛格按那少許ヲ加ヘ用テ治驗多シ○下利赤痢ハ症ニ隨ヒ香竄藥阿芙蓉劑銕劑ヲ加用テ良○此根嘔吐下利ニ經驗セル治例ヲ左ニ略擧ス

第一 一男子八月大ニ勞力發汗ノ冷氣ニ冒觸シ劇ク吐瀉ノ腹痛シ煩躁休マサルヲ十二時精力大ニ

虛脱ス乃チ格綸僕末ニ月ヲ取テ薄荷水ニ和シ一時半或ニ時毎ニ與レハ諸症解散シ速ニ回復ス其後勞力ノ所業ヲ爲シ復前症ヲ發ス即チ前方ヲ與テ全愈セリ

第二 一男子八月下旬偶下利ヲ發シ三日ニノ大ニ増劇シ腹痛極テ甚シ又頻ニ嘔吐ノ四肢痙攣ヲ兼又即此藥ヲ散劑トシ一月ヲ與レハ吐下半ヲ減

第三 一婦人四月下旬產後腸痛ヲ發シ腹脹苦滿ノ數下利シ便色及其稀稠酥ノ如シ舌白苔アリ肌膚

枯燥灼熱シ脉百動ヨリ百十五動許。下利。腹脹痛。夜分殊ニ甚シ。此症乙百葛格安那ヲ與テ吐セシメ。又阿芙蓉劑。越栗失爾赫篤立沃利。收瀉劑。清涼劑ヲ投メ寸効ナシ。因テ格綸僕ヲ取テ桂ノ泡劑ニ浸メ濃ク泡出シ一茶碗ヲ用ル。毎ニ下利腹痛輕差シ連服五日ニメ全治セリ。

第四 一男子二十六歲六月酷暑ノ候偶往來熱ヲ發ス一醫吐劑及下劑ヲ與ヘ又中和塩類ヲ飲劑トシ與ル一三日。些モ輕快ヲ得ス。頻々惡心嘔噦ノ屢。綠色ノ膽液ヲ吐シ舌苔アリ。肌膚灼熱乾燥。大便壅閉。

頭痛劇ク。且背疼シ。肢體懈惰疲困甚シ。脉百二十動許。乃チ吉利詞參兒ヲ施シ。孕礬酒石ニ刀ヲ取リ。格綸僕ノ泡劑三匙ニ研和メ一服トシ與レハ惡心嘔噦頓ニ輕差ス。因テ二時毎ニ一服宛用フ。是ニ由テ下利シ。其熱及諸症悉ク解散ス。但第十一日ニ當テ大便血ヲ交ヘ下ス一兩次。患者疲困ス。因テ幾那ヲ取テ對症ノ收瀉劑ニ加ヘ與レハ便血止テ體力漸復シ平愈セリ。

第五 一小兒二歲六月二日。生齒ニ由テ劇ク吐瀉スル一三日。虛憊甚シ。因テ格綸僕末五氏。蟹爪末三氏

ヲ調和シ與レハ嘔吐頓ニ止ミ次テ下利止ミ兩日
 中ニ回復ス
 格綸僕試性說**第一**七月酷暑ノ候。幾那ト格綸僕ノ
 冷浸劑各一弓ヲ取り各別ニ兩個ノ硝子壺ニ存レ
 牛肉ヲ細ニ判ミ二錢宛加ヘ南窓ニ置テ二日二夜
 格綸僕浸ノ牛肉ハ稍腐臭アリ。幾那浸ノ牛肉ハ完
 好ニ臭氣ナシ。其後五時ヲ經テ仍腐敗セス。然ハ
 幾那ハ肉類ノ腐敗ヲ防クテ格綸僕ニ勝レリ但牛
 肉二錢ヲ冷水ニ浸シ置ケハ一晝夜ニノ腐敗ス
第二幾那ト格綸僕ノ冷浸劑一弓宛各別ニ硝子壺

ニ存レ。又右ノ冷水ニ浸ノ腐敗セル牛肉ヲ等分ニ
 取テ前說ノ兩浸劑ニ加ヘ浸メ三時ヲ經レハ俱ニ
 臭氣減消ス。但格綸僕ハ差臭氣アリ**第三**小硝子壺
 四個ヲ取り。各腐敗ノ牛膽液三錢唾液二錢宛存レ
 唾液ノ性胃液是ニ幾那浸劑。格綸僕浸劑。加密列浸
 劑。泉水一弓宛各別ニ加ヘ。重湯罐中ニ置ク重湯ノ熱度ハ
 幾那浸ハ其膽液唾液ニ混メ忽チ凝固
 加密列浸ハ膽液ノ腐敗及稀稠惡臭
 少シモ渝變セス。格綸僕浸ハ能ク膽液唾液ニ混和
 ノ速ニ腐敗ヲ制止シ臭氣消去ス。然ハ是膽液腐敗

ヲ制止回復スル性力最モ秀偉トス○右ノ諸浸劑。重湯中ニ在^レ一^レ時半許ニ^レ臭氣大ニ減ス。唯泉ノ浸液ノ^レ臭氣除カス^レ三時ヲ經テ皆臭氣消ス。但^レ泉ノ浸液ノ^レ臭氣アリ。幾那浸ハ多ク漚沫泡起シ化釀ノ酒氣生ス。六時ヲ經ルハ格綸僕及^ヒ加密列浸ハ膽液ノ慄悍氣增加ノ毫毛惡臭ナシ。幾那浸ハ其漚沫ノ泡釀減シ酒氣差消ス。十二時ヲ經テ泉浸甚ク腐壞シ。幾那浸ハ酸敗ス。格綸僕浸^カ加密列浸ハ尚腐敗氣ナシ。然^レ正十五時ヲ經テ腐敗シ二十四時ニ^レ極テ惡臭ヲ生ス○格綸僕浸ハ右ノ如ク膽液ノ腐

敗ヲ挽回スル^レ峻駛ナルヲ以テ兇猛ノ吐瀉病。霍亂暴厲ノ膽液熱等。一切膽液泛溢腐敗ヲ兼ル諸病ニ奇効アル^レ知ルヘク又膽液諸病ノ初發吐劑及下劑等ニテ腐敗ノ膽液ヲ驅除セ^ス直ニ此藥ヲ用テ捷効アル^レ所以ヲ明證スルニ足ル○幾那浸ハ腐敗ノ膽液速ニ凝固シ惡臭増發スルヲ以テ觀レハ前說ノ亞墨利加地方ノ兇暴ナル膽液熱^{夥ク}膽液^{吐ク}醫家屢幾那ヲ投ス^レ凡胃ニ受容セ^ス絶テ効驗ナキ所以ヲ曉了スルニ足ル。然^レニ格綸僕ヲ與^レハ忽チ膽液ヲ混和ノ腐敗ヲ回復シ惡臭ヲ奪去シ良

性ト爲ス故ニ其惡厲危劇ノ病患ヲ救活スル一聖藥ナルト亦顯然タリ

第四 幾那浸格綸僕侵。加密列浸。及冷水各一弓宛各別ニ四個ノ硝子壘ニ存レ。是ニ各牛膽三錢。唾液二錢宛加ヘ。爐ノ邊。大抵血溫度口中ノ處ニ置テ三時。即チ其浸液皆泡釀ス。幾那浸ハ多ク漚沫泡起シ酒香生ス。格綸僕浸ハ泡釀微ナリ。水浸ハ十二時ニノ腐敗ス。幾那浸ハ二十四時ニノ酸敗シ加密列浸ハ微腐敗ス。格綸僕浸ハ微モ變敗セス其氣佳好ナリ

○右ノ諸試說ヲ以テ觀レハ幾那浸ヲ新鮮ノ膽液ニ加レハ凝固シ腐敗膽液ニ

加レハ凝固殊ニ甚シ。又幾那ハ肉類ノ腐敗ヲ防止スルト格綸僕及加密列ヨリ峻ナリ。然レ格綸僕ハ幾那ノ如キ泡釀ノ變化ナクノ膽液ノ腐敗ヲ防止ス。是ヲ以テ能ク膽液腐敗ノ諸病ヲ治シ又腐敗膽液及津唾ノ變性缺乏等ニテ飲食消化シ難キヨリ發スル諸病ニ効アリ

第五 格綸僕ト加密列。白芥子ト飲食ノ烹釀消化ヲ扶ル効力ヲ比較シ試ルトアリ。其法。石臼四個ヲ取り各蒸餅心二錢。炙羊肉細搗者二錢。唾液四錢宛存レ。是ニ一ハ格綸僕浸。一ハ加密列浸。一ハ白芥子浸。各一弓宛加ヘ一ハ水四錢ヲ加

へ各熟研合和シ。是ヲ各別ニ硝子壘ニ付レ置ケハ
 其水浸劑ハ六時中ニ泡釀シ他ノ三劑ハ十五時中
 ニ泡釀ス。但格綸僕浸ハ泡釀最モ遅シ。水浸劑ハ二
 十四時ニノ酸敗ス。加密列浸ハ三日ニノ酸敗ス。然
 ニ格綸僕浸白芥子浸ハ些モ變敗セス。爐邊ニ置テ
 十日ニノ尚酸味生セス。腐敗セス毫モ變化ニ罹ル
 ヲナシ。格綸僕ト白芥子ハ其味相似タルヲ以テ試
 ルト右ノ如シ。然ハ此二品ハ飲食消化ヲ妨ケスノ
 烹釀ヲ抑制スル者ナリ。○格綸僕ハ右ノ試効アル
 故ニ胃中ノ飲食泡釀過甚ニノ大ニ風氣ヲ生シ痞

滿腹脹攣急拘痛シ及酸敗液ヲ兼ル症ニ殊効アル
 ト他ノ苦味藥ノ比ニ非ス。又胃ノ飲食ヲ傳輸スル
 衝動力機轉虧損スル症飲食停滯痞悶ノ消化シ難キ症ハ此藥ニ
 香竄佳味ノ藥及白芥子ヲ加テ良効アリ第六此藥
 ハ諸液ノ酸敗ヲ防遏シ。既ニ酸敗スル者ハ是ヲ中
 和塩ト爲ス異能アリ。其試法格綸僕浸加密列浸幾
 那浸一弓宛各別ニ硝子壘ニ付レ。是ニ醋二十滴宛
 加テ。格綸僕浸ハ醋酸盡ク凝固ノ結芒シ中和塩ト
 ナル。加密列浸ハ其酸味差減ス。幾那浸ハ酸味酸臭
 尤顯著ニノ右ノ格綸僕浸ニ醋二十滴ヲ倍加スル

ニ非レハ同等ノ酸味トナルヲナシ第七格綸僕ヲ
 内服ノ心藏及動脈ニ感觸スルヲ試ルニ予空心ニ
 ノ且勞動セス靜坐スルヲ半時許ニノ夜六半時ニ
 至リ格綸僕末一カヲ取り泉水一小盞ヲ以テ送下
 シ脈ヲ診スレハ七十動ナリ尚靜坐四分時ニノ脈
 狀差異ナシ翌夜同時右ノ如クノ此末半錢ヲ服ス
 ルニ脈八十動ナリ十二分時ヲ經テ脈狀差異ナシ
 但七十七動ハ同様ニノ三動ハ既ニ遲緩ナリ然レハ
 此藥脈動ヲ増進セス又起熱ノ藥ニ非ス故ニ勞效
 羸瘦消削病等ノ内伏熱ニ投メ起熱ノ害ナク能ク

酷厲液ヲ消化シ胃腸ヲ健運ス○幾那ハ胃ニ鬱滯
 シ或瀉下スルヲアリ格綸僕ハ些モ胃腸ヲ攪擾セ
 ス風氣痞滯ヲ驅散シ酸敗液ヲ消化ス右ノ試説ヲ
 以テ前件ノ諸病ニ推當運用ノ逾殊効ヲ驗スヘシ
 格綸僕浸液試説格綸僕ヲ再餽燒酒ニ浸セハ其質
 融化シ出ルヲ最多シ是ニ次テ尋常燒酒葡萄酒蒸
 餾水醋泉水ハ其融出スルヲ逐次ニ少ナシ○其試
 法右六種ノ液各四カヲ取り各別ニ六個ノ硝子壺
 ニ内レ格綸僕二錢宛投シ浸スヲ十二時ニメ皆紙
 ニテ濾シ秤量ヲ衡レハ再餽燒酒ノ浸劑最モ重シ

其他ノ五種ハ秤量逐次ニ輕キヲ以テ是ヲ知ル。故
 ニ再餹燒酒ノ浸劑ハ其氣味尤醇厚ナリ。○水浸劑
 ハ藥氣速ニ消散シ十二時ヲ經レハ多ク渣渣生シ
 二十四時ニノ溷濁シ微ノ如シ。○此藥ニ橙皮ヲ加
 水浸劑トスレハ氣味尤佳ナリ。即此末一弓橙皮黃
 四錢燒酒二弓水十四弓。煖氣ヲ假ラス浸ス。六時
 紙ニテ濾シ聽用ノ尤佳味ノ浸劑トス。

服量散劑ハ十五氏ヨリ半錢マテ日三四次服ス。但
 散劑ヲ用テ稀ナリ多クハ葡萄酒或水ニ浸シ服ス
 ○煎劑ハ此根四錢水一比煮テ半ヲ減シ一二匙宛

服ス。或云浸劑煎劑ハ此根四錢日三四次服ス。水
 弓ニテ製シ用フ。○越幾斯劑ハ一錢申引二錢ハ
 丸藥或飲液ニ溶化シ或他藥ニ加用フ。

格綸僕越幾斯劑製法此根十二弓粗末トシ再餹燒
 酒三介ニ浸テ四日。濾テ液ヲ取り其滓ニ水適宜ヲ
 加テ煎煮。濾テ其液ヲ取り慢火ニ止セ水氣ヲ蒸
 散メ大抵其四分一ヲ減シ火ヲ下シ又重湯ニ煎
 熬シ稠厚トナルヲ候ヒ前ノ燒酒浸液ヲ取テ徐々
 ニ加テ煎熬シ放冷ノ丸藥トナル許ノ稠ト爲シ聽
 用ス。是ニ由テ香味脱セス焦臭ハシ。此根十二弓ヲ

以テ越幾斯劑ハ弓二錢出ヲ効力大抵散劑ト同シ

格倫僕丁幾劑

製法 格倫僕細到二十錢 燒酒二十度者三十三手

右硝子壘共内固封シ浸ス月十四日滓ヲ去リ固封

シ貯フ健胃劑ノ藥液ニ滴シ加服メ良國華國福國寶

應的刺皮コルテクス・ナンテラス・シニナモム・

形狀麻竭郎南亞墨利加産スルコルテクス・ナンテラス・シニナモム・

チカト名タル樹ノ皮ナリ往昔諸厄利亞ノ加比丹

應的爾名麻竭郎ノ海邊ニ行始テ此樹皮ヲ採ル故

ニ此皮ノ名トシ又麻竭郎桂ノ名アリ其樹大ナル

ハ五丈許濶二尺半許ノ板トナル小ナルハ灌木ノ

如シ葉常綠香氣アリ老利兒葉ニ似テ大ナリ花五

瓣紫色十六雄蕊一雌蕊アリ第十一目萼三瓣花後

軟實ヲ結シ裏三室アリ各二子ヲ收ム味辛竄透ス

或云實ノ形掛實○此樹皮藥舖ニ販ク者ハ大ニ

長三四拵徑甚夕厚夕或云厚廿五釐許硬固外面

皺アリ淡白色香氣アリ研磨シ或嚼メハ香竄ニノ

丁子及桂ノ如ク氣味辛熱ニ夕暫ク舌ニ殘留ス水

ニ浸セハ藥氣出ル非燒酒ヨリ多シ蒸餾スルハ精

名物考甫遺

卷四

風雲堂藏

微火油水面ニ浮ム。數月ヲ經レハ半白脂ノ如ク凝
 聚ニ底ニ沈ム。○白桂モ亦此樹ノ同種トス。留スル
 白桂 カ子ルラアルバ又カ子クス
 北亞墨利加洲ニ産スル樹ノ皮ナリ。樹大廿中等。葉
 長廿一拇指半。潤一拇指。淡綠色。葉本ニ五瓣ノ白花
 攢簇ス多雄蕊ニ十及多雌蕊アリ第十三綱實淡綠
 熟スレハ黑色。核アリ葡萄核ノ如シ。花葉實佳香アリ
 味辛。○此皮ハ白斑子此粗皮ヲ削リ去リ裏皮ヲ
 日乾シ卷縮ノ小管狀ヲ爲ス。硬固輕脆ニメ外黃色。
 或淡白色ニメ帶赤色ノ横理アリ。裏面淡白色破碎

スレハ白色。氣味辛。微香竄様ニメ丁子ニ似タリ研
 磨シ若ハ水煎スレハ殊ニ甚シ。蒸餾スレハ露水桂
 及丁子ノ香氣アリ。黃色ノ油其底ニ沈ム。此樹北亞
 墨利加洲ノ煖地。牙埋加カカ。加祿利那ナ。古巴等ノ諸島ニ
 産ス。○應的ラ刺皮ト白桂ハ醫家同種同効トシ。或種
 類甚夕相近トス。但物産家ハ是ヲ別種トス。
 試効 二種ノ皮氣味性効大抵同様トシ相代用ス。○
 温煖衝動壯神健胃ノ一良藥トス。○胃腸諸器ノ纖
 維虛衰シ蠕動機頹弛セル諸症ヲ治ス。○痔瘻及乳
 糜諸道ニ寒粘液凝聚ノ壅滯スルヲ稀釋シ發汗ノ

驅散ス○疝腹痛子宮病失苟兒陪苦胃寒等ニ良効ヲ稱ス○此藥單用シ或苦味衝動ノ藥ヲ加ヘ用フ

○服量定準ナシ散劑煎劑浸劑泡劑丁幾劑トシ用

フ或云應的刺皮ハ白桂皮ヨリ熱性多シ一次ニ一月ヨリ多ク用ルト勿

白桂丁幾劑製法 白桂 適宜 燒酒 二十度者 八倍

右硝子壘ニ内レ固封シ煖處ニ置キ浸ス一六日渣

ヲ去リ用フ 叔 叔 依 伍 拔 華 亞

拔爾撒謨篤露 「バルサミム」トリウ「バルセム」トリウ「トバ」トバ「ト」トバ「ト」トバ「ト」トバ

形狀 篤露及加兒答竭那 共ニ南亞墨ニ産スルトリ

イヘラバルサミムト名ク樹ヲ鑽刻ノ取ル華爾

斯液ナリ 或云此樹松 故ニ篤露拔爾撒謨又加兒答

竭那拔爾撒謨ト名ク初ハ流動ノ稠厚ノ的列竝底

那名ノ如シ時ヲ經レハ凝固シ微赤黃金色 或云是

爾撒謨ト名ク他ノ拔爾撒謨ハ黧赤色ナリ 透亮佳香甚夕竄透シ枸

櫟及蘇合香ノ氣アリ嚼メハ柔ニ粘著シ微甘ニ

ノ辛ヲ帶ヒ味佳クノ他ノ拔爾撒謨ノ如キ嘔スヘ

キ氣味ナシ燒酒ニ浸メ盡ク溶化ス○是ニ二種ア

リ一ハ軟ニ半流動ス 或云指ニテ 小壺蘆ニ内レ

輸ス是ヲ上品トス一ハ經久ニノ凝固シ疏脆ノ碎

塊トナル此品居多シ是ヲ乾拔爾撒謨ト名ク○或
格碌波尼亞名ヲ雜テ偽ル者アリ炭火ニ投スレハ
的列竝ノ氣アルヲ以テ知ルヘル

試効凝結ヲ疏解シ肺瘍ニ用テ愈創排膿淨刷ノ効
亭露拔爾撒謨名ノ如シ但亭露及其他拔爾撒謨類
ハ熱性ニノ刺戟衝動ス此拔爾撒謨ハ緩性ニノ刺
戟セス味佳クノ服シ易ク諸疔瘍ニ用テ愈創ノ良
効ヲ奏シ諸拔爾撒謨ニ勝レテ推稱ス○喘急ニ三
四滴宛飲液ニ點服ノ効アリ或沒藥蘧謨安沒尼亞
幾金硫黃等ヲ加ヘ丸藥トシ用フ○或丁幾劑トシ

十五滴若クハ二十滴一服トシ前說ノ諸症ニ用フ

拔爾撒謨篤露丁幾劑拔

拔爾撒謨篤露 一勺 燒酒 二十度者 八勺

右硝子壘ニ内レ浸テ六日滓ヲ去リ聽用ス

拔爾撒謨篤露舍利別涅

製法 拔爾撒謨篤露 一勺 亞刺比亞蘧謨 四錢

水 一勺 舍利別 六十四勺

右拔爾撒謨ト蘧謨ニ水少許宛加テ研合シ乳白液
トナルニ至テ舍利別少許宛研和ス

○外敷ノ腰髓痛風傷冷毒痛ヲ治シ一切創傷ヲ愈

シ膿ヲ排ヒ殊ニ腓及神經多キ部ノ毀傷ニ偉効ヲ稱ス

依拔華 涅叔伍

拔爾撒謨加拿太 「バルサミス、カナヂンセ」

形狀 加拿太 北亞墨利加ニ産スル「ビュス、バルサメ」

アト名クル樹ヲ鑽刻ノ取ル華爾斯液ナリ是の列

竝底那ノ最精微揮發ノ者ニノ透亮粘稠微黃白色

揮發油ヲ帶ヒ的列竝ノ香アリ味微苦香竄様ニノ

諸拔爾撒謨類ノ如シ

試効 尿道虛弱弛緩ノ諸症小便淋瀝漏精白帶下等

ヲ治ス性効拔爾撒謨格拜霍ト同シ二十滴ヨリ三

十滴ヲテ日ニ三次沙糖ヲ加ヘ香竄ノ露水ニ滴シ

服ス否サレハ飲食消化ヲ妨ク或雞子黃或亞刺比

亞蘆謨漿 名ニ加ヘ水適宜ヲ研和シ用ヒ或飲液ニ

點服ス但熱性ニノ刺戟衝動スル故ニ多血焮衝性

ノ症ハ是ヲ禁ス○外敷メ纖維弛虛衰弱ヲ強健ニ

經久ノ潰瘍等ヲ治ス

拔爾撒謨刺加失刺 「バルサミス、ラカシラ」

形狀 亞墨利加洲ニ産スル一種ノ拔爾撒謨樹ヲ鑽

刻ノ取ル華爾斯液ナリ。其質重ク赤赭色透亮柔軟
膠粘ノ絲ヲ引キ嚼テ粘著ス。味微苦收澇シ香竄ニ
ノ稍格洋霍拔爾撒謨ノ如シ壺蘆ニ内輸ス

○榕按ニ此拔爾撒謨ハ漢人所謂篤耨香ナリ

試効胸肺ヲ強壯シ小便ヲ利ス。微毒淋治ノ後淋瀝
止下ス數月困難淹滯スルヲ治ス。毎日十氏。尚其餘
至服シ或對症ノ藥ニ加ヘ丸劑トシ用フ

〔依華〕

拔爾撒謨默加

「バルサミヘラ」ト名ツクル灌木ヨリ自ニ滲出シ或
「バルセルム」ト名ツクル灌木ヨリ自ニ滲出シ或
「アポバルサム」ト名ツクル灌木ヨリ自ニ滲出シ或
「ヨロドセルバルサム」ト名ツクル灌木ヨリ自ニ滲出シ或

〔形狀〕亞刺比亞亞細亞洲國名ノ默加地名ニ産スルアメイリ

スバルサミヘラト名ツクル灌木ヨリ自ニ滲出シ或

鑽刻ノ取ル華爾斯液ナリ。此品甚タ稀ク透明鮮白

或淡黃色或云微赤佳香アルヲ諸拔爾撒謨ニ勝リ

甚タ鑽透シ枸櫞及薄荷ノ氣アリ味辛微苦香竄久

ヲ經レハ稠粘ニメ的列竝底那或蜜ノ如ク絲ヲ引

キ流動シ難ク氣味微ナリ○眞品ノ新鮮ナル者ハ

其質精微ニノ輕キ故ニ是ヲ一盞ノ水ニ滴スレハ

沈降セス或沈ムト雖モ忽チ復浮テ水面ニ布漫シ

膜ノ如シ。八分時ヲ經レハ鳥羽ヲ以テ是ヲ刷取ル

ニ破碎セス或掌上ニ滴ノ摩スレハ稠固ニノ酥ノ
 如ク乳白色トナル。經久ノ品ハ稠厚ニノ水ニ滴ス
 レハ直ニ沈ミ。膜トナラス。○此拔爾撒謨ハ其樹ノ
 一刻痕ヨリ出ル。日三四滴。一良木ト雖モ僅ニ十
 錢若ハ十五錢出ルノミ。故ニ國禁アリテ他方ニ輸
 ス。トヲ許サス。或其葉及細枝ヲ水ニ煮テ鮮白ノ脂
 液浮ムヲ取ル。是亦多ク得難キ故ニ輸ス。ト罕ナリ。
 或、其煮タル枝葉ヲ取テ再煎シ湯上ニ浮ム油液ヲ
 取り製ス。此品多ク諸方ニ輸シ販ク然レ稠厚ニノ
 精微ノ氣味少ナシ。下品トス。上品ハ罕ナル故ニ偽

造ノ品多シ。或胡麻油ヲ雜ヘ或駝鳥脂ヲ加テ偽製
 スル者多シ。宜ク前説ノ鑒法ヲ以テ辨識スヘシ

試効 熱性衝動ノ汗ヲ發シ月經ヲ通シ虛冷沈痼ノ

疼痛ニ丹服外敷ノ殊効アル。ト大抵的列竝格拜霍。

加拿太拔爾撒謨ノ如シ。○胸肺諸病。喘急効嗽。勞効。

吐血ニ用ヒ肺管ニ泛滿セル粘稠液ヲ消化シ酷厲

液ヲ緩解シ痰ヲ疏豁ス。外敷ノ創ヲ愈スニ奇効ア

リ。但筋肉多キ部ノ打撲傷ハ効ナシ。又纖維弛弱ノ

潰瘍ヲ治シ顔面小胞ヲ消シ皮膚ヲ滑澤ス。然レ此

藥起熱衝動スル故ニ焮衝ノ症ハ是ヲ禁ス。又腎膀

朮ノ潰瘍ニハ甚ク害アリ○此拔爾撒謨ハ近來用
 ルコト少ナシ。是真品ハ罕ニメ下品多ク。且格拜霍亭露
 篤露加拿太等皆真品ヲ輸シ性効モ亦優多ナレハ
 ナリ○此樹實ヲ「カルポバルセム」ト名ケ販ク稍拔
 爾撒謨ノ効アリ又蝮蛇等毒蟲刺咬ヲ治ス其大腕
 豆ノ如ク末尖リ小梗アリ外面四條理アリ初綠熟
 スレハ赭色。皺縮シ裏白色ノ仁アリ味辛。佳香拔爾
 撒謨ノ如シ○此樹ヲ「キセイロバルセム」ト名ク。細
 ク皮粗糙灰色。中心白色然レ焚セハ佳香アリ

遠西醫方名物考補遺卷四終

此ノ漬瘍ニハ甚ク害アリ○此拔爾撒謀ハ近來凡
 ル下劣ニ是眞品ハ罕ニ下品多ク且格洋貨家
 萬露加拿太等皆眞品ヲ輸シ性効モ亦優多ナレハ
 ナリ○此樹實ヲ「カルボニルセムト」名ク販ク稍拔
 爾撒謀ノ効アリ又嫩葉等毒蟲刺咬ヲ治ス其大宛
 豆ノ如ク末夫リ小枝外西四條理アリ初綠熟
 スレハ新色嫩緑ニ裏白色ノ仁アリ味辛佳香拔
 撒謀ノ効○此樹ヲ「キニイロバルセムト」名ク
 久皮粗脆灰色中心白色然モ葉々ハ佳香アリ園
 遠西醫方名物考補遺卷四終

遠西醫方名物考補遺標目

卷五

地蘭

刺答尼豆

此豆ノ實ハ長ク細ク
 形如豆ノ實ニ似テ
 然レモ實ニハ硬ク
 食ハズシテ藥用ナリ
 其効ハ皮膚癩癬
 疥癩等症ヲ治ス
 其法ハ豆ノ實ヲ
 水ニ浸シテ乾カセ
 粉ニシテ患處ニ
 塗ルニシテ之ヲ
 治ス

遠西醫方名物考補遺標目

卷五

地膽

地膽消毒飲

刺答尼亞

驅熱散

姜橙糕

龍酸飲

健胃飲

香竄飲

龍腦飲

鹹蓬丸

健胃飲

丁幾劑

香竄飲

收飲

海葱飲

煎劑

固腸飲

收飲

越幾斯劑

收飲

浸劑

附收瀉藥說

單收瀉藥 揮發收瀉藥

名物考補遺

卷五

標目

風雲堂藏

收瀋藥性功總說

百屈林

傑臘弗魯伊

傑臘弗魯伊 驅蟲草丸

傑臘弗魯伊 越幾斯劑

傑臘弗魯伊 丁幾劑

太那設點謨

驅蟲膏

太那設點謨油

伊里斯弗魯連底那

蘇格爾需謨

麻爾羅歌

麻爾羅歌 越幾斯劑

遠西醫方名物考補遺卷五

榛齋先生譯述

男 宇田川 榕 榕 菴 校 補

地膽

「ツチハンメウ」俗「メロエ・プロ・スカラ」
「パイウス」羅「マイタルム」
「メイタルム」蘭

芫菁ノ一種ナリ翅ナク甲半被フ。二種アリ一種ハ

淡青蓮色一種ハ背赤色

按ニ本草綱目啓蒙ニ云地膽
山中土丹或原野石間ニ居

四時、出行ク長サ一寸餘潤リ三此蟲人手ニ觸

脚節ヨリ臭氣アル黄色油様ノ脂液出テ粘著ス

地膽ノ性効多ク此液ニ在リ故ニ是ヲ失テル為ニ

箸ニテ夾捕紙ニ包キ乾シ頭脚等ヲ去リ貯フ

〔試効〕此蟲大毒アリ性効荒菁ト同、ノ微緩弱ナリ過服スレハ劇キ腹痛、胃腸焮衝吐血下血ヲ發シ特腎膀胱尿道ヲ刺戟ノ劇キ焮衝小便閉、尿血等ノ危症ヲ發シ或死ス○一男兒六歲此蟲一個ヲ燒酒ニテ吞下ス少間ノ大腹痛煩躁搗搦、衄血尿血下血、血汗ヲ發メ斃ル○然、氏服量些少ニ用レハ經久廢癩ノ病患急劇危篤ノ諸症ニ奇効ヲ得ルト多シ○此藥溶解稀釋ノ峻効アル故ニ痛風、脚痛、腰髓痛、歷節遊走痛等、經久頑滯ノ症、結石腎痛ニ俾効アリ○水腫小便閉ニ驅水ノ駛効アルト荒菁ノ如シ○此蟲ヲ

醋ニ投シ或蜜ニ浸メ殺シ乾シ頭甲脚ヲ去リ極細末トシ初半氏許ヲ取テ舍利別等ニ和シ毎日前説ノ諸病ニ用ヒ漸次ニ服量ヲ增加、小便焮痛頻數努責ノ稠濁ノ粘液ヲ雜へ通スルニ至テ休ム、尚驗ナキ片ハ又前法ノ如ク用テ治スルニ至ル或云此末ヲ四氏マテ舍利別ニ和シ用レハ右ノ諸症ヲ發メ小便ニ夥ク粘液ヲ通スルト大抵七八時許、病ノ輕重ニ隨ヒ右ノ如ク用テ六次若ハ十二次ニメ全治スルニ至ル○狂犬咬傷ニ奇効アリ患人ノ年齢ニ隨ヒ此蟲一個ノ八分一ヨリ半分マテ一服トシ半

時毎ニ與テ尿血ヲ發スルニ至ル。其創ハ鉞針ニテ刻截ノ毎日水銀膏ヲ擦スヘシ鉞針ヲ恐ル者ハ頻ニ荒菁末ヲ摻ノ潰破セシムヘシ此ニ由テ危險ノ症ヲ救フ勝テ算ヘ難シ○或云此蟲ノ細末大人ハ一匁半ヨリ二匁マテ消石一倍若ハ三四倍ヲ加テ小便焮痛不利ヲ發スルキハ亞刺比亞護謨ヲ加テ二時若ハ三時毎ニ用ヒ。小便血縷ヲ見スニ至レハ消石ヲ去テ此末一味前法ノ如ク用フ其創ハ數荒菁末ヲ摻ノ潰爛セシメ三週許モ瘡スヲナキヲ所要トス。是ニ由テ危險瀕死ノ症ヲ救活ス○或云此

蟲ヲ蜜ニ浸ノ殺シタルヲ一味用フ他藥ヲ加ルヨリハ功驗著實ナリ○狂犬傷ニ因テ恐水。搐掣ノ症ヲ發スル者ハ左ノ劑ヲ與テ汗ヲ發シ小便ヲ利シ其毒ヲ驅泄ノ治ス。又前說ノ痛風ニ殊効アリ

地膽消毒飲

地膽 八個

龍腦 一錢

鹿角揮發塩

名或硝砂華

二錢

的里亞加 四錢

民埜列利精 八錢

右調和シ二匙宛與ル一日兩次。此服量ニテ小便焮痛ヲ發セス然レ既ニ恐水ノ症ヲ發シ患者總テ飲

液ヲ見テ驚怖シ毫毛飲ムヲ能ハサル者ハ劑中ノ
民埤列利精ヲ去更接骨花傑列乙鏡四錢ヲ加テ煉
膏トシ分テ十六服トシ早朝ト夜分ト一服宛與フ
ヘシ○往年狂犬傷ヲ被ル者十五人其中十二人ハ
初ヨリ右ノ療法ヲ施ノ皆全愈ス二人ハ當時患症
ナキ故ニ自ラ怠忽ノ此藥ヲ用ヒス數週ノ後惡症
ヲ發シ死ス一人ハ數日ヲ經テ諸症崩發スル故ニ
大ニ危懼シ存リニ此藥ヲ服ノ全愈ス○四男子ハ
婦人齊ク狂犬傷ヲ被リ當時患症甚キヲ以テ治療
ヲ施サス然ルニ百二十日許ヲ經テ皆恐水ノ危症ヲ

發シ男子悶亂狂躁ノ死ス但婦人ハ此蟲ヲ蜜ニ研
和シ數服ノ回復セリ○二少年一婦人同時ニ狂犬
傷ヲ被ル此蟲ヲ取テ頭ヲ去リ各一個ヲ服ス共ニ
忽々眩ノ劇症ヲ發シ死ニ瀕シ然レ尿血ヲ發シ諸
症醒解シ爾後狂犬毒再發セス○一小兒十歲狂犬
傷ヲ被ル此蟲ヲ蜜ニ研和シ與テ劇キ腰痛ヲ發シ
小便終日頻數淋痛メ休マズ且油脂ノ如キ粘物及
血交ヲ通ス然レ其症漸々減シ爾後犬毒ノ患症再
發セス○此藥ヲ用テ渴甚キ者ハ接骨花ノ泡劑ヲ
與ヘ臥床ニ溫覆ノ微汗ヲ發シ且縞絆臥被ヲ更換

ナルヲ上品トス。水沸湯。燒酒等ニ浸シ若ハ水煎ス
 レハ赤色トナリ茜根ノ如シ。剝篤亞斯ヲ加レハ殷
 赤色トナル。綠礬名撒兒末ヲ加レハ黑色トナリ墨
 汁ニ用フ。漆匠是ヲ赤色ノ漆料トシ或赤葡萄酒ノ
 色ヲ出シ氣味ヲ醇厚ニス。水煎シ若ハ浸劑トシ貯
 レハ黑塗生ス。此塗亞爾箇兒及銳烈燒酒ニ浸ノ溶
 化セス華爾斯質見レス。或云銳烈燒酒ニ浸ノ丁幾
 華爾斯單寧及沒食酸共ニ出ヲ含ム。幾那ヨリ多シ。此
 收瀋質。香竄質ハ總テ保固強壯藥ノ基資トス。
 試効根ヲ藥用トス。收瀋苦味ノ保固強壯藥ニノ甚

夕幾那ニ近シ但幾那ニ比スレハ味佳ク胃ニ重滯
 セス。虛弱ノ諸症ニ長服ノ胃腸ノ消化力ヲ妨ケス
 間歇熱。諸脫泄。失血等ニ用テ効力幾那ニ優リ且健
 胃ノ効殊ニ多キ故ニ晚近。是ヲ以テ幾那代用ス。近
 來幾那ハ上品少ク或偽品アレハナリ。○凡強壯劑
 ヲ用ヘキ諸病。神經熱。腐敗熱。等ノ保固強壯藥ヲ與
 フヘキ症ハ服法製劑。幾那ノ如ク用テ燄衝ヲ増發
 セス。殊効ヲ奏ス。但藥力峻ナル故ニ幾那ニ比スレ
 ハ服量ヲ減スヘシ。大抵此末十五氏ト上好ノ幾那
 末二十氏ト對當ス。或云頑固ノ間歇熱ニ幾那末ニ

十氏宛用ル症ハ此末十五氏宛與テ驅熱ノ効。幾那ヨリ快捷ナリ。○間歇熱。其他往來發歇アル熱病ノ多ク幾那ヲ與テ驗ナキ症ニ此藥ヲ用テ每常治驗ヲ誤ルコトナシ。○間歇熱。傳染往來熱ハ後方ヲ與テ多ク治ス。○刺答尼亞驅熱散

刺答尼亞根細末 一匁

右分テ十六服トシ一時若ハ一時半毎ニ一服宛薄荷若ハ迷迭香ノ泡劑ニテ送下ス左ノ方亦良

刺答尼亞姜橙糕

刺答尼亞根細末 一匁

乾姜細末 一錢

刺答尼亞根

細末 一匁

乾姜

細末 一錢

橙皮舍利別

鏡 一匁

右煉和ノ糕トシ發熱ナキ時。半時毎ニ一茶匙若ハ肉豆蔻大ヲ服ス。○腐敗熱寒壞疽等。後方治驗多シ

刺答尼亞龍酸飲

刺答尼亞越幾斯劑

一錢半

龍腦飲

補 七匁

稀硫酸

即綠礬精 二錢

右調和シ二時毎ニ三匙宛服ス。○神經感觸甚キ諸症。神經病ノ頭痛。依剝昆垵利亞癩症等ノ神經病ハ後方秀偉ノ効ヲ稱ス

刺答尼亞龍腦飲

刺答尼亞越幾斯劑

龍腦飲

補 七 弓

揮發香竄精

名 二 錢

右調和シ二三匙宛與ル一日三次○一婦人生平病

弱一日モ全康ナシ此越幾斯劑一味長服ノ强健ニ

復ス○稟賦脆弱纖維弛緩ノ諸病ハ左ノ劑良効ア

胃腸虚弱ノ症ハ孕禁酒石名 第 三 錢ヲ加フ多汗

ノ症ハ香竄精ヲ去テ綠礬精二錢ヲ加フ茶湯

刺答尼亞香竄飲

刺答尼亞越幾斯劑

三 錢

蒸餾水 十二 弓

刺答尼亞香竄丁幾劑

一 弓

次 出

揮發香竄精

名 二 錢

右越幾斯劑ヲ水ニ溶シ丁幾劑香竄精ヲ加ハ一時

半或二時毎ニ二匙或三匙宛服ス○飲食消化ニ難

ク風氣痞滯或婦人無孕白帶下淋疾粘液漏泄或經

久潰瘍等ハ後方多ク驗アリ

刺答尼亞健胃飲

刺答尼亞越幾斯劑

一 錢 半

瀉利塩 名 二 錢

刺答尼亞丁幾劑

四 錢

蒸餾水 七 弓

右調和シ二時毎ニ二三匙宛服ス下利ス者瀉

利塩ヲ去ル。酸敗液。腺腫。痛風。兼平者ハ。瀉利塩ヲ去テ。蘇蓬塩二錢ヲ加フ。丸藥ヲ好ム者ハ。後方良

刺答尼亞蘇蓬丸

刺答尼亞越幾斯劑 一錢半 蘇蓬塩 半錢

葛縷子油 或茴香油 十五滴

右調和シ舍利別ヲ加テ三十九根共ニ丸宛服ス。此一日三次或三丸宛兩次服ス。胃虛弱ニ感觸甚キ症ハ此根ヲ浸劑トシ服メ尤良。散劑越幾斯劑ニ比スレハ消化シ易シ。體稟虛弱。飲食消化シ難ク痞氣苦滿。胃痛。胃瘕。大便滑泄。下利等。胃腸感動シ易

キ症ハ左ノ二方。苦味香竄收瀉ニノ効力。諸健胃劑ニ勝レリ

刺答尼亞香竄丁幾劑

刺答尼亞根 搗碎者 三弓 白桂 搗碎者 補二弓

燒酒 二比

右硝子壤ニ内レ浸ス。十日濾テ滓ヲ去リ。二三匙宛氷少許ヲ加ヘ服ス。一日三四次。水煎ニ式ニ式

刺答尼亞丁幾劑複方

刺答尼亞根 搗碎者 三弓 橙皮 黃搗碎者 三弓

攝爾扁答利亞 名 四錢

雜腹蘭

一錢

燒酒

再餉者
二比

右硝子燬ニ丹レ浸ス下十二日。濾シ貯ス。服法同前。

此劑効力峻ナル故ニ幾那丁幾劑複方鏡ニ比スレ

ニ服量ヲ減スヘシ。○胸水。腹水。肢節水腫ニ左ノ方

ヲ用テ衰弱ヲ強壯シ小便ヲ利シ總テ險重ノ水腫

ニ治驗多シ

刺答尼亞海葱飲

刺答尼亞越幾斯劑

二錢

海葱丁幾劑

一錢

甘消石精

名補

揮發香竄精

名各二錢

蒸餾水

名七

刺答尼亞香竄丁幾劑

前出四錢

右調和シ三匙宛服スル下日三四次。○尿道粘液漏

泄過多。淋瀝等ハ此越幾斯劑殊効アリ。○尿崩ハ後

方屢良驗ヲ稱ス

刺答尼亞收斂飲

刺答尼亞越幾斯劑

一錢
消石精三錢

刺答尼亞香竄丁幾劑

前出四錢

蒸餾水

七

右調和シ二三匙宛服スル下日ニ數次。○經久下利
滑泄等ハ左ノ劑ヲ用テ多ク治ス

刺答尼亞固腸飲

刺答尼亞越幾斯劑 一錢半

刺答尼亞香竄丁幾劑 六錢

蒸餾水 七考

右調和シ二時毎ニ一匙宛服ス○一僧尼久ク下利ヲ患ヒ諸藥驗ナク虚羸ノ甚夕危險ニ至ル此越幾斯劑ヲ服メ下利漸ク止ミ回復ス○此藥血液ヲ收斂シ失血諸脫泄ヲ治スルヲ篤爾面室刺^名拳參根^鏡ニ勝リ殊ニ越幾斯劑トシ用^レハ効力諸植物ノ收斂藥ニ超絶ス○吐血ハ乳汁ヲ用^テ血ノ酷厲

毒ヲ和解ノ血脉ヲ刺破セサラシメ且滋養ス但咽喉潰瘍或聲啞ヲ兼ル症ハ刺答尼亞ヲ用ヒ乳汁ヲ多服ノ尤効アリ此越幾斯劑ハ殊ニ斂血ノ峻効アリ左ニ一二ノ治驗ヲ舉ク○一少年十二歳夥ク口鼻ヨリ失血シ衆藥驗ナク連綿ニ晝夜精力極テ虚脱シ又劇ク嘔吐シ危篤ニノ死ニ瀕シ乃此越幾斯劑一錢ヲ取テ水ニ弓ニ溶シ蒸餾醋少許ヲ滴シ加^レハ其血頓ニ止ミ三日中ニ平復ス○一坊賈ノ婢月經延綿止マサル一既ニ二年發熱ノ虚憊シ肢體極テ羸瘦シ傍人ノ扶掖ニ非^レハ舉動スル一能

ハス食進スス諸藥驗ナク衆醫不治トス乃此越幾斯劑一錢ヲ與テ經血稍減ス第三日又半錢ヲ與テ逾輕差シ稍食ス第六日又半錢ヲ與ヘ第九日杖ニ倚テ歩行シ以後右ノ如ク此劑ヲ與テ熱解シ食進ミ一月許ニメ回復ス○一婦人崩漏劇クメ止サルト八日大ニ虛憊ス阿芙蓉等斂血ノ諸劑微功ヲ得ス因テ此越幾斯劑前法ノ如ク一服與テ崩血止ミ翌日患婦能ク歩行シ第五日ニメ全治シ以後康健ナリ○產婦脫血赤白帶下嘔血創傷出血等治驗甚タ多シ失血疼痛ヲ兼ル者ハ其血止メハ疼亦治ス

屢試ルニ脫血ニ因テ攣急痛ヲ發スル者多シ○諸脫泄失血劇クメ渴アリ多ク飲液ヲ服スル症ハ後方良効アリ○

刺答尼亞潤涼飲

刺答尼亞越幾斯劑 未

芒消 一錢 醋 一錢

右越幾斯劑ニ芒消ヲ和シ文火ニテ溶解シ醋ヲ加一服トス○此越幾斯劑ハ華爾斯質ニ非ヌメ苦味ヲ帶ヒ健胃ノ効幾那ノ如クメ收滯スル故ニ血竭ヲ用ル諸症ニ丹服外敷シ斯ノ如キ護華爾斯ノ

諸藥ニ勝リテ良効ヲ奏ス。又收瀉藥ノ害アル諸症
 モ是ヲ用テ害ナシ凡、歛血藥中此劑ノ如キ過誤ナ
 ク峻効アル者。植物中比スヘキ者ナシ。從來醫家此
 劑ヲ諸失血ニ質驗シ殊効ヲ得ル者既ニ八百餘人
 然ハ是ヲ用テ驗ナキ者ハ恐クハ服量一錢ニ足ラ
 サルナリ

越幾斯劑 **服量** 大抵半錢ヨリ二錢マテ香竄ノ露水
 ニ溶シ用フ○或云十二歳以上ノ者ハ一乃ヨリ二
 乃ニ至ル。大人ハ半錢ヨリ一錢マテ水少許ニテ送
 下ス。或丸藥トシ五氏ヨリ十氏マテ日ニ兩次服ス○

失血ハ水若ハ玫瑰水鏡ニ溶シ每服越栗失爾楮篤
 立沃利名或蒸餾醋十滴ヨリ二十滴マテ加用フ○
 失血諸脱泄ハ一錢ヲ一服トシ速ニ止ム。効ナキ者
 ハ再服ス。三服用ル者稀ナリ。少許宛數用レハ捷効
 ナシ或一服用ヒ治メ後再發ヲ防ク爲ニ一服若ハ
 其餘モ用ルヲアリ吐血メ効ヲ兼ル症ハ間再服ス
 ○或失血止テ後。此劑毎朝一錢宛二日與ハ翌朝ハ
 半錢ヲ與ヘ其後ハ一錢ノ四分一宛與テ再發ヲ防
 ク者アリ。此劑久服スレモ毫モ害ナシ。一男子外傷
 ニ因テ吐血シ此劑ヲ與ヘ治メ後。四個月服メ毫モ

妨害ナシ。○脱血。頑固ノ諸脱泄劇クノ止サル症ハ
 此劑三錢ヲ一服トシ與ル。一アリ此類ノ劇症ハ煎
 劑泡劑ニテ速効ナシ。○此根ノ効力ハ專ラ其皮ニ
 在リ中心木様ノ質ハ効ナシ故ニ全根ニ錢ヲ煎劑
 泡劑散劑トスレハ皮一錢ノ効アリ。皮一錢ヲ用レ
 ハ越幾斯劑半錢ノ効アリ。然レハ全根ノ煎劑泡劑散
 劑ハ越幾斯劑四分一ノ効アリト知ルヘシ。○嘔吐
 アル症ハ越幾斯劑一錢ニ水ヲ濕ノ丸藥トシ一服
 トス味ナクノ服シ易シ。

越幾斯劑製法 健質亞那越幾斯劑 名ト同シ 濕

又法根ヲ採リ洗剉シ冷水ニ浸ス一夜磁鍋ニ付レ
 火ニ上セ煮テ濃赤色トナルニ至リ濾テ液ヲ取り
 又其滓ニ水ヲ加ヘ煮テ赤色出ルニ至リ濾テ前液
 ト合シ毛布ヲ重子テ濾シ火ニ上セ煎熬ノ稀蜜ノ
 稠トシ是ヲ盤ニ寫シ大陽ニ暴シ乾固メ破碎スヘ
 キニ至レハ上好ノ盧會ノ如ク明淨透亮ニノ硝子
 ノ如ク殷赤色上好ノ血竭ノ如シ故ニ間血竭ト紛
 錯ス。然レ血竭ニ比スレハ疏脆ニメ苦味ヲ帶ヒ甚
 收斂ノ齒ニ粘著セス火ニ投スレハ熔ケスメ焚燒
 シ華爾斯ノ臭ナキヲ以テ是ヲ辨スヘシ。○生根ニ

テ製スレハ塩質速ニ水ニ融解シ。久ク火力ヲ假ラス
 ノ藥氣出ツ。乾根ニ比スレハ効力峻ナリ。乾根ニテ
 製スレハ時ヲ費シ精細ニ注意セサレハ透亮光潔
 美赤色トナラス或久ク煎熬スレハ炭素焦質ヲ生
 ノ透亮ナラス性効脱失ス或急煎スレハ亦焦質生
 ノ赭黒トナリ或鍍器ヲ用レハ此根ヲ没食酸鍍氣
 ト抱合メ黒色トナル。此劑ヲ製スルニハ水六倍
 宛加テ前法ノ如ク兩次煮ルヲ佳トス數回煎熬
 或過半煮減スレハ塩質收瀋苦味多ク脱効力劣
 弱ニノ多服セサレハ驗ナシ。此劑燒酒ニハ最多

ク溶化ス蒸餾水ハ是ニ次ク醋ハ又是ニ次ク但此
 三種ノ液モ熱スレハ尤多ク溶化ス。沸湯ハ殊ニ多
 ク溶化シ効力亦多シ。散劑。浸劑。煎劑。丁幾劑モ亦
 用テ多ク良効ヲ稱ス。刺答尼亞散劑。乾根ヲ破碎シ中心ノ木質ヲ去リ極
 細末トシ三錢ヲ一服トス或十氏ヨリ一月若ハ半
 錢マテ日數次服ス。刺答尼亞浸劑。乾根一弓。沸湯一斤。浸ス。十二時級
 布ニテ濾シ滓ヲ去リ一盞宛服ス。失血諸脱泄ノ
 劇症ハ左ノ煎劑亦捷効アリ。

刺答尼亞煎劑 此根四錢ヲ取り水二比ヲ加ヘ煮減

ノ半比トシ濾テ滓ヲ去リ醋二錢ヲ加ヘ一服トス

緩症ハ分テ二三服トス。或沙糖四錢ヲ加甘味トシ

與フ也日對大煎久ク煎スルニ好シ

刺答尼亞丁幾劑

刺答尼亞根

搗碎者煎酒ニ比

右硝子壘ニ内レ蓋封シ浸ス一八日。濾テ滓ヲ去リ貯

刺答尼亞收斂丁幾劑

一名刺答尼亞精

刺答尼亞越幾斯劑

四錢

燒酒

四馬

蒸餾醋

八馬

燒酒

四馬

燒酒

四馬

燒酒

右調和シ小頸硝子壘ニ内レ蓋封シ煖處ニ置キ浸

一三日。濾テ滓ヲ去リ固封シ貯フ。口中斷顎ノ潰

瘍腐爛ヲ治シ齒牙弛動ヲ強固スルニ此越幾斯劑

ヲ水ニ溶メ含漱シ或此根ノ細末ヲ摻メ速効アリ

此藥ハ諸器血脉ノ緩弛ヲ收固スレハナリ。齒斷

腐爛ヲ治シ齒ヲ淨潔強固スルニ前說ノ丁幾劑ニ

方共ニ口中ニ含テ殊効アリ又左ノ漱劑ヲ用テ良

是ヲ以テ沒藥丁幾劑ニ代用ス。此藥ハ味苦

刺答尼亞漱方

此藥ハ味苦

刺答尼亞越幾斯劑

四錢

蒸餾水

十馬

醋 二弓

右越幾斯劑ヲ水ニ加ヘ火ニ上セ溶化ノ醋ヲ攪和
 シ一匙宛口中ニ含ム日數次○此根ノ細末收斂
 ノ美赤色ナルヲ以テ措齒藥ト云或乾根ヲ牙杖ト
 シ齒ヲ措テ強固淨潔ニススハニ齒痛ノ下幾種ニ
 外敷纖維弛弱經久潰瘍水棉樣腫失苟兒陪苦齒斷
 腐爛出血等ニ外敷メ治外○產婦脫血月經崩漏痔
 血過多ニ後方ヲ患處ニ擦メ速効アリ此強幾種
 「刺答尼亞收斂擦方固捷」○口中腫脹ノ竟
 古刺答尼亞越幾斯劑 三弓 蓋鉛粉 二弓 置

明礬 四錢

右極細末トシ研合ノ左ノ藥ヲ加メ膏者藥トシ

玫瑰油 名 一匙半 的列竝底那 名 二弓

蜜蠟 三弓

右文火ニ熔シ火ヲ下シ刺答尼亞鉛粉明礬ノ末ヲ
 加ヘ手ヲ住メス攪和シ冷ルニ至ル○刺絡或水蛭
 貼シ或齒ヲ拔テ出血止サル症ハ此越幾斯劑ニ
 根ノ末ヲ研和シ其痕ニ貼シ暫ク壓定スレハ出血
 即チ止ム 依福 呂利 涅

收瀋藥 按ニ刺答尼亞吉訶薺謨等ハ收瀋藥ニ屬

又此藥類ヲ統括ノ三種ニ分ツ左ノ如シ

單收瀉藥 此藥類ハ收瀉質尤居多シ植物ハ槲皮。沒

食子。阿煎藥。拳參 鏡共 篤爾面室刺 名 刺答尼亞。吉訶護

謨 補共 山物ハ硫酸。消酸 精消 石鹽酸。蘇魯林。蘇魯林。曹達

蘇魯林。加爾幾。明礬。鉛糖。密陀僧。動物ハ磷酸 名共 補等

揮發收瀉藥 收瀉質ニ苦味質。揮發油ヲ含メリ故ニ

稍脉管。神經ヲ衝動ノ收瀉スヘキ症ニ用フ即チ水

楊梅根。玫瑰花 鏡 撒爾非亞 名 等ノ如シ

苦味收瀉藥 保固強壯藥中ニ舉ル收瀉苦味藥ナリ

即チ楊皮。七葉樹皮。幾那 鏡共 烏霍烏爾失 補 等ナリ

收瀉藥性功總說 植物ノ收瀉質ハ沒食酸 他沒食子其

味收瀉ノ草木 類ニ含ム 酸性 **及單寧** 原名ロイ ヲ以テ基資トス 此

物ハ草木收瀉ノ性味ヲ成ス者ナリ ○收瀉藥ハ脉管

筋膜等總テ柔軟ノ纖維ヲ收固牽縮ノ強硬ナラシ

ム。是ニ因テ生力憤起ノ諸器ノ張力増發ス故ニ諸

管纖維弛緩虛弱ヨリ發スル諸病或精力脫缺諸器

虛損ノ發スル吐血。嘔吐。尿血。下血。婦人崩漏。白帶下。

遺精。尿崩。遷延下利等或神經熱。腐敗熱。胃腸熱等ノ

病毒汚物ヲ驅除ノ後尚飲食消化ノ機カアル症ヲ

治ス。又間歇熱ハ是ヲ以テ一奇藥トス。或諸筋及神

經ノ虚脆罷弱ヨリ發スル搐掣痙攣ノ諸症。或諸腺
 病痙攣結腫等 尙儂病及瘦削消耗病ヲ防キ治スルニ用
 フ○多血壯實ノ焮衝病ハ此藥害アリ。然レ遷延病
 トナリ發熱疼痛學急等ノ症ナク虚憊ノ諸竅ノ排
 泄過多ナル症。或傷冷毒ノ遷延胸肺病效嗽喘急等 虚罷
 ノ痰唾過多ノ症及遷延ノ焮腫眼ニ効アリ諸失血
 運行過盛多血ノ症。或其宿疾トナリ時々發スル症。
 或失血ニ因テ病毒分利スル症。其他諸般ノ漏泄經
 久ニノ宿疾トナリ是ヨリ病毒分利スル症ハ脱泄
 過多ニ非レハ此藥ヲ禁ス。或腹内諸器頑固ノ壅塞

アル症亦是ヲ禁ス○外敷ノ諸脱泄。失血。纖維弛虚
 ノ潰瘍。子宮。腔ノ墜脱。脱肛。動脈。癆。屈。靜脈。腫ヲ治
 ス○凡收瀉藥ハ酸化金屬後出諸鍍劑。剝篤亞斯。石灰。
 膠類。雞子白等ト合シ用レハ收斂質ノ性効脱失

百屈林

「ハバ。ペ。キ。リ。ム。レ。ペ。キ。リ。ス。レ。ビ。キ。リ。ム。レ。ビ。キ。リ。ム。レ。テ。ト。ラ。ン。テ。ヘ。ラ。ビ。キ。リ。ム。レ。ビ。キ。リ。ム。レ。シ。レ。ビ。キ。リ。ム。レ。セ。ボ。ー。子。ン。ル。ヘ。ル。ム。レ。ラ。シ。リ。セ。ボ。ー。子。ン。ル。ヘ。ル。ム。レ。」

形状

ラウリス。スペキリムト名ク。ル樹ノ子仁ナリ。花

雄蕊。一雌蕊。第一目。形扁圓ニメ長大殆ト一拵横徑。或云
 九網第一目。形扁圓ニメ長大殆ト一拵横徑。或云
 一拵半横徑許。厚廿一分許。一面ハ圓ク隆起シ一面
 潤一拵横徑

ハ窪凹或云大ナル扁桃ヲ滑澤ニシテ重シ。外面薄皮被ヒ微皺アリ。赭色。裏淡灰色。硬固ニシテ織條質ナラス。肉豆蔻ヲ破碎スルカ如シ。嚼テ柔脆。氣味香竄ニシテ肉豆蔻ト薩撒弗刺斯ヲ混スルカ如シ。此仁一匕ヲ搾レハ油一弓半許出ツ。白色。乳酪ノ如ク香氣薩撒弗刺斯ノ如シ。○偽品アリ眞品ニ比スレハ半大ニシテ外面皺アリ淡白色。香氣微ニシテ苦味多シ。○此樹巴辣歪伯西兒共ニ南亞墨利ヨリ輸ス試効揮發衝動藥トス。薩撒弗刺斯ノ如キ香竄質アリテ甚ク健胃ノ効ヲ稱ス。胃虛及酸敗液ヨリ發ス

ル胃痛ヲ治ス。○遷延下利ノ閉止ノ害ナキ症ハ是ヲ用テ殊効アリ。赤痢ハ胃腸ヲ淨刷ノ後是ヲ用テ多ク治ス。○疝腹痛及虛弱ヨリ發スル白帶下ノ甚キ症ニ散劑トシ用テ經驗ノ一藥トス。○凡香竄藥ノ効アル諸症ニ的當ス。散劑トシ一錢ヨリ漸ク加テ三錢ニ至ル。或半錢ヲ一服トシ日數次用。燒酒等ニ浸シ用テ殊ニ効アリ。
依華福 溼拔

形狀南亞墨利加洲ノ須里那模地名ニ産スル樹皮ナ

リ其葉長楕滑澤鋸齒ナク皂葉狀ニノ十五對許莖

枝ニ排列ス。葉本ニ曇黄色ノ蛾形花稠穂ヲ爲シ長

サ三四寸許萼五出短梗アリ嫌フヘキ臭氣散漫ス。

十雄蕊分レテ一雌蕊ヲ抱ク第十七目花後卵圓形

ノ核果梅李類ヲ結フ。黄綠色扁桃ニ似テ毛茸アリ。肉

微黄色軟ニメ微甘嫌フヘキ臭アリ核扁圓裏白仁

アリ味收瀼○幹及大枝ノ皮ヲ取ル。濶大或云長短濶狹齊カ

スニメ厚ク或云厚薄一様ナラス外面灰色ニメ薄キ苔被ヒ

其下ニ帶黑赭色ノ膚皮アリ。皮質ハ柔靱纖維緻密

ニメ曇赭帶黑色裏面鏽黄色香氣微ナリ。新皮ハ嫌

ヘキ臭アリ味微苦ニメ簽ヲ帶フ。久ク嚼ミ含メハ

苦味多シ久ク貯レハ氣味共ニ消散ス○一種牙埋

加北亞墨利加洲ノ島名ノ傑ダ臘フ魯コ伊イアリ。外面灰赭色ニメ

綠黄色ノ條理アリ。裏面黄色味苦簽ニメ甘ヲ帶ヒ

粘テ臭氣アリ是須里那模ノ樹ト種類異ナリ。殺蟲

ノ効アレ氏用ルヲ稀ナリ○陳久ノ者ハ氣味脱メ

効ナシ或此皮ニ似タル葛斯加栗刺ノ種類ヲ以テ

偽リ販ク者アリ。是ヲ用レハ甚夕害アリ宜ク審ニ

新鮮ノ眞品ヲ擇ムヘシ

名物考補遺

卷五

風雲堂

試効 此皮殺蟲ノ奇効アリ殊ニ蛇蟲ヲ殺シ驅泄ス
 蟻蟲條蟲モ亦効アリ○此藥峻下ノ効ナシ故ニ時
 々下劑ヲ兼用スヘシ○此越幾斯劑ヲ丸藥トシ十
 五氏マテ一服トシ或對症ノ劑ニ加用フ○蟲ヲ驅
 泄スルニ左ノ如ク製シ用テ治驗多シ

傑臘弗驅蟲飲

傑臘弗魯伊 燒酒 水

右調和シ文火ニ煮テ殆半ヲ減シ滓ヲ去リ初日ハ
 半時毎ニ二勺宛服スル一日三次大抵大便三次通

ス翌日用ルヲ右ノ如クメ吐シ若ハ粘液ヲ下ス第
 三日ハ半時毎ニ一茶碗宛服ス吐下ノ蟲及粘液ヲ
 驅出ス第四日ニ藥刺巴ト加羅蔑兒ヲ與レハ殘餘
 ノ蟲ト粘液ヲ通泄ス是ニ由テ頑固ノ蟲症ヲ治ス
 ○此藥ニ他ノ殺蟲藥ヲ加テ丸劑トシ用テ驅蟲ノ
 殊効アリ喻ハ後方ノ如シ

傑臘弗續草丸

傑臘弗魯伊末

續草根末

各三錢

乾白撒兒末爾扶斯

一錢

健質亞那越幾斯劑

名

二月

右研和ノ三氏ヲ一九トシ甘草末ヲ衣トシ一時半
毎ニ四九尚其症ニ隨ヒ増加シ用フ

服量散劑トシ小兒ハ五氏ヨリ十氏マテ一服トシ

大人ハ一乃若ハ半錢宛用フ。此藥動スレハ惡心嘔

吐ヲ發スル故ニ初少許宛用ヒ漸ク加ヘシ或云漸

惡心嘔噦發スルカ度トス散劑ヲ用テ瀉下スル者アリ○煎劑

ハ此皮一弓。水八弓ニ煮テ用フ。浸劑亦効多シ○丁

幾劑ハ四十滴ヨリ八十滴ニ至ル。能蟲ヲ殺ス

傑臘弗魯伊越幾斯劑製法健質亞那越幾斯劑名ト

同シ注此皮八弓ヲ以テ越幾斯劑六錢餘出ツ。味苦

發收瀋衣ニ收盡ル。味苦。○

傑臘弗魯伊丁幾劑注

製法此傑臘弗魯伊鴨碎者三燒酒二十度者

右硝子壘ニ存ル固封罈爐邊ニ置テ六日濾テ渣ヲ

去リ聽用ス注拔注依注木棘之酸漿注平注八注羅

太那設黠謨注タルムセ注タルムセ注タルムセ注タルムセ注

形狀此草圓莖二三尺許直生多枝硬固無以毛茸

リ。葉太ニ長ク芥葉狀。莖生ニ深ク缺裂。邊鋸齒

下以黯綠或云黃滑澤。臭氣甚。味苦ク稍香竄樣。莖

下以黯綠或云黃滑澤。臭氣甚。味苦ク稍香竄樣。莖

枝頭二扁圓鱗狀以蒼萼生之筒樣者小黃花或稀ニ

リ攢簇ノ複花ヲ爲ス辦端三叉五雄蕊連匝之雌

蕊ヲ圍ム第十九目細莖頭分テ織成爲區佳好ノ苦味

アリ。花後細長ノ子生シ微勾深窪白毛アリ。此子多

ク揮發油ヲ含ミ香竄様ニメ不佳ノ氣アリ味辛苦。

熟スルハ黑色トナル。根木様多鬚。歷年枯レズ。歐羅

巴洲諸國ニ生ス。蒸餾スルハ苦味精微ノ油出リ。

此草六比ヲ以テ越幾斯劑二三得製ス。

試効花穂子ヲ藥用トス。性刺戟衝動メ殺蟲ノ峻効

アリ。子殊ニ虻蟲ヲ殺シ攝絲施那名ノ如シ○温煖

開達。健胃。止痛。防腐。驅熱。破氣ノ効アリ。尿道ヲ淨刷

シ小便ヲ利シ汗ヲ發ス。○水煎テ服メ水腫ヲ治ス

月經ヲ通ス。○間歇往來熱。粘液腫。萎黃病。處女病。依

糾昆^{ボコシ}_ニ^デ兒。黃疸。傷冷毒痛ヲ治ス。○子ヲ採リ細末或

浸劑。煉膏トシテ用テ虻蟲ヲ殺シ是ヨリ發スル搐掣

様ノ諸症ヲ治ス。或吉利詞^{キリ}參兒^シトシテ施メ良

服量花穂ヲ散劑トシ一カヨリ二錢ニテ一服トス。

或二三氏ヨリ一錢ヲ一服トシ日ニ三服用フ。或泡劑

若ハ煎劑トス。○浸劑ハ四錢ヲ取リ水六馬或ハ馬

ニ浸シ滓ヲ去リ服ス。○太那設^{タナセ}點^テ謨^ム油ハ丹服外敷

共六蟲症ニ奇効アリ。二滴ヨリ五滴迄テ飲液ニ點

服ス。外敷ハ適宜又軟膏ニ研和ス。○左ノ軟膏ヲ腹

部ニ擦テ驅蟲ノ峻効アリ。○此ノ眼腫ハ

驅蟲軟膏精煉ノ油ニテ製法薄荷油製法同シ女麻外

新牛膽ハ右驗勿各茶亞者味辛苦

太那設黠謨油製法薄荷油製法同シ女麻外

右研和ノ軟膏トス。混合ノ末也。

太那設黠謨油製法薄荷油製法同シ女麻外

○此草ヲ燒酒ニテ蒸餾ノ精ヲ取り傷冷毒痛ニ丹

服外敷ノ偉効ヲ稱ス。○此葉ニ牛膽ヲ加テ研和シ

臍ニ貼メ蟲ヲ下ス。葉ノ煎劑一二匙宛兼用メ尤良

○琶布トシ外敷メ寒腫ヲ消散シ肢節閃挫轉筋強

硬及傷冷毒痛ヲ治ス。澤拔叔瀨國

伊里斯弗魯連底那羅イレスフロレンテインセリス蘭

形狀此草數葉叢生シ。長狹片ノ末尖綠色。葉間長莖

ヲ抽キ。莖頭ニ花ヲ開キ六瓣白色或黃色。每瓣互

外ニ勾屈ス。三雄蕊一雌蕊及黃色ノ鬚毛アリ。第

一網第花梗ナシ。○根塊節様ニテ差扁ク拊指大ニメ

固ク重シ。黠黃色ノ粗皮及鬚根ヲ削リ去テ乾シ輪

ス。外面白色。裏淡黃。微辛苦。香竄ニシテ。莖菜花ノ香氣アリ。多年枯レス。三年ヲ經テ根ヲ採ル。生根ハ辛辣。乾ケハ氣味減ス。○意太利亞。等歐羅巴洲ノ南地。殊ニ弗魯連底印地名ニ多ク培栽ス。○蒸餾ノ佳香。露水ヲ取ル。精微竄透ノ油少許。浮ミ膜様トナル。是草

試効 根ヲ用フ。生根ハ瀉下ス。乾根ハ鑽透稀釋。疏解淨刷ノ効アリ。豁痰藥トス。殊ニ粘痰多キ。效嗽喘急等ノ肺病。經久ノ胃寒。效ニ用テ粘液ヲ稀釋シ。吐痰ヲ進メ。小便ヲ利ス。但焮衝病ハ害アリ。○內藏粘液過多ノ症。殊ニ小兒。疫效ニ。此末四氏。一服トシ

用テ治ス。○小兒腹孿痛ニ制酸藥ヲ加ヘ煎劑トシ用テ良。○細末トシ沙糖ヲ和シ。或亞刺比亞。蘆謨漿ニ和シ。或和胸劑ノ舍利別ニ加ヘ。或硫黃華。甘草末ヲ加ヘ。或丸劑トシ用フ。○大人ハ一月ヨリ半錢ニ至ル。小兒ハ五六氏宛用フ。○汚穢ノ潰瘍。惡厲ノ疥癬ニ。此末ヲ外敷メ。膿ヲ排ヒ淨刷メ治ス。

蘇格爾需謨

「テウクソリウム。スコルダウム。羅」
「タートルローク」ガマシテル蘭

形狀 此草。方莖叢生。一二尺許。枝多シ。下莖ハ地ニ塌ス。葉橢圓。皺糙毛茸多ク柔ニシテ。灰白色。鋸齒刻缺ア

リ梗ナク莖ニ對生ス。生葉葱蒜臭アリ味苦シ乾ケ
 ハ臭氣消散ス。莖枝ノ葉本ニ二個若ハ四五個ノ小
 唇花攢生シ上唇ナク下唇ニ又。中辨長大。淡紅或淡
 紫青色。四雄蕊短ニハ一雌蕊アリ第十四綱
 第一目 萼筒様。短
 梗アリ花後四個ノ小裸子ヲ結フ。根鬚多シ經年枯
 レス原野濕地ニ生ス

試効 葉ヲ藥用トス揮發ノ油鹽ヲ含ミ鑽透稀釋收
 瀋防腐殺蟲發汗利尿通經ノ効ヲ稱ス○泡劑トシ
 服ノ病毒ヲ皮表ニ發越シ疫毒及痘瘡斑疹ヲ驅出
 ス○粘液ヲ淨刷シ痰ヲ豁シ肺瘍欬嗽等胸肺ノ諸

症ヲ治ス○下利ニ用テ腸ノ弛弱ヲ強壯ス効力撒
 爾非亞ニ似テ收瀋ノ効微ナリ○煎劑泡劑浸劑ト
 シ或丁幾劑トシ用フ

蘇格爾需謨丁幾劑

蘇格爾需謨越仙劑ト同シ

製法

蘇格爾需謨 乾葉 適宜 燒酒 二十度者 六倍

右硝子壘ニ存浸1六日。滓ヲ去リ固封シ貯フ○外
 敷ノ疼痛及腐敗ヲ過ル一良藥トシ又毒螫刺咬ヲ
 治ス。蒸溺藥トシ汚穢潰瘍ヲ淨刷シ琶布トシ貼メ
 疫腫ヲ消シ腐敗ヲ過メ寒壞疽ニ効ヲ稱ス

治 潤 依 依

麻爾羅歇

「ルム・ビム・ガレ」
「ルム・ビム・アル・ビム・アル・ドール」
「ルム・ビム・ガレ」
「ルム・ビム・アル・ビム・アル・ドール」
「ルム・ビム・ガレ」
「ルム・ビム・アル・ビム・アル・ドール」

形状 此草方莖叢生。一二尺許。數枝ヲ分子毛茸アリ

灰白色。葉橢圓皺糙。淡綠。背毛茸多ク白粉アル如シ。

邊鋸齒アリ莖枝ニ對生ス。葉本ニ筒樣ノ白唇花攢

生シ上唇分レ直立ス。四雄蕊_{短シハ}一雌蕊_{アリ}第_十綱

第一萼齒狀。毛茸アリ。梗ナシ花後差長キ粗糙ノ四

裸子ヲ結フ。鬚根多シ。花葉味苦。鹹ヲ帶ヒ香氣アリ

或云微麝_{アリ}原野路傍ニ生ス。經年枯レス

試効 葉花莖共ニ用。苦味竄透シ微收瀉ス。解凝ノ一

藥トシ腹藏ノ壅塞ヲ疏解ス。粘液ヲ稀釋シ汗ヲ

發シ小便ヲ利ス。粘痰多キ喘急。胸肺諸症ニ用テ

粘液膠痰ヲ疏解淨刷ス。胃寒欬嗽。勞欬吐血等ヲ

治ス。月經稀少及經閉ヲ通シ產婦ノ瘀血ヲ下ス

○內藏硬結腫。肝脾子宮ノ壅塞ヲ疏通シ子宮衝逆。

依_イ糾_ボ昆_コ垓_ゲ兒_ル。黃疸。胸脇痛ヲ治シ蛇蟲ヲ殺ス。越_エ幾_キ

斯_ス劑_ニトシ半_ハ刀_ヲヨリ一_ニ錢_ニ至_ル。或煎劑浸劑トス。○

外敷ノ疥癬ヲ治シ殊ニ乾癬禿瘡。侵蝕瘡。潰瘍ヲ治

ス。○琶布トシ貼ノ熱壞疽ヲ治シ婦人乳房結核硬

腫ヲ疏散ス

麻爾羅歇。越幾斯劑。莖葉ヲ以テ製ス。製法 健質亞那

越幾斯劑

名

ト同シ

叔華僕
依涅叔
依

① 慧市... ② 民... ③ 胃寒... ④ 婦... ⑤ 婦... ⑥ 婦... ⑦ 婦... ⑧ 婦... ⑨ 婦... ⑩ 婦... ⑪ 婦... ⑫ 婦... ⑬ 婦... ⑭ 婦... ⑮ 婦... ⑯ 婦... ⑰ 婦... ⑱ 婦... ⑲ 婦... ⑳ 婦... ㉑ 婦... ㉒ 婦... ㉓ 婦... ㉔ 婦... ㉕ 婦... ㉖ 婦... ㉗ 婦... ㉘ 婦... ㉙ 婦... ㉚ 婦... ㉛ 婦... ㉜ 婦... ㉝ 婦... ㉞ 婦... ㉟ 婦... ㊱ 婦... ㊲ 婦... ㊳ 婦... ㊴ 婦... ㊵ 婦... ㊶ 婦... ㊷ 婦... ㊸ 婦... ㊹ 婦... ㊺ 婦... ㊻ 婦... ㊼ 婦... ㊽ 婦... ㊾ 婦... ㊿ 婦...

遠西醫方名物考補遺卷五終

遠西醫方名物考補遺目錄

卷六

安質...

鹿...

氏...

龍...

耶...

沙...

斯...

經驗說... 治例

十則

遠西醫方名物考補遺標目

卷六

安質沒扭酒

鹿琥精

民埕列利精

龍腦飲

耶蔑斯驅熱散

沙別爾扶驅蟲油

斯必竭里亞

經驗說

十則

名物考補遺

卷六

標目

風雲堂藏

名物考補遺 卷六

斯必竭里亞驅蟲飲

歇爾拔斯屈謨

治例 四則

歇爾拔斯煎

坎百設水

老利兒結爾斯

老利兒結爾斯水

安質解凝化毒飲

卷六 解凝疏腺飲

遠西醫方名物考補遺卷六

遠西醫方名物考補遺卷六

榛齋先生譯述 男 宇田川榕 榕菴校補

安質沒扭酒 「ヒヌム、スチピア、五ムヒヌム、エメチクム」

製法 扶云安質沒扭酒ハ近來皆此方ヲ通用ス

韃爾答越默室 二十四日

葡萄酒 一北

右研和之硝子壘ニ收メ固封ニ貯ル 溼篤

試効 催吐發汗豁痰解凝ノ一良藥トス ○吐藥トス

ルニハ一匙ヲ服ス 粘液留液ヲ吐ニ蒸氣ヲ發傷

名物考補遺 卷六 風雲堂藏

冷毒ノ嗽衝ヲ解散ス。小兒ハ一茶匙宛。頗ニ與テ
 吐スルヲ度トス。○發汗劑。豁痰劑トスルニ於テ
 ヨリ一錢マテ一服トス。蒸氣及汗ヲ發シ痰ヲ豁シ。
 熱病或遷延病。冒寒傷冷毒等。蒸氣壅塞ヨリ發スル
 諸症。欬嗽。胸肺嗽衝様ノ症ヲ治ス。○劇キ欬嗽。胸脇
 嗽衝等ノ痰ヲ豁シ呼吸ヲ利シ蒸氣ヲ發メ嗽熱ヲ
 降鎮スルニ此藥ヲ後方ニ滴シ加テ殊効アリ。
 豁痰鎮嗽飲。欬嗽。胸脇嗽衝ノ諸症ヲ寛解ス。
 乙百加格安那末トス 亞刺比亞護末トス
 阿芙蓉液名 二十滴 屋施葩兒名 二与 四錢

扁桃乳或罌粟子乳
名 六与

右調和シ一時毎ニ二匙宛服ス。○嗽衝様ノ痛風。傷
 冷毒痛ハ安質沒扭酒三十滴。舍電阿芙蓉液名 十五
 滴ヲ合和シ毎夜臨卧ニ一盞ノ水ニ滴シ服メ捷効
 アリ。或云頑固ノ下利。乾効。傷冷毒痛ハ此劑ニ阿芙
 蓉液四分一ヲ加ヘ服メ治ス。○丹藏諸器ニ粘液壅
 塞セル症。肝脾腸間膜腺ノ閉塞。諸腺病。痛風。傷冷毒
 痛。頑固經久ノ瘡瘍等ハ此藥ヲ解凝劑トシ初少許
 宛服メ漸ク其量ヲ加ヘ惡心ヲ發スルニ至レハ服
 量ヲ減シ長服メ効アリ。或雙鸞菊。越幾斯劑名 朴窟

名物考補遺 卷六 風雲堂藏

名物考補遺 卷二、 風雲堂藏

福烏篤丁幾劑 扑窟福烏篤ノ華爾斯ヲ二十度ノ燒酒八倍ニ浸シ煖處ニ置テ六日渣ヲ

去リ阿芙蓉液等ニ加用フ ○頑固惡厲ノ皮病癩病

失苟兒陪苦ノ瘡瘍ハ此劑八滴ヨリ十滴ニテ榆皮

煎 一茶碗ニ加ヘ服スル一日三次敗血惡液ヲ排

除シ治ス ○壯熱炊衝性ノ熱病ハ効アレバ丹伏消

耗熱腐壞性ノ咽喉潰瘍ニハ大害アリ或劇ク下利

ノ虛脫セシム 服量 小兒ハ三四滴宛用ヒ大人ハ二

十滴ヨリ漸ク加ヘ惡心嘔吐スレハ服量ヲ減シ或

暫ク休ム 利 貳

鹿琥精

一名鹿琥漿 スピリトス コルヌセルヒソク
シナ左スシ羅 フルーイエンデバルンステーン
シイレアマ
モニアラ蘭

製法

琥珀鹽 一考

蒸餾水 八考

鹿角鹽 適宜

右硝子壘ニ蒸餾水ヲ入レ琥珀鹽ヲ加溶シ鹿角鹽

ヲ取テ少許宛加ヘ毫モ滾滓セサルヲ度トシ固封

シ微温處ニ置テ十二時其間時々壘ヲ振掉メ能飽

和セシメ滾動セサルニ至ル若シ琥珀鹽ノ酸性偏勝

ノ滾動スル片ハ鹿角鹽少許ヲ加ヘ鹿角鹽偏勝ノ

滾動スル片ハ琥珀鹽少許ヲ加テ毫モ滾動セサル

ニ至リ微温處ニ置テ能飽和セシメ濾テ其液ヲ取
リ固封シ貯フ 〔溼〕

又法 鹿角精 〔名〕 第二製法ノ劑 琥珀鹽 各適宜

右鹿角精ヲ磁鉢ニ入レ琥珀鹽少許宛加ヘ研和ノ

毫モ滾滓セサルヲ候ト是ヲ青紙前出及姜黃紙ニ滴

メ色微モ變セサルニ至リ濾テ硝子壺ニ付固封シ

貯フ 〔箋〕 琥珀鹽酸性偏勝スレハ青紙赤色トナル鹿

角亞兒加利鹽偏勝スレハ姜黃紙老虎色トナ
ル○姜黃紙ハ姜黃細末ヲ水ニ
和シ白紙ニ塗リ乾ス者ヲ云

試効 揮發衝動ノ生氣ヲ活潑シ神經感動甚キ諸症

ニ用テ鎮痙ノ奇効ヲ稱ス。痙攣搐掣ノ諸症ヲ降鎮

シ痙喘胸水等ノ痙攣ノ運動。寧急甚キ胃痛 胃痙 腹痛

失氣昏冒。子宮衝逆。脾病。心悸動。傷冷毒痛等ニ捷効

ヲ奏シ汗ヲ發シ小便ヲ利ス但焮衝病ニハ害アリ

服量 二十滴ヨリ六十滴マテ水或葡萄酒ニ點服ス

○此劑ハ亞兒加利鹽。硫酸。綠礬。油鹽。酸。海鹽。消石酸

精。消石磷酸。補酒石酸。酒石酸。英類。銹鹽。綠礬。升銹。鹽。等ヲ加服

スレハ性効脫失ス 〔家〕 〔箋〕

民埕列利精 〔ア〕 セタス。アムモニア。リグイ。ス。羅

試効 清澄ノ中和鹽液ニメ味辛。不佳。是ヲ服メ温覆

名物考補遺 卷二六 風雲堂藏

スレハ發汗シ否ラサレハ小便ヲ利ス○此劑一匙
 宛薄荷泡劑一盞ニ加ヘ服スルヲ日ニ二三度汗ヲ發
 シ熱ヲ解シ渴ヲ止ム○胃寒傷冷熱ノ初發或熱病
 ノ斑疹痘瘡赤斑熱等ノ熾熱劇シカラサル症ニ用
 テ汗ヲ發シ病毒ヲ發越ス○神經熱樣ノ傷冷熱増
 劇シ揮發衝動ノ峻劑ヲ用ヒ難ク唯蒸氣及汗ヲ發
 ノ病毒ヲ排泄スヘキ症ニ用テ○熾衝病傷冷熱神
 經熱等ニ一味用ヒ或纈草若ハ接骨花ノ泡劑ニ加
 ヘ或傷冷毒ノ咽喉熾腫ハ遠志ノ泡劑ニ加用テ殊
 ニ良○熾衝熱傷冷毒遊走痛ニ用テ蒸氣ヲ發シ安

眠セシム拈歇爾私發汗散 名ニ比スレハ熱ヲ増進

セス○劇キ傷冷毒ノ流走痛ハ此劑一弓ニ安質没

扭酒 前出二十滴阿芙蓉液十滴ヲ加夜分服ノ治ス○

表發ノ蒸氣ヲ抑遏丹伏ノ發スル水腫卒ニ冷氣ニ

胃觸メ瘡疹丹攻シ發スル諸症ハ此劑ヲ用蒸氣ヲ

驅發メ治ス○傷冷毒ノ頭痛ハ蒸湯藥トシ咽喉熾

腫ハ漱藥トシ傷冷毒ノ遷延熾腫眼羅斯樣ノ熾衝

打撲傷ニ洗湯藥トシ施メ皆捷効ヲ稱ス

服量一弓ヨリ二弓ニ至ル外敷ハ一錢ヨリ三弓ニ

至ル或症ニ隨ヒ清涼解凝衝動ノ藥液ニ加施メ良

名物考補遺 卷六 風雲堂藏

○此劑ハ諸酸味。亞兒加利鹽類。炭酸亞兒加利鹽。亞斯。蘇。蓬鹽等。石灰水。土質鹽。明礬等。金屬鹽。出前等ヲ兼用スレ

製法

名 砒砂ノ條ニ出シ以テ煎取ル。蒸餾醋ノ條ニ出シ以テ

又法

名 砒砂華。名 三ノ頭醇精醋。名 蒸餾醋。名 條。

右砒砂華ニ醋少許宛加テ能飽和シ毫毛滾動止サ
ルニ至リ是ニ蒸餾水ヲ加テ都合二十四ヲ小爲シ
貯フ。依窓。馬福。十。煎。研。美。茶。葉。十。煎。研。去。煎。以。其。際。一。リ。上。ニ。出。シ。以。テ。煎。取。ル。蒸。餾。醋。ノ。條。ニ。出。シ。以。テ。煎。取。ル。

龍腦飲

「カムホラ。五。ル。ダ。ラ。ニ。キ。蘭。

製法

龍腦。一。刀。燒酒。二。沙糖。各二錢。

右龍腦ニ燒酒ヲ滴メ研和シ沙糖ヲ加ヘ細末トシ
次ニ蘘謨ノ末ヲ加ヘ沸湯一升ヲ徐クニ研合シ蓋
閉メ冷ルヲ候ヒ緻布ニテ濾シ硝子壺ニ存シ固封
シ貯フ。呂。利。蘇。文。麻。真。不。蓋。ハ。什。意。研。取。煎。取。ル。蒸。餾。醋。ノ。條。ニ。出。シ。以。テ。煎。取。ル。

試効

燉衝熱。惡性熱。及神經感觸銳敏。痙攣運動アル

諸症ヲ治ス。○感動甚キ諸症ハ葛私多僂謨。或揮發

香竄精名共等ヲ加フ。○此劑六分。民埤列利精ニ攪

和シ一時半或二時毎ニ三匙宛服メ發汗ハ良劑也

名物考補遺

卷六

風雲堂藏

シ熱病嗽衝ノ諸症ヲ治ス。嗽衝熱ニハ安質沒扭酒
補ヲ加テ尤良。○腐敗熱。腐敗惡性ノ咽喉潰瘍。壞疽
ハ幾那ニ兼用メ良。○小便不利ハ此劑三匙。消石半
錢。亞刺比亞。蘆謨二錢ヲ研和シ一時毎ニ用フ。○遷
延傷冷毒痛及麻痺不遂ハ朴窟福烏篤脂揮發丁幾
劑朴窟福烏篤脂一ヲ二十ハ度ノ燒酒六ヲ石白一
劑ヲ研合メ溶化シ硝子墜ニ付硝砂加生石灰精
ニヲ加ヘ固封シ浸四錢ニ蜜四錢ヲ加磁白ニ
ス一ハ日濾シ貯フ研和シ龍腦飲六ヲ研合シ一時半或二時毎ニ二
匙宛服メ治ス。○疫效。經久呼吸不利喘息ハ此劑ニ
海葱蜜亞的兒阿魏等ヲ加用テ治ス。○狂躁譫妄ニ

丹伏熱ヲ兼子。阿芙蓉的當セサル症ハ此劑三匙宛
數用テ催睡セシム。○發斑熱。痘瘡。麻疹ノ潜伏丹攻
ハ此劑三匙宛二時毎ニ用テ發越ス。○熱病ノ頭腦
若ハ肺藏ニ血ノ攻衝スル症ニ龍腦劑ヲ用テ發汗
スレハ逾増劇ノ危險ニ至ル利

耶茂斯驅熱散 「ヤメス。コイルツ。フルデレイルヘン
テ。ブードル」

製法 安質沒扭ニ 鹿角灰角石一ヲ半

消石四ヲ 右各別ニ極細末トシ能研合シ坩ニ入レ蓋閉シ武

火ニテ燒燉シ煙氣ナキニ至リ取出シ固封シ貯依
試効燉衝熱胸脇燉衝傷冷熱欬嗽等ノ諸症ニ用テ
汗ヲ發シ血ノ運行ヲ鎮靜ス他ノ發汗劑ニ比スレ
ハ緩性ニノ捷効ヲ奏シ効力尤切實ナリ虛弱ノ諸
症諸熱ニ用テ亦良驗ヲ稱ス○此劑一錢ニ玫瑰蜜
少許ヲ加テ二十九トシ二時或二時半每一丸宛服
ス又服法前說ノ安質沒扭酒ト同シ但妄ニ諸熱病
ニ過用シ或腐敗性ノ咽喉潰瘍遷延丹伏熱ニ用レ
ハ大ニ下利ノ虛脫シ救活シ難シ依利

沙別爾扶驅蟲油

オホム。エム。ペイ。ム。サーベル。チ。オ。シ。ア。ン。テ。ル。ミ。ン。チ。ク。ム。サーベル。チ。シ。ロ。

製法

鹿角臭油

名一弓

的列竝底那油

名

三弓

右能ク合和シ硝子燻ニ丹置テ四日ニノ硝子ノ列
篤兒多名ニ丹沙火ニテ蒸餾シ其液四分ノ三ヲ餾
シ取テ小硝子ニ丹固封シ貯フ。大氣ヲ引ハ黑赭色
トナリ粘稠ニノ味嫌惡スヘク嘔噦ヲ發ス

試効諸蟲病殊ニ條蟲ニ奇効アリ每朝每夜可喜匙

常匙ノ五分ニ二抄宛水少許ニ和シ服ス其不佳ノ

味ヲ消スル爲ニ服後芳香ノ品丁子桂等ヲ嚼ムヘ
シ然レ右ノ服量ハ大抵服シ易シ但惡心眩運ヲ發

スル者ハ服量ヲ減スヘシ或大小便燥熱スル者ハ
甘扁桃乳等ヲ用フヘシ利

斯必竭里亞羅「タルムドデンドコロイド」蘭

〔形狀〕此草二種アリ。第一種ハ「スピゲリア」マリラン
ヂカス「マレイヤ」ドト名ク。根ヨリ一直莖ヲ抽キ
圓樣ニノ稜アリ。葉柳葉狀。柄ナク對生シ綠色滑澤。
背淡綠。筋隴起シ正中ノ縱筋ヨリ兩側ニ循行ノ肋
狀ヲ爲ス。不佳ノ微臭アリ。味微苦。花單瓣漏斗狀。穗
ヲ爲シ五雄蕊一雌蕊アリ。第五綱花後實ヲ結フ。二

囊狀ニノ裏二室ヲ爲シ各多子ヲ收ム。根長ク鬚甚

タ多シ味苦ク香臭ナシ數年枯レス。加祿利那北亞

地加洲ノ南地ニ生ス。○第二種ハ「スピゲリア」アン

テルミア又「ブラシリア」アンセ。スピゲリアト名ク。一

莖數枝ヲ分チ梢葉四枚相對ノ十字樣ヲ爲ス。花攢

簇シ囊樣ノ實ヲ結フ。宿根セス。伯西兒南亞墨利加

等ニ多ク生ス。此草濱瞿麥鱧ニ似タルヲ以テ偽リ

販ク者アリ。然レ眞品ハ濱瞿麥葉ノ如キ縱道ナキ

ヲ以テ分別スヘシ。

〔試効〕第一種ノ根ヲ用フ。或云莖葉モ亦藥用トス。○
或云第二種亦峻効アリ。

殺蟲ノ聖藥トス諸蟲症ニ奇効ヲ奏ス。稍麻痺毒アリ一頓ニ過服スレハ發熱眩暈眼昏催睡惡心嘔吐ヲ發ス然レ少間ニ又解散ス。服量散劑ハ効尤多シ小兒ハ十氏若ハ十二氏ハ一服トシ朝夕一服宛用フ或云八歳ノ兒ハ十氏宛日兩次用フ。或二十氏ハ一服泡劑トシ用フ大人ハ一錢マテ一服トシ朝夕一服宛用フ。或半錢宛日四次用テ尤切實トス。或云大人ハ一錢ヲ取テ沸湯四弓ニ泡出シ分テ三服トシ毎日三次ニ服ス。或云二錢ヲ取テ沸湯六弓ニ泡出シ分テ二服トシ一服ハ夜分用ヒ一服ハ翌日

兩次ニ用フ。或云二錢ヲ泡劑トシ毎日兩次ニ用フ。大便秘スル者ハ大黃ヲ加フ。○此藥ヲ用テ兩次ニ下劑ヲ與レハ夥ク蟲ヲ下ス服量適宜ニ用レハ嘔氣ヲ發セス。熱症ニ用テ熱ヲ増發セス。小兒ハ泡劑ニ沙糖若ハ蜜ヲ加テ服シ易シ。○第二種ノ草。一乃若ハ半錢ハテ泡劑トシ一服トス。日三服用ヒ。三日毎ニ下劑ヲ投スレハ死蟲或半爛蟲ヲ下ス。○**經驗說**凡患狀症候變幻百出。的識シ難キ。下蟲病ヨリ甚ハナシ。蟲ノ症候亦能ク諸病ニ發現スレハナリ。○患者不食噫氣酸臭或酸汁ヲ吐シ大便或秘

或瀉シ或粘穢汚物ヲ下シ或時々腹痛發熱咬牙等
蟲症ニ發シ粘穢汚物腸中ニ鬱積スル者亦發ス○
腹肚一種ノ鈍痛ヲ發シ腹脹硬滿羸瘦瀉下丹伏消
耗熱肌皮黧澹大便異常又惡臭アルハ蟲症ニ發ス
レモ腸間膜腺ノ硬腫ニモ亦屢發見ス○乾欬下利
發熱顏頰熱赤等ハ蟲症ニ發シ小兒生齒モ亦發ス
○頭水ト蟲病ハ病因所在異ナレモ腸間一般ノ症狀
ヲ發ス。即、頰顴赤色卒ニ饑テ食ヲ欲シ腹痛關節痛
咬牙搐搦鼻孔搔痒等ハ頭水ニ發シ蟲症モ亦發ス。
予頭水ノ患者ヲ療スルト五六人皆咬牙シ鼻中搔

痒ノ症アリ。又痒病偏枯ニ右ノ諸症ヲ發スル者アリ
死後其屍ヲ剖觀スルニ汚血ニ汚血ニ汚血ニ汚血ニ汚血
出セリ○頭水ト蟲症ハ症候甚夕紛錯ス或脉遲緩
瞳子散大等ハ必ス蟲病ノ增長セル症ニ兼發シ頭
水ニモ亦發ス。故ニ頭水ヲ誤認テ蟲症トスルト多
シ○多年歷試考究スルニ上唇頰顴鼻翅厖然ト浮
腫シ鼻孔是カ爲ニ狹小半ニ過ク此數症ハ蟲ノ確
徵トシ曾テ一モ差誤ナシ或小兒ノ如キハ患情病
苦ヲ細陳スルヲ能ハス。特ニ外候ニテ察識ス。右ノ
數症アル片ハ患苦ヲ問ハス必ス蟲症トシ療スヘ

シ○此藥散劑若ハ泡劑ニテ服量饒多ニ與レハ服後速ニ蟲ヲ下ス。小兒是ヲ過服ノ頭眩運。眼疼或眼筋異常ノ運動ヲ現シ眼球牽扯スル者アレハ少間ニノ解散ス若シ稍留連スル者ハ輕キ香竄ノ露精ニ揮發ノ藥劑。雜腹蘭若ハ橙皮油。茴香油等少許ヲ加ヘ與レハ速ニ解ス或此藥ニ芸香油。亞爾鮮油。薩昆那油名共等數滴ヲ加與レハ右ノ如キ瞑眩ナシ○凡百ノ蟲症ニ此藥ヲ歷試スルニ服後自ラ輕キ下利ヲ發スルニ非レハ良効ヲ得ス。或胃腸粘穢汚液鬱積セル熱病ニ試用ルニ蟲ヲ下サスノ自ラ瀉下

シ諸症解散ノ意外ノ効ヲ得ルト多シ○根半錢ヲ用レハ宛モ大黃半錢ヲ用ル如ク瀉下スル者アリ或多ク服ノ瀉下ナキ者アリ。此症ハ効ナシ故ニ大黃或甘汞一二分ヲ加用ヘシ是ニ由テ眼球抽掣等ノ瞑眩ナシ○或先吐劑ヲ與ヘ吐ノ後此藥ヲ投シ大ニ蟲ヲ下ストアリ○多ク試用ルニ服量少許用レハ眩運眼昏搖掣等ヲ發スルトアリ。多量ニ服スレハ唯吐シ或瀉スルノミニテ曾テ他症ヲ發スルトナシ故ニ多量ニ用ルヲ著實トス。小兒二歲蟲症ヲ患ヒ此藥十分宛日兩次與ヘ。疲倦嗜眠ス又

二十二氏宛朝夕與レハ瀉下ノ大蛇五條ヲ下シ治
 ス。數月ノ後又蟲症ヲ發シ右ノ多量ヲ與テ蟲ヲ下
 シ全治セリ。○或散劑トシ十二氏ヨリ六七十氏ニ
 テ用テ効ヲ取レアリ。泡劑ハ二三錢若ハ四五錢宛
 日兩次用フ。○此藥陳久ノ者ニ非レハ驅蟲ノ効効
 ヲ誤ルヲナシ且長服スルハ是ニ慣テ効力減スル
 者ヲ見ス。○蟲熱ハ往來及暫留氏ニ此藥卓偉ノ効
 アリ。殊ニ攝爾扁答名少許ヲ加ハ水煎メ用レハ熱
 ノ發作ヲ制挫シ顯功アルヲ宛モ蟲熱ノ消毒藥ノ
 如シ又解凝ノ殊効アリテ能ク内部ノ壅塞凝結ヲ

疏解ス。○蟲症經驗ノ治例左ニ示ス則以畧舉ス前條
 第一行小兒四歲暫留熱ヲ患レ七日。是蛇蟲刺戟ノ
 發スル熱トシ左ノ方ヲ處ス。其下ニ長甘末等藥

斯必渴里亞驅蟲飲

此ニ散劑トシ因ハ驅蟲ノ下

酒石葉名各一刀

的里亞加水名二錢

沙糖名適宜

右研和シ半時毎ニ一匙宛與フ。翌日亦用フ。午後大

便ニ行通メ蛇蟲三十條ヲ下シ隨テ熱解散ス。第三

日又前方ヲ與ハ蛇蟲九條ヲ下シ其熱再發セス

第二 一女子十歲蟲症アリ此藥ヲ散劑トシ每服芸香油一滴宛加與ルテ數次。瀉下ナシ。二日ヲ經テ患兒頭痛困重精神愁鬱眼昏眩暈ス。此症五日ヲ經テ稍退キ次テ眼胞青色匝圍シ時ニ鼻邊頰額ニ彌漫ス。此症半時許消メ又忽チ發現シ且此症ト眩運眼昏等ト互ニ往來換發メ數日休メナシ。予以爲ク此藥ヲ與レテ瀉下ナキ故ニ効ナシト。因テ溫壯ノ下劑ヲ加テ與ヘ翌日亦用テ輕ク瀉下ス。是ヨリ諸症遂キ再發セズ蟲モ亦下ラスノ全愈セリ

第三 一小兒五歲。五月十五日診察ス。四箇月以前劇

ク下利ノ粘液ヲ下シ腹痛ノ臍脹シ次テ頭痛頰赤咬牙鼻中搔痒鼻孔上唇浮腫。舌白苔。渴アリ又三週以前ヨリ疫效ヲ兼ヌ。因テ大黃末十二匁甘汞一匁研和ノ一服トシ與ヘ次ニ斯必竭里亞細末朝夕十匁宛與フ。十九日。蛇蟲一條ヲ下ス。二十三日尚瀉下休メス。又前說ノ下劑ヲ與フ。二十八日諸症輕差スレテ下利休メス。因テ又大黃ヲ與フ。六月三日蟲症悉ク治ス故ニ斯必竭里亞モ亦休ム。但疫效及下利仍荏苒タルニ由テ幾那劑ヲ與ヘ漸ク回復ス

第四 一婦人二十七歲嘗テ間日熱ヲ患ヒ爾後五箇

月以來時々蛇蟲ヲ下ス。五月十六日診察ス。其症腹痛シ上唇鼻孔腫起シ常ニ鼻中搔痒。咬牙ス因テ先大黃ニ甘朮ヲ加ヘ與フ。二十二日斯^ス必^ビ竭^ケ里^リ亞^アノ末半錢宛^ヅ日三次用フ。是ヨリ大便日滑利シ二十五日蛇一條ヲ下ス。因テ其散劑ヲ用テ日四次。二十九日又蛇二條ヲ下ス。是ヨリ諸症及鼻唇ノ腫減ス。因テ散劑ニカヲ與フ。六月二日蟲症悉ク治シ唯微腹痛スルノミ故ニ此藥ヲ休レハ腹痛モ亦治ス

第五 一女子五歲。六月晦診察ス。其症二年以來腹痛ヲ患ヒ時々發熱ノ渴シ又惡心嘔噦眩暈。下利咬牙

鼻中痒。鼻孔浮腫。按ノ疼アリ。乃先吐劑ヲ與テ吐セシ^シノ斯^ス必^ビ竭^ケ里^リ亞^アノ散劑朝夕十氏宛^ヅ用フ七月六日惡心嘔噦休テ食進ミ十一日諸症殆ト解散シ十四日全愈ヲ告ク。此患者服藥中大便毎日瀉利セリ

第六 一男子二十歲八月二十九日診察ス。患者嘗テ蛇蟲ヲ下ス^{コトアリ}其症腹痛シ殊ニ每朝心下刺痛ノ甚タ苦悶ス。乃此藥ヲ散劑トシ半錢宛^ヅ與ル日四次。然^レ瀉利セス因テ瀉下ノ丸劑ヲ與テ下利ス然^レ蛇蟲下ラス九月五日腹痛全治シ爾後再發ノ候ナシ

第七 一 小兒五歲。三月二十一日診察ス。其症患兒常

ニ鼻中ヲ摘搔シ腹脹ノ痛アリ唇鼻浮腫咬牙シ每

朝饑ル_レ甚シ脉百三十動。乃此藥ノ散劑四_レ取

テ夜中用_レ七翌朝_レ漸_レ加テ八_レ至_レ大便利

スル_レ日兩三次。四月四日諸症悉ク治_レ爾後再發

セ_レス

第八 一 女子六歲正月十二日診察ス。三週以來欬

劇ク。腹硬滿脹痛シ上唇腫起ス。但鼻中搔痒咬牙ノ

症ナシ。脉百三十八動。先_レ大黃ニ甘汞ヲ加_レ與_レ一

服。次_レテ斯必_レ竭里亞ノ散劑八_レ宛用_レ日兩次。始終

大便利ス。二十五日ニ至_レ諸症快愈シ藥劑ヲ休ム

第九 一 小兒七歲。二月十七日診察ス。此兒素瘰癧腺

腫アリ。三週以來頭痛。腹脹痛ヲ患_レテ步履シ難シ。又

八日以來上唇著ク腫起シ鼻孔及鼻邊浮腫ス。脉百

八動。是_レニ旃那葉ヲ用_レテ蛇三條ヲ下_レス。又斯必_レ竭里

亞ノ散劑七_レ宛與_レ日兩_レ次。大便利セ_レス。因_レテ二十

一日大黃末四_レ宛加_レ用_レテ多ク硬屎ヲ通_レス。二十四

日鼻唇ノ浮腫及腹脹減_レ甚ク臭穢ノ大便通_レ多

ク蛇ヲ碎片ヲ雜_レテ。二十日_レ蛇三條ヲ下_レ唇腫及

諸症悉ク消散シ回復セ_レリ。二十五日_レ蛇三條ヲ下_レ唇腫及

第廿一 女子十歲中十一月二十五日是ヲ診ス。其症腹痛劇發日數次且心下亦刺痛又煩躁シ顔面赤色常
 鼻中ヲ摘搔シ鼻孔上唇腫起ス。此症時々發スル
 十一年許開蛇蟲又下スヲアリ乃此藥ノ散劑十氏
 宛與ル日兩次大便能ク滑利ス然レ蛇通セス十
 二月朔諸症悉ク解散シ爾後再發セス。右ノ試効
 ヲ觀ルハ此藥殺蟲ノ奇効アルヲ顯然アリ就中四
 個人症ハ蛇ヲ下シ五個人症ハ蛇下ラスノ全治ス。
 是蟲消化ノ大便ニ雜リ大腸ニ在テ壞爛溶解シ大
 便ニ混メ暗ニ瀉下シ或蟲巢敗穢ノ粘液ヲ滌除ス

其ハナリ。此藥ハ蟲ヲ驅除スルノ最速アリ又復其
 萌生ノ再發スルヲ遏絶ス。他ノ驅蟲藥ハ捷効アル
 氏長服シ胃腸ニ慣習スレハ蟲復醸生ス。此藥ヲ
 與ル六日ニハ蟲症全治シ或十八日モ用テ治スル
 者アリ。右十個人症中是ヲ用テ瀉下ナキ者無症
 アリ然レ眩運眼昏搐掣等ヲ發セズ。其他ハ太復瀉
 利シ或腹痛ス。生鮮ノ者ヲ用ルハ瞑眩スルヲアレ
 氏暫時ニノ解散ス。小兒搐搦ニ用テハ蟲ヲ下サス
 治スル者多シ。上唇鼻孔ノ腫起ハ特ニ蟲症ノ確
 徴トシ又瘰癧腺腫ニ蟲ヲ兼死の候トス。宜ク是ヲ

記得ノ諸症ト參驗シ他病ニ混出誤ルヲ勿ルヘシ

〔根〕〔葉〕〔花〕〔果〕 土身喜潤角頭疎葉疎花疎果疎

敬爾拔斯屈謨ハバスクム 〔ハルバクム〕イム 〔イム〕イム 〔イム〕イム 〔イム〕イム

〔形狀〕此草莖四五尺許沃壤ニ在テ長一丈許枝ナ

シ毛茸多クノ綿絮ニ如シ葉長太三ノ末尖シ柔厚

粗糙表裏毛茸多ク淡白綿絮ヲ被フ如シ梗ナシ

味微收溇ス莖梢薔薇様ノ花生ス美黃單瓣五出五

雄蕊屈曲シ鈍頭ノ一雌蕊アリ第五綱 密其攢簇ノ

長穗ヲ爲シ佳香アリ味微甘粘滑ス花後卵圓形ノ

實ヲ結ル中隔兩室ヲ爲シ熟ノ割裂シ稜アル子ヲ

收ム歐羅巴洲諸國原野路傍ニ生ス二年ニノ枯ル

此草ノ乾葉棉絮ノ如キヲ以テ是ヲ絢テ燭心ヲ造ルト云

〔試効〕葉花ヲ藥用トス緩和止痛愈創ノ殊効アリ

和胸ノ一良藥トシ胸肺病欬嗽喘急吐血諸失血及

腹絞痛疝痛ヲ治ス花ヲ泡劑トシ服ス○下利赤痢

ニ煎劑トシ服シ腸痛ヲ緩解シ重墜努責ヲ靜止シ

治ス○咽喉焮腫ニ漱藥トシ下利痔疾ノ重墜努責

ニ吉利詞參兒トシ施メ治ス○痛風ノ劇痛及盲痔

ノ焮痛ニ蒸濕藥トシ施メ緩和シ疼痛速ニ消散ス

○打撲傷及創傷ニ此藥ヲ搗テ油ヲ加ヘ軟膏トシ
 外敷ル速ニ愈ユ○經久頑固ノ下利ニ試効多シ治
 例四則ヲ左ニ略載ス藥ノ下味其味ハ重鬱發臭
 第一一男子二十六歳五月十三日診察ス其症五年
 以前頑固ノ間歇熱ニ罹リ二年ヲ經テ治ス其後右
 肋下腫脹疼痛ノ左方ニ牽引ス六週ヲ經テ又下利
 ヲ發シ今ニ荏苒タリ其初水瀉九日許然レ腸痛ナ
 シ但欬嗽ヲ發ノ粘黃鹹味ノ痰ヲ咯ク一夥シ然レ
 胸痛惡寒盜汗ナシ今呼吸蹇難不利勞動スレハ殊
 ニ甚シ眼ノ白膜及肌皮黃色ヲ帶ヒ腹稍臌脹ス然

レ腸鳴ナシ患者右脇ヲ下ニノ臥シ易シ脉百十二
 動ヨリ百二十動許乃チ夜中炮大黃末半錢ヲ與ヘ
 翌日左ノ劑ヲ用フ

歇爾拔斯煎

歇爾拔斯屈謨葉ニヨ

右水三比ニ煮テ二比ト爲シ滓ヲ去リ一時半毎ニ
 四勺宛與フ同月二十日ニ至テ嘔吐ヲ發ス故ニ吐
 劑ヲ與テ吐セシム同夕二十九日下利及右肋下肝
 部ノ腫痛大ニ減シ次テ下利腫痛腹脹漸ク退散シ
 六月五日全治セリ此症腸ノ虛罷甚クノ收固強壯

劑ヲ與レ下利休マサルヲ殆ト一年許。腸殊弱シ肢體極テ羸瘦ス。故ニ甚夕險重ノ病トス。其右肋下腫起重痛ノ左方ニ連引スルハ病毒肝藏ニ壅結ノ黄疸ノ基始ヲ爲ス徵トス。患者左脇ニ臥ス片ハ肝ノ韌帶甚夕伸張ノ牽扯ニ堪ス故ニ右脇ニ臥シ易シ患者惡寒セズ盜汗ナク脉朝旦ニ比スレハ夜分其數減ス。是肝藏膿瘍ナク唯閉塞ノ壅腫スル候トス。欬嗽ハ肺勞ノ欬ニ非ス且胸痛及勞瘵様ノ諸症ナク欬ノ稠痰ヲ咯キ氣息寒難ナルハ肝藏腫脹ノ肺ヲ壓迫スル候トス即チ此藥ヲ用テ其欬下

利ト共ニ止ヲ以テ知ルヘシ

第二 一男子十九歲。七月十一日診察ス。四週以來烈キ下利ヲ患ヒ腸痛及重墜努責甚シ。初發一週ハ血ヲ交ヘ下シ毎夜發汗ス脉百八動許。脉力平常ノ如シ。予刺絡スルヲ一次。大黃劑一服用テ後歇爾拔斯煎前ヲ連用ス。同月十八日下利殆ト止ヲ以テ藥劑ヲ休ム。其後十四日中ニ下利再發ス然レ此藥ナキ故ニ復試用セス

第三 一婦人四十三歲。十二月十六日診察ス。其症下利既ニ二十四日。劇キ腹痛ヲ兼ヌ。脉九十八動。乃チ吐劑

ヲ與テ後歇爾拔斯屈謨一弓ヲ取テ水二匕ニ煎シ
與^ル一三日ニメ下利止ム。但腹痛休マサル一^二日。莧
麻油鏡ヲ與テ治ス

第四一男子六十歳正月十六日診察ス。三週以來下
利ノ劇キ腹痛ヲ兼ヌ。乙百葛格安那ヲ與テ吐セシ
メ次ニ格綸僕ヲ與テ功ナシ。同ク二十九日歇爾拔
斯煎出前ヲ用ル一^二毎日二匕下利止ニ大便平常ノ如
ク腹痛亦解散ス。二月四日全愈ヲ告ク○右ノ質驗
ニ據レハ此藥頑固經久ノ下利腸痛ニ奇効アル一^二
顯然タリ○凡下利ニ罹ハ胃腸感觸極テ甚平常ノ

資養消化ニ供スル飲食膽液泡釀氣等ノ如キモ尚
胃腸ニ感觸ノ劇ク衝動シ。大ニ蠕動機ヲ増發ノ下
利ス。然^ルニ此藥ヲ用テ効功多キヲ觀レハ緩和止痛
收瀉ノ偉効アル一^二知ルヘシ。林娜斯名人ノ試説ニ此
藥ヲ末トシ麥粉ヲ加テ泥トシ河水ニ投スレハ魚
類昏醉シ手ヲ以テ捕フヘシト云然ハ此藥ハ麻痺
止痛ノ峻カアル一^二亦徵スヘシ。此煎劑ヲ吉利詞爹
兒トシ施セハ腸管ヲ緩弛ノ重墜努責ヲ治シ盲痔
ニ蒸溺劑トシ施セハ速ニ焮痛ヲ祛クモ亦麻痺止
痛ノ殊能トス○右第三ノ治驗ハ偶此藥ノ匱乏ニ

由テ一弓ヲ水ニ比ニ煮テ用フ。多ク貯レハ二弓ヲ
取テ水ニ比ニ煮テ用ルヲ良トス (依) (溼) (僕) (叔) (貨)

坎百設木 「リ」グヌムカムペセンセ「ハ」マトセイロ
「カ」ムベシアヌム「ル」カムペセ「ホ」ウト

「ホ」ウト「蘭」

形状北亞墨利加洲ノ海邊ニ産スル喬木ノ幹材十

其樹老則兒ノ如シ花五瓣萼五出十雄蕊一雌蕊

第十綱實長クノ尖リ自ラ割裂ノ形千舟ノ如シ○

此材藥舗ニ輸ス者大抵二尺許太サ二三拵横徑硬

固堅實ニノ重シ外面黧赭裏黧赤ニノ藤花色ヲ帶

ヒ味收瀼ニノ甘ヲ帶フ 根材尤モ 漆匠用テ黑色赭色

ノ染料トス水及燒酒ニ浸セハ赤色トナル 或云水

ハ黄色トナリ時ヲ經レハ黑色トナリ墨汁ノ如シ 或云水

此樹新伊斯巴尼亞宇革堂ノ坎百設及牙埋加安知

列等ノ諸嶋 共ニ北亞墨利ニ産ス

試効性收瀼ニノ諸管纖維ノ弛虚縦緩セル諸病ヲ

治ス經久下利赤痢及諸腸弛弱ノ諸症ニ浸劑若

ハ越幾斯劑トシ用テ良効ヲ稱ス或一錢許ヲ取り

西瑪爾拔皮 名ヲ加ヘ水煎ノ收瀼劑トシ用フ

坎百設木越幾斯劑製法健質亞那越幾斯劑 名ト同

此材三十二弓ヲ以テ水煎ノ越幾斯劑四弓半出
〔華〕〔依〕〔叔〕〔叔〕

老利兒結爾斯

ラウロケラシタスラウリールケルセンラウロケ

形狀是布律扭斯樹梅李櫻ノ類ノ一種ナリ。葉老利

兒葉ノ如ク實ハケルス櫻ノ類ニ似タルヲ以テ名ク。此

樹灌木ニメ直幹多枝。皮黯綠ニメ赭色ヲ帶フ。嫩條

ハ綠色葉老利兒ニ似テ大ク厚クメ鋸齒アリ多液

美綠光澤アリ互生ス。味苦ク苦扁桃ノ如シ揉メハ

香氣アリ冬ヲ凌テ凋落セス。葉背ノ梗側ニ二腺ア

リ其形粟起ノ枝梢ノ葉本ニ五瓣ノ小白花攢簇メ

穂ヲ爲シ梅花様。雄蕊二十以上アリテ萼ニ著キ一

雌蕊アリ第十二綱香氣ナシ萼五出。花後實ヲ結フ

卵圓形ニメ小李ノ如シ或云大サ阿長様ノ核アリ

縫際壠起ス。○那多里亞亞細亞洲ニ産シ又歐羅巴

洲東南諸國ニ培養ス

毒性葉ニ精微揮發ノ油アリ是ニ青酸ヲ含メ太ク

多シ青酸ハ動物植物ニ含ム者多シ或ハ是ヲ製造ス

苦扁桃櫻實等此毒ヲ含メリ青酸ハ猛烈ノ麻痺毒ニメ血及湧

乙ヲ稀釋スルヲ極テ甚シ凡植物ノ毒是ヨ此葉ノ

露水一二勺ヲ服スレバ忽チ腦神經ヲ侵襲シ全身ノ生力ヲ撲滅シ觸動機ヲ廢弛ノ卒倒ニ或劇キ腹痛嘔吐。痙攣搐掣。麻痺。睡症。昏冒ヲ發メ死ス故ニ鹿工ニ在テハ危殆ノ毒藥トス精練ノ醫家ハ其症ヲ察メ服量ヲ慎ミ少許用レバ他藥ノ功ナキ篤疾ヲ治シ非常ノ奇驗ヲ得ルヲ甚タ多シ○此毒ヲ解スルハ乳汁ヲ良トス或剝篤亞斯石鹼ヲ用フ

老利兒結爾斯水

製法

老利兒結爾斯葉生葉細切二十四弓水三比右硝子ノ列篤兒多ニ得煖處ニ置キ浸十二時ニ

ノ文火ニ上セ蒸餾ノ露水十六弓ヲ取ル氣味。宛

モ苦扁桃若ハ桃仁ノ如シ其氣甚夕揮發銳烈ナル

故ニ硝子列篤兒多ヲ用ヒ能接際ヲ固封シ蒸餾ス

ヘシ。露水中揮發ノ油沈ム。其毒極テ烈キ故ニ醫藥

ニ用ヒス或葉ヲ泡劑トシ用フ

試効老利兒結爾斯水ハ腹部ノ神經病ヲ治ス。故ニ

腹部諸器ノ壅塞。殊ニ門脉閉塞ノ痙攣ノ運動ヲ兼

ル諸症ニ奇効アリ。即黑膽液鬱積壅滯メ發スル神

思鬱憂病。依剝昆垤兒脾病。子宮衝逆等ナリ其症。顏

面黑赭色。上腹兩側。肋下苦悶痞脹。腹中常ニ困重ヲ

覺工脉度不整。大便常色ヲ失ヒ膠粘若ハ稀薄。神思沈重鬱悒等ナリ。○血及^レ沔乙ヲ稀釋溶解スルニ峻効アリ。故ニ血液稠粘凝固セル病ノ熱劑害アル症ヲ治ス。曾テ是ヲ二人ニ試ム。一人ハ黑膽液質ニシテ其諸症ヲ發見ス一人ハ傷冷毒痛ヲ患フ共ニ其血甚夕稠厚ニシテ膠粘ナリ此葉ノ露水ヲ取り三十滴ヨリ六十滴ニテ一服トシ日ニ三四服宛用テ後刺絡スレハ其血甚稀釋渙流シ其病回復セリ。又一人肝ノ壅塞頑固ニシテ諸症ヲ發ス此葉ヲ濃泡劑トシ數用テ壅塞疏解シ全治セリ。○或云此藥ハ門脉ノ

黑血ヲ稀釋ノ赤色ト爲ス殊能アリ故ニ黑膽液質ノ入門脉壅塞ノ發スル神思鬱憂病。依剝昆垚兒。痔血壅滯。經閉ニ峻効アリ。○或云此藥ハ腹中諸器ニ黑膽液ノ壅塞ヲ兼ル子宮衝逆。依剝昆垚兒等ノ瘕瘕性ノ病ニ奇効アリ。其症患者神思沈重鬱悒シ助下上腹ノ部痞脹苦邁シ眼中汚黃色。脉小若ハ大ニ遅或時ニ一止シ大便黑色ヲ帶テ稀ク或膠粘ニシテ蜜ノ如ク小便黧澹色或乳汁ノ如シ。又黑膽液質ノ患者ハ天性懶惰ニシテ勞動ヲ厭ヒ一處ニ定著スル痛ナクノ腹肚苦滿困重シ或偏頭痛不寐肢節顫

振疲弱虚乏ヲ覺ル等ナリ此症ハ先ツ吐劑若ハ下劑ヲ與テ胃腸ノ汚液ヲ淨刷シ此露水ヲ用テハ根治スル者多シ○黑膽液壅塞ノ右ノ諸症ヲ見ス者ハ對症ノ解凝劑ニ此藥ヲ加用ルヨリ捷効アルハナシ喻ハ後方ノ如シ

解凝化毒飲

老利兒結爾斯水ラウリールケルス 酒石葉液名 各一盞

韃爾答越默室タタルダクエモチ 名 六氏

右研和シ時々一匙宛白葡萄酒若ハ水ニテ服シ効驗ノ多少ニ隨ヒ増減シ且韃爾答越默室ハ患者感

觸ノ銳鈍ニ隨ヒ加減之與ヘシ○黑膽液病經久ニ

ノ險重ニ至レハ終ニ黑病トナル是ハ腐敗酷厲ナ

ル膠粘稠厚ノ黑血腹藏ニ壅積スルヲ久クノ遂ニ

脉管ヲ侵蝕破壊シ卒然トノ夥ク黑血ヲ瀉下シ或

湧吐シ患者昏冒ス此症ハ此露水モ功ナシ唯緩和

劑若ハ鎮痙劑ヲ與テ其劇症ヲ寛解スルヨリ他策

ナシ劇症鎮定ノ後大ニ虚脱セス尚黑膽液壅積ノ

症アル片ハ前説ノ解凝化毒ノ劑ヲ與テ是ヲ治ス

ヘシ○此藥腺ノ諸病ヲ治ス腸間膜腺壅塞硬腫肺

藏硬結腺腫瘰癧癌樣硬腫ハ大人小兒共ニ此露水

二安質沒扭劑。鹽酸重土補ヲ加用テ峻効アリ。但眞
 ノ癌腫ハ治セス。○小兒腸間膜腺ノ壅塞硬腫ハ腹
 肚硬滿膨脹ノ四肢羸瘦枯削大便惡臭アリテ或瀉
 シ或秘シ頻ニ饑テ食スレト氏毫モ營養セス此症ハ
 左ノ方極メテ驗アリ其傳ニ實ハ入ルハモリト藥
 解凝疏腺飲目入ルハモリト藥一錢
 粗嘗老利兒結兒斯水一馬一錢
 右研和シ十五滴宛服スルル日ニ三四次扶○此露水
 ハ肺氣管ノ痙攣ノ運動ヲ鎮制ス故ニ痙攣ノ咳
 喘急疫効等ノ良藥トスル或云勞効ノ虛憊ノ嗽衝ヲ

兼ル症ハ此露水ヲ用テ痙攣ノ効ヲ鎮定スル一良
 藥トシ起熱ノ害ナク其効阿芙蓉ニ勝レリ○肺嗽
 衝刺絡ノ後虚憊スル症或熱病ノ虚憊ノ嗽衝ヲ兼
 ル症ハ此藥良効多シ○痛風傷冷毒痛其他諸般ノ
 疼痛或痙攣ノ諸症アリテ虚憊ヲ兼ル者ニ的當ニ
 能ク疼ヲ止メ痙攣ノ運動ヲ鎮ムル日ニ三四次
 服量十滴ヨリ二十滴マテ日ニ三四次用ヒ漸次ニ加
 テ六十滴或八十滴ニ至ル○吉利詞參兒トシ施メ
 亦右ノ諸病ニ殊効ヲ稱ス其量同前
 外敷此露水外敷メ嗽腫眼及眼瞼嗽腫ヲ治ス殊ニ

名物考補遺 卷六 風雲堂藏

