

遠方考補遺物名方醫方

卷五




499.2
王M-6
5

No. 1466

12 ② 16

葉26



高士川文庫

3323



遠西醫方名物考補遺標目
卷五

刺答尼亞

地膽

地膽消毒飲

收煎散潤收丁蘇香龍驅
飲飲劑涼飲幾蓬竄酸熱
擦丁飲飲劑九飲飲散
方幾複方

漱丁浸越固海香健龍姜
方幾劑幾腸葱竄胃腦橙
劑斯飲飲丁飲飲糕
劑幾劑



附收濬藥說

卷五

標目

單味收濬

收濬藥

藥

揮

發

收濬

藥

風雲堂藏

收濬藥性功總說

百屈林

傑膾弗魯伊

傑膾弗驅蟲飲
草丸

傑膾弗魯伊越幾斯劑

傑膾弗魯伊丁幾劑

太那設黜謨

驅蟲膏

太那設黜謨油

伊里斯弗魯連底那

蘇格爾需謨

麻爾羅歇

麻爾羅歇越幾斯劑

遠西醫方名物考補遺卷五



擗齋先生譯述

男 宇田川榕榕菴校補

地膽

トチハシノウ俗 メロエ・プロ・スカラ
バーウスレ羅 マイナルム・メイナルム・蘭

芫菁ノ一種ナリ翅ナク甲半被フ。二種アリ一種ハ

淡青蓮色。一種ハ背赤色按ニ本草綱目啓蒙ニ云。地膽。山中土俗或原野石間ニ居リ時く出行ク長サ一寸餘潤リ三分。黑色碧光アリ飛フ能ハス此蟲人手ニ觸ルハ脚節ヨリ臭氣アル黃色油様ノ脂液出テ粘著ス地膽ノ性効多ク此液ニ在リ故ニ是ヲ失サル爲箸ニテ夾捕紙ニ包ミ乾シ頭脚等ヲ去リ貯フ

箸ニテ夾捕紙ニ包ミ乾シ頭脚等ヲ去リ貯フ

試効此蟲大毒アリ性効羌菁ト同メ微緩弱ナリ過

服スレハ劇キ腹痛。胃腸燃衝吐血下血ヲ發シ特腎膀胱尿道ヲ刺戟メ劇キ燃衝小便閉。尿血等ノ危症ヲ發シ或死ス○一男兒六歳。此蟲一個入燒酒ニテ呑下ス少間^{シハラク}ノ大腹痛煩躁搐搦。衄血尿血下血。血汗ヲ發メ斃ル○然^レ服用量些少ニ用レハ經久廢痼ノ病患。急劇危篤ノ諸症ニ奇効ヲ得ル^レ多シ○此藥溶解稀釋ノ峻效アル故ニ痛風脚痛腰鼈痛。歷節遊走痛等。經久頑滯ノ症。結石腎痛ニ偉効アリ○水腫小便閉^レ驅水ノ駄効アル^レ羌菁ノ如シ○此蟲ヲ

醋ニ投シ或蜜ニ浸メ殺シ乾^カ頭甲脚ヲ去リ極細末トシ初半氏許ヲ取テ舍利別等ニ和シ毎日前說在諸病ニ用ヒ漸次^{レタク}ニ用量ヲ増加。小便燃痛頻數努責メ稠濁ノ粘液ヲ雜ヘ通スルニ至テ休ム。尚驗ナキ時ハ又前法ノ如ク用ヒ治スルニ至^レ或云此末ヲ四氏マテ舍利別ニ和シ用レハ右ノ諸症ヲ發メ小便ニ夥ク粘液ヲ通スルコ大抵七八時許。病人輕重ニ隨ヒ右ノ如ク用^レ六次若^ハ十二次ニ^タ全治スルニ至ル○狂犬咬傷ニ奇効アリ患人ノ年齡ニ隨ヒ此蟲一個ノ八分一ヨリ半分マテ一服トシ半

時毎ニ與テ尿血ヲ發スルニ至ル。其創ハ鉋針ニテ
刻截ノ毎日水銀膏ヲ擦スヘシ鉋針ヲ恐ル者ハ頻
ニ荒菁末ヲ摻ノ潰破セシムヘシ此ニ由テ危險ノ
症ヲ救イ勝テ算ヘ難シ○或云此蟲人細末大人
一氏半ヨリ二氏マテ消石一倍若バ三四倍ヲ加エ
小便焮痛不利ヲ發スルキハ亞刺比亞護謨ヲ加エ
二時若バ三時毎ニ用ヒ。小便血縷ヲ見ズニ至レハ
消石ヲ去テ此末一味前法ノ如ク用フ。其創ハ數荒
菁末ヲ摻ノ潰爛セシメ三週許モ瘥ストナキヲ肝
要トス。是ニ由テ危險瀕死ノ症ヲ救活ス○或云此

蟲ヲ蜜ニ浸ノ殺シタルヲ一味用ベシ他藥ヲ加ル
ヨリハ功驗著實ナリ○狂犬傷ニ因テ恐水。搐掣ノ
症ヲ發スル者ハ左ノ劑ヲ與テ汗ヲ發シ小便ヲ利
シ其毒ヲ驅泄ノ治ス。又前說ノ痛風ニ殊効アリ

地膽消毒飲

地膽八個

的里亞加四錢

民垤列利精八錢

鹿角揮發塗

或硝砂華

二錢

右調和シ二匙宛與ル一日兩次。此服量ニテ小便焮
痛ヲ發セス然既ニ恐水ノ症ヲ發シ患者總テ飲

液ヲ見テ驚怖シ毫モ飲ムト能ハサル者ハ劑中ノ
民蛭列利精ヲ去テ接骨花傑列ガレ四錢ヲ加テ煉
膏トシ分テ十六服トシ早朝ト夜分ト一服宛與フ
ヘシ○往年狂犬傷ヲ被ル者十五人。其中十二人ハ
初ヨリ右ノ療法ヲ施ノ皆全愈ス。二人ハ當時患症
ナキ故ニ自ラ怠忽メ此藥ヲ用ヒス。數週ノ後惡症
ヲ發シ死ス。一人ハ數日ヲ經テ諸症崩發スル故ニ
大ニ危懼シミキ荐リニ此藥ヲ服ノ全愈ス○四男子。一
婦人齊ク狂犬傷ヲ被リ當時患症ナキヲ以テ治療
ヲ施サス然ニ百二十日許ヲ經テ皆恐水ノ惡症ヲ

發シ男子悶亂狂躁ノ死ス。但婦人ハ此蟲ヲ蜜ニ研
和シ數服ノ回復セリ○ニ少年一婦人同時ニ狂犬
傷ヲ被ル。此蟲ヲ取テ頭ヲ去リ各一個ヲ服ス。共ニ
忽瞑眩ノ劇症ヲ發シ死ニ瀕シ然ニ尿血ヲ發メ諸
症醒解シ爾後狂犬毒再發セス○一小兒十歲狂犬
傷ヲ被ル。此蟲ヲ蜜ニ研和シ與テ劇キ腰痛ヲ發シ
小便終日頻數淋痛ノ休マス且油脂ノ如キ粘物及
血交リ通ス。然ニ其症漸ク減シ爾後犬毒ノ患症再
發セス○此藥ヲ用テ渴甚キ者ハ接骨花ノ泡劑ヲ
與ヘ臥床ニ溫覆メ微汗ヲ發シ且縹糲臥被ヲ更換

スヘシ○狂犬傷ニ是ヲ用ヒテ効ナク或死スル者ハ
服量些少ニメ功ヲ成スニ足サルカ或是ヲ用ヒ遲
クメ諸器血液既ニ烊崩シ挽回スルヲ能ハサルナ

リ○狂犬其他諸獸咬傷ニ因テ既ニ危劇ノ諸症ヲ

發スル者ハ此蟲ノミナラス羌菁。水銀及麝香龍腦

等ノ鎮痙藥亦良驗アルヲ諸名醫質驗ノ確說多シ

淑依叔

刺答尼亞

羅

蘭

形狀

李露

南亞墨加國名

等ニ產スルカラメリアドリア

ンドラ或云「テタ」ト曰フ灌木様ノ草根ナリ和蘭千百八
年始テ諸厄利輸スト云此草多枝分敷二三尺許。梭色ニメ葉
ナシ但細條ノ本ニ葉互生シ末尖リ鋸又ナシ葉及
細條。白色ノ毛茸被ヒ天鷺絨ノ如シ。花四瓣蛾形。四
雄蕊。三雌蕊アリ第四綱第三目萼ナク尖葉兩對ス。實大蛇
苺ノ如シ背ニ鬚様ノ尖刺アリ核小扁桃ニ似テ一
尖アリ○根數桿ヲ分チ細枝多シ句屈蔓延二三寸
ヨリ二三尺ニ至ル太拇指許。或云一指許外皮粗糙坼裂
黓赭色。皮質厚ク疏脆赭赤或帶黑色。中心木樣帶白
色。皮味苦微辛。香氣アリ煮ハ香多シ。細末ノ美嬌紅

ナルヲ上品トス。水。沸湯。燒酒等ニ浸シ。若ハ水煎ス
レハ赤色トナリ。茜根ノ如シ。剝篤^{ポツ}亞斯^{アス}ヲ加フ。レハ殷
赤色トナル。綠礬^{名撒^ラ兒末^ル}爾^ア扶^ス斯^スヲ。加フ。レハ黑色トナル。墨
汁ニ用フ。染匠是ヲ赤色ノ染料トシ。或赤葡萄酒ノ
色ヲ出シ。氣味ヲ醇厚ニス。水煎シ。若ハ浸劑トシ。貯
レハ黒塗生ス。此塗^ア。亞爾箇^{コレ}兒及銳烈燒酒ニ浸ノ溶
化セス。華爾斯質見^ハ。レス^{或云銳烈燒酒ニ浸メ丁幾}
質出^ハ爾斯單寧及沒食酸^{共ニ}。剤トシ水ヲ加フ。レハ濁テ
收濁質。香竄質ハ總テ保固強壯藥ノ基資トス。
試効根ヲ藥用トス。收濁苦味ノ保固強壯藥ニメ甚

夕幾那ニ近シ。但幾那ニ比スレハ味佳ク。胃ニ重滯
セス。虛弱ノ諸症ニ長服メ。胃腸ノ消化力ヲ妨ケス
間歇熱。諸脫泄。失血等ニ用テ。効力幾那ニ優^サリ。且健
胃ノ効殊ニ多キ。故ニ晚近。是以テ幾那代用ス。近
來幾那ハ上品少^ク或^ヒ偽品アレハナリ〇。凡^ハ強壯劑
ヲ用^フヘキ諸病。神經熱。腐敗熱等ノ保固強壯藥ヲ與
フヘキ症ハ服法製劑。幾那ノ如ク用^ヒテ。燉衝^ハ增發
セス。殊効ヲ奏ス。但藥力峻ナル故ニ。幾那ニ比スレ
ハ服量ヲ減スヘシ。大抵此末十五氏ト上好ノ幾那
末二十氏ト對當ス。或云頑固ノ間歇熱ニ。幾那末二

十氏宛用ル症ハ此末十五氏宛與テ驅熱ノ効。幾那ヨリ駛捷ナリ○間歇熱。其他往來發歇。又熱病ノ多ク幾那ヲ與テ駢ナキ症ニ此藥ヲ用テ毎常治駢ヲ誤ル。ナシ○間歇熱。傳染往來熱ハ後方ヲ與テ多ク治ス。

刺答尼亞驅熱散

胃、刺答尼亞根細末一弓、乾姜細末一弓。

右分テ十六服トシ一時若ハ一時半毎ニ一服。宛薄荷若ハ迷迭香ノ泡劑ニテ送下ス左ノ方亦良。

刺答尼亞姜橙糕

刺答尼亞、龍酸飲

右煉和メ糕トシ發熱ナキ時半時毎ニ一茶匙若ハ肉豆蔻大ヲ服ス○腐敗熱寒壞疽等。後方治駢多シ。

刺答尼亞龍酸飲

刺答尼亞越幾斯劑一錢半

古龍腦飲七弓與ハ稀硫酸即綠礬精名二錢

右調和シ二時毎ニ三匙宛服ス○神經感觸甚キ諸症。神經病人頭痛依剝昆塗利亞。癇症等ノ神經病ハ後方秀偉ノ効ヲ稱ス

外刺答尼亞·龍腦飲

刺答尼亞·越幾斯劑 一錢半

龍腦飲

補 七弓

揮發香竄精 二錢

右調和シ二三匙宛與ル一日三次○一婦人生平病弱。一日モ全康ナシ此越幾斯劑一味長服ノ強健ニ復ス○稟賦脆弱。纖維弛緩ノ諸病ハ左ノ劑良効アリ胃腸虛弱ノ症ハ孕礮酒石名第三錢ヲ加フ多汗ノ症ハ香竄精ヲ去テ綠礮精二錢ヲ加フ

刺答尼亞·香竄飲

刺答尼亞·越幾斯劑 三錢 蒸餾水 十二弓

泰康刺答尼亞·香竄丁幾斯劑

弓次出

揮發香竄精

二錢

鱗粟鹽頭膏貯出ニ鑄

右越幾斯劑ヲ水ニ溶シ丁幾斯劑香竄精ヲ加ヘ一時半或二時毎ニ二匙或三匙宛服ス○飲食消化難カ風氣痞滯或婦人無孕白帶下淋疾粘液漏泄或經久潰瘍等後方多ク驗アリ

刺答尼亞·健胃飲

一錢半

細基鹽

半錢

刺答尼亞·越幾斯劑

一錢半

瀉利塩

二錢

右調和シ二時毎ニ二三匙宛服ス。下利ス。風者瀉瀉去テ

刺答尼亞·丁幾斯劑

四錢

蒸餾水

七弓

名物考補遺

卷五

風雲堂藏

Kitasato Memorial Medical Library

利塩ヲ去ル。酸敗液腺腫痛風兼ル者ハ瀉利塩去テ鹹蓬塩二錢ヲ加フ。丸藥ヲ好ム者外後方良

刺答尼亞鹹蓬丸

根濟一錢半

鹹蓬塩半錢

刺答尼亞越幾斯劑一錢半

鹹蓬塩半錢

葛縷子油或茴香油十五滴

右調和シ舍利別ヲ加テ三十九丸シ二丸宛服スル
早旦三次或三丸宛兩次服ス。胃虛弱ニメ感觸甚
キ症ハ此根ヲ浸劑トシ服ノ尤良散劑越幾斯劑
比スヒハ消化シ易シ。○體稟虛弱飲食消化シ難ク
痞氣苦滿。胃痛。胃痙。大便滑泄。下利等。胃腸感動シ易

キ症ハ左ノ二方。苦味香竄收濇ニメ効力。諸健胃劑
ニ勝レリ

刺答尼亞香竄丁幾劑

刺答尼亞根搗碎者三弓

白桂搗碎者二弓

燒酒二北

右硝子壝ニ内レ浸ス。十日濾テ滓ヲ去リ二三匙
宛水少許ニ加ヘ服スル。日三四次。水煎ニ式ハ古

刺答尼亞丁幾劑複方

刺答尼亞根搗碎者三弓

橙皮搗碎者二弓

攝爾扁答利亞名四錢

雜腹蘭

一錢

燒酒

再餽者
二比

右硝子壠ニ内レ浸ス一十二日。濾シ貯フ。服法同前。
此劑効力峻ナル故ニ幾那丁幾劑複方鏡ニ比スレ
ハ服量ヲ減スヘシ○胸水。腹水。肢節水腫ニ左ノ方
ヲ用テ衰弱ヲ強壯シ小便ヲ利シ總テ險重ノ水腫
ニ治驗多シ

刺答尼亞海葱飲

刺答尼亞越幾斯劑

二錢

海葱丁幾劑名

一錢

甘消石精名揮發香竄精名

各二錢

蒸餾水名

七弓

刺答尼亞香竄丁幾劑

前出
四錢

右調和シ三匙宛服スル一日ニ三四次○尿道粘液漏
泄過多。淋瀝等ハ此越幾斯劑殊効アリ○尿崩ハ後
方屢良驗ヲ稱ス

刺答尼亞收斂飲

刺答尼亞越幾斯劑一錢

消石精

三錢

刺答尼亞香竄丁幾劑名前出

四錢

蒸餾水名

七弓

右調和シ二三匙宛服スル一日ニ數次○經久下利
滑泄等ハ左ノ劑ヲ用テ多ク治ス

刺答尼亞・固腸飲

刺答尼亞・越幾斯劑 一錢半

刺答尼亞・香竄丁幾劑 六錢

蒸餾水 七弓

右調和シ二時毎ニ二三匙宛服ス○一僧尼久ク下利ヲ患ヒ諸藥驗ナク虛羸ノ甚夕危險ニ至ル。此越幾斯劑ヲ服ノ下利漸ク止ミ回復ス○此藥血液ヲ收斂シ失血諸脫泄ヲ治スルト篤爾ル面室刺ミカツラ拳參根鏡ニ勝リ殊ニ越幾斯劑トシ用レハ効力諸植物ノ收斂藥ニ超絶ス○吐血ハ乳汁ヲ用テ血ノ酷厲

毒ヲ和解ノ血脉ヲ刺破セサラシメ且滋養ス但咽喉潰瘍或聲嗄ヲ兼ル症ハ刺答尼亞ア用ヒ乳汁ヲ多服ノ尤効アリ。此越幾斯劑ハ殊ニ斂血ノ峻効アリ。左ニ一二ノ治驗ヲ舉ク○一少年十二歳夥々口鼻ヨリ失血シ衆藥驗ナク連縣ニ晝夜精力極テ虛脱シ又劇々嘔吐シ危篤ニノ死ニ瀕シ乃此越幾斯劑一錢ヲ取テ水二弓ニ溶シ蒸餾醋少許ヲ滴多加與レハ其血頓ニ止ミ三月中平復ス○一坊貢ノ婢月經延縣止マサル。既ニ二年發熱ノ虚憊シ肢體極テ羸瘦シ傍人ノ扶掖ニ非レハ舉動スナル能

ハス食進。又ス諸藥驗才外衆醫不治トス。乃此越幾斯劑一錢ヲ與テ經血稍減ス。第三日又半錢ヲ與テ逾輕差シ稍食ス。第六日又半錢ヲ與ヘ。第九日狀ニ倚テ步行シ以後右ノ如ク此劑ヲ與テ熱解シ食進ミ。一月許ニメ回復ス。○一婦人崩漏劇クメ止サル。十八日大ニ虛憊ス。阿芙蓉等斂血ノ諸劑微功ヲ得ス。因テ此越幾斯劑前法ノ如ク一服與テ崩血止ミ。翌日患婦能ク步行シ第五日ニメ全治シ以後康健ナリ。○產婦脫血。赤白帶下。嘔血。創傷出血等治驗甚タ多シ。失血疼痛ヲ兼ル者ハ其血止メハ疼亦治ス。

屢試ルニ脱血ニ因テ癉急痛ヲ發スル者多シ。○諸脫泄。失血劇クメ渴アリ。多ク飲液ヲ服スル症ハ後方良効アリ。○本草綱目十三處以土八味散。散以土八味散。

刺答尼亞潤涼飲

平陰

二

散

香薷八味散

八味散

香薷散

八味散

香薷散

八味散

香薷散

八味散

香薷散

八味散

香薷散

八味散

刺答尼亞越幾斯劑

末

一錢

芭消根

一錢量

一錢

量

一錢

量

一錢

量

一錢

量

一錢

量

一錢

量

一錢

右越幾斯劑ニ芭消ヲ和シ文火ニテ溶解シ醋ヲ加一服正ス。○此越幾斯劑ハ華爾斯質ニ非ス。ノ苦味ヲ帶ヒ健胃名効。幾那ノ如クメ收濁スル故ニ血竭ス用ル諸症ニ脣服外敷シ。斯ノ如キ謹謨華爾斯ノ

諸藥ニ勝リテ良効ヲ奏ス。又收濁藥ノ害アリ。諸症モ是ヲ用ヒ害ナシ。凡歛血藥中此劑ノ如キ過誤タク峻効アル者。植物中。比スヘキ者ナシ。從來醫家此劑ニ諸失血ニ質験シ殊効ヲ得ル者既ニ八百餘人。然ハ是ヲ用ヒ験ナキ者ハ恐クハ服量一錢ニ足ラサルナリ。又亞細亞寒熱病中一錢半。

越幾斯劑 **服量** 大抵半錢ヨリ二錢マテ。香竈ノ露水ニ溶シ用フ〇或云十二歳以上ノ者ハ一刀ヨリ二刃ニ至ル。大人ハ半錢ヨリ一錢マテ水少許ニテ送下ス。或丸藥トシ五氏ヨリ十氏マテ日兩次服ス〇

失血ハ水若バ玫瑰水鏡ニ溶シ毎服越栗失爾赭篤立沃利名或蒸餾醋十滴ヨリ二十滴マテ加用フ〇失血諸脫泄ハ一錢ヲ一服トシ速ニ止ム。効大キ者飲再服ス。三服用ル者稀ナリ。少許宛數用ヒハ捷効ナシ。或一服用ヒ治ノ後再發ヲ防外爲。一服若ハ其餘王用ルトアリ。吐血ノ效ヲ兼ル症ハ間再服ス〇或失血止後此劑每朝一錢宛二日與ヘ翌朝ハ半錢ヲ與ヘ其後ハ一錢ノ四分一宛與ヒ再發ヲ防外者アリ。此劑久服スレバ毫モ害ナシ。一男子外傷ニ因テ吐血。此劑與治後。四個月服メ毫モ

妨害ナシ。脱血。頑固ノ諸脱泄劇ク止サル症ハ
此劑三錢ヲ一服トシ與ル。アリ。此類ノ劇症ハ煎
劑泡劑ニテ速効ナシ。○此根ノ効力ハ專ラ其皮ニ
在リ。中心木様ノ質ハ効ナシ故ニ全根ニ錢ヲ煎劑
泡劑散劑トスレハ皮一錢ノ効アリ。皮一錢ヲ用レ
ハ越幾斯劑半錢ノ効アリ。然バ全根ノ煎劑泡劑散
劑ハ越幾斯劑四分一人効アリト知ルヘシ。○嘔吐
アル症ハ越幾斯劑一錢ニ水ヲ濕メ丸藥トシ一服
食ス味ナクノ服シ易シ。

越幾斯劑

製法 健質亞那越幾斯劑

名ト同シ 涼

又法 根ヲ採リ洗剗之冷水ニ浸ス。一夜磁鍋ニ内レ
火ニ上セ煮テ濃赤色トナルニ至リ濾テ液ヲ取り
又其滓ニ水ヲ加ヘ煮テ赤色出ルニ至リ濾テ前液
ト合シ毛布ヲ重子テ濾シ火ニ上セ煎熬ノ稀蜜ノ
稠トシ是ヲ盤ニ寫シ大陽ニ暴シ乾固メ破碎スヘ
キニ至レハ上好ノ盧會ノ如ク明淨透亮ニノ硝子
矣如久殷赤色。上好ノ血竭ノ如シ明淨透亮ニノ硝子
錯ス。然ニ血竭ニ比スレハ疏脆ニノ苦味ヲ帶ヒ甚
收斂メ齒ニ粘著セス火ニ投スレハ熔ケスノ焚燒
シ華爾斯ノ臭ナキヲ以テ是ヲ辨スヘシ。○生根ニ

テ製スレハ塩質速ニ水ニ融解シ。久ク火力ヲ假^ラス
メ藥氣出ツ。乾根ニ比スレハ効力峻ナリ。乾根ニテ
製スレハ時ヲ費シ精細ニ注意セサレハ透亮光潔
美赤色トナラス或久ク煎熬スレハ炭素焦質ヲ生
ノ透亮ナラス性効脫失ス或急煎スレハ亦焦質生
ノ赭黒トナリ或鍊器ヲ用レハ此根ノ没食酸鍊氣
ト抱合ノ黑色トナル○此劑ヲ製スルニハ水六倍
宛加テ前法ノ如ク兩次煮ルト佳トス數回煎熬シ
或過半煮減スレハ塩質收濇苦味多ク脱シ効力劣
弱ニノ多服セサレハ験ナシ○此劑燒酒ニハ最多

ク溶化ス蒸餾水ハ是ニ次ク醋ハ又是ニ次ク但此
三種ノ液モ熱スレハ尤^モ多ク溶化ス。沸湯ハ殊ニ多
ク溶化シ効力亦多シ○散劑。浸劑。煎劑。丁幾劑モ亦
用テ多ク良効ヲ稱ス

刺答尼亞。散劑。乾根ヲ破碎シ中心ノ木質ヲ去リ極
細末トシ三錢ヲ一服トス或十氏ヨリ一刀若^ハ半
錢マテ日數次服ス

刺答尼亞。浸劑。乾根一弓沸湯一斤。浸ス丁十二時緻
布ニテ濾シ滓ヲ去リ一盞宛服ス○失血諸脫泄ノ
劇症ハ左ノ煎劑亦捷効アリリ外ニ大毒無^ハ也

刺答尼亞煎劑此根四錢ヲ取り水二升ヲ加へ煮減ノ半升トシ濾テ淳ヲ去リ醋二錢ヲ加へ一服トス緩症ハ分テ二三服トス。或沙糖四錢ヲ加甘味トシ與フ

刺答尼亞丁幾劑

刺答尼亞根搗碎者
三弓燒酒二升

右硝子壠ニ内レ蓋封シ浸ト八日濾テ淳ヲ去リ貯

刺答尼亞收斂丁幾劑

一名刺答尼亞精
二升

刺答尼亞越幾斯劑四錢燒酒四弓

蒸餾醋

八弓

右調和シ小頸硝子壠ニ内レ蓋封シ焼處ニ置キ浸
ト三日濾テ淳ヲ去リ固封シ貯フ○口中歛頸ノ潰
瘍腐爛ヲ治シ齒牙弛動ヲ強固スルニ此越幾斯劑
ヲ水ニ溶メ含漱シ或此根ノ細末ヲ摻メ速効アリ
此藥ハ諸器血脉ノ緩弛ヲ收固スレハナリ○齒斷
腐爛ヲ治シ齒ヲ淨潔強固スルニ前説ノ丁幾劑二
方共ニ口中ニ含テ殊効アリ又左ノ漱劑ヲ用テ良。
是ヲ以テ沒藥丁幾劑ニ代用ス

刺答尼亞漱方

四錢

刺答尼亞越幾斯劑四錢蒸餾水

十弓

右越幾斯劑ヲ水ニ加ヘ火ニ上セ溶化ノ醋ヲ攪和シ一匙宛口中ニ含ム一日數次○此根ノ細末收斂メ美赤色ナルヲ以テ揩齒藥トシ或乾根ヲ牙杖トシ齒ヲ揩テ強固淨潔ニス外敷纖維弛弱經久潰瘍水棉樣腫失苟兒陪苦ノ斷腐爛出血等ニ外敷メ治ス○產婦脫血月經崩漏痔血過多ニ後方ヲ患處ニ擦メ速効アリ

刺答尼亞收斂擦方

刺答尼亞越幾斯劑

三弓

鉛粉

二弓

明礬

四錢

右極細末トシ研合ノ左ノ藥ヲ加フ

玫瑰油

一丸半

的列竝底那

二弓

蜜蠟

三弓

右文火ニ熔シ火ヲ下シ刺答尼亞鉛粉明礬ノ末ヲ加ヘ手ヲ住メス攪和シ冷ルニ至ル○刺絡或水蛭ヲ貼シ或齒ヲ拔テ出血止サル症ハ此越幾斯劑ニ根ノ末ヲ研和シ其痕ニ貼シ暫ク壓定スレハ出血即キ止ム

呂依利福涅

收濇藥

按ニ刺答尼亞吉諭謨等ハ收濇藥ニ屬

ス此藥類ヲ統括メ三種ニ分ヅ左ノ如シ

單收濬藥此藥類ハ收濬質尤居オホ

食子。阿煎藥。拳參^{共二}篤爾^{ハル}固室刺^ラ刺答尼亞^{アキ}吉諭護

謨^{共二}山物ハ硫酸。消酸精^消石鹽酸。蘇魯林^{スロリ}蘇魯林^{スロリ}曹達^{ソダ}

蘇魯林^{スロリ}加爾幾明礬。鉛糖。密陀僧。動物ハ磷酸^{共二}等^{名補}

揮發收濬藥收濬質ニ苦味質。揮發油ヲ含メリ故ニ

稍脉管。神經ヲ衝動メ收濬スヘキ症ニ用フ卽チ水

楊梅根。玫瑰花^鏡撒爾非亞^{サルヒア}名等ノ如シ

苦味收濬藥保固強壯藥中ニ舉ル收濬苦味藥ナリ

卽^ナ楊皮。七葉樹皮。幾那^{共二}烏霍烏爾失^{ウハルシ}等^補ナリ

收濬藥性功總說

植物ノ收濬質ハ沒食酸^{没食子他總テ性其}味收濬ノ草木及單寧^{原名ロイストフ}ヲ以テ基資トスニ^此類ニ含ム酸性^リ分析術ニテ是ヲ取ル詳說アリ○收濬藥ハ脉管筋膜等總テ柔軟ノ纖維ヲ收固牽縮メ强硬ナラシム。是ニ因テ生力憤起ノ諸器ノ張力増發ス故ニ諸管纖維弛緩虛弱ヨリ發スル諸病或精力脫缺諸器虛損メ發スル吐血。嘔吐。尿血。下血。婦人崩漏。白帶下。遺精。尿崩。遷延下利等或神經熱。腐敗熱。胃腸熱等ノ病毒汚物ヲ驅除メ後尚飲食消化ノ機力アル症^ナ治ス。又間歇熱ハ是以テ一奇藥トス。或諸筋及神

經ノ虛脆罷弱ヨリ發スル擣掣痙攣ノ諸症。或諸腺
病_{腫等}瘻癰結。佝僂病及瘦削消耗病ヲ防キ治スルニ用
フ○多血壯實ノ焮衝病ハ此藥害アリ。然ニ遷延病
トナリ發熱疼痛攣急等ノ症ナク虛憊ノ諸竅ノ排
泄過多ナル症。或傷冷毒ノ遷延胸肺病_{欬嗽喘}虛罷
ノ痰唾過多ノ症及遷延ノ焮腫眼ニ効アリ諸失血。
運行過盛多血ノ症。或其宿疾トナリ時々發スル症。
或失血ニ因テ病毒分利スル症。其他諸般ノ漏泄經
久ニメ宿疾トナリ是ヨリ病毒分利スル症ハ脫泄
過多ニ非ハ此藥ヲ禁ス。或腹内諸器頑固ノ壅塞

アル症亦是ヲ禁ス○外敷ノ諸脱泄失血纖維弛虛
ノ潰瘍子宮腔ノ墜脱脱肛動脈貌僂屈靜脉腫ヲ治
ス○凡收濇藥ハ酸化金屬後出諸鍊劑ボツトアス刹篤亞斯石灰
膠類雞子白等ト合シ用ハ收斂質ノ性効脱失ス

百屈林 ハバ・ペキリム ペキリス ピキリム ピダリム
トランテンヘラ・ビキリム ロベキリム・ボーラシ
ラシリセボーラン

雄蕊一雌蕊第
九綱第一目形扁圓ニメ長大殆ト一母横徑
一母半横徑許
一母横徑厚サ一分許。一面ハ圓ク隆起シ一面
或云

ハ窪凹或云大ナル扁桃ノ搗滑澤ニメ重シ。外凹薄

ニ剖割スルカ如シ

皮被ヒ微皺アリ。

赭色裏淡灰色。硬固ニメ纖條質ナ

ラス肉豆蔻ヲ破碎スルカ如シ。嚼テ柔脆。氣味香竈ニメ肉豆蔻ト薩撒弗刺斯ヲ混スルカ如シ。此仁一

比ヲ搾レハ油一弓半許出ツ。白色。乳酪ノ如ク。香氣

薩撒弗刺斯ノ如シ○偽品アリ。眞品ニ比ス。レハ半

大ニメ外凹皺アリ。淡白色。香氣微ニメ苦味多シ○

此樹巴辣歪伯西兒共ニ南亞墨利ヨリ輸ス

試効揮發衝動藥トス。薩撒弗刺斯ノ如キ香竈質アリテ甚夕健胃ノ効ヲ稱ス。胃虛及酸敗液ヨリ發ス

ル胃痛ヲ治ス○遷延下利ノ閉止ノ害ナキ症ハ是ヲ用ヒ殊効アリ。赤痢ハ胃腸ヲ淨刷メ後是ヲ用テ多ク治ス○疝腹痛及虛弱ヨリ發スル白帶下ノ甚キ症ニ散劑トシ用ヒ經驗ノ一藥トス○凡香竈藥ノ効アル諸症ニ的當ス。散劑ヒシ一錢ヨリ漸ク加テ三錢ニ至ル。或半錢ヲ一服トシ日數次用。燒酒等ニ浸シ用ヒ殊ニ効アリ

涅拔

華福

傑膾弗魯伊

「ゲラフロイア・ミリナメシシス」羅

「ゲラフロイ・バスト」又「ユリナームセ

「ダルム・バスト」蘭

形狀 南亞墨利加洲ノ須里那模

地ニ產スル樹皮ナ

リ其葉長橢滑澤鋸齒ナク皂葉狀ニメ十五對許莖枝ニ排列ス。葉本ニ曇黃色ノ蛾形花稠穗ヲ爲シ長サ三四寸許。萼五出。短梗アリ。嫌フヘキ臭氣散漫ス。十雄蕊分レテ一雌蕊ヲ抱ク第十七綱 花後卵圓形ノ核果梅類 李ヲ結フ。黃綠色。扁桃ニ似テ毛茸アリ。肉微黃色。軟ニメ微甘。嫌フヘキ臭アリ。核扁圓。裏白仁アリ。味收濬○幹及大枝ノ皮ヲ取ル。潤大或云長短 潤狹齊シカスニ厚ク或云厚薄一外面白色ニメ薄キ苔被ヒ其下ニ帶黑赭色ノ膚皮アリ。皮質ハ柔韌。纖維緻密

ニソ曇赭帶黑色。裏面白鑄黃色。香氣微ナリ。新皮ハ嫌人キ臭アリ。味微苦ニメ簽ヲ帶フ。久ク嚼ミ含メハ苦味多シ久ク貯レハ氣味共ニ消散ス○一種牙埋ヤマ加カ北亞墨利加洲ノ島名リカノ傑膾弗魯伊アリ。外面白色ニメ綠黃色ノ條理アリ。裏面白色。味苦簽ニメ甘ヲ帶ヒ粘テ臭氣アリ。是須里那模ノ樹ト種類異ナリ。殺蟲ノ効アレ氏用ルト稀ナリ○陳久ノ者ハ氣味脫ノ効ナシ或此皮ニ似タル葛斯加栗刺ノ種類ヲ以テ偽リ販ク者アリ。是ヲ用レハ甚夕害アリ。宜ク審ニ新鮮ノ眞品ヲ擇ムヘシ。ハ根ニ陳久者有之。味酸辛也。

試効此皮殺蟲ノ奇効アリ殊ニ蛇蟲ヲ殺シ驅泄ス
蛇蟲條蟲毛亦効アリ○此藥峻下ノ効力強故ニ時
下劑ヲ兼用スレシ○此越幾斯劑ヲ丸薬トシ十
五氏マテ可服トシ或對症ノ劑入加用フ○蟲ヲ驅
泄スルニ左ノ如ク製シ用ヒテ治驗多シ良也此藥
傑膾弗驅蟲飲。裏面黃色。和苦參ニ。大青大帶白
傑膾弗魯伊ニヨウ。燒酒。四兩。大蒜。一瓣。下劑
苦和水。二升。

右調和シ文火ニ煮テ殆半ヲ減シ浮ヲ去リ初日ハ
半時毎ニ二弓アマツ宛服スル。三日三次。大抵大便三次通

ス。翌日用ルヲ右ノ如クノ吐シ若ハ粘液ヲ下ス。第
三日ハ半時毎ニ一茶碗宛服ス。吐下ノ蟲及粘液ヲ
驅出ス。第四日ニヤシ薬刺巴ト加羅蔑兒ヲ與レハ殘餘
ノ蟲ト粘液ヲ通泄ス。是ニ由テ頑固ノ蟲症ヲ治ス
○此藥ニ他ノ殺蟲藥ヲ加テ丸薬トシ用ヒテ驅蟲ノ
殊効アリ。喻後方ノ如シ。且コ漢ニ附。此藥之效
大

傑膾弗。纈草丸

傑膾弗魯伊末。紅角纈草根末各三錢。大青大帶白
乾白撒兒末爾拔斯名。一錢。

健質亞那。越幾斯劑名。二刀。

右研和メ三氏ヲ一丸トシ甘草末ヲ衣トシ一時半
毎ニ四丸。尚其症ニ隨ヒ增加シ用フ

服量 散剤トシ小兒ハ五氏ヨリ半氏テ一服トシ
大人ハ一刀若バ半錢宛用フ。此藥動^モスレハ惡心嘔
吐ヲ發スル故ニ初少許宛用ヒ漸々加^フヘシ^ク或云漸
惡心嘔噦發ス 散剤ヲ用テ瀉下スル者アリ○煎劑
ル^ヲ度^トス

傑膾弗魯伊越幾斯劑 製法 健質^ア那^ナ越^キ幾斯劑^ス名ト

同シ 涅^ニ 此皮八弓ヲ以テ越^キ幾斯劑六錢餘出ツ。味苦

拔^ハ

簽收濬ス

傑膾弗魯伊丁幾劑 涅^ニ

涅^ニ

製法

傑膾弗魯伊^ハ搗碎者

燒酒

二十度者

八弓

右硝子壠ニ内レ固封シ爐邊ニ置^フ六日濾テ渣ヲ

去リ聽用ス

涅^ニ 福^ハ 華^ハ 淑^ハ 依^ハ 院^ハ

此不刺^ハ燒酒^ハ和辛苦^ハ

太^タ那^セ設^セ黜^ム謨^{タナセタム} 佐^ルガ^レ羅^ロメ^イ子^ハ蘭^ハ

形狀 此草圓莖二三尺許。直生多枝硬固ニノ毛茸ア

リ。葉大ニメ長タ。芹葉狀互生シ深ク缺裂ス邊鋸齒

アリ 黑綠^ハ或云黃滑澤臭氣甚^シ味苦ク稍香竄様莖

綠色

枝頭扁圓鱗狀ノ苔萼生シ筒様ノ小黃花或稀ニ白花ア

○攢簇ノ複花ヲ爲シ瓣端三叉。五雄蕊連匝タ一雌

蕊ヲ園ム

第十九綱 第一日

莖頭分テ繖ヲ爲ス。

佳好ノ苦味

アリ。花後細長ノ子生シ微勾深窪白毛アリ。此子多
ク揮發油ヲ含ミ香竄様ニメ不佳ノ氣アリ味辛苦。

熟スルハ黒色トナル。根木様多鬚歷年枯レス。歐羅

巴洲諸國ニ生ス○蒸餾スレハ苦味精微ノ油出ス。

此草一比ヲ以テ越幾斯劑二三弓ヲ製ス

試効花穗子ヲ藥用トス。性刺戟衝動メ殺蟲ノ峻効
アリ。子殊ニ蛇蟲ヲ殺シ攝絲施那名シノ如シ○溫煖

開達健胃止痛防腐驅熱破氣ノ効アリ。尿道ヲ淨刷
シ小便ヲ利シ汗ヲ發ス○水煎シ服メ水腫ヲ治シ
月經ヲ通ス○間歇往來熱粘液腫萎黃病處女病依
剝昆塙兒黃疸傷冷毒痛ヲ治ス○子ヲ採リ細末或
浸劑煉膏トシ用テ蟻蟲ヲ殺シ是ヨリ發スル搐掣
様ノ諸症ヲ治ス或吉利詞テ翁兒トシ施ノ良

服量花穗ヲ散劑トシ一刃ヨリ二錢ベテ一服トス。
或二三氏ヨリ一錢ヲ一服用フ。或泡劑
若ハ煎劑トス○浸劑ハ四錢ヲ取リ水六弓或八弓
ニ浸シ滓ヲ去リ服ス○太那設點謨油ハ內服外敷

共ニ蟲症ニ奇効アリ。二滴ヨリ五滴テ飲液ニ點服ス。外敷ハ適宜ノ軟膏ニ研和ス○左ノ軟膏ヲ腹部ニ擦テ驅蟲ノ峻効アリ。一日三服用。效速良。

驅蟲軟膏

牛膽石鹼勿擣祭亞者各一錢

太那設黒謨油適宜

右研和メ軟膏トス

太那設黒謨油製法

薄荷油製法

○此草ヲ燒酒ニテ蒸餾ノ精ヲ取り傷冷毒痛ニ丹眼外敷メ偉効ヲ稱ス○此葉ニ牛膽ヲ加テ研和シ

臍ニ貼ノ蟲ヲ下ス。葉ノ煎劑一二匙宛兼用メ尤良
○琶布トシ外敷ノ寒腫ヲ消散シ肢節閃挫筋强硬及傷冷毒痛ヲ治ス

涅拔叔淑窟

伊里斯弗魯連底那

羅イレオス・フロレンシエナ

羅蘭

形狀此草數葉叢生シ。長狹ニメ末尖綠色。葉間長莖

ヲ抽キ。莖頭二花ヲ開キ六瓣白色或黃色。每瓣互ニ

内外ニ勾屈ス。三雄蕊一雌蕊及黃色ノ鬚毛アリ

第三

綱第
一目花梗ナシ○根塊節様ニメ差扁ク拇指大ニメ
固ク重シ黯黃色ノ粗皮及鬚根ヲ削リ去テ乾シ輸

ス。外面白色。裏淡黃。微辛苦。香竄ニメ莧菜花ノ香氣
アリ。多年枯レス。三年ヲ經テ根ヲ採ル。生根ハ辛辣
乾ケハ氣味減ス。○意太利亞等歐羅巴洲ノ南地。殊
ニ弗魯連底印ヒシネンジン地ニ多外培栽ス。○蒸餾ノ佳香ノ露
水ヲ取ル。精微竄透。人油少許浮ミ膜様トナル
試効 根ヲ用フ。生根ハ瀉下ス。乾根ハ鑽透稀釋疏解
淨刷ノ効アリ。豁痰藥トス。殊ニ粘痰多キ欬嗽喘急
等ノ肺病。經久ノ胃寒欬ニ用テ粘液ヲ稀釋シ吐痰
ヲ進メ小便ヲ利ス。但煥衝病ハ害アリ。○內藏粘液
過多ノ症。殊ニ小兒疫欬ニ此末四氏ニテ一服トシ

用ヒ治ス○小兒腹寧痛ニ制酸藥ヲ加ヘ煎劑トシ
用ヒ良○細末トシ沙糖ヲ和シ或ア亞刺比亞趨謨漿
ニ和シ或和胸劑ノ舍利別ニ加ヘ或硫黃華甘草末
ヲ加ヘ或丸劑トシ用フ○大人ハ一刀ヨリ半錢ニ
至ル。小兒ハ五六氏寃用フ○汚穢ノ潰瘍惡厲ノ疥
癬ニ此末ヲ外敷メ膿ヲ排ヒ淨刷メ治ス

蘇格爾需謨

テウク リウムスコルギウム
キートルロイクガマソルデル蘭

華依
涅叔
密叔

形狀此草。方莖叢生一二尺許。枝多シ下莖ハ地ニ塌ス。葉橢圓。皺糙毛茸多ク柔ニメ灰白色。鋸齒刻缺ア

リ梗ナク莖ニ對生ス。生葉葱蒜臭アリ味苦シ乾ケ
ハ臭氣消散ス。莖枝ノ葉本ニ二個若ハ四五個ノ小
唇花攢生シ上唇ナク下唇ニ又中辨長大淡紅或淡
紫青色。四雄蕊ニハ一雌蕊アリ第一目
第十四編萼筒様短

紫青色。四雄蕊

二 短シハ一雌蕊アリ 第十四
第一目

第十四
第一目

四
銅
非

粵簡樣短

試効 葉ノ藥用トス揮發ノ油鹽ヲ含ミ鑽透稀釋收濁。防腐殺蟲。發汗。利尿。通經ノ効ヲ稱ス。○泡劑トシ服メ病毒ヲ皮表ニ發越シ疫毒及痘瘡斑疹ヲ驅出ス。○粘液ヲ淨刷シ痰ヲ豁シ肺瘍欬嗽等胸肺ノ諸

症ヲ治ス○下利ニ用テ腸人弛弱ヲ強壯ス効力撒
爾非亞ニ似テ收濇ノ効微ナリ○煎劑泡劑浸劑十
シ或丁幾劑トシキノ

蘇格爾需謨丁幾劑

蘇格爾需謨越仙劑并同

製法

蘇格爾需謨 乾葉通

通宣赤燒酒六度

敷ノ疼痛及腐敗ヲ遏レ一良藥トシ又毒蟻刺咬ヲ
治ス。蒸湯藥トシ汚穢潰瘍ヲ淨刷シ琵布トシ貼メ
疫腫ヲ消シ腐敗ヲ遏メ寒壞疽ニ効ト稱。泊涅依伍
叔華叔僕

疫腫ノ消シ腐敗ノ遏メ寒壞疽ニ効力稱

泊淑
涅華
依叔
伍僕

麻爾羅歇

ル・ロ・ハ・ム・レ・ル・ス・ル・ガ・レ・ロ

タ・フ・テ・ア・ン・ド・ル・ン・蘭

形狀此草方莖叢生。一二尺許。數枝々分毛草アリ。

灰白色。葉橢圓皺糙。淡綠。背毛草多々白粉アル如シ。

邊鋸齒アリ莖枝ニ對生ス。葉本ニ筒様ノ白唇花攢

生シ土唇分々直立ス。四雄蕊ニハ一雌蕊アリ四綱第十一裸子アリ結ス。鬚根多シ。花葉味苦。鹹又帶上香氣アリ
或云微麝。原野路傍ニ生ス。經年枯レス。**試効**葉花莖共用。苦味竄透シ微收濁ス。解凝ノ一

藥トシ腹藏ノ壅塞ア疏解ス。○粘液ア稀釋シ汗ア

發シ小便ヲ利ス。○粘痰多キ喘急。胸肺諸症ニ用テ
粘液膠痰ヲ疏解淨刷ス。○胃寒欬嗽。勞欬吐血等ヲ
治ス。○月經稀少及經閉ヲ通シ產婦ノ瘀血ヲ下ス
○內藏硬結腫。肝脾子宮ノ壅塞ヲ疏通シ子宮衝逆。
依刹昆垤兒。黃疸。胸脇痛ヲ治シ蛇蟲ヲ殺ス。○越幾
刺劑トシ半刀ヨリ一錢ニ至ル或煎劑浸劑トス
外敷ノ疥癬ヲ治シ殊ニ乾癬禿瘡。侵蝕瘡。潰瘍ヲ治
ス。○琶布トシ貼ノ熱壞疽ヲ治シ婦人乳房結核硬
腫ヲ疏散ス。

越幾斯劑名ト同シ

依叔
涅華
叔僕

鷄矢薑堵大○
今○蜀本十全眼人燒製取大者之粉入酒取諸外敷
於爐火微燃火候之參二株熟末撒。勿燒盡。勿熟未熟
快慢半分半候。一處半生。以灰箇清髮際。次
如中濃型染。黃麻油。研成膏。治癩蟲之效。○效慢
○今蘇更該難。細研于宮火壅塞。或難解之于宮衝多
病大○此聖解之又豎體。以服之。急散人體。又不
許藥懸火。或稱解毒。○胃寒丸。亦然。其效甚

