

西遠

醫方名物考補遺

卷六

×

e 16

F 5
I-19

葉26


499.2
Em-6
6

No. 1467
R. 16



富士川文庫

3324



遠西醫方名物考補遺標目

卷六

安質沒扭酒

鹿琥精

民埵列利精

龍腦飲

耶蔑斯驅熱散

沙別爾扶驅蟲油

斯必竭里亞

經驗說

十則



名物考補遺

卷六

標目

風雲堂藏

斯必竭里亞驅蟲飲

歇爾拔斯屈謨

治例 四則

歇爾拔斯煎

坎百設水

老利兒結爾斯

老利兒結爾斯水

解凝化毒飲

解凝疏腺飲

遠西醫方名物考補遺卷六



遠西醫方名物考補遺卷六

榛齋先生譯述

男 宇田川榕 榕菴校補

安質沒扭酒 扶云安質沒扭酒ハ近

製法

葡萄酒精一北

右研和之硝子壘ニ收メ固封ニ貯フ

試効 催吐發汗豁痰解凝ノ良藥トス

○吐藥トス

粘液留液ヲ吐シ蒸氣ヲ發メ傷

冷毒ノ焮衝ヲ解散ス。小兒ハ一茶匙宛頻々ニ與テ
 吐スルヲ度トス。○發汗劑豁痰劑トスルニハ二月
 ヲリ一錢ニテ一服トス。蒸氣及汗ヲ發シ痰ヲ豁シ。
 熱病或遷延病。胃寒傷冷毒等。蒸氣壅塞ヨリ發スル
 諸症。欬嗽。胸肺焮衝様ノ症ヲ治ス。○劇キ欬嗽。胸脇
 焮衝等ノ痰ヲ豁シ呼吸ヲ利シ蒸氣ヲ發メ焮熱ヲ
 降鎮スルニ此藥ヲ後方ニ滴シ加テ殊効アリ。

豁痰鎮嗽飲 欬嗽。胸脇焮衝ノ諸症ヲ寛解ス

乙百加格安那末 十氏 亞刺比亞護謨末 四錢

西醫 阿芙蓉液 二十滴 屋施菟兒 二弓

扁桃乳 或罌粟子乳 六弓

右調和シ一時毎ニ二匙宛服ス。○焮衝様ノ痛風。傷

冷毒痛ハ安質沒扭酒三十滴。舍電阿芙蓉液 十五

滴ヲ合和シ毎夜臨卧ニ一盞ノ水ニ滴シ服メ捷効

アリ。或云頑固ノ下利。乾欬。傷冷毒痛ハ此劑ニ阿芙

蓉液四分一ヲ加ヘ服メ治ス。○丹藏諸器ニ粘液壅

塞セル症。肝脾腸間膜腺ノ閉塞。諸腺病。痛風。傷冷毒

痛。頑固經久ノ瘡瘍等ハ此藥ヲ解凝劑トシ初少許

宛服メ漸ク其量ヲ加ヘ惡心ヲ發スルニ至レハ服

量ヲ減シ長服メ効アリ。或雙鸞菊。越幾斯劑。朴窟

福烏篤丁幾劑 扑窟福烏篤ノ華爾斯ヲ二十度ノ燒酒八倍ニ浸シ煖處ニ置テ六日渣ヲ

去リ阿芙蓉液等ニ加用フ 頑固惡厲ノ皮病癩病

失苟兒陪苦ノ瘡瘍ハ此劑八滴ヨリ十滴ニテ榆皮

煎 一茶碗ニ加ヘ服スル日三次敗血惡液ヲ排

除シ治ス ○壯熱炊衝性ノ熱病ハ効アリ

耗熱腐壞性ノ咽喉潰瘍ニハ大害アリ或劇ク下利

ノ虛脱セシム **服量** 小兒ハ三四滴宛用ヒ大人ハ二

十滴ヨリ漸ク加ヘ惡心嘔吐スレハ服量ヲ減シ或

暫ク休ム **利** ○

鹿茸鹿角 鹿茸鹿角 鹿茸鹿角

鹿琥精

一名鹿琥漿 スピリタスコルヌセルヒソク シナ左スルモニアア

製法

琥珀鹽 名

一馬

蒸餾水

八馬

鹿角鹽 名

適宜

右硝子壘ニ蒸餾水ヲ入レ琥珀鹽ヲ加溶シ鹿角鹽

ヲ取テ少許宛加ヘ毫モ滾滓セサルヲ度トシ固封

シ微温處ニ置テ十二時其間時々壘ヲ振掉ノ能飽

和セシメ滾動セサルニ至ル若琥珀鹽ノ酸性偏勝

ノ滾動スル片ハ鹿角鹽少許ヲ加ヘ鹿角鹽偏勝ノ

滾動スル片ハ琥珀鹽少許ヲ加テ毫モ滾動セサル

ニ至リ微温處ニ置テ能飽和セシメ濾テ其液ヲ取
リ固封シ貯フ（注）

又法 鹿角精（名） 琥珀鹽（法） 各適宜

右鹿角精ヲ磁鉢ニ入レ琥珀鹽少許宛加ヘ研和ノ
毫毛滾淬セサルヲ候ヒ是ヲ青紙（前）及姜黃紙ニ滴

ノ色微毛變セサルニ至リ濾テ硝子壺ニ付固封シ

貯フ（篤） 琥珀鹽（角） 酸性偏勝スレハ青紙赤色トナル鹿
角亞兒加利塩偏勝スレハ姜黃紙老虎色トナ

ル（和） 姜黃紙ハ姜黃細末ヲ水ニ
和シ白紙ニ塗リ乾ス者ヲ云

試効 揮發衝動ノ生氣ヲ活潑シ神經感動甚キ諸症
ニ用テ鎮痙ノ奇効ヲ稱ス。痙攣搐掣ノ諸症ヲ降鎮

シ痙喘胸水等ノ痙攣ノ運動。攣急甚キ胃痛（胃）腹痛

失氣昏冒。子宮衝逆。脾病。心悸動。傷冷毒痛等ニ捷効

ヲ奏シ汗ヲ發シ小便ヲ利ス但炊衝病ニハ害アリ

服量 二十滴ヨリ六十滴ニテ水或葡萄酒ニ點服ス

○此劑ハ亞兒加利鹽。硫酸（綠） 礬油（硫） 鹽酸（精） 海塩（消） 石酸

精（消） 磷酸（補） 酒石酸（英） 銹鹽（綠） 礬升（銹） 塩（等） ヲ加服

スレハ性効脫失ス（注）

民（シ） 埴列利精（ア） フアセタス。アムモニア。リグアイ。左ス。羅

試効 清澄ノ中和鹽液ニメ味辛。不佳。是ヲ服以温覆

此劑一匙
 宛薄荷泡劑一盞ニ加ヘ服スル一日ニ三次汗ヲ發
 シ熱ヲ解シ渴ヲ止ム○胃寒傷冷熱ノ初發或熱病
 ノ斑疹痘瘡赤斑熱等ノ焮熱劇シカラサル症ニ用
 テ汗ヲ發シ病毒ヲ發越ス○神經熱樣ノ傷冷熱増
 劇シ揮發衝動ノ峻劑ヲ用ヒ難ク唯蒸氣及汗ヲ發
 ヲ病毒ヲ排泄スヘキ症ニ用テ○焮衝病傷冷熱神
 經熱等ニ一味用ヒ或纈草若ハ接骨花ノ泡劑ニ加
 ヘ或傷冷毒ノ咽喉焮腫ハ遠志ノ泡劑ニ加用テ殊
 ニ良○焮衝熱傷冷毒遊走痛ニ用テ蒸氣ヲ發シ安

眠セシム拈歇爾私發汗散名ニ比スレハ熱ヲ増進
 セス○劇キ傷冷毒ノ流走痛ハ此劑一弓ニ安質没
 扭酒前出二十滴阿芙蓉液十滴ヲ加夜分服ノ治ス○
 表發ノ蒸氣ヲ抑遏丹伏ノ發スル水腫卒ニ冷氣ニ
 胃觸ノ瘡疹丹攻シ發スル諸症ハ此劑ヲ用蒸氣ヲ
 驅發メ治ス○傷冷毒ノ頭痛ハ蒸湯藥トシ咽喉焮
 腫ハ漱藥トシ傷冷毒ノ遷延焮腫眼羅斯樣ノ焮衝
 打撲傷ニ洗滌藥トシ施メ皆捷効ヲ稱ス
服量一弓ヨリ二弓ニ至ル外敷ハ一錢ヨリ三弓ニ
 至ル或症ニ隨ヒ清涼解凝衝動ノ藥液ニ加施メ良

○此劑ハ諸酸味。亞兒加利鹽類。炭酸亞兒加利鹽刺。亞斯蘇。蓬鹽等。石灰水。土質鹽。明礬。金屬鹽。出等ヲ兼用ス。ハ性効脱失ス。

製法 名 硃砂ノ條ニ出ツ

又法 名 硃砂華 名 三弓 醇精醋 名 蒸餾醋ノ條 適宜

右硃砂華ニ醋少許宛テ能飽和シ毫毛滾動セザルニ至リ是ニ蒸餾水ヲ加テ都合二十四弓ト爲シ

貯フ 依 窠 福 萬

龍腦飲 「カムホラヒレップ」羅「カムヘルダラン」キ「蘭

製法 龍腦一 燒酒二十 滴

亞刺比亞ア 蘧謨ム 沙糖各二錢

右龍腦ニ燒酒ヲ滴メ研和シ沙糖ヲ加ヘ細末トシ

次ニ蘧謨ノ末ヲ加ヘ沸湯一升ヲ徐々ニ研合シ蓋

閉メ冷ルヲ候ヒ 緻布ニテ濾シ硝子壘ニ存シ固封

シ貯フ 呂 利

試効 燉衝熱。惡性熱。及神經感觸銳敏。痙攣運動アル

諸症ヲ治ス。○感動甚キ諸症ハ葛私多ト 僂謨。或揮發

香竄精名 共 等ヲ加フ。○此劑六弓。民埵列利精二弓攪

和シ一時半或二時毎ニ三匙宛服メ發汗ノ良劑ト

シ熱病焮衝ノ諸症ヲ治ス。焮衝熱ニハ安質沒扭酒
補ヲ加テ尤良。○腐敗熱。腐敗惡性ノ咽喉潰瘍。壞疽
ハ幾那ニ兼用ノ良。○小便不利ハ此劑三匙。消石半
錢。亞刺比亞。薤謨。二錢ヲ研和シ一時毎ニ用フ。○遷
延傷冷毒痛及麻痺不遂ハ朴窟福烏篤脂揮發丁幾
劑朴窟福烏篤脂一各一十八度ノ燒酒六各石白二
二各ヲ加ヘ固封シ浸硝子壘ニ各一硝砂加生石灰精
ス一八日濾シ貯フ四錢ニ蜜四錢ヲ加。磁白ニ各
研和シ龍腦飲六各ヲ研合シ一時半或二時毎ニ二
匙宛服ノ治ス。○疫效。經久呼吸不利喘息ハ此劑ニ
海葱蜜。亞的兒阿魏等ヲ加用テ治ス。○狂躁譫妄ニ

丹伏熱ヲ兼子。阿芙蓉的當セサル症ハ此劑三匙宛
數用テ催睡セシム。○發斑熱。痘瘡。麻疹ノ潜伏丹攻
ハ此劑三匙宛。二時毎ニ用テ發越ス。○熱病ノ頭腦。
若ハ肺藏ハ血ノ攻衝スル症ニ龍腦劑ヲ用テ發汗
スレハ逾増劇ノ危險ニ至ル。利二報半。一試發
耶茂斯驅熱散「ヤメス。コールツ。フルデレイルヘン
デ。ブードル。グダイムス。ブードル。蘭
製法安質沒扭ニ鹿角灰角石
一各半
右各別ニ極細末トシ能研合シ坩ニ入レ蓋閉シ武

火ニテ燒燬シ煙氣ナキニ至リ取出シ固封シ貯依

試効 焮衝熱胸脇焮衝傷冷熱欬嗽等ノ諸症ニ用テ

汗ヲ發シ血ノ運行ヲ鎮靜ス他ノ發汗劑ニ比スレ

ハ緩性ニ捷効ヲ奏シ効力尤切實ナリ虛弱ノ諸

症諸熱ニ用テ亦良驗ヲ稱ス○此劑一錢ニ玫瑰蜜

少許ヲ加テ二十九トシ二時或二時半每一丸宛服

ス又服法前説ノ安質沒扭酒ト同シ但妄ニ諸熱病

ニ過用シ或腐敗性ノ咽喉潰瘍遷延丹伏熱ニ用レ

テ大ニ下利ノ虛脫ニ救活シ難シ依利

...

沙別爾ハチ扶驅蟲油オラムムエムペイラムサールチオロ

製法 鹿角臭油名一弓 的列底那油名三弓

右能ク合和シ硝子壘ニ丹置テ四日ニメ硝子ノ列

篤兒多名ニ丹沙火ニテ蒸餾シ其液四分ノ三ヲ餾

シ取テ小硝子ニ丹固封シ貯フ大氣ヲ引ハ黑赭色

トナリ粘稠ニテ味嫌惡スヘク嘔噦ヲ發ス

試効 諸蟲病殊ニ條蟲ニ奇効アリ每朝每夜可喜匙

常匙ノ五分ニ二抄宛水少許ニ和シ服ス其不佳ノ

味ヲ消スル爲ニ服後芳香ノ品丁子桂等ヲ嚼ムヘ

シ然レ右ノ服量ハ大抵服シ易シ但惡心眩運ヲ發

スル者ハ服量ヲ減スヘシ或大小便焮熱スル者ハ
甘扁桃乳等ヲ用フヘシ 利 國

斯必竭里亞羅 「タルムドーデンデコロイド」蘭

形状 此草二種アリ。第一種ハ「スピゲリアマリラン
チカ」「ス」マレイランド」ト名ク。根ヨリ一直莖ヲ抽キ
圓樣ニノ稜アリ。葉柳葉狀。柄ナク對生シ綠色滑澤。
背淡綠。筋龍起シ正中ノ縱筋ヨリ兩側ニ循行ノ肋
狀ヲ爲ス。不佳ノ微臭アリ味微苦。花單瓣漏斗狀穗
ヲ爲シ五雄蕊一雌蕊アリ 第五綱 第一目 花後實ヲ結フ。二

囊狀ニノ裏二室ヲ爲シ各多子ヲ收ム。根長ク鬚甚
タ多シ味苦ク香臭ナシ數年枯レズ。加祿利那 北亞墨利
加洲ノ南地ニ生ス。○第二種ハ「スピゲリアアン
テルミア」又「ブラシリアンセ」「スピゲリア」ト名ク。一
莖數枝ヲ分チ梢葉四枚相對メ十字樣ヲ爲ス。花攢
簇シ囊樣ノ實ヲ結フ。宿根セズ。伯西兒 南亞墨利加
等ニ多ク生ス。此草濱瞿麥 「ハミナリゲシ」ニ似タルヲ以テ偽則
販ク者アリ。然レ眞品ハ濱瞿麥葉ヲ如ク縱道ナキ
ヲ以テ分別スヘシ 「或云莖葉モ亦藥用トス。或云第二種亦峻効アリ。」

殺蟲ノ聖藥トス諸蟲症ニ奇効ヲ奏ス。稍麻痺毒アリ一頓ニ過服スレハ發熱眩暈眼昏催睡惡心嘔吐ヲ發ス然レ少間ニハ解散ス。○服量散劑ハ効尤多シ小兒ハ十氏若ハ十二氏マテ一服トシ朝夕一服宛用フ或云八歳ノ兒ハ十氏宛日兩次用フ。或二十氏マテ泡劑トシ用フ大人ハ一錢マテ一服トシ朝夕一服宛用フ。或半錢宛日四次用テ尤切實トス。或云大人ハ一錢ヲ取テ沸湯四弓ニ泡出シ分テ三服トシ毎日三次ニ服ス。或云二錢ヲ取テ沸湯六弓ニ泡出シ分テ二服トシ一服ハ夜分用ヒ一服ハ翌日

兩次ニ用フ。或云二錢ヲ泡劑トシ毎日兩次ニ用フ。大便秘スル者ハ大黃ヲ加フ。○此藥ヲ用テ兩次ニ下劑ヲ與レハ夥ク蟲ヲ下ス服量適宜ニ用レハ嘔氣ヲ發セス。熱症ニ用テ熱ヲ増發セス。小兒ハ泡劑ニ沙糖若ハ蜜ヲ加テ服シ易シ。○第二種ノ草一刃若ハ半錢マテ泡劑トシ一服トス。日三服用ヒ。三日毎ニ下劑ヲ投スレハ死蟲或ハ半爛蟲ヲ下ス。○**經驗說**凡患狀症候變幻百出。的識シ難キト蟲病ヨリ甚ハナシ。蟲ノ症候亦能ク諸病ニ發現スレハナリ。○患者不食噫氣酸臭或酸汁ヲ吐シ大便或秘

或瀉或粘穢汚物ヲ下_レ或時々腹痛發熱咬牙等
蟲症ニ發シ粘穢汚物腸中ニ鬱積ス_ル者亦發ス
腹肚一種ノ鈍痛ヲ發シ腹脹硬滿羸瘦瀉下丹伏消
耗熱肌皮黧澹大便異常ノ惡臭_{アル}ハ蟲症ニ發ス
一_レ腸間膜腺ノ硬腫ニモ亦屢發見ス
○乾欬下利
發熱顏頰熱赤等ハ蟲症ニ發シ小兒生齒モ亦發ス
○頭水ト蟲病ハ病因所在異ナ_レ腸間一般ノ症狀
ヲ發ス。卽、頰顴赤色。卒ニ饑テ食ヲ欲シ腹痛關節痛。
咬牙搐搦鼻孔搔痒等ハ頭水ニ發シ蟲症モ亦發ス。
予頭水ノ患者ヲ療スル_ル五六人皆咬牙_シ鼻中搔

痒ノ症アリ。又痲病偏枯ニ右ノ諸症ヲ發スル者アリ
死後其屍ヲ剖觀ス_ル汚血ニ_テ許。腦髓中ニ溢
出セリ
○頭水ト蟲症ハ症候甚夕紛錯ス或脈遲緩
瞳子散大等ハ必ス蟲病ノ增長セル症ヲ兼發シ頭
水ニモ亦發ス。故ニ頭水ヲ誤認テ蟲症トス_ル日多
シ
○多年歷試考究ス_ルニ_テ上唇頰觀鼻翅尾然_レ浮
腫シ鼻孔是カ爲_ニ狹小半ニ過ク。此數症ハ蟲ノ確
徵ト_シ曾テ_モ差誤ナ_レ或_レ小兒ノ如キハ患情病
苦_ク細陳ス_ルト能_ハス。特_ニ外候_ヲ察識ス。右ノ
數症_ハ藥_ヲ患_テ苦_ク問_ハス必_ズ蟲症ト_シ療ス

シ○此藥散劑若ハ泡劑ニテ服量饒多ニ與ハ服後速ニ蟲ヲ下ス。小兒是外過服ハ頭眩暈。眼疼或眼筋異常ノ運動ヲ現シ眼球牽扯スル者アリ。少間ニノ解散ス若稍留連スル者ハ輕キ香竄ノ露精ニ揮發ノ藥劑。雜腹蘭若ハ橙皮油。茴香油等少許ヲ加ヘ與レテ速ニ解ス或此藥ニ芸香油。亞爾鮮油。薩毘那油名共等數滴ヲ加與レテ右ノ如キ瞑眩ナシ○凡百人蟲症ニ此藥ヲ歷試スルニ服後自ラ輕キ下利ヲ發スルニ非レハ良効ヲ得ス。或胃腸粘穢汚液鬱積セル熱病ニ試用ルニ蟲ヲ下サスノ自ラ瀉下

シ諸症解散ノ意外ノ効ヲ得ルト多シ○此根半錢ヲ用レハ宛モ大黃半錢ヲ用ル如ク瀉下スル者アリ或多く服ノ瀉下ナキ者アリ。此症ハ効ナシ故ニ大黃或甘汞一二分ヲ加用ヘシ是ニ由テ眼球抽掣等ノ瞑眩ナシ○或先吐劑ヲ與ヘ吐メ後此藥ヲ投シ大ニ蟲ヲ下ストアリ○多ク試用ルニ服量少許用レハ眩暈眼昏搐掣等ヲ發スルトアリ。多量ニ服スレハ唯吐シ或瀉スルノミニテ曾テ他症ヲ發スルトナシ故ニ多量ニ用ルヲ著實トス。小兒ニ歲蟲症ヲ患ヒ此藥十分宛日兩次與ヘ。疲倦嗜眠ス又

二十二氏宛朝夕與レハ瀉下ノ大蛇五條ヲ下シ治
 ス。數月ノ後又蟲症ヲ發シ右ノ多量ヲ與テ蟲ヲ下
 シ全治セリ。○或散劑トシ十二氏ヨリ六七十氏ニ
 テ用テ効ヲ取ルアリ。泡劑ハ二三錢若ハ四五錢宛
 日ニ兩次用フ。○此藥陳久ノ者ニ非レハ驅蟲ノ効効
 ヲ誤ルコトナシ且長服スレハ是ニ慣テ効力減スル
 者ヲ見ス。○蟲熱ハ往來及稽留氏ニ此藥卓偉ノ効
 アリ。殊ニ攝爾扁答名少許ヲ加ヘ水煎メ用レハ熱
 ノ發作ヲ制挫シ顯功アルコト宛モ蟲熱ノ消毒藥ノ
 如シ又解凝ノ殊効アリテ能ク內部ノ壅塞凝結ヲ

疏解ス。○蟲症經驗ノ治例。左ニ十則ヲ畧舉ス
 第一 一 小兒四歲。稽留熱ヲ患テ七日。是蛇蟲刺戟ノ
 發スル熱トシ左ノ方ヲ處ス

斯必竭里亞驅蟲飲

酒石葉名 各一匁
 的里亞名 加水名 二錢
 雜服蘭名 五匁
 泉水名 二錢半
 沙糖名 適宜

右研和シ半時毎ニ一匙宛與フ。翌日亦用フ。午後大
 便一行通ノ蛇蟲三十條ヲ下シ隨テ熱解散ス。第三
 日又前方ヲ與ヘ蛇蟲九條ヲ下シ其熱再發セズ

第二 一女子十歲蟲症アリ此藥ヲ散劑トシ每服芸香油一滴宛加與ルテ數次瀉下ナシ。二日ヲ經テ患兒頭痛困重精神愁鬱眼昏眩暈ス。此症二日ヲ經テ稍退キ次テ眼胞青色匝圍シ時ニ鼻邊頰額ニ彌漫ス。此症半時許消メ又忽チ發現シ且此症ト眩運眼昏等ト互ニ往來換發メ數日休メナシ。予以爲ク此藥ヲ與レテ瀉下ナキ故ニ効ナシト。因テ溫壯ノ下劑ヲ加テ與ヘ翌日亦用テ輕ク瀉下ス。是ヨリ諸症遂キ再發セズ蟲モ亦下ラスノ全愈セリ

第三 一 小兒五歲五月十五日診察ス。四箇月以前劇

ク下利ノ粘液ヲ下シ腹痛ノ臍脹シ次テ頭痛頰赤咬牙鼻中搔痒鼻孔上唇浮腫舌白苔渴アリ又三週以前ヨリ疫效ヲ兼ヌ。因テ大黃末十二氏甘草一氏研和メ一服トシ與ヘ次ニ斯必竭里亞細末朝夕十氏宛與フ。十九日。蛇蟲一條ヲ下ス。二十三日尚瀉下休メス。又前說ノ下劑ヲ與フ。二十八日諸症輕差スレテ下利休メス。因テ又大黃ヲ與フ。六月三日蟲症悉ク治ス故ニ斯必竭里亞モ亦休ム。但疫效及下利仍荏苒タルニ由テ幾那劑ヲ與ヘ漸ク回復ス

第四 一 婦人二十七歲嘗テ間日熱ヲ患ヒ爾後五箇

月以來時々蛇蟲ヲ下ス。五月十六日診察ス。其症腹痛シ上唇鼻孔腫起シ常ニ鼻中搔痒。咬牙ス因テ先
 大黃ニ甘朮ヲ加ヘ與フ。二十二日斯必竭里亞ノ末
 半錢宛日三次用フ。是ヨリ大便日滑利シ二十五日
 蛇一條ヲ下ス。因テ其散劑ヲ用テ日四次。二十九日
 又蛇二條ヲ下ス。是ヨリ諸症及鼻唇ノ腫減ス。因テ
 散劑ニ刀ヲ與フ。六月二日蟲症悉ク治シ唯微腹痛
 スルノミ故ニ此藥ヲ休レハ腹痛モ亦治ス

第五 一女子五歲。六月晦。診察ス。其症二年以來腹痛
 ヲ患ヒ時々發熱ノ渴シ又惡心嘔噦眩暈。下利咬牙

鼻中痒。鼻孔浮腫。按メ疼アリ。乃先吐劑ヲ與テ吐セ
 シノ斯必竭里亞ノ散劑朝夕十氏宛用フ。七月六日
 惡心嘔噦休テ食進ミ十一日諸症殆ト解散シ十四
 日全愈ヲ告ク。此患者服藥中大便毎日瀉利セリ

第六 一男子二十歲。八月二十九日診察ス。患者嘗テ
 蛇蟲ヲ下スヨリ其症腹痛シ殊ニ每朝心下刺痛
 ノ甚タ苦悶ス。乃此藥ヲ散劑トシ半錢宛與テ日
 四次。然レ瀉利セス因テ瀉下ノ丸劑ヲ與テ下利ス
 然レ蛇蟲下ラス。九月五日腹痛全治シ爾後再發ノ
 候ナシ

第七 一 小兒五歲。三月二十一日診察ス。其症患兒常ニ鼻中ヲ摘搔シ腹脹ノ痛アリ唇鼻浮腫咬牙シ每朝饑ルヲ甚シ脉百三十動。乃此藥ノ散劑四匁ヲ取テ夜中用ヒ翌朝ヨリ漸ク加テ八匁ニ至リ大便利スルヲ日兩三次。四月四日諸症悉ク治シ爾後再發セス。

第八 一 女子六歲正月十二日診察ス。三週以來咳嗽劇ク。腹硬滿脹痛シ上唇腫起ス。但鼻中搔痒咬牙ノ症ナシ。脉百三十八動。先大黃ニ甘草ヲ加ヘ與テ一服。次テ斯必竭里亞ノ散劑八匁用テ日兩次。始終

大便利ス。二十五日ニ至テ諸症快愈シ藥劑ヲ休ム

第九 一 小兒七歲。二月十七日診察ス。此兒素瘰癧腺腫アリ。三週以來頭痛。腹脹痛ヲ患テ步履シ難シ又八日以來上唇著ク腫起シ鼻孔及鼻邊浮腫ス。脉百八動。是ニ旃那葉ヲ用テ蛇三條ヲ下ス。又斯必竭里亞ノ散劑七匁宛與テ日兩次。大便利セス。因テ二十一日大黃末四匁宛加用テ多ク硬屎ヲ通ス。二十四日鼻唇ノ浮腫及腹脹減シ甚ク臭穢ノ大便通ノ多ク蛇ノ碎片ヲ雜フ。二十六日蛇三條ヲ下シ唇腫及諸症悉ク消散シ回復セリ。

第十 一女子十歲。十一月二十五日是ヲ診ス。其症腹痛劇發日數次且心下亦刺痛ノ煩躁シ顔面赤色常ニ鼻中ヲ摘搔シ鼻孔上唇腫起ス。此症時々發スルヲ一年許。間虵蟲ヲ下ストアリ乃此藥ノ散劑十氏宛與ル。日兩次大便能ク滑利ス然レ虵通セス。十二月朔諸症悉ク解散シ爾後再發セス。右ノ試効ヲ觀レハ此藥殺蟲ノ奇効アルヲ顯然タリ就中四個ノ症ハ虵ヲ下シ五個ノ症ハ虵下ラスメ全治ス。是蟲消化ノ大便ニ雜リ大腸ニ在テ壞爛溶解シ大便ニ混メ暗ニ瀉下シ或蟲巢敗穢ノ粘液ヲ滌除ス

レハナリ。○此藥ハ蟲ヲ驅除スルノミナラス復其萌生ノ再發スルヲ遏絶ス。他ノ驅蟲藥ハ捷効アレト長服ノ胃腸ニ慣習スレハ蟲復醸生ス。○此藥ヲ與テ六日ニシテ蟲症全治シ或十八日モ用テ治スル者アリ。○右十個ノ症中是ヲ用テ瀉下ナキ者二症アリ然レ眩暈眼昏搐掣等ヲ發セス其他ハ大便瀉利シ或腹痛ス。生鮮ノ者ヲ用レハ瞑眩スルヲアレト暫時ニシテ解散ス。○小兒搐搦ニ用テ蟲ヲ下サス治スル者多シ。○上唇鼻孔ノ腫起ハ特ニ蟲症ノ確徵トシ又瘰癧腺腫ニ蟲ヲ兼ル候トス。宜ク是ヲ

記得ノ諸症ト參驗シ他病ニ混ニ誤ルヲ勿ルヘシ
依拔 淑華 涅

歌ハ爾ル拔バ斯ス屈ク謨ム
「ヘルバスキム。タプシス。羅」

形状 此草一莖四五尺許。沃壤ニ在テハ一丈許。枝ナ

シ毛茸多クノ綿絮ノ如シ。葉長大ニノ末尖リ柔厚

粗糙表裏毛茸多クノ淡白。綿絮ヲ被フ如シ梗ナシ

味微收瀉ス。莖梢薔薇様ノ花生ス。美黄單瓣五出。五

雄蕊屈曲シ鈍頭ノ一雌蕊アリ第五綱 第一目密ニ攢簇ノ

長穗ヲ爲シ佳香アリ味微甘粘滑ス。花後卵圓形ノ

實ヲ結ヒ中隔兩室ヲ爲シ熟ノ割裂シ稜アル子ヲ

收ム歐羅巴洲諸國原野路傍ニ生ス。二年ニノ枯ル

此草ノ乾葉棉絮ノ如キヲ以テ是ヲ絢テ燭心ヲ造ルト云

試効 葉花ヲ藥用トス。緩和。止痛。愈創ノ殊効アリ○

和胸ノ一良藥トシ胸肺病。欬嗽喘急吐血。諸失血及

腹絞痛。疝痛ヲ治ス。花ヲ泡劑トシ服ス○下利赤痢

ニ煎劑トシ服ノ腸痛ヲ緩解シ。重墜努責ヲ靜止シ

治ス○咽喉焮腫ニ漱藥トシ。下利痔疾ノ重墜努責

ニ吉利詞キリス參兒サナトシ施メ治ス○痛風ノ劇痛及盲痔

ノ焮痛ニ蒸濕藥トシ施メ緩和シ疼痛速ニ消散ス

○打撲傷及創傷ニ此藥ヲ搗テ油ヲ加ヘ軟膏トシ
 外敷テ速ニ愈ユ○經久頑固ノ下利ニ試効多シ治
 例四則ヲ左ニ略載ス藥ノ下利疾熱ノ重型發貴
 第一一男子二十六歲五月十三日診察ス其症三年
 以前頑固ノ間歇熱ニ罹リ二年ヲ經テ治ス其後右
 肋下腫脹疼痛ノ左方ニ牽引ス六週ヲ經テ又下利
 ヲ發シ今ニ荏苒タリ其初水瀉九日許然レ腸痛ナ
 シ但欬嗽ヲ發ノ粘黃鹹味ノ痰ヲ咯ク一夥シ然レ
 胸痛惡寒盜汗ナシ今呼吸蹇難不利勞動スレハ殊
 ニ甚シ眼ノ白膜及肌皮黃色ヲ帶ヒ腹稍臌脹ス然

レ腸鳴ナシ患者右脇ヲ下ニノ臥シ易シ脉百十二
 動ヨリ百二十動許乃子夜中炮大黃末半錢ヲ與ヘ
 翌日左ノ劑ヲ用フ

歇爾拔斯煎

歇爾拔斯屈謨葉ニテ

右水三升ニ煮テ二升ト爲シ滓ヲ去リ一時半毎ニ
 四勺宛與フ同月二十日ニ至テ嘔吐ヲ發ス故ニ吐
 劑ヲ與テ吐セシム同夕二十九日下利及右肋下肝
 部ノ腫痛大ニ減シ次テ下利腫痛腹脹漸ク退散シ
 六月五日全治セリ此症腸ノ虛罷甚クメ收固強壯

劑ヲ與レ下利休ニサルト殆ト一年許。腸殊ニ罷弱シ肢體極テ羸瘦ス。故ニ甚夕險重ノ病トス。其右肋下腫起重痛ノ左方ニ連引スルハ病毒肝藏ニ壅結ノ黃疸ノ基始ヲ爲ス徵トス。患者左脇ニ臥ス片ハ肝ノ靱帶甚夕伸張ノ牽扯ニ堪ス故ニ右脇ニ臥シ易シ患者惡寒セス盜汗ナク脉朝旦ニ比スレハ夜分其數減ス。是肝藏膿瘍ナク唯閉塞ノ壅腫スル候トス。欬嗽ハ肺勞ノ欬ニ非ス且胸痛及勞瘵様ノ諸症ナク欬ノ稠痰ヲ咯キ氣息蹇難ナルハ肝藏腫脹ノ肺ヲ壓迫スル候トス即チ此藥ヲ用テ其效。下

利ト共ニ止ヲ以テ知ルヘシ

第二 一男子十九歲。七月十一日診察ス。四週以來烈

キ下利ヲ患ヒ腸痛及重墜努責甚シ。初發一週ハ血ヲ交ヘ下シ毎夜發汗ス脉百八動許。脉力平常ノ如シ。予刺絡スルト一次。大黃劑一服用テ後歇爾拔斯煎前ヲ連用ス。同月十八日下利殆ト止ヲ以テ藥劑ヲ休ム。其後十四日中ニ下利再發ス然レ此藥ナキ故ニ復試用セス

第三 一婦人四十三歲。十二月十六日診察ス。其症下

利既ニ十四日。劇キ腹痛ヲ兼ヌ。脉九十八動。乃チ吐劑

ヲ與テ後、歌爾拔斯屈謨一弓ヲ取テ水ニ比ニ煎シ
 與^レ一三日ニメ下利止ム。但、腹痛休マサル^レ二日。蓖
 麻油^鏡ヲ與テ治ス

第四一男子六十歳。正月十六日診察ス。三週以來下
 利ノ劇キ腹痛ヲ兼ヌ。乙百葛格安那ヲ與テ吐セシ
 メ次ニ格綸僕ヲ與テ功ナシ。同ク二十九日歌爾拔
 斯煎^前出^出ヲ用ル^レ毎日二比。下利止ミ大便平常ノ如
 ク腹痛亦解散ス。二月四日全愈ヲ告ク。○右ノ質驗
 ニ據^レハ此藥頑固經久ノ下利腸痛ニ奇効アル^レ
 顯然タリ。○凡、下利ニ罹^カハ胃腸感觸極テ甚、平常ノ

資養消化ニ供スル飲食。膽液。泡釀氣等ノ如キモ尚
 胃腸ニ感觸ノ劇ク衝動シ。大ニ蠕動機ヲ増發メ下
 利^ス。然^ルニ此藥ヲ用テ効功多キヲ觀^レハ緩和止痛
 收瀉ノ偉効アル^レ知ルヘシ。林娜斯^名ノ試說^此
 藥ヲ末^トシ麥粉ヲ加^テ泥ト^シ河水^ニ投^ス。魚
 類昏醉シ手ヲ以テ捕フヘシト云然^ルハ此藥ハ麻痺
 止痛ノ峻カアル^レ亦徵スヘシ。此煎劑ヲ吉利詞^參
 兒^トシ施セハ腸管ヲ緩弛ノ重墜努責ヲ治シ。盲痔
 三蒸湯劑トシ施セ^ハ速ニ焮痛ヲ祛^ク。毛^亦麻痺止
 痛ノ殊能トス。○右、第三ノ治驗ハ偶、此藥ノ匱乏ニ

此材三十二弓ヲ以テ水煎ノ越幾斯劑四弓半出ツ
華依叔叔 涅拔伍

老利兒結爾斯ラウロケラウロケラウロケラウロケ

形狀是布律扭斯樹梅李櫻ノ類一種ナリ。葉老利

兒葉ノ如ク實ハケルス櫻ニ似タルヲ以テ名ク。此

樹灌木ニメ直幹多枝。皮黯緑ニメ緒色ヲ帶フ。嫩條

ハ綠色。葉老利兒ニ似テ大ク厚クメ鋸齒アリ多液

美綠光澤アリ互生ス。味苦ク苦扁桃ノ如シ揉メハ

香氣アリ冬ヲ凌テ凋落セス。葉背ノ梗側ニ二腺クキアリ

其形粟起ノ枝梢ノ葉本ニ五瓣ノ小白花攢簇メ

穂ヲ爲シ梅花様。雄蕊二十以上アリテ萼ニ著キ一

雌蕊アリ第十二綱。香氣ナシ萼五出。花後實ヲ結フ

卵圓形ニメ小李ノ如シ或云大サ阿長様ノ核アリ

縫際攏起ス。那多里亞亞細亞洲ニ産シ又歐羅巴

洲東南諸國ニ培養ス

毒性葉ニ精微揮發ノ油アリ是ニ青酸ヲ含ム太夕

多シ青酸ハ動物植物ニ含ム者多シ或是ヲ製造ス

苦扁桃櫻實等此毒ヲ含ム青酸ハ猛烈ノ麻痺毒ニメ血及洩

乙ヲ稀釋スル極テ甚シ凡植物ノ毒是ヨ此葉ノ

露水一二勺ヲ服スレハ忽チ腦神經ヲ侵襲シ全身ノ生カヲ撲滅シ觸動機ヲ廢弛ノ卒倒シ或劇キ腹痛嘔吐痙攣搐掣麻痺睡症昏冒ヲ發ノ死ス故ニ鹿工ニ在テハ危殆ノ毒藥トス精練ノ醫家ハ其症ヲ察メ服量ヲ慎ミ少許用レハ他藥ノ功ナキ篤疾ヲ治シ非常ノ奇驗ヲ得ルヲ甚タ多シ○此毒ヲ解スルハ乳汁ヲ良トス或剝篤亞斯石鹼ヲ用フ

老利兒結爾斯水

製法

老利兒結爾斯葉生葉細剉ニ十四勺ヲ水三匕右硝子ノ列篤兒多ニ內煖處ニ置キ浸ス十二時ニ

ノ文火ニ上セ蒸餾メ露水十六勺ヲ取ル匣氣味宛モ若扁桃若ハ桃仁ノ如シ其氣甚タ揮發銳烈ナル故硝子列篤兒多ヲ用ヒ能接際ヲ固封シ蒸餾スヘシ露水中揮發ノ油沈ム其毒極テ烈キ故ニ醫藥ニ用ヒス或葉ヲ泡劑トシ用フ

試効

老利兒結爾斯水ハ腹部ノ神經病ヲ治ス故ニ

腹部諸器ノ壅塞殊ニ門脉閉塞ノ痙攣ノ運動ヲ兼ル諸症ニ奇効アリ即黑膽液鬱積壅滯ノ發スル神思鬱憂病依剝昆垓兒脾病子宮衝逆等ナリ其症顔面黑赭色上腹兩側肋下苦悶痞脹腹中常ニ困重ヲ

覺エ脉度不整。大便常色ヲ失ヒ膠粘若ハ稀薄。神思沈重鬱悒等ナリ。○血及^レ沔乙ヲ稀釋溶解スルニ峻効アリ。故ニ血液稠粘凝固セル病ノ熱劑害アル症ヲ治ス。曾テ是ヲ二人ニ試ム。一人ハ黑膽液質ニシテ其諸症ヲ發見ス一人ハ傷冷毒痛ヲ患フ共ニ其血甚夕稠厚ニシテ膠粘ナリ此葉ノ露水ヲ取り三十滴ヨリ六十滴ニテ一服トシ日ニ三四服宛用テ後刺絡^レハ其血甚稀釋渙流シ其病回復セリ。又一人肝ノ壅塞頑固ニシテ諸症ヲ發ス此葉ヲ濃泡劑トシ數用テ壅塞疏解シ全治セリ。○或云此藥ハ門脉ノ

黑血ヲ稀釋ノ赤色ト爲ス殊能アリ故ニ黑膽液質ノ入門脉壅塞ノ發スル神思鬱憂病。依^レ剝昆^レ埴兒^レ痔血^レ壅滯。經閉ニ峻効アリ。○或云此藥ハ腹中諸器ニ黑膽液ノ壅塞ヲ兼ル子宮衝逆。依^レ剝昆^レ埴兒^レ等ノ痙攣性ノ病ニ奇効アリ。其症患者神思沈重鬱悒シ肋下上腹ノ部痞脹苦薄シ眼中汚黃色。脉小若ハ大ニ遅或時ニ一止シ大便黑色ヲ帶テ稀ク或膠粘ニシ蜜ノ如ク小便黯澹色或乳汁ノ如シ。又黑膽液質ノ患者ハ天性懶惰ニシテ勞動ヲ厭ヒ一處ニ定著スル痛ナクノ腹肚苦滿困重シ或偏頭痛不寐肢節顫

振疲弱虚乏ヲ覺ル等ナリ此症ハ先ツ吐劑若ハ下劑ヲ與テ胃腸ノ汚液ヲ淨刷シ此露水ヲ用レハ根治スル者多シ○黑膽液壅塞ノ右ノ諸症ヲ見ス者ハ對症ノ解凝劑ニ此藥ヲ加用ルヨリ捷効アルハナシ喻ハ後方ノ如シ

解凝化毒飲

老利兒結爾斯水

酒石葉液

各一盞

韃爾答越默室

名 六氏

右研和シ時々一匙宛白葡萄酒若ハ水ニテ服シ効驗ノ多少ニ隨ヒ増減シ且韃爾答越默室ハ患者感

觸ノ銳鈍ニ隨ヒ加減シ與ヘシ○黑膽液病經久ニ

ノ險重ニ至レハ終ニ黑病トナル是ハ腐敗酷厲ナ

ル膠粘稠厚ノ黑血腹藏ニ壅積スルヲ久クノ遂ニ

脉管ヲ侵蝕破壊シ卒然トノ夥ク黑血ヲ瀉下シ或

湧吐シ患者昏冒ス此症ハ此露水モ功ナシ唯緩和

劑若ハ鎮痙劑ヲ與テ其劇症ヲ寛解スルヨリ他策

ナシ劇症鎮定メ後大ニ虚脱セヌ尚黑膽液壅積ノ

症アル片ハ前說ノ解凝化毒ノ劑ヲ與テ是ヲ治ス

ヘシ○此藥腺ノ諸病ヲ治ス腸間膜腺壅塞硬腫肺

藏硬結腺腫瘰癧癌様硬腫ハ大人小兒共ニ此露水

安質沒扭劑。鹽酸重土補ヲ加用テ峻効アリ。但眞
ノ癌腫ハ治セス。○小兒腸間膜腺ノ壅塞硬腫ハ腹
肚硬滿膨脹ノ四肢羸瘦枯削大便惡臭アリテ或瀉
セ或秘頻頻ニ餓テ食スレモ毫モ營養セズ此症ハ
左ノ方極メテ驗アリ其懷法ヲ實稱スルニ
解凝疏腺飲
老利兒結兒斯水一馬補 鹽酸重土一錢補
右研和シ十五滴宛服スル一日三四次扶 ○此露水
ハ肺氣管ノ痙攣ノ運動ヲ鎮制ス。故ニ痙性ノ咳嗽
喘急。疫效等ノ良藥トス。或云勞效ノ虛憊ノ焮衝ヲ

兼ル症ハ此露水ヲ用テ痙攣ノ效ヲ鎮定スル一良
藥トシ起熱ノ害ナク其効阿芙蓉ニ勝レリ ○肺焮
衝刺絡ノ後。虛憊スル症或熱病ノ虛憊ノ焮衝ヲ兼
ル症ハ此藥良効多シ ○痛風傷冷毒痛其他諸般ノ
疼痛或痙攣ノ諸症アリテ虚憊ヲ兼ル者ニ的當ニ
能ク疼ヲ止メ痙攣ノ運動ヲ鎮ム
服量 十滴ヨリ二十滴々テ日三四次用ヒ漸次ニ加
テ六十滴或八十滴ニ至ル ○吉利詞爹兒トシ施メ
亦右ノ諸病ニ殊効ヲ稱ス其量同前
外敷 此露水外敷メ焮腫眼及眼瞼焮腫ヲ治ス。殊ニ

瘰癧毒ヨリ發スル症ニ良○皮膚剝脫頑固ノ症ニ
 洗藥トシ施メ治ス○癌様ノ硬結腺腫ハ露水若クハ
 葉ノ泡劑ニ小麥粉ヲ和シ琶布トシ外敷メ其腫漸
 ク收縮シ消散ス。一婦人乳癌ヲ截斷メ創潰爛シ腋
 腺腫痛甚シ此露水六十滴ヨリ百滴マテ與ル一日
 四次且其創ニ棉撒絲ヲ貼メ漸ク愈合シ腫痛消散
 ス。然レ其後再發潰爛メ竟ニ死ス 福依淑理施
華坂叔成

遠西醫方名物考補遺卷六 終

和蘭翻譯醫書窮理書發行目錄

和蘭醫範提綱 棟齋宇田先生著 全三冊 理學門 植學啓原 宇田榕庵先生著 全三冊

同 內象銅版圖 同上 全一帖 舍密開宗 同上 每篇三冊完 自初篇至七篇

增補和蘭藥鏡 同上 全八冊 醫療正始 冲齋伊東先生著 每篇三冊完 自初篇至七篇

遠西醫方名物考 同上 全八冊 泰西名醫彙講 蘇川箕作先生著 全八冊

同 補遺 同上 全九冊 要術知新 大槻玄幹先生著 全三冊

瘍醫新書 玄澤大槻先生著 全四冊 醫方研幾 無涯足立先生著 每篇三冊完 初篇二篇

蘭學階梯 同上 全三冊 同方劑篇 同上 全二冊

蘭學佩觿 同上 全一帖 西音發微 大槻玄幹先生著 全二冊

幼幼精義 素堂堀内先生著 每篇三冊完 初篇二篇 病學通論 洪菴緒方先生譯述 初篇三冊出来 二篇三篇四篇 世に出物

濟生二方 杉田成卿先生譯 全四冊 青藜閣 江戶淺草茅町三丁目 須原屋伊八

