

遠西方彙

○卷之一

第二編

熱性病

第一 熱病

單純刺衝熱 焮衝熱

倭麻質斯熱 聖京倔熱

腸胃熱

薩滌爾刺列熱

○膽液熱

○粘液熱

醫士川文庫
499.2
En-2
1

✕
e 12

F 1
E-22



富士川文庫

3258

題言

我皇國昇平數百年。仁風波及異域。洋人獻方物以請互市者。接踵而至。自布帛兵器至凡百奇工。無不舶輪者。而醫家諸科書。亦不可舉算。余幼志於醫學。博檢洋書。其窮理試治。日新月精。以及今日。實洋外醫術之精。可謂至其極矣。然藥方之書。約綴而可供常用之便者。未嘗見也。由是初學徒臨病。茫茫不知所下手者。亦不少矣。余有憾于此。嘗得蒲葺幾氏日用方叢。譯之為一帙。既公于世焉。或曰。是方叢之書也。極簡極約。而日用之要。無所不備。可謂初學之必携也。然各方不詳其主治。用量等。恐臨病施治之際。有隔靴搔痒之憾。予請補之。余曰。不然。

10冊
499,2
En-2
No.1386
p.12

雕新秋晚戌壬二久文

侍醫法眼伊東貫齋譯

初帙

遠西方彙

原本紀元一千八百五十二年鏤行

廣胖堂藏



不書主治用量者。所以尚簡約也。若主治悉舉。則不免冗長。用量歸一。則僅々二百數十方。豈可以應酬長幼百出之疾乎。余別有所志。子姑待焉。既而得獨乙國安頓氏所著方彙。閱之於各症編首。畧述攝養治法等。其尾詳錄洋外諸家之驗方。及主治服量。其方數千。雖似冗長。依症分類。以為日用之便。別集婦人小兒病為續編。寔初學之標準也。乃欣然譯之。以成往日之志云爾。

文久紀元歲在辛酉十月

翬塘伊東貞識



凡例六則

一書中藥名病名。有漢名不詳者。皆從先輩之譯。加栗刺カシラ。聖京シンキョウ。偃儻エンタウ。麻質斯マシチ之類是也。其未經譯者。今新定其字。格列刺カクリ。謁設刺ケツセツ。設篤拉里セツトクリ。揜ケン之類是也。舊譯不穩當者。則正之。蘓魯林ソロリン。改作格魯林カクリン之類是也。或前譯稱呼不便者。則換之。謁哥利斯ケツカリス。亞設爾アセトル。利油リユ。改作肝油之類是也。若夫未經譯者。驟用南洋所考正之字音。覽者幸勿怪其紛錯。前譯誤字音者。徃々不尠。今改之。則恐初學之徒迷眩。故依舊キョウ。亞爾アル。苦ク。諳セン。沒モク。尼亞ニヤ。等誤作アアル。鮮セン。安アン。沒モク。尼亞ニヤ。之類是也。一方中西洋新驗之藥品。徃々有焉。就洋舶新齎之諸書。檢索

其製法効驗詳附錄。藥名下記附號者是也。
 一書中加愚按註釋者。首尾記號以分之。譯原註者不別設符號。讀者勿混同。

一漏刻皆從皇國。但不論春秋平分晝夜而為十二時。分一時而為百二十分。謂之昏。或密扭篤。分一密扭篤而為六十分。謂之設昆度。

一如尺度量衡。古人譯書已詳矣。今不復贅焉。

辛酉十月

貞識

遠西方彙目次

○卷之一

○第一編

熱性病

第一

熱病

單純刺衝熱

嗽衝熱

聖京屈熱

腸胃熱

○粘液熱

○薩滌爾熱

○膽液熱

○卷之二

神經熱

敏性神經熱

鈍性神經熱

○鈍性神經熱係腦

脊

症。鈍性神經熱係肺症。鈍性神經熱係腹內症。

○卷之三

腐敗熱

間歇熱

慢性熱

○卷之四

第二 局處焮衝病

肺焮衝

胸膜焮衝。胸膿

橫膈膜焮衝

喉頭焮衝。氣管焮衝

。肺管焮衝

義膜咽喉焮衝

心臟及心囊焮衝

舌焮衝

咽喉焮衝

○卷之五

腦焮衝

。酒狂。急性腦水腫

脊髓焮衝

胃焮衝

腸焮衝。痢

○卷之六

腹膜焮衝。網膜焮衝

。腸間膜焮衝

肝焮衝

脾焮衝

腓焮衝

腰筋焮衝

腎焮衝

膀胱焮衝

子宮焮衝。卵巢焮衝

。儻麻質斯

膀胱痛

○卷之七

第三 熱性皮膚病

痘瘡

麻疹

猩紅熱

律別阿刺

羅斯

帶狀羅斯

粟疹

尋麻羅斯

謁設刺

水疱疹

鷺口瘡

○卷之八

○第二編

慢性病

第一類

慢性病係脈管系症

第一 心臟慢性病

心悸動

胸內逼迫

第二

多血畜積病

第三

失血病

衄血

○卷之十一 咯血

嘔血

黑病

○卷之九

痔

○卷之十一 血尿

血斑病

子宮出血

月經不調

○卷之十

第四 萎黃病

第二類

慢性病係神經系症

第一 係腦髓及脊髓症

頭旋

昏冒

卒中風

○卷之十

腦髓軟化

麻痺

○舌痺

○膀胱麻痺

○卷之十一

第二 痙攣病

癩癩

舞蹈病

聖及偈

○卷之十二

口噤

痙強

落法尼亞

恐水病

○卷之十三

喘

○痙攣喘

○粘液喘

○密兒刺爾喘

○骨布喘

百日欬

○卷之十四

吃逆

胃痙

疝

○鉛毒疝

吐糞病

○卷之十五

第三 神經痛

面痛

第四 係神經核系症
依朴昆堙兒 歇倚私的利

○卷之十六

第五 精神病

第三類

○卷之十七 慢性病係補給器系症

第一 係諸液分泌器症

甲 粘液太過症

鼻孔及氣管粘液太過症 ○聖京偃 ○咳嗽

肺臟粘液勞 胃腸粘液鬱積 膀胱聖京偃

○卷之十七 麻

麻 第三十久麻 龜頭狹窄

畢丸焮衝 攝護腺焮衝 徽毒焮衝眼

龜頭淋 白帶下

○卷之十八

乙 排泄失常症

慢性嘔吐 泄瀉 完穀下利

乳糜利 肝崩

○卷之十九 黃 流行格列刺

格列刺 特發格列刺

遠西藥書 卷一 五 廣 胖 堂

○卷之二十 黃疸 膽石 小便失禁

小便滯滯 小便淋瀝 小便閉 尿石

尿崩 遺精 陰萎 吐涎下

○卷之二十一 大常

○卷之二十八 蟲

蟻蟲 虻蟲 絛蟲

○卷之二十二

第三 無熱皮病 髮病

疥癬 頑癬 頭瘡

煙面瘡 ○卷之二十三 蔓延煙面瘡

○卷之二十三 六 夏月斑

銅色疹 夏月斑 肝斑

皮膚搔痒 ○卷之二十四 癩 縮髮病

禿瘡 ○卷之二十四 第四 風氣脂肪及水液蓄積病

風脹 ○鼓脹 肥滿 水腫

○卷之二十四 皮膚水腫及腹水 胸水 ○心囊水腫

慢性頭水 卵巢水腫

慢頭水 卵巢水腫

慢頭水 卵巢水腫

○卷之二十五 巢水蠶

第五 削瘦病

虛衰病 ○卷之二十 勞

○卷之二十六

第六 慢性病係毛操絡者

腺病 ○疝勞 ○佝僂病 頸腫

○卷之二十七

第七 依倔篤

○卷之二十八 矢苟兒陪苦

○卷之二十八

第九 徽毒

○卷之二十九

徽毒 下

○卷之三十

第十 結節腫 癌腫 ○胃結節腫 ○胃癌腫

○附篇

服量 製法

遠西方彙目次 終

遠西方彙 卷之十一 醫學

表西之藥君火卷十五

第五 前腹痛

○腹脹量 醫書

○痲瘋 漫性痲瘋

第十 諸病類 諸類 ○諸病類

○卷之三十一

○卷之二十一

○卷之二十一 痲瘋



遠西方彙卷之一

獨乙 加幾安頓 著

傑婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 文仲 重譯

南洋伊東 亨健夫 參校

第一編

熱性病

第一 熱病

單純刺衝熱 スブリスアキスインプレキスチリア 羅

廣 半 堂

此症ハ專自然ノ良能ニ委任シテ醫ノ用心唯自然ノ妙機
ヲ妨ゲサルヲ要トスル者多シ故ニ唯患者ノ身心ヲ安靜
ニシ病床ニ就テ接骨木花或ハ菩提樹花ノ單浸劑ヲ温服
セシムルニ宜シ然レ氏其症必醫藥ヲ須ツ者ニ在テハ清
涼劑ヲ投スベシ即里歇利飲^{方一}沸騰散^{三方}或ハ純精酒石
等是ナリ蓋純精酒石ハ佳味ナル結晶水^{方四}ニ作ル者最良
トス若發因胃寒ニアル^一確著ノ症ハ民埜列利精ヲ伍シ
タル發汗密^{方五}去爾^{方五}ヲ佳トス民埜列利精ハ此症彌留
セル者^{慢性刺衝熱}ニ最稱用セリ患者甚多血^ニシテ血液胸部
或ハ頭上^ニ畜積シ兼テ大便秘結セル者ハ清涼中和塩ニ

硝石ヲ加フヘシ^{方六}刺絡及ビ局處ノ放血ヲ要スル者ハ少
シトス腸胃ニ汚物鬱積セル^一確著ナル^一排泄ノ便路
ニ從ヒ或ハ輕吐劑^{方七}或ハ下劑^{方八}ヲ撰用スベシ

○第一方^{穢熱瀰度} 里歇利飲^{方九}

炭酸剝篤亞斯^{方十} 枸椽汁^{新絞者適宜} 蒸餾水^{方十一}

覆盆子舍利別^{方十二}

右調勻每一時服^二食匙^一

○第二方^{同上} 沸騰散^{方十三}

過炭酸曹達^{方十四} 純精酒石^{方十五} 白糖^{方十六}

右調和為散加水^一盞乘沸騰服之

遠西方書 卷一 單純刺衝熱 二

○第三方賢母暴律私 沸騰散

過炭酸曹達十五 枸椽油糖十

右為散分四裏每半時取一裏枸椽汁一小食匙送下

主治惡心連綿トノ止サル者殊ニ効アリ胃化衰弱セル

者モ前方方ニ較フレハ能ク之ニ堪フ枸椽汁ニ些ノ水

及ヒ沙糖ヲ和シ里謨那垓ヲ作りテ先之ヲ用ヒ直ニ水

少許ヲ以テ沸騰散ヲ服スルモ亦可ナリ

○第四方賦歌蘭度 結晶水

純精酒石半 入新土器以井水五比煮至溶化加後味

枸椽一個 白糖六

右調和為飲料

○第五方

民埵列里精 屋施蔑爾各半 菩提樹花水四

右調和每一時服一食匙

主治冒寒症發汗劑ニ供スベシ

○第六方松傑福傑爾

精製硝石一錢 芒硝半 覆盆子水五 接骨木子舍利

別 枸椽酸舍利各六錢

右調和每一時服二食匙

主治清涼瀉下ヲ兼ヌル緩發汗劑トシテ單純刺衝熱ノ

遠西方藥 卷一 廣 膠 半 堂

重症ニ用フベシ

○第七方

吐酒石一匁至二匁 以加密列水ニ弓溶化加後味

吐根一匁 海葱蜜半匁

右調和毎十密扭篤服一食匙以至得吐臨服宜振蕩

主治舌上厚苔アリテ惡心スル者之ニ宜シ

○第八方

旃那葉末一匁至半錢 複方旃那昆設爾弗一弓

右調勻毎一時或一時半服一茶匙以至得瀉

主治舌上厚苔アリ肚腹緊脹ノ雷鳴シ大便秘結セル者

之ニ宜シ

焮衝熱フエブリス、インフラン、マトリア、シムブレキ、ス、オントステイキングス、コトルツ、蘭

強實ノ人既ニ焮衝熱ヲ發セル者ハ先放血シテ血中非常

ニ倍加セル纖維質ヲ減殺スルヲ以テ療法ハ第一義トス

兼テ清涼ノ攝養ヲ施シ五官ノ刺戟ヲ避ケ食餌ヲ減シ滋

味ヲ禁シ且冷水ニ果實ノ舍利別ヲ和メ多服セシムルヲ

要トス放血ノ後或ハ輕症ニシテ放血ヲ直ニ消石ヲ用フ

ベシ但粘滑藥ニ和スルヲ最妙トス九方、十方、十一方、病始

メテ降和スルキハ腸ヨリ分利セシムルヲ促スハシ蓋

消石ヲ霸王塩十四方 芒硝六方 瀉利塩或ハ純精酒石等

遠西方藥 卷一 廣 膠 半 堂

方ニ配スルヲ好トス又全ク消石ヲ用ヒズノ上ニ列舉ス
 ル所ノ塩類或ハ殊ニ孕鹼酒石方十八及ヒ磷酸曹達方十九
 ミヲ與ヘテ適當スル症モ亦少カラズ症ニ應ノ消焮ノ灌
 腸法ヲ行フモ亦可ナリ方廿五方廿六方廿七方○若肺臟ノ聖京屈ヲ
 兼併セル症此症數ハ礪砂最好トス或ハ之ニ吐酒石ヲ配
 スベシ方廿方廿方病ヲ表ヨリ分利セシハルハ民埵列利精方五
方廿二最効アリトス或ハ塩類ノ溶液ニ少量吐酒石ヲ加フ
 ル者方十八方亦佳ナリ弗里度兒陽名ハ治療熟練ノ名哲ニ
 シテ方今世間以テ摸範トスル所ナリ此人表ノ分利ヲ促
 スガ為ニ安質沒尼若波列方廿五ヲ稱用セリ今茲ニ此方ヲ

記載スルモノハ余先哲ノ功ヲ湮滅セシムルヲ欲セザ
 レバナリ表ノ分利止ミテ焮衝症既ニ緩解セル者ハ龍腦
 一分或ハ二分若ハ之ニ硝石二三分ヲ加ヘテ方廿四每晚之
 ヲ與フヘシ

○第九方警母暴律秘

精製硝石錢一以常水八分溶化加後味鹽
 砂糖舍利別弓半

○第十方弗嗜新歌消焮飲

右調勻每半時服一食匙
 精製硝石一錢半至二錢亞刺昆亞蘆謨弓半以覆盆子水六

遠西方藥
卷一
煨衝熱
廣

右和勻每一時服一食匙

○第十方 覆盆子舍利別

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩

○第十一方 別連杜

甘扁桃乳六弓以甘扁桃一弓製之

精製硝石錢一

過兒托舍利別

右和勻每一時服一食匙

○第十二方 警弗蘭屈

大麥未熟者一弓

以井水適宜煮熟濾過取一坵溶化硝石

一錢加後味

屋施蔑爾弓半

右調和每一時服半盞

○第十三方 歇蘭度

精製硝石錢一

吐酒石一

過爾托根煎四弓溶和加後

藥

扁桃舍利別弓一

右調和每一時服一食匙

主治第九方ヨリ第十三方迄煨衝熱ノ初起及ヒ局處ノ

煨腫ニ宜シ

○第十四方

歇蘭度消煨散

遠西... 卷... 廣... 堂

硝石 霸王鹽 各二錢 純精酒石 一

右調勻為散每一時乃至一時半取一小茶匙水半盞和服

○第十五方 賦歌蘭度 十三分 芒硝 半 吐酒石 一 蒸餾水 六分 溶化

精製硝石 一 芒硝 半 吐酒石 一 蒸餾水 六分 溶化

加後藥

覆盆子舍利別 一

右調和每一時服一食匙乃至二食匙

○第十六方 同上 荅麻林度 上好滿那 各半 芒硝 一 以井水十二分

煮至八分濾過加後藥

覆盆子舍利別 一

右調和每一時服二食匙以至得効

主治右三方 十四方十五方 焮衝熱症大便ヲ促スニ宜シ

○第十七方 弗鳴刺歇 消焮水 井水 六分 溶和加後藥

精製硝石 一 純精酒石 半 井水 六分 溶和加後藥

老利兒水 一 黑櫻實舍利別 一

右調和每一時服一食匙

○第十八方

孕驗酒石 半 吐酒石 一 精製度碌布 半

右蒸餾水四分溶和每一時服一食匙

遠西方彙 卷一 焮衝熱 廣 財 堂

主治以上二方十七方。ハ焮衝熱ノ末期大便ヲ促スニ宜シ此方前方十四方。十六方十五方ニ較シ効力緩ナリトス

○第十九方

燐酸曹達半 蒸餾水四勺溶化加後藥

覆盆子舍利別一 對實舍利一

右調和每一時服一食匙ハ 并水六勺飲味飲對藥

主治用法前方ニ同シ其能力モ亦緩ニノ且味佳ナリ

○第二十方

精製礪砂錢一 橙花水四勺溶化加後味

扁桃舍利別一

右調和每一時服一食匙

主治焮衝熱症硝石食機ヲ害スルノ恐アル者或ハ焮衝熱ニシテ胸部ノ聖京屈ヲ合併セル症之ニ宜シ

○第二十一方

精製礪砂錢一 精製度碌布各 煎吐酒石一 隋一 對一

右蒸餾水六勺溶和每一時服一食匙

主治能力前方ニ同シ焮衝熱ノ末期分利ヲ促スモ亦之

ニ宜シ

○第二十二方刺書秘

主氏堙列利精錢各六 屋施茂爾錢各六

接骨木花水四

遠西方彙 卷一 廣 財 堂

治皮膚ノ分利ヲ促スニ宜シ
 精製硝石 一錢半
 安質没尼若波列 半錢
 至三錢

○第二十三方 弗陽

扁桃乳 三
 精製硝石 一錢半
 至三錢
 安質没尼若波列 半錢
 至一錢

右調和每半時服一食匙乃至二食匙

主治 焮衝熱已ニ放血ヲ行ヒ消焮劑及下劑ヲ投シテ

焮衝減却シ脈緩且徐トナリ肌熱口渴モ亦已ニ消解シ

自然ノ良能表ヨリ病毒ヲ分利スルニ操能ヲ扶クルハ

安質没尼若波列ヲ以テ特効ノ奇藥トスル者歟ハ

○第二十四方 龍腦

龍腦 細碎者一
 至二錢
 精製硝石 三錢
 至五錢
 白糖 十

右調和為散分三服蠟紙包裹臨卧取一包接骨木花或菩

提樹花泡劑和服

主治 分利ヲ促ス

○第二十五方 戾鬼

加密列花 二
 至三錢
 亞麻子 研末
 一錢
 井水適宜煮濾過取六

右調和為灌腸藥

○第二十六方 戾鬼

瀉利鹽 半
 至一錢
 亞麻子油 新製
 一錢

右調和為灌腸藥

○第二十六方 戾鬼

瀉利鹽 半
 至一錢
 亞麻子油 新製
 一錢

遠西方彙 卷一 十一 廣 月 堂

裸燕麥煎方八 瀉利鹽錢二 勿ナ擗祭ナ西石ナ驗半

○第二十七方辰鬼

裸燕麥煎方六 醋方二

右調和為灌腸

主治第二十五方ヨリ第二十七方マデ 皆焮衝熱症大便ヲ促スニ宜シ

儂麻質斯熱レウマナセコールツ蘭

此症治法專抑壓セル蒸氣ヲ發越スルヲ要トス間焮衝性ヲ帶フル者アリ勿々看過スル一カレ多血ノ人或ハ劇症

ニ於テハ放血ヲ行ヒ硝石ヲ用フベシ九方。十方。十一方。十二方。十三方。十四方。十五方。

熱勢緩ナル者ハ民埵列里精方五。方六。方七。方八。方九。 或ハ少量吐

酒石世十八方。世廿一方。世廿三方。ヲ良トス室卒德氏ハ安質没尼若波列

ヲ稱用セリ方世四熱少微ノ者ハ雙蘭菊良効アリ方世五龍腦

ヲ用フルハ大ニ謹慎ヲ加フベシ然レハ熱緩ナル者ハ之

ヲ硝石ニ配シテ屢偉効アルヲ驗セリ方世四。方世七。方世六。儂麻質

斯熱ヲ治スルノ本法ハ惠篤計氏ニ依テ世人防テ之ヲ知

レリ方世八以上ノ法方ヲ行フノ外發汗浸劑ヲ用ヒテ以テ

治ヲ助クベシ局處ニ劇痛アル者ハ弗刺ナ涅爾ナ或ハ羊毛ヲ

以テ患部ヲ覆フヘシ又症ニ從フテ白芥子及ヒ羌膏膏ヲ

遠西方彙 卷一 十一 廣 月 堂

遠西方書
卷之九
傳麻質新熱
廣
肝
堂

貼シ或ハ間蟻吮吸角ヲ施ス者之アリ硬膏塗擦藥ノ類ハ
病邪ヲメ内部ニ轉移セシムルガ故ニ其害少シトセズ然
レハ職歌蘭度氏ハ感覺過敏ニ因テ疼痛スル者ニ麻酔硬
膏ヲ稱用セリ方世九

○第二十八方〔私傳福傑爾〕

精製硝石ハ 精製硝砂一錢至 蜩蛄石末一錢 黑櫻
實水六 罌粟花舍利別 過爾托舍利別各一
右調和每半時服二食匙

主治 焮衝性傳麻質斯熱ニ先放血シテ后此方ヲ與之福
傑爾氏ハ峇麻林度或ハ純精酒石ヲ以テ乳清ヲ作り平

○常ノ飲料ト為シ上方ト並用セリ化加後味

○第二十九方〔職歌蘭度〕

精製硝石錢二 民埜列里精一 安質没尼酒錢一 接骨
木花水 蒸餾水各四 橙花舍利別一

右調和每一時服二食匙

主治 傳麻質斯熱重症之ニ宜シ

○第三十方〔過傑福傑爾〕

民埜列里精二 薄荷水四 栗鼈子舍利別六
右調和每一時服一食匙

主治 傳麻質斯熱未龍腦ヲ用テベカシガル症此方偉効

遠西方書
卷之九
廣
肝
堂

遠西方藥
卷
傳麻質新熱
廣

アリ尚且蘆根煎ニ些ノ沙糖及ニ枸櫞汁ヲ加ヘテ味ヲ適シ意ヲ放テ多飲セシムルヲ佳トス

○第三十一方 曾別倫回母

接骨木花半 熱湯適宜浸出瀝取四加後味

民埜列里精一 重安質没尼酒一 接骨木子昆設兒弗

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩

主治傳麻質斯熱聖京屈ヲ帶ブル症及ヒ他ノ諸傳麻質

斯初症之ニ宜シ

○第三十二方 邊德福繼兒

吐酒石三 接骨木花水八 溶化加後味

砂糖舍利別一

右調和每一時服二食匙

主治焮衝性傳麻質斯熱放血及ヒ第二十八方ヲ用ヒテ

其熱已ニ減退セル者之ニ宜シ間之ガ為ニ惡心或ハ嘔

逆スル者アルモ損ナシ却テ益アリトス

○第三十三方 質列乳斯

硝石二 吐酒石一 接骨木花水五 溶化加後

味

砂糖舍利別一

其外意懷ノ對麻質

其外意懷ノ對麻質

其外意懷ノ對麻質

其外意懷ノ對麻質

其外意懷ノ對麻質

其外意懷ノ對麻質

其外意懷ノ對麻質

右調勻每一時服一食匙

主治僂麻質斯熱及ヒ其他急劇ノ僂麻質斯ヲ治ス但薩爾撒巴里兒刺ニ如キ稀釋發表ノ飲劑ヲ兼用スニ以テ

○第三十四方聖卒德

安質沒尼若波列錢半 接骨木花水五 海葱蜜五

右調和每一時服半盞

主治僂麻質斯熱及ヒ聖京促熱ヲ治ス然レレ氏弗里度兒陽名ハ此方緩ニ過タリトシ上方ヲ以テ優レリトス

○第三十五方時歌蘭度

雙蘭菊越幾斯ハ木安質沒尼酒錢二

右調和每一時半服十滴乃至二十滴

主治僂麻質斯熱血脉ノ衝動緩ナル者之ニ宜シ

○第三十六方過傑福傑兒

甘扁桃去皮者 白罌粟子各 大麻子各 龍腦至半

錢一 加覆盆子水十 多搗爛作乳劑更加後味

精製硝石錢一 滿那舍利別錢一

右調和每一時服一食匙乃至半盞

主治僂麻質斯症熱勢輕ク脈軟ニ頭腦關係ナキ者之ニ

宜シ患者能ク龍腦ヲ服スルニ堪フルキハ効驗更ニ偉

ナリ然レ氏之ヲ用スル其時ニ應セサレハ却テ大害ヲ

遠西藥房
傳麻質斯熱
廣月堂

招クカ故_レ症ニ對シテ最謹慎ヲ加フヘシ

○第三十七方 賦歌蘭度

龍腦_六 精製硝石_{一錢} 白糖_{二錢}

右調和為散等分為六包每一時乃至一時半服一包

主治上方ニ同シ

○第三十八方 憲篤計

硫酸規尼捏_{十五} 鹽酸_{十滴至十二滴} 接骨木花水_{四至}

精製硝砂_{一錢至}

右溶和每一時服一食匙

主治傳麻質斯熱及ヒ急性傳麻質斯ニ宜シ或ハ其症間

歇病性ヲ帶ビ且脊髓及ヒ脊髓神經ニ關係アル者ハ殊

ニ良ナリ憲篤計氏右ノ症ニ此方ヲ用ヒ一夜_{大率十}

ニノ已ニ尿中淫渣ヲ見ハシ熱勢疼痛俱ニ減退スルヲ

實驗セシ_一屢之アリト云フ

○第三十九方 賦歌蘭度

菲阿斯硬膏_一 阿芙蓉_{半錢}

右捏和貼痛所

主治傳麻質斯熱ニ於テ毎ニ傍發スル所ノ局處疼痛神

經ノ感觸過敏ニ因ル者之ニ宜シ

聖京屈熱_{フエブリス、カタルラリス、羅}

遠西藥房 卷一 廣月堂

抑壓セル蒸氣ヲノ平復セシムルハ聖京偲熱ニ於テモ亦
 醫治ノ要務トスル所ナリ是故ニ發汗ノ浸劑ヲ與フルノ
 他民埵列里精五方。廿二方。廿九方。卅方。卅一方。卅二方。卅三方。卅四方。卅五方。卅六方。卅七方。卅八方。卅九方。卅十方。少量吐酒石卅一方。
 安質没尼酒卅一方。等亦此症ニ適應ハ次ニハ精製硝砂
 二精製度礮布及ヒ吐酒石ヲ配スル者卅一方。卅二方。卅三方。卅四方。諸種ノ和
 胸散四十四方。四十五方。四十六方。四十七方。四十八方。四十九方。五十方。及ヒ粘滑ニノ咳嗽ノ刺衝ヲ緩鬆スルノ和
 胸浸液等四十六方。四十七方。四十八方。四十九方。五十方。ヲ用ヒテ以テ通例此症ニ傍發ス
 ル所ノ肺臟聖京偲ヲ減消スルヲ此症ノ治法トス

○第四十方 兼兒鳩松

民埵列里精半 接骨木花浸四 過兒抱舍利別半

右調和每半時服一食匙

○第四十一方 同上

安質没尼酒一 民埵列里精一 接骨木花水四 過

兒抱舍利別半

右調和每半時服一食匙

○第四十二方 又刺對斯 清涼飲

精製硝砂二 精製硝石四 覆盆子水六 橙花舍利

別三

右調和每一時服一食匙

主治 倭麻質斯熱 聖京偲熱 發疹熱ノ初期熱勢ヲ緩解シ

聖京偲熱
 廣
 聖京偲熱

遠西藥書
卷一
聖京屈熱
廣肝

且適宜ニ蒸氣ヲ催發スルニ宜シ

○第四十三方

精製硫砂 精製度碌布各半

右調勻每一時服一食匙

主治聖京屈熱ノ效嗽ニ宜シ

○第四十四方

菲阿斯越幾斯 金硫黃各三

甘草末三錢 白糖六錢

右調和為散每一時半取一茶匙和胸泡劑和服

主治聖京屈熱效嗽ヲ鎮靜スルニ宜シ

○第四十五方

硫黃華六錢 茴香子三錢 伊里斯弗魯連底那根半 甘草各半

右調和為散每一時半乃至二時服一茶匙

主治聖京屈症之ヲ用ヒテ痰ヲ利シ大便ヲ促ス

○第四十六方

過兒托根三錢 亞麻子三錢 甘草半 茴香三錢

右研和為和胸飲料

○第四十七方

過兒托根三錢 歌爾拔斯屈謨花二錢 甘草三錢 茴香二錢

右研和為和胸飲料

遠西藥書 卷一 廣肝

沙滌爾刺列熱
甘草
茴香
...

右研和為和胸飲料
○第四十八方 穢歌蘭度

歌爾拔斯屈謨花 接骨木花 黠失刺蘊葉 甘草
遏兒托根 伊里斯弗魯連底那根 茴香

右研和為和胸飲料
腸胃熱 三種ノ別ヤ

凡腸胃熱ニ三種ノ別ヤ 第一 薩滌爾刺列熱 腸胃ニ鬱積
セル汚物 因ル者 第二 膽液熱 非常ノ膽液分泌ニ因ル者

第三 粘液熱 腸胃中粘液分泌太過 因ル者 是ガリ甘草
第一 薩滌爾刺列熱

薩滌爾刺列熱ノ因專飽食ニアル者ハ早ク吐劑ヲ用ヒテ
全病頓ニ除ク一問之アリ然レ汚物既ニ腸中ニ傳ル者
ハ緩性ノ清涼下劑中和塩類 旃那 滿那 等ヲ與フベシ 蓋大
抵所謂解凝劑即醋酸加里液 孕鹼酒石ニ解凝越幾斯
類ヲ合スル者或ハ吐酒石ヲ配スル者 等此ニ
適當ナリトス 此劑ヲ與ヘテ古醫ノ所謂汚物易動ニ至ル
ヘシ若汚物逆上ノ徵アル片ハ吐劑ヲ與ヘ

ノ證アル片ハ酒酸加里曹達 或ハ複方旃那浸 下劑ヲ投スベシ 但服量ハ
大便日ニ二三行乃至四行ヲ得ルヲ以テ度トシ汚物鬱畜
...

透西...
沙港爾判列熱

廣 月 堂

廣 月 堂

證除カザルノ間ハ解凝藥ト排泄藥ヲ交換シ用フベキ者間之アリ吐藥ハ吐酒石吐根ノ合劑最適當トス特ニ吐酒石一味ヲ用フルキハ及テ下利ヲ發シテ嘔吐セザル者屢之アリ本復ノ期ニ及テハ其症ニ應シテ苦味藥ヲ投ズベシ七十四方。七十六方。

○第四十九方

蘆根流動越幾斯附三錢 醋酸加里液半 蒸餾水四
右調和每一時服一食匙

○第五十方

蘆根流動越幾斯附 孕鹼酒石各半 蒸餾水四弓溶

右調勻每一時服一食匙

○第五十一方

蒲公英流動越幾斯附三錢 孕鹼酒石半 精製度碌布一錢 吐酒石一 蒸餾水四弓溶解

右調勻每一時服一食匙

○第五十二方邊。傑。福。傑。兒。

蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯各二錢半 孕鹼酒石三錢 接骨木花水六弓溶化加後件

壁施茂兒三

遠西... 廣月堂

右合和每一時服一食匙乃至二食匙

○第五十三方

孕驗酒石弓半 蘆根煎八弓溶解加後味

砂糖舍利別弓半

右調勻每一時服二食匙

主治右ノ諸方ハ四十九方至五十三方 觸動過敏ノ人ニ於テ腸胃

熱ノ初起解凝劑トシ用フルニ宜シ

○第五十四方葉見鳩松

酒酸加里曹達弓一 上好滿那弓二

右井水八弓溶化每一時服二食匙

○第五十五方別連杜

酒酸加里曹達弓半至六錢 上好滿那弓一至二弓 茴香水四

弓溶解加後藥

橙皮舍利別弓一

右調和先取半劑頓服後每一時服一食匙以至見効臨服

宜振蕩

主治此二方五十五方 汚物噴下ノ徵アル者ニ宜シ但

感觸過敏ノ者ニ與フベシ

○第五十六方

精製芒硝弓半 常水四弓溶化加後味

西方藥 卷一
沙利爾刺熱
廣月堂

右調和每一時服一食匙

主治壯實ノ人腸胃熱症ニ宜シ每服一食匙ニシテ功用未大便ヲ利スルニ足ラザルキハ加ヘテ二食匙ニ至ルベシ

○第五十七方 庚見

芒硝一 白糖半 新製枸橈汁一 裸燕麥淡煎半
一面收爾量詳

右調和每一時服一盞以至得下

○第五十八方 庚見

芒硝一 井水四 新製枸橈汁 栗籠子舍利別各一

右調和每一時服半小盞以至得下

○第五十九方 癸歌蘭度

芒硝一 上好滿那 荅麻林度各半 旃那葉二 井

水適宜煮瀝取七弓加後藥

覆盆子舍利別一

右調和每一時服一食匙以至收全効

○第六十方 弗陽

瀉利鹽一 吐酒石一 加密列水六 溶化加後味

砂糖舍利別一

右調和每半時服一食匙強

主治腸胃熱舌苔硬固ニシテ稍乾燥シ嘔氣アリ或ハ吐ス
ルト雖其症寛解セザル者ニ宜シ

○第六十一方 庚鬼

上好大黃錢一 梅那葉錢二 瀉利鹽弓半 井水適宜煮濾

取六弓加後件

上好滿那錢二

右調和每二時服一食匙

主治第五十六方ヨリ第六十一方至ハ汚物下行ノ徵アリ者ヲ治ス但患者感觸過敏ナラザル者ニ用フヘシ

○第六十二方 癸 歌蘭度

吐酒石尺二 吐根末カ 海葱密弓半 蒸溜水弓二

右調和每八分時服一食匙以至得吐臨服宜振蕩

主治汚物逆上ノ徵アル者之ニ宜シ第一回ノ吐ヲ得テ

四分時ヲ經再吐セザル氏ハ更ニ又一食匙ヲ與フ此法
ノ如クシテ吐ヲ得ル一三四ニ至ルベシ每吐後加密列

泡劑一盞ヲ飲服セシムルニ宜シ然レ氏之ヲ過服スル

片ハ吐藥ノ効力ヲ減耗シ或ハ全ク其能ヲ失ス且未吐
氣アラザル前ハ必之ヲ與ル一勿レ若煖衝性ノ合併病

アリテ脈緊實ナル者ハ吐藥ヲ與ル人前放血ヲ行フベ

西遊記

卷一

沙流圖列

廣

月

堂

又便秘セル者ハ灌腸ノ瀉ヲ得ルハ後ニラザレハ吐劑ヲ與フルヲ勿レ然ラザレバ胸部及ヒ頭上ニ多血蓄積ノ症ヲ發スレバナリ也

○第六十三方同上

吐酒石一 蒸餾水一 乃至二勺 溶解加後件各

吐根末一 海葱蜜一 覆盆子舍利別各半

右調勻每十密扭篤乃至十五密扭篤服一食匙以至得吐

三回或四回臨服宜振蕩

○第六十四方

吐酒石一 吐根末一 加密列水一 莖菜舍利別半

○右調和每八分時服一食匙以至得吐臨服宜振蕩

○第六十五方庚兒

吐酒石一 蒸餾水一 海葱蜜半

右調和取半劑頻服餘半劑每八分時服一食匙以至得吐

○第六十六方曹私百兒

吐根一錢至一錢半 熱湯適宜浸漬八分時濾過絞取一勺 加

後藥

安質没尼酒錢二 海葱蜜半

右調和每十密扭篤乃至十五密扭篤服一食匙以至得吐

三四

西遊記

卷一

三

廣半堂

○第六十七方弗漢蘇弗

吐根粗末一錢 橙皮二錢 純精酒石半錢 蒸餾水五勺

浸漬濾取四勺加後味

海葱蜜半勺

右調和頻々用一食匙以至得吐數回初煎蘇蘇一匙

○第六十八方別連杜

吐根末一乃至二勺 默栗薩水二勺 過施印垂的兒 滴ハ

右調和每十密扭薦服一食匙以至得吐數回臨服宜振蕩

主治感覺過敏ノ人殊ニ柔脆ノ婦人之ニ宜シ

○第六十九方庚兒

一會退ハ至則吐頻頻宜服

吐酒石二勺 吐根末一勺 白糖二勺

右調和為散等分十包每八分時服一包以至得吐

○第七十方賦歌蘇度

吐酒石一勺 漿粉一勺

右調和為散頓服

主治胃ノ感觸甚鈍ナル者之ニ宜シ其漿粉ヲ加フル者

ハ吐酒石久ク胃中ニ停留シテ効力更ニ倍加スルニ因

ル

○第七十一方

吐酒石二勺 吐根末二勺 漿粉半錢

一會退ハ至則吐頻頻宜服

右調和為散等分三包每八分時服一包以至得吐
主治上二同シ

○第七十二方 福仙寫

吐酒石二 海葱根末一 吐根半 白糖一錢

右合勻為散等分六包每五密扭寫乃至十密扭寫取一包
加密列飲和服以至得吐三回

主治第六十二方ヨリ七十二方至汚物逆行ノ候アル者

ニ用フ

○第七十三方 穢馱齋度

吐根末一 土附末一 白糖一

右頰服 吐藥ヲ怠リ汚物又ク胃中ニ停留シテ胃ノ感覺遲鈍トナリ且患者下利スルカ如キハ吐藥中殊ニ吐根多量ヲ取テ頰服セシムルヲ要ス若之ニ吐酒石ヲ與フル片ハ下利愈加ハルガ故ニ用フルト勿レ患者甚下利シ易ク且胃ノ感覺過敏ナル片ハ吐藥ヲ用フルノ前胃部ニ芫菁膏ヲ貼シ阿芙蓉液二三滴ヲ内服セシムベシ

○第七十四方 虎鬼

新鮮牛膽半 瀝過加後件一 水一

桂水三 半

右調和分數服一日服盡

主治病本復ノ期及口膽液ノ功用稀淡ニシテ消食機

損敗シ腸ノ運機鈍滯シテ便秘ノ癖ヲナス者之ニ宜シ

○第七十五方 穢獸蘭度 薄荷水

蒲公英越幾斯 睡菜越幾斯 大黃酒製丁幾

忽弗滿液 薄荷水

右調和每服一食匙日四次

主治病本復ノ期ニ方リテ胃腸ヲ補益ス

○第七十六方 井水適宜煮下火浸漬八分時濾過取八

指矢垂屑 井水適宜煮下火浸漬八分時濾過取八

大黃酒製丁幾 忽弗滿液 橙皮舍利別

右調和每服二食匙日四次

主治醫治ノ終末之ヲ用ヒテ功ヲ收ム

第三膽液熱 薩澎爾刺列熱

總テ膽液熱 薩澎爾刺列熱 同煎般以治法ニ依テ之ヲ

療スヘシ憤怒劇シキニ因テ致ス所ノ者ハ吐劑ヲ用ヒテ

全病ヲ驅除シ得ルノ間之ヲ但始大抵左ノ清涼中和鹽

類ヲ與ヘ爾後吐藥ヲ與フルヲ要ス即醋酸加里

孕鹼酒石 孕礬酒石 酒酸加里曹達

五十五方。八十
 方。八十五方。八十
 方。霸王鹽七方芒硝五十五方至硝砂廿方等
 是ナリ或ハ始少量ノ吐酒石或ハ之ヲ上ノ中和塩ハ一味
 下合シハ十方至用フヘシ膽液熱モ亦腸胃熱按スルニ專
 熱ラノ治ト相似テ再次吐藥ヲ用テベキ者間之ヲ用ト雖
 或ハ吐藥ヲ禁スル者之アリ即肝臟ノ焮衝症狀盛ニシテ
 全體焮衝性ノ熱ヲ帶ル者舌上乾燥ノ其色赤ク肝部ニ疼
 痛アリテ大ニ苦悶スル者ノ如キ是ナリ此ノ如キ症ニ於
 テハ間放血ヲ要スルアリ肝部ニ蟻鍼ヲ用フルハ最久ク
 ベカラズトス而シテ温暖ノ罨法及ヒ緩和灌腸法モ亦施ス
 ベキナリ蟻鍼口癒テ后患部ニ水銀膏ハ十方ヲ塗擦スベシ

膽液熱
 五十五方。八十
 方。八十五方。八十
 方。霸王鹽
 七方芒硝
 五十五方
 至硝砂
 廿方等

内服ニ甘永劑ハ十方且症ニ從フテ清涼鹽ノ溶液ハ十方ヲ用
 フヘシ焮衝性ノ衝動已ニ靜止スル氏ハ即吐藥至六十二方
 方ハ十八方ヲ施スベシ胃ニ拘攣症ハ九方者吐藥ハ忌ム
 へキ者間之アリ此ノ如キ症ハ沸騰散三方或ハ炭酸剝ハ
 亜斯ノ飽和液ヲ吐酒石ヲ伍スル者ハ九方ヲ稱用セリ
 若シ僂窟或ハ妊娠等ノ為ニ吐劑ヲ用フルト能ハサル者
 ハ之ニ代ルニ下劑ハ九十一方ヲ以テス總テ膽液下行
 徴アル者ハ吐後必下劑ヲ投ノ大便ヲ利スルヲ要トス○
 植物酸ハ膽液病ニ一種ノ奇効アルガ故ニ此ニ列舉セザ
 ルトテ得ズ就中苔麻林度ヲ以テ尤物トスハ九十三方輓近

ニ至リテ大三塩酸九方ヲ稱譽セ山病本復々期ニ至リテ

ハ大黃九十九方ヲ用ヒテ大便ヲ利カスニ此方最モ便舉ニ

○第七十七方私傳。福傑爾 吐酒石一匁至一匁 上好滿那一匁 熟

醋酸加里一錢 湯六匁溶解 右調勻每一時服一食匙

○第七十八方 蘆根流動越幾斯三錢 孕礪酒石半匁 蒸餾水四匁溶

解 右調和每一時服一食匙

○第七十九方 蒲公英流動越幾斯三錢 霸王鹽二錢至三錢 蒸餾水四

匁溶化 右調和每一時服一食匙

○第八十方私傳。福傑爾 酒酸加里曹達半匁至一匁 吐酒石二匁至四匁 茴香水六匁

溶解加後藥 滿那舍利別一匁

右調勻每一時服一食匙

○第八十一方〔私傳。福傳爾〕

攝度里都鹽或瀉利鹽半弓至吐酒石一弓至橙皮

水五弓溶解加後藥

滿那舍利別弓

右調和每一時服一食匙

主治右ノ二方ハハハ粘液或ハ膽液ヲ帶ビタル汚

物胃腸ノ裏面ニ膠着セル症ニ適當ス其症舌苔固着シ

嘔氣水瀉舌上乾燥等ヲ以テ察スベシ上ノ方ハ其汚物

ヲ疎解シテ之ヲ排除シ易カラシム症ニ應ノ塩劑及ヒ

吐酒石ノ量ヲ増減スベシ最初之ヲ服メ已ニ吐逆ヲ起

ス者往々之アリト雖然レ其吐ハ漸次ニ鎮止シ胃中

清潔トナリ且胃腑モ亦吐酒石ニ慣ルニ從フテ瀉下

ノ効ヲ奏スルニ至ル此他沙瀉爾刺列熱ハ條下ニ舉ル

所ノ數方亦解凝ニ供スベシ

○第八十二方

吐酒石一弓至孕驗酒石三弓蒲公英流動越幾斯三錢

附 蒸餾水四弓溶解

右調和每一時服一食匙

主治膽液熱ノ初期解凝劑ニ供スベシ

遠西方集 卷一 膽液熱 廣 月 堂

○第八十三方

水銀膏 過兒把軟膏 各三錢

右合勻朝夕塗擦肝部

○第八十四方

甘汞 六錢 白糖 一錢

右調和為散等分六包每一時服一包

〔主治〕右ノ二方ハ十四方ハ膽液熱肝臟ノ始衝ヲ帶ブル

症・吐劑ヲ與フルノ前預之ヲ用ブベシ○甘汞ヲ用フ

ル片酸類ヲ忌ムハ固ヨリ論ナシ

○第八十五方私傳福傑爾

酒酸加里曹達 精製硝石 各一錢半 黑櫻實水六弓溶化

加後藥

新製枸橈汁 覆盆子舍利別 各一

右調勻每一時服二食匙

〔主治〕熱熾盛ナル者之ニ宜シ殊ニ發作ノ時煩熱ヲ清涼

セシムルニ之ヲ用フ

○第八十六方私傳福傑爾

純精酒石 半錢 吐酒石 二錢至四錢

右調和為催吐散分二服

○第八十七方私傳福傑爾

遠西方集 卷一 廿九 廣 半 堂

吐酒石各一
吐根末各一
大黃末半
吐根末一
吐酒石一

右調和為催吐散頓服

○第八十八方秘傳福傳爾

大黃末半 吐根末一 吐酒石一

右調和為催吐散頓服

主治病者吐逆ノ証ヲ見ハシ醫モ亦膽液様ノ汚物ヲ胃

及ヒ十二指腸ヨリ排泄セシメント欲スルキハ上方ノ

一八十六方至ヲ用フヘシ其他腸胃熱ノ條下ニ舉グル

所ノ吐劑六十二方至モ亦可ナリ

○第八十九方過傳栗屈的兒

精製炭酸剝トス 蕪亞斯ス 錢半 枸椽汁適宜但飽和為度 蒸餾水二

吐酒石三

右調和先取半劑頓服後每八分時服一食匙以至得吐

主治酷厲膽液性ノ汚物過多ナル者之ニ宜シ其症ハ口

苦非常舌苔厚固ニメ且綠色ヲ帶ビ心下苦悶堪フベカ

ラズ前額疼痛アルヲ以テ徵スベシ此ノ如キ症ニ尋常

ノ吐劑ヲ與レバ之ガ為ニ或ハ劇吐ヲ發シ或ハ全ク吐

セズメ惡心ニ苦惱シ加之更ニ神經証ヲ併發スルノ間

之アリトス

○第九十方過傳栗屈的兒

精製炭酸剝篤亞斯

新絞枸橛汁

吐酒

石^三 接骨木花水^二

上好麝香^四

加密列舍利別

錢^六

右調和取半劑頓服後每八分時服一食匙以至得吐臨服宜振蕩

〔主治〕胃ノ拘攣ニ由テ吐スルノ能ハザル者此方ヲ與ヘ兼テ發泡膏ヲ貼シ以テ患者ヲ救フノ往々之アリ又此ノ如キ症ハ先光膏膏或ハ蒸餅心ヲ胃部ニ貼シ其刺戟始テ見ハル、ニ至リテ吐劑ヲ用フルヲ佳トス

○第九十一方〔私傳福佛鬼〕

純精酒石 大黃末

錢各一

右調和為散等分三包每一時服一包

○第九十二方〔過傳栗屈的兒〕

純精酒石

麻屈涅矢亞

錢各半

右調和為散分六包先每半時服一包大便利後每一時服一包

○第九十三方〔私傳栗屈的兒〕

荅麻林度

一弓至一弓半

純精酒石

半

熱湯六弓溶和加後

味

覆盆子舍利別

遠西方彙
卷一
膽液熱
麩
則

右調勻每半時服一食匙

○第九十四方過傑栗屈的兒

瀉利鹽錢六 上好滿那半一 井水四勺溶化

右調和先服半劑後每一時服一食匙

主治第九十一方ヨリ第九十四方至膽液樣汚物下行ノ

徵アル者之ニ宜シ

○第九十五方過傑栗屈的兒

精製芒硝勺一 井水四勺溶化加後件

櫻實舍利別勺半

右調和先服半劑後每半時服一匙強

主治膽液熱瀉スベキノ証アリテ熱勢熾ナル者之ニ宜

シ病焮衝熱ニ傾ク片ハ精製硝石一錢ヲ配スベシ

○第九十六方

精製荅麻林度勺半 過視把膏末二勺 熱湯二匕溶解

右調和為飲料

主治總テ酸性ニノ瀉下ノ効ヲ具セル品ハ膽液熱ニ於

テ最必須ノ者トス譬ヘハ冷水ニ屋施蔑爾ヲ加フル者

純精酒石。西國米煎。沙列布煎。米汁。或ハ裸麥煎ニ多量枸

櫟汁ヲ加フル者ノ如キ是ナリ又煮タル果實及ヒ果實

製ノ傑列乙等此ニ屬ス

遠西方彙
卷一
膽液熱
廣
脾
堂

○第九十七方 里篤卓

發烟海鹽精錢一 覆盆子水六分 覆盆子舍利別一分 果實

右調和每半時或一時服一食匙

主治膽液太過ノ症ヲ治ス里篤卓氏膽液熱ニ塩酸ヲ用

ヒテ他藥ヲ要セズ吐下藥ヲ與フルトナク持此劑ヲ施

シテ膽液太過ノ証漸次ニ退キ全治ヲ得シ者舉テ算ス

ベカラザルヲ證セリ

○第九十八方 哥蘭篤

大黃 菖蒲根各一錢半 熱湯適宜浸漬瀝取三勺 加後藥

醋酸加里液三勺

右調和每服一食匙日四次

主治病癒ルノ期ニ方リテ胃ヲ補益シ大便ヲ利ムルニ

宜シ又腸胃病ニ於テ消化ヲ進ムル劑トシテ之ヲ與ヘ

又消食器衰弱症之ニ宜シ

○第九十九方 過傑栗屈的兒

酒製大黃丁幾 複方橙皮越栗幾附 薄荷水各一

右調和每服一食匙日三次

主治病癒ルノ期ニ方リテ胃ヲ強壯ニシ大便ヲ利スル

ニ宜シ第七十四方ヨリ第七十八方ニ至リ功用相同シ

第三粘液熱 スレブリス、コヒト、コイル、ツ、サ、羅、ニ、至、リ、ハ、月、時、同、
 粘液熱ノ療法ハ始吐劑 六、七、十、三、方、至、ヲ與フルヲ通例トス
 後更ニ粘液蓄積スルキハ再三スルニ宜シ吐後ハ碓砂ヲ
 以テ最適當ノ劑トス之ニ吐酒石ヲ配シテ更ニ佳ナリ方
 至百五下藥ヲ用フルハ最謹慎ヲ加フヘシ何トナレバ容易
 ニ過度ノ泄瀉ヲ致シ生力速ニ沈衰スレバナリ然レ氏瀉
 劑ノ巴ムベカラザルニ至テハ大黃ヲ佳ナリトス症ニ從
 テ甘汞若ハ藥刺巴根モ亦配伍スベシ 百、六、方、至、私、昆、列、印、
 氏ハ大黃煎ニ酒酸加里曹達ヲ配スルヲ稱賛セリ肺臟粘
 液ノ蓄積太過ナル者ハ金硫黃並ニ結鬼默斯密涅刺列九

方偉効アリ

○第百方 私、傑、福、傑、爾、

甘扁桃 去皮者 覆盆子水 十 為乳劑溶後味

精製碓砂 錢二 白糖 適宜味佳為度

右調和每一時服ニ食匙

○第百一方 過、傑、栗、屈、的、兒、

精製碓砂 精製度碌布 各二錢 菩提樹花水 六 可溶化

右調和每一時服ニ食匙強

○第百二方 設、兒、外、

精製碓砂 安質沒尼酒 各一錢 加密列水 十 屋施茂

遠西方集 卷一 粘液熱

兒

右調和每半時服半盞子

○第百三方

精製礪砂 精製度碌布各一錢 吐酒石二錢 加密

列水四勺溶化

右調和每二時服二食匙乃至二食匙

○第百四方秘傳 福傳爾

精製礪砂一錢 吐酒石一錢 過兒托膏半 默栗薩水六

右溶和每一時服一食匙

主治第百方ヨリ第百四方至粘液ヲ疎解ノ之ヲ上下ニ

排泄シ易カラシム

○第百五方秘傳 兒傳

吐酒石一錢 礪砂一錢 黑接骨木子昆設兒弗半 黑

接骨木花水八勺溶解加後藥

過兒托舍利別半

右調勻每半時服二食匙

主治粘液熱ニ之ヲ用ヒテ粘液ヲ疎釋シ且皮表ノ運營

ヲ發揮スルニ宜シ

○第百六方秘傳 福傳爾

大黃末一錢 精製礪砂四 過泥子油糖半

遠西方集 卷一 長一 三二五 廣半

遠西方彙
卷一
粘液熱
三十五
廣
朋
堂

右調和為散等分四包每一時乃至一時半取一包冷水和服

○第百七方過。傑。栗。屈。的。兒。

主 大黃末十六 甘汞二至三 橙皮舍利別適

右為塊頓服

○第百八方過。傑。栗。屈。的。兒。

藥刺巴根末十八至二十 甘汞二 白糖十五

右調和為散頓服

○主治第百六方ヨリ百八方至ハ粘液熱ニ下劑トシ用フ

ヘシ然レハ大黃及ヒ藥刺巴ノ如キハ肌熱微ナル時ノ

ミ用ヒテ適當ナリトス

○第百九方過。傑。栗。屈。的。兒。

結兒茂斯密涅刺列一 孕鹼酒石 地榆根末各一

右調和為散分六包每服一包日一次乃至二次

主治粘液熱熱勢减退スルノ后粘液膠着セル者ヲ疎解

シ分利ヲ促サント欲スル時之ニ宜シ

遠西方彙卷之一

遠西方彙 卷一 三十五 廣 朋 堂

遠西方彙卷之二
粘液熱
廣
册
堂

○第百六十五卷 南洋伊東 侍醫法眼貫齋伊東 貞文 仲重 譯
○第百六十六卷 獨乙 加幾安頓 著
○第百六十七卷 和蘭 婁婆都 譯

遠西方彙卷之二

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 婁婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文 仲重 譯

南洋伊東 亨健夫 參校

神經熱 セトニリス。子ルホサ 羅

世人通知セルガ如ク此症二種ノ別アリ○一ハ敏性神經

熱 セトニリス。子ルホサ ○一ハ鈍性神經熱 セトニリス。子ルホ

羅 セトニリス。子ルホサ 是ナリニ症共ニ腦及ヒ神經系ニ係ルト雖然レ氏敏

遠西方彙 卷之二 廣 半 堂

透西... 敏性神經熱

性神經熱ハ生カ虚衰シ覺機亢進スルノ症ヲ謂ヒ鈍性神
經熱ハ生カ虚衰シ覺機遲鈍ナルノ症ヲ謂フ右ノ二症ハ
唯病ノ輕重ニ由テ異ナル乎或ハ其本性ヲ殊ニスル乎未
之ヲ確定セズト雖輒近解體病理論家顯微鏡ヲ以テ發明
セシ說ニ據レハ鈍性神經熱ノ本性ハ血液ノ調和變常ニ
係ルトス是恐ハ單純神經熱ニアラサル所以歟
第一敏性神經熱リスブルホサ、スルサチ
此症輕易ノ者ハ格魯林水百十方ヲ以テ適當ノ劑トス稀鹽
酸一方十モ亦同性ナル者ニ列ビ屈氏ハ殊ニ之ヲ稱贊シ
テ格魯林水ニ代用セリ病腦ヲ侵ス一甚キ者ハ耳後ニ蟻

鍼ヲ施シ項窩ニ羌膏膏ヲ貼シ頭上寒菴法兩脚温湯ニ浸
シ遍體諸部ニ芥子泥ヲ貼シ殊ニ下肢ニ於テ交替シ貼ス
スベシ往昔多ク稱用セシ所ノ續草白芷攝爾扁太里亞亞
兒尼加亞的兒等ノ如キ衝動藥八百十五方大ニ神經系
ヲ衝動セシメ且麻痺ヲ遺シ易キガ故ニ用ニ臨テ最謹慎
ヲ加フベシ爾噤刷屈斯名ハ大ニ實實芟荅利斯ヲ贊贊羨ノ百
ハ唯神經熱單純ナル者ニ用フルノミナラズ猩紅熱癩麻
質斯熱ヲ合併セル症ニモ亦稱用セリ理篤阜名モ亦同ク
之ヲ賞シ或ハ實芟荅利斯ヲ鹽酸ト配伍シ舌上稍荅ヲ帶
ブル症ニ與ヒ患者甚安靜ナラズ不寐ナル症ハ菲阿斯

越幾斯百二十九方ヲ用ヒ著ク痙攣証ヲ見ハス者ハ麝香ヲ

與フ百廿一方但衝動劇シキ症ハ之ニ甘汞ヲ伍シ百廿三方皮

膚弛緩シテ粘汗ヲ發スル者ハ龍腦ヲ加フルニ宜シ百廿四方

肝爾私人多血頭腦ニ畜積セル症ニ吐酒石ヲ用ヒ漸次ニ

加増メ每一時半乃乃至每半時七乃與フル一ヲ稱譽セ

リ然レ氏唯血脉ノ生力抑壓セラレテ真ノ虛脱ニアラサ

ル者ノミ之ヲ投與セリ○聖京僂麻質斯及レ腸胃汚物

ヲ合併セル者ハ對症ノ療法ヲ施スベシ百廿七方至

○第百十方職歌蘭度

格魯林水半至 蒸餾水七 覆盆子舍利別一

右調和每一時服ニ食匙

主治單純神經熱ノ輕症ヲ治ス此他身體ヲ安息シ仰臥

セシメ寒暄不齊ナカラシメ下肢ニ芥子泥ヲ貽スベシ

毎ニ只此簡易療法ニ由テ全癒スル者少シトセス

○第百十一方列心屈

稀鹽酸二 蒸餾水八 覆盆子舍利別二

右調和每一時取一食匙粘滑煎汁和服臨服宜振蕩

主治神經熱ヲ治ス

○第百十二方職歌蘭度

纈草粗末半 加熱湯蓋閉文火煮八分時瀘過取八

透西... 卷二... 敏性神經熱... 廣... 堂

加後藥

民埜列里精錢六 忽弗滿液一 砂糖舍利別半

右調和每一時服一食匙

主治格魯林水方百十ヲ用ヒテ効ヲ收ムルニ足ラザル氏

ハ此浸劑ニ轉ズベシ且微温浴ヲ施シテ發汗ヲ促スニ

宜シ皮表ヨリ分利セシムルヲ最簡要トス然レ氏合併

ノ症殊ニ腸胃汚物ノ有無ニ着眼シ若之アル者ハ吐劑

或ハ適宜ノ下劑ヲ與ヘテ之ヲ驅除スベシ

○第百十三方春姪隣

纈草錢三 雜腹蘭錢半 熱湯適宜浸放冷加後藥

過設印亞的兒半 橙花舍利別半

右調和每一時服一食匙

○第百十四方別速杜

垂兒尼加花錢二 熱湯適宜浸漬瀝取六ヲ加後藥

垂刺毘垂護錢二 橙皮舍利別一

右調和每一時服一食匙

○第百十五方職歌薩度

垂兒尼加根末半 水十勺煮至八ヲ加攝爾扁太里亞

根末二錢上文火瀝過加後味

忽弗滿液錢一 橙皮舍利別一

遠西本草 卷二 敏性神經熱 廣 月 堂

右調和每一時服二食匙

主治第一百十三方ヨリ百十五方至敏性神經熱ニ謹慎シ

ラ與フベシ

○第一百十六方春姪隣

醇醋二錢至三錢附

覆盆子水五

過設印亞的兒半錢至一錢

覆盆子舍利別二

右調和每一時服一食匙

主治敏性神經熱ニ甚之ヲ稱用ス

○第一百十七方別連杜

安沒尼亞加枸椽密幾私去爾

硃砂揮發華水附

或 鹿琥精半

枸椽汁三錢

右調和乘沸騰服之

主治揮發衝動ノ方ニノ敏性神經熱ニ用ヒテ超絶ノ發

汗劑トス

○第一百十八方爾嚙刷屈斯

實菱荅利斯四

熱湯適宜浸瀝取四弓加後味

過兒托舍利別半

右調和每一時服一食匙

主治敏性神經熱ニ宜シ○刷屈斯氏累年實驗ノ確定セ

シ說ニ云ク敏性神經熱ニ實菱荅利斯ヲ用フルキハ其

効他藥ニ卓越セリ初起之ヲ十分ニ用フレバ其危險ニ

陷ルヲ預防シ已ニ危篤ニ及ブ者モ亦之ニ由テ佳候ニ
 轉スト約ノ之ヲ言ヘバ實^チ芟^キ荅^タ利^リ斯^スハ是此症ニ一種ノ
 奇藥タリト刷^ハ屈^ク斯^ス氏病初直ニ之ヲ多量施用セリ即四
 夕ヨリ増加メニ錢ニ至リ瀝液四夕ヲ取りテ十二時間
 ニ全量ヲ服盡セシム但毎服時刻ヲ遠隔セシム○然レ
 氏余之ヲ考フルニ所謂服量二錢ニ至ルハ危險ナリ余
 若之ヲ用フルトアラバ理^リ篤^ト阜^ク名^ハニ倣ヒ半錢乃至一錢
 ヲ以テ瀝液六夕ヲ取り毎一時一食匙ヲ服セシムベシ
 然レ氏吾ガ此論モ亦實驗ニ出ヅルニアラス何トナレ
 バ鈍性神經熱係腹内症既往流行セシ以來余未單純ノ

敏性神經熱
 廣
 腹
 症

敏性神經熱ヲ療セザレバナリ

○第百十九方

菲^ヒ阿斯^ア越^エ幾^キ斯^スハ 白糖^四

右調和為散等分八包每服一包日四次

○第百二十方 過^ル供^ル栗^ノ屈^ク的^ク兒^ト

菲^ヒ阿斯^ア越^エ幾^キ斯^ス 雜^ラ腹^ノ蘭^ノ 東方產者 各三 白糖^一

右調和為散分六包每一時服一包

主治 右二方ハ敏性神經熱興奮機亢ブル者及ヒ不寐譫

語ニ宜シ○余以為ラク方中菲^ヒ阿斯^ア越^エ幾^キ斯^スノ服量稍過

多ナリトス更ニ小量ヨリ始メテ唯日ニ三次或ハ四次

之ヲ與フベシ一時毎ニ用フルヲ勿レ

○第百二十一方

麝香八分至十二分 白糖四分

右調和為散等分八包毎一時服一包

○第百二十二方別連杜

麝香六分 揮發鹿角鹽半錢 續草油糖或桂油糖一錢

右調和為散等分為六服蠟紙包裹毎一時一服

主治敏性神經熱及ヒ神經性ノ皮疹ニ宜シ

○第百二十三方

麝香八分至十二分 甘汞六分至八分 白糖四分

右調和為散等分八包毎一時服一包

主治敏性神經熱神經証ヲ見ハス一甚シク且興奮力亢

盛スル者ニ宜シ

○第百二十四方

麝香八分至十二分 龍腦細碎者二分至四分 白糖四分

右調和為散等分八包毎一時乃至一時半服一包

主治神經熱皮膚弛緩シテ粘汗ヲ發スル者之ニ宜シ

○第百二十五方秘傳欣獨蒲

吐根粗末六分至半錢 熱湯適宜浸漬八分時濾取六分

右毎一時服二食匙強

速西... 卷... 敏性神經熱... 廣... 堂

主治 聖京 屈熱 神經症ニ轉移スル者此方奇特ノ劑トス
○或ハ 刺毘 亞 護漿 半ヲ或ハ 橙皮 舍利別 二錢或ハ
沙糖 少許ヲ配伍スルモ可ナリ或ハ 症ニ從ヒ 吐根 飽熟
スル片 遇見 托煎ヲ加ヘ或ハ 纈草 或ハ 龍腦 三ハヲ和シ
用フ

○第百二十六方 曾別倫 斷母

葡萄 草葉 浸五ヲ浸 葡萄 草葉半ヲ製之 民埜 列里 精一 加 密 列

舍利別六錢

右調和 每一時服 一食匙

主治 神經熱 輕症 殊ニ 聖京 屈及ヒ 儂麻質 斯症ヲ 合併セ

ル者之ニ宜シ

○第百二十七方 同主

纈草三錢 熱湯 適宜 浸瀘 取四ヲ加 後藥

民埜 列里 精半 過 設印 亞的 兒一錢 離 腹 瀾 舍利 別一

附

右調和 每一時服 一食匙

主治 神經熱 輕症 儂麻質 斯ヲ 合併セル者及ヒ 神經性 疹

ニ用ヒテ 皮膚ノ 運機ヲ 挑起スルニ 宜シ

第二 鈍性 神經熱一名 重証 神經熱 五ブリ ス子

此症 興奮 機ノ 強弱ト 外來ノ 諸件トニ 由テ 種々 其景況ヲ

殊ニス或ハ病邪觸動機及ヒ補給機ヲ侵ス_一專ニシテ知
 覺機ニ係ル_一却テ少ク諸見証遍ク全體ニ關係スル症ア
 リ或ハ專_ラ頭腦鈍性神經熱係腦症肺臟鈍性神經熱係肺症若クハ腹内鈍性神經熱係
 腹内ニ係在スル症アリ蓋此病ハ世間困窮ノ時殊ニ戰場
 及ヒ凶年ニ一般流行ス又都會軍陣ノ圍ヲ受クル時大ニ
 此症ヲ患フル_一アリ或ハ病院及ヒ獄中ニ行ハル_一者ア
 リ其症最傳染シ易シ傳染神經熱或ハ往々一種ノ疹ヲ發シ疹發
神經熱或ハ斑ヲ發スル者發斑神經熱アリ或ハ最モ恐怖スベキ
 證状ヲ見ハシテ腐敗性ヲ帶ビ加之東方疫發黃熱ニ類似
 セル者モ亦聞之アリ○此症品類繁冗ナル此ノ如シト雖

疾醫ノ要ハ之ヲ分テ係腦症係肺症係腹内症ト為ス_一最
 適當ナリトス

甲 鈍性神經熱係腦症チピユス、ケレブラリス
羅ヘルセン、チピニス蘭

此症一千八百十五年ノ役和講以來之アル_一稀ナリト雖
 其以前一千八百六年及ヒ七年殊ニ一千八百十二年ヨリ
 十五年至大ニ流行シ弱齡壯實ノ徒此症ニ罹_リシ者最多
 シ其熱始七日間焮衝性ヲ帶ヒテ多血頭腦ニ畜積シ或ハ
 真腦焮衝ヲ發シ之ガ為ニ神經性諸証ヲ見ハスニ至レリ
 此ノ如キ症ハ初起身體及ヒ室内病床俱ニ清涼ニ保護シ
 被衾ヲ輕クシ飲料ニ冷水ヲ與フルヲ須要ナリトス頭_ヲ

寒奄シ全身ヲ冷洗シ桶中ニ坐シテ灌水シ水節ヲ以テ冷
水ヲ射注スル等皆即効ヲ奏セリ蓋此諸法ハ皮膚乾燥ノ
熱シ面色赤クシテ頭熱灼クガ如ク昏々眠ヲ嗜ミ或ハ狂
妄ヲ發シ且血管ノ熱熾盛ナル症ニ佳ナリトス頭腦ノ疾
患順良ニシテ肌膚微熱ヲ帶ビ滋潤セル者ハ微温湯中ニ
浸坐シ即時冷水ヲ灌注シテ更ニ効アリ○又此症刺絡ヲ
必要トセリ之ヲ施セバ焮衝將ニ發セントスルヲ預防シ
已ニ發スル者ハ之ニ由テ除クヲ得其瀉血焮衝皮ヲ生
セシ者之アリ此ノ如キ者ハ真焮衝ノ為ニ死セリ但此ノ
如キ症ハ當時モ亦之アルト甚鮮シ方今問之アル所ノ鈍

性神經熱係腦症ハ今時ノ流行性ニシテ昔年ノ病性ニ異
ナリ容易ニ刺絡スベカラズ故ニ真ニ刺絡ノ定証ヲ具ヘ
ズ麻痺甚シク謔言狂妄スル症面色赤クノ熱シ焮衝狀ヲ
見ハシ弱齡強實ナル者ハ顛顛或ハ耳後ニ放蟻ハ頭ヨリ
十二頭若ハ十五頭至其飽落後モ亦少間出血セシムベシ
數次蟻吮ヲ要スル者モ亦問之アリ若蟻ナキハ吸角法
モ亦可ナリ兼テ項窩羌膏腓腸芥子泥足躡温暖布ヲ
貼スル等適當ナリトス大便通利ニ注意スルト最簡要ナ
リ腸胃ノ汚物或ハ膽液ヲ帶ブル症ハ殊ニ然リ但緩ナル
旃那浸ニ酒酸加里曹達ヲ加フル者ハ百廿或ハ旃那煉膏ニ

茶匙ヲ服セシムルニ宜シ頭上血液壓迫アルガ故吐劑ハ
 嚴ニ忌ムベキナリ○先放血シ〔按專棋吮ヲ云〕頭上ニ寒菴法ヲ施
 スノ后甘汞一匁乃至二匁若ハ三匁ヲ與フル片ハ効ヲ奏
 スル者多シ甘汞ハ大便ヲ利スルヲ以テ殊ニ益アリトス
 其症ニ隨ヒ甘汞一味九方ヲ與フル者多シ或ハ小量阿芙蓉
 蓉ヲ加ヘ用フ三方阿芙蓉ヲ伍スル者ハ練歷慎重ナル職
 歇蘭度氏殊ニ稱賛スル所ナリ○格魯林水百方稀鹽酸十
 方一磷酸百方等ノ如キ鑛酸ハ熱勢活潑發汗太過失血
 太甚腐敗ニ傾ク症等ニ甚稱譽セリ然レモ溶崩下利ニハ
 適當ナラズ大便通利適宜ナラザル片ハ酒石酸百方荅麻三

林度百方荅麻林度乳百方果實煎ノ飲料等ノ如キ植酸ヲ
 服用セシメテ効アリ○劇シキ痙攣疼痛單ニ神經ノ刺衝
 ニ因ル者ハ阿芙蓉百方莫爾比捏百方麝香百方至葛
 私篤樓謨百方等ヲ用ヒ兼テ蒸餅母ヲ貼シ酒精劑亞的兒
 劑ヲ塗擦シ鎮痙藥ヲ灌腸スル等ニ由テ上方ノ効ヲ扶ク
 ベシ但衝動藥ヲ用フルハ最謹慎ヲ加フベシ既往流行ノ
 神經熱ニ衝動劑ヲ誤用シテ大害ヲ致セリ蓋衝動劑ハ殊
 ニ神經系ノ麻痺及ヒ腐敗ニ傾ク症ニ於テ必適當ニ衝動
 藥ニ屬スル者ハ即續草百方攝爾扁百方太里亞百方亞兒尼加百方
 九方百至百攝爾扁百方太里亞百方亞兒尼加百方

百四十諸種ノ亞的兒劑百十六方百安沒尼亞劑百四十八方至百五
 方十二燐百五十五方是ナリ然レ此重症ニ在テハ衝動劑却テ害
 アリ之ガ為ニ病加重スル者數之アリ唯龍腦ハ之ニ異ナ
 リ皮膚粘滑ニシテ脈小疾弦ナル者眠瘡或ハ手足指頭寒
 壞疽ノ症ニ十二時間ニ十人乃至十二人ヲ用ヒテ偉効ア
 リ加之病毒分利ヲ催進区或ハ之ヲ單用シ百五十六方或ハ之
 ヲ醋ニ加ヘ百五十七方或ハ症ニ應ジ麝香ニ配伍ス百五十八方○
 病本復スルノ時ニ方テハ苦味ノ越幾斯劑百五十九方菖蒲根
百六十方ヲ用フ但大ニ衰弱セル者ハ幾那浸劑百六十一方或ハ煎
 劑百六十二方ヲ用フルヲ稱譽ス其他飲食ヲ節スルヲ簡要

ナ則上ニ其書有リ

○第百二十八方方熱湯適宜浸濾取之ヲ加後味

小旃那錢一熱湯適宜浸濾取之ヲ加後味

酒酸加里曹達二錢至三錢酒滿那舍利別半

右調和每一時服一食匙以至得下

主治鈍性神經熱係腦症腸胃汚物ヲ合併シ及ヒ便秘ス

ル者之ニ宜シ

○第百二十九方戒歌蘭變

甘汞八分至十六分白糖四

右調和為散等分八包每一時乃至一時半服一包

西藥精製
卷二
鈍性神經熱
廣
肝
堂

主治 頭腦ノ焮衝性疾患及ヒ神經熱ニ適應ノ消焮法ヲ
施スル右腦ノ關係連綿トノ退カサル者之ニ宜シ

○第三百三十方(同上)

甘汞ハ 精製阿芙蓉ニ 白糖四

右調和為散等分八包每一時服一包

主治 頭腦焮衝性ノ疾患アリシ症變シテ敏性神經熱或

ハ鈍性神經熱ト為ル者頭面ノ赤色及ヒ肌熱減退シ脈

小且軟トナル者ハ少量ノ阿芙蓉ニ甘汞ヲ配伍スル者

ヲ主藥トス此方無比ノ偉効ヲ奏スルヲ屢之アリ兼テ

項上ニ芫菁膏ヲ貼スベシ

○第三百三十一方(補心)

精製磷酸錢 覆盆子舍利別二 茶匙

右調和每一時取一茶匙冷水和服

○第三百三十二方(同上)

精製磷酸錢 覆盆子舍利別二 過兒把煎五 煮過

右調和每一時服一食匙

主治 右二方百世一方 敏性神經熱及ヒ鈍性神經熱ニ

宜シ磷酸ハ十二時間ニ一錢乃至三錢ヲ用フベシ

磷酸ハ其佳味且爽快ノ藥ニシテ肌熱アル者多血ヲ部

酸ハ其佳味且爽快ノ藥ニシテ肌熱アル者多血ヲ部

遠西方藥 卷二 純性神經熱 廣 肝 堂

畜積セル者。身心不安。宜シク且煩渴ヲ消シ胃モ亦能之ヲ受タルニ堪フ

○第三百三十三方

酒石酸錢一 覆盆子水五勺溶和加後藥

覆盆子舍利別勺一

右調和每一時服一食匙

○第三百三十四方

精製荅麻林度牛一 純精酒石錢二 覆盆子舍利別宜適

右作軟煉膏朝夕服一茶匙乃至二茶匙

○第三百三十五方 荅麻林度製乳清

牛乳此 入壺煮沸後加荅麻林度髓四勺更上火攪和

至凝聚瀘過

右每一時服半盞子

主治右三方百廿三方至百廿五方 嗽衝熱 膽液熱 神經熱 嗽衝

三傾ク者。慢性肝臟病。及ヒ其他ノ症ニ於テ清涼且瀉ヲ

要スル者之ヲ用フ

○第三百三十六方

精製阿芙蓉一 白糖二

右調和為散等分四包朝夕服一包

○第三百三十七方

醋酸摸爾比捏一白糖四
純性神經熱
 廣
 丹
 堂

右調和為散等分八包應症朝夕服一包

○第百三十八方

葛私篤樓謨二八至白糖半

右調和為散分八包每一時乃至二時服一包

主治右三方百世六方至疼痛癰瘰單二神經不刺衝

由ル者ヲ鎮靜スルニ宜シ○麝香百世一方至毛亦佳

リ

○第百三十九方職歌蘭度

纈草粗末 白芷粗末 垂兒尼加花各一錢 注熱湯蓋

閉上文火煮四分時濾取四勺加後藥

硝砂加過泥子精 忽弗滿液各半 砂糖舍利別半

右調和每一時服一食匙

○第百四十方福佃篤

纈草 白芷各半 注熱湯適宜浸漬濾取六勺加後藥

鹿瑰精 忽弗滿液各二錢 麗春花舍利別六錢

右調和每一時服一食匙

○第百四十一方別連杜

纈草半 熱湯適宜浸漬濾過取五勺加後藥

醇醋錢 過設印亞的兒錢 橙花舍利別一

遠西放齋
卷二
鈍性神經熱
廣
肥
堂

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩令味散

〔主治〕右三方百廿九方至百四十一方敏性症下鈍性症下ノ論セズ

總テ順症神經熱ニ用フベシ然レ氏其症此モ燉衝ノ候

ナク純粹神經性ノ者ニ用フベキノミ○敏性症歇蘭度名ハ

之ニ兼テ洗滌法心窩香竈藥罨法芥子泥十時毎ニ之ヲ施シ急劇ノ

症ハ六時毎ニス強壯藥灌腸法且微温湯浴ハ二十度等ヲ殊ニ稱用

セリ並ニ滋養衝動ノ食餌雞卵水ニ酒ヲ加フル者肉羹

汗等ヲ與フ○然レ氏予が見ヲ以テスレバ總テ是等ノ

衝動藥ハ敏性神經熱鈍性神經熱俱ニ容易ニ用フベカ

ラズトス蓋此ニ右ノ三方及ヒ左ノ一二方ヲ列擧スル

所以ノ者ハ一ハ此書ヲ全備セシノニハ治法ノ來歴ヲ

示スナリ且予ガ徒豈職歇蘭度福屈篤別連杜陽栗屈的

爾氏等ノ如キ大家ノ意ニ及メ他方ヲ擧クルヲ得

ヤ況ヤ復既往流行セシ神經熱ニ於テハ衝動強壯ノ療

法偉効ヲ奏セシト明確ナルヲヤ後來復神經熱ヲ療ス

ルニ衝動強壯ノ療法ヲ須ツナキヲ能ハシ常ニ大ニ

○第四百十二方弗陽

白芷半熱湯四弓浸漬瀝加後藥藥材

封櫻實舍利別半大熱劑藥材

右調和每半時服二食匙藥材

遠西放齋 卷二 廣 半 堂

主治陽氏云ラク神經熱腸胃汚物ヲ兼ナル症及ヒ腐敗
 性ノ症ニ於テ汚物已ニ大抵除キ脈小ニシテ軟且振慄
 シ。舌或ハ清潔或ハ黑色或ハ舌上ニ粘液附着シテ顫振
 シ。皮膚汚穢皺縮ニ或ハ微冷シ或ハ灼熱シ或ハ乾燥シ
 或ハ粘濕シ。呼吸苦悶。面色慘憺且羸瘦シテ常形ヲ失シ。
 眼目或ハ濁リテ光ヲ失ヒ或ハ硝子ヲ覆フガ如ク或ハ
 水ヲ充ツルガ如ク。尿不熟ニシテ灰白或ハ甚溷濁ナル
 者等此方用フベシ已ニ此ノ如ク殆活路ノ望ヲ失フ者
 モ白芷ノ奇驗アルヲ驚クベシト
 ○第四百十三方同上

純性神經熱
 麩
 膠
 堂

白芷 續草 攝爾扁太里亞 各二錢
 煮濾過加後藥
 硫酸亞的兒 一錢
 橙皮舍利別 三錢
 右調和每一時服一食匙
 主治惡性神經熱或腐敗熱症脈沈ニシテ震慄シ呼吸不齊
 或ハ疾速或ハ障碍スル所アリ。喃喃譫語シ。皮膚冷或ハ
 粘汗潤フ者之ニ宜シ
 ○第四百十四方過。備。栗。屈。的。爾
 白芷 苴蒲根 各三錢
 熱湯ハ弓浸漬又煮四分時濾過
 加後藥

遠西方書
 卷三
 廣
 半

遠田林藥房
老
純性神經熱
十七
廣
肚
堂

硫酸亞的兒刀二 橙皮舍利別弓半

右調和每半時服一食匙

○第四百十五方同上

攝爾扁太里亞錢六 熱湯八弓浸漬暫時煮沸濾加後藥

忽弗滿液錢二

右調和每半時服一食匙

○第四百十六方詞倫

亞兒尼加花弓半 熱湯適宜浸濾過取六弓冷定加後藥

鹿琥精錢二 硫酸亞的兒錢一

右調和每半時服一食匙

○主治第四百四十四方ヨリ第四百四十六方至神經熱鈍性衰

弱ヲ帶ブル者之ニ宜シ

○第四百四十七方職歌蘭變

桂油滴十 龍涎香越仙扶亞 或麝香越仙扶亞 忽弗

滿拔爾撒謨非答 錢一 硫酸亞的兒半一錢 舍電阿芙蓉

液

右調和每一時乃至一時半服三十滴

主治神經熱麻痺ノ候極度ニ至リ生力虚脱ノ死ニ瀕シ

意識並ニ知覺運動ヲ喪失シ且肚腹膨脹ノニ便失禁セ

ル症右ノ藥液ヲ以テ右法ト兼子施ス片ハ回生ノ効ヲ

收ムル下間之アリ即古列印酒ヲ匙抄シテ與ヘ發疱膏
 四枚一齊ニ貼シハハ心窩其他香竈藥湯ニ葡萄酒若ハ
 燒酒ヲ加ヘテ猛烈ニ浴法湯温ニ行ヒ葡萄酒二三ヲ
 灌腸トシ肚腹及ヒ頭上ニ冰冷罨法ヲ用ヒ加之頭上
 ニ烙鉄ヲ施スベシ

○第四百十八方過傑栗屈的爾 亞刺昆亞 護膜漿 錢 掛水 雜腹

揮發鹿角鹽錢半 亞刺昆亞 護膜漿 錢 掛水 雜腹

○蘭舍利別多 亞刺昆亞 護膜漿 錢 掛水 雜腹

右調和每半時服二食匙

○第四百十九方列墨爾 亞刺昆亞 護膜漿 錢 掛水 雜腹

揮發鹿角鹽四 麝香二 纈草油糖半

右調和為散等分八服蠟紙包裹每半時一服

主治右二方百四十八方ハ鈍性神經熱著シク神經証ヲ

見ハシ且皮膚鈍性衰弱ノ症ニ宜シ時時骨木來六

○第一百五十方過傑栗屈的爾

東方產麝香二 揮發鹿角鹽半 點栗

薩水四 桂丁幾 阿芙蓉舍利別各半

右調和每半時服一食匙臨眠振蕩

主治鈍性神經熱大ニ神經証ヲ發スル者脈小弱ニシテ

結代シ四肢冷小便灰白呼吸痙攣ヲ帶ヒ昏々嗜眠スル

遠西... 卷二... 廣... 堂

者之ニ宜シ

○第百五十一方 速別倫四世

龍腦細碎 揮發鹿角鹽五 纈草油糖半

右調和為散等分六服蠟紙包裹每二時一服

主治鈍性神經熱熱性疹ヲ發スル者之ニ宜シ

○第百五十二方 同上

龍腦一 亞刺昆西蘘謨末二 合和加接骨木花水六

主治手作乳劑再加後藥

鹿琥精二 雜腹蘆舍利別一

右調和每二時服一食匙臨服宜振蕩

主治神經熱麻痺証ヲ帶ブル者之ニ宜シ

○第百五十三方 福徳篤

攝爾扁太里亞六 法尼利二 古依斯巴尼亞酒適

上文火浸漬二時屢振蕩之爾後絞搾取十二馬加後

味二 同一

龍腦半錢 以再齧 燒 過設印亞的兒一 錢 桂舍利別半

右調和每四分時之三服二食匙

主治鈍性神經熱患者年老已ニ衝動藥ニ習慣セル者之

ニ宜シ

○第百五十四方 蘇利

蘇利

遠西方藥
純性神經熱
廣脾

○攝爾扁太里亞錢六 燒酒五 水宜適 上文火飽熟八分

○時之三瀝過取六勺和後藥

主龍腦錢半 拔爾撒謨半錢至 亞刺昆亞錢 蘇謨末錢

右合作乳劑更加過設印亞的兒一錢每四分時之三服一

食匙

主治前方二同之前方ハ法尼利及ヒ依斯巴尼亞酒ノ為

ニ其價貴シ但法尼利ハ拔爾撒謨露ヲ以テ代用スベ

シト雖挂舍利別ニ至テハ缺クベカラサルガ故ニ貧家

○等處スル片ハ此方ヲ以テ福僑篤氏ノ製方ニ優レリト

夫の如く...

○第百五十五方 曾別倫回如

燐一々至 白罌粟子油錢三 微温溶解投亞刺昆亞錢

謨末徐々搗和加後藥

雜腹蘭舍利別一 白芷浸六勺以白芷

右為乳劑更配伍鹿角精二錢每一時服一食匙臨服宜振

蕩

主治鈍性神經熱及ヒ同種ノ熱症神經系ノ衰弱ヲ兼子

或ハ麻痺ニ類似セル者之ニ宜シ

○第百五十六方

龍腦六々至 白糖錢一

遠西方彙
卷二
純性神經熱
廣
胖
堂

右調和為散等分六包每一時服一包

主治 鈍性神經熱ニ用ヒテ病邪ノ分利ヲ進メ殊ニ皮膚粘賦脈小疾弦ナル症ニ宜シ又寒壞疽ヲ治ス

○第百五十七方 孤刺律私里布私氏龍腦醋密幾斯去爾

龍腦六 亞刺昆亞護一 常水 蒸餾水各三 砂

糖舍利別半 右調和作乳劑每一時服一食匙

主治 鈍性神經熱發斑症上方主治ノ諸証ヲ具フル者之

二宜シ

○第百五十八方

龍腦六 麝香十 白糖一

右調和為散等分六服每一時一服

主治 鈍性神經熱皮膚粘賦シ痙攣証ヲ見ハシ生力大ニ

虚脱スル者ニ宜シ

○第百五十九方 辰見

葛兒儒別越幾斯六 加薄荷水四ヲ溶解加後藥

民埕列里精二

右調和每一時服一食匙

主治 鈍性神經熱快復ノ期ニ方リテ強壯ノ効ヲ奏シ且

皮膚ノ機能ヲ助クルニ宜シ

遠西方藥

卷二

純性神經熱

二十

廣

肚

堂

○第百六十方曾別倫回母

菖蒲根錢 以熱湯適宜煮將熟加菖蒲根黃橙皮各一

錢濾取六勺冷定更加後藥

複方幾那丁錢 甘硝石精半錢 橙皮舍利別勺

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩

○主治 粘液熱神經熱ノ重症及ヒ他ノ虛衰病後之ノ用フ

ルニ宜シ○然レモ先麻爾羅歇及ヒ睡萊越幾斯等ノ如

キ衝動セザル者七十五方七十六方九十九方ノ與ヘ後漸ク香竈

苦味ニシテ更ニ衝動スル劑ヲ與フルヲ最佳ナリトス

○第百六十一方

赭色幾那粗末四錢至六錢 注熱湯適宜蓋閉安暖所浸漬八

分時濾過取六勺加後件

桂舍利別勺半

右調和每一時服一食匙

○第百六十二方

赭色幾那粗末半勺 常水適宜煮八分時濾過取四勺加後

藥

忽弗滿液錢半 桂舍利別勺半

右調和每一時半服一食匙

○主治 右二方百六十一方百六十二方 純性神經熱快復ノ期ニ方リ

テ生カ虚衰スルヲ治ス○但煎劑ハ服シ難キガ故ニ浸劑ヲ優レリトス

○第百六十三方過傑栗屈的爾

硝砂揮發華水 芫菁丁幾各半 捲垣規精三

右調和塗擦脊椎及兩股

主治神經熱鈍性衰弱ニ傾ク者之ヲ用ヒテ效アリ

○第百六十四方爾噦刷屈斯

硝砂加石灰精一弓至一弓半 阿芙蓉丁幾一錢至一錢半 燒酒弓

右調和洗顔面及顛顛

主治惡性神經熱及ヒ腐敗熱輓近ノ傳染神經熱惡性猩

紅疹其他皮膚ヲ衝動シ其運機ヲ挑起スベキ症ニ宜シ

○刷屈斯氏ハ其宜ニ應シ燒酒ニ代フルニ白芷精ヲ以

テシ尚且此ニ忽弗滿拔爾撒謨非答ヲ加フ

○第百六十五方福偃篤

複方白芷精弓 酒製硝砂精一弓

右調和洗前額及兩掌

主治鈍性神經熱及ヒ虚性神經症ニ宜シ

○第百六十六方春煙隣

龍腦一 加後藥溶化

再留燒酒二 醋八

遠西方藥
卷二
純性神經熱
三
慶月堂

右調和温洗兩掌胸部肚腹等日一次

主治鈍性神經熱皮膚機能ヲ失ヒ且弛緩セル症ニ宜シ

○第百六十七方過癆栗屈的鬼

龍腦錢半 精製阿魏錢一 加雞子黃適宜捏和更加黃藥

那煎四弓以藥那半

右調和微温灌腸

主治神經熱ニ宜シ

○第百六十八方福儼篤

上好麝香以十 纈草細劉半弓 漿粉錢半

右調和為芳香劑入硝子壘貯每二時乃至三時取三分一

以熱湯浸出灌腸

主治神經熱痙攣ヲ帶ビ嚔下困難ナル者之ニ宜シ

乙 鈍性神經熱係肺症チヒス。ヒルモノナリス

鈍性神經熱流行スル時多血頭腦ニ蓄積スル症多ク之ア

ルガ如ク血液肺ニ逼迫シテ焮衝ヲ起シ所謂鈍性神經熱

兼肺焮衝症ヲ發スル者亦之アリ按スルニ此症ハ即求弗

健蒲律篤名ノ所謂過見扁私扶骨病ト同症タリ此症ヲ療

スルニ放血セザル者罕ナリト雖之ヲ施ス片ハ概子謹慎ヲ

加フヘシ蟬鍼ノ如キハ諸症通用シテ可ナリ之ヲ行フテ

後大量ノ甘汞百九ヲ稱用シ又小量甘汞ニ阿芙蓉ヲ伍用

遠方膏
 純性神經熱
 方三
 方五
 方六
 方七
 方八
 方九
 方十
 方十一
 方十二
 方十三
 方十四
 方十五
 方十六
 方十七
 方十八
 方十九
 方二十
 方二十一
 方二十二
 方二十三
 方二十四
 方二十五
 方二十六
 方二十七
 方二十八
 方二十九
 方三十
 方三十一
 方三十二
 方三十三
 方三十四
 方三十五
 方三十六
 方三十七
 方三十八
 方三十九
 方四十
 方四十一
 方四十二
 方四十三
 方四十四
 方四十五
 方四十六
 方四十七
 方四十八
 方四十九
 方五十
 方五十一
 方五十二
 方五十三
 方五十四
 方五十五
 方五十六
 方五十七
 方五十八
 方五十九
 方六十
 方六十一
 方六十二
 方六十三
 方六十四
 方六十五
 方六十六
 方六十七
 方六十八
 方六十九
 方七十
 方七十一
 方七十二
 方七十三
 方七十四
 方七十五
 方七十六
 方七十七
 方七十八
 方七十九
 方八十
 方八十一
 方八十二
 方八十三
 方八十四
 方八十五
 方八十六
 方八十七
 方八十八
 方八十九
 方九十
 方九十一
 方九十二
 方九十三
 方九十四
 方九十五
 方九十六
 方九十七
 方九十八
 方九十九
 方一百

又喉頭及食道頭ニ係ル症間之アリ
 頭及食道頭症ニ喉頭
 圍ニ蟻鍼ヲ施シ甘汞ヲ與ヘ緩和蒸劑含漱劑等ヲ用フベ
 シ然レ氏此療法通例効ヲ収ムルナシ頸圍ニ疾患見ル
 ルノ后十二時或ハ二十四時ニシテ死ニ歸スルヲ常トス
 方十二等ヲ用フヘシ衝動強壯ノ療法ハ不可ナリ
 花ヲ加フルヲ好トス祛痰ヲ促スハ金硫黃百七十方遠志七百
 方十二等ヲ用フヘシ衝動強壯ノ療法ハ不可ナリ
 又喉頭及食道頭ニ係ル症間之アリ
 頭及食道頭症ニ喉頭
 圍ニ蟻鍼ヲ施シ甘汞ヲ與ヘ緩和蒸劑含漱劑等ヲ用フベ
 シ然レ氏此療法通例効ヲ収ムルナシ頸圍ニ疾患見ル
 ルノ后十二時或ハ二十四時ニシテ死ニ歸スルヲ常トス

理篤阜氏ハ此症ノ初起頸圍ニ猛烈ノ芫菁硬膏ヲ貼シ大
 量甘汞ヲ服セシムルヲ稱賛ス此法モ亦必然ノ効ヲ期ス
 ベカラスト雖理篤阜氏嘗テ鈍性神經熱係喉頭症ノ初起
 之ニ由テ患者ヲ救フトラ得タリト云フ
 ○第百六十九方
 阿魏半錢至 亞刺昆半 亞蘆半 護漿半 加水四勺丁寧研
 和加白糖半勺

右調和為乳劑每一時服一食匙
 主治 涅優滿氏阿魏ヲ以テ鈍性神經熱係肺症ノ良藥ト
 シ十二時間ニ阿魏四勺至ヲ與ヘ且皮膚ヲ摩擦シテ誘

遠西方藥 卷二 純性神經熱 廣 堂

導ノ効ヲ奏セシム

○第百七十方 蟹兒滿

蟹兒尼加花 三錢至

石六分後加後藥

桂水 錢二

右調和每一時服一食匙

主治鈍性神經熱ニ屢合併スル所ノ真肺焮衝ヲ治ス○

蟹兒滿氏吐酒石ニ堪ヘザル者ハ蟹兒尼加單味ヲ用ヒ

或ハ碓砂加過泥子精ヲ伍用セリ

○第百七十一方

金硫黃 四分至

非阿斯越幾斯 六分至

白糖 四分

右為散等分八包每一時半乃至二時服一包

主治鈍性神經熱係肺症及ヒ他ノ胸病ニ於テ祛痰ヲ促

スニ宜シ

○第百七十二方 曹別倫歌

遠志 三錢 以水八勺煮瀘過取六勺放冷後加後藥

龍腦 細末 一乃 亞刺昆亞蘆 錢二

右作乳劑更加鹿琥精二錢雜腹蘭舍利別一乃調和每一

時服一食匙臨服宜振盪

主治鈍性神經熱虛性ノ胸患ヲ兼ナル者ニ宜シ

鈍性神經熱

三

廣

虛

丙鈍性神經熱係腹内症チビスアブドミナルチリス方今此症最多シ或ハ專此症流行スル地アリ往昔此症ニ
 醫療ヲ專要トセシ時ハ衆醫ノ説病初衝動劑ヲ以テ之ニ
 處スルヲ佳トセリ○然レ其効驗ナキヲ確定セシヨリ
 漸他ノ諸般ノ療法ニ轉移ス其中良効ヲ得ル者間之アリ
 ト雖又竟ニ之ヲ自然ノ良能ニ委スルヲ本法トシ其功用
 ヲ確徴スルニ至レリ甚シキニ至テハ鈍性神經熱係腹症
 ヲ療スルノ最勝法ハ一事モ施為セザルニ在リト公然夸
 言スル者亦之アリ吾輩モ亦多般ノ伎倆ニ勞センヨリハ
 寧一事モ為スコトナカラシ假令之ヲ為スモ獨衝動セザル

ノ法方其害少シト謂フベシ又按ズルニ其兩間ニ於テ中
 庸ヲ取ル者鈍性神經熱係腹内症ヲ療スルニ於テ最良工
 タルベシ漢都氏小冊子著ハシ此症ヲ治スルノ簡易法
 ヲ載セリ○理篤阜氏ノ療法モ亦簡易適度ニメ賞スベシ
 其法初起病勢甚興奮ノ稽留熱ノ証狀ヲ見ハス氏ハ小心
 ニ刺絡ヲ行フテ放血シ頭痛劇シキ者ハ兩耳後ニ放蟻三
 頭ヨリ四頭至譚語甚シキ症ハ頭上ニ寒罨法ヲ施スナリ
 ○咳嗽甚シキ者ハ胸上ニ蟻鍼ヲ施シ心窩ニ芫菁膏ヲ貼
 シ乳劑ニ硝石ヲ伍シテ方一飲服セシムベシ○腸ニ著大
 ノ關係アル者ハ甘汞一ハ至一時乃至一時半毎ニ之ヲ與

へ肚腹ノ痛所ニ芫菁膏ヲ貼シ或ハ吐酒石膏ヲ塗擦シテ
 發疹スルニ至ルベシ爾後舌苔厚キ症ハ格魯林水ニ亞刺
 毘亞譚漿ヲ和スル者百八十方精製食鹽百七方或ハ粘滑
 ノ煎汁ニ鹽酸ヲ加フル者百八十八方ヲ用フベシ劇シキ下利
 ヲ止ムルニハ漿粉ノ灌腸百九十八方ヲ行フヘシ但阿芙蓉ヲ
 加フルコト勿レ皮膚燥熱灼クカ如キ症ハ灌水ヲ施シテ速
 ニ之ヲ拭ヒ弗刺涅爾毛布ヲ以テ身體ヲ纏ヒ病床ニ就カ
 シムルニ宜シ然レ氏患者惡寒ヲ訴ル者或ハ皮表潤ヘル
 症ハ灌水スルコト勿レ五時乃至六時ヲ過テ后再灌水セシ
 ムベキ症モ間亦之アリ若故アリテ灌水ヲ忌ム氏ハ冷水

ニ醋ヲ加フル者格魯林水海塩精葡萄酒燒酒等ノ清冷洗
 滌法ヲ行ヒ粘汗出ル者ハ微温洗法ヲ施スベシ病毒分利
 ノ期ニ方リテハ微温ノ灌法或ハ洗法ヲ施シ民埜列里精
五方。三十方。卅一方。及ヒ龍腦百八十八方ヲ服セシムベシ但龍
四十方。四十一方。腦ハ持ニ覺機甚沈衰セル症ニ與フベシ病本復ノ期ニハ
 嚴ニ食餐ヲ節シ衰弱甚シキ者ハ幾那百六十一方ヲ用フ
 ベシ○或毎服時刻ヲ遠隔シテ大量甘汞百九十九方ヲ施スヲ稱
 譽ス甘汞ハ大ニ肝ノ運營ヲ振起セシムルガ故ニ膽液ヲ
 合併セル症ニ殊ニ簡要トス或ハ小量ノ甘汞八分。四分。
一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。ニ至リ一時毎ニ與ヘテ効ヲ得ル者アリ○暴鼈爾田氏

ハ硫酸規尼捩百九十方ヲ稱用シ其他ノ醫ハ硝酸銀百九十方
 鉛糖百九十方明礬百九十方外鉄鹽百九十方及ヒ青酸鉄百九十方
 ヲ賞賛セリ殊ニ腸瘍ヲ治シ下利ヲ制スルニ之ヲ用之然
 レ此ノ如キ人體ヲ害スルノ藥劑ハ吾輩ノ容易ニ處セ
 サル所ナリ且純性神經熱ノ下利ヲ停ムル功用亦甚微ナ
 リトス○別徇爾氏及ヒ歌倚涅氏ハ植物炭百九十方ノ効ア
 リレ症ヲ經驗セリ○高名ノ醫病初ニ吐劑ヲ稱用スル者
 アリト雖却テ害ヲ為シ易シ○婪忽兒突氏ハ肌熱熾盛腸
 胃ニ汚物鬱滯ノ候確然タル症ニ孕鹼酒石ノ偉効ヲ自驗
 シ一ヲ迄水ニ溶化シ水六甘汞ヲ用フルノ后少頃アリテ

頻々食匙ヲ以テ之ヲ服用セシム又婪忽兒突氏醋酸加里。
 醋酸曹達ヲ用フ此劑ハ下利ノ効甚微ナリト雖大ニ蒸發
 氣ヲ催進ス而シテ身温中度ニシテ假令之ヲ衝動セザルモ
 動輒衰弱ニ陥ラントフル者之ヲ用フレハ其効カ他藥ニ
 超絶ス病虛性ニ遷ルルハ婪忽兒突氏醋酸加里ニ代ヘテ
 民埜列里精ヲ用ヒ或ハ其症ニ隨ヒ纈草亞的兒劑葡萄酒
 其他強壯ノ諸藥ヲ並用シ胸内ニ較著ノ關係アル氏ハ民
 埜列里精ト共ニ碓砂遠志安息香等ヲ用フ按スルニ婪忽兒
ル症ヲ療スルハ恐ラク○梟軋爾氏ノ說ニ據レハ敵度
ハ中和鹽ヲ除クナル○梟軋爾氏ノ說ニ據レハ敵度
 利阿達私剝篤亞斯ハ純性神經熱ノ奇藥ト云フト雖此劑

下利及ニ衰弱ヲ来スガ故ニ害アリトス○未_カ鯊_イ垓_テ氏_ノ祿_ノ温_ノ
 顛爾毒土氏ハ水銀膏一錢乃至二錢ヲ以テ一時毎ニ之ヲ
 塗擦シ急ニ流涎ヲ起サシメ專之ヲ施シテ其効ヲ竝ツト
 雖然モ此療法ハ決メ歴驗ニ出ルニアラズ寧口軟膏ニ升
 汞ヲ和シ九百九十方塗擦スルヲ優レリトセシ光菁膏芥子泥
 吐酒石膏等ヲ以テ盲腸ノ部ニ擦スルモ亦同効アルベシ
 ○第一百七十三方漢都

過爾托半一錢

常水適宜煮將熟加吐根六ハ飽熟四分

時濾過取六ヲ加後藥

蒲公英流動越幾斯半錢

附

蘆根流動越幾斯三錢

半附 醋

酸加里液六錢

過爾托舍利別半

右調和每一時服一食匙

○主治鈍性神經熱係腹内症ニ聖京偃及ヒ腸胃汚物ヲ合
 併セル症初起之ニ宜シ

○第一百七十四方同上

菲阿斯越幾斯二

安質没尼酒一

苦扁桃水半錢至

過兒托舍利別 菩提樹花水各一

右調和每半時乃至四分時之三服一茶匙

○主治鈍性神經熱聖京偃ヲ帶ズル症呼吸器ノ刺衝連綿
 ○トメ止マサル片之ヲ鎮靜スルニ宜シ

○第一百七十五方同上

實⁺芟⁺荖⁺利⁺斯⁺葉⁺八八至

熱湯適宜浸瀘取六勺加後藥

刺⁺篤⁺亞⁺斯⁺與⁺新⁺製⁺枸⁺櫟⁺汁⁺飽⁺和⁺者⁺半勺至

苦扁桃水勺

至⁺四⁺ 過⁺兒⁺托⁺舍⁺利⁺別⁺勺

右調和每一時服一食匙

主治鈍性神經熱帶聖⁺京⁺偃⁺症⁺胸⁺膜⁺肺⁺臟⁺肺⁺管⁺或⁺氣⁺管⁺二

液畜積入⁺心⁺頑⁺固⁺ナ⁺ル⁺者⁺二宜⁺シ

○第一百七十六方同上

新⁺絞⁺枸⁺櫟⁺汁⁺與⁺刺⁺篤⁺亞⁺斯⁺飽⁺和⁺者⁺勺 蒸⁺餹⁺水⁺勺 苦⁺扁

桃⁺水⁺勺 過⁺兒⁺托⁺舍⁺利⁺別⁺勺

右調和每一時服一食匙

主治鈍性神經熱帶聖⁺京⁺偃⁺症⁺胸⁺膜⁺肺⁺臟⁺肺⁺管⁺或⁺氣⁺管⁺二

輕易ノ⁺燃⁺衝⁺性⁺關⁺係⁺アル⁺者⁺之⁺二宜⁺シ其⁺症⁺ニ⁺隨⁺テ⁺局⁺處⁺或

ハ⁺全⁺身⁺ノ⁺放⁺血⁺モ⁺亦⁺施⁺ス⁺ベ⁺シ

○第一百七十七方同上

沙⁺列⁺布⁺末⁺勺半 常⁺水⁺適⁺宜⁺煮⁺將⁺熟⁺加⁺吐⁺根⁺六⁺勺加⁺密⁺列⁺七

錢⁺半⁺飽⁺熟⁺四⁺分⁺時⁺瀘⁺取⁺六⁺勺更⁺加⁺後⁺藥

蒲⁺公⁺英⁺流⁺動⁺越⁺幾⁺斯⁺附半錢 蘆⁺根⁺流⁺動⁺越⁺幾⁺斯⁺ 醋⁺酸⁺加

里⁺液⁺各一錢半至三錢

右調和每一時服一食匙

主治 聖京^{セントギン} 鈍性^{鈍性} 神經熱^{神經熱} ヲ帶^帶 日^日 然^然ル 鈍性^{鈍性} 神經熱^{神經熱} ノ初起^{初起} 腸胃^{腸胃} 汚物^{汚物} ノ微^微 アリテ兼^兼 テ下利^{下利} ニ傾^傾 キ且^且 肚腹^{肚腹} ニ惡^惡 ムベキ關係^{關係} ヲ覺^覺 ユル者^者 之ニ宜^宜 シ症^症 ニ應^應 シテ醋酸^{醋酸} 加里液^{加里液} ヲ去^去 ルベシ

○第百七十八方 同上 甲

甘扁桃^{去皮} 二箇

白嬰粟子^{錢三}

石臼搗爛加蒸餾水六勺

作乳劑加後件

菲阿斯越幾斯^二 白糖^{錢三}

右調和每一時服一食匙

主治 鈍性^{鈍性} 神經熱^{神經熱} 係^係 腹內^{腹內} 症^症 發生^{發生} ノ期^期 ニ用^用 ヒテ之^之 ヲ防止^{防止} スルニ宜^宜 シ且^且 左法^{左法} ニ後^後 ヒ小量^{小量} ノ吐根^{吐根} ヲ兼^兼 用^用 スヘシ

○第百七十八方 同上 乙

吐根末^{一匁至一匁半}

白糖^{錢一}

右調和為散等分六包每服一包日三次乃至四次

備考之ヲ用ヒテ其証仍頑滯セル片ハ上ノ乳劑ヲ連服

セシメ兼テ以散各包中龍腦四分ハ一乃至半ハヲ加

用シテ効ヲ得ルノ間之アリ

○第百七十九方 同上

精製阿芙蓉

吐根末^{各六分ハ一四}

白糖^半

且^且 散^散

右調和為散分六包每服一包日二次乃至三次

主治 鈍性^{鈍性} 神經熱^{神經熱} 係^係 腹內^{腹內} 症^症 下利^{下利} 太過^{太過} ノ者^者 ニ宜^宜 シ但此方

遠西方彙 卷二 鈍性神經熱 廿三 廣 厚 堂

ヲ用フル下利適宜ニ減スルヲ度トス全ク之ヲ過ス
ルニ至ル勿レ○發熱ヨリ第五日至ニ下利ヲ發シ之
ヲ診スルニ腸ノ粘液膜未死壞ノ証ヲ見ハサズ且溶渙
ノ性ヲ帶ビス腹痛劇甚ナル者ハ始此散各包中ニ甘汞
六分ハ一乃至四分ハ一ヲ加フルヲ佳トス

○第百八十方 同上

甘汞 六分ハ一。四分ハ一。半分ハ一。 白糖 一

右調和為散分六包每服一包日一二次乃至三次

備考鈍性神經熱ニ甘汞ヲ用ヒテ或ハ大便ヲ促シ或ハ
胸腹諸器ニ焮衝ノ候アル者ヲ主治ス蓋大便ヲ促スキ

ハ小量ニ與ヘ灌腸法ヲ兼用シテ之ヲ扶ケ焮衝性疾患
ニ用フルハ稍其服量ヲ加増スベシ

○第百八十一方 同上

甘扁桃 去皮 白罌粟子 錢三 蒸餾水 六 作乳劑加後

藥

龍腦 一分半加亞刺昆亞 苦扁桃水 二刀至 過兒抱

舍利別 手 內症主之

右調和每半時乃至一時服一食匙

主治鈍性神經熱係腹內症生カ脱衰甚シキ者或ハ將ニ
脱衰セントスル者ニ宜シ之ニ兼テ芥子泥ヲ貼スベシ

○第百八十二方

龍腦

六分 一分 四分

麝香

四分 一分 半

白糖

半 餘

右調和為散分六包每服一包日二次乃至三次

主治鈍性神經熱係腹內症生力沈衰且昏睡狀ヲ見ハ

ス者ニ宜シ

○第百八十三方〔漢都〕

格魯林水

半 至 六錢

蒸餾水

六

過兒托舍利別

一 至 三

右調和每半時若四分時之三服一食匙

主治鈍性神經熱係腹內症抵抗力沈衰シ溶渙失血ヲ發

シ或ハ凡テ血液溶崩候確著ナル者ヲ治ス

○第百八十四方〔同上〕

沙列布末

半 刀

水適宜者將熟投續草二錢黃幾那半

乃至六錢濾過取六分冷定加後藥

忽弗滿液

半 錢 至 一 錢 半

過兒托舍利別

一

右調和每一時半服一食匙

主治鈍性神經熱係肺或腹內症生力全ク虚脱シ咽喉及

ヒ口中鵝口瘡ヲ生スル者ニ宜シ之ト共ニ龍腦半

乃至一八半ヲ與フル日ニ數次ニ宜シ

○第百八十五方〔同上〕

硼砂

錢 一

撒爾非亞水

二 弓 溶解 加 後 藥

遠田方景

卷二

鈍性神經熱

廿五

廣

月

堂

沒藥丁幾錢二

玫瑰蜜一

右調和為塗液

右調和為塗液

主治鈍性神經熱ニ併發セル鷺口瘡ニ宜シ

○第百八十六方

格魯林水一

至

並刺毘亞護

護漿

遇兒托舍利別

蒸餾水三

右調和每一時服一食匙

主治鈍性神經熱係腹內症ニ宜シ十二時間ニ一乃至

一乃至半ヲ服盡スベシ之ニ兼テ格魯林ヲ洗法トシ用フ

○第百十方モ亦用ヒテ可ナリ

○第百八十七方

未爾爾兒地忽的兒梗優

精製食鹽錢一

蒸餾水五ヲ溶化加後藥

遇兒托舍利別一

右調和每一時服一食匙

主治鈍性神經熱ノ第二期ニ方テ此方奇効アリ但之ヲ

用フルト一二日ニ過グベカラズ理篤卓氏モ亦之ヲ稱

用セリ

○第百八十八方

稀鹽酸錢一

遇兒托煎六

覆盆子舍利別一

右調和每一時服一食匙

主治 純性神經熱係腹裏症ニ宜シ○第九十七方若ハ第百十一方モ亦用ヒテ可ナリ

○第百八十九方

龍腦四ハ 白糖四ハ

右調和為散等分八包每一時乃至一時半服一包

主治 純性神經熱係腹内症今利ノ期ニ方リテ覺機甚沈

衰セル者ニ宜シ

○第百九十方列設爾

甘汞一ハ 白糖半ハ

右調和為散分四包早且服一包隨其症晡時又與一包

主治 純性神經熱係腹内症ニ宜シ○先刺絡シテ后再施

ナリモ亦可 甘汞一刃ヲ取リ早且ニ與フベシ更ニ劇甚ノ症

ニ至テハ半錢ヲ與フルモ亦可ナリ其症ニ隨ヒ晡時又

一刃ヲ與ヘ下利スル者ハ阿芙蓉一ハ乃至二ハ又配伍

スヘシ大便增多セサルハ三時乃至四時ヲ經テ后扁

桃油密幾私去爾 附若ハ複方梅那浸ヲ與スベシ○列設

爾氏上法ノ如ク之ヲ施シテ劇熱鎮降スルニ至ルニ日

乃至三日之ヲ持重スル症アリ又更ニ久ク連用スル症

アリ但流涎ヲ發スレバ後服ヲ停止列設爾氏此療法ヲ

用ヒテ四十九人ヲ治セリト云フ○屋兒弗氏ハ此法ヲ

改革シテ朝五半時ヨリ四半時至四分時間ニ甘汞半勺ヲ與フルト二次重症ニ至テハ又晚ニ及シテ再服セシム生カ沈衰スルキハ毎服龍腦一以乃至三以ヲ伍シ或ハ龍腦乳ヲ兼服セシム甘汞ヲ用ヒテ吐逆スル者ハ之ニ薄荷油糖ヲ配伍シ蓋此時ニ當テ通常水銀劑ヲ用フルト一般攝生調護ヲ善クセシム即暖室ニ居リ飲液ヲ温服セシメ温浴法ヲ施シ口内ヲ洗淨スル等是ナリ上法ノ如クニシテ汞劑ヲ連用スルト五日ヨリ七日ニ至ル若生カ沈衰スル者ハ更ニ時刻ヲ遠隔シテ或ハ二次之ヲ與フ或ハ甘汞ヲ屏ケテ用ヒサルトモ亦之アリ病

者本復之期

大率此症本復スル日容易ナラス方ヲ

ハ龍腦攝爾扁太里亞ヲ用ヒ次ニ強壯藥ヲ施シ謹テ攝

生ヲ善クセシム○好弗人呂私同失設列爾同私葛爾老

同等モ亦大量ニ甘汞ヲ稱用テ苦列私欲婪忽兒突同等

ハ甘汞ニ効ヲ見ズ獲魯思婪倚謨人噎別爾萊倚爾同ハ

却テ其害アルトテ試驗ス下云フ

○第九十一方 暴驚爾田

硫酸規尼捏ハハ至

扁桃油密幾私去爾ハハ至

右調和每一時服一食匙

主治 神經熱係腹內症ニ甚之ヲ稱用セリ○病ニ極期ニ

送子方書

卷二

鈍性神經熱

七

慶

堂

至テ或ハ硫酸規尼捏ニ必要ノ症行ク或ハ然ラザル者ア

世大率硫酸規尼捏ヲ用フル適當ノ證候今世未一定セ

サ能ク見ルニシテハ此ノ由容儀等去爾ハ通例ニ依リ或

○第百九十二方

結晶消酸銀二ハ沙列布煎六ヲ溶化水銀劑ヲ用テ

右調和毎一時服一食匙思藥劑ヲ入シテ攪拌藥劑

主治葛兒篤氏神經熱係腹内症善之ヲ用セテ佳効ヲ得

シ者二十人ニ過タシト云フ或ハ間硝酸銀同量四ハヨ

リ六ハ至テ施用セリ○此法ハ兼テ硝酸銀ヲ灌腸トナ

シ之ヲ五ハ至沙列布煎六ヲ和シ用フ蓋之ヲ施ス氏

ハ長管ノ水銃ヲ用ヒ極メテ深ク腸中ニ送ルベシ○噎

別爾私名謁爾私名訶兒斯名同昏撫謨名同モ俱ニ之ヲ賞譽セ

リ腸ノ知覺過敏ノ者ハ最初ノ灌腸液ニ阿芙蓉少許ヲ

加フベシ

○第百九十三方帶那私設私那私設

精製鉛糖四分ハ一上好吐根末九

右調和為散分八包毎服一包日三次乃至六次

主治鈍性神經熱係腹内症第二期ニ至リ下利スル者ニ

宜シ下利ヲ治スルハ通例服量ニハニシテ足レリ○訶

兒設爾名ハ鉛糖一ハ日ニ三服スルヲ常法トセリ而シ

急卒ニ下利ヲ遏止セザルガ為ニ更ニ蓖麻油ヲ兼用セ

○第百九十四方〔獨浦列爾〕〔思歌達〕

明礬五 乳糖半

右調和為散分十二包乃至十四包每半時服一包

〔主治〕純性神經熱係腹内症ノ初期殊ニ之ヲ用フ極メテ

危険ノ症ニ至テハ明礬一錢水一比ニ溶化シ每一時灌

腸シテ五回ニ及ブベシ醇警爾名ハ別ニ預療法ヲ行フ

トナク純性神經熱ノ患者ニ概シテ明礬ヲ與ヘ特之ニ

由テ數人ヲ治セリ其効驚クベシト云フ

右上火溶化分為二劑供灌腸

〔主治〕純性神經熱係腹内症下利太過ノ者ニ用フ○此灌

腸劑藥局ニ於テ製スル一ナク病家ニ之ヲ作ルヲ佳ト

ス何トナレハ長路咎ヲ移セバ變メ糊トナレハナリ

粉ヲ熱湯ニ溶シ微温ニ至ルヲ俟テ直ニ注射スルヲ更

ニ妙トス

○第百九十九方〔純爾〕

升汞半 家猪脂半

右調勻每一時取少許塗擦肚腹

〔主治〕純性神經熱係腹内症ニ反對刺戟法トナシ用フ塗

擦スル部焮熱赤色ヲ見ハス六時ヲ過グレハ即チ疹ヲ發シ水搦液之ニ充ツ

○第二百方別路宛寫

龍腦錢半 的列並油 硃砂加石灰精各半

右調和作軟膏塗擦肚腹

〔主治〕督留神經熱係腹内症第二期ニシテ發スル所ノ腸 瘍ヲ治ス

遠西方彙卷之二

遠西方彙卷之三

獨乙 加幾安頌 著

和蘭 傑。婆。婆。都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文仲 重譯

南洋伊東 亨健夫 參校

腐敗熱 フエブリス ズトリダ オチピユス

腐敗熱ヲ療スルニ醫ノ用心專病室ニ淨潔清涼ノ氣ヲ引

クニアリ之ヲ治スルノ藥品鑛酸類ヲ以テ第一トス就中

稀硫酸ニ方硫酸密キ私ス去キ爾ル附三百二方收飲亞的現ヲ腸

遠西方彙

卷三

廣 堂

胃ノ汚物及ヒ膽液合併ノ症ハ殊ニ稀鹽酸九十七方。百十
二百ヲ用ヒ兼テ冷水ヲ以テ身體ヲ洗フニ宜シ醋或ハ格
 魯林モ亦之ニ加フベシ溶崩ノ候ヲ見ハス片ハ最明礬二
十六方。ニラ稱賛ス斯篤計私氏ハ麥酒酵ヲ以テ最止腐劑
百十七方ニ稱用シ或ハ之ヲ内服セシメ每一時半或ハ之ヲ灌腸劑
ニ加フ○古昔ノ醫腐敗熱ヲ療スルニ初吐劑ヲ與ヘ後中
 和鹽ニ少量ノ吐酒石ヲ加用ス八十方至八十方ト雖此療法
 ハ特真ニ腸胃汚物ヲ挿ム症ニ適當ニ峻下劑ハ大ニ害アリ
リトス之ニ及メ純精酒石。荅麻林度九十三方。百三十一ノ良
 効アルハ屢歴驗シテ確定スル所ナリ○先輩又幾那ヲ主

藥トシ殊ニ之ヲ衝動藥ト配伍ス二百八方至ト雖幾那ハ
 唯疾患快路ニ趣キ血管統系ノ刺衝腸胃ノ汚物除キテ後
 深ク沈衰セル生カラ補助スルニ至リテ適當ナリトハ衝
 動藥ノ中ニ就テ殊ニ亞兒尼加花二百四方。二龍腦百五十
百五十ヲ稱用ス若其他ノ藥方二百十五方至ヲ謾投スル
 片ハ却テ害ヲ為シ易シ唯脈細弱。顏貌羸瘦シ大ニ衰弱セ
 ル者ハ葡萄酒ヲ許シ與フベシ○血脈系ノ興奮機亢盛シ
 加之失血スル者ハ何等ノ症ヲ論セス飲酒ヲ禁スベシ内
 部ニ激衝アル者ハ蟻鍼吸角寒罨法ヲ施シ溶崩下利ハ明
 礬二百十六方亞兒尼加根二百十八方至鹽酸銻百九十沙

列布ニ赤葡萄酒少許ヲ加ヘテ飲料トシ漿粉ノ灌腸法九百
 方十八及ヒ下腹ニ香竈蒸漏法ヲ施スベシ出血スル者ハ稀
 硫酸或ハ明礬ヲ用ヒ寒罨法及ヒ冷水射注法ヲ行フ吐腹
 風脹スル者ハ礶砂加石灰精或ハ冰粒ヲ與ヒ腫瘍ヲ發ス
 ルノ景况アル者ハ燒酒醋拘緣汁燒酒ニ雞子白ヲ和スル
 者二百方廿格魯林カ加爾基ルノ溶液二百方廿稀淡ノ木酸二百方廿
 等ヲ以テ洗フニ宜シ

○第二百一方

稀硫酸一錢至二錢 沙列布煎四 覆盆子舍利別一至三
 右調和每一時服一食匙一

○第二百二方弗陽

收斂亞的兒三 覆盆子舍利別一

右調和取一茶匙乃至二茶匙加水一比一日服盡

主治右ノ二方ハ腐敗熱ノ腸胃汚物ヲ帶ル一ナク而メ

頭痛壓重面色赤ク一青ラ帶ビ脈緊ニメ小或ハ大ナル

ガ如クニシテ其實ハ虚シ肌熱灼クガ如ク呼氣惡臭ヲ

帶ビ排泄物モ亦惡臭アル症ニ宜シ

○第二百三方同上

鹽酸三 覆盆子水三 覆盆子舍利別一

右調和每半時取一食匙強粘滑煎液和服

主治 鈍性神經熱ニ宜シ殊ニ其症流行シ傳染腐敗ノ性アリ。皮膚乾燥ノ熱シ。渴アリ。口内上顎及ヒ咽喉乾燥シ。頭痛。狂妄。血行平穩ナラズ。溶崩ノ景況アリテ出血スル者ニ宜シ又此ノ如キ証狀ノ發疹熱就中痘瘡症ニ之ヲ與フベシ

○第二百四方〔曾別倫歌〕

主 亞兒尼加花浸花五ヲ但亞兒尼加 龍腦密シキ私去爾
〔附〕 稀鹽酸錢二 遏施印亞的兒半錢 覆盆子舍利別一

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩

主治 鈍性神經熱腐敗ヲ兼ル症及ヒ同性ノ皮膚病ニ宜シ

○第二百五方〔樞屈拔爾記〕

醇醋一 櫻實舍利別二
〔附〕 右調和每半時服一食匙

主治 腐敗熱鈍性神經熱ニ宜シ

○第二百六方〔弗陽〕

精製硃砂一錢半 吐酒石二 接骨木花水五 溶和加後件

民埕列里精一 遏兒托舍利別六錢

右調和每半時服一食匙強

主治腐敗熱神經熱ノ初起頭痛劇ク。面赤ク。眼光火ノ如ク。脈實シ。苦悶甚シク。而ノ患者體格強實ナル者之ニ宜シ

○第二百七方同上

纈草根半 熱湯適宜浸漬瀝過取四弓加後件

荅麻林度下 枸椽舍利別各半 亞的兒一錢

右調和每半時服一食匙

主治神經熱腐敗熱腸胃汚物ヲ挿ム者之ニ宜シ

○第二百八方同上

幾那越幾斯三錢 蓬酸一錢半 醇醋一 接骨木花水十

接骨木子舍利別一

右調勻每半時服一食匙

主治腐敗熱膽液様ノ汚物ヲ排除スル后之ヲ用ヒ又鈍性神經熱真ノ衰弱ニ係ル者之ニ宜シ

○第二百九方爾過福佛地

幾那一 水一匕煮瀝取四弓加後件

新絞枸椽汁三 列印設酒 覆盆子舍利別各一

右調和每一時服一食匙

主治腐敗熱腸胃ノ汚物ヲ排除スル后皮膚稍滋潤シ生

カ始テ沈衰シ。脈細數。眼中混濁且常形ヲ變シ。喃喃謔語スル者之ニ宜シ。胃腸汚物鬱積セル者其他脈實緊。苦悶甚シク。眼面赤色。或ハ狂妄ニ似テ謔語スル者ハ幾那ヲ忌ムベシ

○第二百十方 職歌蘭度

王幾那末^一 水十六^勺 煮耗至^八 勺加攝爾扁太里亞

末^一 亞兒尼加根末各二錢飽熟瀝過更加後件

復方幾那丁幾^三 生明礬^二 忽弗滿液^一 桂舍利^一

別^一

右調和每一時服ニ食匙

主治腐敗熱生力沈衰セル者之ヲ振起シ溶崩ヲ防止スルニ宜シ此方ハ峻藥ノ合劑タリ宜ク謹慎シテ用フベシ

○第二百十一方 過傑栗屈的兒

赭色幾那^一 水一^斗 煮耗至^七 勺加白芷攝爾扁太里

亞各二錢飽熟瀝過放冷更加後件

過施印亞的兒^一 桂舍利別^一

右調和每一時服ニ食匙

主治腐敗熱ニ宜シ

○第二百十二方 別連杜

亞兒尼加花錢二 熱湯適宜浸漬瀝過取六分加後藥

亞刺昆亞錢二 橙皮舍利別分一

右調和每一時服一食匙

〔主治〕鈍性神經熱及腐敗熱宜シ

○第二百十三方曾別倫欽

白芷半 熟湯適宜浸漬瀝過取六分放冷加後藥

桂加酒水附一分 甘海鹽精錢二 龍腦細碎半刀 雜腹至一刀

蘭舍利別分一

右調和每一時服一食匙臨服宜振蕩

〔主治〕鈍性神經熱腐敗ヲ兼ナル症ニ用テ飲前々切立ス

○第二百十四方弗陽

麝香六分至十分 純精酒石半錢 甘消石精一錢半 覆盆子

水三分 覆盆子舍利別錢三

右調和每半時服一食匙

〔主治〕神經熱及腐敗熱宜シ

○第二百十五方別連杜

上好麝香六分至四分 亞刺昆亞錢一 叮嚀擣和漸次

加後件

默栗薩水二分 橙花舍利別分一 過施印亞的兒半

右調和每半時若一時服一食匙臨服宜叮嚀振蕩

主治 衝動劑トシテ腐敗熱神經熱ニ用フ

○第二百十六方私傳呂埋兒 私傳福傑兒 陽

幾那越幾斯半 生明礬二刀至 桂水八 楡梲舍利

別或 過兒托舍利別一

右調和每一時服一食匙

主治 腐敗熱失血及ヒ溶崩下利溶崩汗アリ而シ患者硫

酸ニ堪ヘザル者之ニ宜シ ○腸中汚物及ヒ内臟閉塞ア

ル者ハ此方禁忌スベシ

○第二百十七方 私傳福傑兒

亞刺昆亞護謨 阿仙藥末各半 生明礬末一錢 薄荷

水四勺溶化加後件

上好列印設酒一

右調和每一時服一食匙

主治 腐敗熱溶崩下利ニ宜シ

○第二百十八方

亞兒尼加根二錢至 水九勺煮瀝取六勺加後味

橙皮舍利別一

右調和每一時服一食匙

○第二百十九方 別連杜

亞兒尼加根 格綸僕各二錢 葛私加栗刺三錢 熱湯適

遠西方藥 卷三 腐敗熱 廣 月 堂

宜浸漬瀝過取六勺加後件

○ 橙皮舍利別方 右調和每一時半服一食匙

○ 第二百二十方 惡持爾滿

攝爾扁太里亞末 亞兒尼加根末 薄荷油糖各二

右調和為散等分十裹每一時服一裹

主治右三方 至二百十八方 腐敗熱ノ下利ヲ停ムルニ用

不勝味無十餘則一食理

○ 第二百二十一方 堊霸憫

雞子白 振蕩上文火攪攪不住徐徐加燒酒六勺

右局部發赤色帶疼痛者宜塗之

○ 第二百二十三方

格魯林加爾基 水八勺溶化

右洗滌所

○ 第二百二十三方

木醋 加密列浸 六勺至

右調和洗滌所

主治右三方 至二百廿三方 腐敗熱神經熱其他危險ノ

症眼瘡ヲ發スル者之ヲ用フ

間歇熱 至二百廿三方 至二百廿三方 腐敗熱

遠西方藥

卷三

九

廣 月 堂

此症焮衝性ヲ見ハス者ハ希ニアル所ナリ若之アル氏ハ
石砂吐酒石二百廿五方ノ如キ輕易消焮法荅麻林度九十三方純精
酒石九十四方滿那等ノ清涼下劑ヲ用ヒテ勉テ之ヲ防グベシ
焮衝劇度ニ進ミ或ハ之ニ加フルニ發作ノ際肺焮衝ノ景
况及ヒ胸脇痛ヲ以テスル者ハ精製消石ヲ用ヒ且發作中
若クハ免熱時小心シテ刺絡ヲ施スモ亦簡要ナルベシ但惡
寒ノ時期ハ嚴ニ然レモ局處ノ瀉血ヲ優レリトスル症多
之ヲ禁忌スベシ
シ○間歇熱ハ腸胃汚物ヲ兼ヌル者最多シ汚物頗盛ナル
氏ハ必之ヲ和解シテ以テ熱ノ發作ヲ妨グルナカラシム
ベシ此症石砂ヲ與フルヲ佳トス但小量ノ吐酒石二百廿四
方至

二百廿六方ヲ伍スレバ更ニ妙ナリ若其汚物頗膽液ヲ兼ヌル
氏ハ孕驗酒石十八方五十方ヲ與ヘ後吐劑ヲ用フヘシ之
ニ由テ熱解スル者多シ若解セザル氏ハ硫酸規尼捏ニヲ以
テ制伏スベシ春時發スル所ノ輕易ノ間歇熱ノ如キ健康
ノ人唯冒寒ニ因テ之ヲ得ル者ハ解凝藥ヲ要スルヲナク
直ニ硫酸規尼捏ニヲ與ヘ次デ熱毒及ヒ腸胃ニ鬱積セル汚
物ヲ除クニ宜シ四日熱ハ腹裏ノ慢性病ヲ合併セル者多
シ之ヲ治スルニ截熱以前又シク預療法ヲ施スヲ要トス
但腹裏ノ疾患熱勢ノ為ニ緩解シ或ハ全ク退ク者屢之ア
ルガ故ニ此ニ驅熱劑ヲ與フルハ慎マサルベカラス○夫

驅熱藥ハ大率之ヲ舉クルニ二種トス即幾那皮並ニ其亞
 爾加祿乙甸規尼捏○聖叔尼及ヒ砒石是ナリ幾那皮就
 中王幾那皮諸種ノ中ニ就テ王幾那ハ規
 尼捏ヲ含蓄スルヲ最多シハ殆二百年來間
 歇熱ニ的中ノ良藥トス帝ニ熱ノ發作ヲ遏ムルノ功用確
 實ナルノミナラズ其再發ヲ禦ガモ亦他藥ニ優レリ蓋幾
 那ノ功用ハ專間歇熱ノ素因ヲ驅除スルニ由ルナリ二百
 廿九
 方至二百幾那ヲ以テ浸劑煎劑ニ作ル氏ハ驅熱ノカラ生
 五十方スルヲ十分ナラズ實物ヲ散藥ト為ス者最確實ノ効アリ
 蓋胃ハ單味ノ幾那末ヲ受クルニ堪ヘズ強テ之ヲ與レバ
 後胃部ノ壓迫便秘下利其他惡ムベキ証ヲ發スル者屢之

アリ宜ク香竅藥大黃或ハ症ニ隨ヒ阿芙蓉ヲ配伍ノ之ヲ
 防クベシ然レト亞爾加祿乙甸ヲ發明セシ以來今世醫流
 幾那皮ヲ用フルヲ稀ナリ亞爾加祿乙甸ハ間歇熱ヲ治ス
 ルノ効力十分ニシテ之カ為ニ惡ム可キ患ヲ生スルヲナ
 ケレバナリ亞爾加祿乙甸ノ中ニ就テ最硫酸規尼捏ヲ勝
 レリトスニ百五十五方至
 二百八十九方其他ノ者ニ百七十七方至
 二百八十九方ヲ用
 フルヲ甚シ規尼捏ハ免熱時ニ方テ與フベシ中度ノ服量
 大人ハ六匁ヨリ十二匁小兒ハ三百卅三方 二匁ヨリ六
 匁ニ至ル硫酸規尼捏ハ内服ノミナラズ亦賢姪兒麻質私
 法トナスアリ殊ニ患者嚥下シ得サル者或ハ規尼捏ヲ服

スルコトヲ欲セザル小兒ノ如キハ此法ヲ宜シトス其法胃
 上或ハ脊推込傍ニ小ナル發泡膏ヲ貼シ其經一度乙謨ヨ
 リ一度乙謨半至表皮ヲ剥キ去リテ硫酸規尼捏四ハヲ撒
 敷シ蠟紙小片ヲ以テ之ヲ掩ヒ小ナル英吉利硬膏若ハ膠
 着硬膏一二片ヲ以テ其上ニ貼定スルナリ若尚多量ノ規
 尼捏ヲ用ヒント欲セハ數所ニ之ヲ施スヲ良トス一所ニ
 撒敷スルコト多量ニ過レバ厚痂ヲ結ビテ其吸收ヲ妨グ○
 嚥下艱難ノ症ニハ規尼捏ヲ灌腸ニ三百廿九方至ニ用フル
 モ亦可ナリ○往昔唯自國ノ藥物ノミヲ採用スルノ學派
 コニチ子ニル行レシ時其探索シ得タル代用藥ハ輕易ノ

症ニ効アリト雖然凡幾那ニ代フベカラズ即歐歌蘭度ノ

人造幾那ニ百五十一方方水楊梅根ニ百九十九方至
 九十三方至ニ撒里矢捏ニ百九十九方至七葉樹皮ニ百九
 百九十五方至ニ設篤拉里捏ニ三百方等是ナリ龍腦ニ三百方至
 至三百方設篤拉里捏ニ三百方等是ナリ龍腦ニ三百方至必百力
 捏ニ三百方白芥子ニ七百方番椒ニ三百八方至苦扁桃一方至墨列僕
 里ニ三百方弗魯里矢捏ニ三百方阿芙蓉四方百十燐五百十格魯
 林曹達ニ三百方鍊屑ニ三百方青酸鍊即精製洋靛至三百十八方
 金硫黃ニ三百廿一方方膽礬三百廿四方碓銅礬五百廿八方
 熱ノ効症ニ從テ優劣アリ○砒石ハ幾那及ヒ其亞爾加祿
 乙甸ノ効アラザル症ヲ治スルコト間之アリ私昆列印氏ハ

遠西方彙 卷三 間歇熱 十一 廣月堂

痙強狀及ヒ癩癩狀ノ間歇熱又間歇熱頑固ニシテ局處ノ
疾患ヲ帶フル症ニ之ヲ稱贅ヒリ但砒石ヲ用フレバ腹内
諸器ノ損害水腫及ヒ全身血液腐敗等ノ如キ危重ノ症ヲ
遺スカ故ニ之ヲ用フルハ忌ムヘキナリ予此ニ三四方ヲ
掲クル者ハ專此書ヲ全備スル所以ナリ
三百六十六方至三百七十八方
○惡性間歇熱ノ療法ハ唯再次ノ發作ヲ遏止スルヲ主ト
ス故ニ第一發ノ後速ニ硫酸規尼捏多量ヲ用ヒ第二發ノ
前半時許ニ至テ規尼捏ノ量ヲ一倍シ阿芙蓉一瓜若ハ二
瓜ヲ配伍スベシ發作ノ間患者直視シ軒聲高ク脈小ニメ

間歇シ。全身強勁ノ症ハ阿芙蓉ノ効アルヲ經驗スル所ナ
リ二百四十六方甲
三百四十四方乙世上惡性間歇熱ヲ治スルノ方多シ醫
士能ク之ヲ検査メ症ニ應シ適當ノ者ヲ撰用スベシ
○間歇熱後脾臟ノ腫起ヲ遺ス者アリ亦幾那三百三十九方規尼
捏若ハ鉄劑三百四十一方ヲ用ヒテ療スベシ鉄劑ハ脾臟
軟化ヲ兼ヌル症ニ最適應ス○間歇熱後ノ水腫モ亦幾那
或ハ規尼捏ヲ利尿劑及ヒ強壯劑ト配伍シ三百四十二方
至三百四十四方
方與フベシ金硫黃
三百四十六方七亦効アル症間之アリ
○第二百二十四方過。係。栗。風。的。魁

蒲公英流動越幾斯半精製砒砂一錢至加後藥

遠西方彙 卷三 廣月堂

溶解

橙花水五

右調和每一時服一食匙

○第二百二十五方同上

吐酒石一

精製礪砂

精製度碌布各二

錢

加苗香水

四子溶解

右調和每一時服一食匙

主治

右二方

二百廿四方間歇熱

驅熱藥ヲ與ヘント欲

スルキ預用フベシ

醋酸

加里液

孕鹼酒石

十方

至

五

方其他解凝ノ効アリテ適宜ニ大便ヲ促ス所ノ中和

鹽ノ如キモ亦同上ノ意ヲ用ヒテ與フベシ若汚物逆上

ノ証アル者ハ吐劑ヲ兼用スベシ六十二方至七十一方又胃中汚

物ノ有無ヲ論セス吐劑ハ腹内神經ノ機運ヲ轉變セシ

ムルヲ以テ截熱ノ功用最偉ナリトス

○第二百二十六方秘傳福傑爾

精製礪砂

健質安那越幾斯各二

錢

加密列水八

橙

皮舍利別一

半

右調和免熱之間每一時乃至一時半服一食匙乃至三食

匙強

主治同上

透... 間歇熱... 廿四... 廣... 堂

○第二百二十七方同上

珊篤里葉 葛兒儒別葉 尋常亞爾鮮葉 睡菜葉各一

握 尋常加密列二撮 旃那葉 墨列僕里根各半 三幾

那一 孕鹼酒石六錢 白葡萄酒二北至 常水北一

右浸漬二三日而後濾過免熱日飲服一小盞日三次

○主治 間歇熱黑膽液畜積シ及ヒ便秘ヲ兼ル者ニ宜シ

○第二百二十八方弗陽

收飲亞的兒 一刃至 甘硝石精四刃 玫瑰水四 玫瑰

舍利別半

右調和每四分時服一食匙強

○主治 清涼姑息ノ藥トシテ間歇熱症發熱ノ時期ニ用フ

ベシ但其熱熾衝ヲ帶ル者殊ニ之ニ宜シ

○第二百二十九方穢歇蘭度

新玉幾那細末

右等分為八裏每一時服半裏

○主治 免熱ノ時之ヲ用フ若其免熱暫時ノ症ハ半時每ニ

一包ヲ服スベシ最後ノ一服ハ其量ヲ增加シ發作前ニ

切近ノ服スルヲ好トス若幾那ヲ服メ下利ヲ發スル者

ハ一時半乃至二時每ニ阿芙蓉丁幾一滴ヲ加フ或ハ之

カ為ニ便秘スルトハ每服大黃二三ハ伍用シ胃部壓

迫惡心或嘔吐ヲ起ス者ハ桂皮ヲ加ヘ若クハ每服強葡萄酒一匙ヲ以テ送下スルヲ佳トス。痙攣証ヲ見入ス者ハ續草或ハ葛根私篤樓謨ヲ配伍ス。惡性間歇熱ニシテニシオサレモ亦王幾那一ヲ以テ免熱ノ間ニ服盡セシム但發熱前一服ハ其量ヲ一倍シ且阿芙蓉二匁ヲ加フルニ宜シ

○第二百三十方 篤堙

上好幾那末一 橙皮舍利別適

右為煉膏每半時餘服一茶匙強直下宜令飲葡萄酒一食匙

○第二百三十一方 穢歇蘭度

新王幾那細末 桂舍利別適

右為煉膏每一時服一茶匙

○第二百三十二方 結列都菜兒

王幾那半 蒸餾水九匁 稀硫酸一錢 煮耗至四匁 放冷

加後藥

忽弗滿液錢一

右調和食匙抄頻服

主治 第二百三十方ヨリ第二百三十二方至免熱ノ時ニ

用ヒテ發熱ヲ遏止スルニ宜シ

○第二百三十三方〔秘傳〕驚滿間歇熱

王幾那錢一 攝爾扁太里亞根 硃鍊花各六 薄荷油

糖一

右調和為散分八裏免熱時用之至再發作前一時半盡之
主治此方截熱効最確實ナリト稱ス蓋叔密篤滿氏舍
電阿芙蓉液ヲ取リテ上方ノ第一服ニ一滴第二服ニ二
滴第三服ニ三滴第四服ニ四滴第五服ニ五滴第六服ニ
六滴第七服ニ七滴第八服ニ十二滴ヲ加フ二百七十三

○第二百三十四方〔栗屋的兒〕

赭色幾那一 葛私加栗刺錢二 水十六ヲ煮耗至八ヲ

濾過加後藥

加密列舍利別一

右調和每一時餘服二食匙

主治間歇熱幾那散ヲ服ノ瀉スル者之ヲ用フルニ宜シ

○第二百三十五方〔別連杜〕

王幾那錢六 黃橙皮油糖錢三 舍電阿芙蓉液二十滴

右調和為散分十二包免熱間每一時服一包

主治單純神經性間歇熱ニ宜シ

○第二百三十六方〔弗陽〕

幾那末刀一

精製礪砂刀半

右調和為散分六裹每一時服一裹至發熱前半時

主治間歇熱久夕替留スル症ニ宜シ

○第二百三十七方

湯儼栗屈的兒

大黃末錢一

精製礪砂刀一

幾那末刀一

右調和為散分八服每一時一服

主治間歇熱幾那ヲ服ノ便秘スル者之ニ宜シ

○第二百三十八方

福僂篤

赭色幾那末錢六

精製礪砂錢二

桂皮末錢一

橙皮舍利

別三

右調和為煉膏每服一茶匙日四次

主治間歇熱或ハ神經病ニ宜シ

○第二百三十九方

栗屈的兒

赭色幾那細末六錢

纈草末

橙皮越幾斯各一錢

橙皮舍

利別適宜

右攪和為煉膏每半時服一茶匙

主治間歇熱患者ノ胃幾那散ヲ受クルニ堪ヘザル者之

ニ宜シ

○第二百四十方

弗陽

幾那半一

半夏

墨列僕里根

健質安那各二錢

右調和為散每一時服半錢乃至一錢

主治頑固間歇熱ニ宜シ

○第二百四十一方阿西安姆爾 藥歌蘭度

王幾那四 荻若葉二

右調和為散分四服每二時一服

主治間歇熱頑固ニ其症數次發スル者ニ宜シ殊ニ四

日熱ニ好トス

○第二百四十二方弗陽 倣忽弗滿

幾那一 生安質沒尼五 至二

右調和為散分八包每服一包日二次乃至三次

主治頑固ノ間歇熱及ヒ感覺遲鈍ニシテ脆薄ノ人慢性

儂麻質斯ヲ患フル者之ニ宜シ

○第二百四十三方屋兒弗

加密列 赭色幾那各半 阿芙蓉八分 至六分 金

硫黃一 至二 芳香散五

右調和為散分十二包免熱之時服六包乃至八包十包或

十二包

主治頑固間歇熱ニ宜シ

○第二百四十四方遠幾秘列乙

別爾多婪根末錢 赭色幾那末一 橙皮舍利別宜

右調和為煉膏每一時服一茶匙

主治經久頑固ノ間歇熱其症屢々發シ腹内神經系著シク遲鈍ナル者之ニ宜シ

○第二百四十五方葛根 溼優滿

王幾那末一 姜末十五分 拂郎西赤葡萄酒八

白糖一

右調和四時服盡臨服宜振盪

主治惡性間歇熱速ニ過止スルヲ要スル者之ニ宜シ初發作ノ發汗減スルヲ俟テ始メテ之ヲ與フベシ而メ再次ノ發作前半時ニ方リ阿芙蓉一匁ヲ用フルニ宜シ

○第二百四十六方甲 護秘篤

赭色幾那 王幾那 赤幾那各半 水ニ北煮耗至一

北半濾過加列印設酒六匁

右調和每一時服二食匙

○第二百四十六方乙 同上

硫酸規尼捏一至六分 精製阿芙蓉四分 麻屈皇至半分

矢亞六 橙皮 白糖各半

右調和為散分十六服每一時一服

主治右二方惡性間歇熱ニ互用ス一次煎方ヲ服シ一次散方ヲ用フベシ此他幾那煎ニ硫酸規尼捏三匁乃至四

遠田方集 卷三 問歇熱 二十 廣 月 堂

氏ヲ和メ一時半毎ニ灌腸スルヲ好トス又發疱膏ヲ以

テ表皮ノ一處ヲ剥キ幾那ノ亞爾加祿乙甸規尼捏○聖叔尼捏○

規尼阿ヲ撒布スルモ亦可ナリ且鹽酸及ヒ硝酸ヲ温水

ニ加ヘテ脚ヲ浸ス丁日ニ三次鹽硝酸俱ニ食右ノ療

法ニ由テ大抵第二發ヲ遏止スベシ第三發ノ如キハ其

効愈確實ナリ○多血ノ患者ニ在テハ發作中尺澤ヲ刺

テ適宜ニ放血シ頭上ニ蟻鍼ヲ施シ以テ目前ノ危險ヲ

救フヘシ若其証狀痙攣ヲ帶ブル者ハ發作中阿芙蓉四

分氏ノ一乃至半氏ヲ取り半時若クハ一時毎ニ與フベ

○シ三百十四方ヲ照スベシ

○第二百四十七方

赭色幾那子吐酒石人

右調和為散分八服每一時乃至一時半一服

主治間歇熱腸胃汚物ノ証徵未除カズ或ハ肚腹内ニ閉

塞ノ恐レアル者之ニ宜シ

○第二百四十八方蒲列刺

王幾那子吐酒石人精製阿芙蓉人

右精密調和分六服每一時一服

主治險惡ノ間歇熱免熱暫時ノ症之ニ宜シ

○第二百四十九方越湯耳杜

遠田方集 卷三 間歇熱 三十一 廣 丹 堂

赭色幾那一錢者 精製硝砂一錢者 吐酒石十五分

右調和為散分十包每服一包日三次乃至四次

主治頑固ノ四日熱ニ宜シ此方ノ配合舍密術ノ法則ニ

背違スル所アリ又吐酒石ノ量甚過多ナリトス

○第二百五十方 名四日熱圓

幾那末一分 吐酒石十六分 炭酸剝篤亞斯一分 亞爾鮮一分

舍利別二分

右調和作圓如梧子大每服一箇日三次乃至四次

主治頑固ノ四日熱ニ宜シ

○第二百五十一方 碱歇蘭度人造幾那煎

水楊皮各粗末 七葉樹皮各粗末 菖蒲根 水楊梅根各粗末

錢

右水十六分煮至八分濾過每一時服二食匙

主治間歇熱及ヒ諸般ノ虛衰病ニ宜シ二十分乃至三十

○第二百五十二方 碱歇蘭度人造幾那散

水楊皮 七葉樹皮 健質安那 菖蒲根 水楊梅各細末

末半

右調和玻璃壘收貯間歇熱發作前茶匙抄服四次至六次

主治同上

○第二百五十三方 阿山

○復方幾那丁幾

亞爾鮮丁幾 各半

右調勻取四十滴葡萄酒一食匙和服日二次

主治間歇熱ノ素因ヲ除キ再發ヲ防クニ宜シ○又阿山

氏幾那酒浸劑ヲ與ヘテ同上ノ効ヲ得タリト云フ

○第二百五十四方 謝詒倫

○丁子油一阿芙蓉液半硫酸亞的兒一

右調和幾那服用之時最後二三貼此液二十滴乃至三十

滴和服

主治間歇熱單ニ王幾那ヲ久服スレバ數次發スル者之

ヲ用ヒテ確効アリ○訓夏氏ハ殊ニ沙羅葡萄酒ヲ稱用シ

テ再發ヲ防止セリ用法新鮮沙羅葡萄屑三盞乃至四盞強

ヲ取リ通例之橙皮四錢ヲ加フ上好赤葡萄酒一盞ヲ加ヘテ浸漬

シ每服一小盞強日ニ三次乃至四次數週之ヲ連用スト

云ス

○第二百五十五方 刺野松

硫酸規尼捏三至二白糖二

右調和為散分六包免熱之時用之

主治間歇熱及ヒ神經衰弱ニ宜シ但神經衰弱症ニ用フ

ルハ朝夕一包ニ止マルベシ○此散黑哥喜ニ和服セシ

ムルヲ最妙トス此ニ由テ規尼捏ノ苦味稍掩ハルレバ

ナリ 異性トシテ地ヨリ由テ賦性ニ苦和餘藥ハハレハ

○第二百五十六方 五カハハ 此方黒瀉糖ニ味照スレ

主 硫酸規尼捏子六 橙皮黄半五 煎熱湯調試天用之

右調和為散分三服免熱之時與之

主治 順正間歇熱ニ宜シ白糖

○第二百五十七方 穢歇鬱度

主 硫酸規尼捏子一 度碌布宜通 此方二十滴乃至三十

右為二十九夜石松粉每一時或一時半服之丸數用ス

○第二百五十八方 血熱墨爾 右調和為散分三服免熱之時與之

主 硫酸規尼捏子十八 吐酒石一人至一人半 健胃散附

○白糖 各一錢至一錢半 右為散分六包每服半包日四次

主治 葛蒲根浸之並用之 間歇熱ヲ治スベシ

○第二百五十九方 護秘篤 至二報照四次

主 硫酸規尼捏子六 吐酒石一人 麻痺涅矢垂錢一 白砂糖

右調和為散分十二包每半時或一時服一包

主治 諸種 間歇熱ニ用ヒテ良効アリ

○第二百六十方 護刺

主 硫酸規尼捏子半 吐酒石三人 苗香半一錢 加密列油加

右調和為散分十二包每半時或一時服一包

主治 諸種 間歇熱ニ用ヒテ良効アリ

送田丸膏
間歇熱
二十四
廣
丹

右調和為散分六服蠟紙包裹免熱之時每一時一服
主治間歇熱用此確實効力最初一服吐下發
スル者多シ合士二日真半熱夜二報服一時

○第二百六十一方〔袂設兒〕

硫酸規尼捏十五 桂皮半 玉幾那越幾斯適

○右為三十九衣桂末每一時乃至二時服四九

○第二百六十二方〔弗斯爾田蒲蘭度〕

硫酸規尼捏十五 睡菜越幾斯一 菖蒲根末適

右為十二九衣桂末每一時服一九乃至二九

○第二百六十三方〔盧屈松答度土〕

硫酸規尼捏二 芳香散半 苦扁桃油一 珊篤

里越幾斯適

○右為十九衣桂末發熱前服二九

○第二百六十四方

硫酸規尼捏三 砂糖舍利別一

右調和名麻健董名規尼捏舍利別

主治間歇熱宜之六抵六匙ヲ服ノ截熱ノ効ヲ得ルニ足ル

○第二百六十五方〔林港松〕

○硫酸規尼捏ハ加後味溶化

越栗シ幾ル矢爾ル必篤里阿利リ半ニ再餹燒酒一錢

右濾過取十二滴乃至二十四滴或應症更取多量和甘味

燕麥汁若稠厚砂糖水與之合味

[主治]右諸方二百五十五方至免熱ノ時ニ用ヒテ間歇熱

ヲ遏絶スルニ宜シ

○第二百六十六方甲靈田別爾乙爾丙儼丁儼戊儼己儼庚儼辛儼壬儼癸

硫酸規尼捏半 默栗薩水半 收斂亞的兒半 砂

糖舍利別半

○右調和每一時服一食匙強

○第二百六十六方同上

硫酸規尼捏半 橙皮黃各 末白糖半

右調和為散分十服每一時一服

[主治]間歇熱ニ宜シ ○靈田別爾乙儼丙氏病ヲ視テ其性間歇

ヲ帶ブルヲ占ムルハ日發開日ノ症ニ於テ舌苔ノ

有無ニ拘ラズ惡心ヲ論セズ預療法ニ處セズ免熱ノ時

ニ方テ硫酸規尼捏半方甲ヲ與フ之ニ由テ再次ノ發作

ヲ遏止セリ假令全ク歇マザルモ其証更ニ輕シ再次ノ

發作ヲ經レハ假令復發スルモ恐怖スルニ足ラズトス

此ノ如ク之ヲ用フルノ后第五日ニ至リテ再硫酸規尼

控半刃ヲ以テ散藥ガトナシ與レ爾後每週同日第五方リテ規尼控散同量ヲ與ルル六回ニ至ル最初申リ之ヲ算スレバ七回ニ及ル但其間他藥ヲ服スルヲ須クズ此ノ如ク之ヲ療スルモ每症必シテ再發テ防止スルヲ得ズト雖然モ其復發スル者極メテ稀ナリ四日熱及ビ昏睡性卒中性喘息性間歇熱ノ如キ確實ニ過止センヲ要スル者ハ靈田別爾偃氏病初六回ヲ用テルヲ稱賛セリ間歇熱治ヲ誤リ或ハ治ヲ加ヘザルニ由テ慢性熱ペンコニスススロイニ變スル者間之アリ其症モ亦他ノ療法ヲ要セス但患者能ク上ノ療法ニ堪フベキノ時ヲ候

フテ之ヲ施スベシ此法三十九年間ノ經驗ニ出テ而シト
 ○一十人ヲ治セシ所ナリ
 ○第二百六十七方速別倫歇情
 生 硫酸規尼控ハニ 大黃五 葛縷子油糖半
 右調和為散分三服蠟紙包裹免熱之間與之

主治間歇熱腸胃汚物ヲ兼テ子大便秘スル者之ニ宜シ
 ○第二百六十八方模噎過那優瀉
 硫酸規尼控ハニ 上好幾那十五 大黃 薄荷油糖各五
 右調和為散分八包每服一包日四次

廣 堂
 廣 堂
 廣 堂

主治間歇熱舌苔全久除カズ大便不利ノ症ニ用ヒテ發
作ヲ遏止スルニ宜シ

○第二百六十九方〔布刺鐵〕

稀硫酸十五 煎餹水六 覆盆子

主舍利別一

右溶和每半時服一食匙

主治間歇熱ニ宜シ○硫酸ヲ加フル者ハ規尼捏ヲ溶解

○シ易カラシムルナリ

○第二百七十方〔溼優濁〕

硫酸規尼捏三 精製阿芙蓉二 橙皮黃油糖半

右調和為散蠟紙包裏發作前服之

主治惡性間歇熱ニ宜シ

○第二百七十一方〔弗四篤秘〕

硫酸規尼捏四 莨菪根末一 橙皮黃一

右調和為散分四包免熱之間用之

主治間歇熱經久頑固ニメ數回發スル症之ニ宜シ

○第二百七十二方〔謨私篤〕

硫酸規尼捏一 精製阿芙蓉半 甘草 番木鱉越

幾斯各一 麻僣一 白糖各半

右調和為散分八包每一時半服一包

主治間歇熱甚頑固之症宜之

○第二百七十三方秘密篤滿

硫酸規尼控三 攝爾扁太里亞根末 碓鍊華各六

右調和為散分五服免熱之間用之

主治叔密篤滿氏感觸銳敏之人規尼控ヲ用フレハ其

効幾那ニ優レリト云フ腸胃虛弱ノ者殊ニ然リ舍電阿

芙蓉液ヲ取リ之ヲ上方第一服ニ一滴第二服ニ四滴第

三服ニ六滴第四服ニ八滴第五服ニ十二滴和用セシム

○然レモ叔密篤滿氏以為ラク規尼控ハ間歇熱ヲ遏絶

スルノ効幾那皮ノ如ク適切ナラズ且規尼控ヲ服セシ

者ハ幾那皮ヲ用ヒシ者ニ比スレバ再感シ易シト第三

十四方ヲ照スベシ

○第二百七十四方秘秘慥篤

硫酸規尼控十五 桂水ニヲ溶化加後件

硫酸十五 覆盆子舍利別半

右調和頓服

主治間歇熱ニ宜シ○初メ發作後直ニ之ヲ服シ翌日熱免

日又之ヲ服シ一故ニ間日熱ハ第一服ノ後十二時又次日發熱ニ至リ發作

前半時規尼控五五ヲ用フベシ

○第二百七十五方秘密土

○ 硫酸規尼捏ハ十二 再餾燒酒半ヲ溶化加後藥

前舍電阿芙蓉液滴十一

右調和晨夕服二十滴

主治 惡性間歇熱流行時預防方且シテ之ヲ用フ

○ 第二百七十六方 穢屈

硫酸規尼捏ハ十五 常用鼻煙一

右調和嗅之五日乃至六日

主治 間歇頭痛ニ宜シ

○ 第二百七十七方 秘五兒滿

鹽酸規尼捏ハ八 茴香水五 甘海鹽精一 白糖半

○ 右調和每一時餘服一食匙

主治 間歇熱ニ宜シ ○ 別爾列印名國 加里名地 的名 病院ニ於

テ試驗セシ說ニ據ルニ鹽酸規尼捏ハ 硫酸規尼捏ハ 比

スレバ其効力實ニ優リテ峻烈ナリト

○ 第二百七十八方 護私篤

鹽酸規尼捏ハ一 麻屈ハ 涅矢亞ハ 桂皮各四 精製阿美

蓉四分 白糖一

右調和為散分十二服如法用之

主治 秋候ノ膽液性間歇熱ニ宜シ ○ 護私篤氏再次ノ發

作前一時ニ方リテ先吐劑ヲ與ヘ後免熱日一時毎ニ幾

那末半錢至ヲ用ヒ次ノ免熱日ニ至テ一時毎ニ上方共

包ヲ服セシムルハ對開燈燭ニ宜シ○難味萬力再ハ、發

○第二百七十九方〔暹羅地爾〕

丹寧酸規尼捏〔子〕 胡椒末 亞爾鮮越幾斯〔各半〕

右為三十九衣石松粉每一時半服三九〔子〕 蘇藥阿美

○主治經久頑固ノ間歇熱ニ宜シ

○第二百八十方〔調兒噫爾篤〕

規尼阿乙實捏〔子〕 葛縷子油糖〔或〕 葛蒲油糖〔子〕

右調和為散分十二服每一時乃至一時半一服〔子〕

○第二百八十一方〔同上〕

規尼阿乙實捏〔子〕 精製阿芙蓉〔子〕 葛縷子油糖〔或〕 葛

○蒲油糖〔子〕

右調和為散分十二服每一時乃至一時半一服〔子〕

○第二百八十二方〔暹羅地爾〕

規尼阿乙實捏〔子〕 硫酸規尼捏〔各一〕 葭若根 阿芙蓉

各四分〔子〕 之 芳香散〔子〕 蘇藥阿美

○右調和為散分二十服免熱之時每一時一服

○第二百八十三方〔刺割秘〕

規尼阿乙實捏〔子〕 王幾那〔各〕 蘇藥阿美

右加燒酒少許為三十九衣白桂末每一時服三九乃至五

九氣熱脈不持然三木火亦自對末每二劑服五八至正

主治右四方二百八十八方至二百八十三方間歇熱ニ宜シ

○第二百八十四方同上規尼阿乙實捏丁幾

規尼阿乙實捏錢一亞爾箇兒錢一

右溶化每服取一茶匙赤葡萄酒或砂糖少許和服日二三

次服規尼阿乙實捏規尼阿乙實捏錢一亞爾箇兒錢一

○主治此方間歇熱ヲ治スルノ効規尼捏ニ優ル一屢之ヲ

大劑服規尼阿乙實捏規尼阿乙實捏錢一亞爾箇兒錢一

○第二百五十五方那篤耳布

收斂重的兒規尼阿乙實捏丁幾錢一薄荷水

右調和茶匙抄服如法規尼阿乙實捏規尼阿乙實捏錢一亞爾箇兒錢一

主治間歇熱宜シ日發熱ハ每一時間日熱每一時半

四日熱ハ每一時一茶匙ヲ服發汗ヲ過テ直下始メテ

之ヲ用フルニ宜シ○小兒ニ與フルハ薄荷水ニ代ヘテ

他ノ甘味液ヲ加ルヲ好トス規尼阿乙實捏錢一

○第二百八十六方不尉秘滿

規尼阿乙實捏錢一硫酸規尼阿乙實捏錢一健質安那

末各一菖蒲根末各一

右調和二氏為丸菖蒲根末每二時服三九

主治 間歇熱ニ宜シ 通例上方半劑ヲ用テ熱ヲ截ルニ

過タリト云ス 獨 辰 堂 爾

○第二百八十七方 規尼阿乙實捏規ニニ 阿乙イ 實捏イ

右加忽弗滿液ホフマン五月溶化免熱之時服之

主治 間歇熱極メテ頑固シメ屢發スル者之ニ宜シ

○第二百八十八方 苦扁挑水苦ニニ 扁挑イ

右調和每服四十滴乃至五十滴日四次

主治 間歇熱甚頑固ニノ數回發スル者之ニ宜シ

○第二百八十九方 規尼阿乙實捏規ニニ 阿乙イ 實捏イ

右調和每服四十滴乃至五十滴日四次

主治 間歇熱甚頑固ニノ數回發スル者之ニ宜シ

○第二百九十方 規尼阿乙實捏規ニニ 阿乙イ 實捏イ

右調和每服四十滴乃至五十滴日四次

主治 間歇熱甚頑固ニノ數回發スル者之ニ宜シ

○第二百九十一方 規尼阿乙實捏規ニニ 阿乙イ 實捏イ

右調和每服四十滴乃至五十滴日四次

主治 間歇熱甚頑固ニノ數回發スル者之ニ宜シ

○第二百九十二方 規尼阿乙實捏規ニニ 阿乙イ 實捏イ

右調和每服四十滴乃至五十滴日四次

主治 間歇熱甚頑固ニノ數回發スル者之ニ宜シ

○第二百九十三方 規尼阿乙實捏規ニニ 阿乙イ 實捏イ

右調和每服四十滴乃至五十滴日四次

主治 間歇熱甚頑固ニノ數回發スル者之ニ宜シ

○第二百九十四方 規尼阿乙實捏規ニニ 阿乙イ 實捏イ

右調和每服四十滴乃至五十滴日四次

主治 間歇熱甚頑固ニノ數回發スル者之ニ宜シ

○第二百九十五方 規尼阿乙實捏規ニニ 阿乙イ 實捏イ

○獲爾瀧耳屈氏ノ説ニ據ルニ此下幾劑ハ植物四種ノ越
 幾斯質ヲ亞爾箇兒ニ溶化シテ以テ製スルナリ而ノ此
 植物ハ獨西印度ニ産シテ歐羅巴洲中未之アルヲ見ス
 且此方驅熱ノ奇効アルヲ稱メ印度ノ土人ニ示セリ
 ト云フ用法發熱前一時半ニ方テ二錢半ヲ服シ將ニ發
 作セントスルニ及テ再同量ヲ用フ大抵此二服ニノ發
 作ヲ防止スルニ足レリ此劑ヲ服スル前蓖麻油適宜ヲ
 用ヒテ悉腸胃ノ汚物ヲ除去スルヲ要ス蓋二服ヲ終フ
 ル至總ニ他ノ飲食ヲ禁ズベシ○官ヨリ設クル所ノ諸
 邑ノ病院ニ於テ千八百四十六年一千餘人ニ此劑ヲ試

驗ニ間歇熱最頑固ノ症ニ良効アルヲ確定セリ但其症
 極メテ經久既ニ衰弱腹滿水腫等ヲ繼發セル者ヲ撰ミ
 テ之ヲ驗セシニ大率二服ニシテ再次ノ發作停止セリ
 其第ニ發ヲ致ス者ハ千百中一二ニ過ギス且此劑ハ間
 歇熱衰弱ノ加ハル者ニ最佳効ヲ奏シ畜水ノ諸症脾臟
 ノ腫脹モ亦能ク消散セリ○然レモ百列私瀧爾屈地名ノ
 經驗ニ據レハ上歎ク如ク之ヲ稱譽スベカラズ蓋之ヲ
 用フルモ他ノ截熱藥ト一般ニ其再發セル者屢之アリ
 シ由テナリ

○瀧弗涅兒氏此下幾去爾ヲ精査シテ次件ノ説ヲ發明

セリ第一此液ハ君藥ハ聖叔尼捏ニ兼テ硫酸脂及ヒ
亞爾箇兒ヲ含ム第二規尼捏ノ外聖叔尼捏ヲ含ム一疑
又容レズ第三龍腦及ヒ雜腹蘭其佐藥タリ而メ此二品
ヲ含有スルハ確實ナリトス第四方法ヲ秘スルカ爲ニ
尚他ノ染色苦味香竈ノ者此藥液ニ混淆ス蓋蘆薈及ヒ
沒藥ヲ加フルヲ疑ヒナシ其香味ヲ以テ考フルニ恐ラ
クハ良姜ノ如キ香竈藥之中混スルナルベシ第五之ヲ
溶解セシ者ハ亞爾箇兒タルヲ確著ナリ第六是故ニ唯
植物ノ元分ヲ酒精ニ溶化スル者ナルヲ昭々タリ第七
製法ハ王幾那ヲ硫酸ト水ニ浸漬シ此浸液ヲ蒸發シテ

以テ極メテ稠厚ナラシメカ爾基ト剥篤亞斯ヲ加ヘテ
硫酸ノ一分ヲ去リ更ニ此ノ龍腦雜腹蘭等ヲ加ヘ之ヲ
純粹猛烈ノ酒精ニ混和スルナリ此說最信用スベシ○
又澎弗涅兒氏法ヲ以テ之ヲ檢査シ規尼阿乙實捏ヲ硫
酸二三滴ニ和メ猛烈ノ燒酒ニ溶化シ之ヲ此ノ龍腦雜
腹蘭丁幾沒藥丁幾及ヒ蘆薈丁幾ト混合シ以テ雙爾滌
耳偃氏ノ截熱液ニ酷類似セル全ク同品ニ一種ノ丁幾
丟爾ヲ製シ得タリ○殷結列兒氏及ヒ屢年地名ノ合藥家
臧屈私氏モ亦之ヲ分離セリ其論全ク澎弗涅兒氏ノ試
驗ニ同シ

○第二百八十九方 丙 病院用截熱丁幾

蘆薈一 龍腦十六 橙皮 土木香粗末各八 燒酒

北十五

右飽熱十日絞取液加後藥

硫酸規尼捏三六 稀硫酸十六 舍電阿芙蓉液一

〔主治〕屢年 堡砦ニ 附屬七 最大ノ病院第四局ニ 屬

スル醫爾理 屈列耳名 此丁幾劑ヲ以テ間歇熱ヲ治シ其

試驗說ヲ世上ニ示セリ左法ニ依テ硫酸規尼捏ヲ用フ

レバ其効力更ニ強シ〔第一〕溶化シ用フ〔第二〕硫酸ヲ加ヘ

テ過硫酸規尼捏トナラシム〔第三〕他ノ緩性强壯藥香竈

揮發ニシテ衝動ノ効アル者ヲ配伍ス〔第四〕發作前ニ切

近ノ之ヲ與フ已上件々確徵スル所ナルカ故ニ私撮歌

兒度醫名 骨篤埋爾名 命ニ從ヒ軍用藥劑書中適當ノ

品ヲ撰ミテ此丁幾劑ヲ製シ嬖爾濾耳屈 截熱丁幾手 爾

ノ如ク之ヲ用ヒ間歇熱ノ患者百四十六人ニ俾効ヲ奏

セリ皆此劑ヲ服スルノ后顯著ニ小疱ヲ發セリ其狀真

ニ熱性汗疱ス トラシ トス ンシ テ他種ノ者ニアラズ○普

呂弗刺屈 私揭名 及ヒ合藥家拔屈名 舍密法ヲ以テ之ヲ

分離ス其一定說ニ據レバ此丁幾劑ノ成分ハ嬖爾濾耳

屈ノ秘藥截熱液ニ類似スト云フ

○第二百九十方 聰爾突氏貧家應用驅熱散

水楊梅根六錢 精製硝砂二錢

右調和為散每一時乃至一時半服一小哥喜匙

○第二百九十一方 噤過法設

水楊梅根一細到 水十二弓煮濾過取八弓加後藥

水楊梅越幾斯或幾那越幾斯 忽弗滿液一錢

右調和每一時服二食匙

○第二百九十二方 私屈拔爾誌

水楊梅根末一 桂末二 橙皮舍利別三

右調和為煉膏每半時服一茶匙強

主治 右三方二百九十方至二百九十二方 間歇熱輕症ニ用フベシ

○第二百九十三方 過細栗屈的兒

水楊皮細末 橙皮黃末半 橙皮舍利別適宜

右攪和為煉膏免熱之間茶匙抄服

主治 間歇熱殊 消食器衰弱セル者之ニ宜シ

○第二百九十四方 蕭列墨爾

水楊皮末五 燒酒八 水十六

右蓋閉飽熱六時加水三十弓煮耗至十五弓濾過免熱時

小盞抄服

主治 間歇熱頑固症ニ與ヘテ良

○第二百九十五方 栗屈的兒

水楊皮半 熱湯一北浸漬六時煮耗七分 乘煮熟加水

楊梅根三錢濾過絞搾取液六分 加後藥

酒製大黃丁幾 橙皮舍利別

右調和每一時服二食匙

主治間歇熱頑固ノ症ニ宜シ

○第二百九十六方 弗格呂謨保兒秘

撒里矢捏子 白糖

右調和為散分四包每服一包日三次

主治間歇熱衰弱ヲ帶ル症ニ宜シ

○第二百九十七方

硫酸撒里矢捏子 甘草越幾斯

右調和為六十九衣桂末每服二丸乃至六丸日一次至五

次

主治同上

○第二百九十八方

撒里矢捏子 枸橼酸 健質亞那越幾斯 水楊

梅根

右為九十九衣菖蒲根末玻璃壺収貯每服十九日三次

主治間歇熱ノ患者規尼捏子ヲ服スルニ堪ヘズ又數間歇

熱ヲ發スル者之ニ宜シ

○第二百九十九方 〔磁歇熱度〕

七葉樹皮半 姜末或 芳香散三

右調和為散分二十四裏免熱間每半時服一裏

○主治間歇熱ニ宜シ ○此散ヲ服ノ胃中壓迫ヲ覺ユル者

ハ亞爾鮮丁幾十六滴乃至二十滴若クハ葡萄酒少許ヲ

服スル一日ニ二次吐逆ヲ發スル者ハ舍電阿芙蓉液ヲ

加フベシ六十六 加至六日一次至正

○第三百方 〔水適宜煮濾取六多冷定加後件〕

七葉樹皮一 水適宜煮濾取六多冷定加後件

菖蒲根丁幾錢 橙皮舍利別六

右調和免熱間用之臨服宜振盪

○主治間歇熱輕症ヲ治スルニ宜シ

○第三百一方 〔麩兒〕

七葉樹皮越幾斯錢 桂水一

右調和免熱間每一時半服六十滴

○第三百二方 〔麩兒列爾〕

設篤拉里捏〔依蘭苦ノ〕 亞刺昆〔亞〕 亞蘆護〔各〕 白糖〔半〕

右調和為散分八服每一時一服

○主治間歇熱ニ宜シ ○設篤拉里捏ノ効之ヲ規尼捏ニ較

レハ緩ナリト雖胃甚能ク之ヲ受クルニ堪フ

○第三百三方 〔拔臘私〕

龍腦一八半 亞刺昆亞二錢 白糖一錢

右調和為散分三包蠟紙包裹當再次發熱前三時二時及

一時每次服一包

○第三百四方 同上

甘扁桃乳六錢以甘扁桃製之 龍腦一八至 白糖三錢

右調和取半劑當再次發熱前三時服之其餘半劑方發熱

前一時半用之

○第三百五方 同上

龍腦

右加亞刺昆亞二錢末半錢研和為十九衣桂末當發作前

二時及一時每次服二九

主治 右三方三百三方至三百五方 間歇熱ヲ遏止スルニ用フ

○拔臘私氏ノ說ニ據レバ龍腦ノ幾那ニ優レルト三件

アリ 第一龍腦ヲ以テ治スレバ其症ノ再發スルト甚罕

ナリ 第二龍腦ハ幾那及ヒ規尼二捏ノ加ク後患ヲ遺ス

ナシ 第三幾那ニ比スレバ其價廉ナリ ○拔臘私氏一患

者ヲ療セシト龍腦二八亞刺昆亞二錢末二分合和頓服

セシメ爾後二日毎日龍腦一八ヲ二九ト為シ與フト云

○澎加列私篤名地ノ合藥家私啾傑氏間歇熱ニ龍腦ノ効ヲ稱賛シテ拔臘私氏ノ名ヲ世ニ顯ハセリ伊太利亞國ノ旅客モ亦大ニ龍腦ヲ賞譽セリ

○第三百六方幾壓巴

必百力至十八附 菖蒲油糖半

右調和為散分六服蠟紙包裹免熱時用之

主治間歇熱飲食不化及ヒ不食症ニ宜シ○間歇熱腹内

運營遲鈍ノ症ニ必百力至十八附ノ効アルヲ默利氏顯爾篤列

氏優篤薛爾氏蒲魯謨氏偃戾涅爾氏等確定セシ所ナリ

然ニ噦魯涅屈氏及ヒ刺曹私氏ノ經驗ニ據レバ必百力

捏ノ効規尼捏ニ較レバ甚劣レリト云フ○又黑椒十粒

乃至十五粒ヲ取テ免熱時嚙下セシムル一日ニ二次ヨ

リ四次至或ハ發熱前一切近ノ胡椒十粒乃至十五粒枸

櫞汁ヲ以テ送下スルヲ稱賛ヒリ然ニ此ノ如キ療法ハ

獨感覺遲鈍ノ症ニ適應スルハニ

○第三百七方對兒瀧

黑芥子末ハ安息香末ハ對兒瀧ハ對兒瀧ハ

右調和為散赤葡萄酒或燒酒一盞和服其益ヲ對兒瀧スル

主治土設爾尼名地ノ政府ニ於ケル結列都醫官冷蛇私

揭等頑固ノ間歇熱ニ規尼捏及ヒ其他對症ノ藥ヲ用セ

ヲ治シ難キ者ハ此方ヲ與ヘテ良効ヲ得タリ冷柁私掲
 此方ヲ一老婦一傳受シ發熱前一切近シテ之ヲ服サシ
 ム假令再次ノ發熱アルモ必ス輕ク且此症ヲ復發スル
 トナシ此方大抵一服ニテ治ス後服ヲ要スル者ハ甚稀
 ニシテ唯經久ノ症ニ間之アルノミ冷柁私掲此法ニ
 從ヒ八年間ニ百十二人ヲ治シ爾後復害アルヲ見ス
 ト云フ小兒ハ上方ノ半量ヲ服スベシ
 ①室兒滿氏云
 ク芥子ハ古來屢間歇熱一用ヒテ世入ヲ知ル所ニシ
 テ此方ハ君藥タリ殊ニ單純腸胃性間歇熱ノ如キハ之
 味用ヒテ同上ノ効ヲ奏スト

○第三百八方 弗除爾田蒲離度

番椒越幾斯 亞爾鮮越幾斯 綿谷幾里私布水

薄荷ノ種六子 水製大黃丁幾子

右調和每一時服二食匙

○第三百九方 同上

番椒越幾斯 珊篤里越幾斯 默栗薩水 忽

弗滿液

右調和每一時服二食匙

主治右二方間歇熱腹内諸器運機遲鈍ナル症ニ宜シ

○第三百十方 贊爾醫私

番椒六

老利兒二

右調和為散分三服初日惡寒之始一服次日一服又次日一服每服須同時與之

主治頑固ノ惡性間歇熱ニ宜シ

○第三百十一方弗離屈 磯歌蘇

苦扁桃去皮一錢半

加水適宜作乳劑一弓溶後藥

珊瑚里越幾斯半刃至一刃

右調勻當發熱前三時頓服

主治間歇熱ニ用フ○發熱前上切近ノ苦扁桃一二箇ヲ

用ヒ截熱ヲ得シテ屢之アリ

○第三百十二方別冷突篤

墨列僕里越幾斯

碓砂各二錢

亞爾鮮越幾斯一錢

薄

右調勻每一時服一食匙

主治四日熱ニ宜シ此方ヲ用ヒテ后大抵第二發乃至第

四發ニシテ解散ス之ヲ用フレハ血液腐敗及ヒ肚腹膨

脹等ノ症モ亦預防スルヲ得ベシ幾那或ハ葎若ヲ要ス

ル者稀ナリ

○第三百十三方卸寧屈

精製弗魯里矢捏十二人至十五人

白糖半

附

右調和為散發熱前服一色乃至二色

○主治 間歇熱ニ宜シ○第一包ヲ用ヒテ効ナキ者ハ發熱

後ニ至テ第二包ヲ與フベシ多キモ第三包ヲ用フルニ

過キズ之ニ由テ熱ヲ除クヲ確實ナリ憑私名劉天私同

呻濕子偃レ刺レ弗レ上レ同ノ試驗說モ亦寄寧屈名ノ說ニ符合ス

○第三百十四方 戒歇蘭度

精製阿芙蓉ハ 白糖四

右調和為散分八包每一時服一包

○主治 卒中狀間歇熱ニ先免熱時王幾那末一多或ハ硫酸

規尼捏十六乃至二十人ヲ與ヘテ後發作中此方ヲ連用

ス蓋此症ハ真ノ卒中性ニアラスシテ唯痙攣性ノ証々

リ故ニ之ヲ治スルニ阿芙蓉ヲ以テス患者嚥下スル

能ハザル片ハ阿芙蓉液二錢ヲ加ヘテ灌腸ヲ施スベシ

但甚多血ノ人ハ免熱時適宜ニ放血ヲ行フベシ然レモ

是唯病勢ヲ緩和スル為ニシテ全治ノ法ニアラス

○第三百十五方 同上

燐一 的列並油一錢溶和

右每服取十滴過爾托煎一小盞和服日四次

○主治 頑固ノ間歇熱諸藥効ナキ者此方最奇驗アリ

○第三百十六方 落刺私結

格魯林曹達半錢至 蒸餾水四勺溶化

右調和免熱時每半時服一食匙

主治間歇熱ニ用フ殊ニ脾臟腫起スル者ニ宜シ○格兒

損名人翹憂邪同格魯林曹達ノ効力ヲ論定セリ○然レ

頑固症ニ於テハ其効規尼捏ニ代ルヲ能ハス

○第三百十七方弗。隱

鍊屑半 著草越幾斯加密列 越幾斯各二 番木鱉

右調和二氏為一九衣桂末每一時半服三粒乃至五粒

主治頑固ノ間歇熱ニ用フ殊ニ四日熱經久且幾那ヲ用

ヒテ却テ激スル者之ニ宜シ

○第三百十八方

青酸鍊三 大黃二 菖蒲油糖半

右為散分九包蠟紙包裹每服一包日三次

主治頑固ノ間歇熱其熱勢輕ク然レ氏大ニ虛衰ノ神經

ノ感覺充進セル者之ニ宜シ

○第三百十九方加。弗。土。辰。噫。爾

青酸鍊二 硫酸規尼捏三 大黃五 白糖半

右調和為散分八包蠟紙包裹免熱時用之

主治間歇熱幾那劑ヲ與ヘテ治セリト雖復屢發スル者

此方ヲ用ヒテ超絶ノ効ヲ得タリ○通例一

劑ヲ用ヒテ截熱スルニ足ルト雖土炭噦爾頑固症ヲ療

スルキハ第二劑ヲ作りテ用フ其頑固ナラザリシ者モ

亦第二劑ヲ與ヘシトアリ爾後暫睡菜葉浸ヲ少許宛與

ヘテ功ヲ終ヘリ

○第三百二十方帶四箇秘

青酸銹一八 硫酸規キニ 尼捏トニ 大黃六 菖蒲油糖半

右調和為散分八服蠟紙包裹每服一裹日三次乃至四次

主治第三百十八方ニ同シ

○第三百二十一方燻蒸爾 名驅熱散

金硫黃 孕礬酒石 精製牡蠣末各半

右調和為散分四包

主治金硫黃ハ幾那ニ代ハルベク又頑之ヲ用フレハ幾

那ノ効カラ扶クルノ一藥トシテ燻蒸爾名之ヲ稱賛セ

リ汚物逆上ノ微ヲ見ハス者ハ燻蒸爾氏先吐劑ヲ與フ

他症ハ始ヨリ此方ヲ處セリ日發熱ノ免熱時短ク此者

ハ此散ニ包ヲ與ヘ餘ノ二包ハ次ノ免熱時ニ及テ之ヲ

與フ其第一包ハ發作後二時ニ方テ用ヒ第二包ハ其後

四時ニ及テ服サシム三日熱四日熱ハ免熱時中四包連

進メ之ヲ盡サシム但四日熱ハ免熱二日ノ間毎日二包

ヲ投スベシ此方ヲ與ヘテ或ハ吐シ或ハ瀉シ或ハ發汗
及ヒ利尿ヲ増スベシ大抵之ニ由テ發作止ムナリ其熱
再次却テ劇發スル者モ亦間之アリト雖後ノ發作ニ至
テ歇ム若再次發スルハ次ノ免熱時ニ至リ幾那ヲ與
フヘシ頑固ノ四日熱モ亦此療法ニ由テ解スベシ但頑
固症ニ在テハ此散久服スルヲ要スル者屢之アリ

○第三百二十二方 〔間歇熱〕

金硫黄八 精製阿芙蓉二 幾那末各四 加密列末各四

右調和為散分八包免熱時用之

〔主治〕間歇熱ニ効アルノ一方トス

○第三百二十三方 〔過傑栗屈的兒〕

膽礬各半 精製阿芙蓉各半 白桂一 亞刺昆亞薩謨末各半

右調和為散分六服朝暮一服

〔主治〕間歇熱最頑固ノ症ニ用テ膽礬及ヒ阿芙蓉ノ量増

シテ一ハニ至ルモ亦可ナリ

○第三百二十四方 〔過胎耳〕

膽礬六 蒸溜水適宜溶解加後藥

菖蒲根末二 甘草越幾斯適

右為九十九夜石松粉貯玻璃壺每服四九乃至七九免熱

間三次乃至四次

主治 間歇熱極メテ頑固ノ者之ニ宜シ

○第三百二十五方

砒銅礬各一 甘草末一 砂糖舍利別適

右為八九衣石松粉貯玻璃壺每二時服一丸

主治 間歇熱甚頑固ニシテ且發作不齊ノ症腹内ノ閉塞

及ヒ腺病ヲ夾ム者之ニ宜シ

○第三百二十六方

白砒 酒石鹽各六分 白封一 亞特曼亞蘇末

以上二果加蒸餾水六勺安沙火煮溶之小心濾過冷

定加後件

刺賢埵兒精半 蒸餾水適宜但度

右名福烏列爾氏砒石溶水

主治 間歇熱ニ宜シ○此液七十滴乃至八十滴中砒石大

率半ルヲ含ム小兒二歳ノ者ハ二滴ヲ與フル一日ニ二

次大人八十滴ヨリ二十滴ニ至ル○蓋砒石ヲ用フル片

ハ專謹慎ヲ加ヘ已ムヲ得ザルノ症ノミ之ヲ與ノベシ

○第三百二十七方

白砒細末 精製酒石鹽各半 蒸餾水六勺煮濾過加桂

水適宜

右調和作液八名顯爾列斯人改制蒲列刺砒石溶水

○第三百二十八方

白砒末錢各一 酒石鹽錢各一 加蒸餾水半北安沙火溶解砒

石冷定加後藥

複方白芷精附一 蒸餾水適宜

右合作液一北名歌憎人砒石溶水

主治間歇熱二宜大人一時每二五滴ヨリ十五滴至小

兒一滴ヨリ二滴至免熱時之ヲ用フ

○第三百二十九方別速也

幾那煎四ヨリ煎幾那 雞子黃一箇 王幾那細末 舍電

阿芙蓉液十二滴

右調和供灌腸

主治惡性變形間歇熱二宜シ

○第三百三十方冷度

幾那越幾斯錢二 蒸餾水四 阿列襪油半 單方阿芙

蓉丁幾十二滴

右調和供灌腸

主治間歇熱胃幾那二堪へル者之二宜シ

○第三百三十一方福爾墨兒

硫酸規尼捏十二 加後藥捏和

雞子黃筒一 菖蒲浸八 舍電阿芙蓉液十二

○右調和供灌腸

主治頑固ノ間歇熱及ヒ幾那ノ内服ニ堪ヘザル者之ニ宜シ

○第三百三十二方春姪隣

硫酸規尼捏六 醋酸加里一 茴香水三 橙花舍利

○別一

右溶和免熱時每半時或一時服一糖匙強

主治小兒間歇熱ニ宜シ

○第三百三十三方優篤薛爾

○鹽酸規尼捏一 薄荷水或桂水半ヲ溶化

右每一時服二十滴乃至六十滴

主治小兒間歇熱ニ宜シ

○第三百三十四方私蜜斃兒

赭色幾那三至六

右為粗末水煎濾過每日一劑加浴湯

主治小兒間歇熱ニ宜シ

○第三百三十五方歌憐

歌憐砒石溶水一刀第三 蒸餾水一 拔爾撒謨舍

利別半

右調和每一時服一茶匙

主治小兒間歇熱ニ宜シ然レモ余輩決メ小兒ニ砒石ヲ

用フルナシ

○第三百三十六方

上好幾那一錢 橙皮黃二錢至三錢

右細剉加葡萄酒一壺浸漬每服一盞強日二次

○第三百三十七方

寒製幾那越幾斯二錢 橙花水一錢 硫酸亞的兒一錢

右調和每一時服二十滴乃至六十滴

○第三百三十八方篤燈

幾那越幾斯三錢 桂加酒水十兩

右調勻朝暮取六十滴葡萄酒和服

主治右三方三百三十六方至三百三十八方 慢性間歇熱及ヒ其他大病

後ノ衰弱ヲ治スルニ宜シ

○第三百二十九方噫乙天越慈兒

赭色幾那細末一錢 桂末一錢

右調和為散分八服每一時半一服

主治間歇熱後肝臟若クハ脾臟ノ腫脹セル症之ニ宜シ

○第三百四十方心降

硝鎂華一錢 赭色幾那末一錢 健質亞那末三錢 海葱蜜

橙皮舍利別各適

右調和為煉膏每一時服一茶匙臨服宜振盪

主治頑固人間歇熱脾臟腫起及心水腫症入兼併七九者

之意宜之

○第三百四十一方孤刺律私 孤刺律私強壯解凝丸

硝鍊萃 蘆薈水製越幾斯各一 白屈菜越幾斯四

瓦爾拔奴謨 勿擲祭玉石鹼各二

右調和二氏為一丸衣桂皮末貯玻璃壘朝夕與六九

主治慢性間歇熱後腹內諸器殊脾臟腫起其質軟化

七九者之宜之

○第三百四十二方警弗蘭屈

幾那粗末 水適宜煮濾過取入弓加後件

幾那細末 純精酒石二錢至三錢 白糖三錢

右冷定再加甘海鹽精二錢調勻每一時服一食匙臨服宜

揚盪

○第三百四十三方過傑栗屈的兒

幾那細末 菖蒲根末半錢 海葱蜜半 杜松子傑列乙

水適宜

右為煉膏每一時乃至一時半服一茶匙臨服宜攪和

○第三百四十四方設傑海優滿

海葱末六

精製阿芙蓉二

鹽酸規尼控三十一

薄荷

白糖錢

右調和為散分十二裹每服一裹日三次乃至四次

○第三百四十五方失錄趨志都

七葉樹皮細末

菖蒲根末錢

杜松子傑列乙三

附三

右調和作煉膏每一時服一茶匙臨服宜攪和

主治右四方三百四十二方至三百四十五方

水腫間歌熱

因スル症ニ

宜シ

○第三百四十六方溫優滿

金硫黃

孕礬酒石

牡蠣末各半

右調和為散分六服晨夕一服

主治間歇熱後ノ水腫幾那ノ過服ニ因ル者之ニ宜シ此

散ヲ服スル一二三日ノ後更ニ幾那若クハ規尼控ヲ用

スベシ

慢性熱フアリス。レンタ。スレ

慢性熱ハ每常他ノ本病アリテ之ニ因スル所ヲ見証ナリ

或ハ局處ノ疾患一部ノ慢或ハ排除スベキ病毒ノ鬱積皮膚

病ノ抑壓。清瘍及ヒ打膿速ニ癒ユル者。常或ハ諸液ノ過泄

血液。精液。或ハ心思鬱憂慈心。遂ガザル者此症ノ原因タリ

慢性熱ノ因テ起ル所以ノ者其レ此ノ如ク差別アルガ故

各症ニ適應スル一定ノ方法ヲ擧クルヲ能ハズ要唯其
 症ヲ誘起シ其レヲシテ保續セシムル所ノ病根ヲ索メ從
 テ的當ノ方法ヲ撰ムヲ醫ノ伎倆ニ任スルナリ是故ニ余
 ハ唯此病ニ多ク採用スル所ノ治方ノミヲ將テ此ニ記載
 ス乃滋養法強壯法是ナリ但其方法每症必シモ施スヘカ
 ラザル者モ亦之アリト雖中ニ就テ最簡要ノ者ヲ掲ケ且
 附考ヲ設ク第一乳養法新乳ヲ絞リテ未冷ヘザル者ヲ
 最佳トス患者朝夕三小盞乃至四小盞ヲ白蒸餅ト俱ニ用
 ヒ氣カ步行ニ堪フベクニ好日乳漣ヲ服ノ后清爽氣中
 ラ緩歩スベシ驢馬乳ヲ最消化シ易シトス之ニ次グ者ハ

山羊乳牛乳是ナリ婦人ニ就テ直ニ哺乳セシムルハ吾輩
 欲セザル所ナリ患者弱齡ノ男子ナラバ殊ニ之ヲ忌ムベ
 シ乳養法ヲ施スノ間ハ鹽酸味香竄及ヒ多脂ノ食物或ハ
 果實麥酒等ヲ嚴禁スベシ若胃乳汁ニ堪ヘザル者ハ之ニ
 代ヘテ乳清三百五十六方至三百五十八方ヲ與フベシ第二精麥粉一食
 匙乃至二食匙ヲ取り牛乳山羊乳若クハ驢馬乳一匙或ハ
 稀淡ニシテ脂肪少キ肉羹汁ヲ加ヘ微炭火ニ上セ手ヲ任
 メズ攪和シテ稀粥ノ稠トナス但之ヲ沸騰セシムルヲナ
 ク而ノ冰糖ヲ加ヘ甘味ナラシメ之ヲ朝暮ノ餐食ニ代ヘ
 テ用ヒシム多脂ノ物酸性ノ物及ヒ風氣ヲ醸ス物ハ禁ス

第三亞兒魯粉附 亞兒魯粉一錢半ヲ取り冷水一食匙
 ヲ加ヘ攪和シ更ニ熱湯九ヲ加ヘ再振盪シ一密担密担爲間
 之ヲ飽釀セシメテ清澄ノ粘汁ヲ得之ニ砂糖ヲ和メ佳味
 ナラシメ食匙ニ抄ヒ服セシム或ハ冷水ニ代ヘテ肉羹汁
 ノ脂肪ヲ去ル者若クハ乳汁モ亦用フベシ○小兒ヲ療ス
 ル片ハ冷水一食匙ニ亞兒魯粉總ニ一茶匙強ヲ用フベシ
 第四以幾那及規尼控治慢性熱考起因脫液ニテリテ此ニ
 炊衝証腸胃汚物或ハ膽液性ノ証狀ヲ帶ヒサル者ハ幾那
 浸百六十方幾那煎百六十方偉効アリ但之ニ及スル者ハ幾那
 必害アリ幾那鹽ハ禁忌ノ症甚少シ貴要ノ内臓ニ不治ノ

器敗病アリテ慢性熱ノ本因ヲナス者ノ外ハ幾那鹽ヲ久
 服セシメテ全癒ヲ得ル者間之アリ始硫酸規尼控六氏乃
 至十氏ヲ服シ後暫ノ間日ニ二氏乃至四氏ヲ用フベシ

○第三百四十七方職歌蘭度

刺蝟石錢二 枸橛汁宜適 飽和加後件

菩提樹花水引六 甘草舍利別引一

右調和每一時服ニ食匙

○第三百四十八方

精製炭酸剝篤亞斯半一錢 新製枸橛汁宜適 飽和加後

大藥

遠西方藥 卷三 慢性熱 五十五 房月

大麥煎一北 覆盆子舍利別一

右為飲料

○第三百四十九方

收欽亞的兒半 沙列布煎四 覆盆子舍利別一

右合勻每一時服一食匙

○第三百五十方

新大麥一 湯數次洗之半 蘆根半 水五北煮耗至四北濾

○第三百五十一方

屋施茂兒二

右調和每次與一小盞

主治 右諸方三百四十七方 燉衝性慢性熱二 宜シ

○第三百五十一方私條福條爾

蒲公英越幾斯一 旃那瀉下飲附三 滿那舍利別

右調勻每一時乃至一時半與二食匙

主治 慢性熱腸胃汚物二 起因シ且之二 其熱替留七

ル者ニ用フ

○第三百五十二方同上

幾那末一 大黃末半 水三北煮耗至一北濾加後

藥

苗香舍利別二

右調和每一時乃至一時半服半小盞

○主治慢性熱腸中ノ汚物ヲ排泄スベキ症ニシテ生力大ニ沈衰セル者之ニ宜シ○然レモ幾那不當ノ症ニ之ヲ用フル片ハ其利ヲ得ルヨリ害ヲ招ク多シ忽ニスベカラズ殊ニ感動甚シキ症熱旺盛ノ暫留セル者肌熱熾ナル者重大ノ閉塞アル者及ヒ腹臍ニ硬結腫アル者ハ皆幾那ヲ與フヘカラズ其熱較著ニ間歇アリテ而モ肌熱甚輕ク脈小ニノ軟ナル者ハ幾那ノ効更ニ偉ナリ

○第三百五十三方理篤軒

實キ艾ダ荅リ利ス葉半 赭色幾那半錢

右熱湯六弓浸漬濾過每一時乃至一時半與一食匙

○主治慢性熱脈狀觸動機ノ微弱ヲ見ハシ且一處ノ畜血等アル症ニシテ其他ハ幾那適應ノ証候備ハル者之ヲ與フルニ宜シ實キ艾ダ荅リ利スノ効力ハ久ク保持スルカ故ニ久服スヘカラズ五六日乃至九日ニシテ休ムベシ

○第三百五十四方過傑栗屈的兒

吐酒石一 孕礪酒石半

右蒸餾水四弓溶和每一時與一食匙

○主治慢性熱腸胃汚物ヲ夾ム症之ニ宜シ

○第三百五十五方弗陽 女民埵列里精味 過設印亞的兒錢 橙花水二 橙花

舍利別錢 右調勻每半時服一食匙

○主治緩慢神經性ノ症患者虛弱依利昆埵爾若クハ馱私

的里ヲ帶ヒ脈小ニシテ稍緊ナル者ニ用ヒテ皮膚運營

ノ減衰ヲ挑起スルニ宜シ

○第三百五十六方 暴劉私甘乳清キリムククス

犢牛胃乾者 冷水六弓浸漬五時乃至六時取浸液一

弓加後藥

新鮮牛乳北九

○右安微溫所飽熟至凝聚取上澄濾過

主治每日此乃至上此ヲ取リ微溫ヲ服用セシムル

ヲ宜トス但最初ハ少許宛早且空心ニ飲マシメ服後屋

外ヲ緩歩セシムベシ此方ヲ用フルハ總テ難化ノ食

物油膩鹽味酸味ノ物多脂肉炙肉果實精液及ヒ麥酒ヲ

禁忌ス專蔬菜雞肉犢牛肉白蒸餅等ヲ以テ奉養スル

宜シ○摂爾都兒水洎爾私蒲淪泉麻里印泉等ノ如キ鑲

泉ヲ以テ上方ニ合和シ適應スル症モ亦多シトス更ニ

○第三百五十七方 暴劉謨甘和乳清セリムラクチヌ

廣胖堂

○第百五十八方

雞子白適宜煮沸至雞子白凝聚濾加後藥

右上火沸騰初加純精酒石一錢令凝結畧冷後濾過更加

雞子白適宜煮沸至雞子白凝聚濾加後藥

禁牡蠣末適宜飽和為度

○第百五十九方

酒石乳清タルタルリサクチム。

右加甘和乳清三百五十七方二北乃至三北煮沸濾過一日服盡

主治甘乳清三百五十六方ヲ服ノ后胃化困難ナル者之ヲ與フ

○第百六十方

純精酒石二錢 枸橼汁適宜

右作乳清加大麥糖隨適宜味佳為度

新鮮牛乳三北

煮加後藥

○第百六十一方

上好滿那三北 純精酒石半 酒石乳清三百五十九方

主治慢性熱肝臟ノ疾患ヲ夾々者此方殊ニ宜シ○蓋上方ノ如ク乳清ヲ混和セズ先白屈菜汁ヲ與ヘ後乳清ヲ飲服セシムレバ患者更ニ服シ易シトス

○第百六十二方

白屈菜葉汁新絞者ニ 桂水一

右合勻朝暮服劑臨服宜振盪

○第百六十三方

純精酒石二錢 枸橼汁適宜

右作乳清加大麥糖隨適宜味佳為度

○第百六十四方

白屈菜葉汁新絞者ニ 桂水一

右合勻朝暮服劑臨服宜振盪

○第百六十五方

純精酒石半 酒石乳清三百五十九方

主治慢性熱肝臟ノ疾患ヲ夾々者此方殊ニ宜シ○蓋上方ノ如ク乳清ヲ混和セズ先白屈菜汁ヲ與ヘ後乳清ヲ飲服セシムレバ患者更ニ服シ易シトス

○第百六十六方

純精酒石半 酒石乳清三百五十九方

主治慢性熱肝臟ノ疾患ヲ夾々者此方殊ニ宜シ○蓋上方ノ如ク乳清ヲ混和セズ先白屈菜汁ヲ與ヘ後乳清ヲ飲服セシムレバ患者更ニ服シ易シトス

○第百六十七方

純精酒石半 酒石乳清三百五十九方

主治慢性熱肝臟ノ疾患ヲ夾々者此方殊ニ宜シ○蓋上方ノ如ク乳清ヲ混和セズ先白屈菜汁ヲ與ヘ後乳清ヲ飲服セシムレバ患者更ニ服シ易シトス

○第百六十八方

純精酒石半 酒石乳清三百五十九方

主治慢性熱肝臟ノ疾患ヲ夾々者此方殊ニ宜シ○蓋上方ノ如ク乳清ヲ混和セズ先白屈菜汁ヲ與ヘ後乳清ヲ飲服セシムレバ患者更ニ服シ易シトス

右調勻每一時與半盞以至得下

主治清涼下劑トシテ熱性病厥衝病ニ用フ

○第三百六十二方

沙列布末一錢水適宜煮為糜列乙加後味

栗蠶子舍利別一

右調和茶匙抄服

主治胸病ヲ患ヒテ衰弱羸瘦セル者此方滋養包摂スル

ニ宜シ

○第三百六十三方

訥弗氏沙列布傑列乙

沙列布末一錢

蒸餾水八匁煮沸濾過加後藥

橙皮舍利別半

○第三百六十四方

上好鹿角菜細製

新鮮牛乳九

煮耗至五匁濾過加

後藥

白糖半匁至

苦扁桃水濃厚者

右調勻安冷所頗々茶匙抄服一日盡

主治經久ノ嘶咳乾欬痙攣性欬嗽肺勞下利痢疾等ノ如

キ重病後ノ羸瘦脱力ヲ治スルニ宜シ

○第三百六十五方

上好鹿角菜細製

水十二匁煮濾過取五匁加後藥

覆盆子舍利別一子半 苦扁桃水一厚者

右調和安冷所每日茶匙抄服

主治上方二同シ

○第三百六十六方 鹿角菜二錢 乳汁一匙煮作一加後味

白糖一錢 苦扁桃二箇

右每日飲服

○第三百六十七方 鹿角菜一錢 水適宜浸漬五密一加後水五煮濾

取三加後藥

櫻實舍利別六錢 老利兒水一

○右安冷所作傑列乙貯白玻璃壺一日服盡

○第三百六十八方 鹿角菜細末 上微火煮四分時加後

葛加阿膏四 鹿角菜六

白糖四 白法里那砂糖之一種

右半子為一錠乾貯水及乳汁煮服之

考感觸靈敏ノ人鹿角菜ヲ用フル片ハ依蘭苔ニ優レリ

此ニ依蘭苔ヲ用フレバ衝動ニ過タリトス

○第三百六十九方 依蘭苔傑列乙

Kitasato Memorial Medical Library

○依蘭苔子

注精製炭酸剝篤亞斯溶液剝篤亞斯二錢熱湯適宜

浸漬一時半濾去液丁寧洗淨再加水適宜煮耗至六寸加

後味

白糖一匁

過泥子油糖半匁

右調勻每服一茶匙

[考]依蘭苔ヲ炭酸剝篤亞斯ニ浸セバ其固有ノ苦味ヲ脱

ス○又之ヲ煎スル前依蘭苔ニ熱湯ヲ加ヘテ攪挽スル

○モ亦其苦味ヲ除クコトヲ得ベシ

○第三百七十方和瀉粉

依蘭苔一匁 水十六匁煮濾取五匁加沙列布末半錢冷

水一匁溶化者搗和不任手強攪令沸釀更加後味

橙皮油糖一匁

右安冷所為傑列乙一日服盡

○第三百七十一方

古依蘭苔一匁 加熱湯六匁飽熟四分時投鹿角屑洗潔者

半匁加水十四匁煮濾取六匁加雞子白適宜再濾過

加後味

挂油糖一匁

右安冷所為傑列乙一日服盡

○第三百七十二方和律粉

○依蘭苔各二 白糖各二 亞刺昆亞薤各二 末二

右安暖所令乾固為細末每服一哥喜匙日四次乃至六次

○第三百七十三方抄瀉秘

依蘭苔三 水二匕煮濾取一匕加後藥

甘草舍利別一 右調勻每一時服一食匙乃至二食匙

○第三百七十四方同上

依蘭苔六錢至 格綸僕二 水十六三煮濾取十二三

忽弗滿液一 桂舍利別一 水十六三煮濾取十二三

冷後加後藥

右調和每一時服二食匙

○第三百七十五方

依蘭苔三 魚膠一 水適宜煮一時溶白糖四三加雞

子白一箇濾過加赭色幾那一三桂皮二錢再煮八分

時濾取八三

右分八服每日四服

○主治右諸方三百六十六方至三百七十五方 慢性熱羸瘦或ハ全身衰弱

慢性粘液太過及ヒ經久潰瘍ヲ帶スル者ニ宜シ

○第三百七十六方

蛞蝓八 細剉熱湯能洗淨水適宜煮一時半加後味

紫堇葉

木香

各二錢

右煮沸八分時濾過取一匕半每服一小盞強日四次溫服

主治慢性熱勞症及心羸瘦病宜之

○第三百七十七方補瀉私

魚膠

錢一

水十六勺煮濾取十二勺溶化白糖半勺更加

後藥

列印酒

勺一

右調和每服一小盞

○第三百七十八方同上

魚膠

錢三

水九勺煮濾過取三勺加後藥

枸櫞汁

新絞濾過

枸櫞油糖

右安冷所為傑列乙白必幾失埲名器收貯每一時服二茶匙

主治右二方三百七十七方滋養包攝ノ劑ノ太過ノ泄

瀉ヲ停ムルニ宜シク又慢性熱削瘦症肺勞等ニ用フヘ

○第三百七十九方穀優蘭葛

鹿角屑

二錢

葛私加栗刺

半

右調勻分三色每日取一色水一匕半煎耗濾取一匕服盡

主治慢性熱削瘦諸液溶渙老衰症等ニ宜シ

○第三百八十方弗蘭屈

○鹿角屑以熱湯洗者二弓水四斗煮耗至二斗濾加白糖適宜味佳為度服

主治滋養包攝劑久宜久慢性熱削瘦等用之

○第三百八十一方 舍電發謨白煎做結列藥方鹿角屑各三水五斗煮濾過取三斗加後

藥十十六寸 枸櫞汁舍利別適宜味佳為度

右調和飲服

主治滋養包攝劑トス慢性熱削瘦劇效痢下利胃煥衝

腸煥衝腎煥衝等之ヲ補用

○第三百八十二方 鹿角傑列乙

鹿角屑以熱湯洗者二弓水十六斗煮耗至八斗濾過強力絞

濾加雞子白及枸櫞汁適宜振盪令清澄再加後味

白糖二

右再煎熬為適宜稠取他一器預盛些少香竈藥宜移之

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

遠西方彙卷之三

夏西古藥錄之三

本真傳為治 症宜辨 凡此一 為肝熱 症之 香寶無其 疑之

白樹

本以辨之 白樹 雖長 而宜 辨盡 今 書 實 再 以 辨 起

或自 辨 本十六 卷 黃 林 五 八 卷 或 或 五 以 或

書肆

江戸芝神明前

和泉屋吉兵衛

