

遠西方彙

小

○卷之十	第四	萎黃病
	第二類	
		慢性病係神經系症
	第一	係腦髓及脊髓症
卒中風		腦髓軟化
頭旋		昏冒
麻痺		
○舌痺		
○膀胱麻痺		

高士川文庫
X
499.2
En-2
4

X
e 12

F
工-22

499.2
E_m-2
4
No. 1389
Dec 12

伊東瑤川院譯

遠西方彙

原本紀元一
千八百五十

二年鑄行

廣胖堂藏



遠西方彙卷之十

獨乙 加幾安頓 著

和蘭本 嫈婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲 重譯

南洋伊東亨健夫 參校

第四 婆黃病コロコロシス 羅アト蘭フ

此症血液調和不良ニ因ルガ故ニ之ヲ惡液病ニ算入スベ
シ蓋婦女方ニ成立ノ年紀ニ在テハ婆黃病ト經閉症ニ親
シク關係スル者ニシテ既ニ婆黃病ヲ發スル時ハ經閉モ

富士川文庫

3261



亦隨テ起ル二症俱ニ多クハ血ノ不給ニ起因ス血中紅分。纖維質及ヒ鍊分缺乏シテ調和常ヲ失ヒ水分却テ過多ナルナリ是故ニ其治法ノ如キモ亦既ニ明了ナリ即萎黃病ノ根治法ハ保固強壯藥ヲ須要トス然レニ感覺過敏ノ婦人ノ如キハ毎常必シモ始ヨリ保固強壯法ヲ執セス恐ラクハ其病之が爲ニ却テ増進スル者アラン宜ク礦酸類。硫酸密幾私丟尔等ヲ稱用スペシ爾後苦味劑ニ轉メ睡菜等。四方。千廿五方。千廿四方。千廿五方。千廿六方。葛兒廚別括失亞。亞爾鮮菖蒲根葛私加栗刺等ヲ用ヒ竟ニ鍊劑ヲ投スベシ但先硝鍊革諸種ノ鍊丁幾九方。

至千卅二方所謂鍊酒千五十四方至千五十六方ノ如キ最消化シ易キ者ヲ撰用シ漸々更ニ難化ノ品千卅四十五方至千五十三方ヲ用ヒテ功ヲ收ムベシ天造及ヒ人造ノ鍊泉浴千五十七方ハ能ク内服藥ノ功ヲ扶クルカ故ニ尤適當ナリトス此他諸種ノ鍊劑ニ苦味強壯藥便秘スルハ神經強壯藥ヲ伍用シテ可ナリ通經藥ヲ配スルハ諸家ノ論一定セス大約之ヲ要セズ何者假令通經藥ヲ用ヒザルモ血質復良スレハ隨テ經血モ亦自カテ通スレバナリ○此症處女粘液質ニシテ多液且弛緩セル者ニ在テハ先瀉藥求ニ薬刺巴伍用スヲ用ヒ後鍊劑ヲ用ヒテ効アリ○其他既ニ經閉

條 = 列載スル所ノ諸方モ亦此症ニ適應ス 九百廿七方。九
千一方。千十六
方。十十七方

○第一千二十一方 寒倫蒲律薦

硫酸密幾松垂爾 實芟答利斯丁幾各半

右調和毎眼十五滴乃至二十滴水半盞和服日三次

主治 感覺敏捷ノ婦人ニ在テハ始メ此方ヲ用ヒ兼テ微温浴ヲ施シ内股ニ芥子泥乾角法或ハ摩挲ヲ施シ爾後始メテ鍼劑ヲ與フベシ

○第一千二十二方

越栗失爾必篤里阿利一弓

右每服二十滴乃至五十滴甘味燕麥汁和服日四次

○第一千二十三方

越栗失爾必篤里阿利 半錢至一錢 桂水 六 白糖 適宜味佳為度

右調勻每一時服一食匙

主治 右二方處女萎黃病感覺過敏ニシテ畜血症アル者ニ宜シ ○ 越栗失爾必篤里阿利ハ毎日一錢一錢半乃至二錢ヲ服盡セシメテ可ナリ

○第一千二十四方 求老地遷的

幾那 二錢 熟湯適宜浸漬瀘取六另加後藥

燐酸銹

過設印亞的兒

右調和每一時服一食匙

主治萎黃病者大ニ衰弱シ神經系及ヒ血脈系ノ感覺過敏ナル者之ニ宜シ

○第一千二十五方過傑栗屈的兒

睡菜葉 橙皮 苗香各細末一錢 大黃失半錢 麻佩涅失

亞二錢

右調勻為散每服一茶匙日四次

主治萎黃病冒虛酸敗液ヲ生スル者之ニ宜シ

○第一千二十六方同上

括失亞 白糖各一刃 硬鍊華半刃

右調勻為散分二十四裹每服一裹日四次

○第一千二十七方猶歌蘭度

硝鍊華或鍊酒石附一錢 健知亞那越幾斯一錢 橙皮越幾斯一錢 黑栗薩水三分 桂水二分 橙皮舍利別一分

右合勻每服一食匙日四次

主治右二方萎黃病婦人體質脆軟大ニ胃弱ノ者或ハ粘液過多ノ者ニ宜シ

○第一千二十八方別連社

硝鍊華 尼爾拔奴謨各一錢 阿魏二錢 葛私篤僂謨一分

右加纈草丁幾調和三氏為一九衣石松粉玻璃壘收貯晨

夕服二三九

主治萎黃病及ヒ虛性神經病ニ宜シ○此他別連杜人ハ
鍊劑ヲ久服セシムルニ先此方ヲ與フ

○第一千二十九方

林檎酸鍊丁幾一

右每眼半茶匙乃至一茶匙日三四次

○第一千三十方

鹽酸鍊丁幾一

右每眼二十滴乃至四十滴沙糖和服日三四次

○第一千三十一方

別私點設弗神經丁幾一

右十五滴乃至三十滴或五十滴沙糖和服日二三次

○第一千三十二方

葛刺布魯篤入人名神經丁幾一

右每眼十滴乃至三十滴沙糖和服日二三次

主治第一千二十九方ヨリ一千三十二方至萎黃病者體

質脆弱他ノ難化ノ鍊劑ニ堪ヘザル者之ニ宜シ

○第一千三十三方 羣的爾氏萎黃病丁幾

花尼利丁幾 葛刺弗魯篤神經丁幾各半

右調匀每眼十五滴乃至二三十滴日四次

主治萎黃病殊ニ其症心思鬱重ニ因テ來ル者之ニ宜シ

○第一千三十四方遇。濁弗濕兒。

撒爾末兒扶斯 炭酸曹達各一 白糖六人

右調勻為散分六包每服一包日二三次沙糖水一盞和服
主治此方味惡カラス炭酸銕ヲ用フルノ妙方ナリ萎黃
 痘及ヒ他ノ經閉諸症ニ甚稱用セリ

○第一千三十五方謨。玳苦麻尙尔

(甲方)

撒爾末兒扶斯二八至三八 白糖一刀

右調勻為散分十二包第一號

(乙方)

炭酸曹達二八至三八

白糖半刀

右調和為散分十二包第二號每服取甲方一包乙方一包
 各別冷水溶化後二方合和服

主治萎黃病及ヒ其他纖維弛緩セル症ニ宜シ

○第一千三十六方

撒爾末兒扶斯 酒石鹽各半 達刺侃鴛護謨適宜

右為四十八丸名簿老度人炭酸銕丸

主治萎黃病及ヒ其他虛弱ニ因ル症ニ宜シ○簿老度人

用法始メ三日間朝夕一丸ヲ與ヘ第四日第五日第六

日ハ午後又一丸第七日第八日第九日ハ朝夕二丸第十一日第十二日ハ午後又二丸第十三日第十四日及ヒ第十五日ハ朝夕三丸第十六日以後ハ毎服四丸ニ三次此ノ如ク連進メ病証全ク退クニ至リテ又週回シ前ニ準シテ漸ク服量ヲ減ス

○第一千三十七方 蕁乙婆兒篤改製薄老度氏鍊丸

撒爾末兒扶斯 結晶過炭酸剥篤亞斯

各半

二味調

撒爾末兒扶斯 結晶過炭酸剥篤亞斯

各半

二味調

亞刺昆亞薩謨末

一錢

過爾拖

未半錢

右為九十六丸衣石松粉

〔附考〕毎丸炭酸鍊及ヒ炭酸剥篤亞斯各半丸ヲ含畜シテ其餘ハ酸化鍊及ヒ硫酸剥篤亞斯ヨリ成立ス

○第一千三十八方 韶管爾

撒爾末兒扶斯 酒石鹽 甘草越幾斯 甘草

細末各二錢

右調和二丸為一丸衣甘草末每服六丸日三次

〔主治〕單純萎黃病並ニ總テ鍊劑ヲ要スル諸症ニ宜シニ三日連服ノ后漸々加ヘテ毎服五六丸日ニ四五次ニ至ル之ヲ服ノ其人頰唇紅色ヲ得ルニ至レバ再服量ヲ減シテ尚連進シ病狀全ク退クニ至ルベシ○別矣噎魯地產ノ上好麥酒ヲ少許宛與フルハ實ニ治療ノ一助タリ

此丸方ハ毫モ冒腸ヲ害スルトナシ○此丸製法左ノ如
シ即撒爾末兒秩斯酒石ニ味ヲ磁鉢ニ内レテ熟研細末
シ次ニ甘草越幾斯ヲ加ヘテ適宜ニ調和スレバ稍硬固
ノ塊ト為ル然ニ未九スペキノ稠ヲ得ス故ニ其撒爾末
兒秩斯ニ含ム所ノ結晶水ヲ離散セシメンガ為ニ之ヲ
暖所ニ置ケハ變メ稀粥ノ稠トナリ結晶水離散シテ鹽
分モ亦稍融解ス是ニ於テ之ヲ暖所ヨリ退ケ更ニ二三
密扭篤間熟研スレハ結晶水ノ一分又蒸散スルナリ而
後本量ノ如ク甘草末ヲ投シテ研和スレハ即適宜ノ稠
ヲ得

○第一千三十九方 設條。溫優滿

荅幾私葉附 開達搭碌屈私末爾秩斯附各一錢 麥奴二錢
實芟荅利斯半錢 橙皮舍利別適宜

右為二百五十九每服八丸薩毘那泡劑送下

主治萎黃病末水腫及ヒ羸瘦熱ヲ發セサル者之ヲ連服
スルニ宜シ

○第一千四十方 遏傑栗屈的兒

幾那越幾斯二錢 没藥 撒兒末爾秩斯各一錢 桂油四滴

右調和為五十四丸衣桂末早晚服二丸

主治幾那銀配伍スレハ萎黃病ニ卓越ノ効ヲ奏ス蓋此

方胃化強健ノ者ニ用フベシ

○第一千四十一方 蒲列刺人鍼製強壯散 ヒユルフニレストコ・マルチア

レスヲ
ラ羅

酸化鍼

格綸僕各一

橙皮半

桂刀一

右調勻為散等分九包毎服一包日一次

主治萎黃病全身衰弱經血閉止セル症ニ宜シ

○第一千四十二方 炒畠私

鹽酸鍼

二又至三才

橙皮水一

右調和毎服二十滴日二次乃至三次

主治萎黃病ニ宜シ又脫血或ハ諸般ノ虛脫病ヲ患フル

ノ後筋力衰弱及ヒ血液不給ノ症ヲ補益ス此溶液二十滴中大約鹽酸鍼二又ヲ含畜ス

此溶液半

○第一千四十三方 萬幕孫

沃胄謨鍼

二又至三才

蒸餾水九錢溶化加橙皮丁幾一錢

右分為三服一日服盡入沃胄謨鍼舍丹四分主治萎黃病瘰疬病ヲ合併スル者ニ宜シ其固效內外亦

○第一千四十四方 越魯源屈

沃胄謨鍼

一錢附

甘草越幾斯通

右為六十九衣桂末玻璃搗收貯晨夕服二丸乃至四丸主治萎黃病瘰疬病合併症ニ用ヒテ確効ノ一方トス

○第一千四十五方 機利僵

沃胄謨鍊舍利別

附一錢半

至

蒸餾水

一弓半

沙糖舍

利別

半弓

右調勻晨夕服一小哥喜匙

主治少女ノ萎黃病ニ宜シ又小兒神經病其因腹内ニ在ル症ニ用フベシ○大人ハ沃胄謨鍊舍利別三錢乃至四錢ヲ以テ蒸餾水六弓ニ和シ毎服一食匙強日ニ二三次

○第一千四十六方 涅優澷

牡蠣

末十

鍊粉

三八至六

桂油糖

半弓

右調和為散分十二服日三服

○主治萎黃病胃中酸敗液ヲ兼ル者之ニ宜シ

○第一千四十七方

鐵粉

二錢

葛爾儒別

半弓

老利兒子

末三

桂末

一錢

杜松子舍利別

全量半弓

桂油糖

半弓

右調和作舐劑每服二三茶匙日三次

○附考呂私名創製スル所ノ所謂私黠篤噶爾德人萎黃病舐劑是ナリ合八兩時又一服

○第一千四十八方 過傑栗局的匙

銹粉

二錢

葛私加栗刺

桂皮各一錢

白糖

六錢

右調和為散私葛肘刺器收貯每服一小哥喜匙強日四次

主治萎黃病胃腸虛弱者ニ宜シ

○第一千四十九方 穀歌蘭度

大黃 桂皮各二 白糖一
葛鍊粉

右調勻為散分八服朝夕一服

○第一千五十方 過像栗屬的兒

精製硫黃 没藥 透明蘆薈 緩固牛膽 適宜
錢 鍊粉

右二錢為一丸衣桂末朝夕服五丸乃至六丸

主治右二方萎黃病鍊ヲ用ヒテ便祕スル者ニ宜シ

○第一千五十一方

上好蘆薈一錢 鍊粉二錢 金硫黃半錢 甘汞一
錢 薩毘那

右三錢為一丸衣桂末臨卧服二粒

主治此方越矣葛爾度人製スル所ニシテ頑固ノ萎黃病
ニ稱用ス

○第一千五十二方 紳醫私

上好蘆薈半錢至一錢 上好大黃一錢 達刺侃篤

葛謨漿 適宜

右三錢為一丸衣桂末每服二粒乃至三粒日二次

主治萎黃病腹臟膨脹及ヒ閉塞症經閉症等ニ宜シ若之
ヲ服ノ瀉スルキハ後服ヲ停ム

○第一千五十三方

拔爾戾

萎黃病

士

適

鍊粉
叔格刺度末

雜腹蘭

末

達刺侃篤

謨將

宜

右十二人為一拉黠刺

ノ綻

日服三箇乃至四箇

主治萎黃病。白帶下。惡液病等ニ宜シ

○第一千五十四方

過係栗屬的兒

大黃粉

桂皮半
細末

幾那
赤健質亞那

橙皮半

桂皮二錢各

鍊粉二

右白葡萄酒二北浸漬飽熟十二時濾過每服一小盞強日

三次乃至四次

主治幾那鍊粉ノ如キモ製劑此ノ如クナレハ胃虛弱ノ者ト雖亦能ク服スルニ堪ルナリ

○第一千五十五方

龜鵝秘丁

蒔蘿葡萄

屑三

生姜

屑二

鍊粉

一

白沒食子酒

二

右浸漬十二時紙濾每服半盞乃至一盞日四次

主治壞血病及ヒ萎黃病ニ宜シ

○第一千五十六方

蒲列羅人苦鍊酒

ノニュム。アマリュム。カブレラ

羅

半

亞爾鮮穗

三

桂皮

鍊粉

各二

上好酒

三

右浸漬十二時濾過每服一食匙日三次乃至四次

主治萎黃病。腸胃衰弱症ニ宜シ又蟲症本復ノ期等ニ用

フベシ五十ナ衣

○第一千五十七方

鍊酒石球一弓至四弓附

右水一瓜兒篤煮加浴湯

○第一千五十八方

鹽酸鍊溶水半弓至一弓半附

右玻璃壠收貯加浴湯

主治右二方一千五十七方萎黃病。粘液流出。筋力疲弱。及

血脉衰弱ニ宜シ○萎黃病ハ天然ノ鍊泉拂郎西泉○四
爾隣鶯泉○叔姫兒拔屈泉○殊効アリ最病後補益ニ宜
數里泥爾偏泉○冠突法泉等殊効アリ最病後補益ニ宜

シ夏月之ヲ飲服セシムル三四週間且其症ニ準シテ

天造或ハ人造ノ鍊泉浴ヲ施スベシ

第二類

慢性病係神經症

第一係腦髓及脊髓症

多血卒中ハ多量ノ瀉血。頭上放蜞。叔繆結爾人寒罨法四十
方及芒硝灌腸。吐酒石。醉五方至七方。牛肺腸蒸餅母。項上
芫菁硬膏。兩足薰湯法等ヲ施スヘシ患者能ク嚥下スルト
不得。消石。九方至十四方芒硝吐酒石旃那等ヲ配合セル清涼下

者ニ施スベキノミ畜血已ニ減退セルキハ緩性衝動藥ヲ
頻々少量ニ與ヘテ以テ神經力ヲ佐クルニ宜シ即纈草千
十一方至千攝爾扁太里亞千六十亞兒尼四方
六十三方滿液鹿曉精等是ナリ然ニ若少シク多血ノ証徵ヲ見ハ
ス片ハ復速ニ清涼藥ニ轉スヘシ○神經性卒中ハ上ニ列
載ヒル衝動藥並ニ亞的兒アヤチル劑龍腦麝香或ハ燐等ヲ殊稱ス
葡萄千六十甘硝石精ニ收欵亞的兒アヤチル加フル者千六十忽
弗滿液鹿曉精等是ナリ然ニ若少シク多血ノ証徵ヲ見ハ
ス片ハ復速ニ清涼藥ニ轉スヘシ○神經性卒中ハ上ニ列
載ヒル衝動藥並ニ亞的兒アヤチル劑龍腦麝香或ハ燐等ヲ殊稱ス
然ニ更ニ猛力ノ劑公用ニ臨テ最慎重スヘシ何者衝動度

ニ過レハ幾微ノ元氣之ガ為ニ容易ニ消滅スレハナリ又
此種ノ症ハ注意ソ適宜ニ大便ヲ利シ香竈藥ヲ以テ洗滌
シ及ヒ塗擦シ且誘導法ヲ怠ルヘカラス危急ニ在テハ頭
上艾灸モ亦施シテ可ナリ

○第一千五十九方穢歌蘭度

旃那ニ 芽硝一 井水適宜煮沸濾取七加後味

吐酒石ニ 滿那舍利別一

右調匀每半時服一食匙乃至二食匙

主治多血卒中風放血後ニ用フヘシ之ニ兼テ醉三四弓
或ハ吐酒石四丘ヲ灌腸シ腓腸ニ蒸餅母ヲ貼シ兩足ヲ

蒸漏シ。頭上ニ寒巻法ヲ行フベシ

○第一千六十九方 謨私鶯

荅麻林度二 井水適宜煮耗至八弓濾過溶後味

精製消石一 芒硝一 吐酒石一 八

右調匀每四分時服一食匙

主治多血卒中風放血後之ニ宜シ

○第一千六十一方 穢歌蘭度

纈草粗末半弓 亞兒尼アルニ 加花カハ 錠熟湯適宜飽熱八分時

濾取七弓加後味

芒硝半弓 鹿琥精 忽弗滿液各四 十滴 橙皮舍利別半弓

右調匀每半時服一食匙

主治多血卒中風頭上ノ畜血ヲ制シテ后之ヲ用フベシ

○第一千六十二方 蓮珍

纈草半弓 加密列握アカヒツリョク 热湯適宜浸漬濾取十弓加後味

精製硝砂二 葛私鶯カスイトリ 傷謨レウム 錠 橙皮舍利別一弓

右調匀每半時服一食匙乃至二食匙

主治卒中風放血後之ニ宜シ

○第一千六十二方

纈草半弓 热湯適宜浸漬濾取六弓冷定加後味

忽弗滿液一

四

右調和每一時服二食匙。

○第一千六十四方

攝爾扁太里亞半

熱湯適宜浸漬濾取六弓冷定加過

主設印亞的兒一刀

右調勻每一時服一食匙

○第一千六十五方

亞兒尼加花錢

熱湯適宜浸漬濾取六弓冷定加後味

亞刺毘亞蓬謨錢

橙皮舍利別一弓

右調和每一時服一食匙

○第一千六十六方

金

亞兒尼加花錢 熱湯適宜浸漬濾取六弓冷定加鹿琥精

古弓刀

右調和每一時服一食匙

○第一千六十七方

葡萄草葉

亞兒尼加花錢各一弓

熱湯適宜浸漬濾取四弓

冷定加橙花舍利別半弓

右調勻每一時服一食匙

○第一千六十八方

甘硝石精

收欽亞的兒

覆盆子水

覆盆子

舍利別

主

甘硝石精 收欽亞的兒 覆盆子水

覆盆子

半堂

主治一千六十三方ヨリ一千六十八方至卒中風畜血ヲ除キテ后神經ノ運機ヲ振起スルニ宜シ

○第一千六十九方

欲爾田斯

人造麝香三 菲阿私越幾斯二 酒石糖未詳

右調勻為散分四裹晚服一裹

主治卒中風后ノ不寐ニ宜シ

○第一千七十方

吐酒石三人至 亞兒尼加花浸十二

右溶和供灌腸

主治卒中風及ヒ昏睡ニ宜シ

○第一千七十一方

春姪隣做過別爾潤萬

英喜格祿董篤越幾斯一 精製食鹽三 錢 加密列浸五弓溶

化加後藥

蘇蘆根流動越幾斯半 脫安大丁重勞久之

右調勻供灌腸臨用宜振盪

主治重證卒中風昏睡。其他腦病ニ宜シ

腦髓軟化エンセフロマニア 罗蘭ラシヤ 卵白エッグホワイト 蘭ラン

此症鑑定最難シ而ノ之看神經性卒中風ト看做オト屢アリ消炎治法ハ緩法ト雖此症ニ適當スルト甚罕有之アリ較スレ水衝動法ト誘導法ヲ兼ニ施ステ優レト不不誠

屈私人此症前兆ヲ見ス時即神經藥カルヲ稱用ス纈草。亞兒尼加。趨謨安沒尼亞幾。軒的兒劑。別私默設弗。神經丁幾。少量頻服シ。酒精塗擦藥香竈浴湯等是ナリ。驟ニ中風ノ類症ヲ發メ。卒倒スル件。此症往々ハ神經性卒中風ノ治法ヲ下スベキノ機會トス。宜シク嗅藥ヲ施シ足蹠ヲ刷摩シ。蒸餅母等ヲ貼スベシ。麻痺ノ期ハ。猶屈私人。做ヒテ亞兒尼加花ニセナ。十亞的兒劑。趨謨安沒尼亞幾及ヒ鱗千七十三方ヲ用ヒ。外用衝動藥ヲ塗擦シ。頭上ニ香竈罨法。蒸餅母及ヒ芫菁膏ヲ貼シ。其他麻痺ニ處スル所ノ劑ヲ與フベシ。輓近爹爾千七十九方ヲ試用シテ殊効ヲ得タリ。

○第一千七十二方猶屈私

亞兒尼加花

山生者半弓

熱湯適宜浸濾取六弓加後味

過設印亞的兒

二刃至

亞刺毘亞趨謨漿

橙皮舍利

別各一

右調匀每半時服一食匙

○第一千七十三方同上

燐一人半至三人亞的兒適宜溶化加後味

亞兒尼加花浸六弓以亞兒尼

桂舍利別一

右調匀每半時服一食匙乃至二食匙

○第一千七十四方同上

燐ニ 甘扁桃油二錢溶化加後藥

亞刺毘亞趨謨漿半 亞兒尼加花浸六 扁桃乳舍利

別一

子

右調勻為乳劑每半時服一食匙

主治一千七十二方ヨリ一千七十四方至腦髓軟化症痺ノ時期用フルニ宜シ

○第一千七十五方 甲〔弗。私。格耳列爾〕

爹爾 甘草越幾斯各一 甘草適

右二氏為一丸衣甘草末每一時服二丸

主治慢性腦髓軟化症ニ宜シ爹爾ハ此症ニ用ヒテ効ア

ルト恐ラクハ他藥ノ比ニアラジ「フ。私。格耳列爾」人ノ都ツ地名病院ニ於テ爹爾ヲ連用ノ劇甚頑固ノ頭痛頭旋健忘嗜眠斜視吃言行步蕩搖及ヒ半身不遂俱ニ脳髓軟化ノ見証ナリ平治セリ以上ノ病者皆病院ヲ去テ后不便ノ患ナク世ヲ終レト云フ○後世ノ試驗モ亦爹爾ノ確効ヲ證セリ久ク之ヲ連服スレハ下利ヲ發シテ患者快復ヲ覺エ能ク尿ヲ利ス若之ヲ服メ胃中灼熱ヲ發スレハ後服ヲ停ムベシ總テ煥衝症畜血症及ヒ胃腸ノ感覺過敏症胃腸汚物アル者或ハ下利過多ノ症等ハ皆爹爾ヲ忌ム頭旋ノルチゴ羅ド蘭ゲ

此症頭ノ畜血ニ因ル者ハ刺絡。頭上撻鍼。項窩吸角。脚湯等適當ス内服清凉剤九方至十七方。苦味泉。鑛酸六百六十七方。八百二十方。宜シ胃腸汚物アル症ハ解釋下劑四十九方至六十方ニ宜シ神經系ノ衰弱及ヒ其變調ヨリ來ル者ハ神經藥ヲ鑛酸ト配用。ノ千七十五方。鴻益アリ例スルニ纈草。芥子。良姜千七十七方至千七十八方。及ヒ菖蒲根。姜等是ナリ。外用刺賢塹兒精。複方乳香精。迷迭香油。拔爾撒謨油密幾私去爾等ノ如キ酒精剤及ヒ拔爾撒謨劑ヲ以テ顳顫耳後項窩。及ヒ前頭ヲ洗滌スルヲ好トス。○打膿法ハ大抵諸般ノ頭旋ニ良効アリ。

○第一千七十五方

乙福懶列爾人

越栗失爾必篤里阿利

甘硝石精

越栗失爾必篤里阿利各三錢

右調匀每服十滴乃至三十滴日二次多量冷水和服

主治畜血ト感覺過敏ト合併ノ發スル所ノ諸症ニ用ヒ

○奇方トス又諸種ノ熱病其性何タルト未顯然タラス而ノ神經衰弱證見ハレ皮膚熱シテ乾燥シ且渴アル者之ヲ用ヒテ殊ニ適當ス諸般ノ頭旋ニ亦卓越ノ効アリト雖就中燒酒過飲ニ因ル者最偉効アリ但其症ニ在テハ清涼劑ヲ兼用ノ畜血ヲ制シ又適宜衝動藥ヲ用フルヲ要トス。○此方舍利別覆盆子舍利別。櫻實舍利別。ヲ加フレハ味佳

ナリ

○第一千七十六方〔私摩爾徒〕
纈草丁幾硫酸密幾私毛爾附各二錢

右調勻每一時取十滴乃至二十滴沙糖水和服

○第一千七十七方〔福侖鶯〕
主治同上ノ諸症ニ殊効アリ

良姜 橙皮黃 桂皮各半 赤葡萄酒適 飽熟十二

時濾過取一北加後味

忽弗滿液小瓶二錢

右調勻每服一食匙日三四次

○第一千七十八方

良姜末

菖蒲油糖各半

右調勻為散分十二裹日服三裹乃至四裹葡萄酒送下

○第一千七十九方〔叔拔爾託〕

良姜半
益智細末

白糖十六

右調和為散分八服蠟紙包裹日服四次葡萄酒送下

○第一千八十一方〔那陽〕
主治神經性頭旋ハ良姜ヲ一奇藥トス○又右三方千七十七方至一千七十九方

胃腸衰弱。風氣鬱蓄。胃中粘液鬱滯或ハ酸敗液。麻痺症。及ヒ經閉弛緩ニ因ル者等ニ用フベシ

○第一千八十二方〔那陽〕

遠志方真

卷十

頭旋

二十

廣 肝 堂

庚 半

堂

○ 薦草 錢十 薄荷 葡萄草葉 墨 紗 西格 姜 半
右為粗末調勻取一食匙水二三盞泡出用

主治歇倚私的利性頭旋ニ宜シ 胃中氣鬱發起ハ難煩

○第一千八十一方 同上

龍涎香丁幾(或麝香丁幾) 忽弗滿拔爾撒謨非答 錢各二

舍電阿芙蓉液

刀

右調勻每一時服四十滴

○第一千八十二方 同上

過設印亞的兒 錢 加耶普的油

十滴

右調勻每一時服二十滴

○第一千八十三方 骨布

雞番木鼈末 番木鼈越幾斯 各一茶匙半加一錢

右調勻為十五丸衣過爾拖末每一時半乃至三時服一丸 味感覺敏捷人ハ十二時中用量僅一
○第一千八十四方 歇蘭度

主治頭旋ニ宜シ 感覺敏捷人ハ十二時中用量僅一
九乃至二丸ニ止マルベキ者往々之アリ○便秘症ハ蘆
薈水製越幾斯十五丸乃至三十丸ヲ加フ

○古癰瘍木脂 白糖 各半 錢 純精酒石 一
八

右調勻為散分四裏早晚服半裏

主治寢^ニ頭旋ノ奇方ナリ○此方殊ニ依^{レバ}偏篤ヲ兼ヌル
症ニ適當ス^ニ利尿丸^ニ加至三十丸^ニ吸^ハ

○第一圭八十五方〔祿溫頭爾毒土〕タマリ○外妙敷^ヘ蓋^シ
白頭翁越幾斯^ハ白糖^{一入}鐵^錢中量對^一

右調和為散等分六服早晚一服

主治頭旋假症^ニ宜シ○歇爾^ハ私^ス人^ハ說^ハ據^{レバ}假症^ハ
眼瞼内面木纖維瘻^ニ因^テ來ルト云ヒ他ノ一說
從^ハ虹彩^ノ痙攣^ニ係ルト云フ

睿^ホ智^{アタシ}衣^{マヌ}蘭^ラ圭^ク頭^{カイ}封^{カウ}二^ニ宜^シ

嚴ニ之ヲ論スレハ昏冒ハ決ノ腦病ニアラズシテ心臟病
ニ屬ス何者此症ハ一時心臟ノ運營過絶セルニ因^テ起^リ
之ニ繼^テ脳神經ノ侵襲セラル、者ナリ然レ正病學家多
之ヲ腦病ニ算入セルカ故ニ此書モ亦舊ニ仍テ此ニ揭ク
○此症心臟血充滿セルニ由^テ發スル者ハ速ニ緊縛セル
衣服ヲ脱去シ病者ノ位置ヲ改メテ其胸ヲ高クシ顏面並
ニ胸部ニ冷水ヲ灌キ下肢ニ芥子泥ヲ貼シ若其症久ク復
セザレバ放血スヘシ○歇爾私^ス的利^ニ因^テ來ル者ハ羽毛
人髮^ニ獸毛^ニ革^ニ或^ハ角^ヲ焚^テ之ヲ嗅シメ若クハ蒜^ニ或^ハ剉^タ
ル葱^ニ或^ハ香竈醋^ヲ鼻孔^ニ挿^ミ前額ニ酒精^ニ萄萄酒^ニ礪砂精

等ヲ擦シ弗刺渥兒ヲ以テ全體殊ニ四肢ヲ摩擦シ足心ヲ
刷摩シ及ヒ刺戟藥灌腸等ヲ好トス○其他神經虛弱ノ昏
冒ハ皆治法上ニ同シク且揮發ノ喚藥千八十六方至千九十六方ヲ施ス
ベシ蓋喚藥ハ直ニ腦ニ達スルヲ以テ之ヲ行フニ必慎戒
スヘシ頭上畜血ノ證徵アル者ノ如キハ嚴ニ之ヲ禁ス昏
冒中ハ藥ヲ服セシムルコ能ハズト雖已ニ醒覺スルキハ
其病性ト患者ノ體質ニ準メ相當ノ内藥ヲ與フヘシ凡此
症ハ昏冒ト醒覺トニ論すタゞ總テ苛酷ノ治法ヲ處セザル
ヲ要トス

○第一千八十六方昏冒ハ六、脚痛、腰背酸痛、四肢痺

醋酸加里乾固者一錢過硫酸加里一錢
右調勻為散內玻璃壘加薰餾水少許固封供喚藥

○第一千八十七方

醋酸加里 過硫酸加里各一錢半 丁子油五滴

右調勻為散內玻璃壘固封供喚藥宜滴冷水或醋少許溫
之

○第一千八十八方

硝砂華半 薄荷油 加耶普的油各十滴

右調和為喚藥

○第一千八十九方

硝砂 ニ
鐵 メタル 酒石鹽 半
弓

右調勻為散加燒酒適宜溫之玻璃壘收貯供嗅藥

○第一千九十九方 鄭的

硝砂 一
錢 煅石灰 ニ
錢

右二味各別研末內玻璃壘振盪混和為嗅藥

主治 專昏冒 ニ 宜シ ○ 脚汗抑遏ヲ復スルモ亦之ヲ用

フベシ用法臨卧此散少許ヲ取テ田場ニ撒布シ通夜之

ヲ着セシム

麻痺 パラリシス羅 フ

此症原因畜血 ニ 在ル者ハ放血及ヒ防焮法ヲ施スペシ腹

臟ノ刺衝物ニ因ル者ハ先腸胃汚物ヲ掃除スルヲ要トス
眞ノ衰弱ニ因ル者 此種ノ症 最多シハ神經衝動法ヲ專一トス
痺日ヲ延ク片ハ適宜ニ醫藥ヲ更換シテ用ヒ且最初小量
後漸ク加ヘテ大量ニ至ルヲ必須トス但時々藥ヲ休息セ
シメテ以テ醫藥ノ刺戟ニ慣ル、ナカラシムベシ ○ 此症
最要スル所ノ藥ハ即亞兒尼加 ハーニカ 百十四方。百十五方。千七
五 葡萄草葉 十九十六方 番木鱉 千九十八方 私的列幾尼捏 ニ
方 五百八方至一千百十三方 蒲律失捏 千百四十四方至一千百十六方 至千百七方 ニ
番椒 千百七十方 千亞的兒性油 千九十五方。千百廿三方。 千百廿三方。
方 五百五方 歇刺篤里捏 千百廿六方 俗稱 千百廿三方 荒菁等是ナリ

○以上列載スル所ノ神經藥ハ血脉ノ神經衝動シ並ニ脊椎ニ直達メ對稱機ヲ起スノ効アリ此理ニ原ツキテ或ハ私繆^{スミ}結兒氏ノ九方^{千百世}一方^{千百世}ヲ以テ呑吐ヲ起シ。或ハ格祿^{ゲロク}董土^{キント}千百ニ方。千百世三方^{千百世}巴豆油^{千百}一方^{千百世}ノ如キ峻下藥ヲ施シテ良効ヲ奏スル者アリ殊ニ其症腸胃汚物ヲ帶ヒザル者ニ好トス○又患部ニ從テ相當ノ治法ヲ處スベシ四肢ノ麻痺ハ外用法偉効アリ即刺戟劑ヲ塗擦シ^{千百三十五方至}芥子泥及ヒ芫菁膏ヲ貼シ。刷ヲ以テ摩擦シ。或ハ弗刺涅兒ニ香竈藥氣ヲ薰シテ以テ摩蕩シ。乾角法ヲ施シ。導麻ヲ以テ鞭チ。蟻浴。動物體浴。瀉水浴。滴水浴。越列幾的兒尾爾波尼

等ヲ施スヘシ。又病者自テ意ヲ用ヒテ患部ヲ適宜ニ運動シ以テ局處ナ痺弱ニ勝ニトガムベシ。望外ノ効アルト往々之アリ。其他麻痺症ヲ療スルキハ篤布栗^{トガル}地^{トガル}遏捲^{トガル}同微私^{スミ}同^カ噶^カ私^{スミ}的印^カ同^カ等ノ温泉ニ浴スルヲ怠ル勿レ

○第一千九十一方 [福偏篤]

亞兒尼^{アーニ}加花^{カハ}半錢^{ハーフ} 黑粟^{リップ}薩葉^{ササエ}一錢^{ハーフ} 甘草^{カンゾウ}一錢^{ハーフ} 角茴香^{カクイ}一刃^{ハーフ}

右細剉調匀分四裹取一裹水一比浸出濾過分服四次

主治四肢痺。黑障眼等ニ宜シ

○第一千九十二方 [謁急倫]

亞兒尼^{アーニ}加花^{カハ}半熱湯適宜浸濾取六弓加後味

鹿琥精二錢 硫酸亞的兒一錢

硫酸亞的兒一錢

右調勻每半時服一食匙強

○第一千九十三方

猶歌蘭度

亞兒尼加花一刃 繢草油一滴 白糖半錢 鹿角精四錢

右調勻為散分八服每一時半一服

○第一千九十四方

速別倫歌惜

亞兒尼加丁幾二錢 加耶普的油三十滴 鹿角精一錢

右調勻每服十滴乃至二十滴砂糖和服日四次

○第一千九十五方

私屈泥姪爾

亞兒尼加花油四滴 甘硝石精半勺溶化

右調勻每服四滴八滴乃至十二滴日三四次

右調勻每服四滴八滴乃至十二滴日三四次

主治第一千九十一方ヨリ一千九十五方至卒中風後ノ四肢不遂=宜シ

○第一千九十六方

葡萄草葉半錢 橙皮舍利別一

右調勻每一時半服一茶匙

○第一千九十七方

葡萄草葉半 加密列薄荷各一 素三粉一

右剉為泡劑料

主治葡萄草八實=用フル1罕ナリト雖鈍性衰弱症=

在テ神經系ヲ衝動シ及ヒ皮表、腎臓、氣管粘液膜ノ分泌ヲ獎メン。ヲ欲スル者就中麻痺症卒中後舌痺等ノ痙攣殊ニ舞踏病及ヒ水腫等ニ稱用ス。毎日二錢乃至三錢浸劑トシ用フ。

○第一千九十八方番木鼈越幾斯

番木鼈越幾斯

半

右一氏為一丸。衣石松粉日服一粒漸加至二粒三粒。主治脊髓神經彌蔓セル部四肢ノ麻痺ニ宜シ。○此症ニ於テハ番木鼈殊ニ私的列ス幾尼捏アキニネヲ奇藥トス。但之ヲ用フルハ最慎戒スヘシ。何者此劑動輒死ヲ促ス。アレハナ

リ其効麻痺ノ部蟻ノ行クカ如キヲ覺ユルヲ以テ證ス。ヘシ尚之ヲ連服スレハ屢越列ス幾ノ如キ激動ヲ起シ筋惕肉憚ス或ハ麻痺ノ一局處發汗スル者亦之アリ。

○第一千九十九方

番木鼈

末半

精製甘草膏

適宜

右為六十九衣石松粉每服二丸日二次宜徐々加服量。附考此用法ハ別兒レーリ列印地名ノ病院ニ於テ麻痺症ニ施セシ所ナリ。

○第一千百方番木鼈越幾斯

番木鼈越幾斯

半

甘草越幾斯

七

右調勻為八十九衣伊里斯弗魯連底那根末每服二丸乃至六九日二三次

○第一千百一方〔膏布〕

巴豆油

六滴

番木鼈越幾斯

二十

番木鼈

末各二

右調和為丸五十粒衣遏兒拖根末每服一丸日五次

○第一千百二方〔福僵篤〕

番木鼈越幾斯

半刀

至一刃

格祿莖

篤

丁幾一錢溶化加地

榆丁幾三錢

主治右二方

千百二方

下肢ノ麻痺大便不利ヲ兼ル者

宜シ

○第一千百三方〔同上〕

番木鼈越幾斯

四十

龍腦

一錢

別爾篤

丁幾

一

右溶和每服二十滴亞兒尼加泡劑和服日四次

主治四肢麻痺ニ宜シ

○第一千百四方〔弗。肝。爾。姪。蒲。蘭。突。〕

番大鼈越幾斯

二十

四丸

默栗薩

水

六弓

溶化加亞刺

昆亞楚謨漿半弓

右調勻每一時服二食匙臨用宜振盪

主治四肢麻痺並ニ癲癇ニ宜シ

○第一千百五方〔速別倫歌憲〕

加後味

安質沒尼酒三錢 忽弗滿液一茶匙 姜舍利別一茶匙

右調勻每一時服一食匙臨用宜振盪

主治僂麻質斯性及ヒ單純神經性ノ四肢麻痺其症脊髓ヨリ起ル者ニ宜シ

○第一千百六方秘刺律松

甘汞 金硫黃各一 番木鼈越幾斯五錢 亞兒尼加越

幾斯 阿魏各二錢

右調勻二氏為一丸衣石松粉每服五丸日二次

○第一千百七方福傷篤

番木鼈丁幾 荒菁丁幾各二錢

右調勻每服三十滴亞兒尼加泡劑和服日三四次

○第一千百八方麻健齋

主治感覺甚遲鈍ノ人ニ於ケル痲症ニ宜シ至二丸

○第一千百九方麻健齋

精製私的列幾尼坦三分

右調勻為二十四丸衣石松粉玻璃壘收貯晨夕服一丸須

極慎重加至二丸上

逐石

藥

卷十

二十九

廣胖堂

堂

主治麻痺症ニ宜シ○私的列幾尼捏ノ能力番木齶越幾
斯ニ優ルト六倍乃至十倍トス僅ニ八分仄ノ一コリ半
仄至ヲ以テ強大ヲ斃スベシ之ヲ人ニ施セバ危險ヲ致
スニ足ル安度刺兒氏ハ十二分仄ノ一ヲ服ノ撮口症ヲ
發セルヲ親驗セリト云フ或ハ毎服一仄乃至二仄ニシ
テ毫毛危害ヲ見サル症アリ此ニ由テ之ヲ觀ヒハ私的
列幾尼捏ノ能力一定ナルズ○然レ此ノ如キ毒物ハ寧
内服セシメザルヲ優レリトス晏姪兒麻質斯法千百十
三方

ヲ以テ之ヲ施ス片ハ其効更ニ確實ナリ

○第一千九方同上

精製私的列幾尼捏一 醋酸二 白糖三 橙花水二
右溶和朝夕眼一茶匙

主治麻痺症ニ宜シ

○第一千百十方劉姪爾松

醋酸私的列幾尼捏一 再餚燒酒一 桂水七

右溶和每服五滴日二次須慎重加服量

主治劉姪爾私名下身麻痺經久ノ者三人之ヲ用ヒテ偉
効ヲ得タリ

○第一千百十一方硝酸私的列幾尼捏

硝酸私的列幾尼捏一 热湯適宜溶化加精製甘草膏

適宜

午晚服二丸

○主治 麻痺ニ用ヒテ大ニ驗アリハ昔三人之マニヤニ

○第一千百十二方

精製私的列幾尼捏四分八一至半八 稀醋酸一錢融解加燒酒七錢
右調勻每服四滴日四次須徐々加服量

○主治 私咄屈ホルム訶ホルム兒母ホルム地ホルムノ病院ニ於テ鉛毒麻痺ニ之ヲ試
用シテ良効ヲ得タリ

○第一千百十三方

精製私的列幾尼捏四分八一至半八 白糖三分
右研和為細末分四裹晚暮取一裹剥表皮撒布之

○主治 麻痺症及ヒ慢性神經痛ニ宜シ○能ク病狀ニ着眼
シ慎戒シテ私的列幾尼捏ヲ加増シ一八若クハ一八半
ニ至ルヘシ若之ニ由テ中毒證ヲ見ハスキハ模爾比捏
ヲ代用スヘシ

○第一千百十四方

(麻健齋)

精製蒲律失捏十二 玫瑰昆設兒弗半
右丁寧調和為二十四丸衣金箔早晚服二丸漸加至六丸

○第一千百十五方

(同上)

○第一千百十六方 同上 始服量始服量半
右每服六滴日二次乃至三次漸加至二十四滴

精製蒲律失捏六 薫餾水二弓_{乃至四弓} 溶化加白糖二錢

乃至四錢

右調和早晚服一食匙

主治第一千百十四方ヨリ一千百十六方至局處或ハ遍身麻痺ニ宜シ○蒲律失捏ハ私的列幾尼捏ト同効ナリト雖其力彼レニ劣レルト六倍乃至十二倍トテ輓近ノ醫安度刺兒人諸般麻痺症ニ之ヲ用フルト半弓乃至

五人ニシテ効ヲ得タリ】麻健鑿人ハ羸瘦病ニ症其一ハ脣ニ係ル者其一ハ足ニ係ル者之ヲ用ヒテ奇驗ヲ得タリ但之ヲ丸トナシ毎九蒲律失捏八分人ノ一ヲ含ム者毎日六丸ヲ服セシム○硫酸蒲律失捏鹽酸蒲律失捏燐酸蒲律失捏等ノ如キ總テ蒲律失捏鹽ハ之ヲ純粹蒲律失捏ニ較スレハ更ニ溶解シ易シ是故ニ其効更ニ優レリ宜ク小量ニ處スペシ然レ世間通知セルカ如ク蒲律失捏鹽ハ今時未嘗テ之ヲ醫用ニ供セズ

○第一千百十七方

臘實干斯葉半弓至一弓

菖蒲油糖半刀

右調勻為散分八服早晚一服

麻痺

三十三

廣胖

堂

主治 僥麻質斯性依倨篤性麻痺症ニ宜シ ○ 腦實干斯ノ量漸々加ヘテ十氏ニ至リベシ然ニ其能力一定ナラサルガ故ニ服量モ亦定メ難シトス間或時少々服ベシ

○ 第一千百十八方 速別倫歇惱

腦實干斯葉

一

熱湯適宜浸濾取六弓放冷加後藥

癒瘍木脂揮發丁幾

附

格爾失屈謨子酒

各二

拔爾

撒謨字露舍利別

一

右每一時半取一食匙粘滑藥泡劑和服臨用宜振盪

主治 依倨篤性麻痺症ニ宜シ

○ 第一千百十九方

弗。肝爾田蒲蘭度

臘實干斯越幾斯

龍腦

各十

亞兒尼

加越幾斯

纈

草越幾斯

各半

菖蒲根末

適

右三氏為一丸衣石松粉每二時服三丸

主治 半身不遂ニ宜シ

○ 第一千百二十方

謝。忽倫

番椒丁幾

一

右每服三十滴乃至五十滴粘滑藥浸液和服日四次

○ 第一千百二十一方

謝。忽倫

番椒丁幾

一

格碌董篤丁幾

各一

亞兒尼

加丁幾

錢

一

亞兒尼

加丁幾

錢

一

亞兒尼

加丁幾

錢

一

亞兒尼

遠西方彙

薩毘那油

半錢

卷十

麻痺

三十四

廣
月

右調匀每服十滴乃至十五滴粘滑藥浸液和服日四次

主治右二方四肢膀胱直腸ノ麻痺ニ宜シ殊ニ其症僂麻
賀斯ニ因ル者ニ用フベシ○又番椒ヲ散トシ毎服二仄
乃至六仄日ニ三四服スルモ可ナリト雖其味辛辣ナル
ヲ以テ服スルニ堪ヘス

○第一千百二十二方

麻
醉
蘭度

加耶普的油

一
刀

忽弗滿液

鹿琥精

各一
錢

右調和每一時半三十滴

主治麻痺症未頑固十ラサル者ニ宜シ

○第一千百二十三方

同上

的列並油

引
六
支

右每服至三十滴日四次

主治下肢麻痺ニ偉効アリ

○第一千百二十四方

春
姪
隣

宜シ○

大
燐

大
燐
一
根
草
一
分
量
用
宜
火
燐

右加耶普的油一錢半溶化内玻璃壠用黑紙被封貯每服
四滴乃至六滴葡萄酒和服日三次

主治麻痺ニ宜シ

○第一千百二十五方

誠
歌
蘭度

○第燐ニ百新絞扁桃油二錢溶化加亞刺毘亞蓮謨將水一錢半徐々搗和又和拔爾撒謨亨露舍利別一弓橙花水六弓作乳劑更加後味日五本

古忽弗滿液一錢

一錢半容小內瓶

右調匀每一時半服一食匙臨用宜振盪

○主治頑滯癲癇及麻痺症宜シ○燐ハ最神經衝動ノ藥劑タリ外雖之ヲ内服スルキハ必多少危害ナキト能ハシ四十歲日四大

○第一千百二十六方

歇刺篤里捏一

菲阿私越幾斯

甘草末各十

六弓

○右調和為十六丸衣石松粉每一時半服一丸

○主治麻痺症。神經痛等宜シ歇刺篤里捏ノ服量多キエ毎服四分弓ノ一ニ過クヘカラズ○歇刺篤里捏ハ最危藥タリ服シテ二三弓ニ至レハ即斃ル但外用ハ害アルト罕ナリ

○第一千百二十七方爾達地叔泥延爾

叔泥姪爾禾草

丁幾千シクチラ。アカリキ。ミ

スカリ。スクリ。サイデリ。羅

生禾草洗淨細剉

者二弓

右再餾燒酒五弓浸安暖所飽熟三日紙絞濾取淳加再餾燒酒三弓振盪爾後飽熟久之濾取液又加燒酒六弓

○第一千百二十八方

同上

叔泥塙爾禾草醋

アセナユム。アミス

生禾草

洗淨細剉者ニ引

酒醋五弓浸安暖所三日紙絞濾取

滓加酒醋三弓振盪飽熟久之濾取液再加酒醋六弓

附考

腐敗ヲ防クニ燒酒少許ヲ加フルヲ妙トス

○此方

丁幾劑ニ較スレバ効力猛烈ナリトス

○第一千百二十九方

同上

禾草丁幾

千百廿七方

橙皮丁幾

各一弓

右調勻每一時二十滴冷水和服漸加至四十滴

○第一千百三十方

同上

禾草末五

白糖一刃

右調勻為散分十二裹最初日服三裹後四裹冷水送下

主治諸般ノ麻痺症ニ宜シ○叔泥塙爾人之ヲ用ヒテ全治セル者數症乃書記セリ○麻痺症ノ外左ノ諸病ニ亦禾草ヲ試用セリ即重証依朴昆塙兒及ヒ心思鬱憂病。舞踏病。落法尼亞。胃痛。疝。腎病。膀胱病。發疹病。皮疹。內陷。粘液勞等是ナリ

○第一千百三十一方

鐵歌蘭度

叔繆結爾人丸

名也

吐酒石

十五氏水容解

瓦爾拔奴謨

護謨安沒尼亞幾

アキヤ

兔尼加越幾斯各一錢

半

葛私鴛鴦謨

半日四大煎味至多錢

右調勻一丸為一丸衣石松粉每服八丸日四次漸加至發
嘔土面各十五丸

主治催吐療法ハ麻痺症ニ偉効ヲ得ルノ屢之アリ此丸
ヲ服シ吐ヲ發スルニ至リテ吐酒石ノ量若クハ丸數ヲ
減殺スヘシ

○第一千百三十二方(同上)

格碌董篤丁幾半

右每服十滴乃至十五滴日三次

主治諸般ノ麻痺症ニ宜シ殊ニ其症黒膽液性ノ者ニ佳

ナリ

○第一千百三十三方(別連社)

格碌董篤丁幾半

六滴至

桂冰

綿苔

幾里私布

各半

葛甘海鹽精一錢

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

主治麻痺症腸ノ運營遲鈍ヲ兼ル者ニ宜シ

○第一千百三十四方(無歌蘭處)

外汞

硫酸亞的兒

二錢溶化

右每服十滴乃至三十滴日三次

主治麻痺症諸種ノ病毒殊ニ癰毒轉移ニ因ル者ニ宜シ

○第一千百三十五方

蟻精附

龍腦精各半

老利兒軟膏一弓半附

右丁寧調勻塗擦四肢麻痺

加耶普的油

忽弗滿拔爾撒謨非答

複方乳香精捲姪兒精

加耶普的油

忽弗滿拔爾撒謨非答

右調勻洗麻痺部

加耶普的

油

加耶普的

油

加耶普的

○第一千百三十六方

〔穢歌蘭度〕

○第一千百三十七方

〔穢歌蘭度〕

加耶普的油

硝砂揮發加龍腦油膏

忽弗滿拔爾撒謨非答

○葉撒謨非答

〔穢歌蘭度〕

右名神經軟膏

○第一千百三十八方

〔穢歌蘭度〕

番椒弓六錢

白芥子二錢

龍腦一錢

的列並底那

白色者一

右浸漬十二時濕弗刺涅兒拿擦麻痺處日一二次

○第一千百三十九方

〔穢歌蘭度〕

燐五錢實百爾油二錢瞿粟油半弓溶化

右調勻拿擦患處

○第一千百四十方

〔穢歌蘭度〕

燐八錢的列並油亞麻子油各一弓溶化加後味

龍腦 半錢乃
至一錢

神十山膏 甘扁桃油半
山

○右調勻作軟膏塗擦日二次臨用宜振盪
○第一千百四十一方〔喊過僧誤〕

燐火四 龍腦 一刀至半錢 甘扁桃油半

○右溶和塗擦患處

○第一千百四十二方〔護頭〕

燐火二 加後味溶化

薩毘那油 半 硝砂加石灰精

○右調勻作軟膏塗擦日二三次

○主治第一千百二十五方ヨリ一千百四十二方至皆麻痺

症ニ宜シ

○第一千百四十三方〔肘倫〕

歇刺篤里捏五人至二十人 家猪脂一

右調和為軟膏取榛子大塗擦日二次

○第一千百四十四方〔嫵暗耳〕

歇刺篤里捏半 菲阿斯油或罂粟油半

右調和塗擦患處

○主治右二方諸般ノ神經痛。黑障眼。頑滯。依僥篤。麻痺症。水腫。癰毒骨痛等ニ宜シ○麻健葦人ハ歇刺篤里捏四八ヲ以テ家猪脂一弓ニ和シ腹水及ヒ慢性瘧麻質斯經久依

倨篤等ニ試用セリ○越魯涅屈人モ亦此三症ニ賞用セ

リ

舌痺

舌痺 ダロスソノブレギア羅フル

蘭

此症卒中風ノ前兆若クハ傍証若クハ餘証トシテ來ル者ハ此症往々卒中風治法適當ス之ヲ施メ後誘退法及ヒ局處衝動法ヲ行フベシ誘退法ハ即角法。發疮膏。串線法。艾灸。打膿等是ナリ但打膿法ハ顱骨根ノ近圍。項椎ノ上頭ニ施シ其効力ヲシテ極テ舌下神經根ニ達セシムルヲ要ス局處衝動藥トシテ諸種ノ咀嚼藥ヲ撰用ス即地榆根千百四十六方別爾篤婪根千百四十七方姜及ヒ羌活千百四十八方等是ナリ又刺戟性

含漱水千百四十九方舌上亞的兒性油塗擦千百五十六方及ヒ龍腦油。薄荷油。加耶普的油等ヲ點滴ス○噴藥モ亦稱用セリ○内服八葡萄草ニ宜シ千九十六方。千九十五方○越列幾的爾尼波尼鍼鍼治アキビンモ亦効アリ

○第一千百四十五方

葡萄草葉半弓熱湯適宜浸濾過加白糖半弓

右調匀日服

主治舌痺ニ宜シ往歲暴利私名葡萄草ヲ用ヒテ奇効ヲ得タリ輓近ニ至リテ斂耳人モ亦之ヲ用ヒテ無毒ノ舌痺二症ヲ治セリ

○第一千百四十六方

地榆根

錢

右剗為薄片供咀嚼劑

○第一千百四十七方

別爾篤婪根

末

乳香

各一

右調勻取其半咀嚼

○第一千百四十八方

弗幾

雅魯

篤滿

姜

燒活

各末

乳香

適

右一刀為一塊供咀嚼

○第一千百四十九方

質列乳斯

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

金

白芥子

末

白拂郎斯酒

此

安暖所飽熱十二時濾過

加後藥

複方白芷精

附二

右調勻供含漱水或取一食匙內服日三四次

○第一千百五十方

弗幾確魯篤滿

右丁寧調和塗擦舌上

○第一千百五十一方

別篤尼越幾斯

未

甘草越幾斯

各一

葛私篤僂謨

阿魏

各半

肉豆蔻

刀

右蜜搘和為栗非奴謨

果實名未詳

大扁圓錠令含之置舌上

主治右數方

千百四十六方至五十一方

舌痺ニ宜シ

膀胱麻痺

シストブルギア羅フルラ
ムミングスンデブライス蘭

此症ヲ療スルハ毎日數次謁刺私室葛蕷謨製葛翁的爾ヲ

輸入スルヲ須要トス内服ハ其功用膀胱神經ニ直達スル

劑ヲ要トス即的列並油拔尔撒謨骨拜霍拔尔撒謨字露的

髓ニ循行スル者ニ宜シ即亞兒尼加千九十一方至番木鼈

化者烏白烏爾識葉及ヒ實阿松麻葉千百五是ナリ或ハ脊

兒溶ウ白烏爾識葉千百八方至臘實千斯方至千百

千九十八方私的列幾尼捏千百十三方臘實千斯方至千百

至千百七方私的列幾尼捏千百八方至臘實千斯方至千百

十九麥奴千百五十七方等是ナリ○外用ハ揮發膏龍腦精

方千百五十七方等是ナリ○外用ハ揮發膏龍腦精

ニ羌青丁幾ヲ加フル者及ヒ石腦油千百六十三方等ノ衝動藥ヲ塗擦スヘシ發疮膏モ亦大效アリ若膀胱麻痺脊髓病ニ傍發スル者ハ其症之ヲ薦骨上ニ貼スルヨリ小腹ニ施スフ優レリトス何トナレバ之ヲ薦骨ニ施ス片ハ眠瘡ニ變シ易キニ由テナリ此他小便失禁小便艱澁小便淋瀝小便閉塞下二載スル所ノ方法ヲ參照シ用ノシベ

○第一千五百五十二方麻葉

實阿私麻葉烏白烏爾識葉各半注滾湯八弓蓋閉

安暖所飽熟四分時濾過加後味

遠志舍利別

右和勻每一時服一食匙

〔主治〕痺疾並ニ膀胱ハ弛緩及ヒ麻痺ニ宜シ

○第一千百五十三方

〔傳承的而連〕

○第一千百五十三方

旃那瀉下飲

〔附〕半

水製大黃丁幾

〔半〕

括失亞越幾斯

十五 芫菁丁幾

〔半〕錢

癒瘍木揮發丁幾

〔一錢〕

杜松子舍利別

右和勻每一時取一食匙杜松子浸半盞和服

〔主治〕膀胱麻痺初期甚之ヲ稱用ス○速母墨躰僵

〔入〕

名ハ芫

菁丁幾十五滴乃至二十滴ヲ取リ扁桃乳=和服スル

〔一日〕

ニ三次或ハ芫菁末

〔每服三分〕

ヲ龍腦一丸及ヒ亞刺毘

○第一千百五十四方

〔同上〕

○第一千百五十五方

〔同上〕

○第一千百五十四方

〔同上〕

的列並油

杜松子油

忽弗滿拔爾撒謨非答

芫菁

丁幾

〔各二錢〕

右調勻每服二十滴乃至四十滴裸燕麥煎汁和服日四次

至六次

○第一千百五十五方

〔同上〕

〔主治〕膀胱麻痺經久ノ症ニ宜シ

亞麻子

〔末一錢〕

甘草

〔粗末一刃〕

井水適宜煮八分時濾取八

弓加後藥

芫菁丁幾

十滴至滿

右和勻每一時半服一食匙

主治膀胱弛緩及下肢痺

○第一千百五十六方

春姦隣

至龍腦

一錢

番椒

八分

癰瘍木脂

一錢

芫菁末

五仄

加雞子黃少許

古程和

格碌革

丁幾

適宜

石松粉

四

大

右為八十九衣石松粉每服一丸漸加至二丸或四丸裸燕麥粘汁送下日二次

主治膀胱直腸及下肢之麻痺

○第一千百五十七方

懶人秘傳

一小日二上服

麥奴

六分

白糖

半

右調勻為散分十二服日三服甘草實

主治尿閉症膀胱底麻痺因斯者之二宜

○第一千百五十八方

麥奴

一錢半

至二錢

水煎服日三次

右井水六升煮濾過每一時服一食匙

主治同上

○第一千百五十九方

昆刺地人丸

阿魏

半

吐根

末

阿芙蓉

末

薄荷油

各二

亞刺昆

亞楚謨漿

適宜

遠西方藥

卷十

四十五

廣半

堂

右二升為一丸衣

每服十九日三次

主治
松泥姪爾アラシニシマツル入ニ據レハ此九小便閉膀胱麻痺ニ由ル

者ニ歷驗セル一方ナリト云フ

○第一千百六十方西懸爾土

茺蔚アラシニシマツル末一ム

龍腦ラウバン三人至六人

白石鹼ホワシナカツ半錢

右和勻為十二丸衣桂末每服一丸乃至三丸日三次

主治
產婦ノ小便失禁症麻痺ニ因ル者ニ宜シ

○第一千百六十一方弗兒咩秋湿润爾

茺蔚アラシニシマツル末一

錢粉マネイニ

精製甘草膏カニシヤウ一錢

右調勻一升為一丸衣石松粉漸加服三四丸

主治
小便失禁麻痺ニ因ル者ニ宜シ殊ニ產婦老人ニ用
フベシ

○第一千百六十二方極形忽倫

薩毘那葉アラシニシマツル末一錢

滾湯適宜浸漬濾取五勺冷定加龍腦二

升乃至四升

右調勻每半時服一食匙臨用宜振盪

主治
難產後ノ膀胱麻痺ニ宜シ

○第一千百六十三方越王健度

龍腦精ラウバン六分

硝砂精

鹿角精各一

琥珀油

杜松子

油オイ石腦油シロジン各二

錢

遠西方彙

卷十

膀胱麻痺

四百六

廣腹

右和匀塗擦膀胱部及肚腹

主治膀胱麻痺ニ宜シ

臨

前書卷一

既

卷二

○報一千九百六十二年五月廿四日

主治膀胱外ノ細胞種類ニ宜シ

臨

前書卷一

既

○治法安寧神氣一會吸氣用宜氣量

久飲至四次

○報一千九百六十二年五月廿四日

主治膀胱外ノ細胞種類ニ宜シ

臨

前書卷一

既

遠西方彙卷之十

遠西方彙卷之十一

獨乙加幾安頓著

和蘭傑婆都譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲重譯

南洋伊東亨健夫參校

第二 痘癬病

癩癩

エビレブシア羅

ルレンドシーキテ蘭

治法其原因ヲ除クヲ以テ第一義トス内臓刺衝物及ヒ腹
内壅塞ハ解釋劑並ニ下劑ニ宜シ胃中酸敗液ハ麻僵涅失

亞。牡蠣石鹼等蟲症ハ殺蟲劑ヲ用アベシ。房勞或ハ獨淫過度ニ由テ衰憊シ即病因トナル者ハ先龍腦ニ硝石ヲ伍用シ後冷水浴幾那及ヒ鍊劑ヲ與フベシ。皮疹或ハ脚汗ノ抑遏若クハ潰瘍ノ誤治ニ因テ來ル者ハ勉メテ之ヲ再發セシムルヲ要ス。痔疾壓閉ニ係ル者モ亦之ヲ復起スルヲ專一トス。病因防止スベカラザル者或ハ之ヲ治シテ其効アラザル者ハ癲癇直達治法ヲ適當トス。癲癇ヲ主治スル鑛性藥中硝銅礮千百六十四方至及ヒ硝酸銀千百七十二方ヲ最稱用。誠歇蘭度名ハ亞鉛華千百八十六方至以テ他ノ諸藥ニ優レリトシテ稱用セリ。輓近ニ至テハ皓礮百

八十方。八十八方ヲ殊稱セリ。毘私繆萬朱砂千百八十八方。福烏列爾人ノ溶液三百廿鹽酸錫千九精製洋靛千一百一等モ亦共ニ賞贊ス。○植物藥ノ中ニ就テハ艾根千百九方。纈草千百九十六方。綠橙葉千三百一方。攝實過屈里斯葉未詳千二百五方。槲寄生千二百九十六方至青黛千二十二百九十六方。寄藥トス芍藥千三百一方。實屈耽尼根至千二百三十九方。阿斯蔓陀羅華千二百四方。藺菪千二百十六方。木鼈子千二十七方。千二百八十九方。實百兒油千二百廿一方。千二百廿二方。八每ニ極メテ危險ヲ致ス。懼心ト雖亦之。

ヲ稱贊セリ。其他數品ヲ合和シテ製スル所ノ癲癩藥數方アリ。是疇昔ハ秘方トスル所ニシテ或ハ大ニ稱譽セシ者アリ。千二百廿七方至。○小兒ノ癲癩モ亦其原因ヲ除ク。先ニシテ本症ヲ後ニスベシ。生齒ノ時期脳ニ畜血アル者ハ頭上蜞鍼、兩足蒸漏法ヲ行ヒ内服ハ甘汞或ハ之ニ亞鉛華ヲ配用ス。千二百廿六方。腸胃汚物アル者ハ吐藥或ハ緩下劑胃中酸敗液ヲ生ズル者ハ制酸劑千二百廿七方ニ宜シ。且癰瘤奇藥ノ中ニ就テ最緩性ノ品ヲ撰用ス。ベン即亞鉛華。菲阿斯越幾斯。艾根千二百四十八方。千等是ナリ。更ニ峻性ノ者殊ニ猛烈ノ麻醉藥ハ決メ用フベカラバ。

○第一千百六十四方

硝銅礬

三八至六八

府利油糖

錢

右調勻為散等分六裏每服一裏日二三次

○第一千百六十五方

弗。豚。爾。田。蒲。蘭。突。

硝銅礬

二八至四八

白糖

錢

右和勻為散等分六裏每一時服一裏

附考硝銅礬ヲ散トナスキハ速ニ風化シ易キカ故ニ之

ヲ不可ナリトス

○第一千百六十六方

過。傑。栗。屈。的。鬼。

硝銅礬

八

蒸餾水適宜溶化加後味

白蒸餅心 白糖各半錢

二八

右和勻二丸為一丸衣石松粉玻璃壘密貯初晨夕服一丸漸徐加增

○第一千百六十七方

硝銅礬

半錢

蒸餾水適宜溶化加後藥

精製甘草膏

錢

甘草

半錢

右為百二十九衣桂末玻璃壘收貯每服一丸乃至八丸八

至二日二三次

主治一千百六十四方ヨリ一千百六十七方至皆癲癩及
ビ他ノ重證痙攣病ニ宜シ○硝銅礬ハ癲癩ノ一奇藥ナ

○第一千百六十八方

遠突土

半錢

硝銅礬

十六

白蒸餅心

四

硝砂加石灰精

適宣

右為九十六丸衣石松粉玻璃壘收貯日服二丸乃至四丸漸加增

主治癲癩並ニ面痛ニ宜シ

○第一千百六十九方

硝銅礬

半錢

蒸餾水一弓溶化

服之驗效

右每服五滴日三次宜漸加滴數

○第一千百七十方 (福偏驚)

硝銅礮四 蒸餾水半弓及鹿琥精二錢溶化

右和勻每一時半服二十五滴

○第一千百七十一方 (毗多)

硝銅礮一 加後味溶化

桂水 鹿琥精各二錢

右調勻每服六滴乃至八滴日三次

○主治以上三方一千百六十九方至 癲癇並ニ舞踏病ニ宜シ

○第一千百七十二方

結晶硝酸銀十二 蒸餾水一

右溶和黑玻璃壠收貯晨夕服二十滴

○主治癲癇ニ宜シ ○ 葛刺墨兒人名ノ說ニ據レバ硝酸銀ハ專其人體格強健ニシテ頭上畜血ヲ夾ミ及ヒ興奮機亢盛ニ因ル癲癇ニ効アリト云フ九トナシ每服少量持久連進スルヲ尤稱譽セリ ○ 之ヲ用ヒテ胃中灼熱嘔氣飲食不化等ノ証ロ見ハス者ハ速ニ後服ヲ停ムベシ。

○第一千百七十三方 (設魯孤羅脣)

結晶硝酸銀四 細草水十五錢溶化

右調勻早晚服十滴每六日加二滴

○主治癲癇ニ宜シ ○ 二患者極メテ虛弱壯年ニ及テ癲癇

ヲ發シ尔來連綿治セサル。此ニ數年普。孤羅屑。入上方
ヲ用ヒテ全癒シ再發スル。ナシ但漸々加へ服シテ七
八十滴ニ至リ且之ニ兼テ脊椎ニ神經軟膏複方迷迭
香油軟膏ヲ塗擦セリト云フ。

○第一千百七十四方依拂失門
結晶硝酸銀半刀 内石臼加蒸餾水少許搗碎後投後味
渴爾托末白糖各一錢半 蒸餾水適

右為九十九衣渴爾托末玻璃壘密貯早晚服二粒漸加增
〔主治〕此方啻ニ癲癇ノミナラズ他ノ神經病硝酸銀的當
スル症ハ皆稱用スヘシ。

○第一千百七十五方弗陽

硝酸銀半刀 健質安那越幾斯 甘草末各一錢

右和匀一人為一丸衣石松粉晨夕服三丸

○第一千百七十六方

結晶硝酸銀三八 細草越幾斯一錢 艾根末適

右調和二丸為一丸衣桂末早晚服三丸每三日加一丸

○第一千百七十七方羅速私的印祿別耳

結晶硝酸銀半刀 蒸餾水適宜溶化加後味

菲阿斯越幾斯一錢 細草越幾斯一錢

右為九十九衣渴爾托末玻璃壘密貯早晚服三丸

右為九十九衣渴爾托末玻璃壘密貯早晚服三丸

主治癲癇ニ宜シ○硝酸銀ノ量漸々加ヘテ一錢ニ至ル
 ベシ○薩微^サ亞羅^{アロ}獲^{アハ}地ノ疾醫葛^カ弗^フ獨^ト戾^リ噎^ル爾^ル名^ム一軍卒ニ
 十一歳ニシテ癲癇日發スル者此丸ヲ用ヒテ治セリ最
 初朝二粒晚三粒ヲ與ヘ八日毎ニ毎日二粒ヲ加増シ竟
 ニ日服十粒ニ至レリ第十四日後發作減シテニ三日間
 歇スルニ至リ其勢モ亦隨テ減退セリ此ニ於テ方中硝
 酸銀ヲ増シテ十五八ニ至リ爾後二十八ニ至リ又始メ
 ニ回リテ小量ヨリ始メ漸徐ニ加増セリ六七週ニシテ
 發作間歇スル丁六日乃至十二日吉及ビ大約四個月ヲ
 經テ全功ヲ收ム然レ氏爾後尚姑毎朝三丸毎晚四丸ヲ

連進セリ九十九中含硝酸銀十五八其他施治ノ際脊椎ニ吐酒石膏
 ヲ頻々塗擦ス初ハ吐酒石二錢半ヲ以テ家猪脂一弓ニ
 和シ後二味等分ニスト云フ

○第一千百七十八方〔歇憊〕

結晶硝酸銀半蒸餾水適宜溶解加左味

阿芙蓉末六矢鳩^{キツコ}荅^{タマ}越幾斯^ニ精製甘草膏^{一錢}

右和匀二升為一丸衣石松粉早晚服二丸漸加至五丸

○第一千百七十九方〔優列〕
 主治癲癇頑固症ニ宜シ○穢歇蘭度モ亦之ヲ稱用セリ

硝酸銀一
 大麥煎^一

右毎日飲服

主治硝酸銀ヲ服メ皮膚黒色ニ變スル者之ニ宜シ兼テ此藥液ヲ以テ皮表ヲ洗フ_一毎日二三次スペシ葛刺墨兒_人ノ說ニ據レバ硝酸銀ヲ服スル_一七錢ニ至ラザレバ皮膚黒色ニ變スル_一ナシト云_一雄遜_人硝酸銀ヲ連用スル_一三月ニ及テ皮色變スル_一ナシ是其確徵ナリ葛刺墨兒_人ニ據レハ尚且断然持重シテ六月ニ至リテ可ナリ然_レ氏六月中ニ服スル所ノ硝酸銀ノ量半弓ニ過ベカラズ其他葛刺墨兒_人ハ肌膚ノ黒色ヲ消スルニ格魯林及ニ沃胄_{ガウ}謨劑ヲ試用スレ氏効ヲ得ズト云フ

○第一千百八十方〔穢歇蘭度〕

亞鉛華

_{半弓}

甘草膏

_{適宜}

右為六十九衣石松粉早晚服二九

主治穢歇蘭度ノ試驗ニ據ルニ亞鉛華ハ癲癇ノ一奇藥

タリ大量ニ久服スレバ尤妙トス即隔日半弓ヲ加増シ病者輕快ヲ覺エルニ至リテ再服量ヲ減スペシ漸ク加ヘテ十八ヨリ二十八ニ至ルモ害アル_一ナシ此ノ如ク之ヲ連用スル_一重症ハ半年乃至一年輕症ハ毎月十四日ニ下ルベカラズ

○第一千百八十一方〔同上〕

主治癲癇ニ甚効丁ソ頑固症ハ硝銅礬半匁ヲ加フ右調勻為散分八服晨夕一服

亞鉛華六 菲阿斯越幾斯六 頸草油滴一 頸草錢半

○第一千百八十二方〔福倔篤〕

亞鉛華六 頸草新根末 牡蠣四 白糖半 加耶普的油 三

右和勻為散分十五裏每服一裏橙葉浸送下日三次

○第一千百八十三方〔遠突土〕

亞鉛華六 蝎姑石 沐藥 白糖錢一

右調勻為散等分十二服每一時一服

○第一千百八十四方〔衝突列爾〕

亞鉛華六 菲阿斯越幾斯一 橙葉 頸草各六

右調勻為散分十裏早晚服一裏

〔主治〕頑固癲癇ニ宜シ○五日毎ニ亞鉛華二匁ヲ加増シテ一刀ニ至リ後復同法ニ從テ減緩スベシ此方ヲ用ヒテ治セシ者許多ナリ

○第一千百八十五方〔別連杜〕

亞鉛華六 薤芳根三 吐根二 頸草油糖錢一

右調勻為散等分六服蠟紙包裹每一時一服

〔主治〕神經性癲癇ニ宜シ

○第一千百八十六方〔腺爾時亞兒〕

亞鉛華八 艾根九 乳糖各半

右和勻為散分十二裏每服一裏日二次

主治小兒癲癇蟲症ニ係ル者オルムエ之ニ宜シ

○第一千百八十七方〔蒲蘭蛭〕

皓礬半 紅草越幾斯五 紅草油糖半

右調和為散分六服蠟紙包裏早晚服一裏

主治癲癇ニ宜シ ○佛里僕トト篤トト人及ヒ板貧僕トト頭名ハ皓礬ノ量漸々加ヘテ一刀或八半錢ニ至リ毎日三次之ヲ與

フト云フ然ニ予ハ信セス

○第一千百八十八方〔栗屈的兒〕春蛭隣

皓礬一 阿魏錢一 紅草越幾斯適

右為三十九衣桂末玻璃墁收貯每服二丸乃至三丸日二次

三次

主治癲癇。舞踏病。百日歟等ノ如痙攣病ニ宜シ

○第一千百八十九方〔西萬失葛弗土〕格鳴

亞硝酸昆私繆篤スミツト 朱砂一 煙草葉各一 蘆薈水製越

幾斯五 白糖七

右調勻為散等分二十裏朝餐後半時一服臨卧一服

主治癲癇ニ宜シ

○第一千百九十七方 叔列呻傑爾

鹽酸錫シル 甘海鹽精一錢溶解一服朝夜一服

右和勻每服五滴日三四次

主治癲癇卒瘡及口蟲症ニ宜シ ○隔日二滴加増スヘシ
感覺過敏ノ者ハ阿芙蓉十幾二三滴ヲ加ヘテ佳ナリ

○第一千百九十一方 鼎豚爾姪蒲蘭度

精製洋靛一八六八至十二八 白糖錢

右調勻為散等分十二服每一時一服

主治癲癇ニ宜シ

○第一千百九十二方 翹耳達風

艾根末去二細半弓 根
右如法服用

主治同上 ○患者少壯ニシテ感覺機適度ノ者ハ癲癇發作前ニ切近メ此散半錢ヲ取り温麥酒ヲ以テ送下シ感覺遲鈍ノ者ハ三十五八乃至ニカヲ用コ之ヲ用ヒテ后蓐中ニ就テ時々温麥酒少許ヲ服シ以テ發汗ヲ俟ツベシ但隔日ニ之ヲ用フヘシ發汗足ラサル代ハ後服ヲ増スルト十八或ハ十五八ニ至ル尚發汗多キヲ加ヘザル者ハ第五日第三 服一錢半ヲ與フベシ ○若發作前兆ヲ見ハサム故ニ之ヲ迎テ艾根ヲ與フルト能ハザル者

ハ發作後直下ニ用テヘン更歎ヤ與ヒテ「前ハナ

○第一千百九十三方〔佛烈和列耶興ヘン〕

艾根末半
白糖弓

右調和為散每服一茶匙日四次

○第一千百九十四方〔弗豚爾姪蒲蘭度〕

艾根弓
細剉井水適宜煮四分時濾取一北

右每一時半服半盞

○第一千百九十五方〔謨和勦〕

〔主治〕右二方癲癇ニ宜シ

艾葉 橙葉各六
旗那錢

右細剉為泡劑日服

〔主治〕婦人癲癇月經閉止セル者ニ宜シ

○第一千百九十六方〔噶歌蘭度〕

纈草野生者 半錢
纈草油滴

右調勻為散分十二服日三服

○第一千百九十七方〔遏傑栗麻的兒〕

纈草半
橙葉錢 加耶普的油廿四
滴

右調和為散等分六服蠟紙包裹每服一裹日三次

○第一千百九十八方 落蓮祿人癲癇奇効散〔スペシヒキ

ラゴロイ羅

纈草一弓 橙葉綠色者 半弓 精製硝砂二錢 麻僂涅失亞

加耶普的油各二

右調和為散玻璃罐收貯每服二茶匙日三次

○第一千九十九方 [別連社]

纈草半弓

麻僂涅失亞

精製硝砂四八

加耶普的油

右調和為散玻璃罐收貯每服一茶匙日三次

[主治]

一千九十六方ヨリ一千九十九方至皆癲癇二

宜シ

○第一千二百方 媳乙人名癲癇散

纈草一弓 菖蒲根 健質安那 槱寄生各細末
硝砂半弓 加耶普的油四十滴
右調勻為散每服大茶匙日三四次

○第一千二百一方 [藏度]

橙葉細末一錢

右分十二裏每服一裏以橙葉泡劑一盞送下日三次

[主治] 癲癇獨活ニ因テ發スル症ハ唯此方又用ヒテ功ヲ
收ムルニ足ル者往々之アリ

○第一千二百二方 [選設耳]

綠橙葉六錢

纈草錢

井水適宜煮濾取六弓加橙皮舍

利別一弓

右和匀每一時服一食匙

主治癲癇。舞踏病。其他諸種ノ痙攣病有形ノ起因アルヲ
ナクメ單ニ神經系ノ觸動亢盛ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千二百三方 甲

速母蔑兒

攝實遇屈里斯葉

未詳附六八至半刃

薄荷油糖八

右調和為散分六服早晚一服

○第一千二百三方 乙

同上

亞兒尼加花

吐根各半

揮發鹿角鹽

白糖各半刀

右調和為散分六服早晚一服日二次

主治速母蔑兒名ハ甚頑固ノ癲癇ニ攝實亞屈里斯散ト
共ニ此散ヲ互用ス但其第一服ハ午前攝實亞屈里斯散
ヲ服スルノ後二時ニ方テ之ヲ用ヒ其第二服ハ晚ニ至
テ與ヘ之ニ兼テ右膊或ハ項上ニ打腰法ヲ施セリ

○第一千二百四方

醫的爾松

攝實亞屈里斯葉八八至半白糖半刀

右為散分八服早晚一服

主治本發癲癇

他病ノ傍發ニ

アラザル症

ニ宜シ○白糖ニ代ヘテ亞

刺昆亞蓮謨ヲ用フル氏ハ更ニ適當ナリトス第一服後

大ニ吐瀉ヲ發スト雖亦復鎮靜ス○他ノ癲癇奇藥効ア
ラザル症此方利アル者往々鮮シトセズ

○第一千二百五方

攝實亞屈里斯葉一錢至半 滾湯適宜浸漬濾取四弓加
遏爾托舍利別一弓

右調勻每一時服一食匙

〔主治〕上ニ同シ

○第一千二百六方〔福極篤〕

白寄生 繡草 橙葉各二 酒香一

右細剗為泡劑料○每日取其一分注滾湯三盞半少頃濾

過日服盡

○第一千二百七方〔弗。肘爾姪蒲蘭度〕

槲寄生剉者半弓 井水適宜煮四分時濾取一北

右每一時服一盞強

○第一千二百八方〔削乙弗祿矣〕

槲寄生剉半弓 荀藥一常水三北煮耗至二北後味
繡草 鈴蘭 菩提樹花噶里留的葉附末詳各半弓

右飽熟五密紐篤濾過加苟藥舍利別三弓和勻溫服日三

四盞

主治一千二百六方ヨリ一千二百八方至癲癇ニ宜シ

○第一千二百九方 弗陽

橙葉

槲寄生各半

纈草

亞鉛華三八至五八

砲銅

礬一八

半八至一八

右調和為散分八包每服一包日二三次

主治瘡病殊ニ癲癇。舞踏病ニ宜シ

○第一千二百十方

青黛細末半錢

暴爾芳香散

半

右調和分十包每服一包日二次乃至四次

○第一千二百十一方

青黛極末半弓

暴爾芳香散

半

右和勻每服一茶匙日三四次

○第一千二百十二方

青黛末水適宜捏和者半弓

暴爾芳香散

半

右調和作煉膏分四服乃至六服日服

主治一千二百十方ヨリ一千五百十二方至別兒列印名地

在病院ニ於テ癲癇及ニ他ニ瘡病ニ多ク試用スル所ナ

リ○青黛ハ原腹内神經ノ運營轉變セルヨリ發スル所

ニ癲癇ニ尤的當之ヲ用ワルノ初ハ却テ其前ヨリ更

ニ數發作シ且劇甚ナルカ如シト雖發作ハ短ナリ少頃

ニ發作ハ數ト勢ト漸々減退シ竟ニ全ク歇ム者多シ

○青黛禁忌ノ症ハ即燃衝症。腹内畜血。胃腸ノ感覺過敏

並ニ月經是ナリ其トニテ一月ニ一回

○第一千二百十番方

西突列爾

芍藥末半刀 萸亞鉛華八小至 非阿斯オス 越幾斯二八至

右調勻為散分十二裏每服一裏日三次

○主治疇昔芍藥ヲ以テ癲癇ノ奇藥トスレ此唯輕症良

効アルノミ

○第一千二百十四方

穢歇蘭度

蔓陀羅華丁幾一錢

右每服六滴日二次

○主治癲癇ニ宜シ ○癲癇獨滌ニ因テ發スル者ニ 遠突土
入殊ニ蔓陀羅華ヲ稱譽セリ

○第一千二百十五方

阿魏 續草末各二錢

亞鉛華一刀 莖菪末五錢

葛カ私篤トウ僕

謨半錢 加耶普油適宜

右二八為一丸衣桂末每服五粒日三次

○主治癲癇。舞蹈病。歇乙私的里ニ 宜シ

○第一千二百十六方

白莨菪末四錢

白糖四刀

右調和為散等分八服早晚一服

主治單純神經性癲癇ニ宜シ。○良苦ノ量漸ク増進シテ
日ニ二合、三合或ハ四合ニ至ルベシ。ニ患者アリ一人十
六歳一人十九歳皆數年間劇甚ノ癲癇ニ罹リシ者余此
方ヲ用ヒテ全治セリ。良苦ノ量始毎服四分合ノ一漸ク
加増スト。雖四分合ノ三乃至一合ニ過ザリシ。○他ノ鎮
痙藥菲阿斯蔓陀羅華。番木鼈實荳荳利斯。朱草葛爾達密
布刺典私碎米齊等。ハ唯癲癇知覺機ノ亢盛ヨリ發スル
者ニ的當ス。然ニ之ヲ服スルト多キニ過キ或ハ久キニ
過クベカラズ。人或ハ阿芙蓉ヲ稱用スレ。凡卒中ヲ起シ
易キガ故ニ廢シテ用ヒス。

○第一千二百十七方威遏脩設木鼈子屑半刀

滾湯適宜浸安暖所飽熟半時濾過取六

弓加桂舍利別六錢

右調勻每一時服一食匙

主治癲癇ニ宜シ

○第一千二百十八方同上木鼈子半刀

滾湯適宜浸濾取六弓加後味

橙皮越幾斯

健質亞那越幾斯各一錢

(幾那丁幾錢)

桂舍利別弓

右調勻每一時服一食匙

主治癲癇。頑滯間歇熱。蟲症ニ宜シ。○木鼈子ハ強健ノ人ニ在テモ亦神經系ヲ侵ス。甚シクシテ或ハ之力為ニ癡呆ヲ致ス。トアリ。

○第一千二百十九方 [弗。豚爾田。蒲蘭度]

番木鼈越幾斯

亞兒箇爾製者ニハ四ト或六ト

默栗薩水

六亞刺

昆亞蓮謨漿

半弓

右調和每一時服二食匙

主治癲癇及ヒ下肢麻痺症ニ宜シ

○第一千二百二十方 [思多傑滿]

實百兒油

一硫酸亞的兒二錢溶化加後味

舍電阿芙蓉液

半錢

右調和每服十滴日四次

主治癲癇ニ宜シ

○第一千二百二十一方 [弗。呵喧]

實百兒油

硫酸亞的兒一錢

右調和每服二十滴乃至三十滴日四次

主治癲癇。舞踏病。聖反偏。其他諸般ノ瘡病ニ用フ殊ニ其症依偏篤。僵麻質斯。慢性皮疹等ノ抑遏ニ係ル者ニ宜シ

○第一千二百二十二方 [祿佛思底尼] 人憐亞的兒

憐八加後味溶解

硫酸亞的兒半 薄荷丁幾刀

右調勻每一時半或二時取二十滴六十滴乃至八十滴砂糖和服

主治癲癇。麻痺病。黑障眼。或ハ皮疹ニ宜シ

○第一千二百二十三方 [羅遠私的印祿別耳]

燐一 實百兒油一錢溶化加後味

纈草油刀

右調勻每服二滴或三滴日三次

主治癲癇ニ宜シ○血脉系及ニ神經系ノ興奮機亢盛セル者ハ決メ燐ヲ與ルト勿レ感觸遲鈍ニシテ服小緩十

纈草油刀

右調勻每服二滴或三滴日三次

者ニ用フベシ若一部既ニ麻痺セル者ハ尤妙トス

○第一千二百二十四方 [羅遠私的印祿別耳]

龍腦半錢 白糖 亞刺昆亞謨漿各一研和加後味

醋半弓 接骨木花水六弓 麗春花舍利別弓

右調勻每一時服一食匙強

主治癲癇。精神錯亂。殊ニ其症陰具ノ刺衝過度ニ係ル者

=佳トス

○第一千二百二十五方 [羅遠私的印祿別耳]

沒藥 鵝粟拔奴謨 篤爾綿黑刺越幾斯各一錢半 錫粉

纈草弓

錢三

右調和三人為一丸。石松粉每服五粒乃至十粒。日二次。

主治癩癪獨澑。起因。セル症。宜シ。

○第一千二百二十六方 **[蒲耳霸歌]**

麻篤里私百爾刺兒未詳 一弓 蝎姑石半錢 勿搦祭亞石

鹹錢二 薄荷水 苗香水各三 過兒把舍利別半弓

右調勻每半時服一食匙。

主治癩癪及ヒ他ノ瘻癰病。宜シ。○拿拂人モ亦蒲耳霸

歇人ニ倣テ之ヲ用フ

○第一千二百二十七方 **[茱兒幾阿尼名]** 癲癪散

芍藥三 榆寄生 象牙霜屑 鷹爪屑 鹿角屑

用

赤苔未詳

白苔同

麻爾瓦利荅里植物ノ名未詳

各六錢

橙葉

枚二十

右調勻為散。每服十枚至半錢。

○第一千二百二十八方 **[拔魯腎傑兒]** 茱兒幾阿尼格爾列

屈篤人癩癪散

煅製麻僵涅失亞二錢

大黃

榆寄生

橙葉

各細末

右調勻每服一刀尖。日三次。

○第一千二百二十九方 **[昆禾辟篤名舐劑]** 硫黃華 芍藥未 紺草未各三錢 朱砂二 麝香 葛私

篤僂謨各二 砂糖舍利別宜

右為舐劑用茶匙頻々抄服

主治繆爾施留斯人癲癇ニ之ヲ稱贊セリ

○第一千二百三十方 阿魯突祿矣殿暴爾倔名人癲癇散

實屈耽尼根皮宋詳北半 山奈一弓

右調勻為散每服二刀菩提樹葉泡劑和服

主治二百年前阿魯突祿矣殿暴爾倔名人ノ家族此方ヲ以テ秘藥トシ癲癇ニ用ヒテ奇驗ヲ得タリ其服量ヲ増シテ一日四次ニ至リ然氏此ノ如ク多服セシムル氏ハ方中山奈ノ量ヲ半減ニス○小兒搐搦ニ實屈耽尼ヲ稱用セリ但之ヲ用フル氏ハ兼テ蜞鍼灌腸瀉劑ヲ與フル

ヲ須要トセリ○孤列答地名産ノ實屈耽尼社昔醫藥ニ供
デタムニクレ千吉ス一名オリガニムハ
デクタムニスト混同スルト勿レヲ以テ裏伊太里亞産
ノ物ニ優レリトス撰用スヘシ

○第一千二百三十一方 沸奴年私名實屈耽尼舐劑

實屈耽尼根夫半

薄荷昆設兒弗二弓 薄荷舍利別適

右為舐劑每一時半服一茶匙

主治繆爾設留斯人癲癇藥トシテ之ヲ稱贊セリ「私篤魯屈」名ハ單方實屈耽尼丁幾ヲ癲癇ニ賞用セリ

○第一千二百三十二方 私財兒歌ニ傑爾癲癇散至十六日

實屈耽尼根

芍藥 槩寄生各二錢半

蘆薈木 喬姑石

末各一錢 琥珀半刀 木炭錢各二

右細末調和大入服半刀乃至一刀小兒五匁乃至十八日
二三次單

○第一千二百三十三方 毖爾列兒名癲癇煉膏

幾那末六錢 扮爾扁太里亞根錢各二

芍藥舍利別宜

右作煉膏早晚服一錢持重三月乃至四月後當滿月及弦

月服前量三日

附考 扑爾答兒名搗掣病及癲癇二幾那ノ効アルヲ確定セリ即癲癇回發スル者或ハ房勞過度等ノ如キ生力衰耗ヨリ發スル者ニ好トユ越耳錄弗人ハ之ヲ加耶普

的油ト配用シ默實鳩斯人其他古ノ大學醫皆大ニ之ヲ稱贊セリ

○第一千二百三十四方 吻突人癲癇煉膏

幾那弓末一錢 細草錢各二 檸皮舍利別宜

右作煉膏朝夕服持重三月後每月當滿月取前量連服三日至四日

○第一千二百三十五方

(甲方) 讀私篤人癲癇散第一号

健質亞那 菖蒲根各半 艾根一弓 半夏 姜各三錢各六
蘓格爾需謨葉一 橙皮 加耶普的油糖 曹達錢各六

右調勻為散

主治癲癇輕症ニ宜シ大人服量一錢半ヨリ二錢至但唯月ノ變ズル時故ニ毎七日乃至八日ニ用ニ用法早旦蓐中空心ニ服シ尋テ橙葉甘草ノ泡劑ヲ温服シテ發汗ヲ俟ツベシ

(乙方)

謨私篤癲癇散第二号

玫瑰花 甘草 白糖各五錢 桂皮二錢 丁子 姜良姜 捃綿施那 益智 蘭含香 洋芥子各一錢

右調勻為散

主治癲癇劇症ニ宜シ

(丙方)

謨私篤癲癇散第三号

精製洋靛八分半 父根錢半 葛カ私篤僂謨トシマス 第二号癲癇

散一弓

右調勻為散分十二包

主治癲癇劇症ニ宜シ每常弦月及ビ滿月ノ日朝卯牌及ヒ晩酉牌ニ方テ一包ヲ取り黑櫻實水ヲ以テ送下ニ之ヲ用フル代ハ患者病室ヲ出ズ總テ風氣ヲ釀スノ食餌。甘乳汁。酒精類ヲ忌ムベシ此散ヲ服スルノ前二日間必緩鴻セシムルニ宜シ○謨私篤氏ハ越列幾的兒及ヒ瓦爾華尼ヲ以テ癲癇ノ奇方ト為シ而メ此散ヲ用ヒテ佐藥トス且此ヲ施ス左法ノ如シ患者ノ性感覺敏捷ニシ

テ且頭腦畜血アル代ハ先頭上ニ放蜞シ清涼食餌緩瀉
藥ヲ投シ次ニ越列幾的尓ヲ施スノ毎日四分時半時。乃
至一時而ソ項窩及ヒ四肢ヨリ其火氣ヲ導引シ爾後圓
版四十枚乃至八十枚ヲ重起セル福兒答柱瓦爾華尼
瓦爾華尼ノ名
安置ノ名以テ適宜ニ瓦爾華尼ヲ施シ又二三日ノ後再越列幾的
児ヲ行フ但漸次ニ其衝動力ヲ加増シ以テ猛烈ナラシ
ム此ヲ施メ患者觸動機亢進スレバ曼陀羅子丁幾五滴
乃至十五滴ヲ與ルノ日ニ二三次頭上畜血ヲ見ハス者
ハ再蜞鍼ヲ施シ芥子脚湯ヲ命ス此ノ如ク之ヲ持重ス
ルトハ週ヨリ十週ニ至ル○癲癇觸動機亢盛セル者ハ

謹慎ヲ加ヘテ衝動度ニ過ルノ勿レ

○第一千二百三十六方

甘汞 亞鉛華各二八
至二八 麻僵涅失亞八十八 白糖錢一

右調勻為散等分六服每服一服日二次三次乃至四次

主治小兒生齒ノ期ニ發スル癲癇様ノ症ニ宜シ

○第一千二百三十七方穀歌蘭度

麻僵涅失亞 蜈蚣石 鹿角屑 榧寄生 繡草各一
錢右調和為散日服一二刀尖

主治痙攣症發作ノ時神經系ヲ鎮靜スルニ宜シ又小兒

癲癇ニ良トス

○第一千二百三十八方 [福懶列爾]

菲阿斯越幾斯 亞鉛華八 各一 麻僵涅失亞八三 乳糖

半

右調勻為散分六服每一時半一服

[主治] 小兒癲癇及ヒ他ノ痙攣諸症ニ宜シ 第一千百八十
シ 方照スベ

芍藥 蟑姑石各一 亞鉛華六 白糖錢一

右調勻為散等分十二服每一時一服

[主治] 嬰兒ノ搐搦症及ヒ癲癇ニ宜シ

○第一千二百三十九方 [遠突土]

○第一千二百四十分 [謨私寫]

亞鉛華八

吐根末一

艾根末一

甘草末一

茴香油

糖各半

右調勻為散等分十二服每半時取半服乃至一服冷水送

下

[主治] 謨私寫氏ニ據レバ此方嬰兒癲癇ノ發作ヲ治スル
ノ經驗方タリ

○第一千二百四十一方 [越魯涅屬]

鹽酸銀一八

健質安那二刀至

右調勻為散等分八服日三服

主治 小兒癲癇ニ宜シ

○第一千二百四十二方 [格耳列優的兒]

亞爾箇兒製艾根越幾斯人

亞刺毘亞趨謨刀

白糖

錢三 甘扁桃乳三

右調和每四分時服一茶匙

主治 小兒癲癇ニ宜シ

備魯滿人

名姞的爾滿同

烏鴉薛爾同

醫攝耳篤同等モ亦皆小兒癲癇ニ艾根ヲ稱用セリ】備魯
滿氏乳兒ニ與ルニ第一包ハ艾根半升半時ノ後第二包
ハ一升又半時ヲ經テ第三包ヲ末服トシテニ升トスニ
歲以上ノ兒ハ初ヨリ半時毎ニ一升乃至二升ヲ服セシ

ム但病症ノ劇易ニ準シ大抵三服ニシテ分利ヲ得ルニ
足ルトス然ニ或ハ感觸亢ブリテ將ニ搐搦ヲ發セント
スル者ハ尚且一時毎ニ艾根ヲ加用セザルベカラズ

○第一千二百四十三方 [遠突土]

麝香六 磷砂華四 白糖錢三
加密列水一 、 研和加後味

右調勻每半時服一茶匙臨用宜振盪

主治 小兒痙攣諸症及ヒ癲癇ニ宜シ

○第一千二百四十四方 [福偏篤]

麝香二八至 加苗香水六錢麗春花舍利別一 、 徐々

搗和再加後藥

鹿瓈精一
刀

右調勻每一時服一茶匙

主治幼兒ノ痙攣症ニ宜シ

舞蹈病コレア。スチ。奔キ羅シ
ト。奔士スダンス蘭

此症醫藥ノ扶助ヲ須タスシテ暫久不定癒エル者往々之アリ
若自然ニ治セザル者ハ癲癇ニ處スル所ノ方法亦皆施用
スベシ然ニ頗謹慎ヲ加ヘテ之ヲ療シ所謂猛藥ヘロイカヲ用
フルト早ニ失スルト勿レ醫氏最着眼スベキ者ハ原因ニ
在リ蟲症ニ起因スル者屢之アリ故ニ殺蟲劑及ヒ下劑ヲ

用コ奇藥ノ中ニ就テ亞鉛華劑千二百四十方至一千二百四十九方及
劑千百六十四方至一千百七十一方至
劑千百七十方至一千八方及
劑千二百五十一方至一千二百五十二方至
劑千二百五十一方至一千二百五十二方及
劑千二百五十一方至一千二百五十二方及
及ヒ艾根千百九十二方至一千五百三十六方及
ノ神經藥千二百五十四方至一千二百六十二方及
此症麻醉藥ハ廢シテ用ヒス〇外用ハ屢脊椎ニ擦藥千二百五十四方及
方ト施ストアリ即吐酒石軟膏發疱膏等ニ宜シ灌水冷
水浸法。硫黃浴ハ卓越ノ効アリ但硫黃浴ノ法每次硫酸剝
篤亞斯鹽霸王四弓ヲ用ヒ半時間浴スルヲ度トス毎週五次
之ヲ行ヒ大抵十次乃至十二次ニシテ治ス〇私室キーパー兒人名

ハ尋常症コレア。ト脊椎ニ係ル症コレア。ラトヲ區別セリ
其脊椎ニ係レル症ノ其因項ノ第七椎腫起シテ或ハ痛ミ
之ガ為ニ神經根壓迫セラル、ニ由テ神經ニ焮衝状ヲ發
スルニアリト亾而ノ私室アーヴィング兒氏之ヲ療スルノ法其患フ
ル所ノ項椎ニ蜞鍼ヲ施シ甘汞ヲ内用シ脊椎ヲ沿ヘテ水
銀膏ヲ擦シ其他脊椎ノ兩側ニ打膿ヲ稱用シ此ニ由テ骨
ノ腫起速ニ消散スト云フ

○第一千二百四十五方弗。勝爾。田蒲蘭度
亞鉛華六 菲阿斯オーストロ越幾斯ニ 白糖錢一
右調和等分六服每一時一服

〔主治〕舞蹈病其他痙攣病ニ宜シ○亞鉛華ノ量更ニ増加
シテ可ナリ○威歇蘭度氏ハ十六匁至加增シ日ニ三服
シテ偉効ヲ得タリト云フ

○第一千二百四十六方預結

鹽酸亞鉛附一 加甘海鹽精二錢溶解

右調勻先每二時服五滴後十滴

〔主治〕舞踏病癲癇面痛ニ慎テ用フベシ

○第一千二百四十七方

精酸鉢アーヴィング亞鉛四 煎餾水二盃溶解

右分服四次一日盡之

遠古方解

舞路病

三陰

廣胸

堂

○第一千二百四十八方

羅仙私室

歌爾懿祿私

青酸銕亞鉛

附半刀

纈草

末

一

纈草越幾斯適

右調勻為丸每粒二瓜衣桂末早晚服一丸

○第一千二百四十九方

福僵篤

青酸銕亞鉛

附半刀

麻僵涅失亞

二刀

丁寧搗和加後藥

纈草油

二滴加密列舍

纈草

末

十

右調勻三八為一丸衣麻僵涅失亞每服六丸日三次漸加

增

○主治第一千二百四十七方ヨリ一千二百四十九方至舞

踏病ニ宜シ

○第一千二百五十方

噎魯利阿篤損

王格碌

屈私末

兒秩斯

半刀

至

右分為十二服每二時乃至三時一服

○主治舞踏病ニ宜シ○噎魯利阿篤損此方日ニ半弓至服セシム但之ヲ服スルノ前先瀉藥ヲ與ニ常ニ之ヲ用ヒテ平治スト雖六週八週乃至十二週ヲ經ルノ後ニアラザレハ効ヲ見ズト云ニ蓋舞踏病六週乃至十二週ヲ過グル氏ハ醫治ヲ須タザルキ亦癒エル者アリヤ

○第一千二百五十一方

謨私篤

開達格碌

屈私末

兒秩斯

各

二

芳香散

八

硫酸規尼捏

艾根末一

普靖各二

廣脾堂

右調和為散分十二服日三服

主治一少女舞踏病ヲ患フル丁七年此ヲ與ヘテ佳効ヲ得タリ之ニ兼テ浴湯ニ硫酸ヲ加ヘテ浴セシムルニ宜シ

○第一千二百五十二方

橙葉

大黃

錢各一

纈草

純精酒石

錢各三

右調和内ムカシ葛カク時刺タラ器名晨夕服半茶匙強

○第一千二百五十三方弗栗私

主治舞踏病癲癇及ヒ他ノ神經病ニ宜シ

艾根末一

右隔晚取一茶匙強溫麥酒和服

主治十九歳ニシテ舞踏病ヲ患フル者此ヲ與ヘテ良効

フ奏セリ

○第一千二百五十四方欲煜僵

遏屈答刺設謨沙根サ末一

右每服一茶匙日三次

○第一千二百五十五方密葛栗思

葛爾達密布刺典私花碎米齊ノ一種

末一

刀至一錢

白糖一

右調匀為散分八服早晚一服

葛爾達密布刺典私花前ニ出半弓 滾湯適宜浸漬濾過取

古弓八弓加後藥

橙皮舍利別弓

右調匀每一時服一食匙

主治右二方千二百五十五方 舞踏病及ヒ他ノ痙攣病ニ
宜シ此方ハ達列名始テ 鎮痙方トシ稱譽セシ所ニシテ
殊ニ拔結耳人ハ歇倚私的里性ノ痙攣症ニ稱用セリ 一
少年十四歳ニシテ舞踏病ニ罹ル者密葛栗ムス人之ヲ用

フルト三時毎ニ一錢ニ至リ六週ヲ出ズシテ治セリト
云フ○葛爾達密布刺典私ハ特ニ發汗ノ効アリ尚且恐
ラクハ殺蟲ノ能アラン○今世之ヲ棄テ用ヒズ恐ラク
ハ穏當ナラジ

○第一千二百五十七方弗豚爾田蒲蘭度

葡萄草葉 亞兒尼加花各二錢 滾湯適宜浸漬四分時

濾取一比加白糖二弓

右調匀每一時服半小盞

主治虛性舞踏病ニ宜シ

○第一千二百五十八方謨私篤

蔴麻草葉各等

旃那 一錢至三錢

橙葉 繡草 蘭蕪草葉

各半弓

右細剉分三裹每日取少許泡出用

主治舞蹈病ニ宜シ ○ 三女子アリ 一ハ十歳一ハ十四歳
一ハ二十六歳其性皆感覺敏捷ニ三月來舞蹈病ニ罹リ
猛烈ノ鎮痙攣及ヒ強壯劑ヲ投シテ寸効ナシ謨私篤氏
之ニ命メ餐食ヲ減少セシメ八日毎ニ吐根吐酒石ノ吐
方ヲ與ヘ上ノ泡劑ヲ用ヒテ微瀉セシメ以テ暫時ニ全
功ヲ收メリト云フ

○第一千二百五十九方 据縵

阿魏 五刀 番木鼈越幾斯 一刃

右調匀為丸每粒一匁衣石松粉早晚服五丸乃至六丸
主治舞蹈病頑滯セル症及ヒ諸般ノ神經病其因脊髓ニ
在ル者之ニ宜シ

○第一千二百六十方 羣的通

阿魏 纈草越幾斯各二錢

通

葛糸篤僂謨 五十

通

芒若越幾斯 六人

通

亞鉛華 一刃

通

右調匀為丸每粒二匁衣石松粉每服五丸日三次

主治頑固舞蹈病ニ宜シ 附其藥ド酒頭メ敷頭セリイ云

○第一千二百六十一方 拔魯寺房

通

龍腦 麝香各四白砂一匁白糖一匁

右調勻為散分四包每二時半服一包

主治拔魯寺戾氏每常舞蹈病ニ之ヲ用ヒテ偉効ヲ得タ
少但晚ニ方リテ阿魏ト阿芙蓉ヲ配伍メ灌腸セリト云

ノ福氣於此也

○第一千二百六十二方 栗屈的兒

實百兒油一忽弗滿液三錢溶化

右玻璃壘收貯黑紙被覆每服二十滴乃至三十滴日四次

主治瘧病殊ニ舞蹈病。癲癇及ヒ聖父僕ニ宜シ

○第一千二百六十三方 傅外泄篤

吐酒石六菩提樹花浸液六弓溶解加後味

實亞格地溫一弓半

右調和每一時服一食匙

主治同上

○第一千二百六十四方 羅仙私的印

丁子油 肉豆蔻拔爾撒謨附各鐵 杜松子精四弓

右調勻供擦藥

主治舞蹈病ハ脊椎ニ沿ヘテ之ヲ擦シ下利ハ肚腹ニ塗

草ルベシ 草ルベシ 草ルベシ 草ルベシ 草ルベシ

聖父僕カタレフシア羅ラン

此症モ亦舞蹈病ト同ク其治期限一定セズ醫治ヲ須タズソ瘥ル者

間之アリ故ニ多般ノ方法ヲ費ヤシテ徒ニ患者ヲ勞シ害ヲ招クヲ勿レ唯緩性神經藥ヲ施スベシ治法先病原ヲ探索シテ之ヲ防止シ既ニ之ヲ除クモ其症猶荏苒退カザルキハ神經ノ運營ヲ變革セシムルヲ治療ノ第二義トス纈草。阿魏。小量吐根。葛草。麝香。亞鉛華。鍊劑等約メ之ヲ言ヘバ癲癩。舞蹈病ノ條ニ列載セル方法悉皆此症ニ相當ニ聖反倔ハ唯歇倚私的里ノ傍証タル一社々之アリ此症治法歇倚私的里ト一般外用法ハ越列幾の爾及ヒ麻倔涅篤良効アリ然ニ先微溫浴湯ヲ施シ其後浴水法殊ニ海水浴ヲ行フヲ最稱贊ス

○第一千二百六十五方叔密篤滿

亞鉛華 麝香各二 鍊粉六 桂皮半 紛草一

右調和為散分八服每一時半一服

主治聖反倔ニ宜シ一少女聖反倔ニ罹リ日ニ四發乃至六發セル者叔密篤滿氏此方ヲ與ヘテ治セリ

遠西方彙

卷十二

聖及僊

卷五

廣脾堂

遠西方彙卷之十二

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑。婪婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲 重譯

南洋伊東 健夫 參校

口噤 千リスミス羅モ

卒瘞 テタニス羅レフトステイ
蘭所謂破傷風

倭麻質 斯性卒瘞ハ刺絡。脊椎吸角法。水銀膏蒸氣浴。刺心斯
高私蠻屈斯ノ微溫浴ヲ施シ内服ハ阿芙蓉。纈草 千二百六
十六方千

トス蓋泉黙質スナカサクシテ人名ノ治法千二百八十二方ニ大ニ稱贊セリ
 此症經過ノ際能ク意ヲ注キテ適宜ニ瀉下スルヲ要ス○
 外用法ノ中ニ就テ灌水最益アリ其法先病者ヲ温水中ニ
 坐セシメテ高所ヨリ不斷水ヲ瀉シ之ヲ頭上肩胛及ヒ脊
 椎ニ灌グラ要トス痙攣頻發スル時ハ浴湯モ亦可ナリト
 雖大抵上ノ療法ニ由テ危篤ヲ救フ者多シ全身浴湯卓越
 ノ効アリ殊ニ剥篤亞斯若クハ刺必斯カウス高私蟹屈斯カウスヲ加フ
 蓉丁幾龍腦等ヲ加ヘ擦スルハ治療ノ一良助タリ遍體ニ
 溫油ヲ塗ルモ亦稱用ス但急ラズ刺戟藥ノ灌腸或ハ其症

方等ニ宜シ○創傷ニ因ル者ハ創口ヲ破開シテ其内ニ在
 ル所ノ贅物ヲ除去シ。菲阿斯及ヒ阿芙蓉ノ琶布ヲ施シ。緩
 和鎮痛軟膏ヲ貼メ繃帶シ。創所ノ上部ニ循レル神經ヲ截
 リ。或ハ創傷ヲ受タル一肢ヲ截断スルヲ至極ノ一法トス
 神經系ノ運營ヲ轉變鎮定スルハ刺絡。阿芙蓉或ハ單味千
 百七十方或ハ麝香ト配用ス千二百七十三方或ハ甘汞千二
 二方百七十方或ハ甘汞百七十方
 吐酒石。格碌屈私末兒秩斯千二百七十七方福烏列爾ル入研石
 溶液千二百七十八方格爾失屈謨千二百七十九方芫菁丁幾千二百八
 方千二百八十一方
 的列並油或ハ灌腸等ヲ稱贊ス就中阿芙蓉ヲ以テ最

ノ要スル所ニ従ヒ纈草阿魏ニ阿芙蓉丁幾ヲ加ヘタル鎮
痙灌腸ヲ施スニ宜シ英吉利及ヒ米里幹ノ醫ハ煙草灌腸
千二百八方ヲ甚賞譽セリ又阿芙蓉越幾斯溶液ヲ以テ脉管
十四方ニ射注スルヲ試用セシ者アリ千二百八十六方拂郎屈人ハ烙鏡
ヲ用ヒテ効ヲ得タリ脊椎爻灸モ亦稱贊セリ嬰兒ノ口噤
及ヒ卒瘧ハ吐劑浴湯及ヒ灌腸ヲ以テ專一トス鎮痙劑ハ
亞鉛華千二百十七方麝香千二百八十八方至艾根千二百九十二方至等
ヲ最好トス阿芙蓉ノ如キハ小兒ニ在テ全ク禁忌スト雖
獨此危險症ニ在テハ之ヲ許シ用フルモ亦可ナラン栗結
人嘗テ阿芙蓉ヲ以テ一児ヲ治セリ即其症極度ナル氏ハ

阿芙蓉丁幾每服一滴半時毎ニ與ヘ爾後諸見証減ズルニ
従ヒ一時乃至一時半ニ與ヘテ其症全ク退クニ至レリ
此ノ如ク之ヲ施シテ阿芙蓉丁幾總量半錢ヲ盡セリト云
コ其他慎嚴ノ職歇蘭度モ亦阿芙蓉液六滴ヲ以テ二時毎
ニ灌腸シ尚且小心シテ内服セシムルヲ佳トス但舍電阿
芙蓉液ノ如キ最緩劑ヲ撰用スベシ此症黃疸ヲ夾雜スル
者多シ故ニ注意メ大便ヲ促スヲ要不但甘汞ニ大黃麻僵
涅失亞ヲ和用スルニ宜シ並ニ蒸氣浴モ亦試用スベシ賜
葛歇爾人モ亦之ヲ用ヒテ一小兒ヲ救ヘリト云コ其他諸
般ノ塗擦方千二百九十四方至ヲ施スベシ

○第一千二百六十六方 [施倚迷謂爾]

纈草丁幾

葛私篤僂謨丁幾

鹿琥液

阿芙蓉

丁幾

刃

右調和每一時乃至一時半取十五滴至二十五滴加密列

泡劑和服

○第一千二百六十七方

纈草

野生者半弓

熟湯適宜浸漬瀝取四弓加後味

鹿琥精

錢二弓

橙花舍利別

半弓

右調勻每一時服一食匙強

○第一千二百六十八方

吐酒石

二八

纈草浸四弓溶化加後味

橙皮舍利別

半弓

右調勻每一時服一食匙

○第一千二百六十九方

吐酒石

四八至六八

蒸餾水四弓溶解

右和勻每半時或一時服一食匙

主治上方皆第一千二百六十六方僂麻質斯性卒瘍二宜

シ○英吉利ノ衆醫ハ殊ニ吐酒石ノ奇効ヲ得タリ」弗。姫耳的爾名モ亦其偉効ヲ稱セリ

○第一千二百七十方

龍腦五合至十八 亞刺罌亞謹謨漿半勺研和加後味

橙花水 橙花舍利別各一勺

右調勻每一時服一茶匙

○第一千二百七十一方

龍腦半合。一合至二合 精製阿芙蓉半合至一合 白糖半刀

右合勻為散分八裏隨其症每一時乃至二時服一裏

○主治右二方ハ龍腦適當ノ諸病或ハ僂麻質斯性卒瘡

効アリ

○第一千二百七十二方

精製阿芙蓉二合 白糖半刀

右調勻為散分八服每半時或一時一服

○主治卒瘡=宜シ○律私篤入名ノ言ニ據レバ始メ阿芙蓉二

合ヲ與ヘ半時毎ニ四分合ヲ増シテ瘡撓鎮定シ或ハ昏冒ヲ發スルニ至ル但其功ヲ收ルハ大抵十合十五合餘

ニシテ足レリ昏冒ヲ發スル者ハ通例猛烈ノ哥喜酒亞

的兒劑ヲ以テ鎮靖シ復更ニ阿芙蓉ヲ與ヘ毎服二合ニ

至ルベシ○此ニ用フルハ單方阿芙蓉丁幾ヲ最適當ト

ス律私篤氏二十滴ヨリ始メテ半時毎ニ五滴乃至十滴

ヲ加増シ昏冒証見ハルハニ至ル○阿芙蓉ニ三服ニシ

テ効ヲ奏セザル氏ハ之ヲ灌腸シ或ハ謨爾比涅ノ賢姪

児麻質斯法ヲ施スベシ其法倚過忽弗滿人ノ說ニ從ヘ
バ表皮ヲ剥グニ熱湯ヲ用ヒ或ハ熱湯ニ醮シタル刀ヲ
用ヒ以テ時々延クノナカラシム此ノ如ク之ヲ剥脱ノ
後脊椎兩側ニ謨爾比捏ヲ敷クナリ○彌錄都涅児名ハ
純粹神經性ノ卒瘲ニ殊ニ阿芙蓉ヲ賞賛セリ遠突土人
ハ老人ノ卒瘲足指ノ寒壞疽ヨリ發スル者ニ稱用セリ
○第一千二百七十三方〔醫脚蘭風〕

麝香ムクセン 阿芙蓉アフモク 白糖ホワイトスuga

右調勻為散分八服每半時一服

主治口噤並ニ卒瘲ニ宜シ

○第一千二百七十四方〔福僵篤〕

精製阿芙蓉アフモク

二八至四八

上好麝香ムクセン

半八至十五八

麻僵涅失亞

乳糖ラクサン

四八

刃

右調勻為散分六裏每一時乃至二時取一裏溫茶送下

主治卒瘲ニ宜シ

○第一千二百七十五方

甘汞ガム

二八。三八至四八

精製阿芙蓉アフモク

半八至一八

白糖ホワイトスuga

半八

右調和為散分八服每半時若一時一服

主治同上甘汞ノ服量ハ之ヲ用ヒテ速ニ流涎ヲ發スル
ヲ度トス弗能耳的爾人之ヲ以テ此症ノ主藥トセリ又

牙關及ヒ頸圍ニ水銀膏ヲ塗ラシノ兼テ全體浴湯ヲ施ス○又按スルニ汞劑ハ極衝性卒瘡ニ殊ニ撰用スベシ

○第一千二百七十六方〔顯爾列斯〕

青酸十滴 再餾燒酒 桂水各六十滴

右内玻璃壇黑紙固封貯毎服五滴乃至八滴餘日三次

主治卒瘡〔人外非散篤〕名的列青酸ヲ稱用ス一症阿芙蓉効ヲ得サル者ニ的等卒瘡ニ青酸ヲ稱用ス一症阿芙蓉効ヲ得サル者ニ的列非散篤氏青酸二滴ヨリ十二滴ヲ與ヘテ本病殆平治シ後復意外ノ他病ヲ發メ竟ニ斃ルト雖毎服諸証較著ニ緩解シ大ニ佳効ヲ得タリト云〕結列印氏モ亦阿芙蓉

蓉ノ効ナキ者ニ青酸ヲ用ヒテ其死ヲ救フヲ得ザレ此ニ由テ患苦ヲ和解セリト云「救人雖不能勿為其害トハ疾醫ノ旨ナリ」其他上方ハ青酸ヲ施スベキ諸病ニ皆稱用スベシ十滴中青酸一滴ヲ含畜ス大人中等ノ服量六滴乃至八滴。少年十三歳ヨリ十四歳至四滴乃至六滴。兒童三歳ヨリ七歳至二滴乃至三滴トス大人服量多キ者モ十滴乃至十二滴ニ上ルベカラズ

○第一千二百七十七方〔噎利附篤損〕

格碌屈私赤兒株斯半アリヤカミハニ

右調勾稀淡羹汁一盞送下量其子與千利也加莫

主治卒瘡直視ニ宜シ此服量甚奇異ナリトス唯英醫ノ

處セル方ニシテ獨英人ノ胃之ヲ受クルニ堪ルノニ然
氏壹利阿篤^{オトツジ}損名ハ格砾屈私末兒秩斯半弓至一時乃至
一時半毎ニ與ヘテ二人ヲ治セリト云フ

○第一千二百七十八方〔顯。密耳列爾〕

福烏列爾砒石溶液錢

右每半時取十滴阿芙蓉丁藥十滴及火酒一食匙和服
主治此方浴湯下併用シテ卒瘡及傷ニ因ル者四人ヲ治
セリ○福烏列爾砒石溶_{三百廿六方}下ヲ参照スベシ

○第一千二百七十九方〔越。傑。和密篤〕

格爾失屈謨子丁藥

右每四分時服辛士滴乃至四十滴

主治卒瘡ニ宜シ先半錢至ヲ與ヘ後加增メ嘔吐若クハ
瀉下ヲ發スルニ至ル私密篤氏先瀉利灌腸法ヲ以テ腸
ヲ掃除シ尋テ脊椎ニ沿フテ放血シ醇厚硝砂溶液ヲ棉
布ニ蘸メ項窩及ヒ脊椎ニ敷キ其後民姪^{ミニ}列里精ニ謨爾
比捏^{チネ}ヲ和シ與ス此療法ニ由テ四人ノ中三人ヲ治セリ
○第一千二百八十分一者學^{アラタ}也

先著丁藥

右每一時八滴乃至十滴沙列布煎若苦扁桃乳點服

○第一千二百八十一方

芫菁丁幾半 過爾把舍利別一弓

右調勻每一時半服一茶匙乃至二茶匙

主治卒瘡ニ宜シ殊ニ創傷ニ因ル症僂麻質斯熱ヲ夾ム
者ニ用フベシ卒瘡他藥ノ効ナキ者芫菁丁幾半時每ニ
用ヒ以テ半錢至ヲ以テ治セシト確實ナリ或ハ之ヲ用
ヲ服盡セシムヒテ効ナキ者アリ○佛祿溫名葛爾實涅兒同ハ一時每
二十滴乃至二十滴ヲ用フ○然モ之ヲ試驗スルニ概ノ
阿芙蓉ノ効芫菁ニ優レリ○發胞膏ハ効アルトナシ

○第一千二百八十二方 泉黜質人治破傷風方

精製剥篤亞斯一錢至 蒸餾水四弓溶化加後味

罂粟殼舍利別錢

右調勻每一時服二食匙

主治原卒瘡刃傷ニ因ル症ニ宜シト雖他ノ卒瘡症モ亦
之ヲ用ヒテ効アリ之ニ兼テ晨夕阿芙蓉一氏ヲ與フベ
シ十二時乃至十八時ヲ經テ証狀減ゼザル氏ハ剥篤亞
斯ノ量ヲ半倍ス或ハ半時毎ニ上ノ溶液ニ匙ヲ取りテ
阿芙蓉一氏半ヨリニ氏至和シ日ニ三服スルモ可ナリ
或ハ其症ニ準メ右二品ヲ更ニ加増スベシ但瘡擊減ズ
レハ隨テ服量ヲ減殺スベシ兼テ刺必斯高私蟄屈斯乾
者

二三弓ヲ加ヘテ浴湯ヲ命スルト日ニ十二次スベシ。若浴湯ヲ能セザル者ハ刺必斯高私蟹屈斯半錢ノ溶液ヲ
弗刺涇兒ニ熊メ肚腹及ヒ他部ヲ洗ヒ且之ヲ以テ摩津
スルヲ要ス。然モ浴湯ノ効ヲ優レリトス。阿芙蓉ヲ用ヒ
テ便秘スル者ハ石鹼灌腸法ニ宜シ。若頑固ノ秘結ハ剥
篤亞斯一錢乃至二錢ヲ加ス。暴々同美者十日而通。

○第一千二百八十三方 (枲黒質) 剥篤亞斯液 アロマラ

精製剥篤亞斯錢 アロマラ 加密列水及桂水各三弓溶解加後
味

白瞿粟舍利別一

右調和毎四分時乃至半時服一食匙。
主治卒瘡ニ宜シ。此ト更換メ四分時或ハ半時毎ニ阿芙蓉丁幾五滴乃至十滴ヲ用フ。但其症ニ準シ阿芙蓉ノ量ヲ倍加。剥篤亞斯浴及ヒ石鹼灌腸法ヲモ亦併用スベシ。

○第一千二百八十四方

煙草葉 半刀至 滾湯適宜浸漬濾取ハ弓加後味

亞麻油 半

右供灌腸

主治卒瘡ニ宜シ。○煙草ハ卒瘡ヲ治スルノ一品タリ。瘡

摩ノ劇勢ニ從フテ屢之ヲ灌腸スペシ但之ヲ施ス氏ハ
阿芙蓉及ヒ灌水法ヲ停テ用フベカラズ○西印度ニ於
テハ煙草ハ俗間ノ卒症藥タリ○又灌腸ト俱ニ煙草葉
ヲ煮熟メ琶布ニ作リテ下頷頸圍及胸上ニ貼ス或ハ煙
草葉煎乾葉四升水四升ヲ加ヘテ浴スルモ亦可ナリ
草葉煎以テ煮ル十半時ヲ加ヘテ浴スルモ亦可ナリ

○第一千二百八十五方

的列並油一弓半至二弓

阿列機油

亞刺毘

亞蓮

謨漿

各半弓

右調匀供灌腸

主治同上○其盆人之ヲ灌腸スル「日ニ三次ニ」ノ卒症
諸藥不効ノ一症ヲ治セリ○德暮私名及ヒヒヨト鴟篤巾損ツヅク同

ハ一時乃至一時半每ニ的列並油半弓ヲ内服セシムテ
功ヲ得タリト云フ

○第一千二百八十六方百耳失老連德

阿芙蓉越幾斯カ 蒸餾水六弓溶化

右調匀注入脈管

主治上ノニ氏之ヲ卒症ニ施ノ効ヲ得タリ此法治ト不
治上ノ比例五ト八トニ居ルト云曰其卒効ヲ得ル者五
人ニ居ルヲ言フ蓋卒症ハ原危篤症ナリ而ノ五ト八ト
治不治未相半セズト雖其功用果ノ此ノ如ク十キハト
謂鴻益アリト又ニ氏曼陀羅華越幾斯二十四氏ヲ水半弓
干溶化セル者或ハ曼陀羅華濃煎ヲ射注シ偉効ヲ得タ

リト云フ○吾輩ノ如キハ甚此試験ヲ信ゼス實ニ輕忽
二人命ヲ覩弄スル者ト謂ハザルベケンヤ格印塙徳名
嘗テ一法ヲ試用ノ大害ヲ致ストアリ吾輩唯此ヲ想フ
天之ヲ懼ル、イニ其法一婦人歇倚私的里性卒瘻ニ罹
ル阿芙蓉一刀ヲ以テ水一升ニ溶シ五密扭篤毎ニ一錢
半ヲ取リテ大血管ニ射注スルト五四ニ至ル之ヲ行フ
テ二三瞬間ノ后其婦即斃ルト云フ

○第一千二百八十七方

城歇蘭度

亞鉛華八 麝香東方産 四八 舍電阿芙蓉液六 白糖錢二

右調勻為散等分八服每半時一服

○第一千二百八十八方

同上

鹿琥精四十滴 苗香水 大黃舍利別各一 蟑姑石末
刃菲阿斯越幾斯ニ 麝香東方產 四八 雜腹蘭三好木

右調勻每十時服一茶匙

○第一千二百八十九方

惡揭爾滿

纈草丁幾白葡萄製半錢 阿芙蓉一 麝香五八加砂糖一
綿荅幾里私布水二 皆散ノ四兩

右調勻每半時服五滴乃至六滴

主治右三方嬰兒口噤及卒瘻ニ宜シ

○第一千二百九十分

叔腫滿

大黃水製丁幾 漢氏麝香密幾私去爾製法未詳 各半弓 繡
草浸半 方 滿那舍利別錢

右調勻每一時服一茶匙

主治嬰兒口噤及ヒ卒痙ニ宜シ叔泥姪爾人名此方ヲ用ヒ兼テ加密列浸ニ阿魏六匕ヲ加ヘテ灌腸シ居多ノ卒痙ヲ緩解シ或ハ全治セリト云フ

○第一千二百九十一方 叔泥姪爾人名龍涎香加麝香丁幾 龍涎香錢 硫酸亞的兒半 浸漬六時屢攪和加後味
麝香者東方産 一錢 忽弗滿液錢

右調勻

主治痙攣及ヒ他ノ神經病ニ宜シ嬰兒口噤及ヒ卒痙ニハ十密扭篤每ニ一滴ヲ與フ

○第一千二百九十二方 叔泥姪爾

龍涎香加麝香丁幾前方 二刀 橙花水半 實亞格地溫

右調勻每四分時服一食匙

主治二兒口噤及ヒ卒痙ニ罹ル者アリ叔泥姪爾氏此密幾私去爾ヲ連進スルヲ二十四時ニソ皆救フヲ得タリ

○第一千二百九十三方 備魯滿

艾根ホウジ

麻僵涅失亞マクニセイア

廣胖堂カントウドウ

右調勻為散分八服每半時或一時一服

主治嬰兒口噤及ヒ卒瘻ニ宜シ○備魯滿氏上方ニ接骨木花ノ浴湯ヲ兼用メ二人ヲ治セリ

○第一千二百九十四方

兼阿斯油オース 龍腦油ラモン 各半 阿芙蓉丁幾ドウキ 一錢至

右調和每一時塗擦下頸脊椎及肚腹

主治一千二百八十七方ヨリ一千二百九十四方至嬰兒

口噤及ヒ卒瘻ニ宜シ

○第一千二百九十五方

遠突屑爾

嬰兒口噤及ヒ卒瘻ニ

菲阿斯油オース 半 舍電阿芙蓉液 硼砂加石灰精カツカツ 各半

龍腦ラモン 一

刃

右調勻微溫塗擦脊頸及牙關日二次

○第一千二百九十六方

碱歇蘭度

芫菁軟膏アラビ 半

右擦胸及脊

子

主治右二方嬰兒卒瘻ニ宜シ但第一千二百九十六方ヲ

施ス氏ハ最謹慎ヲ加フベシ

落法尼亞ラボニア

羅キリ

テ蘭

此症往昔獨乙及ヒ歐羅巴ノ北方行於テ屢流行セリト雖

今世アルヲ罕ナリ唯濕濡ノ年蒸餅ニ多ク麥奴ヲ混タル
時社マ之アルノミ佛落屈人一千八百二十八年一千八百
三十一年及ヒ一千八百三十三年山村ニ於テ屢此症ヲ見
タリ但其詳錄ヲ缺ク並ニ館姪涅爾ナモキ亦一千八百三十
年一千八百三十一年及ヒ一千八百三十八年叔利便地ハシリヘンジノ
近傍ニ於テ多ク此症ヲ療セリト云フ○治法諸藥ヲ後ニ
シテ先吐劑ヲ與フベシ佛落屈館僕涅爾兩氏ノ說ニ據ル
ニ患者ノ胃知覺甚鈍ナルガ故ニ吐藥並ニ總テ諸藥ノ刺
戟ヲ感シ難シ故ニ服量太多ナラザレバ効ヲ得難シト云
凸其症ニ應メ五日十日若クハ十五日毎ニ吐藥ヲ用テ可

ナリ但吐酒石ヲ用フルヲ通例トシ吐后直ニ下劑ヲ與フ
ルヲ佳トス殊ニ瀉利鹽一弓半頓服スルヲ妙トス但再服
セザレハ効ヲ得難シ或ハ往々蟲症ヲ夾雜スルアリ此症
大量甘汞ヲ投シテ驅逐スル氏ハ本症確著ニ退キ非常ニ
佳効ヲ奏スルヲアリ攝綿施那モ亦此ニ好トス爾後大量
龍腦醋及ヒ接骨木子舍利別ヲ與凸但龍腦六錢ヲ以テ醋
一弓ニ溶化スベシ通例一患者ニ龍腦醋四弓ヲ算定シテ
漸次之ヲ服セシム纈草阿魏實百兒油葛私篤僕謨モ亦同
ク良効アルベシ腸胃大衰弱及ヒ溶崩証ヲ見ハス者ハ姜
密幾私去爾菖蒲根纈草阿魏ニ宜シ刺絡ハ必忌ムベシ但

蜞鍼ハ頭脳畜血並ニ患部ノ攣痛ヲ減ス。全身浴湯。發胞膏及ヒ芥子泥ハ良驗アリ。到別召ハ火酒ト酩酊等分配伍シ軟膏ト為シ又的列並油ヲ煖シテ指頭及ヒ他部ニ擦セリ强壮藥及ヒ鎮痙藥ヲ併用シテ大ニ効アリ。就中刺絡ヲ要スル者唯二人ヲ見タリ。姑息法トシテ兩手ヲ温水ニ浴シ且温油ニ阿芙蓉丁樂ヲ加ヘテ塗擦シ以テ劇痛ヲ減セリト云フ。○娼倔湿润爾人ノ經驗ニ據レバ落法尼亞無熱症ハ先吐下劑ヲ處シ後阿芙蓉ヲ用ヒテ治スルニ足レ。然氏娘衝熱ヲ兼併セル者ハ刺絡及ヒ局部瀉血ニ宜シ。若此症牙關緊急。全身麻痺或ハ腸胃麻痺性衰弱ヲ夾ム。氏ハ死ヲ免ル、者殆稀ナリト云フ。

○第一千二百九十七方 [娼倔湿润爾]

吐酒石二 吐根刃末半 白糖錢半

右調勻為散等分四服每十密扼篤一服以至得吐

[主治] 一女子十二歲無熱落法尼亞ニ罹リ。顔面及ヒ遍身此症ヲ發シ旦左手痙攣ヲ患フル者アリ。其初起此散ヲ與ヘテ吐ヲ得ル。四回瀉モ亦數行ニシテ左手ノ痙攣著シク減退セリ。四服牌一服。

○第一千二百九十八方 [同上]

精製阿芙蓉

霸王鹽

白糖各

列幾

右調勻爲散等分四服朝夕一服

主治前方ヲ試用セル女子痘癩再發ノ時之ヲ用ヒテ佳効ヲ得タリ

○第一千二百九十九方

(同上)

精製消石錢

瀉利鹽錢

井水六弓溶解加後味

舍電阿芙蓉液

半錢

拘榦汁舍利別

半弓

右調勻每一時服半食匙

主治一女子歲十五無熱落法尼亞ヲ患フ先吐藥ヲ施シテ後此方ヲ處シ平治ス

恐水病

ヒドロ

ポビア羅

アス蘭

此症單發傍發ヲ論セズ他ノ神經病殊ニ歇倚私的里ト併發スル者ニシテ皆阿芙蓉老利兒結爾斯水八百八十一方方誠歇蘭度良若老利兒結爾斯水至八百八十五方芥子泥發胞膏鎮痙攣法五百十一方五等ヲ施シ阿魏等ノ鎮痙灌腸法ヲ行フニ宜シ○神經熱ニ由テ發スル者ハ腸胃ヲ疎滌シ旦龍腦麝香等ノ如キ神經藥及ヒ鎮痙藥ヲ與フベシ○又疥癬內陷ニ因スル者アリ非爾都人嘗テ此一症ヲ療スルニ刷子ヲ以テ脊椎ヲ摩擦シ人造硫黃泉ニ浴セシメ脊椎ニ光菁膏ヲ貼シ内服ハ甘汞ヲ硫酸私的列幾

尼捏ニ配用シ三日ヲ出テズノ治スルヲ得タリ○狂獸咬傷ノ致ス所ニ因ル者コントタギウセ。ハ療法ニ般アリ一ハ其未發ヲ預防シ一ハ其發病ヲ治ス
預防法外用法ヲ施ノ咬傷所ヲ療スルハ其効内藥ニ優リテ確實ナリカヲ以テ十分傷口ヲ截開スルハ最的實ノ法タリ若其咬傷獨一指ニ在ル者ハ其指ヲ截斷スベシ然ニ截開截斷ノ二法皆施スラ得ベカラザル者ハ灰汁鹽海鹽水。尿。醋。或ハ消酸銀稀溶液ヲ以テ小心ニ傷口ヲ洗淨シ尋テ烙鉄ヲ施ノ更ニ之ヲ破潰スルヲ切要トス但艾灸ハ不可ナリ火藥ヲ用フルハ最不可ナリ何トナレハ火藥ハ速

ニ失血ヲ止メ且傷處ノ底面痂ヲ結ビ之が為ニ効力深ク達スルヲ得ザレハナリ若傷口烙法ヲ施スニ適當ナラザレバ刺必斯高私蟄屈斯或ハ腐蝕安質沒尼ヲ以テ侵蝕スベシ消酸銀ハ腐蝕劑ニ用フベカラズ結痂遺リテ速ニ之ヲ除キ難ケレバナリ咬傷深クシテ小ナル者ハ之ヲ截開シ微温水ヲ用ヒテ洗ヒ若クハ乾角法ヲ施ソ久ク出血セシムルヲ要ム若咬傷ノ部位截開ニ宜シカラザル片ハ亂刺法ヲ好トス傷口ヲ膿潰セシムルヲ極メテ久シキヲ最要トス宜ク芫菁軟膏赤降汞軟膏或ハ時々發疱硬膏ヲ貼シ又升汞水或ハ芫菁丁幾二三滴宛點滴スベシ兼テ傷口

ノ周圍ニ水銀膏ヲ擦メ以テ吐涎ヲ發スルニ至ルベシ傷
口ノ釀膿ヲ持久スル「二三月ニ滿タザルベカラス尋テ
之ヲ潰瘍ト爲シ累年或ハ生涯癒ス「十カラシム」預防内
服藥中最首品トスル者ハ即蕎苔千三百五方至三百三十三方光菁千三百五方至三百三十三方服
千三百八方地膽千三百九方至一千三百四十五方甘汞千三百五十五方至一千五百五方龍腦青酸鹽
阿芙蓉千三百十六方等是ナリ「遏那噶栗私亞兒」失
斯植物名未詳モ亦此類ニ属ス「弇弗」人殊ニ之ヲ贊美シ未嘗テ
浸劑ニ作り日ニ三錢乃至四錢ヲ與フ或ハ之ヲ散トナシ
テ傷口ニ撒敷セリ「爾遏福傑兒」人ハ一患者既ニ發病ノ第

一期ニ及ビテ遏噶那栗私ア用ヒテ治セリト云フ○輓近
魯西亞ニ於テ遏利私麻附ヲ稱賛セリ其根末ヲ牛酪ヲ塗
リタル乾肉ニ撒布ソ喫セシノ或ハ半錢乃至一錢葡萄酒
ヲ以テ送下シ或ハ蜂密ヲ加ヘテ塊トナシ用フ果ノ此藥
劑ノ効績ヲ奏セル者間之アリト雖亦無益ニ属スル者少
シトセズ○又硝砂精ヲ稱用スル醫多シ殊ニ「虜」人名之ヲ佳トス硝砂精十滴接骨木花泡劑一小盞ニ點服セシ
ムル「日ニ二次ヨリ三次ニ至ル」留設水アウテリュセ一千六百五十五方モ亦同シク的効アリ「茱爾質涅篤」人名ハ既ニ恐水症ヲ發セ
ル者モ亦硝砂精ヲ以テ防止セリ又弗勝爾田蒲蘭度人名ハ

鹿角鹽一刃ヲ用ヒテ其既ニ發見セル恐水病二人ヲ治セリ○申結名ハ燐ヲ以テ恐水五人ヲ防止セリ用法憐一刀。亞的兒一錢半。薄荷水四弓。沙糖舍利別一弓半ヲ合和シ一食匙ヲ與ル。丁日ニ三次但弗。罐。興利篤名ハ憐半匕至ヲ以テ莨菪一匕ニ和用ス此用法効ヲ得ザリシト云。一千七百年ノ末ニ於テ目涙答モタマ人ノ試驗世ニ發行セリ其法麥酒醋三比。酔半比ヲ混和シ温ノテ以テ傷處ヲ洗ヒ旦之ヲ重布ニ。熊ノ巻覆シ内服ニハ麥酒醋三兩。酔少訟ヲ和シ與ヘテ之ヲ持重スル。短キ者モ十五日ニ充夕ザル十カラシム。目涙答モタマ上出此法ニ由テ百人ノ恐水症ヲ預防セリト云フ。

然氏復効ヲ奏セザルガ故ニ竟ニ棄テ用ヒザルニ至レリ○魯西亞ノ諸部ニ於テハ狂獸ノ温血ヲ飲服ス俗間此ヲ以テ恐水預防法トシテ贊美セリ。栗篤咩リトトマ私的爾アレ人此法ヲ發明シテ三十一年ニ試驗シ以テ其効ヲ確徵セリト云。又他獸ノ温血ヲ服スル。毛亦可ナリ但其温ニ乘シ凝聚セザル者ヲ准トス。○諸浴水法殊ニ鴟沐浴ハ恐水病ヲ預防シ或ハ之ヲ治スルニ宜シ○其他數品合和ノ秘方ト稱スル者夥多ナリ。世醫陋說ヲ持スル者或ハ大ニ之ヲ夸稱スト雖學者之ヲ精查シテ皆其名稱ヲ失セリ。

發証治法預防云稱贊スル所ノ方法亦皆發病ヲ治スルニ

用フベシ故ニ此條唯瀉血卒倒スルニ至ル及ヒ蒸氣浴ヲ
說キ旦孤羅珍^{ジン}名ノ學醫刺栗屈^{リク}人及ヒ私格魯帽^{ルハス}名ノ官醫
法別魯^ル名ノ歷驗セシニ新法ヲ述ブルノミ○疇昔刺洛ヲ
持重メ恐水症ノ既ニ發出セルヲ治セシ者少シトセス輓
近ニ至テハ印度ニ於テニ患者瀉血ヲ持重ニ後阿芙蓉及
ヒ汞劑ヲ服ノ平癒セル者名アリ其之ヲ試驗セニ醫ハ質
門人及ヒ私箇兒佛羅突^{ラト}人ノニ氏ニニテ歐羅巴ニ於其
治法ヲ模倣スル者多シ賀涅^{カニ}人福傑爾^{ルム}私蘭倔^{ラム}同
爾姪兒滿^{ムン}皆刺絡ヲ施シテ患者全ク意識ヲ失スルニ至
リ後阿芙蓉甘汞大量硝砂精ヲ用ヒ或ハ之ニ水銀塗擦法

ヲ併用ノ此危症ヲ救治セリ但他醫ハ同法ヲ施ソ寸驗ヲ
得ズ那私屑^{スセ}人放血卒倒ニ至ラザレバ効ヲ奏セザル所以
ニ原キテ久シク頸動脈ヲ抑壓スルノ一法ヲ試驗セリ此
法同上ノ効アリテ而メ危險更ニ甚シ賴魯里^ル人嘗テ譖語
劇痛及非劇痙^ク治スルニ頸動脈ヲ壓定ノ眠ラシム或ハ
卒倒ノ前徵ヲ發セシハルヲ發明セリ今那私屑^{スセ}氏之ニ倣
フナリ○佩私損^ス人嘗テ自ラ恐水病ニ患ヒテ蒸氣浴ノ治
驗ヲ發明セリ初此人薄命ニシテ此病ニ罹ルフ悲ミ自ラ
窒息シテ死セシヲ謀^シ竟ニ身ヲ蒸氣中ニ投^シ其溫度
列氏驗溫器二十四度ニ升ルニ及テ疾患俄然ト解散セリ

是ニ於テ大ニ喜ヒ旦驚キ猶之ヲ持重シテ終ニ其症平治
ノ復發セズ爾來佩私損氏魯西亞ノ蒸氣浴ヲ他人ニ施シ
テ夜汗ヲ催進ス此ニ由テ狂犬咬傷症ヲ治スル者八十餘
人中ニ就テ四人ハ既ニ狂ヲ發セシ者ナリ唯一兒七歳ノ
者蒸氣浴中ニ斃ル佩私損氏ノ之ヲ施スヤ夜間ハ毛布ヲ
以テ病者ヲ纏覆シテ羽蓐ニ卧サシメ旦薩爾沙根煎ヲ多
服メ以テ蒸發氣ヲ催進ス○刺栗屈氏之療法ハ專健質安
那狐律失亞荅十三百方ヲ用フ○法別魯氏ハ瀉血吐劑及ヒ
冷水浴ヲ施シ又地膽及ヒ甘朮千三百方ノ効アルヲ説述ス
○第一千三方密桺苦密桺苦治法同上

莨菪葉

去一瓜至十四瓜

白糖

半

右調勻為散頓服

主治乙醫魯印甸壇德官密桺苦名恐水病ヲ預防シ或ハ
之ヲ治スルニ莨菪葉ヲ用フ先海鹽水醋若クハ尿ヲ以
テ傷處ヲ洗ワテ出血セシメ釀膿膏ヲ貼シ傷口癒ユル
「早キニ過ダレハ赤降汞膏ヲ貼メ以テ繃帶ス多血家
ハ刺絡ヲ行ヒ胃ニ汚物アレハ吐劑ヲ與フ其後莨菪葉
ヲ用フ但服量ノ多少ハ年齡ニ準ズルナリ」第一服ノ后
二十四時ヲ經テ第二服ヲ用ヒ又ニ半小時ノ後第三服
ヲ用ヒ此散ハ冷水或ヒ裸燕麥汁メ以テ送下セシム

年	服法	年	服法	年	服法
一歲	半八	二歲	八二	三歲	八二
二歲	半八	三歲	八三	四歲至六歲	八四
三歲	半八	五歲至七歲	八五	八歲至十歲	八六
四歲至六歲	半八	十歲至十三歲	八七	十三歲至廿六歲	八八
八歲至十歲	半八	廿六歲至五十歲	八九	廿六歲至五十歲	八十
十歲至十三歲	半八	五十歲	八十一		

宜服	第一服	第二服	第三服	第四服	第五服	第六服	第七服	第八服	第九服	第十服	第十一服
半八	八一										
八二	半八	八二									
八三	八三	半八	八三								
八四	八四	八四	半八	八四							
八五	八五	八五	八五	半八	八五						
八六	八六	八六	八六	八六	半八	八六	八六	八六	八六	八六	八六
八七	八七	八七	八七	八七	八七	半八	八七	八七	八七	八七	八七
八八	半八	八八	八八	八八	八八						
八九	半八	八九	八九	八九							
八十	半八	八十	八十								
八十一	半八	八十一									

男女俱ニ五十歳已上ハ右ニ準シ服量ヲ減少ヘキ監密云^ミ苦氏上法ノ如ク之ヲ百七十六人ニ施用シテ恐水發起ヲ防禦セリ然氏若未之ヲ服盡セサルノ間一恐水症ヲ發スル代ハ鹹劑若クハ塊ニ作リ與フルヲ妙トス貞按ニ此症既ニ發斯ル代ハ病者大ニ水ヲ恐ル故剤或ハ之ノ服スル必シモ冷水或ハ燕麥汁ヲ用七ズ故ニ云爾^ス第一服或ハ第三服ニシテ狂躁鎮靖セサル者ハ放血シ旦夜若^ク加増スベシ○密标屈氏ハ上表示スガ如ク年齡ニ準メ皆其服量ヲ定ム小兒入喉剤又私許爾屈氏上件ノ法ヲ模倣メ狂犬咬傷ヲ療愈せ但又私許爾屈氏上件ノ法ヲ模倣メ狂犬咬傷ヲ療愈せ但

口ヲ亂刺シ角法ヲ施ソ出血セシメ火藥ヲ以テ焚燬シ
旦赤降汞光菁ヲ配伍メ軟膏ヲ作リ貼ス「此ソ如クニシ
大ニ膿化セシムルノ六週後之ヲ潰瘍ニ變ゼシム」加之
傷處ノ周圍ニ水銀膏ヲ塗擦スルノ日ニ二次○己ニ恐
水症ヲ發スル者ハ一時毎ニ良苦甘汞ヲ配用シ毎服漸
ヲ以テ其量ヲ加増セリ並ニ一時半毎ニ身體諸部ニ水
銀膏ヲ擦ス殊ニ多ク頸圍ニ塗リテ以テ速ニ吐涎セシ
ム「多血家ハ放血シテ卒倒スルニ至ル」浴湯ヲ施スモ亦
佳ナリ或ハ傷口瘡テ經久ナル者ハ更ニ腐藥ヲ以テ之
ヲ破開シ上法ニ従フテ釀膿セシム

便秘ヲ防ダカ為ニ良苦ニ加タルニ旃那及ヒ大黃ヲ以
テス○又藥的魯サツル人大量良苦ヲ以テ恐水症二人ヲ治セ
リ○蒲列刺ラ人既ニ恐水証ヲ發セル者四人ニ大量良苦
ヲ與ヘ甘汞升汞ヲ兼用シ旦水銀膏ヲ塗擦メ以テ之ヲ
救活セリ又或醫同法ヲ施メ才驗ナキ者往々之アリ
○第一千三百一方城歇蘭度城歇蘭度治法
良苦根ホウシ甘汞苦麻德潤失亞ハラド谷四十
有調和為散等分ハ裏朝夕服二裏六入三添二出一水
主治恐水病ヲ防ハシメテ宜シ城歇蘭度此散ヲ與ヘテ適
宜ノ流涎ヲ促シ其レヲソ持續セシムル十四日間傷

○第一千三百二方 狩里屈名治法

葛根根赤五白糖半

右調勻爲散分十二服每朝空心一服
主治此方恐水ヲ預防スルニ宜シ○狂犬咬傷ヲ受ケタル者每朝之ヲ服スル「三週爾後隔日ニ一服」咬傷後二三日ヲ出デズノ治ヲ請フ者ハ上方ニ甘汞ヲ加エ連服セシム以テ流涎ヲ發スルニ至ル此ノ如キ大量葛根ヲ與スル者ハ服後必咽喉乾燥シ眼前火光ヲ見ハシ或ハ曇暗頭旋爾後汗出ル等瞑眩ノ証徵ヲ發スルヲ以テ目的トス兼テ又民塗列里精及ヒ鹿魂精ヲ與ヘ旦

泡劑ヲ多服セシムテ以テ發汗ヲ催進ス「初四週間卧床中ニ在テ内食ヲ戒ヘルヲ要ト」外用ハ深ク傷處ヲ亂刺シ芫菁軟膏ヲ塗擦シ傷口ノ近傍ニ發疱硬膏ヲ貼シ兩處俱ニ釀膿セシムル「六週間又水銀膏ヲ塗擦シ吐涎スルニ至ル」○是紀元一千七百八十三年已來狩里屈地ノ病院ニ於テ行フ所ノ法ニシテ之ヲ發明セシ者ハ實ニ其病院ノ祖侍醫依脣ヒル魯設耳セル人十リ一千七百八十三年ヨリ一千八百二十四年至通計スルニ此法ヲ施セシ者二百三十三人就中死者四人但其中二人ハ病院ニ來テ後第二日ニ死スルガ故ニ施療ノ日甚乏シ其餘

二人ハ口中及ビ眼胞ニ傷ヲ受ケタルガ故ニ猛烈ノ外
用法ヲ施スヲ能ハザリシト云カ入其事中ニ入ヘ所測

○第一千三百三方〔弗。私葛列淪〕〔弗。私葛列淪〕人療法

(甲方)

葛根

末十四

人十五

甘汞

白糖

半加耶普的油

二滴

右調勻為散等分二服晨夕一服百人十三年內來此取

主治

同上

〔私葛列淪〕人

其率小兒一歲ヨリ三歲至ハ葛

葛根一氏乃至二氏甘汞半氏加耶普的油一滴每日二服

四十歲ヨリ五十歲至ハ葛根十四氏乃至十五氏甘汞
二氏加耶普的油一滴又配伍ス大抵十四日間ハ其年齡

二准ノ日ニ葛根半氏一氏若クハ二氏ヲ加増シ後又減
少ス甘汞連服ハ流涎ヲ發スルニ至ルヲ度トス○蓋此
用法葛根ノ量過多ナリ稱用スベカラズ何者私葛列淪
人ハ之ヲ用ヒテ唯頭旋及ヒ重視ヲ發セシメ之ヲ十四
日間連進スルヲ旨トスト云フト雖更ニ小量ヲ用フル
モ尚能ク之ヲ發スル者通則十レバ十リ○施治ノ間遇
那噶栗私亞兒祆失斯〔三方〕〔百〕飲料朴ス○其他私葛列
淪氏傷口ヲ亂刺シテ出血セシム咬傷未時ヲ移サザル
者ハ烙鍤ヲ施シ既ニ二三設昆度ヲ過グ止者ハ筆ヲ以
テ安質〔百〕酪ヲ塗リテ侵蝕セシム十時ノ後再之ヲ侵

蝕レ刺戟軟膏

三千三百
三方而

ヨ貼越ル初十四日間ハ毎日二

次其後相ニ一

次第二十九期過グ止バ單ニ遏兒託軟

膏及拔實里膏ヲ貼シ患處ニ瘻エルニ至ル

私葛列淪五

十人ノ療シテ皆治セシ益久シノ膿潰セシムルハ今ニ

於テ必佳トス

告解限十四日持ト

○第一千三百三方

各半
人渴那噶粟私亞兒祇失斯葉根

甘草錢三
蜀羊泉錢並六
山牛房根濱瞿麥根

苗香錢數十
密量半煮服盡

右細剉調合毎日取三大食匙水二麻篤

密量半煮服盡

○第一千三百三方

丙方

赤降汞八 甘汞十二 芫菁末四 的列並油刀拔
實里膏弓

右調勾貼傷所

○第一千三百四方

越耳祿弗

芫菁一 甘汞一八 龍腦六 達刺侃篤謹漿宜適
右爲丸原本粒數記七八

主治每晚一丸ヲ與ヘテ恐水ヲ預防スルニ宜シ○外用
烙鍊汞劑

卷之二

恐水

主

廣

財

○第一千三百五方非魯篤設耳

羌菁末四

甘朮六

白糖錢二

大黃一兩

長用

右調和為散等分十二裹每一時服一裹

主治一男子十七歲頭上ニ咬傷ヲ受ケテヨリ後一種ノ
僥麻質斯症ノ恐水病ニ近似セル証狀ヲ發ス上方ヲ試

用ノ即治セリ

○第一千三百六方粟屈的兒

羌菁細末一錢

龍腦八分

亞刺四分

亞蘚四分

謨紫適量

由

右為四九過兒把末為衣朝夕服一九

主治恐水ヲ防グニ宜シ

○第一千三百七方律私篤 律私篤人療法

(甲方)

羌菁十二

蠟姑石

白糖各一錢半

右調勻為散等分十二服日二服乃至三服

主治恐水預防方トス○律私篤人ハ最羌菁ヲ贊美セリ
其試驗ニ據ルニ十八年間羌菁ヲ預防方ニ供シ外治ハ

每常必施サズト雖一人モ恐水症ヲ發スル者ナカリシ
ト云フ○咬傷未時ヲ移サズ其部外術ヲ施スニ宜シケ

レバ乃之ヲ截除ス其之ヲ截除シテ后二日若クハ三日
間刺必斯高私蠟屈斯濃溶液千三百七方ヒラ以テ傷口ノ表面

ヲ齶蝕シ其燒痂ハ釀膿ヲ俟テ自ラ剥脱セシム○又刺必斯高私蟻屈斯淡溶液千三百七方丙以テ患所ヲ洗ヒ旦之ヲ綿撤絲ニ醮メ貼ス○律私篤氏上件ノ療法ヲ以テ一患者既ニ狂証ヲ備ヘシ者ヲ救治セリ○第一等ノ外科遏幾私的爾人年地名在病院ニ在テ三十年間犬傷ヲ療シ一二症ヲ除クノ外ハ皆之ヲ救フヲ得タリ其法羌菁末一氏ヲ吐酒石ニ配メ連進スルヲ三日乃至六日間患所ニ羌菁膏ヲ貼シ又時々羌菁末ヲ摻シ或ハ刺必斯高私蟻屈斯ヲ以テシテ六週間之ヲ膿潰セシムト云フ

○第一千三百七方

(乙方)

刺必斯高私蟻屈斯一錢 蒸餾水一弓溶化

右供咬傷洗料

○第一千三百七方

(丙方)

刺必斯高私蟻屈斯半錢 蒸餾水一弓溶解

右洗傷口日三四次又醮綿撤系貼傷處

○第一千三百八方
歎刺アサヒ又アサヒ萬里マダラ療法

(甲方)

羌菁ホウキ一八

亞刺毘アラビ亞謹謨アグモ末アグモモ或アタマ謹謨散アグモモモ附アタマ刀アタマ

右調勾爲散分七裏每朝空心取一裹水或裸蕪麥汁送下
主治恐水病ヲ預防シ又其既ニ發スル者ハ之ヲ治スル
ニ宜シ○患人頗ル多血ノ者ハ篤里氏先放血ヲ施シ。腸
胃汚物アレバ吐劑ヲ用乙兼テ患部外術ヲ施スニ宜シ
ケレバ之ヲ截開シテ出血セシメ後蕪菁末ヲ撒敷ス尋
テ蕪菁膏ヲ貼メ之ヲ覆フ但其大傷口ノ邊縁ニ餘ル「
一獨乙謨ト」咬傷甚淺クノ其部唯表被ヲ剥脱スルノ
ミナル氏ハ蕪菁膏ヲ以テ發疱セシメ之ヲ刺ソ水液ヲ
去リ蕪菁末少許ヲ取テ刺口ニ挿ム次日其疱及ヒ填ツ
ル所ノ蕪菁末モ亦之ヲ除去シ下歎ニ載スル所ノ湯液

千三百八方乙ヲ以テ洗淨シ復更ニ蕪菁末ヲ撒ス此ノ如ク連
用スル「三日以テ劇勢熾衝ヲ發セシム」内用ハ上ノ第
一方一千三百八方甲乙取りテ初回ノ繃帶後早朝空心ニ始テ
之ヲ服シ其後毎朝連進スル「一週間爾後毎週蕪菁ノ
量四分氏レ」一ヲ加増シテ尿道微痛ヲ覺エルヲ極度ト
シ復再上法イ如ク漸次ニ其量ヲ減殺シテ故ニ復シハ
日間ニ一氏ノ量ヲ服スルニ至テ停ム小兒五歳乃至十
歳ノ者及ヒ大人體質虛弱ノ者ハ蕪菁四分氏ノ一ヨリ
始メ小心ニ之ヲ加増シ微々小便濡滯ヲ發スルニ至テ
止ム此ニ兼テ篤里氏左ノ湯液ヲ投ス

○第一千三百八方同上

忍水

三

廣

月

堂

(乙) 方

大葉車前葉

根

過那噶栗

私

過兒

祇

失斯

實

噶里留的

葉艾穗各量

加井水三綿首脣

容量

蓋閉煮四分時

絞濾加後藥

的里亞加安瘦裸謨附

老利兒

搗碎各

右再煮減半冷服

主治二十歲乃至五十歲一人

ハ

早朝前

ノ散方ヲ服スル

ノ后之ヲ一服シ又晚初更ニ方リ一服ノ寝蓐ニ就カシム

ム但晚服ノ前一時ハ唯内羨汁ヲ啜ルノニシテ他ノ

飲食ヲ禁ズ十歳乃至二十歳並ニ五十已上ノ者ハ此湯液ノ半ヲ取り分テ四服トス十歳已下ノ小兒ハ三分ノ一ヲ取り分テ六服トシ時々之ヲ與フ患者之ヲ服スルヲ能ハザレハ此液ヲ以テ小心ニ傷處ヲ洗フノ毎日二次尚旦時々之ヲ以テ繩帶ヲ濡マニ兼テ羌菁末及ヒ遏那噶栗私遏兒祇失斯實乾固研等分軟膏ニ和シテ傷處ニ敷キ以テ釀膿セシムルノ四週間此ノ如ク之ヲ施スノ后病者ヲシテ始終傷處ニ注意セシノ若傷處或ハ其近傍ノ關節ニ不安ノ所アル乎若タハ痙攣ヲ覺ユルノアラハ復速ニ來リ治ヲ需ベキヲ命ノ去ラシムベ

シ而ノ若其證徵ヲ覺ユル者ハ更ニ上件ノ療法ヲ施ス
ベシ○食養唯植物ノミヲ用上亦過多ナル勿レ總テ
此症飽食ヲ禁スペシ上ノ湯液ノ外總テ飲液ヲ戒ムベ
シト雖若大渴已ハベカラザル者ハ艾穗及ヒ遏那噶栗
私遏兒祇夫斯實等分ニ甘草少許ヲ配シテ甘味ヲ加ヘ
稀淡煎汁トナシ與ニ總テ精神ノ感動例スルニ房事或
ハ身體勞動ヲ避クルヲ要ス施治ノ間患者衣服ヲ溫被
シテ適宜ニ蒸氣ヲ發揚スルヲ要ス而ノ必尊中ニ在ル
ヲ要セス羨日ニハ病室モ亦出ルヲ得セシムベシ蓋
右ノ療法此法尼亞ニ始ル恐水病ノ末期ニ至テハ効ヲ奏ス

ル者歟シ○孤攝魯訥微都地名ノ醫喊醫私人始ノテ上歎
ノ治法ヲ傳說セリ此人歇魯落地名ニ淹留セシ間上法
ヲ實驗ノ偉効アルヲ證セリ實ニ狂犬咬傷ニ罹ル者十
中ノ九之ニ由テ平癒セリ其後喊醫私暫國名魯名葛魯達速地名ニ在畠セル時狂犬傷二人アリ篤里氏ノ法
ニ微フテ之ヲ療シ恐水發見ヲ預防シ得ヌリ此時同一
犬他ノ二犬一豕ヲ齧ミ皆之カ為ニ病テ死セリト云フ
○篤里氏ハ此法ノ奇驗ヲ以テ敢テ先菁ニ歸セズ專湯
液ニ在リトス何者其症或ハ唯湯液ノミニ由テ除ク者
アレバナリ

○第一千三百九方 設兒列名 恐水飲

地膽箇 八 的里亞加 アロカ 安度祿謨 アントラム 半鹿角鹽 ニ 龍腦
錢 一 民塗列里精 リ

右丁寧調和毎半時服一食匙 乃至一食匙半臨服宜振盪

主治 恐水ヲ預防シ又之ヲ治スルニ宜シ ○ 設兒列ハ傷口ヲ亂刺シ旦時々芫菁末ヲ撒布ス 又此藥液ヲ用フルノ前吐藥ヲ與フ ○ 地膽ハ往昔大ニ稱用シ中コロ廢棄スレ凡方今復拾用ス

○第一千三百十方

地膽 末 一 龍腦 八 精製消石 六 白糖 半
右調勻爲散分六服每一時乃至二時一服

○第一千三百十一方

地膽 蜜漬者 十四箇 二 摄爾扁太里亞根 未 一 噎別尼 未詳
錢 一 スポンギー。ソルヒ。アウキ。パリ 末詳 一刃 鉛屑 一
的里亞加 リ アカ ニ

右調和爲煉膏

主治 此方弗列塗栗幾人第二世ノ秘方ニシテ弗列塗栗幾氏之ヲ細列失斯國ノ民ニ鬻ヒテ以テ世ニ發行セリ大人服量ノ極二錢。婦人ハ一錢半。小兒五歲ヨリ十歲至

一刃乃至二刃服後十二時食ヲ斷チ後六時間飲液ヲ禁ス但此時ヲ過グレバ接骨木花泡剤ヲ温服メ發汗セシム傷處ヲ瘻サズ旦周圍ニ私格魯匹蠟油一種ノ
蜘蛛油或ハ地膽ヲ漬シタル蜜ヲ塗擦ス此方世ニ字漏生アリス名煉膏ト稱スル者ニシテ恐水症ヲ未發ニ防グノミナラズ其既ニ發スル者モ亦治スペシ一婦人四十歳咬傷ヲ受ケテ后第二日ニ恐水証ヲ發ス此煉膏ヲ一服メ治セリ初之ヲ用ヒテ婦人熟睡スルヲ一時半ニノ大ニ發汗シ醒テ后大ニ爽快ヲ覺工能ク人事ヲ省セリ但暫時下肢ニ麻痺ヲ遺スト雖亦忽平治セ此煉膏ノ効力地膽ニアルヲ

確明ナリ

○第一千三百十二方薰蕎梗鴟耳朮

地膽箇十 繡草末 地榆末 龍芽草根根 榆寄生各半
接骨木子舍利別宜

右作煉膏每一時服大茶匙

○第一千三百十三方薩吉損人恐水病飲ハウス古スア

キソニン羅カルカラサ 蜂蜜去泡沫 櫟兒麻爾秩斯半刀 煤焰光帶

地膽箇二蜜製澤者 半錢

右內臼丁寧研磨作泥更加醋二弓調齊每四分時服一食

匙

主治右二方千三百十三方咬傷ヲ療シ恐水ヲ防グニ宜シ

シ

○第一千三百十四方〔遠渴〕

地膽曝大氣者十五分精製消石錢半

右調和爲散等分十二裏每半時服一裏

主治之ヲ連服ノ送尿ニ臨ミ焮痛ヲ覺エ或ハ血ヲ漏スニ至リ以テ恐水ヲ防禦スペシ但粘滑藥煎ヲ飲料トス

○第一千三百十五方〔遠渴土做〕

突土做孤律德篠孤律德傑及遠

突土並人療法

甘汞半升至一升白糖半升

右調和爲散分十二服每二時一服又夜間一服

主治恐水ヲ禦グニ宜シ○海綿ニ微溫水ヲ醮シ傷口ヲ

洗淨シテ芫菁末ヲ填テ芫菁硬膏ヲ貼ノ之ヲ罨スベシ

硬膏ノ大傷口ノ周圍ニ餘ルヲ一箇也謀トス又水銀膏

一刀乃至半錢ヲ取テ朝暮之ヲ塗抹ス但初ソ之ヲ傷口

ノ周圍ニ塗リ後四肢ニ擦ス又芫菁膏ニ由テ發スル所ノ疮皮ヲ剪リ去リ其濕濡セル芫菁末ヲ除キテ或ハ更

帶上件ノ法ヲ施ソ夥多釀膿セシム六週間傷口

二 患者ノ感觸
敏鈍ニ從ノ新末ヲ撒敷シ或ハ唯芫菁硬膏ヲ貼ノ繩

帶上件ノ法ヲ施ソ夥多釀膿セシム六週間傷口

ア瘡スノ前上脣堵ク足ニ打膿法ヲ施メ一年間愈エ
ザラシニ甘汞華ニ水銀塗法ハ毎日吐涎ニ北ニ至ルヲ
度トシテ之ヲ持重シ若水銀擦法ヲ用ヒザルキハ甘汞
内服ノ量彼イ六週間吐涎ノ度ニ適メ之ヲ連進ス○紀
元千八百十年ヨリ千八百二十三年至上法又行ス者百
六人其中唯二人相當ノ外用法ヲ施スト能ハズシテ死
セリト云フ

○第一千三百十六方〔麻羅泄瀉〕 麻羅泄瀉療法
傑尼私陀^{弓半} 井水ニヒ素^火敷^火可半
右毎半時服二食匙

主治同上○此方原俗間ニ出テ、千八百十三年優葛來
涅^地ニ於テ麻羅泄質氏ノ學ビ得タル所ナリ其法咬傷
ヲ受テ後第三日ヨリ第九日至ニ舌根下臼齒腺ノ排泄
管口ニ接メ發スル所ノ小疱ヲ^{世醫以爲ヘラク此刺破}刺破
シ烙鍼ヲ以テ之ヲ燒滅シ而後傑尼私陀煎ヲ含漱セシ
ムルヲ切須トス^{此術疱ヲ發メ后十二時内ニ施スベシ}
ム^{但毎症必癰ヲ發}不^{ルニアラス}否ラザレハ治シ難ニ嘗テ優葛來涅^{前見}
ニ於テ狂犬咬傷ヲ受クル者十五人其中十四人ハ恐水
治療ニ有名ノ一野人上法ヲ以テ之ヲ療ス他ノ一人六
歳ノ女子ハ麻羅泄質氏ニ治ヲ請フ師當時行ハル、所

ノ方法ニ由テ之ヲ治ス而其十四人ハ皆平癒シ彼ノ一女子ハ恐水症ヲ發ノ斃ル其後五年朴突釐惆地ニ於テ大傷ニ罹ル者二十六人アリ麻羅泄質氏乃其毒疱ヲ焼滅シ傑尼私陀煎ヲ用ヒテ救活セリト云フ

○第一千三百十七方 刺栗屈人療法

健質安那獄律失亞答根尋常健質亞那
一種三弓

右取四分一内臼加水研磨為泥早旦空心服之

主治恐水既ニ發入者ヲ治ス○屈羅質國名歇爾暴弗私
格名地ノ學者刺栗屈人恐水病秘法アリ嘗テ極私向戾幾國ノ政府銀百韋ヲ捐テ之ヲ刺栗屈ニ買其法咬傷ヲ

受クル人始メテ狂躁ヲ發スル時速ニ蝦蟆脈ヘナラニ
脈腫脹セル者ヲ破開ス但木造鏃子ヲ用ヒ先舌ヲ寧引ソ之ヲ施スナリ既ニ之ヲ破レバ舌ヲ放チテロ中ニ取メ久シク出血セシムテ其自然ニ歇ムニ至ル是ニ於テ健質安那獄律失亞答根ヲ取テ上法ノ如ク之ヲ製シ半羅度名量至ヲ第一服トシ與ノ一服半羅度ヲ服量ノ極トス病人ノ年齢ト性質トヲ量リテク之ヲ減少ス爾後毎朝空心ニ同量ヲ服スル七八日○迷迭香精ヲ以テ患處ヲ洗ヒ裸麥粉ニ分杜松子末一分猛烈火酒ヲ加ヘ硬膏ヲ作テ貼ス若傷口既ニ癒ユル者ハ先之ヲ亂刺ス○既

ニ恐水症ノ發ノ諸証具ハル者ハ強ヒテ病人ノロヲ開
キ健質安那獄律失亞荅根ヲ調製シテニ羅度ヲ與ヘス
一時半ヲ經テ再同量ノ服セシム其第ニ服ノ後病人噤
急緩解セザレバ健質安那獄律失亞荅イ金根ヲ取テ嗽
マシムヘシ妙トス病人能ク之ヲ嗽ミ亦喜テ之ヲ嚥下
ス次ニ蝦蟆脈出上ヲ破り肉羹汁少許ヲ與フ爾後大抵病
人水ヲ飲ムヲ畏ル、コナク又安眠至五時乃ヲ得ルナ
リ此ニ至テ乃此症救活ヲ得シ疑フ容ラズ睡眠ノ間
口中粘液或ハ淡黃色或ハ雞子白ニ類似セル者ヲ生ス
善ク其排泄ニ便ナラシムベシ若恐水証將ニ再發セン

トスルノ勢アリ既ハ復更ニ蝦蟆脈ヲ破開スベシ便秘
スル者ハ施治第三日ニシテ瀉藥ヲ與フ虚憊殊ニ甚シ
キ者ハ迷迭香精ヲ以テ軀體ヲ洗ヒ又晚ニ迷迭香精一
盞冷水ニ和服セシム○紀元一千八百四十年庚午年名地ノ軍
政官ヨリ命ヲ下メ刺栗屈ノ治法ヲ示セリ故ニ極私ス
名諸郡ノ兵士病院ニ恐水症アル既ハ此法ヲ試驗
セザルヲ得ズ千八百四十四年諸部ヨリ報知スル所ノ
經驗一定ナラズ又屢年ノ布佛祿私結人ノ說并ニ達魯
母私怛篤名阿袂名地ノ醫官歇私失斯名ノ說皆之ヲ不可ナリト
ス阿袂名地ノ醫官歇私失斯名ノ說皆之ヲ不可ナリト

ヲ示セリ其語ニ曰ク患者此方ヲ以テ死ヲ買フベシト
又別兒印地名ノ布歇兒德微屈人此法ヲニ狂羊ニ施ス
ト雖刺栗屈ノ說ノ如ク適當セズト云フ〇千八百四十
五年ノ秋廢年ノ軍政官上歎ノ經驗說ニ拘泥セズミテ
再刺栗屈治法又行クベキノ命アリシニ由リ極私甸矣
幾全國ニ於テ猶二年間之入嘗試ス同時ニ刺栗屈モ亦
此方ヲ改製メ自ラ世ニ示セリ曰ク健質安那孤律失亞
荅根一羅度半ヲ増シテ三羅度トナシ少量ノ極テ二羅
度ト定ム旦刺栗屈親ク之ヲ試ルニ生根汁ハ乾根ニ優
リテ更ニ佳効アリ又最初ノ硬膏ヲ用ヒテ縛帶スルト

三次ニ及ベバ則硬膏ヲ更フル「簡要ナリト云フ〇按
スルニ刺栗屈モ亦未一定ノ効驗ヲ得ザルナルベシ余
憶フニ此後健質安那孤律失亞答ノ試驗ハ俗間ニ之ヲ
委シテ醫氏ハ猶今世用フル所ノ方法ヲ用フベシ何者
刺栗屈載ル所ノ外用法ノ如キハ取ルニ足ラザレハナ
リ

○第一千三百十八方 法別魯人治法

醫人先懲親撫慰ノ辨說ヲ極メテ以テ患者ノ恐懼ヲ安
ジ殊ニ恐水証ノ既ニ萌生スルヤ否ヤヲ試ヘルヲ禁
ジ傷口既ニ瘥ニル者ハ更ニ破開シ或ハ其傷處ヲ截除

シテ膿潰セシノ爾後多量ニ放血スペ通例發病第一期ニ於テハシ

之ヲ頸靜脈ヲ刺スヲ最妙トス。又項窩及ヒ下顎ニ放蜞

シ或八角法ヲ行ヒ。若其症膽液性ヲ夾ミテ發病已前口

中甚苦味アル者ハ先吐藥ヲ與ヘ後冷水若クハ氷片ヲ

用フベシ但或ハ之ヲ灌注シ或ハ之ヲ罨法トシ或ハ之

ニ浸スペシ此ノ如ク之ヲ施シ並ニ峻烈ノ發汗藥龍腦麝香

安尼亞地騰又與大發汗ヲ促ス要ス之ニ兼テ利尿藥

忌憚スペキナク且此症ノ大効藥タルニ由テナリ○蓋

法別魯氏實ニ上法ヲ以テ佳効ヲ得タリト雖未博ク其

試験ヲ歴ザルナリ旦發病第二期及ヒ第三期ニ至テハ
此法寸効アルヲナシトス

卷之十二

卷之十二

恐水

空

月

空

