




富士川文庫

3262



499.2
F^{M-2}
5
No. 1390
RC 12



伊東瑤川院譯

五帙

遠西方彙

原本紀元一
千八百五十
二年鏤行

廣胖堂藏



遠西方彙卷之十三

獨乙加癸安頓著

傑婆都譯

侍醫法眼貫齋伊東貞文仲重譯

南洋伊東健夫參校

喘アストマ羅ボル
ストカラシブ蘭

此症其原因ニ從フテ諸種アリ故ニ其因ヲ蹤跡シテ相當
ノ治ヲ下スベシ其最重症トスル所ノ者ハ痙攣喘粘液喘
是ナリ痙攣喘ハ呼吸器ノ痙攣ニ因テ發シ粘液喘ハ肺中



粘液太過ニ因テ生ス○小兒ニ在テハ密兒刺爾喘骨布喘
 二種アリ此二症實ニ其本性ヲ異ニスルヤ否未之ヲ發明
 セズ之ヲ要スルニ畢竟皆破裂軟骨ノ攣急ニ因テ来ルナ
 リ○凡喘息發作ノ時ハ專醫治ヲ要スルコト勿レ衣服狹窄
 ノ者ハ之ヲ寬解シ病者ヲ坐セシメ牖戸ヲ開キ清涼新氣ヲ引ク
 故トスル胸部及ヒ足心ニ芥子泥ヲ貼シ或ハ兩足ヲ蒸湯
 シ病人強實多血ナラハ放血スヘシ猛烈哥喜一小盞ヲ取
 リ或ハ其症ニ準メ之ニ阿芙蓉丁幾二三滴ヲ加レハ諸藥
 ニ勝リテ効ヲ奏スル者間之丁幾○又此症ヲ寬解スルニ
 祿別利丁幾二十滴乃至二十五滴ヲ用ヒテ殊効アリト云

フ○根治法ハ疾患間歇ノ時ニ方リテ之ヲ施スベシ蓋瘰
 癧喘ハ鎮瘰劑千三百十九方至千三百卅六方ヲ用ヒ粘液喘ハ專痰ヲ豁
 利スルヲ以テ要トス千三百卅九方至千三百六十四方腹内壅塞ヲ生スル
 者屢之アリ善ク之ヲ解散セシメ尚且發疱打膿法等ノ如
 キ猛烈反對刺衝法ヲ施メ胸中ノ分利ヲ促シ之ヲ持久ス
 ルヲ最要トス○密兒刺爾喘ハ密兒刺爾氏阿魏内服千三百六十六方
十五方千三百六十七方灌腸俱ニ稱用セリ千三百七十七方恚屈滿名ハ麝香
 ヲ好トス○骨布喘ノ治法衆說未一定セズ熱ヲ帶フル者
 ハ頸圍ニ放蟻シ甘黍ヲ與ヘテ的當スル者多シ鎮瘰藥ハ
 殊ニ亞鉛劑千三百七十五方及ヒ麝香ヲ佳トス又硫酸規

尼裡殊ニ之ヲ鎮癩劑ニ配スル者千三百七十六方至千三百七十八方衆醫

稱賛スル所ナリ此症起因病者ノ稟賦ニ在ル者屢之アリ

此素因ヲ治スルハ療癩藥ノ中ニ就テ最沃胃謨劑及ヒ研

油ヲ良トス

第一癩癲喘アストマススモチカ羅スバ

○第一千三百十九方別連杜

祿別利丁幾二錢

右喘息發作中毎二十密扭篤乃至三十密扭篤十滴沙糖

和服

主治癩癲喘ニ偉効アリト稱ス又肺心若クハ肝ノ器質

病ニ係ル者之ヲ用ヒテ其症大ニ寛解ス越魯溼屬名此

効能ヲ確定セリ○噎利阿篤損名及ヒ朱儼門突名等ハ

間歇ノ間モ亦一時毎ニ三十滴乃至四十滴ヲ服セシム

○第一千三百二十方拳傑兒

阿魏丁幾半

右毎一時服二十滴

主治假証癩癲喘ニ宜シ

○第一千三百二十一方漸瀾書堂出

顯草丁幾半

右毎服二十滴沙糖和服日二次

主治痙攣喘ニ宜シ其發作ヲ緩和シ又間歇ノ間ニ與ヘテ根治ノ効アリ

○第一千三百二十二方 佛蘭葛魯突

堙爾比尼謨昆速利達丁幾半ヲ附

右每服二十滴乃至三十滴日三次

主治痙攣喘ニ宜シ

○第一千三百二十三方

吐根赤クハ白糖ニ錢

右調勻為散等分十二服每一時乃至一時半一服同等ハ

主治同上○小量吐酒石或ハ安質沒尼酒モ亦吐根ニ代

用スヘシ

○第一千三百二十四方吐篤

刺屈黠私非祿沙越幾斯十六附 桂水三錢溶化

右調勻早晚服二十滴乃至三十滴

○第一千三百二十五方同上

歇爾蘭獨留謨子錢三 綿答幾里私布 加密列各半

橙葉六錢

右細剉取二食匙強滾湯四小盞泡出

主治右二方痙攣喘ニ宜シ

○第一千三百二十六方拔爾託

硝砂加過泥子精

安質沒尼酒各一錢半

過爾托煎五

阿芙蓉舍利別引

右調勻每一時服一食匙

主治瘧疾喘室息聖京屈風氣鬱畜鼓脹等二宜シ

○第一千三百二十七方颯爾版秘

金硫黃四

菲阿斯越幾斯十二

刺蝟石半

白糖二錢

右調勻為散每一時服一茶匙

主治瘧疾喘二宜シ○颯爾版秘百人百方不効ノ症此散ヲ

用ヒテ根治セリト云フ

○第一千三百二十八方蒲列刺

遠西方彙 卷十三 瘧疾 四 廣脾堂

暹屈訥尼葛答兒百附三錢至半

井水適宜煮濾取八弓加

屋施茂兒半弓

右調勻每一時服一匙

主治瘧疾喘奇方下稱

○第一千三百二十九方

福烏列爾名煙草浸

烟草葉劉

滾湯二弓浸漬二十密抽濾過加亞爾

筒兒二弓

右調勻每服三十滴乃至八十滴茶或裸燕麥汁和服日三

○三次

主治喘息及ヒ胸水ニ宜シ又骨布名ハ小便淋瀝ニ稱用

○第一千三百三十方 過。佛。栗。屈。的。魁

海葱越幾斯 雙鸞菊越幾斯 各六錢 揮發鹿角鹽 十五錢

葛私篤僕謨 半錢 阿魏 半錢

右調和二公為一九衣石松粉每服十九日三次

主治 癩癰喘 宜シ

○第一千三百三十一方 歌。惱

改製硫酸蘆薈越幾斯 未詳 吐根末 半錢 薄荷油 五滴

右調勻為三十九衣伊里私弗祿連底那末晨夕服一九

主治 喘息 宜シ

○第一千三百三十二方 吐。驚

著草越幾斯 半錢 律比丸料 一錢 阿魏 半錢 亞鉛華 十五

右調和為丸每粒二公衣石松粉每服五丸乃至八九日三

次

○第一千三百三十三方 同上

阿魏 半錢 民埤列里精 一錢 溶解加後味

苗香水 五錢 硝砂加過泥子精 二錢 過爾托舍利別 一錢

右調勻每一時乃至一時半服一食匙

主治 右二方假証癩癰喘 宜シ

○第一千三百三十四方 〔德〕

曼陀羅葉二 白糖四

右合勻為散等分八服朝夕一服

主治喘息諸証殊其症時ヲ刻メ發シ心臟ニ關係スル

者之ニ宜シ

○第一千三百三十五方 〔歌蘭度〕

葛私篤レ儂レ謨レ丁レ幾 忽弗滿液各一 薄荷油六 舍電

阿芙蓉液一

右調勻每一時服四十滴

主治喘息腸胃風氣鬱蓄ニ因テ來ル者ニ宜シ

○第一千三百三十六方 〔咄篤〕

葛私篤レ儂レ謨レ丁レ幾 鹿角精 忽弗滿液各一

右調和每四分時服二十五滴乃至三十滴

主治歇倚私的里性喘息發作中用之 歇倚私的里條 下ヲ照スベシ

○第一千三百三十七方 〔母私篤刺爾〕

複方大黃越幾斯附 勿擲一 亞石鹼各一 菲阿私越各一

幾斯錢半 菲阿私越錢半

○右調和二瓜為一九衣石松粉每朝服五丸

主治夜發喘ニ通常兼發スル所ノ腹内壅塞ニ宜シ私篤

刺爾氏稀淡加密列泡劑ヲ熱服スルヲ奇方ト稱ス之ヲ

飲服スレハ腹中雷鳴シ嘔氣及ヒ放屁シテ發作速ニ退
久大外...

○第一千三百三十八方 攝列魯

撒爾非亞葉半 迷迭香葉三錢 芥沃刺那葉二錢 注井

水ハ予益閉微温浸漬瀝過加後呆

麻爾羅歇越幾斯二錢 蒲公英越幾斯三錢 蜜去泡沫

右調勻每一時服一食匙

主治羅惆地名ノ地方ニ一種ノ喘息流行ス攝列魯氏其由

ヲ探索スルニ土地ノ濕濡食物ノ性及ヒ木綿製造局ノ

作業ノ致ス所ニ係ルナリ此症上方ヲ用フルニ宜シ又

攝列魯氏ハ阿列蘆及ヒモスベシ果實泡劑ヲ兼服

第二粘液喘アストマ

○第一千三百三十九方 鑲蘆私丁

接骨木花子 滾湯適宜浸漬瀝取ニ予冷定加後藥

至海葱蜜 屋施蔑兒各一 吐酒石

右調勻每一時服一食匙

主治輕証肺焮衝並ニ粘液喘ニ用ヒテ痰ヲ豁利スルニ

宜シ

○第一千三百四十方 弗弗山山

○薤蕪安沒尼亞幾錢二 土木香越幾斯 甘草越幾斯

宜硫黃華錢各一 伊里斯弗祿連底那根錢末半

右調勻二八為一九甘草末為衣每服八九乃至十二九日

一二次

主治喘症肺臟弛弱因ル者之ニ宜シ

○第一千三百四十一方捕綸涅爾

薤蕪安沒尼亞幾錢各一 阿魏錢各一 加雞子黃二箇合和更

加過爾托舍利別半多

右調勻每一時服一食匙臨用宜振盪

主治粘液喘ニ宜シ

○第一千三百四十二方室里列魯

土木香越幾斯錢半 地榆丁幾 甘草丁幾錢各一

丁香幾附二錢 苗香水三 實亞格地温半

右調勻每一時服一食匙

主治粘液質ノ人喘息ニ罹ル者之ニ宜シ

○第一千三百四十三方佛落屈結德

結刺蕪尼子粗到 井水一比半煮濃取一比

右一日服盡

主治喘息欬嗽百日欬ニ宜シ

○第一千三百四十四方 設兒名和胸解凝舍利別

遠西方藥
卷三
九
廣
堂

○薤謨安沒尼亞幾錢 硃砂錢 海葱蜜半 安質沒尼錢

主酒錢 過爾托舍利別四

右調勻食匙抄頻服

〔主治〕久效粘液喘等二宜シ

○第一千三百四十五方〔職歌蘭度〕

海葱錢 勿擲奈亞石鹼錢 薤謨安沒尼亞幾鼠

婦半 拔爾撒謨骨汗 霍適

右二匹為一九衣桂末朝夕服二九乃至四九

〔主治〕喘息水腫腎膀胱ノ疾患二宜シ

○第一千三百四十六方〔同上〕

薤謨安沒尼亞幾錢 西刺昆亞薤謨漿 加苗香水

六子作 乳劑加後味

硃砂加過泥子精錢 海葱蜜 甘草舍利別各一

右調勻每半時服一食匙

〔主治〕喘息粘痰膠凝其シ 豁利シ 難キ 者之二 宜シ

○第一千三百四十七方〔同上〕

阿魏 薤謨安沒尼亞幾 勿擲奈亞石鹼 蒲公英越

幾斯錢 金硫黃刀

右調勻二匹為一九衣石松粉早且午後及晡時服十九

○第一千三百四十八方〔同上〕

蘼謨安沒尼亞幾 亞兒尼加越幾斯 遠志越幾斯

土木香越幾斯 錢各二 海葱 未 金硫黃 各一

右調勻二以為一丸 石松粉每服八九乃至十九日三次

○第一千三百四十九方 同志

土木香越幾斯 錢二 硝砂加過泥子精 半一錢 苗香水 二

右合和每一時服八十滴

主治一千三百四十七方ヨリ一千三百四十九方至粘液

喘ニ宜シ

○第一千三百五十七方 同志

和胸劑 元 葡萄草葉 一 麻爾羅歇葉 各半 苗香水

右細劉供泡劑料

○第一千三百五十一方 延百暴劉私 和胸越栗失爾

土木香 伊里斯弗魯連底那根 海葱 各一 安息香

沒藥 過泥子 甘草膏 精製蘼謨安沒尼亞幾 各半

○第一千三百五十三方 同志

右調勻加再留燒酒一七如法作越栗失爾每服六十滴乃

至八十滴日數次

主治右二方 千三百五十一方 喘息粘液分泌夥多ナル者

之ヲ用ヒテ稍肺ヲ強壯スルノ効アリ

○第一千三百五十二方 穢歇蘭度蔣蘿蔔酒

○蔣蘿蔔屑五 麥酒廿二 益閉冷浸十二時加後味

沙糖舍利別子

右調勻小盞抄服頻々十二時或二十四時服盡

主治小便閉水腫尿道粘液鬱積及粘液喘二宜シ○刺

胃チク私ス人ノ壞血病ニ之ヲ用ヒテ佳効ヲ得タリト

○第一千三百五十三方過。傑。栗。屈。的。兒。

沒藥水製越幾斯 麻爾羅歌越幾斯 精製蘆謨安沒

尼亞幾錢各二 金硫黃錢一 精製甘草膏錢三

右調勻一匁為二九衣石松粉每服四粒乃至六粒日三次

至四次

○第一千三百五十四方同上

阿魏 瓦爾拔奴謨 沒藥水製越幾斯各二 撒爾末

兒秩斯錢一 橙皮丁幾宜適

右二匁為二九衣石松粉每服十二粒乃至十五粒日二次

至三次

○第一千三百五十五方同上

海葱赤 葛私加栗刺越幾斯各二 金硫黃 揮發鹿

角鹽各半 過泥子油六 甘草膏宜適

右二匁為二九衣石松粉早晚服八九

主治一千三百五十三方ヨリ一千三百五十五方至皆老

年虛弱家人粘液喘二宜シ

○第一千三百五十六方弗陽

瓦爾拔奴謨錢二 海葱醋二 弓溶解加後味

苗香水弓二 民埵列里精錢二 甘消石精錢一 遏兒托舍

利別弓半

右調和每服一食匙日四次

主治喘息濕氣二起因セ者殊二老年弛弱惡液質ノ婦人此症二罹ル者之二宜シ

○第一千三百五十七方遏。佛。栗。屈。的。兒。

琥珀鹽弓一 民埵列里精弓二 薄荷水 沙蘿蔔水各三

白糖弓半

右調勻每一時服二食匙

○第一千三百五十八方同上

蓮謨安沒尼亞幾錢一 海葱蜜一 弓溶和加後味

洋芹水弓三

右調勻每一時服二食匙

○第一千三百五十九方同上

精製消石 鼠婦末 杜松子末各一錢 海葱末九

右調勻為散等分九服早旦午後及日晡一服

主治右三方千三百五十九方至八老年弛弱ノ人小便不

利症ニ兼テ水腫及ヒ喘息交發スル者所謂喘息係之小便不利症之ニ宜シ

○第一千三百六十六方 [蜜里列魯]

土木香 越幾斯錢半 地榆丁 幾 甘草丁 幾各一錢 越埵
里和胸丁 幾附二錢 苗香水三 實亞格地温半

右調勻每一時服一食匙

主治粘液喘ニ宜シ ○越埵里和胸丁幾ハ土木香伊里斯弗魯連底那海葱甘草赤珊答里木過泥子沒藥安息香安沒尼亞雜腹蘭右再留燒酒ニ浸漬ル者此劑肺臟粘液鬱積症粘液喘等ノ如キ慢性胸疾ニ四十五滴乃至六十滴

ヲ服スル一劑ニ二次或ハ之ヲ他ノ密幾私丟爾ニ加ヘ用フ然レ唯粘液質ノ人ニ適當スルヲ

○第一千三百六十一方 別連杜

薤護安沒尼亞幾錢二 雞子黃適 苗香水五 礪砂加
過泥子精錢三 安質沒尼亞酒錢二 拔爾撒謨字露舍利別

右調勻每一時服一食匙

主治粘液喘肺臟衰弱シテ咯痰シ難キ症窒息聖京偃

用フ

○第一千三百六十二方 [藏過漸設]

遠西方書 卷十三 廣月堂

遠西方藥 卷之三 粘液喘 廿五 廣脾堂

○白芷^半 滾湯適宜浸漬飽熟八分時瀝過取^八分加後
味

幾那越幾斯^{錢二} 海葱越幾斯^{刀一} 硃砂加過泥子精^{錢一}
右調勻每一時服^一食匙

主治粘液勞及^レ粘液喘^ニ宜^シ

○第一千三百六十三方^{嗽篤} 金硫黃^{心四} 加後味搗

麴謨安沒尼亞幾 硃砂^{各一} 苗香水^{分八} 麗春花舍

○第一千三百六十四方^同 亞刺昆亞^{錢各一} 苗香水^{分八} 麗春花舍

利別^{分一} 非阿私越幾斯^{心四} 苗香水^{分八} 麗春花舍

右調和每半時服^一食匙

○第一千三百六十四方^同 金硫黃^{心四} 加後味搗

默栗薩水 海葱蜜^{各半} 甘草舍利別^{分一}

右調勻早晚服^半食匙

○第一千三百六十三方^同 亞刺昆亞^{錢各一} 苗香水^{分八} 麗春花舍

液喘^ニ宜^シ

第三密兒刺爾喘^ハス^ト羅^ニ 亞刺昆亞^{錢各一} 苗香水^{分八} 麗春花舍

○第一千三百六十五方^{密兒刺爾} 亞刺昆亞^{錢各一} 苗香水^{分八} 麗春花舍

阿魏^{錢二} 民埜列利精^一 溶解加後味

右調和每半時服^一食匙

○第一千三百六十四方^同 金硫黃^{心四} 加後味搗

默栗薩水 海葱蜜^{各半} 甘草舍利別^{分一}

右調勻早晚服^半食匙

○第一千三百六十三方^同 亞刺昆亞^{錢各一} 苗香水^{分八} 麗春花舍

液喘^ニ宜^シ

第三密兒刺爾喘^ハス^ト羅^ニ 亞刺昆亞^{錢各一} 苗香水^{分八} 麗春花舍

○第一千三百六十五方^{密兒刺爾} 亞刺昆亞^{錢各一} 苗香水^{分八} 麗春花舍

阿魏^{錢二} 民埜列利精^一 溶解加後味

綿答幾里私布水三 雜腹蘭舍利別半

○右調勻每半時或一時服一茶匙若一食匙

〔主治〕密兒刺爾喘宜但阿魏灌腸ヲ兼用スベシ百十三

方十二

○第一千三百六十六方 穢歌蘭度催吐舐劑十四至味

吐酒石一 蒸餾水一勺 溶解加後藥

海葱蜜 沙糖舍利別各半 吐根末一

右調勻每八分時與一茶匙以至得吐

〔主治〕多般ノ肺疾。腦病。義膜咽喉焮衝密兒刺爾喘。百日效。

等之二宜シ是管二胃中ヲ掃除スルノミナラズ又鎮瘧

ノ効ヲ呈シ能ク胃腦肺ノ異常交感ヲ治ス

○第一千三百六十七方 穢歌蘭度

阿魏錢二 民埵列利精錢三 亞刺昆亞邁謨漿適 加默

栗薩水三 多作乳劑再加扁桃乳舍利別一 勺

右調勻每半時服一小食匙

〔主治〕初催吐舐劑十 六方 天與レ後此乳劑ヲ用ヒ阿魏

○灌腸十 三方 七 大量麝香。胸上肚腹及ヒ脊椎等ニ鎮瘧藥

ヲ塗擦シ又胸上ニ芥子泥。發疱膏ヲ貼スベシ

○第一千三百六十八方 篤優爾肺面兒

上好麝香三 鹿琥精一 茴香水半 過兒托舍利別

○右調勻每二時服一茶匙

〔主治〕密兒刺爾喘ニ宜シ

○第一千三百六十九方〔遠志〕

〔主〕續草錢三 滾湯適宜泡出瀝取四 乃冷定加後味

麝香八 鹿角精二 橙花舍利別半

右調勻每四分時服二茶匙臨用宜振盪

〔主治〕同上阿魏灌腸ヲ兼用ス

○第一千三百七十方〔帶鋸典利篤〕

安息香花八 硃砂加過泥子精半 安質沒尼酒一

○海葱蜜 遠志舍利別 過兒托舍利別各三錢

右調勻每半時服一茶匙

〔主治〕密兒刺爾喘神經ノ運營沈衰シ窒息ノ懼アル者之

ニ宜シ麝香二三八 乃至四五八 上方ト更換ノ半時毎ニ

用フベシ兼テ香竄藥湯ニ浴シ胸上芥子泥及ヒ發疱膏

ヲ貼スベシ

○第一千三百七十一方〔謨私篤〕

〔甲方〕

玉幾那錢三 井水六勺 煮將熟投續草半勺 絞瀝取三

半加後藥

硫酸規尼捏ハニ 葛私カ 篤ス 樓レ 謨ム 丁ト 幾キ 一一 橙花舍利別ハ 右調勻每半時服一食匙

主治密兒刺爾喘間歇ノ間之ヲ用ヒテ後發ヲ防止スベシ

○第一千三百七十一方〔同上〕

〔乙方〕

葎荂葉ニハ 番木鱉越幾斯ハ 白糖ハ 右調勻為散等分八裏朝夕服二裏

主治同上此方幾那煎ハ 一一 更換シ用フ

○第一千三百七十二方〔篤優爾附並兒〕

阿魏ハ 雞子黃ハ 右加 纈草浸ハ 四ハ 湯ハ 徐ハ 搗爛作乳劑二分供灌腸

主治百日欬密兒刺爾喘ニ宜シ並ニ阿魏ヲ内服セシム

千四百方 千四百一方

○第一千三百七十三方〔葛私百兒〕

芫菁丁幾ハ 複方白芷精ハ 龍腦精ハ 一一 礪砂加石

灰精ハ 香冰ハ 右調勻塗擦胸上及脊推

主治密兒刺爾喘ニ宜シ

第四骨布喘ハ 一一 羅

○第一千三百七十四方 發健私的結魯

青酸鋁亞鉛附 甘汞各半 實芟答利斯末三分 白糖

右調勻為散分十二服日三服

主治 發健私的結魯名之ヲ骨布喘ノ奇方ト稱ス暗小兒

掘地名ノ患篤滿名及ヒ他醫モ亦此効ヲ確徵セリ半歲乃

至一歲兒ノ用ニ供ス

○第一千三百七十五方 患篤滿

亞鉛華 甘汞各一 實芟答利斯末八分 白糖半

右調勻為散分八服每一時一服

主治 三箇月ノ兒骨布喘ニ罹ル者ヲ治ス先耳後放蟻三

頭灌腸法及ヒ胸上脊椎ニ芥子泥ヲ貼スベシ

○第一千三百七十六方 同上

硫酸規尼捏三 茴香水半 橙皮舍利別一

右調勻每一時服一茶匙

主治 骨布喘ニ用ヒテ發作ヲ預防スルニ宜シ

○第一千三百七十七方 同上

硫酸規尼捏六 葭若根末二 白糖錢一

右調勻為散等分六服日三服

主治 骨布喘發作ヲ防止スルニ宜シ患篤滿名上方ニ兼

テ腰椎ノ上頭按シテ痛アルノ部ニ蟻鍼四條ヲ施シ蟻口癒ユルノ后的列並油ヲ温メテ朝夕之ヲ塗擦シ皮表赤色ヲ發スルニ至ル

○第一千三百七十八方(過秘繆斯)

硫酸規居捏ハハ

亞鉛華ハハ

白糖ハハ

四

右調勻為散等分八裏每服一裏日四次

〔主治〕八箇月ノ兒骨布喘ニ罹リテ百方効ナキ者過秘繆斯名此散方ヲ處セリ之ヲ服ノ其發作確著ニ減シニ服

ニメ全ク止之瀕瘦骨立セル患兒一千八百四十二年五月十八日ヨリ七月十七日至法々如夕之ヲ服メ驚クベ

キノ大量ニ至リ規尼捏百九十九ハ亞鉛華四百四十ハヲ盡スト雖之ガ為ニ些ノ害モ亦見ルナク終ニ平愈セリト云フ

百日効ト羅キンキフスト蘭

百日効ハ實ニ小兒ノ固有病タリト雖大人モ亦甚之ニ類似セル劇証痙攣効ニ罹ル者屢之アリ亦鎮痙解釋劑千七百

十九方至千二百九十九方ヲ要ス○小兒真ノ百日効第一期ニ在テハ炊衝性ヲ帶フル者アリ宜ク胸上ニ放蟻シ内服ハ清涼劑即

消石。硝砂。小量甘汞等ヲ與フベシ然レ腸胃瘵物ヲ帶ヒテ聖京僵性ノ者多シ此症解釋劑千三百九十九方至ヲ用ヒ

兼テ和胸舍利別及ヒ吐劑千三百六フ更換シ施スヲ須要

トス○第二期瘧疾ノニ及ビテハ鎮瘧藥ニ宜シ即苦扁桃

水千三百九 靑酸千三百九 阿魏千三百九 菲千三百九 刺屈千三百九 刺屈千三百九 刺屈千三百九

千四百二百二 麝香千四百 至千四百 阿私千四百 刺屈千四百 刺屈千四百 刺屈千四百

祿沙萬草ノ 失鳩千四百 至千四百 葭若千四百 刺屈千四百 刺屈千四百 刺屈千四百

廿二 阿芙蓉千四百 至千四百 謨爾千四百 白頭翁千四百 白頭翁千四百 白頭翁千四百

八方至千四 列儒千四百 留私千四百 烈千四百 煙草千四百 煙草千四百 煙草千四百

卅七方百 等是ナリ然氏麻醉藥ヲ以テ效ヲ制スルヲ得

ル者甚罕ナルガ故ニ過用スルヲ勿レ大量ニ之ヲ用ヒテ

著シク害ヲ致ス者少シトゼハ輒近丹寧千四百 及ヒ結晶

硝酸銀ヲ稱賛ス或ハ硝酸銀ノ効少シト云フ者アリト雖

他病ニ用ヒテ亦駭クベキノ効ヲ奏スルヲアリ又輒近鹽

酸千四百 方百 廢棄スト雖其功用亦最大ナリ蓋此症施治極

メテ簡易法ニ從事スルヲ好トスルヲ猶他病ニ於ケルカ

如シ緩性和胸舍利別ニ安質没尼酒ヲ和用シ又吐藥ヲ互

用スルハ世間ニ通稱スル所ノ諸種ノ奇方ニ優リテ多ク

驗アリ世間稱賛スル所ノ吐酒石膏ハ利益ナキノミナラ

ス却テ小恙之カ為ニ大患ニ變シ或ハ斃ルハニ至ル者モ

亦間之アリ但戒歌蘭度書載スル所ノ緩性吐酒石膏千四百

方十一 或ハ骨布軟膏ニ白降汞ヲ加フカ如キハ六百 適宜

ノ及對刺衝法トス○第三期ニ至リ患兒大ニ虛憊セル者
ハ遠志千四百四十方及ヒ羌青千四百四十方亦用フヘシ千四百四十方
方至千四百四十方而ノ仍効嗽獨衰弱ノ為ニ荏苒除カサル者ハ
幾那千四百四十方規尼捏千四百四十方及ヒ依蘭苔千四百四十方
鎮痙劑ヲ配用シテ功ヲ收ムベシ

○第一千三百七十九方 收失結名和胸丁幾

甘扁桃油新絞 扁桃乳舍利別各七錢 亞刺昆亞各七錢 謹

錢ニ 櫻實水半 右調勻為舐劑茶匙抄服

主治 聖京偃効痙攣効ニ宜シ

○第一千三百八十方 刺胃秘 白糖二錢

金硫黃三錢 阿芙蓉越幾斯二錢 白糖二錢

右調勻為散等分六裏朝夕服一裏

主治 大人痙攣効粘痰ヲ咯出スル者痙衝狀既ニ退

右之ヲ用フヘシ

○第一千三百八十一方 同上

過兒托根各半 點失刺蘊葉各半 井水八勺煮耗至六勺

右調 投菲阿松葉一錢蓋閉飽熟四分時濾過冷定加後味

○藥阿芙蓉舍利別各一錢

右調和服一匙食匙宜從其症消息

主治大人頑固人瘧瘵效宜

○第一千三百八十二方阿山

蜀羊泉鹽越幾斯一錢精製硝砂二錢精製甘草越

幾斯三錢井水七錢

右調和每半時服一食匙強

○第一千三百八十三方頭寧儼秘

吐根未半錢大黃未一錢勿擲祭亞石鹼 葛爾儒別越

幾斯各二錢

右調和二人為一九每二時半服五粒

○第一千三百八十四方

非阿私越幾斯一錢吐根半錢白糖半錢

右調勻為散分八服每二時一服

主治第一千三百八十二方ヨリ一千三百八十四方至大

人瘧瘵效宜シ

○第一千三百八十五方福儼篤

非阿私越幾斯二錢乳糖六錢甘草半錢亞刺毘亞蘆

謨二錢苗香油糖三錢

右調和為散每服一茶匙以過尔托煎送下日三次乃至四

次

○第一千三百八十六方歌儼

○阿芙蓉末 實芟答利斯末 吐根末 菲阿私越
錢半

右調和加亞刺昆亞蘆漢漿少許為丸三十粒衣石松粉玻
 璃壘收貯每一時半服一粒

○第一千三百八十七方骨布
 主治右二方千三百八十五方 大人癩癰效二宜

○第一千三百八十八方速突
 阿魏錢 萬莖越幾斯半

右為八十九衣石松粉每一時服二三九
 老利兒結爾斯水半 蒸餾水半 白糖半

○第一千三百八十八方速突
 老利兒結爾斯水半 蒸餾水半 白糖半

越屑涅魯名 甘汞麻倭涅失亞實 芟答利斯配伍 連

進シテ 綠便甘 得ル後 乃干 莖答方 與フ ○又遠

屑涅魯氏之ヲ預防方トシ患者ノ年紀ニ準メ一茶匙乃

至二茶匙ヲ取り日ニ三服セシム此ノ如ク之ヲ持久ス

ル一 三週ニ至ル

○第一千四百二十三方同上

精製阿芙蓉 吐根末 結兒蔑斯密涅刺列各 三

糖錢 右丁寧調和等分為十二服速志舍利別和服日二三

主治百日咳癩癰ノ時期其極度ニ及ビ膿様粘痰ヲ吐ス

○第一千四百二十三方同上

精製阿芙蓉 吐根末 結兒蔑斯密涅刺列各 三

遠西方藥 卷三十三 百日效 廣勝堂

ルニ至リ莨菪廿四二代へテ此方ヲ用スベシ○小兒

未一歳ニ滿タザル者ハ遠屑温魯氏方中阿芙蓉ノ量ヲ

減殺シ或ハ之ニ代へテ麝香各服半ハヲ加ク上方ヲ服

ノ時ニ嘔吐セザル者ハ他ノ吐藥ト番替シ與ヲヘシ

○第一千四百二十四方藏歌蘭度

麻僂涅失亞各四 硫黃華各四 舍電阿芙蓉液一 白糖

右調勻為散分四服朝暮一服

主治劇証百日效第二期ノ者之ニ宜シ但連進スル下勿

レ○末期ニ至リテ著シク其效ヲ鎮靖スル者ハ阿芙蓉

トス

安質没尼酒錢一 滿那舍利別半

右調和每一時服一茶匙

主治一歳乃至二歳兒ノ百日效及ヒ他病ニ於テ緩下劑

トス

○第一千三百九十三方同上

蜀羊泉越幾斯錢半 孕鹼酒石半一錢 苗香水三 溶解

加後藥

安質没尼酒錢一 過兒托舍利別錢六

右調勻每一時服一茶匙

主治四歳乃至五歳兒ノ百日效ニ宜シ○蜀羊泉越幾斯

廣勝堂

遠西方書 卷一 百日效 鹿角鹽 和胸舍利別

左量加増シテ二刃ニ至ルモ可ナリ
○第一千三百九十四方 湯ニ葛爾度

甘扁桃油錢六 苗香水四 鹿角鹽一 和胸舍利別半

右調勻小兒每一時服二茶匙大人服一食匙

主治百日效ニ宜シ○總テ乾效短ニノ離雞聲ヲ帶ビ所

謂勞效ニ類似シ而ノ胸中恰モ絞窄スルガ如キヲ覺ユ

ル症並ニ其症依朴昆垚兒及ヒ歇倚私的里家ニ發スル

者モ亦弗陽名八ニ此方ヲ用フト云フ外餘ニ亦マ下

○第一千三百九十五方

苦扁桃水一 菩提樹花水二 過兒托舍利別半

右調勻每一時服一匙布匙

主治小兒百日效ノ初起ニ宜シ

○第一千三百九十六方

青酸二 過兒托舍利別 蒸餾水各一

右調和內玻璃壘黑紙被覆每一時半服一茶匙

主治八歳乃至十歳兒ノ百日效痙攣ノ期ニ宜シ○青酸

ハ諸藥局ノ製法一ナラザルガ故ニ其性强弱ノ異アリ

是ヲ以テ青酸ヲ處スル片ハ能ク其製法ヲ確定スルヲ

最要トス

○第一千三百九十七方 骨刺

遠西本草
百日效
藥
廣
堂

○阿魏錢一 亞刺昆亞蘆一 過見托舍利一
右調勻每一時服一茶匙

主治小兒百日效宜シ○以為之阿魏ハ補給機ヲ減

殺メ以テ終ニ瘰癧ヲ除クノ効又萎スルナリ没私穀優

ノ發作減スルヲ得ル地ノ貯狐名ハ之ヲ連進スルヲ數週ニメ始メテ稍效嗽

患者ハ阿魏ノ為ニ發熱セルガ故ニ之ヲ停メザルヲ
得ザリシト云フ
○第一千三百九十八方同上
阿魏錢二 加民垓列利精一 搗爛投後味

綿答幾里私布三 雜腹蘭舍利別
右調勻每半時乃至一時服一茶匙乃至一食匙

主治百日效宜シ但阿魏灌腸千四百方 千ヲ併用シテ

以テ本方ハ効ヲ佐クベシ
○第一千三百九十九方同上

阿魏一錢 亞刺昆亞蘆漿
右為三十九衣伊里斯弗魯連底那末日服六丸以果實母

斯少許送下
主治百日效宜シ小兒驚風一四之

○第一千四百方

遠西效驗 卷十三 百日效 廣利堂

○阿魏六八至 加密列浸一 亞刺毘亞蘆謨宜適

右研和為三歲已下小兒灌腸一回之料

○第一千四百一方

阿魏半一錢 續草浸四至三錢 亞刺毘亞蘆謨宜適

右研和為三歲已上小兒灌腸二回之料

主治右二方四百方 百日效密兒刺爾喘總テ痙攣症

ニメ諸液循行遲鈍ヲ兼ヌル者ニ宜シ千三百七十二方

○第一千四百二方樓屈篤兒

哥攝尼爾一 酒石鹽一 白糖一 熱湯六

右調勻每服一茶匙日三次

侃私担篤治療書亦此方ヲ舉ク而メ小差アリ方中酒石

鹽ニ代ヘテ或ハ純精酒石一刃ヲ伍シ服法モ亦琶布匙

ニテ抄セ頻服メ十八時内ニ之ヲ盡ス下云フ

○第一千四百三方辨涅志都

哥攝尼爾一 酒石鹽一 熱湯半一 沙糖舍利別一

右調勻茶匙抄服十二時内二次服盡

主治百日效ニ宜シ○其症聖京候ノ時期吐劑ヲ忌マザ

ル者ハ先之ヲ與ヘ后哥攝尼爾ヲ用フル上法ノ如ク

スベク

○第一千四百四方蓬利私

遠西效驗 卷十三 百日效 廣利堂

西苑齋
卷十三
百日效
廣
堂

○上好阿芙蓉半 上好麝香三 亞刺毘一 亞薤一 白糖二

右調勻為散分六服每一時半一服
主治十歲乃至十二歲兒百日效無熱症用フヘシ

○第一千四百五方鳩層
上好麝香半 金硫黃 亞鉛華各半 白糖五

右調勻為散分八服每一時一服
主治百日效患者大ニ衰弱スル者之ニ宜シ

○第一千四百六方篤優爾肺亞兒
上好麝香半 加鹿琥精一 刀徐一 搗和更加後味

苗香水半 過兒托舍利別一

右調勻每一時服一茶匙臨服宜振盪
主治百日效及ヒ小兒瘰癧症ニ宜シ

○第一千四百七方謨私篤
麝香東方產 金硫黃 吐根赤各 亞鉛華 菲阿私

越幾斯各六 白糖半
右調勻分十二服每一時一服

主治百日效ニ宜シ○謨私篤名麝香ヲ用フル時ハ之ヲ
大量ニス虛弱ノ兒全身搐掣ヲ兼ヌル者ニ最稱用セリ

○第一千四百八方墮兒私悞篤

麝香ハ 桂油糖ハ

右調勻為散蠟紙包裹安心窩

主治百日效預防ノ効アリ

○第一千四百九方

菲阿私越幾斯ハ 安質没尼酒半ヲ溶化

右調和每服八滴乃至十滴日四次

主治百日效ニ宜シ○五六歳児ノ用ニ供ス

○第一千四百十方白母布列屈篤

刺屈點私非祿沙越幾斯ニハ至四ハ 乳糖ハ

右調勻為散分ハ裏每服一裏日四次

○主治同上○鎮靖藥トシテ卓越ノ効アリ劇症モ亦之ニ

○第一千四百十方票屈的兒

失鳩答越幾斯ハ 苗香水ニヲ溶解加後藥

阿芙蓉加安息香酸丁幾附三

右調和每服一茶匙日四次

主治同上殊ニ其症療癒ヲ來ル者ニ宜シ

○第一千四百十二方

吐酒石ハ 失鳩答越幾斯ハ 蒸餾水ニヲ乃至四ヲ

融解加覆盆子舍利別半ヲ

遠西藥房
卷三
百九
廣月堂

右調勻每一時服一茶匙

主治百日欬ニ適當ニ密幾私去爾粉水ニ至四

○第一千四百十三方母壹過孫滿

失鳩荅葉末其開達格碌屈私末爾秧斯各一健質安

本那越幾斯適者

右為百二十九夜石松粉初臨卧服二九乃至四九後漸加

十二九乃至十六九苗香水ニ至

○主治慢性刺衝欬殊其症廿歲已上ノ兒ニ在テ肺ニ焮

衝ヲ帶フルナキ者ニ宜シ

○第一千四百十四方穢歌蘭度

葭苕越幾斯四濃厚苦扁桃水半ヲ溶化

右每服二十滴日四次

主治百日欬ニ宜シ○其症稍熱ヲ帶ヒ或ハ焮衝ヲ夾ム

者及ヒ頭腦血鬱アル者ハ皆葭苕適當ナラズトハ葭苕

ハ至テ微量トイヘ氏善ク欬嗽ノ痙攣ヲ鎮靖ス之ヲ服

ノ面色煩紅并ニ腦ノ運營亢盛ノ状アラバ速ニ後服ヲ

停ムベシ

○第一千四百十五方同上

葭苕根一白糖錢一

右調勻為散分八服早晚一服

遠西方藥 卷十一 百日效 廣厚

主治二歲乃至四歲兒入百日效第二期瘧期二用之佳

○第一千四百十六方蓮利私

甲方

葶藶根ハ 精製阿芙蓉ハ半 白糖ハ八

右調勻為散分八服朝夕一服

○第一千四百十六方同上

乙方

的里亞加ハ 葶藶根ハ 阿芙蓉丁幾ハ各一 亞刺昆亞ハ

蓮謨ハ 常水ハ 普品料ハ

右作煉膏攤革貼心窩

○第一千四百十六方同上

丙方

過兒托葉ハ 蜀羊泉ハ 甘草ハ各半

右細剉供泡劑料

主治蓮利私右三方百用效二兼用之每二良効ヲ得夕

リト云ハ 叙黃華ハ 熟酢ハ 面香曲ハ

○第一千四百十七方朴瀝私

葶藶越幾斯ハ 菲阿私越幾斯ハ各三 海葱蜜ハ半 過兒ハ

托舍利別ハ 茶步調用ハ

廣半堂

遠曲方書 卷十三 百日效 廣用

右調勻每一時服一茶匙臨用宜振盪

主治八歲兒百日效宜宜宜宜宜宜

○第一千四百十八方福保篤

菖若根五錢 硫黃華一錢 純精酒石五錢 苗香油糖二錢

右調勻為散分十裹每一時半乃至二時取一裹過兒抱煎送下送下

主治十歲兒百日效宜宜宜宜宜宜

○第一千四百十九方施倚迷詩爾

菖若根五錢 阿魏半錢 蜀羊泉越幾斯

古二效青機草故

右調勻二八為一丸衣甘草末每服三丸乃至五丸顯草淡浸劑送下日三次

主治百日效第二期者之宜宜

○第一千四百二十方骨布

菖若根二錢 吐根一八半 硫黃華 乳糖各半

右調和為散分八服密紙包裹每服一裹沙糖水送下日四次

主治三四歲兒百日效宜宜○菖若ノ量漸增加

可ナリ

○第一千四百二十一方福保篤

菖若根五錢 阿魏半錢 蜀羊泉越幾斯

遠西方藥 卷三十一 百日效 廣野堂

○莨菪葉二十注熱湯適宜飽熟四分時乘溫漉取二勺

冷定加後藥

安質沒尼酒錢一遠志舍利別錢六

右調勻每服半食匙強日三四次

主治十歲兒人百日效宜其症聖京候之時期之熱アル者

○第一千四百二十二方越肩熱湯適宜浸濾過取四勺冷定

莨菪葉各半莨菪根各半熱湯適宜浸濾過取四勺冷定

加扁桃舍利別半勺

右調勻昼夜每一時服一茶匙乃至二茶匙

主治百日效宜其症聖京候之時期之熱アル者

右調和每一時乃至一時半服一茶匙

主治右二方千三百八十七方上二同千三百八十八方

○第一千三百八十九方弗萬苴越幾斯一亞刺昆一亞趨謨漿適丁寧搗和加後

件 萬苴越幾斯一亞刺昆一亞趨謨漿適丁寧搗和加後

井水六覆盆子舍利別半

右調勻每一時服二食匙

主治瘧瘵效不眠歇倚私的利宜

○第一千三百九十方叔泥姪爾鎮瘧丸

阿魏各續草各亞鉛華一葛私篤二良苕

葛私篤二良苕

越幾斯八五 加密列越幾斯宜適

右二八為一九每服五丸乃至八九日三次

主治大人百日效及ヒ他ノ痙攣病ニ宜シ

○第一千三百九十一方穢歌蘭度

孕驗酒石錢一 苗香水半 滿那舍利別一 海葱蜜錢二

安質沒尼酒滴二十 非阿私越幾斯八二

右調和為舐劑每一時服一茶匙

主治二歲乃至四歲兒百日效ノ第一期ニ用フベシ

○第一千三百九十二方阿山

孕驗酒石半一錢 苗香水二弓溶解加後藥

ヲ以テ最トス然レ頭旋昏睡其他險重ノ證狀ヲ發シ易

ク或ハ患者ヲ斃スニ至ル故ニ用ニ臨テ最謹慎ヲ加フ

ヘシ但極メテ小量ニ與フルヲ許スルニシ

○第一千四百二十五方

阿芙蓉加安息香酸丁錢二

右每服五滴乃至二十滴過兒托舍利別和服日二三

主治三歲乃至六歲兒ノ百日效ニ宜シ

○第一千四百二十六方弗陽

阿芙蓉八二 結兒茂斯密涅刺列八四 鹿角鹽八 白糖

遠西方彙 卷十三 百日效 三五 廣胖堂

右調勻為散令八裏每服一裏或八日二三次

主治六歲乃至八歲兒ノ百日效ニ宜シ然此服量稍過

多ナリトス

○第一千四百二十七方（遊詩爾）

醋酸莫爾比捏ハ半白糖ハ二

右研和分六裏貼發疱硬膏剝表皮每晚撒敷一裏

主治百日效ヲ治ス甚稱譽アリ佛留母ハ人及ヒ格列魯ハ同

其効ヲ確定セリ○蓋賢垓兒麻質斯法トイヘ此亦甚害

又招キ易キカ故ニ用ニ臨テ最謹慎ヲ加ヘシ

○第一千四百二十八方（羅遠和的印標別取）

白頭翁越幾斯ハ二ハ至續草ハ二十四ハ至苗香油糖

刃四

右調勻為散令八服蠟紙包裹日三四服

主治百日效痙攣ノ時期之ニ宜シ○屑矣突列爾ハ人及ヒ

婪ハ同モ亦之ヲ賛美セリ殊ニ婪氏ハ阿芙蓉効ナキ症モ

亦之ヲ稱用セリ窒息効ノ如キモ之ヲ用フル一二日

ニシテ即鎮靖ハ服量二月乃至六月ノ兒ハ每服四分ハ

乃至半ハトス一歳已上ハ一ハ七歳ニ至レバ一ハ半皆

沙糖ニ和用スル一日ニ三四次粘液夥多ナル者ハ海葱

蜜一茶匙宛與ヘテ以テ吐ヲ得ルニ至ル

遠西方彙 卷十三 三五 廣胖堂

百日期
廣
財
堂

○第一千四百二十九方 層矣突列爾

白頭翁越幾斯三六至六六 乳糖一錢

右調勻為散分六服早晚一服

主治 百日效宜

○第一千四百三十方 春姪隣

列儒謨賴留私葉三錢 睡菜葉半 熱湯適宜浸漬瀝取

六弓加蘆根流動越幾斯一弓

右調勻每一時半服一食匙

○第一千四百三十一方 速別倫歌權

列儒謨賴留私葉半 滾湯適宜浸漬瀝取六弓先落菲

阿私越幾斯六弓乃至十弓後加後藥

甘草膏越栗失爾附二錢 遠志舍利別

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

主治 右二方千四百卅一方 千百日效二宜シ○隣涅名人が證

徵 據ルニ列儒謨賴留私ハ私屢田名國ノ醫始メテ試驗

七シ所ト云フ

○第一千四百三十二方 瀝瀉瀉兒

藥吐根四 旃那二錢 列儒謨賴留私葉一 熱湯適宜浸

飽熟米時漉取四弓溶白糖一弓冷定再加後藥

古礪砂加過泥子精錢

連西方藥 卷十三 百日效 三七 廣胖堂

右調勻每一時服半食匙臨服宜振盪

主治百日效宜

○第一千四百三十三方

煙草葉半 熱湯適宜飽熟冷定瀝過取八勺加後藥

扁桃舍利別

右調勻每半時服一茶匙

主治一歲兒ノ百日效宜シ四歲乃至六歲兒ハ每服

二茶匙八歲乃至十歲ハ每服一食匙トス

○第一千四百三十四方

煙草葉二 吐酒石一 亞刺毘亞護 白糖二

右調勻為散分二十服每一時一服

主治百日效宜

○第一千四百三十五方

煙草葉越幾斯二分 苗香油糖半

右調勻為散分十二服日三四服

主治百日效ニ用ヒテ卓越ノ効アリ脈管ノ興奮機亢盛

セル者ハ小量甘汞ヲ配シ粘痰利シ難キ者ハ小量金硫

黄ヲ伍用ス

○第一千四百三十六方

煙草葉越幾斯三 蜀羊泉越幾斯半 肥束布水苗香

遠西方藥 卷十三 百日效 廣胖堂

水各半ヲ溶解加後藥

○甘海鹽精半 六分 糖味飽

右調勻每服二十五滴乃至四十滴遠志舍利別和服日三

次

〔主治〕百日效ニ宜シ

○第一千四百三十七方 附設爾

煙草葉錢一 白芷錢三 甘草半

右熱湯適宜浸漬漉取入手每四分時之三服一食匙

〔主治〕百日效。癩癩。麻痺。其他頑滯神經病ニ宜シ

○第一千四百三十八方 別連杜

亞鉛華三 至六 纈草 白糖各半

右調勻為散分六服每一時半一服

〔主治〕百日效。瘧癰。期ニ宜シ

○第一千四百三十九方 附設

海鹽精錢二 蒸餾水六 沙糖舍利別一

右調勻每半時服一食匙

〔主治〕大兒百日效ニ宜シ。殊ニ其症焮衝證既ニ退キ獨神

經力及ヒ補給機ノ變常ノ証神經力感ニシテ胃中粘液膜ノ運營減退セル者

是ナラ見ハス時期此方奇効アリ。但嬰兒ハ海鹽精適當

ナラス初室兒名之ヲ用ヒテ病ノ時期ニ拘ハルナシ

唯煥衝ノ期ニ於テ絶エテ之ヲ用ヒサルノミ○骨布名人
之ヲ用ヒテ鴻益アリシ者往々之アリト云蓋百日效ハ
殆諸藥効ヲ奏シ難キノ久病タリ而メ海鹽精ノ功用此
ノ如ク其レ偉ナリ恐ラクハ當今醫流之ヲ忘失セルナ
ラン

○第一千四百四十方職風秘

精製丹寧一八至三八 乳糖半

右調勻為散分八服每一時乃至二時一服

主治百日效ノ見虛弱ニメ粘液質或ハ惡液質ノ者失血
及ヒ下利ヲ合併セル症ニ用フヘシ但煥衝証ハ丹寧ヲ

忌ハ○疔名狐名九歳乃至十一歳ノ兒十人ニ之ヲ試驗セ
リ服量始メ每服半分日ニ四次漸ク加ヘテ一分ニ至ル
其中十歳ノ女効嗽頻々劇發咯痰血ヲ交ユル者獨速驗
ヲ呈シ十四日餘ニシテ全治ス然レ他兒ハ皆毫モ發作
減セズ經過モ亦更ニ速ナル者ヲ見ズト云フ
○第一千四百四十一方遠突

遠志錢 井水適宜煮濾過取四分冷定加後藥

安質没尼酒ニ 過見托舍利別子

右調勻每一時服一食匙

主治百日效第三期痰ヲ豁利スルニ宜シ

遠西本草 卷之三十一 百日效 廣勝堂

○第一千四百四十二方〔春煙隣〕

遠志半錢 常水適宜浸漬飽熟半時漉取四溶化炭

酸刺篤亞斯一刀垂刺毘亞蘆謨末一錢又加後味

過見托舍利別半一方

○右調勻每一時服一食匙

〔主治〕百日效焮衝證及七熱退夕ノ後之ヲ用ス

○第一千四百四十三方〔戒歇蘭度〕

芫菁未半錢 甘扁桃去皮 溫水引 白糖半

右調勻作乳劑每一時乃至一時半服一食匙

〔主治〕百日效ノ末期咯痰粘膠ニシテ效嗽衰弱ヲ存スル

力為久夕退カサル者之ニ宜シ

○第一千四百四十四方〔彌結魯〕

芫菁半 甘扁桃去皮 白糖錢

右先大理石臼研和後徐々注溫水五引作乳劑濾過但不

用絞○每一時半乃至二時服半食匙乃至一食匙須準年

齡消息

○第一千四百四十五方〔遠突土〕

芫菁粗末 白糖半 亞刺毘亞蘆謨末 丁寧研和徐

○第一ノ加後味

甘扁桃乳五

遠西本草 卷之三十一 廣勝堂

右調勻每服半食匙乃至一食匙日四次

○第一千四百四十六方鵬格魯杜

幾那茶褐色者半勺井水五勺煮濃取三勺冷定加後藥

芫菁丁幾 舍電阿芙蓉液各十滴 扁桃舍利別一

右調勻每服半食匙日四次

○第一千四百四十七方同上

芫菁丁幾半錢 安質沒尼酒錢二

右調勻每服二十滴粘汁點服日四次

主治千四百四十四方ヨリ千四百四十七方至百日效ノ

末期ニ用フ此期ニ在テハ芫菁殊効ヲ稱ス按スルニ芫

菁ハ腎臟ニ反對刺戟ヲ起シテ以テ胸腹ニ涉ル神經ノ
機運ヲ轉變セシムルナリ但之ヲ用フルハ尤小心ヲ要
ス

○第一千四百四十八方穢歌蘭度

硫酸規尼捏三六至六六 白糖一錢

右調勻為散分六服朝夕一服

主治百日效ノ第三期已ニ至テ二週ヲ經テ後熱去リテ獨

衰弱ヲ存スルガ故ニ欬嗽連綿退カザル者之ニ宜シ此

期ニ在テハ規尼捏ト鎮痙藥ト配用スルヲ最適當トス

殊ニ其症著シク間歇スル者ハ規尼捏更ニ鴻益アリ

○第一千四百四十九方

依蘭苔 甘草 各半

常水適宜煮漉取七方加白糖六

右調勻每二時服一匙若二食匙

主治百日效粘液分泌夥多ニノ且久シク退カザル者後

治法トシテ之ヲ用フヘシ

○第一千四百五十方 穢馱蘭度

依蘭苔傑列乙半 甘草舍利別一

右調勻每二時服一茶匙

主治百日效ノ後治法トシテ之ヲ用フヘシ

○第一千四百五十一方 同上

吐酒石錢一 家猪脂半

右調和作軟膏每日取豆大塗擦心窩

主治百日效第二期ニ方リテ反對刺戟法トシテ之ヲ用

フ○鑿典利篤名ノ軟膏之ヲ小兒ニ用フルハ猛烈ニ過

ク骨布名ガ白降永膏ハ六百卅稱用スベシ

遠西方彙 卷十三 百日效 三 廣 月 堂

右調子每二時服一匙... 骨中... 神膏... 水調... 百日效... 廣月堂

遠西方彙卷之十三

遠西方彙卷之十四

獨乙 加。幾。安。頓。著 傑。婆。都。譯

侍醫法眼貫齋伊東 貞文仲 重譯

南洋伊東 亨 健夫 參校

吃逆 スシ ンギ ュル ンキ ンチ

此症ハ普ク世人悉知レルガ如ク横膈膜痙攣様ニ短促牽引ヲ頻發スルナリ其症過食急餐或ハ輕易ノ聖京屈ニ因テ起ル者ハ微患ニメ多クハ頓ニ治スル者アリ然レ若日

遠西方彙

卷十四

廣月堂

ヲ延キ週ヲ逐ヒ或ハ月ヲ累ヌル片ハ尋テ危險ノ症ヲ發
シ或ハ斃ルハニ至ル者アリ熱病或ハ内部焮衝ニ起因ス
ル者ハ極メテ重症トス○通常ノ吃逆ハ呼吸ヲ歇メテ極
メテ吸氣ヲ内ニ保持シ些ノ冷水ヲ徐々ニ飲下シ或ハ沙
糖一塊ヲ含ミ徐々ニ融解セシメ以テ之ヲ治スルニ足レ
リ或ハ卒然驚駭等ノ事アリテ驟ニ心思ヲ轉スレハ即休
スル者モ亦間之アリ或ハ嘔噎ノ如キ激動ヲ挑起ノ即効
ヲ得ル者アリ故ニ非扑葛刺ホカ的カ私ス名ノ弗ホ忽フ弗フ滿マ同ト等ハ愛藥
ヲ用フ又吐藥及ヒ催吐劑十四百五ヲ用ヒテ頑固ノ吃逆
良効ヲ得ル者多シ又冰粒珠二硫酸十四百五ヲ奇藥ト稱

延日方書
卷十四
吃逆
廣
丹
堂

又阿芙蓉ホ菲阿ホ私ス葛私ス篤ト儂ム麝香セ良莖リ曼陀羅華マ亞鉛華ア
硝酸毘私ス繆ス篤ト等ノ如キ鎮痙藥殊効アリ外用ハ胃部乾角
法芥子泥發疱硬膏ヲ貼シ或ハ吐酒石軟膏及ヒ他ノ刺戟
藥鎮痙藥ヲ塗擦シテ妙ナリ全身浴モ亦甚聲價アリ

○第一千四百五十二方的失結百
金硫黃八 亞鉛華二 精製消石三 白糖一

右調勻為散分十八服日六服
主治的失結百八吃逆ニ之ヲ用ヒテ佳効ヲ得シ者多シ

○第一千四百五十二方藏魯達地叔瀝煙爾
收斂亞的兒二 錢六 覆盆子舍利別六 錢六

卷十四
方書
延日
方書
卷十四
吃逆
廣
丹
堂

右調和每四分時取六十滴水三食匙點服

主治頑固吃逆ニ宜シ○或ハ叔泥姪爾氏間越栗失爾茂

印失屈篤附ニ水多量ヲ加ヘテ稀淡ニシ以テ施用セシ

下アリ兩方ノ効迅速ニシ且持久セリ○又順侃名ハ硫

黃精ヲ用ヒテ以テ良驗ヲ得ル者屢之アリ調藥格蒲仙

名人モ亦骨片法健地ノ病院ニ於テ之ヲ用ヒ同効ヲ得夕

リト云フ

○第一千四百五十四方弗西暴兒土

硃砂加遏泥子精錢

刺賢埴兒精弓

右調和塗擦

主治小兒吃逆稽留セシ症ニ宜シ

胃瘧カハシカスシアルギコガストラルギノ野

胃瘧ノ治モ亦醫ノ專着眼スベキ者其原因ニアリ畜血或

ハ慢性嫩衝ニ原ツク者ハ胃部ニ放蟻或ハ其症ニ從テ

肛門若クハ婦人陰部ニ之ヲ施スヲ須要トス或ハ放血ヲ

要スル者モ亦往々之アリ腸胃惡物ヲ掃除スベキ者ハ解

釋緩下ノ劑ニ宜シ門脈系ノ畜血ニ因ル者モ亦同方法ヲ

處メ可ナシ又此ノ如キノ症ハ孕驗酒石ニ解釋苦味ノ越

幾斯ヲ配スル者五十五方五十二方及ヒ複方那昆設爾弗附

卓越ノ効アリ倭麻質斯ニ因ル者ハ内服雙鸞菊越幾斯百六

外用芥子泥發疱硬膏或ハ吐酒石軟膏六百廿五方及

其他ハ反對刺戟法六百廿九方至六百廿九方至六百廿九方至

作者ハ麻屈涅失亞六百廿九方及其他ハ制酸劑至千四百五十五方又

用上後苦味藥宜之神經過敏係ル者ハ鎮痙藥宜之

殊ニ亞硝酸毘和繆篤ヲ以テ最品トス千四百六十七方至

又青酸鍍亞鉛附千四百七十九方青酸亞鉛附千四百七十九方

酸銀千四百八十三方莖若千四百八十四方至千四百八十四方番水鼈千四百

百八十八方等殊効ヲ奏スル者ア諸種ノ塗擦藥九十三

九方至千四百及七硬膏千四百九ハ内服藥ヲ佐ケテ亦効ア

トス

リ蓋シテ戒シ攝生ヲ節セサレバ全功ヲ収ムル者罕ナリ

トス

吾又此ニ大人胃軟化症アガストロムムヲ略述ス此症ノ

監別並ニ其原由ヲ探究スルト未詳明ナラス治法モ亦確

實ナラス蓋腦病及ヒ脊髓病結節腫神經熱等ニ繼發ス而

ノ其腦病脊髓病モ亦慢性胃病ノ末期ニ繼發スル者トス

○輓近胃軟化症ノ主方トシテ丹寧酸ヲ稱用ス

○第一千四百五十五方穀優蘭葛

吐根赤曹達乾枸橼根末各二

右調勻為散分ハ服每朝一服

主治胃脘酸敗液並二腸胃衰弱ヲ兼ル者之ニ宜シ

○第一千四百五十六方弗栗結

過炭酸曹達 勿擲祭亞石鹼各二錢 亞硝酸毘私繆篤

蘆薈越幾斯三錢

石調勻一尺為一九衣石松粉每服八粒日三次

主治胃脘及ヒ疝痛酸敗液及ヒ膽液分泌ノ失常等ヲ兼

又ル者之ニ宜シ

○第一千四百五十七方護私篤

亞刺毘亞薹謨 甘扁桃油各六錢 加密列水 薄荷水

各三錢 麻屈涅失亞三錢 水製大黃丁幾 實亞格地焜

各一錢 忽弗滿一錢

右調勻每一時服一二食匙臨服宜猛力振盪

主治胃脘酸敗液ヲ兼ル者之ニ宜シ

○第一千四百五十八方過傑栗屈的兒

括夫亞屑半錢 石灰水六錢浸飽熟十二時後暫時煮沸

瀘過加後藥

薄荷水二錢 橙皮舍利別半錢

右調勻每一時服一食匙

主治胃脘胃中ノ酸敗液ニ原ツク者之ニ宜シ

○第一千四百五十九方

伯漢名複方扁桃乳

菲阿斯子錢一

甘扁桃去皮半錢

稀淡苦扁桃水八錢

已上作乳劑濾過加後味

白糖六錢

煨製麻屈涅失亞一錢

右調勻每一時服一食匙強臨用宜振盪

主治此方胃症及嘔吐胃ノ感覺過敏及ヒ酸敗液ニ因

ル者ニ屢試驗セリ○先菲阿斯子ヲ搗碎シ後扁桃ヲ加

フルヲ好トス然ラサレハ搗糊ノ間菲阿斯子杵子ヲ適

レ易シ○又櫻實水ヲ以テ扁桃水ニ代ルモ可ナリ

○第一千四百六十方〔堙。霸憫〕

（甲方）

蝟蝟石半錢

薄荷油十滴以沙糖

薄荷油丁幾附

薄

荷舍利別各一錢

舍電阿芙蓉液半錢

薄荷水八錢

右調勻每一時乃至一時半服二食匙

主治胃瘕ニ宜シ○魚百弗蘭屈名之ヲ霸憫氏ノ一奇方

トス兼テ左ノ硬膏ヲ胃部ニ貼ス

（乙方）

刺佛達尼硬膏附一錢半

龍腦

阿芙蓉各半刀 拔爾撒

謨字露宜適

右作硬膏

○第一千四百六十一方〔湯。傑。栗屈的兒〕

○阿魏錢一薄荷舍利別一多溶解加後味
薄荷水八

右調和每四分時服一食匙以至胃瘕鎮定

○第一千四百六十二方風私篤魯弗地邊兒別爾私

阿魏半 亞硝酸毘私繆篤 纈草油各半

右二氏為一九衣橙皮末每一時服五丸

主治右二方千四百六十一方胃瘕風脹二因ル者二宜シ

又阿魏灌腸ヲ兼用スベシ千三百七十二方

○第一千四百六十三方過傑栗屈的兒

硝砂揮發華水附 加密列舍利別各六 加密列水三

右調勻每四分時服一食匙以至胃瘕鎮定

主治胃瘕冒寒二因ル者之二宜シ兼テ心窩ニ發疱膏ヲ

貼シ或ハ硝砂揮發加龍腦阿芙蓉膏或ハ捲埴兒精加羌

菁丁幾ヲ塗擦ス

○第一千四百六十四方弗陽

瓦爾拔奴謨 牛膽各半 越質屋布斯安質沒尼錢一

失鳩答越幾斯錢二 白石鹼半

右調勻二氏為一九衣石松粉朝夕服二十粒

主治胃瘕局處ノ疾患ニ繼發スル者之二宜シ○陽名白

ラク近頃一婦人胃痛劇甚ニシテ吐逆便秘ニ心痛脊ニ

徹ノ灼クガ如キヲ覺ユル者此九子ヲ用ヒテ治セリト云フ○按スルニ此方服量過多ナリトス初朝夕十九ヲ與ヘ後漸ク加ヘテ二十九ニ至ラハ則佳ナリ

○第一千四百六十五方（刺骨秘）

吐根末五錢 大黄末半 達刺ト 儼ト 篤ト 蘧ト 護ト 漿ト 宜適

右為二十九衣桂末朝暮服一二九

〔主治〕腸胃ノ衰弱及ヒ痙攣症ニ宜シ

○第一千四百六十六方（骨疝）

吐根末八錢 格綸僕越 幾斯乾固者 燒酒宜適

右為四十九衣菖蒲根末每一時服一九

〔主治〕胃部壓迫疼痛膨脹ニ宜シ（骨疝）

○第一千四百六十七方（刺骨秘）

吐根末二錢 亞硝酸毘私繆篤十六錢 麻僞溼失亞 錢二

右調和為散分十二服日三四服

〔主治〕倭麻質斯性神經性胃痙失血セントスル者ニ宜シ

○第一千四百六十八方

亞硝酸毘私繆篤三六錢 麻僞溼失亞 白纈草油

糖半

右調勻為散分六服蠟紙包裹日三服

○第一千四百六十九方（刺骨秘）

亞硝酸毘私繆篤十二分至五分薄荷油糖刀半

右調勻為散分六服每一時一服三服

○第一千四百七十方朴滌粉

亞硝酸毘私繆篤十二分至五分姜八分牡蠣味白糖錢二

右調勻為散分八裹每服取一裹加密列或薄荷泡劑和用

日二三次

○第一千四百七十一方秘拔爾託

亞硝酸毘私繆篤刀半續草越幾斯錢一續草油滴十續草宜未適

右為六十九衣

玻璃壘收貯每服六九日三次

○第一千四百七十二方戒歌蘭度

亞硝酸毘私繆篤二分菲阿私越幾斯一分麻俚涅失亞

加耶普的油滴一白糖刀一

右調勻為散分十二服日三服

○第一千四百七十三方骨布

亞硝酸毘私繆篤三分至二分刺屈黥私非祿沙越幾斯高

麻俚涅失亞四分吐根至半分加密

列油糖或薄荷油糖刀半

右調勻為散分十二服日三四服

主治千四百六十八方ヨリ千四百七十三方至胃瘰ノ試

驗方トス

○第一千四百七十四方〔福俣篤〕

亞硝酸毘私繆篤ハ 番木鱉越幾斯各半 麻俣涅失亞

三白糖ハ 薄荷油滴三

右調勻為散分十二服蠟紙包裹每一時半取一裏加密列

泡劑和服

〔主治〕感覺敏捷ノ人胃瘕ニ宜シ

○第一千四百七十五方〔私葛爾老〕

亞硝酸毘私繆篤ハ 荳蔻越幾斯六分ハ一至

大黃末三ハ至六ハ 白糖半

右調勻為散分十二服日三服

〔主治〕之ヲ服スルヲ十二裏乃至十六裏ニノ通例胃瘕ヲ

治スルニ足レリ然レ爾後仍毎日一裏ヲ與ヘテ以テ再

發ヲ防遏スルヲ好トス○之ニ兼テ心窩或ハ心窩ニ對

面ノ脊椎ニ芫菁膏ヲ貼スベシ若其症倭麻質斯ノ致ス

所ニ由ル者ハ更ニ妙トス

○第一千四百七十六方〔好弗〕

亞硝酸毘私繆篤六ハ 荳蔻根末六 大黃末二錢

甘草越幾斯 蒲公英越幾斯各適

右二ハ為一丸衣石松粉玻璃壘收貯每服三九日三次

主治胃瘕極之頑固ノ症先解釋劑ヲ用ヒテ後之ニ宜

シ並ニ胃口硬結腫ヲ生スル者始メ之ヲ用フ○叔泥姪

爾ル此丸ノ功用ヲ確定セリ名

○第一千四百七十七方〔新製私〕

亞硝酸毘私繆篤四八至 實芟荅利斯末八八至 牡

蠣末四 右調勻為散分八服日二三服

右調勻為散分八服日二三服

主治第十對神經ノ瘕瘳症瘕瘳瘳胃瘕等ヲ治ス殊ニ脈

管系ノ興奮機尤盛ヲ兼スル者ニ好トス

○第一千四百七十八方同上

亞硝酸毘私繆篤一 蘆薈水製越幾斯半 遏兒托末

右調勻加達刺侃篤護漿適宜為四十九衣白桂末朝夕

服二粒

主治胃瘕腹内ノ畜血膽液分泌ノ洪滯大便秘結等ヲ兼

併セル者之ニ宜シ

○第一千四百七十九方〔顯寧傳〕

青酸鎂亞鉛附半 煨製麻僞涅失亞四 桂皮三

右調勻為散分四服每二時一服

主治胃瘕ヲ治ス

主治胃瘕ヲ治ス

○第一千四百八十方弗肝爾田蒲蘭突

青酸鋁亞鉛ハハ至白糖糖

右調勻為散分六服每一時一服點夫亞四 卦丸三

○主治胃瘕三宜シ○其症三後フテ六服中二阿芙蓉二氏

初加フ普シ六五宜シ

○第一千四百八十一方帶布

青酸亞鉛附十二分ハ一 續草油糖適

右調和為散分六服蠟紙包裹每一時一服本白封末膠

主治神經性胃痛間歇頭痛其他總テ神經痛二宜シ○此

方小心ノ用ルルヲ要ス骨布氏感觸靈敏ハ人ハ最初每

服十六分氏日ニ四次下ス或ハ漸々增加ノ半氏一氏二

氏或ハ二氏ニ至レリ然レ一氏ヲ用ル日ニ數回ニ

及ハ劇甚ノ頭腦畜血症大苦悶神經過敏ノ重症或ハ

間歇戰慄ヲ發ス

○第一千四百八十二方刺曹秘

結晶硝酸銀半 伊里斯弗魯連底那根錢爾根錢

右調和加亞刺昆亞蘆蘆少許為丸四十粒衣伊里斯弗

魯底那每服一九乃至三九日二次一次二次三

○主治胃ノ感觸尤盛症胃瘕癩癩二宜シ

○第一千四百八十三方賜刺尼都

○藥 結晶硝酸銀五 蒸餾水適宜溶解加後藥

蒲公英越幾斯五 甘草半錢 蘇二宜

右調勻為二十九水過兒托末朝暮服一九乃至二九

〔主治〕胃瘰二宜三 又粘滑液又兼服也四 蘇對里微水

○第一千四百八十四方 賦歌蘭度老利兒結爾斯加莨菪

○第一水四百八十二方

問莨菪越幾斯四 老利兒結爾斯水半

右溶和每服三十滴日三次乃至四次

〔主治〕食道胃及腸頑固瘰癧嘔噎慢久嘔吐胃硬結腫

初起又神經病二宜

○第一千四百八十五方〔祿斯〕

莨菪越幾斯二 剝篤亞斯水錢一 薄荷水五 大黃水

製丁幾 大黃舍利別各一

右調和每一時服一食匙

〔主治〕慢久嘔吐胃中污物二因藥毒元者之胃宜也○又胃

結節腫ノ姑息方トス

○第一千四百八十六方〔每渴過標滿〕

莨菪根半 蘇二 撒爾末兒扶斯一 硫酸規尼捏二

麻低涅失亞半

右調勻為散分六裏朝夕取一裏沙糖水和服

主治 胃瘕酸敗液若久入膽液分泌失常以兼ル者之ニ宜

○第一千四百八十七方

番木鱉一 麻樞涅夫亞半

右調勻為散分八服日四服

主治 吐屈忽魯母地 婦人病院ニ在テ胃瘕症ニ兼テ

嘔氣變氣口味不佳胃部膨脹等ヲ患フル者ニ此方ヲ用

ヒテ良驗アリ黄舎時限

○第一千四百八十八方福樞篤

番木鱉十 吐根二十 大黃錢一 牡蠣二 薄荷油

糖三

右調勻為散等分十二裏每一時半乃至二時取一裏默栗薩泡劑送下

主治 胃瘕ヲ治ス

○第一千四百八十九方帝栗質

木鼈子丁幾 井水三

右調勻每一時乃至一時半服一茶匙

主治 胃瘕疼痛灼クガ如キ者之ニ宜シ之ヲ服ノ總テ多脂酷厲ノ食餌及ヒ飲酒ヲ戒シ或ハ其景况ニ從ヒ哥喜モ亦禁スル片ハ通例四日乃至八日ニシテ治ス其他諸

般ノ胃瘧並ニ二三ノ子宮病即月經痛及ヒ經閉子宮出血等ニ宜シ又癩癩疝因痔血閉者慢性下利慢性痢疾脱肛小兒遺尿海上病嘔吐妊婦嘔吐等ニ弗栗質名此人此方ヲ用ヒテ佳効ヲ得タリト云フ

○第一千四百九十方刺曹秘

葡萄草葉一 薯草葉一 甘草一錢至二錢

右細剉調勻取一食匙強注熱湯二三盞泡出一日服盡

主治胃瘧及ヒ其他腹内瘧瘵症ニ宜シ又痔疾ニ用フ○

刺曹私名間旃那一二錢ヲ配用ス

○第一千四百九十一方泄結別爾偃名地暴埜

大黃水製丁幾各半 忽弗滿液各半 橙皮丁幾各半 葛私

篤儂謨丁幾各一 亞的兒各一

右調勻每一時半服一茶匙

主治單純歇倚私的里性胃瘧發作ノ間隙ニ乘メ之ヲ用

乙纈草浸及ヒ阿魏灌腸ヲ兼用スルニ宜シ

○第一千四百九十二方私葛爾老

甘汞十二 莫若越幾斯二 麻偃涅失亞謁陳佛錢半

白糖一錢半

右調勻為散等分十二裹日服三裹以至見甘汞瞑眩之候

主治胃瘧既ニ慢性胃瘧衝ニ變セル症ニ宜シ肉羹汁或

ハ之ニ雞子黄ヲ加フル者及七乳漣ハ此症ニ無功ノ滋養劑ナリ但毎服必ニ食匙乃至三食匙ニ過ズルカラス數次ニ分チテ半時毎ニ與フヘシ便秘スル者ハ灌腸ヲ行フテ可ナリ然レ甘汞ノ能ニ由リ速ニ暗綠色ノ大便ヲ利シテ大ニ輕快ヲ得ル者多シ上方一劑ヲ盡シ既ニ嘔吐休ミ脊ノ煩痛モ亦立地ニ歇ム者少シトセズ甘汞ノ量十二以乃至二十四以餘ヲ要スル者ハ罕ナリ○更ニ劇甚ノ症ハ心窩若クハ脊ニ艾灸ヲ施スヘシ

○第一千四百九十三方弗爾田蒲蘭度

拔爾撒謨阿波德兒突古弗爾田蒲蘭度阿芙蓉液錢

右調勻塗擦心窩日四次

〔主治〕胃ノ痙攣痛ニ宜シ

○第一千四百九十四方戒歇蘭度名鎮痙軟膏

揮發加龍腦膏一加耶魯的油一綿苔幾里私布油各半

阿芙蓉丁幾錢

右調勻塗擦胃部

〔主治〕胃痙ニ宜シ○並ニ菲阿斯葉加密列ノ温暖琶布及

ヒ芥子泥ヲ貼シ胃部ニ冷水ヲ射注スベシ

○第一千四百九十五方過傑栗屈的兒

肉豆蔻油錢薄荷油一刺賢堙兒油各十再留琥珀五滴

油半錢揮發鹿角鹽半刀

右調勻塗擦心窩

○第一千四百九十六方同上

的里亞加 胡桃油各一 葛私篤樓謨 雜腹蘭東方

梭爾撒謨字露錢各一 枸橼油滴廿 龍腦錢半

右調勻塗敷麻布以貼胃部

○第一千四百九十七方同上

昏噶里亞哥寧低水附 捲埕兒精各一 阿芙蓉丁幾

半一錢

右調和醮紙貼心窩

主治 一千四百九十五方ヨリ一千四百九十七方至胃脘

二宜シ

○第一千四百九十八方 百過歌土名 胃膏エムム プラスト

黄蠟半四 阿列襪油半 的列並底那錢六

味熔和瀝過加後藥 已上三

刺佛達尼蘊謨附 荅葛未屈脂附 乳香各三 肉豆

菟半一錢 梭爾撒謨字露五 薄荷油 格墨茵油廿各

丁子油八

右調和作硬膏

主治胃腸ノ衰弱及ヒ痙攣ニ宜シ○此良膏ハ殊ニ善ク肌膚ニ牢著スルヲ以テ他方ニ優レリトス

○第一千四百九十九方茂桂

丹寧酸一錢

桂水

亞刺毘亞蘆

各三

右調勻每一時服一食匙

主治大人並ニ老人ノ腸胃軟化症ニ宜シ

疝コリカ羅

疝ノ醫治毎症左ノ規則ニ著眼スベシ扁桃油亞刺毘亞蘆

謨製乳劑十五方裸燕麥汁亞麻仁煎等ノ如キ粘滑油性藥ヲ

與ヘテ疼痛ヲ緩和シ安リニ起熱藥ヲ用スベカラス恐ラ

必ク之方為ニ腸焮腫ニ轉變スルハナク外用鎮痙藥腹上

乾角法香竈溫罨法菲阿斯油及ヒ揮發膏千五百等最的當

ト凶殊ニ鎮痙緩下ノ灌腸法千五百十八方ヲ佳トス灌腸

ハ汚物ノ常ニ腸中ニ鬱畜シ疝ヲ持續シ且其レヲ益盛

ナラシムル所ノ者ヲ排泄スルヲ以テ瀉益アリトス下劑

ヲ内服スルニ每次必ク効ヲ得ルヲ難シ痛一處ニ住著ノ劇

甚ニ且灼多カ如ク之ヲ按スルニ堪ヘスノ發熱スル者ハ

忽焮衝症ニ轉ズルノ懼アリ此症彼此ヲ論ゼス速ニ放

血シ後吸角法ヲ施メ之ヲ防制セズバアルベカラズ又疝

ハ能ク肚腹ヲ觀察シ額僕窟ノ有無ヲ檢スベシ既ニ疝痛

ヲ鎮靖シ得テ后緩和下劑ヲ與スルニ但衝動セザル劑ヲ
 好トス○又疝ハ每症各自ノ治法ヲ下スベシ○即多血ニ
 因ル者ハ痔血若クハ經閉ニ原以テ者多シ是刺絡或ハ局
 處瀉血ヲ急ルヲ勿レ○膽液太過ニ因ル者ハ先乳劑五百
方方五百廿二方里歇利飲方一及ヒ橙汁食匙強ヲ與ヘテ後答
 麻林度滿那孕鹼酒石九十三方五百七十五方至
 下劑ヲ投シ而シ疼痛已ニ鎮靖セシ后適宜ノ吐劑ニ鎮瘧
 劑若クハ植酸ヲ配用ス例スルニ吐根純精酒石ヲ和用ス
 ル等是ナリ○腸胃汚物ニ因ル者ハ先解釋劑四十九方至
 後其症ニ從フテ瀉藥四十六方至七百五十三方或ハ吐藥

ニ宜シ○風氣痞滯ニ因ル者ハ所謂驅風劑千五百三方至
 ヲ稱用ス○膽石及腎石ニ因ル者ハ強實多血ノ人ニ在テ
 ハ多ク嫩衝性ヲ帶ズルガ故ニ能ク其候ヲ認メテ先刺絡
 或ハ砒鍼ヲ施シ後鎮痛罨法及ヒ塗擦法全身浴ヲ施シ油
 質粘滑ノ乳劑ニ菲阿斯ヲ和用千五百方スル等好シ腎石疝
 ニ在テハ阿芙蓉モ亦佳ナリ但膽石疝ハ之ヲ用フル勿レ
 何者此症大便通利ヲ好トスルニ却テ阿芙蓉之ヲ閉澀ス
 レバナリ○小兒疝痛ハ酸敗液及ヒ風氣痞滯ニ由テ起ル
 者多シ能ク相當ノ方千五百廿五方至千五百廿二方ヲ處スヘシ
 ○第一千五百方飛歇藤度

○第一千五百一十方 甘扁桃油新絞者 亞刺毘亞錢 蘆護漿錢 茴香水三 上好

滿那半 扁桃乳舍利別一 右調勻作乳劑 每一時服一食匙

○第一千五百一十一方 同上 甘扁桃油新絞者 井水七 亞刺毘亞蘆護漿 適

已上作乳劑加後味 上好滿那一 孕鹼酒石三錢至 扁桃乳舍利別半

○第一千五百一十二方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百一十三方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百一十四方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百一十五方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百一十六方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百一十七方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百一十八方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百一十九方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百二十方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百二十一方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百二十二方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百二十三方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百二十四方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百二十五方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百二十六方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百二十七方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百二十八方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百二十九方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百三十方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百三十一方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百三十二方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

○第一千五百三十三方 蘇阿私越幾斯六 右調勻每一時服二食匙

主治純粹神經性ノ腹内痙攣症及ヒ痙攣症ニ宜シ

○第一千五百四方同上

葛私篤カクシ樓トウ漢カン丁テイ幾ケイ 忽カク弗フ滿マン液エツ 各カク一フ

右調勻每服十滴乃至二十滴加密列泡劑點服日三四次

○第一千五百五方同上

甘消石精カンシヨウシキョウ 錢セン 橙皮丁テイ幾ケイ 錢セン

右調勻每服十五滴乃至三十滴加密列泡劑點服日二次

○第一千五百六方孤刺優秘

府利油フリス 錢セン 亞的兒アヂ 錢セン

右調勻每一時十二滴沙糖點服

主治千五百四方ヨリ千五百六方至皆風氣痞滯風氣疝等ニ宜シ並ニ肚腹ニ乾角法ヲ施スベシ

○第一千五百七方速列倫歌愷

過泥子油アツチ 甘消石精カンシヨウシキョウ 二錢 礪砂リヤクサ 加過泥子精アツチ 一リヤクサ 刀溶化

右調勻每服十滴乃至十五滴日三四次

主治劇証風氣痞滯並ニ風氣疝ニ宜シ

○第一千五百八方歇倚戀

加密列油カクシ 滴テツ 十五 甘消石精カンシヨウシキョウ 三錢溶化

右調勻每一時十五滴乃至二十滴沙糖和服

主治風氣疝其他肚腹痙攣症ニ宜シ殊ニ歇倚私的利婦

人ニ用フベシ

○第一千五百九方

薄荷油十二滴 甘消石精一錢溶化

右調勻每服十滴沙糖和服日三次

主治頑固風氣痞滯及ヒ風氣疝ニ宜シ

○第一千五百十方速効 儉歌憶

過カ泥チ子ス油ス糖一 橙皮黃二 錢一 麻ハ屈ク涅ネ失シ亞ヤ加カ大ト黃ト散一 附

右調勻為散內私葛カ點カ刺チ器器每服一茶匙日三次

主治胃腸ノ痙攣症殊ニ風氣痞滯ニ宜シ

○第一千五百十一方阿藥魯

没食子十六箇 注滾湯一北飽熱十二時

右瀝過每服一食匙日四次

主治風氣疝ニ宜シ○吾儕未風氣痞滯症ニ没食子ヲ稱

用スルヲ見ズト雖阿藥魯名ハ碩學ノ士ナリ何ソ此方

ヲ載セサルヲ得ニヤ且阿藥魯ハ明礬乳八百廿モ亦

此症ニ賛美セリ

○第一千五百十二方戒歌辭度

硫黃華 麻屈涅失亞二 精製阿芙蓉 吐根各三

右調勻為散分十二服日四服

主治 儂麻質斯性若クハ依儂篤性ノ疝ニ宜シ

○第一千五百十三方弗陽

生明礬半 精製阿芙蓉一

右調和為散頓服

主治 所謂粘液疝コレレキ腹痛劇甚ニノ玻璃状粘液ヲ

下ス夥多ノ症ニ陽氏累年上方ヲ用ヒ偉効アルヲ稱

ス○又痙攣性風氣疝ニ明礬佳効ヲ奏スレ氏腸胃汚物

ヲ兼ル者ハ之ヲ忌ム若其汚物ヲ兼スル者ハ先灌腸法

及ヒ其他相當ノ劑ヲ與ヘテ之ヲ排除スベシ

○第一千五百十四方同上

麻屈涅失亞脱分

純精酒石半

右和勻頓服

主治 嘈雜風氣痞滯。疝腸胃汚物或ハ畜血ニ因ル者之ニ

宜シ

○第一千五百十五方過傑栗屈的兒

格綸僕越幾斯錢 水製大黃丁錢 桂水三 忽弗

滿液錢

右調勻每服一食匙日三次

主治 疝治ノ後腸ヲ補益スルニ宜シ

○第一千五百十六方佛律屈涅魯

黃蠟 勿擲祭亞的列並底那錢各二 瓦爾拔奴謨 越

列密附各 已上四味上慢火熔解加後味

葛私私 加密列加拘椽油附一

右調和作硬膏貼胃部若肚腹

主治胃瘕瘕癰疝其他肚腹瘕癰症宜之

○第一千五百十七方私託爾屈

菲阿斯油 白罌粟油錢各六 礪砂加石灰精 鹿琥精

舍電阿芙蓉液錢各一 右調和作軟膏塗肚腹日二次

主治風氣疝宜之

○第一千五百十八方私託爾屈

綿苔幾里私布葉 菜沃刺那葉錢各二 石鹼錢一

右細剉調勻分四貼每用取一貼水二盞泡出灌腸

主治同上

○第一千五百十九方過佛栗屈的兒

燕麥去皮 加密列各一 井水適宜煮瀝過取八弓加

左味

亞麻子油 蜂蜜各一

右調和供灌腸

主治疝二用 大便ヲ促ス 宜之

○第一千五百二十方 福伍列兒名入鎮痙灌腸方

歌爾拔斯屈謨花 罌粟球各二錢

右細刺乳汁及水等分煮濾取十弓灌腸

主治黃疸胃痙疝吐糞病箱頓貌優屈便秘腸ノ感覺過敏

ヲ兼ル者及ヒ假陣痛等ニ宜シ

○第一千五百二十一方 謨私薦

甘扁桃油新絞六錢 雞子黃適宜 取已上二味加加密列水

纈草水各四弓作乳劑再加後味

菲阿私越幾斯カ一 老利兒結兒斯水半一錢 實亞格地

温才一弓

右調每半時服一食匙

主治膽石症ニ宜シ ○但先肝臟命部緩和藥ヲ塗擦シ

全腹蒸湯法或ハ微温湯浴ヲ行フベシ 或ハ其症ニ後放血モ亦可ナリ 殊ニ肝部放蟻ヲ妙トス

○第一千五百二十二方 同上

邊兒托軟膏 菲阿斯油 礪砂揮發加龍腦膏各一

舍雷阿芙蓉液錢 的列並油錢

右調夕朝夕塗擦肝部

主治膽石症ニ宜シ

○第一千五百二十三方 佛刺

○第一千五百二十五方 家猪脂五分

右調和作軟膏塗擦腎及膀胱部

主治劇証腎石症宜之

○第一千五百二十四方 萬尖葛弗五分 便秘腸ノ感冒通散

研砂 苦扁桃水濃厚者 各一錢 默栗薩水四分

右調和每半時服一食匙

主治月經痛二宜 經血將ニ來テ止ル時及ヒ其已

二來ル初之ヲ用ス○又委中ノ轉絡主陰部放蟻

ヲ要スル者少シトセズ緩和琶布ヲ貼シ而後刺戟藥中

ニ足ラ浸ス等皆佳ナリ月經不調ノ條ヲ參照スベシ

○第一千五百二十五方 羅仙秘的印人小兒乳

菩提樹花水五分 黑櫻實水 扁桃油新殺者 各一分 酒石

鹽一分 雞子黃錢二分 亞刺毘亞蘆錢一分 不詳

右調勻每四分時乃至半時與一茶匙之小兒服之

主治小兒腹痛ノ殊効方トス五ノ尚且半茶匙ハ至

○第一千五百二十六方 護利秘問藥蘇薄甚ノ味ハ味鹹耳

茴香浸 茴香水各一分 麻屈涅失亞五分 舍電阿芙

裝液二 沙糖舍利別五分 良青五分 藥一分 藥一分

右調勻每一時與一茶匙之藥一分 藥一分

主治小兒疝痛胃中酸敗液ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千五百二十七方秘濁耳起

鹿琥精四十滴

舍電阿芙蓉液

二滴至三滴

橙花舍利別一

右調勻應用初生兒未滿一月者每服一茶匙哺後一服夜

初更一服

主治小兒風氣疝二宜シ○夜間攣痛劇甚ノ者ハ秘濁耳

杜名之ヲ與フル丁二茶匙ニ止マラズ尚且半茶匙乃至

一茶匙ヲ服セシム前ニ屢戒ムルガ如ク小兒病ニ阿芙

蓉ヲ用フルハ最謹慎ヲ加ヌシ小兒生下後一月ヲ過

クル者ハ更ニ鹿琥精ヲ加増スルモ舍電阿芙蓉液ハ四

滴ヲ以テ極トシ必之ニ過タルト勿レ小兒病ニハシ

○第一千五百二十八方

甘扁桃油

新絞半

亞刺毘亞護謨

未半錢

菩提樹花水一

加密列水半已上四味搗和作乳劑後加滿那舍利別

半

右調勻每一時服一茶匙

主治小兒風氣疝便秘スル者之ニ宜シ

○第一千五百二十九方弗刺結

甘扁桃油

亞刺毘亞護謨

未各錢

礪砂加過泥子精二

五過兒托煎二

冰糖

錢

右調勻每半時或一時服二茶匙

透西... 卷四... 疝... 廣... 胖... 堂

主治二三箇月乃至二歳兒ノ疝痛下利又嬰兒ノ粘液膜
諸病ニ宜シ若其症熱ヲ兼又ル者ハ礪砂加過泥子精ニ
代ヘテ消石半錢ヲ加フ水瀉甚シキ者ハ吐根末ニ以テ
加フ

○第一千五百三十方同上

甘承十二分 吐根末十六分 白糖半

右調勻為散分十二服早晚一服

主治胃腸病經久下利疝痛等ニ宜シ又幼兒ノ瘰癧或ハ
消削病其因皮膚運營ノ障碍ニ因ラザル者之ヲ用スベ
シ

○第一千五百三十一方

過泥子油錢一 肉豆蔻拔爾撒謨附二

右和勻塗肚腹

主治腸ノ痙攣症ニ宜シ殊ニ小兒ニ用フヘシ又痙攣性
下利ニ佳ナリ

○第一千五百三十二方篤優爾黠亞兒

阿魏六分 加密列浸一 亞刺昆亞護護宜適

右研和供灌腸

主治幼兒風氣疝ニ宜シ

鉛毒疝コリカサタルニナ
羅ロドコリキ蘭

鉛毒症ハ專便秘ヲ治スルヲ以テ第一義トス而ノ又疼痛

及ヒ其他ノ諸証ヲ鎮靖スベシ即鎮痙藥或ハ峻下藥ニ油

質乳劑殊ニ蓖麻油ヲ以テ製スル者ヲ和用スハシ至千五百

世五百方鎮痙藥ノ中ニ就テ阿芙蓉至千五百世五百世五百世五百

トス並ニ番木鱉至千五百世五百世五百世五百葎蓉至千五百世五百世五百世五百

斯篤揭至千五百世五百世五百世五百私人ノ灌腸法至千五百世五百世五百世五百倭刺歌至千五百世五百世五百世五百私人ノ栝布等ヲ稱用ス峻下

藥ハ巴豆油至千五百世五百世五百世五百最殊効アリ葎刺巴至千五百世五百世五百世五百大量甘

禾至千五百世五百世五百世五百阿芙蓉至千五百世五百世五百世五百若クハ大黃ト和用ス旃那芒硝等モ亦効アリ

○又明礬至千五百世五百世五百世五百奇藥トス硫酸至千五百世五百世五百世五百五方十五百

至千五百世五百世五百世五百諸經驗法至千五百世五百世五百世五百中ニ就テ

百年来巴黎至千五百世五百世五百世五百都府病院ニ於テ施用スル所ノ方法至千五百世五百世五百世五百

最稱スベシ至千五百世五百世五百世五百

○第一千五百三十三方至千五百世五百世五百世五百蓖麻油至千五百世五百世五百世五百

雞子黃至千五百世五百世五百世五百和已上二味加罌粟舍利別一弓

苗香水至千五百世五百世五百世五百徐徐搗和作乳劑再溶化後味

菲阿至千五百世五百世五百世五百私越幾斯至千五百世五百世五百世五百精製芒硝至千五百世五百世五百世五百

右調勻每半時服一食匙乃至二食匙臨用宜振盪

主治鉛毒症ニ宜シ又他病ニ用フベシ

○第一千五百三十四方至千五百世五百世五百世五百私的鳴撰

蓖麻油至千五百世五百世五百世五百亞刺昆亞蘊謨至千五百世五百世五百世五百已上二味加薄荷水

精製阿芙蓉二 甘草四 白糖錢一

右合勺為散分四服每一時半一服

○第一千五百三十八方同止 龍腦二 硫黃華各半 白糖錢一

精製阿芙蓉二 至阿龍腦二 硫黃華各半 白糖錢一

右調勻為散分四服每一時半一服至用マハ赤クハ

主治右二方千五百三十七方 銘毒疝二 宜シ銘毒疝

○第一千五百三十九方施爾禮斯

番木鱉丁錢一 右每服十滴乃至三十滴日四次發熱

主治銘毒疝二 宜シ發熱

○第一千五百四十方食

番木鱉丁二 麻俚涅失亞六

右調勻為散分十二服日四服

主治私咄屈忽兒慕地名ノ婦人病院ニ於テ銘毒疝二 之ヲ

用ヒテ良効ヲ得タリ之ヲ服シテ後二日或ハ三日ニメ

燥黑硬屎ヲ得尋テ疝痛消散セリ

○第一千五百四十一方噶

生明礬錢二 達刺侃篤錢一 阿仙藥各錢一 井水八

列印酒四 右調勻每半時服一食匙乃至二食匙

右調勻每半時服一食匙乃至二食匙

主治銘毒症ニ宜シ○明礬銘毒ヲ治スルノ功用其說未詳著ナラズト雖此症ニ卓越ノ一奇藥タルヲ確實ニシテ疑ヲ容レス略百列魯名ハ大抵明礬ノミヲ用ヒテ他藥ヲ要セズ服量一晝夜六錢ニ至ル之ヲ粘滑藥煎ニ和用シ兼テ油藥ヲ灌腸セリ

○第一千五百四十二方〔蘆都〕

嬰粟子子

常水子

已上作乳劑濾過溶明礬半錢再

加後味

沙糖舍利別子

右調勻每一時服ニ食匙臨用宜振盪

主治銘毒症ニ宜シ○明礬ノ量漸ヲ以テ加増スベシ

○第一千五百四十三方〔輕度〕

生明礬錢

蒸餾水四子溶化加後味

亞刺昆亞護謨舍利別子

右調勻分為四服

主治同上○之ヲ服スルノ前一時又後半時患者ヲノ飲食ヲ斷タシムベシ若之ヲ服ノ吐若クハ瀉スル片ハ服量ヲ減スベシ

○第一千五百四十四方〔同上〕

生明礬錢

蒸餾水四子溶化加後藥

硫酸 枸橼丁幾附各十滴 枸橼汁舍利別各二

右調勻每半時服一食匙

主治同上○此方前方二較スレハ効力更ニ優ルベシ

○第一千五百四十五方同上

硫酸錢一 蒸餾水北三 亞爾箇兒各二 枸橼丁幾十五滴至廿滴

右調勻每服一盞大約容日三次

○第一千五百四十六方同上

硫酸錢一 蒸餾水北二 白葡萄酒北一

右調勻每服五勺日三次

主治右二方千五百四十五方 鉛毒症二宜シ○然レ硫酸

阿芙蓉明礬及ヒ巴豆油二方リ

○第一千五百四十七方較母別兒僂

巴豆油三滴 白糖錢半 且其其中再調之

右調勻為散分三服每一時一服

主治鉛毒症二宜シ○較母別兒僂各之ヲ治スルニ先巴

豆油ヲ用テ大抵一滴乃至三滴之テ瀉スルニ足ル而

終日扁挑乳ヲ用テ之方テ阿芙蓉半片ヲ服セ之ハ

○單結列兒各巴豆油ヲ以テ最適當ノ即効藥ナリ且腦

病及ヒ脊髓病ハ再發ヲ防グ良藥ト稱シ通例巴豆油
一滴大麥水一匙ニ和服セ之ハ日ニ一次或ハ間ニ

次ニ至ル之ヲ歷試スル丁四百六十人ノ中ニ百八十人
ハ單味巴豆油ヲ與ヘ兼テ隔日ニ瀉藥灌腸ヲ施シ並ニ
瀉杜吉篤屑爾水鑛泉名ヲ用ヒ其餘八十人ハ巴豆油ヲ與
ヘテ即日瀉下灌腸ヲ施シ兼テ毎日阿芙蓉半匁ヲ服セ
シメ或ハ阿芙蓉液三十滴ヲ灌腸セリ巴上通計四百六
十人ノ中四百二十五人ハ此法ニ由テ四五日內ニ癒ユ
其他不治ノ者ハ巴豆油ノ為ニ劇吐ヲ發スルガ故ニ後
服ヲ進ムルヲ能ハス且其治セシ者ノ中再感セシ者纔
二十人トス

○第一千五百四十八方 羣的劑

藥刺巴脂 白石鹼各一匁 硫加爾幾半匁
右調勻一匁為一丸衣石松粉每一時乃至一時半服四丸
乃至五丸

主治 鉛毒疝ニ宜シ ○羣的劑氏ハ先續草及リ旃那浸ヲ
與ヘテ後此丸ヲ用フ

○第一千五百四十九方 新幣秘

護謨安沒尼亞幾 肝色硫黃 蒲公英越幾斯各一匁
白石鹼 大黃末各半匁 阿芙蓉越幾斯三匁
右調勻二匁為一丸衣石松粉玻璃壘收貯每一時服五粒

主治 鉛毒疝頑固ノ便秘治メ后之ヲ用フベシ

○巴黎私都府病院療法

鉛毒症ノ患者初ノ病院ニ入ルヤ醫之ヲ診シテ發病ノ時期ヲ論セズ即伯印的爾人ノ瀉下灌腸法ヲ行フ其方左ノ如シ

○第一千五百五十方

甲方

旃那葉半 常水十二勺 煮濾取八勺 加後味

芒硝半 安質沒尼酒四

右調勻

○同日所謂偪刺印名ノ阿沒勒劑ヲ服セシム其方左ノ如

シ

乙方

阿沒勒此 常水煮如法濾取二北 加後味

酒酸加里曹達一 吐酒石三

右調勻或ハ私匹那屑非 舍利別一 勺ヲ加フ

○晚ニ方テ左ノ鎮痛灌腸ヲ施ス

胡桃油四 赤葡萄酒十二

○其後一時半ヲ經テ的里亞加一錢半及ヒ阿芙蓉一分

半ヲ與フ

○翌日施治ノ 後方ヲ服ス

遠西右藥 卷十四 醫學 廣 附

丙方

吐酒石六

蒸餾熱湯八

石溶和先服其半後經半時服餘半

○之ヲ服ノ吐ヲ得ルハ右次ノ煎劑ヲ與フ

丁方

葱瘡木

薩沙弗刺私

舍生茯苓

薩兒沙巴栗刺各一

甘草半

右常水三北煮濾過取二北煎劑二北味煎劑

○又晚ニ方テ再次鎮痛灌腸法ヲ施シ且的里亞加ヲ服

セシム

○第三日早且復止煎劑三北ヲ取テ四分三用フ或ハ

之ニ稱那葉ヲ加フ

發汗瀉下

午時再單方發汗飲ヲ與ル

ナ前ノ如ク三日晡ニ至テ先伯印的爾氏ノ瀉下灌腸

ヲ施シ一時ヲ經テ後更ニ第二方ノ鎮痛灌腸法ヲ施シ

且的里亞加及阿芙蓉ノ合劑一服ヲ與フ

○第四日又伯印的爾氏ノ瀉下飲ヲ與フ其方左ノ如シ

戊方

稱那葉錢二

熱湯適宜浸出濾取六多加後藥

亞芒硝半

藥刺巴末一

私匹那屑非舍利列附一

右調和對症行時與一煎劑一煎劑一煎劑一煎劑一煎劑一

○又午後發汗飲ヲ與へ晚ニ鎮痛灌腸法ヲ施シ且的里亞加ヲ與フ

○第五日又發汗瀉下飲ヲ與へ晚ニ第一方ノ瀉下灌腸

ヲ施シ後一時ヲ經テ又第三日ノ如ク第二方ノ鎮痛灌

腸法ヲ行ヒ並ニ的里亞加阿芙蓉ヲ配用ス

○第六日又下劑ヲ用ヒ後上ノ單方發汗劑及ヒ鎮痛灌

腸法ヲ施用シ的里亞加阿芙蓉ヲ配用ス

大抵下劑ニ行テ得テ病勢ヲ制伏ス若疼痛連續已

マデ成リ然更ニ猛烈ノ瀉藥ヲ連進シ疼痛鎮靜ス其ニ

至テ峻藥ニ尚効ナキ氏ハ三時毎ニ百伯的兒

瀉下丸ヲ與フ其方左ノ如シ

癸方

上好蘆薈 大黃越幾斯 各半 藥刺巴越幾斯 墨列

僕里越幾斯 蘇甘沒扭越幾斯 各十 私匹那屑非舍

利別附適

右為六丸

已上列載スル所ノ者ハ鉛毒疔ヲ療スル複法ニテ即巴

黎私ハ諸病院ニ於テ一定シテ用フル所ナリ往昔始メテ

病院ヲ建立セシ時之ヲ創制セリ故ニ下劑及ヒ阿芙蓉ヲ

以テ主藥トス之ヲ稱用スル下ニ三百年來ニテ匹涅兒

人之ヲ經驗良法ト名之病院ノ治驗表ニ據ルニ十二年間
 二上法ヲ以テ鉛毒疔ヲ療スルト一千三百五十三人當中
 二就テ死スル者纔ニ六十四人ト云フ
 上款ノ方法ハ一千八百二十二年拂郎西公醫房布失弗
 名及ヒ蒲羅葛私同上ノ鏤行セシ葛的爾加樂室私扶暨書
 ヨリ拔萃スル所ナリ

○第一千五百五十一方 蘭結

莨菪越幾斯カス 亞的兒ア 老利兒結爾斯カス 水カス
 右調勻為軟膏塗擦肚腹

主治鉛毒疔ニ宜シ ○蘭結人ハ先半身浴ヲ施シ癒創膏

ニ失鳩荅龍腦カス 的里亞加吐酒石カス 和ノ硬膏ニ作り以テ
 肚腹ニ貼シテ發疹セシメ而後其部ニ上ノ軟膏ヲ塗擦
 ス兼テ阿列襪油若クハ扁挑油四弓ニ亞的兒製莨菪丁
 幾二十滴ヲ和メ灌腸スル日ニ一二次但疼痛劇甚ナ
 ル片ハ上ノ莨菪丁幾少許ヲ粘滑密幾私丟爾カスニ伍メ兼
 服セシム此ノ如ク之ヲ持重スル日三四日ニ一寛解セ
 ザル者ハ蓖麻油少許ヲ以テ頻服セシム但カメテ上ノ
 軟膏ヲ擦シ又巴ムヲ得サレバ上ノ硬膏中更ニ多量
 ノ龍腦及ヒ吐酒石ヲ調和メ其上ニ貼セシム ○阿魯列
 安私カス 名地ノ病院ニ於テ蘭結氏上法ヲ以テ百五十人ヲ療

ニ死スル者一人モアラスト云フ

吐糞病 イグレト。エン。テト。シセレ。レ。羅ダ。ル。ム。イ

此症ハ常ニ他病ヨリ將出シ来ルナリ故ニ治法ヲ大昔モ

亦其病根ヲ緩解制伏スルニ在リ籍頓貌儂屈ニ基因スル

者多シ此症ハ唯外療法ヲ以テ治スベキノニ其他發因ヲ

ナス者即腹内ニ潜伏ノ其部ヲ逼迫スル所ノ腫瘍新生ノ

靱帶腸管捲収 腸ノ一部非常ニ廣濶シ若クハ縮収セルニ

上部ノ内ニ向テ 捲収スルヲ云フ 幸ニ存生ノ間之ヲ監察スルヲ容易ナラ

ズ是故ニ醫者唯經驗治法ヲ行フノ外他ノ伎倆ナキ者之

アリ然氏或ハ既ニ腸管ニ焮衝ノ在ルアリ或ハ積糞鬱閉

痙攣ニ因ルアリ醫者專此ニ著眼スベシ其焮衝ニ原ツク

者ハ猛烈消焮法即放血大量甘永 毎服五分乃至二十分或

用或ハ寒罨法等ヲ切要トシ痙攣性ノ者ハ鎮痙藥及ヒ瀉

藥ヲ兼用スルヲ尤稱賛シ油劑殊ニ亞麻油 千五百五

油 千五百五 ハ往往偉効アリ之ニ亞テ瀉利鹽 千五百五

五百五十 ヲ好トス舎電發謨 名 巴來大ニ稱用セリ巴止ノ藥

劑効アラザル片ハ巴豆油 千五百五 ヲ用フベシ又往往煙

草 千五百五 ヲ稱用ス然氏内服藥ハ立地ニ吐出

スル者多キカ故ニ煙草 千五百五 及ヒ莨菪 千五百

方 千五百 灌腸並ニ巴豆油 千五百 外用ヲ佳

方 千五百 灌腸並ニ巴豆油 千五百 外用ヲ佳

ト又羅獨密篤兒ノ灌腸法偉効アリ或五子ヨリ北六子至此
 灌腸ハ他ノ諸藥ニ優リテ泄瀉ノ効偉ナリトス欲爾田斯
 名ハ阿魏ニ錢ヲ以テ加密列濃浸ニ和シ灌腸スルヲ稱譽
 セリ遠突土名ハ瓦刺扶阿刺草半錢ノ煎汁ヲ以テ灌腸ハ
 慢嬰兒名ハ吐糞症尋常ノ方法効アラザル者ハ亞麻子油多
 量ヲ以テ一時半或ハ二時毎ニ灌腸ノ殊効ヲ得タリト云
 腸管ノ一部捲収詳ニ上セルニ因テ来ル者ハ上ヨリ下
 三捲シ下ヨリ上ニ捲スルヲ論セズ救急會私機名空氣ヲ
 腸ニ送入シ或ハ排氣器ヲ以テ腸中ノ氣ヲ排除スルヲ稱
 賛ス○乾角法下腹緩和鎮痙毳布微温湯浴等皆此症ニ於

テ怠ルベカラズ○危篤ノ症他藥効ナキハ生水銀ヲ試
 ムベシ謾ニ之ヲ畏レテ用テ非テ皆死リト雖已ニ庶幾ス
 ル所アラザル者モ亦之ニ由テ死天援テ下往往鮮ハ也
 ズ但嫩衝ノ徴アル者ハ嚴ニ忌ムハ毎服一食匙水銀一
 秤量一ヲ亞麻子油ニ和用ス或ハ更ニ加増ノ半北乃至一
 北ヲ用之ヲ服ノ速ニ瀉スル者尠カラス

○第一千五百五十二方戒 歇齋度

亞麻油新絞者

右每半時服一食匙或隨其症尚加多

主治此劑下腸中ノ鬱畜ヲ排泄シ腸ノ運機ヲ本復スル

其他峻下劑ニ優リテ一良藥トス

○第一千五百五十三方 瀉利鹽各一 蘆薈水各一 製越幾斯各一 菲阿

私越幾斯各一 井水各一 右調和丁寧振盪每一時服ニ食匙

○有每半時服ニ食匙乃至ニ食匙

○主治同上

○第一千五百五十四方 瀉利鹽各一 蘆薈水各一 製越幾斯各一 菲阿

井水各一 右調和丁寧振盪每一時服ニ食匙

○有每半時服ニ食匙乃至ニ食匙

○主治同上

○第一千五百五十五方 瀉利鹽各一 蘆薈水各一 製越幾斯各一 菲阿

私越幾斯各一 井水各一 右調和丁寧振盪每一時服ニ食匙

○有每半時服ニ食匙乃至ニ食匙

○主治同上

○第一千五百五十六方 瀉利鹽各一 蘆薈水各一 製越幾斯各一 菲阿

私越幾斯各一 井水各一 右調和丁寧振盪每一時服ニ食匙

○有每半時服ニ食匙乃至ニ食匙

○主治同上

○第一千五百五十七方 瀉利鹽各一 蘆薈水各一 製越幾斯各一 菲阿

私越幾斯各一 井水各一 右調和丁寧振盪每一時服ニ食匙

○有每半時服ニ食匙乃至ニ食匙

○主治同上

○第一千五百五十八方 瀉利鹽各一 蘆薈水各一 製越幾斯各一 菲阿

私越幾斯各一 井水各一 右調和丁寧振盪每一時服ニ食匙

○有每半時服ニ食匙乃至ニ食匙

○主治同上

○第一千五百五十九方 瀉利鹽各一 蘆薈水各一 製越幾斯各一 菲阿

亞麻油 白罌粟舍利別各一

阿芙蓉越幾斯氏五

右調和每八分時或四分時服一食匙

主治吐糞病頑固人便秘ニ宜シ○若此劑ヲ服シ每服吐
出スル者ハ稍阿芙蓉ノ量ヲ加増スベシ

○第一千五百五十七方新散秘

巴豆油氏五 過爾托根末錢半

右加達刺ラガト 侃篤ト 護護ゴ 漿適宜為七丸衣白桂末每服一九乃
至二九

主治吐糞病ニ用ヒテ瀉スルニ宜シ但炊衝アル者ハ之
ヲ禁ス

○第一千五百五十八方職歌辭度

煙草葉錢三

右井水九ヲ煮耗至七ヲ濾過每半時服半小盞

主治吐糞病ニ卓越ノ一良藥タリ○蓋服量半小盞トス
ル者ハ稍過多ナリ大抵一食匙或ハ一食匙半ニシテ足

○第一千五百五十九方連瀝布地葛刺墨爾

煙草丁錢二

右每半時服十滴

主治吐糞病ニ宜シ兼テ解凝劑ノ用法ヲ施スベシ

透西方書 卷十 吐糞病
○第一千五百六十一方 賦歌蘭度

煙草葉半

右熱湯ハ多乃至十ヲ浸漬飽熱四分時濾過供灌腸

○主治總テ内服藥ハ通例立地ニ吐出スルガ故ニ此方更

ニ佳ナリト区實ニ之ヲ施セハ麻酔ノ効ヲ見ハシテ病

者萎弱シ大抵萎弱中ニ瀉ヲ得ルナリ○賦歌蘭度氏上

方ヲ以テ切ヲ得タリ下云フト雖予が見ヲ以テスレバ

煙草ノ量甚過多ナリ故ニ之ヲ戒メテ而シテ每症左ニ掲

クル過別爾格弄名ノ灌腸方ヲ稱用ス

○第一千五百六十一方 過別爾格弄五

煙草葉十五

右熱湯六ヲ浸漬十密三濾過供灌腸

○主治吐糞病ニ宜シ○過別爾格弄名之ヲ灌腸ノ効ヲ

獲ザレバ半時ノ后再煙草葉一ノ浸液ヲ射注セリ○

煙草烟ヲ腸ニ送入スルモ亦同ク良効アリ

○第一千五百六十二方

莨菪葉半

右熱湯適宜浸漬濾過取六ヲ供灌腸

○主治痙攣性腸貌屈吐糞病ヲ兼スル者之ニ宜シ○莨

菪ヲ用スレバ大ニ筋纖維弛緩ニ兼テ知覺機ノ興奮セ

ルヲ制伏ス此故ニ吐瀉病腸ノ緊張甚シキ症ニ莨菪ヲ
 以テ第一等ノ藥トス然レ既ニ麻痺ニ傾ク者ハ之ニ由
 テ或ハ生命ヲ害スルコトアルガ故ニ用ニ臨テ尤慎重ス
 ベシ○且之ニ兼テ貌^{イロ}儂^{ヒク}屈^ク上ニ莨菪葉^{イロ}布^{ヒク}ヲ貼スベシ

○第一千五百六十三方〔秘傳〕 單^{ヒク}紐^{イロ}斯^ク

莨菪根錢一 熱湯適宜浸蓋閉飽熟半時濾過取二三

右加^カ密^ミ列^リ浸^シ等分一頓灌腸或二分用

主治吐瀉病ニ宜シ○此灌腸ハ非常ノ峻法ナリト雖私

單^{ヒク}紐^{イロ}斯^ク名^ハ或^ハ加^カ增^シノ莨菪根一錢半ヲ用フト云ノ〔或ハ

云フ額^{イロ}捺^{ヒク}斯^ク名^ハ一錢半ヲ用フト

○第一千五百六十四方〔秘傳〕 單^{ヒク}紐^{イロ}斯^ク

莨菪越^{イロ}幾^{ヒク}斯^ク 家猪脂一

右調和作軟膏塗擦貌^{イロ}儂^{ヒク}屈^ク

主治一千五百六十二方ニ同シ

○第一千五百六十五方

巴豆油五滴至二十滴 白罌粟油五滴至二十滴

右調和^カ大抵六滴乃至十二滴塗擦臍傍

主治總テ小腹^{イロ}壅^{ヒク}塞^クニ宜シ殊ニ吐瀉病ニ好トス〔或ハ此

油劑二三滴ヲ取テ舌上ニ擦スルモ亦可ナリ

○第一千五百六十六方〔秘傳〕

遠西方彙卷之十四
吐糞病
廣
堂

巴豆油滴三 亞刺昆亞護護末一錢 煙草葉浸五 煙草葉浸

錢一

右調和供灌腸

主治吐糞病ヲ治ス○一患者十四日來大便秘閉シ諸藥

効ナクノ死ニ瀕スル者此灌腸法ヲ施シテ一時ノ后惡

臭ノ大便大ニ瀉下シ速ニ之ヲ救活スルヲ得タリ

遠西方彙卷之十四

遠西方彙卷之十五

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑婆都 譯

侍醫法眼貫齋伊東 文仲 重譯

南洋伊東 健夫 參校

第三 神經痛

神經痛ノ諸症大抵麻酔藥殊効アリ即非阿斯七方 曼陀羅華七方

莫爾比捏千方 葭芎千方 老利兒結爾斯水等

至千方 葭芎千方 老利兒結爾斯水等

是十山格碌屈私末兒秩斯千五百八十九方至諸種ノ亞鉛

劑千五百九十四方及ヒ格魯林酸加里千五百九十八方ノ

如キ鑛劑モ亦佳ナリ的列並油方六百五十六方六百五十七

ニ方モ亦下肢ノ神經痛ニ偉効アリ若夫神經痛ノ發作定

期アル者ハ最樂那劑ヲ的當トス外用ハ灌水殊ニ滴水浴

射水浴或ハ全身水浸法ニ宜シク又瀝定仲鍼麻僞涅篤越

列幾的爾瓦爾波尼其他諸種ノ皮膚刺戟法灸諸般ノ塗擦

藥千五百七十四方至千五百七十七方稱賛ス患所ノ神經ヲ

截断ノ良効ヲ奏セシハ僅ニ二三症ノミ疾駭蘭度

○第一千五百六十七方疾駭蘭度

曼菲阿私葉 菲阿私越幾斯各十 甘草越幾斯適

右為三十九衣石松粉每半時或一時服一粒以至疼痛鎮

主治諸種ノ疼痛ヲ鎮靜スルニ宜シ

○第一千五百六十八方秘膠私

率菲阿私子十匹至 白罌粟子一弓半 黑櫻實水八

主扁桃舍利別至 〇此藥三十六箇中大

右調和作乳劑每半時服一食匙

主治神經痛及ヒ不眠ニ宜シ

○第一千五百六十九方麻健蓋

○醋酸莫爾比捏子六 蒸餾水二 乃溶化加後藥

醋酸滴一 亞爾箇兒一二十 滴

右調勻每服五滴乃至十滴

主治神經痛不眠疼痛痙攣ニ宜シ○此液三十六滴中大

率醋酸莫爾比捏一 乃含畜ス

○第一千五百七十七方樓攝魯涅兒

曼陀羅華越幾斯一八至 白糖半

右調勻為散分四服每日一服

主治額及ト頸人神經痛ニ宜シ之兼元痛處徐徐

曼陀羅華丁幾ヲ塗ルシ方中曼陀羅華越幾斯各重漸

ク加ヘテ微微麻醉ヲ覺ユルニ至ル

○第一千五百七十一方萊爾質涅篤

的列並油各半 煨製麻樞涅失亞各半 白糖適

右為四塊每服一塊日四次

○第一千五百七十二方列加爾

的列並丁幾二錢 亞刺昆亞護謨末半 沙糖半

橙花舍利別一

右調勻分三劑日服盡一劑每服用封糊二箇被包與

主治右二方千五百七十一方 諸神經痛殊ニ勝神經及ヒ

足神經ニ係ル者之ニ宜シ六百五十六方及七百五十七方ヲ參照スベシ

遠西方藥 卷十五 神經痛 三 廣 野 堂

○第一千五百七十三方佛列篤叔泥埋爾

主升汞半一 蒸餾水三勺溶化加後味叔 椒麻鹽及

舍電阿芙蓉液錢半 一錢叔 椒麻鹽及

右調勻早晚服一食匙

主治經久神經痛癱瘓質斯三 因此者之三 宜シ〇 升汞ノ

量漸ク加ヘテ三分ニ至ル〇 濕濡ノ布片ヲ以テ患處ヲ

纏包シ以テ發汗セシムル片ハ姑息ノ効アリ〇 未久ヲ

經サル症ハ格兒失屈子 下幾ヲ稱賛ス

○第一千五百七十四方刺胃私

醋酸莫爾比捏六分至 家猪脂一錢至

右調和作軟膏剥表皮塗擦

主治神經痛及ヒ劇症癱瘓質斯痛ニ宜シ〇 蓋莫爾比捏

ヲ用フルニ最慎重スヘキハ 固ヨリ論ヲ俟タズ

○第一千五百七十五方彪匹

菲阿私油煮製者 醋酸莫爾比捏一

右調勻塗擦

主治前額及ヒ顛顛神經痛ニ宜シ〇 先芥子粉半勺冷水

少許ヲ以テ泥ヲ作り痛所ニ貼シテ後一時毎ニ上方ヲ

塗擦ス通例芥子泥ヲ貼スルト 三三次之ヲ塗擦スルト

二三日ニ疼痛鎮靜スルニ足レリ

○第一千五百七十六方屋兒弗

芥子油滴 再餾燒酒半可溶解

右供塗擦

主治 癩麻質斯性諸疾患 癩麻質斯痛 麻痺症等之宜

面痛 子ウラルギア。子ルネ。チリゲミニ。プロッパルキア。ドドル。スシエイ。フトルギリ。羅テ。ルギルセ。ア

ペインシフツ

第一原因ヲ蹤迹シテ之ヲ攻ムヘシ 癩麻質斯依屈篤ニ因

ル者ハ雙鸞菊 朴屈福烏篤 蜀羊泉 格爾失屈謨 硫黃劑 安質

沒尼劑 升承等ニ宜シ 間歇スル症ハ規尼捏ニ宜シ 其最劇

症ハ砒石モ亦用フヘシ 例スルニ第三百二十六方ノ福鳥

腹臍硬結腫アル者ハ吐下藥及ヒ解釋劑ニ宜シ ○直達法

ハ面痛症ノ奇効藥ヲ用フ其品類最多シ即曼陀羅華

十七方至千五百八十一方 雙鸞菊 千五百八十一方 亞格尼質捏 千五百八十一方 莨菪

千五百八十五方 苦扁桃油 千五百八十六方 失鳩答 千五百八十七方

八百八十五方 格碌屈私末兒秩斯 千五百八十九方 至 青酸鋁亞鉛 千五百九

十四方 鹽酸亞鉛 千五百九十五方 甘汞 或ハ之ヲ單用シ或ハ沙糖ニ

和用シ或ハ麝香ト配シ 千五百九十六方 或ハ失鳩答越幾斯ニ伍

千五百九十七方 格魯林酸加里 千五百九十八方 拮攝尼爾設布

點彪奴屈丁幾 千五百九十九方 等是ナリ 又謨私篤氏著ハ七種ノ

治法アリ 千六百方 ○外用法ハ麻酔擦藥 千六百一十方 硬膏

遠西方彙 卷十五 廣利堂

遠西藥方 卷之五 頭痛

類水銀膏并汞水發泡膏吐酒石膏鐵瓦爾波尼及越列幾的爾等ヲ稱贊以弄別兒偃名ハ數回海水南海殊ニ浴スルヲ好トス

○第一千五百七十七方遠達爾私恒篤

曼陀羅華越幾斯半白糖半

右為散分五服早旦一服後四分時一服過一時又一服三

服後尚未見麻醉之候者翌朝須取後服次第用

主治面痛ニ宜シ○經久症ハ先其本病儂麻質斯ニ治

ノ后二三日此散ヲ連用スベシ若間歇アリテ屢發作ス

ル者ハ曼陀羅華ノ量一日三分ハ一至ルヘシ之ヲ服

ノ麻酔証ヲ發スル者ハ其治療幾スヘシ後療法ハ開達

格碌屈私末兒秩斯ニ宜シ○別戾名獨碌私同上屋兒弗

私歇情同上等此治法効驗アルヲ確證セリ

○第一千五百七十八方斯屈列西爾

曼陀羅華越幾斯二升汞三蒸餾水半

右調和每一時服三十滴乃至四十滴臨服宜振盪

主治儂麻質斯痛及ヒ神經痛殊ニ面痛膝痛ニ宜シ

○第一千五百七十九方別連杜

曼陀羅子半玫瑰昆一設兒弗半入白丁寧搗碎加

後味

遠西藥方 卷之五 頭痛 黃半堂

遠西方藥 卷之五 面痛 慶州

過兒托根末 宜適

右為六十九衣石松粉每服十九日二次

主治 痺麻質斯痛神經痛 殊効アリ 最面痛ニ宜シ

○第一千五百八十方 叔密篤滿

〔甲方〕 曼陀羅華丁幾 二錢 莨菪越幾斯 半 苦扁桃濃水 二

右溶和每三時服三十滴乃至四十滴

○右溶和每三時服三十滴乃至四十滴

主治 面痛ニ宜シ ○乙方ト更換シ用フベシ

〔乙方〕 錫屑 半 白糖 一

右調勻為散分十六包每二時服一包

○之ニ兼テ丙方ヲ患所ニ塗リ以テ其効ヲ助クベシ

〔丙方〕 曼陀羅華越幾斯 莨菪越幾斯 苦扁桃濃水

弓溶解

○右每一時半塗擦

○第一千五百八十一方 福俣篤

曼陀羅華越幾斯 安質没尼酒半弓溶化

右每一時半取十滴點栗薩泡劑和服

主治 面痛及七神經病ニ宜シ

遠西方藥 卷之五 面痛 慶州

○第一千五百八十二方 〔賦〕 歐蘭度

雙鸞菊丁幾

忽弗滿製半弓

右每服五十滴日四次

主治 儂麻質斯性面痛ニ宜シ

○第一千五百八十三方

亞格尼質捏一

甘草末十六

沙糖舍利別適

右為十六丸衣石松粉每一時半服一粒

主治 亞格尼質捏ハ尤劇劑ナリ殆内服ヲ容スベカラサ

ル者トスニ老婦十五令ハノ一ヲ服ソ將ニ斃レントス

ルニ至レリ肘倫澎爾名嘗テ屢之ヲ用ヒ十六令ハノ一

ニ至レリ然レ後速ニ棄テ用ヒス ○今此ニ上方ヲ列舉

スル者ハ特ニ此書ヲ全備セシメンガ爲ナリ

○第一千五百八十四方 〔私的〕 印律屈

菘蓉根

格碌屈私末兒秩斯各三

菖蒲油糖一

右調勻爲散分四服蠟紙包裹晨夕服一包

○第一千五百八十五方 〔整倫〕 烏

菘蓉越幾斯四

老利兒結爾斯水半弓溶化

右每服三十滴日三次

主治 右ニ方

一千五百八十四方

面痛ニ宜シ

○第一千五百八十六方 〔詩〕 忽倫

○苦扁桃油滴二十六再餾燒酒三

右調和每服十滴乃至二十滴日四次宜

主治神經痛殊面痛宜シ○蓋之ヲ用フルハ尤謹慎

ヲ加フベシ

○第一千五百八十七方第陽

阿魏 失鳩答越幾斯錢各二 纈草根 鹿角鹽錢各一

右調和加琥珀丁幾二為一丸衣桂末朝暮服十粒

○第一千五百八十八方同上

瘡瘡木脂 阿魏 失鳩答越幾斯錢各一 雙鸞菊越幾

斯錢半 甘汞錢十五

右調勻二為一丸衣桂末朝以服五粒乃至十粒用

主治右二方一千五百八十七方一千五百八十八方一面痛宜シ

○第一千五百八十九方第陽

格碌屈私末兒秩斯錢一 菖蒲油糖半

右調勻為散分六服蠟紙包裹每服一裹日二三次

主治衆醫格碌屈私末兒秩斯ヲ以テ顔面神經痛ノ一奇

藥水或ハ之ヲ多量用フ○其他神經性頭痛耳痛胃痛

○第一千五百九十方第陽

格碌屈私末兒秩斯錢二 桂皮末半

遠西方藥 卷十五

右調勻分為六服日服三服

○主治面痛宜シ

○第一千五百九十一方新書私

格碌屈私末兒秩斯半白糖半過半泥子油糖錢

右調勻為散每服一茶匙日三次乃至四次

○主治神經痛並全身殊胃腸衰弱宜シ

○第一千五百九十二方委私地田名栗屈的兒

○撒兒末爾秩斯六曹達乾者

右研和為散日三服

○主治面痛宜シ○一患者格碌屈私末兒秩斯連用ス

ルヲ七週其量漸ク加ヘテ終ニ每日一錢ニ至リ之ヲ三

分シ用アルモ絶エテ効ナシ今栗屈的兒名弗涅兒名

ニ倣フテ上方人如ク新製格碌屈私末兒秩斯ノ方ヲ處

セリ服量每次五ハ日ニ十五ハヲ連用スルヲ四日ニシ

テ既ニ疼痛減シ十日ノ後全ク鎮靖セリ而メ之ヲ持重

スルヲ十八日ニ至レリト云フ

○第一千五百九十三方職屈私

格碌屈私末兒秩斯錢醋酸莫爾比捏芳香散錢

右調和為散分十服每一時半服一服

○主治同上○兼テ朴麻篤膏附半ヲ歇刺篤里涅二ハヲ調

和ノ軟膏ヲ作り塗擦ス

○第一千五百九十四方速別倫歌燈

青酸鋁亜鉛半々至 府利油糖五

右調和為散分六服蠟紙包裹日三四服

主治面痛ニ宜シ○小心ノ漸漸服量ヲ加増スベシ

○第一千五百九十五方預結

鹽酸亜鉛一 甘海鹽精ニ錢溶化

右調和毎二時五滴沙糖水和服

主治面痛癩癩舞蹈病ニ宜シ○蓋鹽酸亜鉛ノ内服ハ尤

慎重スヘシ

○第一千五百九十六方乙。百。弗蘭屈。乙。弗蘭屈。

上好麝香一 甘汞 金硫黃各半 白糖六

右調勻為散分八晝晨夕服一晝

主治諸種ノ面痛頑固ニシテ他藥ヲ受ケザル者ハ上ノ

ニ氏此散ヲ用ヒテ治セリ○弗フ肝カ爾ニ田テ蒲フ蘭ク突ト甘汞ヲ

用ケル日ニ四六ヨリ六六ニ至リ沙糖ニ研和ノ四服

以テ大ニ吐涎セシム或ハ水銀膏日ニ一錢乃至二錢ヲ

塗擦シ此法ヲ以テ面痛二十人ヲ全治セリ弗フ律リ墨爾ニ

ハ二症ヲ療メ水銀膏ノ効驗アルヲ確證セリト云フ

○第一千五百九十七方没列魯

甘黍ハニ 失鳩答越幾斯ハ一 白糖ハ半

右調勻為散分六服朝夕一服

主治面痛ヲ根治ス

○第一千五百九十八方葛弗歌魯綿私篤庚土

格魯林酸加里ハ半 附ハ一 蒸餾水四弓溶化

右調勻每一時服一食匙

主治痺麻質斯性神經痛面痛神經性膝痛ニ宜シ

○第一千五百九十九方兒越索斯

格魯林酸加里ハ三ハ六ハ 白糖ハ一

右調勻為散分八包每服一包日三次

主治面痛ニ宜シ ○索斯ハ名ノ説ニ據ルニ格魯林酸加里

ハ確効ノ奇藥トス可ラス唯之ヲ佐藥トシ用ヒテ可ナ

リ ○然レ格魯林酸加里ヲ用ヒテ其症多少寛解ヲ得シ

者尠カラス或ハ先哲之ヲ經驗ノ此痛楚全治セル者モ

亦之アリ ○又索斯ハ名甚鹹治ヲ稱賛セリ假令根治ヲ得

サルモ劇痛之ガ為ニ姑息シ數月間微痛モ亦發セサル

者アリ再發スル時ハ復ニ三日間鹹治ヲ施ス一日ニ一

次或ハ二次ス

○第一千六百方荷弗蘭屈

哥攝尼爾設布點彪奴屈ハ半

右每服二十滴乃至四十滴日二三

主治面痛_{ニ宜シ}○奇攝尼爾設布點彪奴屈_{名虫}ハ新採ノ

者六十箇乃至八十箇ヲ以テ燒酒一弓ニ浸ス一八日ニ

メ成ル

○第一千六百一方 謨私篤_{名人}傳染病防禦發汗散_名

上好麝香 葛私篤_{名產} 龍腦_{各半} 精製消石

艾根_半 吐根_半 攝爾扁太里亞根 琥珀油糖

右調勻為散分六裹

主治猩紅熱神經熱等ニ感染セル者謨私篤氏此散ヲ與

フ但其第一期異常ノ神經証ヲ見シ而メ全ク熱性或ハ

嗽衝ヲ帶ヒザル時之ヲ用フルナリ病者蓐ニ就キテ温

覆シ八分時毎ニ此散一裹ヲ服シ後接骨木花泡劑ヲ温

服セシメ以テ發汗スルニ至ル大抵ニ服乃至四服ニシ

効ヲ奏スルニ足ル又歇倚私的利家ノ半面痛膝痛及ヒ

面痛症患者衰弱シテ熱ヲ帶ヒサル者謨私篤氏此散ヲ

處メ偉効アルヲ徵セリ○謨私篤氏面痛治法不歟ト如

シ總テ藥劑劇性ニシ身軀ヲ激スル者ヲ忌ミ病人強壯

ニシ面痛未久シキヲ經サル者ハ患ル所々一方ニ蟻鍼

西不齋 卷之五 面痛 廣 用 堂

二三條ヲ施シ刺戟衝動セザル飲食ヲ命シ冷水ヲ多服
セシメ梅那橙葉泡劑ヲ用ヒテ毎日大便ヲ得ルヲ二行
而メ二日或ハ三日毎ニ早旦上ノ散劑一裹ヲ服セシム
ルナリ此散ヲ與ルヲ十五裹乃至二十裹ニシテ
至十日ニ面痛重症ヲ全治セリ或ハ冒寒若クハ神思勞動
ノ爲ニ其症再發スル者モ亦之アリト雖能ク此方ニ由
テ功ヲ收ムルヲ證セリ又越列幾的兒鍼或ハ麻屈涅篤
ヲ以テ面痛ニ施シ殊效ヲ見タリト云フ
○第一千六百二方 穢歇蘭度鎮靜水 リキオルケントエ
チキユス。トヘラシ
主 羅 穢歇蘭度鎮靜水

老利兒結爾斯水 護烏刺兒度水 各ニ
ヲ 薔薇水 四
ヲ
右調和供外用
主治面痛ヲ洗フベシ且阿芙蓉膏若クハ鉛粉膏ヲ痛處
ニ貼シ項窩ニ角法若クハ串線法及ヒ灸ヲ施シ疼痛發
作スル時ハ小水節ヲ以テ冷水ヲ射注シ疼痛歇ムニ至
ルヘシ○其他穢歇蘭度氏男女ノ春情旺盛及ヒ此ニ基
因セル症即遺精 夜間
日中 依朴昆垓兒歇倚私的利陰莖勃起
花風病等ヲ治スルニ此水藥ヲ以テ陰部ヲ洗滌スルヲ
稱賛ス但此諸症ニ施ス時ハ醋一二ヲ和メ尤效アリ
○第一千六百三方 列如耶爾
篤 篤爾設奧薄羸寄爾

廣 用 堂

青酸加里 四八

附

蒸餾水一斗溶解

右調和醃木棉塗痛所

主治面痛ニ宜シ青酸加里ハ劇藥ナリ青酸鎂加里ト混

同スルヲ勿レ

○第一千六百四方 〔飛拔耳度〕

青酸加里 二八至

四八

家猪脂 一

右丁寧調勻作軟膏塗擦痛所

主治面痛其他諸神經痛ニ宜シ

○第一千六百五方 〔噎別爾秘〕

精製馱刺篤里捏 五八

附

家猪脂 半斗至

一斗

右調和作軟膏取豆大塗擦痛所近圍日二三

主治面痛。膝痛。コキサルジ

一 膝痛之

肩痛ニ宜シ ○馱刺

篤里捏ノ内服ハ不要トス何トナレハ服量僅ニ十六分

ハノ一ニシテ消食機ヲ衰弱セシメ嘔吐頭旋不食症等

ヲ招ケズナリ外用モ亦大ニ謹慎ヲ加フヘシ感覺過敏

○本入千在テハ殊ニ然リトス

○第一千六百六方 〔衛私的爾連〕

亞格尼質捏 六八

附

阿列襪油 蘇家猪脂 三

錢

右丁寧調和塗擦患所

○第一千六百七方 〔同止〕

耳名ハ之ヲ水ニ溶化シ内外用ニ供セリ

第四

係神經核系症

シド、レイ、デ、ン、フ、ン、フ、ト、ル、ヘ、ル、セ、

依朴昆垓兒 イボコンデーリ 蘭 ラン

此症腹内壅塞アリテ本因ヲナス者多シ其治亦專此ニ從

事スヘシ痔疾條ニ列載セル諸藥 九百二方至九百十七亦

此症ニ適應ス即解釋越幾斯劑ニ醋酸加里液、孕鹼酒石ヲ

加フル者、酒石酸加里曹達 四十九方至五十九方 植物絞汁 九百九

方 護謨華爾斯藥ニ白石鹼或ハ牛膽ヲ加フル者 十方至

千六百方 硫黃劑 千六百二十九方 末里印泉及ヒ葛爾思泉等皆

千七百方

此ニ屬ス而ノ其清涼鹽類ハ其人感觸過敏ニノ畜血症ヲ

發セントスル者ニ用フベク起熱性ノ護謨華爾斯劑ハ粘

液質ノ者ニ施スベシ硫黃ヲ加フルハ痔疾ノ素因アル者

殊ニ宜シ且感觸非常ニ亢進セルヲ轉變セシムルハ此症

ヲ治スルノ一術タリ其功ヲ收ハルハ之ヲ轉變スル顯草

阿魏 千六百廿六方 等ノ如キ神經藥ヲ稱用ス輒近ニ至テ

強壯劑殊ニ鍍劑ヲ好トス但先苦味越幾斯劑ヲ與ヘ爾後

括失重冷浸劑ヲ用ヒ尋テ幾那ヲ投シ終ニ緩性鍍劑ヲ與

ヘ 千廿六方 至 千廿七方 最後天然ノ鑛泉ヲランセシス

ウアルバク。ス。バ。一。鑛。等。ヲ。用。ヒ。テ。全。效。ヲ。收。メ。シ。依。朴

泉ノ名

昆垚兒家ハ猛烈起熱ノ強壯藥ヲ服スルニ堪ヘズ○總テ
 依朴昆垚兒家ハ喜シテ藥ヲ服スルト雖猥リニ藥劑ヲ用
 ヒテ之ヲ侵ス勿レ最要ノ藥劑ニ止マルヲ良トス殊ニ上
 圍適度ナラシムベシ開豁氣中ニ運動シ身心操作ノ定課
 ヲ立テ食養ヲ淡薄ニスルハ尤須要ノ事件トス○其他冷
 水ハ飲料浴法殊ニ又海水浴共ニ用ヒテ神経系ヲ轉變シ且全體
 ヲ強健ナラシカルノ一良法ナルガ故ニ殊ニ之ヲ依朴昆
 垚兒ニ稱賛ス

○第一千六百九方

蘆根越幾斯 蒲公英越幾斯 各三錢

孕鹼酒石 半錢

以上三味加後件溶化

薄苛水 蒸餾水 各二

右調勻每頓一食匙日四次

主治感覺過敏多血質ノ人依朴昆垚兒ニ係リ其因有形
 ニシ腹内壅塞ニ原ツク者之ニ宜シ植物絞汁及ヒ第四
 十九方乃至五十三方モ亦佳ナリ

○第一千六百十方

護謨安沒尼亞幾 三錢 白石鹼 二錢 硫黃乳 大黃末 各

錢 蒲公英越幾斯 適

右二入爲二丸衣石松粉每服十九日三次

主治筋肉弛緩ノ冷工粘液多キ人ヲ於ル依朴昆蛭見
有形ノ因ヨリ來ル者之ニ宜シ其硫黄ヲ加フル者ハ腹
内畜血アル者ニ尤稱用スル所ナリ此症時時肛門ニ放
蟻スルヲ亦好トス

○第一千六百十一方同土

炭酸加里 硃砂各一錢 薄荷水三勺溶化加後味

蘆薈 沒藥 瘡瘡木脂 大黃各半錢 雜腹蘭一

右如法飽熟作越栗失爾每服四十滴乃至六十滴日三次

主治上二同之 窒卒德人名九

○第一千六百十二方

白石鹼 護謨安沒尼亞幾 蒲公英越幾斯各半
右調勻二匁爲一九衣石松粉每服十粒乃至十五粒日三
次

○第一千六百十三方 薩乙歇爾土人名丸

白石鹼 牛膽煮熬者各三錢 蘇甘沒尼錢 開達格碌屈斯

末兒秋私半錢

右調和加珊篤里越幾斯適宜二匁爲一九每朝空心服四

丸

備考其他薩乙歇爾土丸ノ一方アリ第七百九十二方ヲ

見ヨ

○第一千六百十四方〔加心葛爾度〕

牛膽煮熱者 珊篤里越幾斯 健知亞那越幾斯各二錢

右調和加大黃末適宜二匕爲一九衣石松粉每服七粒乃至十粒

○第一千六百十五方〔過傑栗屈的兒〕

護謨安沒尼亞幾 白石鹼 大黃末 牛膽煮熱者

吐酒石水適宜溶化者六匕

右調和二匕爲一九衣石松粉每服十九乃至十五九日三次

○第一千六百十六方〔同上〕

白石鹼 阿魏 蒲公英越幾斯各半

右調勻二匕爲一九衣石松粉服法同上三四六

主治第一千六百十二方ヨリ一千六百十六方至腹内壅

塞症及ヒ依朴昆垓兒ニ宜シ壅塞症經久ノ者ハ灌腸法

九百十九方至九百二十方ヲ施スベシ○第九百九方乃至九百十四

方及ヒ九百十八方モ亦用フベシ○解釋鑛泉類殊ニ末

里印泉及ヒ結樓私泉並ニ鑛泉ノ名ヲ尤稱賛ス輒近剛鑛泉モ

亦用フ

○第一千六百十七方〔吐鳥〕

白屈菜越幾斯 蒲公英越幾斯 阿魏 硫黃乳各二錢

廣利堂
卷之十 依朴昆垓兒

蘆薈透明者十五分白石鹼適宜

○右二瓜為二丸衣伊里私弗魯連底那末每服八九乃至十四九日三次

主治依朴昆垓兒宜之○其症從之服量ヲ増減シ每日軟便二三行ヲ得ルヲ度トス

○第一千六百十八方 結列印名依朴昆垓兒散

大黃末 橙皮黃各二錢 孕鹼酒石各三錢 麻屈涅失亞一錢

苗香油糖半

右調勻為散玻璃壘收貯每服一茶匙日三四次

○第一千六百十九方

硫黃乳二 大黃末一錢 橙皮黃 麻屈涅失亞各一錢半

孕鹼酒石 苗香油糖各三錢

右調和為散玻璃壘收貯每服一茶匙日三次

主治依朴昆垓兒殊効方トハ瀉下ノ効十分ナラサレハ

梅那葉末一錢乃至三錢又加之○其他第九百九方ヲ參

照スヘシ

○第一千六百二十方 朴昆垓兒

沈殿硫黃二 大黃末三 麻屈涅失亞五 孕鹼酒石

橙皮油半 蒲公英越發斯適宜

右為十二塊衣伊里斯弗魯連底那末玻璃壘密封日服三

塊 治前ノ二方 一千六百二十方 代用スヘシ 九乃至十

○第一千六百二十六方 遺傳 栗鼠 的兒 夫亞 五 年 餘 配 云

○白石鹼 錢二 瘡瘡木越幾斯 牛膽 各一 橙皮越幾斯

○蘆薈水製越幾斯 各一

右調勻二入為一丸 衣桂末從其症每服至八九

○第一千六百二十二方 護私篤

○大黃末 錢二 白石鹼 錢一 蜩蛄石 瘡瘡木末 茴香末

加耶普的油糖 錢各半

右調勻為散每服一茶匙 日三次 黃 根 野 夫 亞

主治右二方依朴昆垚兒胃中酸敗液ヲ兼ヌル者之ニ宜

○第一千六百二十三方 破 歇 藤 度

收斂 亞 的 兒 錢二 微篤 名 人 健 胃 丁 錢六

右調勻每服六十滴乃至八十滴冷水或燕麥粘汁一小盞

和服日三次

主治依朴昆垚兒歇倚私的利症遺精或ハ月經過多等ノ

衰弱ヨリ来ル者之ニ宜之ヲ用ヒテ感覺過敏ヲ調理

ノ后括失亞格綸僕依蘭答幾那等ヲ用ヒ灌水ヲ施スヘ

○第一千六百二十四方同上

明礬錢阿仙藥錢幾那越幾斯各二錢

右調和二公為錢衣桂末早晚服五丸乃至十九錢

主治同上錢葛私篤樓謨錢丁幾錢小亞的兒錢

○第一千六百二十五方同上

阿魏錢丁幾錢葛私篤樓謨錢丁幾錢小亞的兒錢

右調勻每服三十滴乃至四十滴日三四次

○第一千六百二十六方同上

著草越幾斯錢縵草越幾斯錢薄荷水四弓溶解加

後藥對林吳致聖胃中鋪煨藥錢

忽弗滿液錢

右調勻每服一食匙日四次

主治右二方錢依朴昆垓兒及錢歇倚私的利

症錢用錢レテ神經運機錢不調錢ヲ制錢スル錢ニ宜錢シ

○第一千六百二十七方同上

精製私的列幾尼捏錢麻僂涅失亞錢大黃錢白糖錢

右調勻為散分十二晝每服一晝日三次乃至四次錢

主治依朴昆垓兒及錢歇倚私的利錢ニ宜錢シ

○第一千六百二十八方

珪土末半錢至一錢

右分爲二十畧每服一畧日三服

主治近歲一患者アリ頑固ノ依朴昆垓兒ニ罹リ胃腸損敗及ヒ痔疾ヲ兼ヌ而ノ患者甚珪土ヲ喜ムニ由リ沈茂爾滿名入精粹細末ヲ撰用シテ良效ヲ得タリト云フ但珪土ハ久ク連進スヘカラス○先哲モ亦珪土ヲ以テ粘液流出失血依朴昆垓兒心思鬱憂病瘕癰心悸動等ヲ治セリ

○第一千六百二十九方穢歌蘭度

蓖麻油一 格碌莖キント 篤丁幾 半

右調和塗擦

主治顯著ノ小腹内閉塞症内臟硬結腫及ヒ此ニ由テ起ル所ノ歇倚私的利ニ宜シ又石鹼硬膏等ノ解凝硬膏類ヲ久用ノ鴻益アリ

歇倚私的利ハイス テ

此症原由依朴昆垓兒ト殊ニシテ小腹内諸器ノ疾患ニ係ル者ハ甚罕ナリ通例其因陰具ニ在リトス即月經不調白帶下子宮及ヒ卵巢ノ慢性燦衝子宮ノ位置變常等持ニ此症ノ起因ニ屬ス○歇倚私的利ノ直達治法ハ神經ノ運機ヲ轉變セシメ之ヲ強壯ニスルヲ主トス是阿魏瓦爾拔奴

葛私篤倭謨。橙葉等千六百三十方至千六百四十方所謂歌倚私的利藥

ヲ用フル所以ナリ以上ノ藥劑其證ニ當ルキハ効アリト

雖之ヲ誤用スルヲ亦往往之アリ之ヲ緩性瀉藥ト併用六千

百四十三方至千六百四十六方ノ適宜ニ大便ヲ利スルキハ其證大ニ整

理スルガ故ニ更ニ之ヲ妙トス若夫根治ノ偉効ヲ奏スル

者ハ保固強壯法トス即鍊劑千廿六方至千五十八方灌水法河水浴海

水浴ヲ施シ攝養ヲ節スル等是ナリ但鍊劑ノ如キハ獨脉

管系ノ興奮機亢進セサル症ニ用フベクノ而シテ初緩方ヲ

投シ後漸猛劑ニ轉スルニ宜シ蓋鍊劑ノ中ニ就テ格碌屈

私末見秩斯ヲ優レリトス○冷水ニ浴スルニ福爾咩名ハ

下法ヲ用フ其言ニ曰ク

予病者ノ強弱ヲ論セス之ヲ冷水ニ浴セシム或ハ始微冷水ヲ用

始ハ列氏二十二度乃至二十三度ノ冷水ヲ以テス而

シ患者水中ニ坐スルヲ久シキモ毎回十瞥眠乃至十五

瞥眠ニ過キス病者漸ク之ニ慣ルニ從ヒ毎日浴水ノ

冷一度ヲ降シ而シ其浴スル時刻モ亦隨テ減殺ス冷度

漸ク降テ十度ヨリ十四度ニ至レハ其浸坐スルノ極メ

テ短促ニシテ一瞥眠間ニ三次四次六次ニ至ル其法患者

浴桶中ニ坐シ棉布ヲ冷水ニ醃シ不斷之ヲ頭上及ヒ頸

圍ニ貼ヒ寒冷ニ慣ルレハ其棉布上ニ冷水ヲ灌注シ其

後布ヲ脱ノ裸體ニシ直ニ頭頸及ヒ脊椎ニ流注ス但每日其度數及ヒ水量ヲ増シ冷度モ亦隨テ降ラシム此法ヲ行フノ外予又冷水ヲ豚膀ニ盛リテ朝夕小腹上ニ安セシム病ノ發作頻頻ナレハ隨テ頻頻之ヲ施セリ
上項ノ冷水浴ハ倭朴昆堙兒歌倚私的利俱ニ適當ス○歌倚私的利ノ瘧發作スル片ハ鎮瘧劑千六百四十七方至千六百六十五方ニ宜シト雖亦安用スルト勿レ或ハ羽髮ヲ焚キ或ハ蒜葱ヲ剉ミ嗅シメテ殊効ヲ奏スルト屢之アリ芥子泥モ亦貼スベシ脚湯ハ却テ諸證増進スルト間之アリ刺絡モ亦害ヲナス症多シ○病婦訴ル所ノ證狀多ナルカ故ニ逐一

其治方ヲ處スルヲ能ハス蓋其症隱見速ナルヲ常ト以然氏患者藥ヲ好ムカ故ニ之ヲ投セスノ徒ニ辨說ヲ費シ以テ之ヲ慰スルトヲカハルハ醫信ヲ失フニ殆シ是故ニ一ニ其方ヲ轉ノ患者ノ需ニ應スルヲ巧ト以局處ノ定證ヲ治スルノ方ハ千六百六十六方ヨリ千六百七十一方至ニ列載ス又歌倚私的利ノ局發證ニ寒暑法ヲ施シ鴻益ヲ得ルト多シ○諸種ノ塗擦法硬膏及ヒ灌腸モ亦用フヘシ六十

百七十二方至千六百七十七方

○第一千六百三十方 會電發謨名人歌倚私的利丸三

上好沒藥 瓦爾拔奴謨錢各半 葛私篤儂謨十五 阿

○右加拔爾撒謨^ハ幸露適宜^ハ二^ハ為^ハ一九衣石松粉每晚服三

○第一千六百三十一方 類方

葛私篤樓謨^ハ沒藥 瓦爾拔奴謨^ハ各半 阿魏^ハ一

右調勻加續草下幾適宜二^ハ為^ハ一九衣石松粉每服三九

乃至八九日三次

○第一千六百三十二方

瓦爾拔奴謨 白石鹼^ハ各半

右調勻二^ハ為^ハ一九衣石松粉晨夕服六九乃至十九

○第一千六百三十三方 第陽

白石鹼^ハ三錢 阿魏 牛膽^ハ疑固者 各一錢

右調勻二^ハ為^ハ一九衣石松粉玻璃壘收貯每服十九日二

次

○第一千六百三十四方 同上

沒藥 格綸僕根 撒爾末兒秩斯^ハ各一 葛私篤樓謨

蘆薈^ハ各半 錢

右調勻加亞爾鮮越幾斯適宜二^ハ為^ハ一九晨夕服十九

○第一千六百三十五方 叔拔爾訖

葛私篤樓謨^ハ半 阿魏^ハ二 加密列越幾斯^ハ適宜

右為百二十九衣桂末玻璃燻收貯每一時半服十九
○第一千六百三十六方和港私

葛私篤樓謨錢 精製阿魏半錢 薄荷油四滴 纈草越

幾斯適

右為九十九衣法尼利末玻璃燻收貯每服六九日三次

主治一千六百三十方ヨリ一千六百三十六方至歌倚私
的利有形ノ因ニ係ル者弛緩症粘液畜積風氣鬱畜瘰癧
症等ニ宜

○第一千六百三十七方同上

纈草半 橙葉半 默栗薩葉二

右細剉調勻早晚取一食匙乃至二食匙熱湯浸出

○第一千六百三十八方穢歌蘭度

綠橙葉 纈草 水楊梅 默栗薩葉各一 軒藥各一

右細剉調勻每晚取一二食匙注熱湯二小盞浸漬一夜早
晚取其半冷服

主治右二方歌倚私的利及ヒ依朴昆堙兒ニ用ヒテ神經
運機ヲ轉變スルニ宜シ○此方ヲ用ヒテ効ヲ得ント欲
スレバ數月連進スルヲ要ス

○第一千六百三十九方春燈隣

雜腹蘭錢 蘇格爾需謨葉半錢 纈草三錢 橙花半

廣 脾 堂

薄荷葉錢二 胡荽子錢一

○右細剉調勻取二食匙水三小盞浸出每服一小盞日三次

温用

主治歇倚私的利及依朴昆堙兒宜シ

○第一千六百四十一方別連杜

雜腹蘭錢半 橙花錢三 加密列錢二

右細剉調和取一大食匙水三小盞浸出一日服盡

主治依朴昆堙兒及歇倚私的利ニ用ヒテ神經強壯劑

トス神効アリ十八

○第一千六百四十一方護私篤

實芟荅利斯一 純精酒石一 杜松子油糖

加耶普的油糖各半

右調勻為散分十二晷每晚若隔晚服一晷

主治歇倚私的利ノ發作ヲ防グニ宜シ殊ニ其症感觸敏

捷ニノ畜血ヲ兼ヌル者ニ用フベシ○又艾根一刀ヨリ

半錢至三四日每ニ早旦温麥酒ヲ以テ送下シ蓐ニ就テ

發汗セシメ以テ歇倚私的利ノ發作ヲ防クヲ謨私篤氏

甚稱贊セリ

○第一千六百四十二方過傑栗屈的兒

大黃末 麻掘涅失亞各一 葛私篤六

卷西 卷十五 葛私篤

遠山本草 卷之三 歇倚私的利 廣勝

右調勻為散頓服

○主治歇倚私的利ノ發作胃中酸液ニ因ル者之ニ宜シ

○第一千六百四十三方 [謨私篤]

蘇縵草 白芷 默栗薩葉 蘇格爾需謨葉 [附] 葡萄草

半葉 [附] 各半錢 橙葉 加密列 [各一錢] 菖蒲根 胡荽子 括

失亞 梅那 [各三錢]

右細劉調勻泡出用

○主治歇倚私的利便秘スル者之ニ宜シ ○每日瀉二行ニ

過グレハ梅那ノ量ヲ減ス菖蒲根括失亞ノ為ニ嘔氣ヲ

發スル者ハ此ニ味ヲ去ル

○第一千六百四十四方 [過傑栗屈的兒]

梅那 昆設爾弗 [各六錢] 至酒石酸 [各二錢] 白糖 [各一錢] 橙花

水 [各二錢] 過設印亞的兒 [各半錢]

○右調勻每半時或一時服ニ食匙以至得効

○第一千六百四十五方 [同上]

大黃水製丁幾 [各三錢] 單方葛私篤儂謨丁幾 [附] 滿那

舍利別 [各一錢] 忽弗滿液 [各半錢]

○右調勻每二時服ニ食匙以至得効

○第一千六百四十六方 [渴優滿]

謁刺篤留謨 [附] 姜 [各一錢]

右調勻為六十九衣石松粉每晚服一二九

○主治千六百四十四方ヨリ千六百四十六方至歌倚私的

利ニ用ヒテ瀉ヲ促スニ宜シ

○第一千六百四十七方

葛私篤樓謨丁幾單方半方

○右每四分時或半時取十滴乃至十五滴沙糖和服

○第一千六百四十八方

葛私篤樓謨丁幾亞的兒製半方

○右每四分時或半時取六滴乃至十滴沙糖和服

○第一千六百四十九方扑澎私

過設印亞的兒

葛私篤樓謨丁幾

各一 續草油五滴

右調勻每八分時服十五滴乃至二十滴以達痙攣鎮靖

○第一千六百五十方過傑栗屈的兒

葛私篤樓謨丁幾

單方 忽弗滿液

各二錢

右調勻隨症服三十滴乃至五十滴

○第一千六百五十一方同上

葛私篤樓謨丁幾

錢一 續草丁幾

亞的兒製二錢

舍電阿美

蓉液

右調勻病證發作中每四分時若半時服十滴乃至二十滴

○第一千六百五十二方依拂朗屈

○藥 纈草丁幾 橙皮丁幾 葛私篤樓謨丁幾 亞
錢各半
 右調勻病證發作中服一茶匙

○第一千六百五十三方 別連杞 丁幾 亞
錢
 舍電阿芙蓉液 葛私篤樓謨丁幾 纈草丁幾

○藥 舍電阿芙蓉液 葛私篤樓謨丁幾 纈草丁幾 亞
錢
 右調勻每二時取十滴十五滴乃至三十滴加密列泡劑點

○第一千六百五十四方 福極篤 鹿角精 忽弗滿液 亞
錢
 葛私篤樓謨丁幾 鹿角精 忽弗滿液

右調和每服四十滴加密列泡劑點服

○第一千六百四十五方 過傑栗屈的兒

甘消石精 鹿琥精 阿芙蓉丁幾 亞
錢

右調勻每服二十滴沙糖點服

○第一千六百五十六方 歐憚

加密列油 甘海鹽精 亞
錢

右調勻每服十滴沙糖點服日三次

○第一千六百五十七方 叔瀝煙爾

纈草油 過設印亞的兒半 亞
錢

右調勻每半時取十滴乃至十五滴沙糖點服

○第一千六百五十八方〔過傑栗屈的兒〕

菲阿私越幾斯一 鹿琥精半勺溶解

右調和每服十六滴漸加增

○第一千六百五十九方〔弗陽〕

亞爾鮮丁幾 葛私篤倭謨丁幾 鹿琥精各二錢 舍電

○阿芙蓉液一

右調勻每服四十滴日四次

○第一千六百六十方〔同上〕

顯草丁幾 府利丁幾 遏設印亞的兒各一錢 加密列

蒸餾油 薄荷蒸餾油各十滴

右調勻每服三十滴乃至四十滴日四次

主治 千六百四十七方ヨリ千六百六十方至歇倚私的利

痙攣ニ亙シ○但其神經運機ノ變常セル者脈管系觸動

機ノ亢進ヲ兼ヌルト否ルトヲ診別スルヲ要トシ觸動

機亢進セル者ハ衝動藥ヲ屏ケテ老利兒結爾斯水。菲阿

私越幾斯。亞鉛華。甘消石精等ヲ用フベシ

○第一千六百六十一方〔速別倫歇愷〕

加密列油一 亞的兒製一 甘消石精三錢 溶化加後味

礮砂加過泥子精一錢

右調勻每服十滴乃至十五滴沙糖點服日三四次

主治歇倚私的利及心風氣鬱畜症等宜三四次

○第一千六百六十二方〔過熱栗屈的兒〕

續草末半 葛私篤二 樓謨二 揮發鹿角鹽半 錢半 和

右調勻為散分十五服臨症一服

〔主治同上〕

○第一千六百六十三方〔復方〕 默栗薩水二 飽熟二 日二 後蒸二 餹

默栗薩新葉一 枸椽皮新鮮者 肉豆蔻 胡荽子

桂 水楊梅各 右細剉注再餹燒酒六比飽熟二日後蒸餹

取液減至四分一〔至四十前日四水〕

主治此方諸種ノ神經病殊ニ歇倚私的利及心風氣鬱畜

症ヲ治スルニ往昔大ニ稱用セリ用法每服半茶匙一茶

匙乃至二茶匙日二三次

○第一千六百六十四方 類方

默栗薩新葉一 枸椽皮新鮮者 肉豆蔻 白芷各三

桂 水楊梅各一

右注再餹燒酒六比默栗薩水三比飽熟三十六時

○第一千六百六十五方 劉西名水

白石鹼三 亞爾箇兒一 溶化濾過加後味

鹿角鹽錢半 礪砂加石灰精二

右調勻每服五滴乃至二十滴冷水或茶點服

主治 歌倚私的利 瘧疾 蛇毒 等 宜 之 又 嗅 藥 二 用 一

○第一千六百六十六方 謨私鳥 三十四 瘧疾 三十六 瘧

精製酒石鹽 錢 芸香越幾斯 錢 纈草水 綿苔幾里

私布水 加密列水 各 二 忽布滿液 錢 一

○右調勻每半時服一食匙

主治 歌倚私的利 瘧疾 性嘔吐 宜 之 里 歌利飲 及 七

沸騰散 八 百 八 方 亦 同 効

○第一千六百六十七方 弗陽

別私黠設弗神經丁幾 錢 菲阿私越幾斯 半

右調勻每一時十五滴沙糖或薄荷泡劑點服

主治 所謂歌倚私的利 家ノ偏頭痛 宜 之

○第一千六百六十八方 歌戾

拔爾撒謨字露 錢 甘海鹽精 燒酒 各 適 宜

右溶和取一茶匙塗擦頭痛處

主治 偏頭痛 或ハ歌倚私的利 家ノ局所頭痛 宜 之 又 嗅 藥 二 用 一

偉効アリ 歌爾名頑固ノ歌倚私的利 頭痛ヲ治スルニ 忽

弗滿拔爾撒謨非答ヲ以テ 曼陀羅華丁幾ニ和シ 痛處ニ

塗擦スル下日ニ二次乃至三次

○第一千六百六十九方〔秘傳律秘〕

精製阿魏錢半 民埜列里精一弓溶解

右調勻每服四十滴乃至五十滴日三次

〔主治〕腦ノ第十對神經ノ瀰蔓セル部ニ係ル歇倚私的利

性諸症。痙攣效。嘶嘎。咽喉及胃ノ痙攣ヲ兼併セル者此

方ニ宜シ

○第一千六百七十方〔弗。貯。爾。姪。蒲。蘭。突〕

萬管越幾斯刃半 亞刺昆亞蘊護漿適

已上二味丁寧調和加後味

井水弓六 覆盆子舍利別弓半

右每一時服ニ食匙

〔主治〕痙攣效。不眠。及歇倚私的利性諸症ニ宜シ

○第一千六百七十一方〔福。屈。篤〕

雜腹蘭末八十八 阿芙蓉末八三 洛黥私八 非祿沙越幾斯

〔蒿。苜。ノ。一。種。ニ。十。四。八。〕

右調勻為十二丸。衣金箔。玻璃壘收貯。每晚臨卧取一九。顯

草泡劑送下

〔主治〕歇倚私的利不眠症ニ宜シ

○第一千六百七十二方

○阿芙蓉丁幾 礶砂加石灰精各一錢 忽弗滿拔爾撒謨

○非答半 複方白芷精二錢

右調勻塗擦

○第一千六百七十三方遇佛栗屈的兒

阿魏丁幾 阿芙蓉丁幾各二錢 複方乳香精半

右調勻塗擦心窩

○第一千六百七十四方同上

琥珀油半 薄荷油十五滴 礶砂揮發華水 鹿琥精

舍電阿芙蓉液各一錢 非阿私油 加密列油各煮製者六錢

右調勻塗擦心窩

○第一千六百七十五方同上

瓦爾拔奴謨加雜腹蘭膏一 阿魏膏二錢 薄荷油十二

右

右搥和攤彈貼心窩

○第一千六百七十六方別連杜

加密列一 熱湯適宜浸濾過取五加後味

雞子黃二 阿列襪油二 白糖半

右調勻作乳劑為灌腸方

○第一千六百七十七方

阿魏二錢

右加嬰粟殼煎一匙搗爛瀝過為灌腸劑

主治一千六百七十二方ヨリ一千六百七十七方至歌倚私的利證ニ宜シ

○第一千六百七十八方〔歌倚私的利〕

格綸僕根半 井水十二勺煮熟至八勺瀝過加後味

鐵丁幾 纈草丁幾 橙皮丁幾各一錢

右調勻每服二食匙日四次

主治歌倚私的利ニ強壯劑トシテ用ヒ功ヲ収ムルニ宜シ

遠西方彙卷之十五 五十六

