

遠西方彙

十九

格列刺	○卷之十九
特發格列刺	
流行格列刺	

499.2
En-2
7

e 12

F 7
E-22



富士川文庫
3264



499,2
E_m-2
7
No. 1392
B e 12

伊東瑶川院譯

七帙

遠西方彙

原本紀元一
千八百五十
二年鏤行

廣胖堂藏



遠西方彙卷之十九

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑斐婆都 譯

○某二... 侍醫法印伊東瑶川院 貞文仲 重譯

南洋伊東 亨健夫 參校

特發格列刺バコレラオヲスロパスチセブラチカラシクロトプ蘭

此症療法甚簡易ナリ直ニ心窩ニ芥子泥ヲ貼シ次テ阿美

蓉散或ハ之ニ吐根ヲ加用スニ千五十九方之ニ由テ吐逆

即止ミ胃能ク藥ヲ受タルニ至ラハ油性粘滑ノ乳劑ニ阿

芙蓉丁幾二三滴ヲ和シ二十六方與十一方若吐逆止マザル氏ハ
 里歇利飲方一或ハ沸騰散二方至三方八百八九百五十八
七方ニ十方ヲ投スヘシ吐腹ニ乾角法及ヒ温暖香竈ノ罨法
 六十二方ヲ投スヘシ吐腹ニ乾角法及ヒ温暖香竈ノ罨法
 偉効アリ○輓近貯設爾氏ノ書載セル治法二千六十五方
 方一種ノ奇効アリテ他藥ニ優レリ至二千六十八方

○第二千五十九方

精製阿芙蓉一八至 白糖二

右調勻為散分四服每一時半一服

○第二千六十方

精製阿芙蓉一八至 吐根末二 白糖二

右調和為散分四服每一時半一服

主治右二方特發格列刺ニ用フ一朝八至一朝半一服

○第二千六十一方

甘扁桃油二錢 亞刺昆亞護謨漿六錢 加黑櫻實水四

搗和作乳劑更加後味

阿芙蓉丁幾八滴至十二滴 過爾托舍利別半

右調勻每一時服一食匙

主治特發格列刺吐逆止テ後之ニ宜シ吐瀉甚シクノ未

止マザル氏ハ上欸ノ散方二千五十九方ヲ兼用スベシ

○第二千六十二方（和瀝私）

精製阿芙蓉八分 過炭酸曹達十五 薄荷油

糖半乃至

右調勻為散分六裹蠟紙包裹每半時取一裹加枸椽汁一

小食匙乘沸騰服

主治特發格列刺ニ宜シ○此方通常ノ沸騰散ニ優リ虛

衰セル胃モ亦能ク之ヲ受クルニ堪フ

○第二千六十三方 溼優滿

阿芙蓉一 過炭酸曹達十二 肉豆蔻六 白糖二

右調勻為散分四服蠟紙包裹每一時乃至一時半一服

主治特發格列刺ニ宜シ

○第二千六十四方

吐根半 酒石酸 枸椽油糖各半 過炭酸曹達十五

右調和為散分六服蠟紙包裹每一時取一裹乘沸滾飲服

主治格列刺類症劇甚嘔吐胃瘧間歇胃瘧及ビ疝痛等ヲ

治ス

○第二千六十五方 阿肝設爾

酒石鹽二錢 醋適 二味飽和加後藥

阿芙蓉丁幾 吐根舍利別 蒸餾水四

右調和每四分時乃至半時服一食匙

主治膽液性格列刺ニ宜シ之ニ兼テ發汗ヲ獎メ且米飲

ヲ温服セシムベシ」後治法トシ小量大黄或ハ格綸僕効
アリ

○第二千六十六方〔同上〕

結晶硝酸銀一

右蒸餾水一匁溶化毎一時服一茶匙

主治 膽液性格列刺下利減シテ嘔吐持續スル者此溶液

ヲ用フル時ハ其効驚クベシト云フ

○第二千六十七方〔同上〕

吐根末半錢

吐酒石半匁

漿粉十匁

右調勻為吐方

主治 薩滲爾刺列格列刺ハ良能力弱クノ胃腸ノ汚物ヲ

排泄スルニ足ラズ故ニ大量大黄及ヒ薄荷加密列泡劑

ヲ兼用スベシ

○第二千六十八方〔同上〕

酒製大黄丁幾匁半

阿芙蓉丁幾錢半

忽弗滿液半匁

右調勻毎一時服四十五滴

主治 膽液性泄瀉ニ宜シ兼テ米飲ヲ温服セシム○腹痛

劇甚割クガ如キ者ハ桂水ニ水製番木鱉越幾斯ヲ稀淡

溶化シ用ヒテ偉効アリ○腸ノ粘液膜嫩衝アル者ハ扁

桃乳若クハ亞刺毘亞蘆謨漿ニ消石及ヒ吐根舍利別ヲ

配用ス

○第二千六十九方 謁兒列爾ル名發汗鎮瘧水

忽弗滿液 鹿琥精各二錢

右調勻每一時乃至一時半二十滴乃至三十滴沙糖和服

〔主治〕慢性癩麻質斯。慢性痛風。諸瘧。瘧若クハ格列刺瘧

ヲ兼ヌル症ニ宜シ第二千九百六十五方ヲ參照スベシ

○第二千七十方〔履結〕

精製礬土半錢 地亞格實溫三錢 扁桃乳舍利別 茴香

水各六錢

右調和每四分時服一茶匙

〔主治〕乳兒ノ劇性格列刺ニ宜シ

○第二千七十一方〔護利松〕

遏爾托煎二 舍電阿芙蓉液二滴 橙花舍利別二錢

右調勻每半時服一茶匙

○第二千七十二方〔同上〕

複方迷迭香軟膏半 龍腦半錢 舍電阿芙蓉液一

右調和塗擦

〔主治〕右二方小兒特發格列刺ニ宜シ

流行格列刺コレ オラ ステ ルセ オフ エピ デミ セコ レラ 蘭

○預防法

流行格列刺ヲ預防スルニ最慎重スベキ事件左ノ如シ
第一 飲食度ニ適スベシ惣テ食餌ハ化シ易クメ極メテ
淡薄ノ滋養物ヲ用ヒ多脂ノ鹽蔵肉ヲ一切禁忌ス假令
之ヲ食スルモ些少ニシテ止マルベシ粘質及ヒ粉質ノ
品即裸麥米大麥西國米等ハ生蔬及ヒ諸菜根ニ勝リテ
佳ナリ諸種ノ萵苣及ヒ魚類ハ食スルコト勿レ只ハ「
魚名及ビ」サルデ「同上」少許食メ可ナルノミ果實モ亦適
宜ニ喫スルハ許スベシト雖梅李ノ如キハ決メ用フル
コト勿レ○飲料ニ赤葡萄酒若クハ燒酒ヲ冷水ニ和シ用
フヘシ亦多服スレハ害ヲナシ易シ適宜飽釀セル苦麥

酒 例スルニベ 一ヲ用ヒテ良ナリ並ニ赤葡萄酒ニ三盞
エニル産ノ品

或ハ居恒ニ燒酒ニ慣ル者ハ適宜ニ之ヲ用フルヲ好
トス

第二 冒寒ヲ忌ムベシ肚腹及ヒ足ヲ冷スコト勿レ居恒ニ
弗刺涅兒ヲ用ヒテ腹部ヲ被覆スヘシ

第三 努カメテ身體ヲ清潔ニシ且居室寢室ニ新氣ヲ通
スベシ然レ格列刺流行ノ時躰躬ヲ冷水ニ洗ヒ或ハ川
流ニ浴スルハ居恒之ニ慣ル者ト雖亦禁戒スベシ居
室寢室ハ常ニ牖戸ヲ開キテ新氣ヲ通スヘシ若故アリ

テ戸ヲ閉ツレハ醋或ハ香竈醋 ニ千ハ 室中ニ撒メ以

テ其氣ヲ新鮮ナラシムベシ居所ノ近傍ニ格列刺病者
在ルキハ其傳染毒ヲ攘ハンガ為ニ格魯林氣ニ千方ラ
發揚シ或ハ護矣頓謨爾歌亞優人名ガ薰法ヲ施スベシ
但胸病人其室ニ在ラハ私密篤名ガ硝酸薰法ヲ佳ナリ
トス

第四 過房ヲ戒ムベシ

第五 身體ヲ安シ殊ニ夜間靜息スベシ

第六 心思ノ振起抑鬱俱ニ戒メ安靜シテ天命ニ委シ格
列刺病ヲ恐怖セザルヲ要ス

第七 人道或ハ職務ニ關係スルニアラザレハ格列刺病

者ヲ訪フト勿レ何者格列刺病ヲ感スルノ素因ハ蓋一
般瀰蔓セル者ニアラジト雖感覺敏捷ノ人ニ在テハ自
然感染シ易キヲ以テノ故ナリ然レ氏之ヲ訪ハザルヲ
得ザルキハ必空心ナル勿レ先哥喜一杯及ヒ葡萄酒若
クハ燒酒一盞ヲ用ヒ白蒸餅一片或ハ乾蒸餅一二個ヲ
喫スベシ

第八 預防ノ方法夥多之アリ皆初歐羅巴洲ニ格列刺流

行ノ時稱用セシ所ナリ能ク身心及ヒ胃腸ヲ強壯スル
ハ小補無キニアラス自カラ之ヲ深信受用スル者ハ無
畏ノ心真實ナルガ故ニ愈其利益アルヲ自然ノ理ナリ

中ニ就テ硫酸規尼捏二千七百七十五方第一品ト匹苦味

酒二千八百ハ常ニ慄悍飲液ニ慣レタル人ニ最佳ト匹賜

葛歇爾名ハカ香竈亞的兒二千八百ハ亞的兒製加密列油二千

七方ト同ク當時甚稱用セリ然レ此ニ方今ニ至テ世ニ

廢セリ收斂亞的兒二千七百七十五方並ニ越栗失爾茂印失屈篤ハ

多血質ニノ蓋血ヲ患ヒ易キ者最的當ナリ松脂硬膏二千

八百及ヒ其他諸種ノ香竈胃硬膏二千八百十五方ハ一遍

ニ肚腹ヲ温メ適宜ニ皮表ヲ刺戟シ誘導ノ効アルカ故

ニ利益アリトス然レ弗刺涅兒ヲ以テ被覆スル片ハ能

ク其効ニ代フベシ其他預防ノ最良法ハ飲食攝生ヲ節

シ並ニ序証ノ治法宜ニ適スルニアリ

○序証治法

速ニ適宜ノ治ヲ下ス片ハ一日若クハ二三日ヲ出ズメ

癒ユル者多キガ故ニ序証ヲ治スルノ法最簡要ト匹若

夫格列刺流行ノ時節併行スル所ノ泄瀉ハ忽格列刺正

証ニ轉スル者屢之アルガ故ニ能ク此ニ注意スベシ若

此般ノ泄瀉ニ罹ル片ハ速ニ蓐ニ就キテ薄荷或ハ綿苔

幾里私布名ハカ默栗薩或ハ加密列ノ泡劑ニ三杯ヲ温服シ阿

芙蓉丁幾二三滴二千八百或ハ阿芙蓉吐根散二千ヲ用

ヒ肚腹ニ大芥子泥ヲ貼シ而メ後蒸餅心及ヒ香竈藥ニ

赤葡萄酒或ハ燒酒ヲ加ヘテ毬布ヲ作り温煖ニメ之ヲ
貼ス惡心若クハ嘔吐ヲ發スル者ハ沸騰散二千七百方ヲ作
リ其症ニ準メ半時或ハ一時毎ニ與フベシ○最初食ヲ
思ハス胃中汚物ノ証狀ヲ見ハス者ハ吐根二千八百方
申ヲ用ヒテ一舉ニ病胸ヲ頓挫スルニ足ルヘテ往々之ア
リ小量放血絡刺ハ唯少壯ノ人頭止及ヒ胸部畜血アル者
面赤盈脹頭旋シ熱性ヲ帶フル者ニ罕ニ之ヲ施スベキ
ノミ○胃部疼痛緊張シ苦悶甚キ者ハ芥子硬膏ヲ貼シ
或ハ放蟻二三頭若クハ吸角法ヲ施スニ宜シ○其他總
テ身心不安ヲ覺ユル殊ニ寒氣ヲ冒セシ後ハ藜ニ就

キ泡劑二三小盞ヲ温服ノ遍身發汗セシムルヲ佳トス

○格列刺正症治法

敏性格列刺コレラエレチスチカハ總テ序症ノ治ニ同シ之ニ兼

テ乾温毛巾ヲ用ヒテ切ニ遍體殊ニ四肢ヲ摩掌シ且身

ノ兩側及ヒ兩足ニ湯瓶ヲ安シ少腹及ヒ腓腸ニ芥子硬

膏或ハ少腹ニ香竈毬布若クハ裸燕麥製温暖毬布ヲ貼

シ冷ユレハ即更換スベシ飲料ニハ香竈藥淡泡劑ヲ用

ヒ若温液ヲ服メ惡心シ數次吐出スル者ハ冷水少許ヲ

與フ泄瀉過多ヲ防クハ十密扭篤二十密扭篤乃至三十

密扭篤每ニ單阿芙蓉丁幾三滴乃至五滴ヲ與フ或ハ猛

烈哥喜若クハ香竄揮發衝動ノ性アリテ皮膚運營ヲ振
 起スルノ丁藥劑二千八百九十九方至ニ阿芙蓉丁藥ヲ和用
 スベシ頭上畜血ノ証狀アラハ速ニ阿芙蓉ヲ屏クベシ
 ○嘔吐ヲ治スルハ胃部ニ芥子硬膏ヲ貼シ其他沸騰散
二方三方八百八十八方千九百五十八
方至千九百六十三方千九百七十八
 喜少許攝爾都兒水或ハ暹野酒一盞ヲ用フルニ宜シ○
 壯實多血ノ人及ヒ貴要部畜血アル者ハ適宜ノ放血蝨
 鍼若クハ吸角ヲ施スベシ内服鹽酸二千二百十三方格魯
 林水二千二百十五方稀硫酸二千二百六十六方硫酸密幾私去爾附二
百十七方千二百九十九方發烟消石精二千二百廿一方ニ宜
百十八方千二百九十九方

シ瘰癧ハ小量吐根二千六百五方老利兒結爾斯水安沒尼
 亞劑殊ニ民埜列里精二千二百廿三方至鹿琥精二十七方至
二千九百等ニ宜シ古來格列刺ヲ治スルニ甘汞二千六百三
二千二百方甲ヲ專用セリ蓋誤用セシ一往々之アリ輓近此
 症流行ノ時令多クハ之ヲ阿芙蓉二千四百三十九方番木
 鱉二千一百四或ハ龍腦二千四百ト配用ノ偉効ヲ得シ一
 屢之アリ○亞硝酸毘私繆篤二千四百四十五方至ハ疇昔
 大ニ嘉稱アリト雖後世廢メ用ヒズ亞鉛華二千四百七
 亦復然リ○輓近ニ至テ結晶硝酸銀二十七方四及ヒ炭水
 素亞的兒附二千六百六十七方ヲ甚稱用セリ○館爾私高

名地格列刺魯人八十密扭篤乃至十五密扭篤每ニ熱湯一盞
 ラ與ヘテ良驗アリト云フ一十八百四十九年及ヒ一千
 八百五十年庚布失偃名地ニ格列刺流行セシ時病院ニ於
 テ此療法ヲ用ヒテ甚佳効ヲ得タリ○或ハ浴湯ノ効ヲ
 稱スト雖決ノ其望ム所ノ功ヲ収ムルナシ蒸氣浴ハ
 更ニ劣レリ○遍體殊ニ四肢ニ酒精劑及ヒ衝動劑二百七
十三方。二十方。ヲ塗擦スルハ唯皮膚ヲ冷ヤスヲ以テ輓近
 殆ト廢ノ用ヒス往昔殊ニ腓腸ノ痙攣ニ之ヲ用フト雖
 温暖毛布ヲ以テ徐々ニ摩挲シ並ニ芥子硬膏ヲ貼ムル
 ハ痙攣ヲ鎮靜スルノ効更ニ大ナリ篤祿私設名地見人ハ菲

阿斯油ノ塗擦二十方百ヲ稱賛セリ

卒中性格列刺レコレハ猛烈衝動劑ニ宜シ即峻烈

ノ安没尼亞劑二十方百至二十方百魚的兒二十方百

及ヒ亞的兒油二十方百至二十方百龍腦二十方百

方倚館蘭根附二十方百麝香草根二十五方百麝香附二十五方百

二十方百等是ナリ○輓近氷二分食鹽一分ヲ合ノ遍身

ニ塗擦シ其症ニ準ノ半時ノ後再復之ヲ施ス此法殊ニ

効ヲ奏セリ之ヲ塗ル毎ニ後必温毛布ヲ以テ病者ヲ被

覆ハ蓋芥子硬膏及ヒ湯瓶ヲ併用シテ其治ヲ扶クベシ

○卒中性格列刺危篤ノ症ニ葛私百兒名地ヲ稱賛セル浴

水法ヲ施メ問小効ヲ得ル_トアリ浴法先患者ヲ列氏ニ
十七度ノ温湯ニ浸坐セシム但湯ノ量ハ病者ノ臍上ニ
至ルヲ度トス次ニ冰冷水三四桶ヲ用ヒテ適宜ノ高所
ヨリ頭背及ヒ胸上ニ瀉注シ兼テ別ニ冰冷水一二桶ヲ
取り稍カヲ用ヒテ胸部及ヒ胃部ニ投_ス速ニ此浴ヲ終
リテ温暖毛布ヲ以テ患者ヲ被覆シ蓐ニ就カシム既ニ
蓐ニ就テ后棉布ヲ冰冷水ニ醺シ之ヲ絞リテ頭上胸部
及ヒ小腹ニ安定シ屢之ヲ更換スルヲ要ス然_レモ兩足ハ
湯ニ醺シ絞リタル棉布ヲ以テ被包シ亦同ク頻々之ヲ
更換セシム此寒温兩番法ヲ昼夜持重ノ脈動按知スベ

ク生命復シ来ルニ至ル瀉水浴ハ其症ニ準メ一時半乃
至ニ時毎ニ行フベシ葛_カ私_ス百_ハ兒_ハ氏_ハ鑛_酸六_弓或ハ芥子
脚湯ヲ併用セシ_ト屢之アリ湯量膝下ニ至ルヲ度トス
或ハ冷水或ハ嗜好ニ應_メ麥酒ヲ冷服セシム大便秘ス
ル者ハ冷水醋等分和_シ灌腸シ或ハ間食鹽少許ヲ之ニ
加_シ劇症ニ在テ葛私百兒氏唯此浴法ヲ施メ決_シ醫藥
ヲ用ヒズ輕症ハ間民_埜列里精或ハ其症ニ從テ甘_永大
黄ヲ與_フ然_レモ其之ヲ用フルヤ大抵其症既ニ生力奮起
セル者ニ於テス而_{シテ}頭上蟻_蟻鍼或ハ刺絡ヲ併用セリ
○生力奮起期治法

生カ奮起十分ナラサル者ハ其治通常ノ法ニ從フ而ノ
 血脈系及心神經系ノ衝動ヲ鎮降セシガ爲ニ時々沸騰
 散ヲ用フベシ然レ奮起度ニ過キ發熱ノ頭上畜血証ヲ
 見ハスハ刺絡ノ六弓乃至八弓ノ血ヲ瀉シ前頭及心
 顛顛ニ放蟻シ。頭上寒菴法。項窩及心腓腸ニ芫菁膏或ハ
 芥子泥。兩足温暖毳布。衝動藥灌腸ヲ施シ。甘汞二分乃至
 三分ヲ二三裏ニ分チ日服セシム。○秩彪私格列刺ヲコレ
 デホイハ病者麻醉狀ニシテ時々寒戰ス頭上ニ蟻鉸二三條
 ヲ施シ寒菴法ヲ行ヒ。灌水後脚湯ヲ施シ。内服鑛酸類
 百十三方至二百十八方。殊ニ格魯林水ニ千四百十五方ヲ
 顯草。亞兒

尼加。白芷等ノ浸劑ト併用若クハ互用スルニ宜シ生カ
 大ニ沈衰スル者ハ安沒尼亞劑。亞的兒麝香ヲ與フベシ
 ○本復期ニ至テハ飲食最慎戒ヲ加フベシ纔ニ飲食ヲ
 誤ルハ再感シ易ケレバナリ生カヲ復スルハ幾那煎
 浸俱ニ宜シ胃腸衰弱ハ複方橙皮丁幾附ニ苦味丁幾附
 ヲ和用スル等ニ宜シ
 ○第二千七十三方
 收斂亞的兒半
 右每服取六滴乃至八滴冷水加覆盆子舍利別少許者和
 服日四次

主治格列刺預防方トス殊ニ多血ニノ畜血症ニ罹リ易
 キ者之ニ宜シ○百私篤地名ハ謁屈斯的地名殊ニ叔歛垂
 的兒ヲ稱用セリ蓋之ヲ用ヒテ稍世人危懼ノ心ヲ安ス
 ルヲ旨トス○癩年地名ノ顛劉突患屈私人名ガ製スル格列
 刺酸モ亦上方ニ類ス此酸ハ過滌弗涅兒人名及ヒ微篤私
 的地名同ノ分離説ニ據ルニ稀硫酸ト葡萄酒ノ合和物ナ
 〓劉突患屈私人名ニ之ヲ預防ノ爲ニ施スノミナラス治
 療上ニモ亦用フ預防ニ用フル片ハ此酸一茶匙ヲ取リ
 テ砂糖水一瓶ニ和シ里没奈埵トシ日服セシム○治病
 ニ用フルハ序証發見ノ時一食匙ヲ與ヘ直ニ新汲水ニ

三盞ヲ飲マシム之ニ由テ病証減退スレバ後服ヲ要セ
 ズ若減退セサレハ更ニ服量ヲ加ヘテ八分時或ハ十密
 扭篤毎ニ一食匙用ヒ服后冷水ヲ與フ大抵五食匙乃至
 六食匙ニシテ病勢ヲ挫クニ足ルト雖十匙乃至十三匙
 ヲ要スル症モ亦之アリ○安頓モ亦格列刺ヲ治スルニ
 鑛酸ノ對症ニ之ヲ用フル片ハ甚的當スト云フト雖劉
 突患屈私人名ノ格列刺酸ヲ以テ總テ此病ノ確効藥トス
 ルヲ信セズ

○第二千七十四方

加密列油錢一

遠西方藥 卷十九 流行格列刺 廣月堂

右內玻璃壘密閉與日服一滴多不過二滴砂糖和用

主治紀元一千八百三十一年噶利失名地ノ鎮臺羅蒲格惠

篤疾此方ヲ用ヒ兼テ肚腹ニ松脂硬膏ヲ貼メ以テ格列

刺ノ的効預防法ト稱セリ

○第二千七十五方弗噶刺歌

硫酸規尼捏錢一 加耶普的油刀一 精製甘草膏適宜

右為六十九衣石松粉晨夕服二九乃至四九

○第二千七十六方同上 規尼捏硬膏

金密陀硬膏錢四半 松脂錢二半 白蠟 硫酸規尼捏各一

龍腦錢一 加耶普的油刀半

右調和作硬膏

○第二千七十七方 幾那硬膏

金密陀硬膏錢五 松脂錢二半 白蠟錢一 赭色幾那末錢二

龍腦錢一 加耶普的油刀半

右調和作硬膏

○第二千七十八方弗噶刺歌

王幾那細末 錢六 硫酸規尼捏錢一 加耶普的油刀半

右調和布囊盛縫封安定于胃部

主治右四方格列刺預防藥トス○弗噶刺歌及ヒ其他衆

醫ノ說ニ據レハ格列刺ト濕地ノ間歇熱ト其性相類セ

リ規尼捏及ヒ幾那ヲ稱用スル者蓋此說ニ出ヅルナリ
預メ上ノ規尼捏九二千七百七十五方ヲ服シテ格列刺ニ罹リシ者
未嘗テ之アラズト云フ噶刺歌氏之ヲ徵セリ富家ニ在
テハ之ニ兼テ規尼捏硬膏二千七百七十六方若クハ幾那硬膏二千七百七十七方
カヲ胃部ニ貼シ或ハ幾那末ノ藥囊二千七百七十八方ヲ安定セシ
ム皮膚感觸敏捷ノ者○規尼捏ハ他ノ諸種ノ預防藥ト
モ亦輕藥囊ヲ用フ同ク健人之ヲ連服スルモ亦害アルナシ却テ全軀殊
ニ神經ヲ補益スルノ功用鮮シトセス

○第二千七十九方刺胃秘

硫酸規尼捏十六至十八 白糖二錢

右調勻為散分十二畏每朝取一畏猛烈哥喜半小盞若一
小盞和服

主治 格列刺預防方トス此方哥喜ニ由テ規尼捏ノ苦味
ヲ脱スルガ故ニ之ニ砂糖一塊ヲ和用スレハ佳味ノ飲
料タリ

○第二十八十方孤儲私篤高名地願賜嘗歌爾

香竈丁幾 忽弗滿拔爾撒謨非峇 過設印亞的

見一錢 苜蒲油五滴

右調勻每服二十滴葡萄酒或里鳩爾酒和用日二三

主治 此方二十年前專格列刺預防劑トシテ稱用セリ居

恒ニ慄悍ノ飲液ニ慣ル、者此方殊ニ的當ス

○第二千八十一方

亞爾鮮 橙皮 白芷 干姜 各一 丁子 二錢

右糊搗為細末注猛烈燒酒三北密閉浸出一日乃至三日
濾過貯

主治 格列刺預防方トス常ニカラ勞シ寒暑ヲ冒シ或ハ
燒酒ニ慣ル、者最之ニ宜シ○蓋此丁幾劑ハ單用スル
一トシ四兩乃至六兩ヲ取り茴香酒一彬篤ニ和シ每服
一里鳩爾蓋日ニ一二次○此方紀元千八百三十一年創
メテ字漏生ノ醫局ニ於テ發明シ健全ヲ保護シ及ヒ格

列刺傳染ヲ預防スルノ稱譽アリ

○第二千八十二方

亞爾哥兒 五北至 水 十六北 砂糖 一北 薄荷油 三百滴

煨麻屈涅失亞 三錢至 四錢

主治 千八百四十八年伯德爾瀨兒屈地名ニ於テ格列刺流
行ノ時預防方トシテ專之ヲ服セリ平常燒酒ニ慣ル、
者ハ每服一利鳩爾蓋日ニ三次乃至四次

○第二千八十三方

白醋 一弓至 黃蠟 二弓

右捏和名松脂硬膏

遠西方膏 卷十 流行格列刺 十一 廣用

主治革ニ攤へ肚腹ニ貼ノ以テ格列刺預防法トス

○第二千八十四方

老利兒子硬膏附一 龍腦 揮發鹿角鹽各半 精製

阿芙蓉 肉豆蔻紋油各一 薄荷油八 丁子油各十

右捏和名胃膏

○第二千八十五方

香竄硬膏附一 阿芙蓉硬膏附一各

右捏和名胃膏

主治右二膏格列刺預防方ト此方肌膚ヲ刺戟スルノ輕キヲ以テ患者堪へ易シ故ニ上ノ單方松脂膏ニ優レ

此硬膏ヲ貼シ廣瀾ノ弗刺涅兒ヲ以テ全腹ヲ被覆ス

千九百七十二方及ヒ千九百七十三方モ亦用フルニ宜

シ

○第二千八十六方

格魯林加爾基北一

右

主治總テ病院ノ空氣ヲ清甦スルニ宜シ殊ニ格列刺病

家ニ用フベシ方一謁爾尺度ノ名三トス三ヲ薰スルハ格

魯林加爾基二兩ヲ以テ水少許ニ溶シ小碟ニ盛リテ足

レリ或ハ之ニ代テ格魯林加爾基二兩ヲ水一監名器ニ溶

遠西方藥 卷卅九 流行格列刺 廣肝堂

化シ之ヲ撒布スルモ可ナリ○更ニ格魯林氣ノ發揚ヲ盛ナラシメント欲スレハ小量格魯林加爾基ニ稀鹽酸ヲ加ヘテ振盪スベシ○肺ノ感觸敏捷ノ人ハ格魯林氣ニ堪ヘス諸物色殊ニ植物之ガ為ニ色ヲ變スルガ故ニ室内ノ額面帷幕等ヲ除去スベシ○又格魯林加爾基一弓水一彬篤ニ溶解シ病者ノ衣服ヲ浸ス一十二時間或ハ此液ヲ以テ倚子卓病褥等ヲ洗ヒ或ハ病室ノ四邊ニ撒スルモ亦可ナリ

○第二千八十七方 香竈醋

園生芸香トイロイト 撒爾非亞 薄荷 亞爾鮮 刺賢埵兒

花各一 握

右調和注上好醋ニ監容量ノ名内土器密閉安熟灰上飽熟四日而後取玻璃壺各壺容ニ監 遷其液各壺加後味溶解

龍腦一兩

主治或ハ之ヲ以テ病室ヲ清甦スルノ方トシ格魯林氣ニ堪ヘザ之ヲ時殊ニ用フ或ハ香藥トシテ顛顛前額及ヒ手掌ヲ洗ヒ或ハ之ヲ稀淡ニシテ含漱ス○空氣ヲ清淨スルハ之ヲ床上ニ撒シ或ハ薄柱ヲ洗フ又弗刺涅兒ヲ此液ニ醮メ室内ニ垂ルモ可ナリ或ハ之ヲ土製ノ小碟ニ盛り燒酒火ニ上セテ蒸發セシム○或ハ上好香竈醋モ亦用フベ

遊西方藥 卷卅九 流行格列刺 廣月堂

ク貧家ハ尋常酢ヲ用ヒテ可ナリ

○第二千八十八方

阿芙蓉丁幾錢一

右泄瀉初起服五滴乃至十滴

主治格列刺流行ノ時泄瀉スル者之ニ宜シ○一服ニシテ効アラザレハ一時半二時乃至三時ノ後再服ス

○第二千八十九方設阿但

舍電阿芙蓉液二 香竈丁幾八

右調勻每半時或一時服二十五滴

主治格列刺流行ノ時泄瀉スル者之ニ宜シ

○第二千九十方伯德爾滲兒屈地室兒滿

纈草丁幾半 舍電阿芙蓉液半錢至 薄荷丁幾吐

根酒各二錢

右調勻準症每半時一時或一時半服三十滴

○第二千九十一方

鹿琥精 舍電阿芙蓉液 纈草丁幾 葛私篤樓護丁

幾各一錢

右調勻用法同上

主治右二方近年伯德爾滲兒屈地流行ノ格列刺ニ用ヒ

テ偉効アリ

遠西方彙
卷十九
流行格列刺
二十
廣
肚
堂

○第二千九十二方鳩爾私篤名地越 莊篤厭土

良姜丁幾錢各二 薄荷丁幾錢各二 阿芙蓉丁幾錢半

右調勻每一時乃至一時半三十滴乃至四十滴冷水點服

○第二千九十三方同上

香竄丁幾錢各二 法尼利丁幾錢各二 阿芙蓉丁幾錢半

右調和用法同上

〔主治〕右二方格列刺ノ序証泄瀉ニ宜シ

○第二千九十四方

舍電阿芙蓉液錢一 纈草丁幾錢三 鹿琥精錢二

右調勻每四分時或半時或一時服十五滴

○第二千九十五方伯德爾滄兒倔名地獨布

舍電阿芙蓉液 葛私篤儂謨丁幾錢各二 纈草丁幾錢三

薄荷油錢半

右調勻每半時或一時乃至一時半服四十滴乃至六十滴

〔主治〕右二方格列刺ノ最初泄瀉太過ヲ防止スルニ宜シ

○第二千九十六方屈仙篤名地賜葛歌爾

阿芙蓉丁幾 纈草丁幾 葛私篤儂謨丁幾 鹿琥精

錢各一

右調勻每半時或一時服二十滴

〔主治〕同上

遠西方彙
卷十九
流行格列刺
二十一
廣
堂

○第二千九十七方別爾列印地屋兒弗

阿芙蓉丁幾半 香竈丁幾二錢 過設印亞的兒一錢 薄

荷燒酒水附一

右調勻初每四分時後每半時或一時服一茶匙

○第二千九十八方同上

阿芙蓉加安息香酸丁幾一 蒸餾水五

右調勻初每四分時後每半時及一時服一食匙

主治右二方格列刺流行ノ時泄瀉腹痛ヲ發スル者ニ用

ヒテ其増進ヲ防グニ宜シ兼テ能ク温覆シ皮表刺戟劑

殊ニ肚腹ニ芥子稀薄丁幾ヲ塗リ薄荷或ハ加密列泡劑

ヲ多量温服セシム第二千九十七方ハ味更ニ佳ナルヲ
以テ屋兒弗之ヲ用フルト最多シ而メ救急ニ便ナルヲ
以テ常ニ俗家ニ貯蓄セシム屋兒弗氏以オモヘ為ラク市中ニ
施療スルニ格列刺正症ノ稀ナルハ俗間速ニ此方ヲ用
フルニ由ルト云フ

○第二千九十九方

阿芙蓉丁幾十滴至廿滴 綿答幾里私布水半 沙列布煎

右調勻每四分時半時或一時服一食匙盖宜準症

○第二千百方伯德兒私德爾個地ノ醫社

速 西方藥 卷十九 流行格列刺 二十二 廣 月 堂

舍電阿芙蓉液錢半 沙列布煎 薄荷水各三

右調勻每半時或一時服一食匙

主治格列刺下利及ヒ格列刺初起ニ宜シ○余ガ輩考フ

ルニ此方服量本法ニ從ハズメ阿芙蓉液ヲ點滴シ用フ

ル者更ニ佳ナリ既ニ嘔吐ヲ發スル者ハ殊ニ然リ

○第二千百一方

精製阿芙蓉 吐根末各二 白糖一

右調勻為散分六畏每一時半乃至二時服一畏

主治格列刺ノ最初並ニ其經過ノ中亦之ヲ用フヘシ

○第二千百二方〔求謨貧年名叔再爾〕

精製阿芙蓉一 吐根末四 亞刺毘亞蘆謨末 麻僞

涅失亞各一

右調勻為散分八畏每半時或一時服一畏

主治格列刺腓腸痙攣スル者ニ偉効アリ

○第二千百三方〔哥寧屈私別爾屈名地醫社〕 溫傑爾

番木鱉越幾斯二 加後仔溶化

燒酒 蒸餾水各半

右調勻每半時或一時服五滴

主治番木鱉ハ諸種ノ格列刺ニ殊驗アリ殊ニ屢格列刺

後ニ遺留スル所ノ泄瀉ニ宜シ○格列刺前ノ泄瀉ハ最

遠西方藥
卷十九
流行格列刺
三十三
廣
堂

効アリ

○第二千百四方
吐根末二 麻屈涅夫亞廿四 乳糖四

右調勻為散分八服每半時服一服

主治格列刺流行ノ時泄瀉ニ宜シ

○第二千百五方求謨貧年地叔孫爾

吐根半乃至 滾湯適宜浸瀘過取液六勺溶後味

亞刺毘亞蘆謨二錢

右每半時服一食匙

主治敏性格列刺ニ用ヒテ神經ノ衝動ヲ鎮降シ殊ニ腓

腸痙攣疼痛ニ宜シ

○第二千百六方不羣篤涅爾

吐根八 沙列布煎一坩浸漬

右每半時服二食匙

主治敏性格列刺ニ宜シ

○第二千百七方

過炭酸曹達十五 酒石酸乾者 白糖一 枸橼油薄

荷油或加 耶普的油滴

右調勻為散分十二服每四小時或半時取一服冷水混和

乘沸騰服

遠西方彙 卷十九 流行格列刺 二五
主治 格列刺嘔吐ヲ鎮靜スルニ宜シ○第二方。三方。八百
八方。及ヒ千九百五十八方乃至千九百六十三方モ亦皆
同効アリ

○第二千八百方

吐根末一錢至二錢

默栗薩水二錢

過設印亞的兒八滴

右調勻每十密扭篤服一食匙以至得吐

主治 格列刺ノ初起殊ニ其前胃腸或ハ心思不安ノ所アリシ症ニ宜シ

○第二千九方〔謁末兒秩尼〕

甲方

吐根末一錢
右分十二畏每十二密扭篤乃至十五密扭篤服一畏
主治 末兒秩尼名格列刺ノ初起每症此散ヲ與ヘ之ヲ持
重シテ遍體面陽シ脈狀復スルニ至ル腹痛ハ他藥ヲ須
スノ自ラ已ム爾後左方ヲ與フ

乙方

加密列浸一錢 桂丁幾二錢 忽弗滿液一錢

右調勻每一時服一食匙

○第二千百十方〔肝謨默魯〕

吐酒石三錢至四錢 加密列水三錢溶化加後味

遠西方彙
卷十九
流行格列刺
廣
用
堂

吐根末 一乃至二錢 海葱蜜 半

右調勻每十密扭篤服一食匙以至得吐

○第二千百十一方同上

膽礬 二乃至四錢 蒸餾水三勺溶化加後藥

吐根末 一乃至二錢

右調勻用法同上

主治右二方格列刺初起殊ニ胃中汚物ヲ兼ル者ニ宜シ

○嘔吐抑壓ヲ挑起スルハ強劑若クハ多服ヲ要ス此方

大抵良効アリ

○第二千百十二方弄別爾

稀鹽酸 一錢 亞刺昆亞蘆謨漿 桂舍利別 各一 井水

○第二千百十六方同上

右調勻每一時服一食匙

主治格列刺吐瀉セザル者之ニ宜シ

○第二千百十三方同上

稀鹽酸 忽弗滿液 各一錢 井水 二

右調勻每一時服一食匙

主治格列刺畜血証ヲ兼ル者之ニ宜シ殊ニ生力奮起ノ

期ニ用フベシ

○第二千百十四方同上

遠西丸
卷十九
流行格列刺
二
廣
堂

○格魯林水 蒸餾水 覆盆子舍利別各二

右調勻每半時服一食匙

〔主治〕格列刺ニ偉効アリ殊ニ生力奮起速ナル者ニ用ヒ

テ佳ナリ

○第二千百十五方〔培爾私高地兒格列魯〕

格魯林水一 白芷浸五 用白 砂糖舍利別一

右調勻每半時服一食匙

〔主治〕同上

○第二千百十六方〔不羣篤濕爾〕

稀硫酸錢一 薄荷水六 覆盆子舍利別一

右調勻每半時服一食匙乃至二食匙

〔主治〕格列刺ノ頭腦畜血ニ宜シ殊ニ生力奮起期ニ用フ

ベシ○篤碌私設兒名秩彪私性格列刺ヲ治スルニ酸類

ノ中最硫酸ヲ稱用シテ毎々良効ヲ得タリ漸々快復ス

ル者ハ轉ノ酒石酸ヲ與フルヲ常トス總テ清涼ヲ要ス

ル症ハ皆之ヲ用ヒテ効アリ枸橼酸モ亦酒石酸ト同効

トス

○第二千百十七方〔伯德兒私港爾名地列魯屑〕

収歛亞的兒半錢至 舍電白煎附六 櫻實舍利別二

右調勻為飲料每服少許

遠西藥房
卷十
流行格列刺
三七
廣月堂

主治 格列刺ノ煩渴ヲ消シ並ニ畜血症ニ宜シ

○第二千百十八方 〔求謨貧年地叔壽爾〕

硫酸密幾私去爾半錢至 覆盆子水六 亞刺昆亞蘆

謨漿 覆盆子舍利別各一

右調勻每半時服一食匙

主治 格列刺ノ頭上畜血ニ宜シ

○第二千百十九方 〔伯德兒私滄爾佩名弗私扑列爾〕

硝酸半錢至 沙列布濃煎六 默栗薩水二 瞿栗舍

利別一

右調勻初每五密扭篤乃至十密扭篤後每四分時半時或

一時服一食匙

主治 私扑列爾名人 硝酸ヲ用ヒテ格列刺病ヲ救活セシ

居多ナリ

○第二千百二十方 〔忽百〕

發烟硝石精原本脫 龍腦密幾私去爾一 阿芙蓉丁

幾四十

右調勻每半時乃至二時取四分一上好燕麥粘汁一小

盞和服

主治 忽百名人 ハ大約此密幾私去爾ヲ用ヒテ治セリ失那

護患都名人 名モ亦之ヲ用ヒテ殊効ヲ得タリ

遠西方藥
卷十九
流行格列刺
廣
堂

○第一千二百二十一方（願滂爾偈名地） 瀧縣

發烟硝石精刀二 沙列布煎弓八

右調勻每半時服一食匙

主治一千八百四十八年願滂爾偈名地ニ於テ流行セシ格列

刺ヲ治スルニ病院專此方ヲ用ヒテ偉効ヲ得タリ刺絡

モ亦施セリ

○第一千二百二十二方（鵠爾私孤名地） 越。求篤層矣土一

民埵列利精弓六

右每二十密扭篤服一食匙

主治格列刺ニ偉効アリ此方ヲ用ヒテ吐瀉即鎮靜ス

○第一千二百二十三方（願滂爾偈名地） 沈蔑爾滿

民埵列利精錢二 菩提樹花水弓四

右調勻每四分時或半時服一食匙

主治暴吐瀉ニ良効アリ

○第一千二百二十四方（歌乙滿）

甲方

薄荷水弓三 民埵列利精弓一 阿芙蓉丁幾滴十六

右調勻每半時服一食匙

乙方

大麥煎弓三 桂水弓一 民埵列利精錢六 阿芙蓉丁幾錢半

遠西方藥 卷十九 流行格列刺 二十九 廣胖堂

至一 砂糖舍利別弓

右調勻每四分時或半時服一食匙

丙方

龍腦二 白糖一

右調勻為散分十二服蠟紙包裹每四分時或半時取一裹

冷水一食匙和服

主治右三方格列刺ニ宜シ○苟連名地病院第二等ノ醫歇

乙滿名格列刺ノ序証ニシテ頭旋スル者ハ刺絡メハ弓

乃至十二弓ノ血ヲ瀉シ序証下利スル者ハ六弓乃至八

弓ノ血ヲ瀉シ胃中汚物アル者ハ吐劑根吐ヲ與フ○脫液

期過吐瀉多ハ八弓乃至十弓ノ血ヲ瀉シ吐劑根吐粘滑發汗劑

大抵薤謨水及薄荷菩及ヒ上ノ密幾私去爾四方甲

ヲ用フ青腫期イノチキムヒ皮色變ノ期ハ其症前ニ放

血セズ且脈狀モ亦之ヲ行フニ宜シケレハ則刺絡シ兼

テ乙方ヲ與フ盖方中阿芙蓉ノ量並ニ每服間隔ハ泄瀉

ノ劇易病ノ輕重ニ準ヌ○佯死期ハアスビクチセ遍體

絶病者拾モ死龍腦ニ宜シ其量四十八日四十八日ニ

至ル一屢之アリ他ノ諸衝動藥即炭水素亜的兒亞的兒

亜的兒油類燐碓砂加石灰精及ヒ鹿琥精灌水獨福利亞

幾私名ガ稱賛セシ處ノ法等ハ皆寸効ナシ○生力奮起

遠西方彙
卷十九
流行格列刺
廣
堂

ノ証徴將ニ見ハレシトスル片ハ速ニ龍腦ヲ廢ノ民埜
利精ヲ與ヘ爾後其經過順序ヲ逐フ者ハ之ヲ自然良能
ニ委シテ可ナリ但生力微弱ニシテ其勢恰モ却クカ如ク
服及ヒ體温衰フル者ハ尚民埜列利精ノ如キ緩衝動劑
ヲ用ヒ泄瀉綿々甚シケレハ少量阿芙蓉ヲ與ヒ生力奮
起期ノ間殊ニ其前龍腦ヲ服シテ内臟激衝ヲ發スル者
之アリ此症局處瀉血ヲ行ヒ或ハ間少量甘汞若クハ甘
汞阿芙蓉ヲ伍用ノ功ヲ収ムベシ

○第二千二十五方（瀉滌爾偃石沈蔑爾滿）
礪砂華錢一 醋宜適 已上飽和加後藥

過爾托舍利別弓六 桂水宜適
右調和作密幾私去爾凡六弓再加亞刺昆亞蘊謨半弓溶
和每半時服一食匙
主治飲劑ニ用ヒテ妙ナリ

○第二千百二十六方
礪砂華水附一 纈草浸弓六 過爾托舍利別半
右調勻每半時服一食匙
主治依訥優刺孤老名地ノ醫喊滌爾傑兒名人紀元千八百四

十八年八月ヨリ九月至格列刺正症三十七人ニ礪砂華
水ヲ用ヒテ危險ノ症モ亦能ク救ヒ得タリ三十七人ノ

中死スル者僅ニ十人用法半時毎ニ二夕ヨリ一錢至或
 ハ之ヲ内服セシメ或ハ之ヲ灌腸トス又安没尼亞劑ヲ
 塗擦シ兼テ其室中ニ安没尼亞氣ヲ充タシハ喊瀝爾傑
 児氏ガ礪砂華ヲ用テルノ説左ノ如シ格列刺ヲ治スル
 ハ血分分離ノ機カラ防制スルニ在リ衆人ノ通知セル
 如ク血中ニ布祿底涅纖維質尿管等ノ原素ノ合和物アリ此物亞
 児加里礪砂華ニ和スレハ能ク溶解ス且刺絡血ニ單純亞
 児加里ヲ投スレバ亦能ク其凝結ヲ妨グ又亞児澎涅蛋白質
 質ノ溶解スベカラザル者モ炭酸安没尼亞礪砂華ニ和ス
 レハ容易ニ溶化スベシ是故ニ礪砂華ハ其効ノ迅速ナ

ルト上歎説ク所ノ性ヲ含蓄スルトニ由テ格列刺ノ靈
 藥タリト云フ

○第二千二百二十七方屈律見別爾僱

鹿琥精錢二 民埤列利精錢二

右調勻每四分時服ニ茶匙

○第二千二百二十八方屈律見別爾僱

鹿琥精錢半 舍電阿芙蓉液錢半

右調勻每半時或一時服二十滴乃至四十滴

○第二千二百二十九方別魯列印地過兒別爾松

鹿琥精 續草丁錢各一

遠西方彙 卷十九 廣胖堂

遠西方彙
卷十九
流行格列刺
廣
脾
堂

右調勻每服十五滴每四分時沙糖或茶點服

主治右三方敏性格列刺ニ宜シ

○第二百三十一方壇秩俚地別連突土

揮發鹿角鹽六八至十二八 亞刺昆亞蘆謨末半

右調勻為散分八服蠟紙包裹每半時服一畏

主治格列刺劇症ニ宜シ

○第二百三十一方別魯列印地過兒別爾私

甲方 揮發鹿角鹽八 龍腦二 白糖一

右調勻為散分二服蠟紙包裹半時開服二畏

主治曾テ格列刺劇症ニ之ヲ施ノ卓越ノ効ヲ得タリ此散ヲ服スルノ後左ノ密幾私去爾方ヲ用ヒ次日患者平治セリ

乙方

纈草丁錢一 鹿琥精錢二 纈草浸五

右調勻每一時服一匙

○第二百三十二方秘羅屑 儻鬼

硫礪水 附半

右每二密扭篤乃至半時取三滴乃至十二滴砂糖水或冷水點服

遠西方彙
卷十九
流行格列刺
三十三
廣勝堂

主治 孤羅屑名地 蒲列私老名地 仁惠社ノ病院ニ於テ此方ヲ
用ニ良驗ヲ得タリ並ニ蒲列私老名地 大格列刺病院ノ補
佐醫 憊兒名地 格列刺病ヲ治スルノ殆八百人皆此方ヲ稱
用セリ蓋遍身表冷青色ヲ帶ヒ脈絶蔓延神經將ニ麻痺
セントスルノ状ヲ見ハノ呼吸ノ妨障甚シク患者外氣
ニ感ザル者 憊兒氏最効ヲ得タリ此劑惡臭アリト雖味
不佳ナルトナシ嗅氣ヲ覆遮スルハ礮砂加垂泥子精ニ
滴乃至四滴ヲ加フ此方効アル者ハ之ヲ用フルノ後生
力即奮起ス但其力十分ナラザレハ礮砂加過泥子精若
クハ龍腦ヲ以テ挑ムベシ塗擦藥皮膚刺戟法等ハ尚兼

用シ怠ルカレ ○篤祿私設兒名地 ハ硫礮水 至每四十分時ヲ
用ヒテ未嘗テ良驗ヲ見スト云フ
記者第二千百三十三方ヲ缺ク今之ヲ改ムルハ其
序次ヲ錯乱シ索引ヲ謬ルカ故ニ原本ニ依レリ
譯者 斐婆都識

○第二千百三十四方
礮砂加石灰精半
右每八分時五滴十滴乃至二十滴沙列布煎或裸燕麥粘
汁和服
主治 英吉利及ヒ印度ノ醫格列刺ヲ治スルニ礮砂加石

遠西方彙
卷十九
三十四
廣勝堂

遠西考 卷一 流行格列刺

灰精ヲ用ヒテ効ヲ得レド已ニ久シ歐羅巴ニ在テハ館

爾私高地名壇秋倔同舒寧倔私別兒倔同私室珍同等ニ於

テ格列刺ノ劇症生カ始メテ沈衰スル者殊ニ卒中性格

列刺コレラカハニ此方大抵良驗アリ

○第二千百三十五方館爾私高地名彪魯私篤

礪砂加石灰精錢一 亞麻子煎六

右調勻每四分時服一食匙

主治格列刺ノ初起放血メ後之ヲ用フルヲ要ス

○第二千百三十六方

甘汞一至三 麻倔涅失亞三 乳糖半

右調勻為散分ハ畏每半時或一時服一畏

主治敏性格列刺コレラカハニ宜シ又生カ奮起期頗ニ大

便閉止スル者殊ニ之ヲ用フ肘謨默魯名ハ大量甘汞每

時或一ヲ服ノ後吐瀉立地ニ歇ムヲ經驗セリト云フ上

方ヲ施ノ大便膽液色ニ變ノ實シ脈カ奮起シ放血ヲ要

スルニ至ル者亦屢是アリ第三日若クハ第四日ニ及テ

善良ノ吐涎ヲ發シ常ニ八日間連綿セリ

○第二千百三十七方屈律見別爾倔

甘汞一 麻倔涅失亞二 白糖半

右調勻為散分十二服每半時一服

西考彙編 卷十九 流行格列刺 廣用堂

○第二千百三十八方同上

甘永ハ一 礪砂華ハ二 白糖ハ半

右調勻為散分十二服每半時一服

主治右二方格列刺泄瀉閉止セル者ニ宜シ

○第二千百三十九方滿歇慳訖弗戾

甘永ハハ至 精製阿芙蓉ハ一 白糖ハ四

右調勻為散分八服每四分時或半時一服

主治格列刺泄瀉ニ宜シ○暴瀉ニ罹リテ治ヲ弗戾ハ人ニ

請フ者夥多ナル中ニ吐根阿芙蓉ニ由テ治セシ者鮮シ
大抵甘永阿芙蓉ヲ服ノ癒ト吐涎ヲ發スル者ハ其治ス

ルハ緩ナハ上方ヲ與フルハ大抵十二劑ヨリ三十六劑
ニ至ル

○第二千百四十方同上

甘永ハ四 精製阿芙蓉ハ二 白糖ハ四

右調勻分八服每四分時若八分時一服

主治格列刺正症ニ用ヒテ泄瀉及ヒ腸中粘液滲出ヲ減

殺スルニ宜シ○初服ノ甘永ハ吐スルハ多シ未吐瀉ア

ラサリシ者モ之ヲ用ヒテ嘔吐ヲ發シ能ク半時間胃中

ニ留ルト雖後ニ至テ吐スル者多シ危篤症ハ每常甘永

五十四ハ乃至百八ハ阿芙蓉四ハ半乃至九ハヲ要ス之

遠西方藥
卷十九
流行格列刺
廣
肺
堂

ヲ輕症ニ用フレバ唯流涎スルノミ

○第二千四百四十一方麻健瀝爾極地阿附設爾爾

甘永ハ番木鱉越幾斯水製白糖四

右調勻為散分八服每一時一服

主治格列刺緩症ニ宜シ○此症皮膚ノ神經ヲ緩々衝動

スルノ劑ヲ要スルガ故ニ湯瓶熱沙囊ヲ安シ手ヲ温湯

ニ浸シ腓腸前膊或ハ胸腹ノ中線ニ芥子泥ヲ貼スベシ

又全腹ニ大温暖琶布ヲ貼スレハ其症大ニ緩快又冷

水ヲ與フルヲ要トス内服ハ甘永ニ宜シ大人半時毎ニ

一匁至小兒四分匁一ヨリ半匁至泄瀉後生カ頭ニ衰耗

スルノ懼アル者ハ番木鱉越幾斯ヲ配用ス大人一時毎

ニ八分匁一ヨリ小兒四分八分匁一ヨリ二十四分匁一至此

ノ如ク甘永ヲ與ヘ之ヲ持重メ苦悶消散シ小便能ク分

利シ大便綠色ヲ帶フルニ至ル此期ニ至ルマテ番木鱉

ノ配用最要ナリト雖今ハ則之ヲ去リ猶甘永ヲ上法ノ

如ク與フルト十二時蓋泄瀉止爾後服量ヲ減シ其半ヲ

與フ○泄瀉暫歇テ后小腹不安ヲ覺エ或ハ小腹ノ右側

疼痛スル者通例之アリ其症蓖麻油ヲ與ヘテ大泄瀉ニ

三行ヲ得以テ腸ノ腐膜及ヒ腸中夥多分泌セル膽液ヲ

掃除スベシ○格列刺ノ暴症及ヒ其類症モ亦一時或ハ

遠
西方
卷十九
流行格列刺
廣

一時半每ニ甘汞一ハ至或其症ヲ酌料シテ水製番水鼈
越幾斯ハ今ハ一ヲ配用メ拔群ノ効アリ

○第二百四十二方

甲方阿附設爾

甘汞十六ハ至
廿四ハ 白糖四

右調勻為散分ハ服每四分時一服

主治伴死格列刺コレラ。アス。ニ宜シ○冰屑ヲ以テ摩挲

シ或ハ冷物ヲ被覆シテ以テ皮膚神經ヲ不斷猛力ニ刺

戟スルハ鴻益アリト雖必常住ニ之ヲ施ストヲ得ズ故

ニコッヒル附設爾名尋常格列刺ノ治ニ從ヒ乾弗刺フ涅見子若クハ

之ニ龍腦精ヲ醮メ急ラズ四肢ヲ摩擦ハ兼テ又ハ分時

毎ニ二三密扭篤間刷子ヲ以テ手掌及ヒ足心ヲ摩挲シ

且芥子泥及ヒ芥子精ヲ連用ス蓋芥子精ハ弗刺涅見ニ

蘸メ慎重ニ施スベシ飲料ハ冷水ヲ與ヘ且細冰塊ヲ嚙

送セシハ胸中逼迫甚シキ者ハ最之ヲ好トス内服ハ大

量甘汞大人每四分時ニハ乃至
三ハ小兒半ハ乃至一ハニ宜シ若之ヲ吐スル片

ハ直ニ再服ヲ要ス○半日乃至一日ノ後生力奮起スル

ナリ更ニ多時ヲ過テ奮起スル者モ亦鮮カラズ小兒ニ

在テハ間一二時ノ後既ニ生力發揚スル者アリ此期ニ

及テ醫善ク意ヲ注キテ放血ノ機會ヲ失スル勿レ小兒

遊 西 方 藥 學 卷 廿 九 流行 格 列 刺 廣 州 堂

ニ於テモ亦然リ血盛ニ瀉出スル者ハ救フベシ生力奮
 起ノ後ハ緩性格列刺ト一般ノ治法ヲ持重ス但甘汞ハ
 猶更ニ多量投スヘシ○秩彪私性格列刺ハ通法ニ從フ
 テ治ヲ下スヘシ蓋神經藥及ニ強壯藥ヲ用フルハ最慎
 重ク○佯死格列刺暴症イムベキス。コレリハ胸中大ニ
 逼迫苦悶シ腓腸痛ミ足ニ瘙痒ヲ覺ユ此症輕易ノ者ハ
 硝酸曹達ト實芟答利斯ヲ配用シ温湯ニ手ヲ浸シ心部
 ニ芥子泥ヲ貼スベシ又早晚甘汞一ムヲ服セシメテ大
 便二三行ヲ得レハ大ニ緩解ス肝設爾名ハ阿魏ヲ用ヒ
 テ殊効ヲ得シ者夥多ナリト云フ劇症全身冰冷死體

ノ如ク將ニ卒中状ニ陥ントスル者ハ放血ヲ以テ無比
 ノ救活法トス但尋常ノ佯死格列刺ノ治ト一般皮膚刺
 戟法ヲ兼用ノ放血ノカヲ補フヘシ或ハ實芟答利斯甘
 汞配用スルヲ佳トス

乙方 伯德爾 魁兒 儼ノ醫設 繆兒 列爾

甘汞 龍腦 白糖

右調勻為散分ハ服蠟紙包裹每四分時服一畏

主治 格列刺ノ証状益増劇セル者瀉水浴ストトルヲ施シ

或ハ食鹽一分氷屑二分ヲ合メ遍體ヲ摩挲セルノ後吐

瀉歇ヤサル者ハ此方ヲ與フルニ宜シ此散ヲ服スレハ

吐下物膽液色ヲ帶ビ随テ其量減シ少頃ニ至テ全ク止ム

○第二千四百四十三方〔婦人私高熱列所〕

〔甲方〕 硝酸毘私繆篤三 白糖半

右調勻為散分十二服每一時乃至一時半一服

〔主治〕 格列刺痙攣ノ時期ニ宜シ之ニ兼テ一時半乃至二時毎ニ後ノ水劑ヲ温メテ四肢ニ塗擦セシム

〔乙方〕 復方白芷精附六 礮砂加石灰精一

右調勻

〔主治〕 之ニ由テ痙攣著ク退クハ甲方ノ服量ヲ減セシ

△○**〔穢歇蘭度〕** 名里久天私達土同 其他良醫ノ證セルガ

如ク毘私繆篤ハ實ニ格列刺ノ一奇藥タルヲ論ナシ當

今之ヲ廢メ用ヒサル者恐クハ衆醫喜テ新驗方ヲ專用

スルニ由ルナリ蓋那ノ新驗方ノ如キハ其奇効ヲ得ル

ヨリ害ヲ招クヲ多シ

○第二千四百四十四方〔同上〕

硝酸毘私繆篤 大黃末焙炙者 白糖半

右調勻為散分六服每一時半乃至二時一服

〔主治〕 格列刺舌上鱗屑狀ノ粘苔ヲ覆フ者多ク此方ニ宜

遠西方彙
卷十九
流行格列刺
廣
月
堂

○第二千四百四十五方〔私燻爾徒〕

硝酸昆私繆篤ハ番木鱉越幾斯ハ白糖半

右調勻為散分六服每半時一服

主治馬偁マウ埕ケイ滌爾レ偁ケイ地ノ格列刺病院ニ於テ輕症ニ之ヲ

用ヒ効ヲ得ル者多シ

○第二千四百四十六方〔連屈業植純列歌私駢〕

亞鉛華半ハ至白糖半

右調勻為散分十二服每半時一服

主治格列刺ニ用ヒテ良驗アリ越魯涅屈名モ亦甚之ヲ

稱賛シ昆私繆篤ニ優レリトス

○第二千四百四十七方〔蒲列私老名地列非〕

結晶硝酸銀ハ蒸餾水四勺溶化

右每一時服一食匙

主治懣兒名ノ說ニ據ルニ硝酸銀ハ格列刺症吐瀉シテ

體温減シ肌色青ヲ帶ヒ神經核痛ン即所謂胃

瘧ノ証狀ヲ發シ腓腸攣急シテ生力沈衰スル一ナク呼

吸妨ナキ者ニ的當スト云フ生力既ニ奮起ノ而ノ尚綿

綿白便ヲ泄瀉スル者ハ懣兒氏殊ニ硝酸銀ヲ嘉稱ス但

一ハヲ以テ水四勺ニ溶化ス○列非氏ハ葡萄酒哥喜ヲ

兼服セシテ刺戟藥ヲ塗擦ス

○第二千四百四十八方

葛私篤^カ倭謨^ス丁幾^ヲ

右每四分時或半時服十滴乃至二十滴

〔主治〕格列刺症麻痺性衰弱アリテ苦悶不安不眠呼吸困

難等瘧瘵性ノ証候ヲ防止スベキ者篤^ト韋^セ設^ル兒^人名葛私篤

倭謨^ト丁幾^ヲ處^リ其症危篤ニノ挽回スベカラザルカ

如ク將ニ伴死症ニ陥ントスル者此方奇驗アルヲ鮮シ

トセズ○別魯列^ル印^シ名地ノ^ノ遇見^ル別爾^ル私^人名格列刺ニ兼發セ

ル吃逆ヲ治スルニ葛私篤倭謨^ト丁幾^ヲ六滴乃至十滴ヲ以

テ半時毎ニ砂糖ニ點服セシメテ偉効ヲ得タリ 二千五百四

方ヲ參照スベシ

○第二千四百四十九方 〔求謨貧年地叔弄爾〕

麝香^四亞刺毘亞^{錢半}護謨末

右調勻分八服蠟紙包裹每半時一服

〔主治〕瘧瘵性格列刺ニ先吐劑ヲ與フル後此方ヲ用ヒテ

殊効アリ

○第二千四百五十方 〔連屈葉植地列駝私駝〕

麝香^{東方產者ニハ}精製阿芙蓉^ハ白糖^半

右調勻為散分八服蠟紙包裹每半時一服

遠西方藥
卷之九
流行格列刺
廣肝堂

主治 格列刺ニ好シ然氏亞鉛華ハ更ニ佳効アリ且貧家

ハ高價ノ麝香ヲ得難キガ故ニ列歇私馳氏近年亞鉛華

ヲ以テ麝香ニ優レリトス二千四百四十六方ヲ照スベシ

○第二千百五十一方別魯列印地過兒別爾私

麝香ハ 龍腦ハ 白糖ハ

右調勻為散分二服蠟紙包裹每一時服一裹

主治 格列刺生力沈衰スル者之ニ宜シ

○第二千百五十二方葛散名地的爾

麝香ハ 番木鱉越幾斯ハ 白糖ハ

右調勻為散分四服蠟紙包裹每一時服一裹

主治 佯死格列刺ニ宜シ

○第二千百五十三方伯德兒私瀝爾屈地私肚兒茂爾

纈草丁幾錢三 遏設印亞的兒錢二 阿芙蓉丁幾錢一

右調勻每四分時乃至一時服十五滴

主治 格列刺ノ初起ニ宜シ

○第二千百五十四方伯德兒私瀝爾屈地私埵高噎爾

甘硝石精錢二

右時々取十滴砂糖點服

主治 格列刺生力沈衰スルヲ挑起スルニ宜シ○又吃逆

ニ佳効アリ

遠西... 流行格列刺... 廣... 堂

○第二千百五十五方

薄荷油錢二

右每八分時或四分時二滴乃至四滴砂糖點服

主治 佯死格列刺ニ宜シ ○英吉利及ヒ東印度ノ醫ハ大

量薄荷油ヲ以テ大量甘汞阿芙蓉ニ配用ス然レモ每症必

病者ニ利アラズ

○第二千百五十六方

加耶普的油錢三

右六滴八滴乃至十滴砂糖點服日二三

主治 佯死格列刺ニ宜シ ○東印度ニ於テ衆醫之ヲ用フ

ル一毎服三十滴ヨリ五十滴ニ至ル獨乙ノ醫モ又之ヲ
誤リテ流行格列刺ニ用フル一過多ナリ宜ク小量ニ與
フベシ甚佳効アリトス

○第二千百五十七方 拔私篤列爾名格列刺丁幾

遏泥子精 加耶普的油 杜松子油各一

忽弗滿液錢一 桂丁幾錢二 叔欽亞的兒滴七

右調勻

主治 格列刺預防ニ宜シ並ニ總テ格列刺ヲ治スルニ其

時期症狀ヲ論セズ之ヲ用フヘシ ○輕易ノ格列刺

子風氣鬱蓄シ胃部壓迫不安ヲ覺エ泄瀉スル者ハ此格

遠西藥房
卷十
流行格列刺
廣
堂

列刺丁幾四滴乃至八滴ヲ取り沙糖或ハ水一食匙ニ點
服スル一日ニ一二次○格列刺下利初發ハ患者速ニ蓐
ニ就キ温布ヲ以テ肚腹ヲ被覆シ薄荷或ハ黙栗薩ノ浸
劑二三碗ヲ服メ發汗シ之ニ兼テ每半時乃至四分時或
病証ノ増進ヲ計リテ八分時毎ニ格列刺丁幾十滴十五
滴乃至二十滴ヲ與フ發汗中渴アル者ハ冷水ヲ食匙ニ
抄ヒ頻々用フルニ宜シ或ハ収歛亞的兒稀鹽酸若クハ
硝酸二三滴ヲ水ニ加ヘテ佳味ノ里没奈埵ヲ作り用フ
ルハ最妙ナリ大抵此格列刺丁幾二三服ニメ泄瀉減セ
リ○正証格列刺コレヲハ每服十五滴二十滴乃至二十

五滴四分時八分時或ハ十密扭篤毎ニ用ヒテ其症鎮靖
スルニ至ル十二時内ニ治スル者多シ○上項説ク所ノ
効驗疑フ容カラズト雖然氏千八百五十年^{イブ}布失^シ掘^シ名^地
ノ流行格列刺ノ如キハ其効一定ナラス且他藥ニ優リ
テ殊効アルトナカリシナリ吾輩謂フニ總テ此丁幾劑
ハ敏性格列刺ニハ每症必相當セズ唯伴死格列刺^レ脈沈
或ハ全ク絶シ四肢厥冷皮膚青色ヲ帶ブル者最的中ス
○第二千五百五十八方^{列非設優爾}

（甲方）

龍腦 菲阿私越幾斯^{各世} 亞刺昆亞蘊謨^半 罌粟

遠西藥房 卷十九 四十五 廣 堂

乳濃者 鹿琥精二錢至 白糖一錢

右調勻準其症每半時服一茶匙或一食匙

主治 世上普通ノ一方タリ之ヲ服メ速ニ吐シ或ハ瀉ス
ル氏ハ愈頻服セシムヘシ症ニ準メハ分時四分時乃至
一時毎ニ與ルニ宜シ胃ノ抗抵鎮靖スレバ即菲阿私越
幾斯ヲ去ル龍腦灌腸法龍腦半錢ヨリ一錢至ヲ施メ過
多ノ泄瀉歇ム_一アリ列非設優爾四肢及ヒ胸腹ニ左
ノ軟膏方ヲ塗擦スト云フ

(乙方)

吐酒石一錢 龍腦三錢 家猪脂三錢

右調勻作軟膏塗擦

主治 此治法ヲ施スルハ龍腦ノ分利スル_一ナカラシカ
為多飲ヲ禁ス渴ヲ消スルハ唯冷水ヲ以テ頻々含漱セ
シムルノミ

○第二千五百五十九方不羣篤溼爾

龍腦三錢至 白糖一錢

右調勻為散分六服蠟紙包裹每半時一服

○第二千六百六十方同上

龍腦二錢 麝香三錢 白糖一錢

右調勻為散分六服蠟紙包裹每半時一服

遠西藥房
流行格列刺
廣

主治 右二方格列刺ニ宜シ

○第二千百六十一方 伯德兒滙爾強ノ醫設繆兒列爾

龍腦十二 過設印亞的兒半ヲ溶化

右每八分時或四分時二十滴乃至三十滴冷水一食匙點服

主治 格列刺全體厥冷ノ期ニ用フ

○第二千百六十二方 祿蒲格非都名人格列刺丁幾

龍腦精三錢 裸麥丁幾半

右調勻每八分時一二滴重症每服四五滴冷水或砂糖點服

主治 此方失列藥地名ニ於テ屢用ヒシ所ノ水劑ナリ 謁兒

別爾私地名格列刺ノ諸期殊ニ初期之ヲ奇藥トノ稱用ス

○龍腦精ノ製法 龍腦四ヲ燒酒九ヲ溶化ス 裸麥丁幾八焙炙裸麥三ヲ燒酒十八ヲ浸漬飽熟シ 濾テ十六ヲ液ヲ取ル

○第二千百六十三方 屋祿涅斯人名越栗失爾

(甲方)

龍腦 礪砂 的列並油 石腦油 硝酸各一錢 番椒

上好醋半 麥製燒酒半

右飽熟十二時濾過每四分時或半時服一茶匙乃至三食

匙至發汗

主治千八百三十一年流行ノ格列刺ニ阿列兒名地ノ醫姪

匹斯名此密幾私丟爾ヲ用ヒテ偉効ヲ得タリ又左ノ軟

膏ヲ塗擦セリ

乙方

礪砂加石灰精ヲ 舍電阿芙蓉液ヲ半 番椒丁幾ヲ六

右調勻塗擦遍體就中心窩肚腹及兩足

主治輓近魯西亞ニ流行ノ格列刺此方ヲ施ノ殊効ヲ得

夕リ

○第二千百六十四方〔瀝滌爾屈地瀝屈歇乙私的爾〕

倚嬭蘭根附一 滾湯八ヲ浸瀝過取液六ヲ又取滓加

常水五ヲ煮耗至二ヲ瀝取液加前液

右每八分時四分時若半時服一食匙

主治卒中性格列刺ニ宜シ

○第二千百六十五方〔宿德兒瀝爾屈地對兒滿〕

麝香草根附半 注滾湯五ヲ蓋閉飽熟八分時再加常

水適宜煮八分時瀝過取液三ヲ

右每半時一時或一時半服一食匙

主治室兒滿氏格列刺ニ之ヲ稱賛ス葛散名地ノ布弗巾的

爾名亦屢之ヲ用ス蓋中の爾ノ之ヲ稱用スル症ハ第

透
西
方
藥
學
卷
十
六
流
行
格
列
刺
廣
濟
堂

一併死格列刺心臟及皮膚ノ運營全ク麻痺セル者第
二已ニ生力奮起ノ期ニ至リ格列刺再感ノ更ニ吐瀉ス
ル者第三生力奮起シ秩彪私ノ証状ヲ發シ而ノ腦ノ刺
衝及ヒ腸胃瘵物証ヲ兼子サル者はナリ

○第二千百六十六方蒲列私老地 憺兒

燐一 甘扁桃油半ヲ溶解更加二 刺毘亞蘆末二 錢

作乳劑加後味

礪砂加過泥子精八滴至十二滴 砂糖舍利別二 錢

右每八分時乃至半時服一 食匙

主治格列刺殊ニ神經運機俄頃ニ沈衰スル一甚シキ者

ニ宜シ所謂白格列刺此症併死状青色格列刺ニ最佳ナ

リ此症ハ皮膚蠟ノ如ク灰白ニメ屍ノ如ク殊ニ顔面常

色ヲ失フテ陥リ初起速ニ筋纖維弛弱シ頭旋耳鳴嗜眠

シ。經過甚猛烈ニメ多クハ治シ難シ病者十八人中治

其屍ヲ檢スルニ腦中血虛シ腦底及ヒ諸空隙ニ透亮液

鬱畜シ腦質乾枯セリ○憺亞的兒附トチオハ其効確實

ナラス且服用シ難キ故ニ廢ノ用ヒズ上方ハ味甚佳ナ

リ憺ノ服量三日乃至四日内四ハニ過グベカラズ唯ニ

患者之ヲ服シ瘥ヘテ后口中粘液膜稍糜爛セリ○始メ

テ歐羅巴洲殊ニ獨乙ニ格列刺流行ノ時屢憺亞的兒ヲ

試用セリ其害少シトセズ

○第二千百六十七方〔撒暹布〕

炭水素亞的兒一錢至二錢〔附〕

麻屈涅失亞二錢

龍腦密幾分

去爾至八分

右調勻每一時乃至二時服一食匙

〔主治〕流行格列刺ニ宜シ

○第二千百六十八方〔篤教設兒〕

炭水素亞的兒五分 白糖半

右調勻為散分三服蠟紙包裹每四分時半時一時或一時半一服

〔主治〕此方格列刺ニ處メ良驗多シ大抵一二服ニメ生力

奮起スルニ足ル必三服ニ過ル勿シ炭水素亞的兒ヲ用

リ混メカルボ子ウム。コロラ左山或ハ格魯福兒謨ヲ用

フルヲ勿レ

○第二千百六十九方〔蒲刺秩〕

格魯福兒謨一錢 的列並油一 蒸餾水三錢

右調勻準症每四分時半時或一時取一茶匙稀淡燒酒一

盞和服

〔主治〕伴死格列刺全體厥冷ノ時期之ヲ用ヒテ超絶ノ効

アリ蒲刺秩名憶フニ格魯福兒謨ハ恰格列刺ノ消毒藥

ニノ此症ノ一奇藥タル一猶規尼捏ノ間歇熱ニ於ケル
 カ如シト且格魯福兒謨ヲ用フレハ危險ノ証状著ク解
 脱セル一確實ニシテ之ニ併用セシ所ノ甘黍芥子泥牛
 膽等ノ中ニ就テ正ニ救活主藥タル一戴フベカラスト
 云ヘリ

○歇爾倔損名反レ倚レ貯兒名流行格列刺ノ重症他藥不

効ノ者ニ英吉利ニ於テ昉メテ格魯福兒謨ヲ嗅方トシ
 良驗ヲ得タリ危險症十人ノ中一モ死スル者アラズ兼
 テ乾弗刺涅兒或ハ弗刺涅兒ニ拔爾撒謨阿波德兒獨弗
 阿芙蓉下幾及ヒ莨菪下幾ヲ塗リテ摩擦ス之ヲ嗅引ス

ルハ危險ノ証状退クヲ度トシテ已ム久シキ者ハ十二
 時間之ヲ嗅カシム但時々休歇スヘシ兼テ燒酒ニ水ヲ
 加フル者亞兒魯薄煎乳汁冷水或曹達水ニ燒酒ヲ加エ
 テ與フベシ之ニ由テ生力奮起スル者ハ刺絡ヲ要セズ
 ○格魯福兒謨ノ嗅引法ハ之ヲ他病ニ施スト一般ニ格
 列刺ニ用フルモ亦謹戒ヲ要スル一固ヨリ論ヲ俟タズ
 ○第二千百七十方秘室篤滿

格魯福兒謨十四 燒酒一 蒸餾水六

右調勻取四分一頓服或準症服其餘
 主治伴死格列刺ニ用ヒテ鴻効アリ

○第二千七百七十一方〔布林茂爾〕

格魯福兒謨

六密尼 繆謨

燒酒三錢

蒸餾水二

右調勻分三服

主治同上○一密尼繆謨ハ大約一ハ即一滴ニ同シ

○第二千七百七十二方〔屋兒弗〕

大麻子丁幾

印度產者 半弓附

右每半時一時或一時半服八滴十滴乃至十二滴

主治紀元一千八百四十九年執政職屋兒弗名格列刺症

七人ニ法私幾斯或ハ大麻子丁幾ヲ用ヒテ良

効ヲ獲タリ其症皆吐瀉物ニ格列刺ノ証徴ヲ見ハスノ

ミナラス聲音變常。皮色。眼光。體温。及ヒ尿閉等悉皆正徴

ヲ備ヘリ但脈動未絶セザルノ此此劑能ク吐下。疝痛。腓

腸痛ヲ治シ且用ヒ易キ力故ニ病者モ亦頻服ヲ喜ヒ忽

鎮瘳ノ効ヲ奏シ善ク不眠ヲ治スルノ能アリテ服後決

メ昏睡或ハ稽留麻痺ヲ發メ秩私變スルノ害アリ

シトナク七人皆其病ノ險重ナルニ比スレハ速ニ平癒

セリ○篤設兒名ハ重症格列刺ニ此丁幾ヲ用ヒテ未

良驗ヲ見ズ腓腸痙攣モ亦鎮靖スルヲナシト云フ

○第二千七百七十三方

龍腦精三

阿芙蓉丁幾

一錢

遠西方藥
卷十九
流行格列刺
五十二
廣
月
堂

右調勻塗擦

○第二千百七十四方

龍腦錢一 蟻精附二

硃砂揮發膏一

芫菁丁幾錢二

右調勻塗擦吐腹

○第二千百七十五方

亞麻子油 的列並油錢各六 加耶普的油錢半 龍腦錢一

硃砂加石灰精一

右調勻塗擦

○第二千百七十六方

龍腦精五 番椒丁幾一

右調勻塗擦

○第二千百七十七方別魯列地 過見別爾私

龍骨木脂丁幾 番椒丁幾 芫菁丁幾 硃砂加石灰

精各一 複方白芷精附八

右調勻塗擦

主治痙攣ヲ鎮メ血液巡行ヲ進ムルニ宜シ

○第二千百七十八方寄寧屈私 別爾屈名地 栗屈的兒

芫菁丁幾 番椒丁幾錢各一 龍腦精二 芥子浸二

子半 製

右調勻塗擦

○第二百七十九方

的里亞加錢

甘消石精子

的列並油子

清淨蜜子

再留燒酒子

右調勻塗擦

主治魯西亞ニ於テ格列刺膏ト稱シ一般之ヲ用フ

○第二百八十方〔篤菘設兒〕

菲阿斯油煮製者

右外用

主治腓腸痙攣ニ宜シ○篤菘設兒名ニ據ルニ菲阿斯油

ハ此痙痛ヲ治スルノ効刺戟藥ニ優レリ

遠西方彙卷之十九

遠西方彙卷之二十

獨乙子加幾安頓著

和蘭子傑斐婆都譯

侍醫法印伊東瑤川院貞文仲重譯

南洋伊東亨健夫參校

便秘オグストムクチオアルヒ羅

大便常ニ秘スル者ハ屢開豁氣中ニ逍遙シ早晚冷水ヲ多

服シ總テ難化ニメ便秘ヲ致シ易キ食餌ヲ戒シ菜蔬果實

及ヒ肉食ヲ要トス其人假令便氣ナシト雖毎日同時ニ上

圖ヲ試ミ以テ習慣スルヲ切要トス蓋其定期ノ如キハ每
 朝哥喜ヲ喫スルノ後ヲ以テ妙トス間亦服藥ノ瀉ヲ促ス
 ヲ要スルモ尚用ヒザルヲ優レリトス鹽類瀉劑ハ腸ヲ弛
 弱セシムルカ故ニ之ヲ要セス大黃ヤラク刺巴バ及ヒ蘆薈ルイ劑ヲ
 佳トス左ニ列舉スル方法ノ外第七百四十方乃至第七百
 五十三方第九百二方乃至第九百六方九百九方九百十方
 九百廿四方等瀉ヲ促スニ用ヒテ可ナリ○輓近バ黎斯ノ
 商家ウツ娼兒ウツ頭トシ植物ヲ調合ノ散末ニ作り謁爾法連答ルト名
 ケテ四訖ウツ祿ウツ屈ウツ婪ウツ墨ウツ秤量ヲ一包トナシ之ヲ頑固便秘ノ秘
 方ト稱ノ世ニ嚮グ此散四羅獨乃至六羅獨ヲ取リ乳汁或

ハ肉羹汁半匕若クハ四分匕ノニヲ以テ煮ル一六密扭篤
 乃至八密扭篤ニ粥トナシ毎朝空心ニ服シ或ハ晚際再
 服ハ一劑服盡ノ効十分ナラザレバ又第二劑ヲ服ハ此方
 良効アリ而ノ害ヲ致スナシ瀉弗涅兒名ノ説ニ從ヘバ此
 散豆粉ヲ以テ製スト云ヒ董的利弗名ニ從ヘハ謁魯ル穢ル謨
 噎ル爾ル肝ル利ル亞ル附ルノ粉末ヨリ成ルト云フ○娼兒頭ノ家ニ格
 董ル機ル那ル砂ル糖ル舍ル利ル別ル詳ルヲ嚮ク謁爾法連答ノ効力足ラサル
 者ハ之ヲ加ヘテ以テ其効ヲ扶ク

○第二千八百八十一方穢歌蘭度

旃那末ニ

蒲公英流動越幾斯適

廣 肝 堂

右為六十九衣石松粉每朝服五丸乃至十九

主治便秘ニ宜シ○旃那ハ便秘症ニ用ヒテ毎ニ害ナク

且確効ノ藥劑タリ然レモ常住之ヲ用フルト勿レ

○第二千八百二十二方 折魯蔑印名國浸劑

旃那葉弓四加再留燒酒飽熟十二時濾去液陰乾合後

味

接骨木花半二弓 茴香 過泥子各一 純精酒石六錢

右調勻

主治常習便秘ニ宜シ○此劑ニ弓ヲ取り水五弓ヲ注キ
暖所ニ安シ飽熟スルト五時ノ後濾過此浸液半多

與フ胃弱家ハ麻刺瓦酒少許ヲ加ヘ服其効確實ニシ

テ數回之ヲ用フルモ毫モ害ヲ遺ストナシ

○第二千八百三十三方 膏名地倚未利

白石蠟錢二 砂糖舍利別宜適

右調勻二公為一丸衣麻強涅失亞或甘草末朝餐與午食
之中間或晚間臨卧服四丸乃至五丸

主治常習便秘ニ宜シ此丸連服二三週ニモ全功ヲ收ム

ルニ至ル之ヲ服メ通例四日乃至六日ノ後始メテ効ヲ

呈スヘシ毎日一回平便ヲ得ルニ至ラハ服數ヲ減シ或

ハ一日休歇累年頑固ノ便秘症及レ其症膽石ヲ兼任

セル者末利名上法ノ如ク此丸ヲ與ヘテ脱然根治セリ

之ヲ久服スルモ決ノ胃弱等ノ害ヲ致スナカリシト

云フ

○第二千八百八十四方〔城歌蘭〕

牛膽各一錢 白石蝮各一錢 大黃末各一錢 蒲公英越幾斯適宜

右二氏為二九早晚服〔福心〕

○第二千八百八十五方〔福心〕

白石蝮三錢 大黃越幾斯半錢 大黃末適宜

右調勻作〔坐〕 三個衣〔蕃薇軟膏蠟紙〕 包裹早旦取一個挿

入直腸

主治 右二方〔二千八百八十四方〕 便秘習僻ノ者ニ宜シ

○第二千八百八十六方〔私〕

透明蘆薈一錢 大黃一錢 白石蝮各一錢 蒲公英越幾斯適宜

右為六十九衣伊里斯弗魯連底那末晚間服〔二三九〕

主治 大便ヲ促スニ宜シ ○緩効ヲ要スル時ハ早晚六丸

乃至八九ヲ服スベシ

○第二千八百八十七方〔歌〕

蘆薈越幾斯半錢 葯刺巴末一錢

右調勻為二十九衣石松粉内玻璃壘固封日晡服〔一九〕 乃

至三九

○第二千八百八十八方同上

蘆薈越幾斯錢半 加拔爾撒謨字露舍利別一弓白搗更

加後味

格魯董篤丁幾錢一

右調勻日晡服一小食匙臨用宜振盪

○第二千八百九十九方私託兒名 瀉下丸

格魯董篤越幾斯 透明蘆薈各一錢 鐵粉半錢 亞刺毘

亞蘧謨漿宜適

右為四十九衣石松粉晚間服一二九

○第二千八百九十方戒歇蘭度

上好蘆薈 鐵粉各一錢

右調勻一匁為一九衣石松粉日晡服一九乃至三九

主治二千八百八十七方ヨリ二千八百九十方至常習便秘

罹リ易キ者ニ宜シ○歇憎名 通例二千八百八十七方ヲ用

フ但其九十分ノ効ヲ奏セサルキハ二千八百八十八方ヲ

與フ

○第二千八百九十一方私列斯弗名 瀉下丸

鐵粉十五錢 蘆薈越幾斯一錢 複方大黃越幾斯附半錢

右調和加再餽火酒少許為四十五九衣石松粉早晚服二

九乃至三九

主治此方衰弱セシマルナク連綿緩下ヲ促スニ好

○第二千百九十二方〔歌〕蘭度

蘇甘没各一 鐵粉各一

右調勻一匁爲一丸石松粉日晡服一丸乃至三丸

附考 鍊粉少許ヲ加フル片ハ蘆薈及ヒ蘇甘没扭ノ効大

ニ倍加ス

○第二千百九十三方〔歌〕瀝私

藥刺巴脂一 白石鹼一錢 加密列加枸橼油附十

再餹火酒宜適

右爲六十九衣石松粉早晚服二丸乃至四丸

○第二千百九十四方〔歌〕愷

複方蘆薈丁錢半 藥刺巴末一錢 旃那煉膏一

右調勻早旦服一茶匙

主治二千百九十二方ヨリ二千百九十四方至便秘常習

ノ者ニ宜シ

○第二千百九十五方 穢歌蘭度人造蓖麻油

巴豆油一 白罌粟油一

右調勻每一時與一食匙以至得瀉

主治痙攣性便秘ニ宜シ

○第二千百九十六方〔歌〕愷

蓖麻油半一

格魯莖篤丁幾

右調勻早晚取一茶匙塗擦肚腹

主治便秘ニ宜シ又腺腫ヲ解釋スルニ好

○第二千九十七方設備室

藥刺巴カニ

甘汞ハ

孕礬酒石錢一

右調勻為散分二畏若四畏若八畏準年每一時與一畏以

至得効

主治常習便秘ニ相當シ難シ但内臟粘液畜積及ヒ蟲症

ニ用ヒテ更ニ的中ス

○第二千九十八方痔私的爾連

巴豆油滴六

甘扁桃油錢一

亞刺昆亞護謨錢二

白糖半

右加常水三勺搗和作乳劑每半時服一食匙以至得効

○第二千九十九方同上

巴豆油滴十

加白石鹼一錢搗爛再加後味

藥刺巴石鹼附

藥刺巴脂各一

右調勻為三十九衣石松粉每服二九乃至四九日二三

○第二千二百方 巴豆油糖

巴豆油滴二

桂油糖錢二

右調勻為散每服十氏乃至三十氏日二次

主治右三方頑固便秘焮衝症ヲ帶ヒザル者ニ宜シ

○第二千二百一方

白糖一錢

精製漿粉廿四

歐朴魯昆刺室利實油龍骨木脂

十ノ類附

右調和作羅黹刺一個九人大人每服二個或三個小兒一

個

〔主治〕暴瀉ヲ促スニ宜シ○歐朴魯昆刺室利實油ニ三種

アリ一ハ絞搾ノ取ル者ニハ亞爾箇兒製三ハ亞的兒ヲ

加ヘ列兒氏ノ搾具ヲ用ヒテ搾リ取ル其第一第二ハ吐

瀉ヲ發シ或ハ失氣昏冒ヲ起スヲアリ第三種ハ瀉下ノ

効更ニ倍スト雖昏冒ヲ發スルヲナシ而ノ服量一錢半

ニ至テ始メテ吐ス○疇昔此油ヲ「カタピチア。ミノリス

油ト唱ヘ用フ輓近葛兒達利尼名及ビ拔耳備爾同之ヲ

巴豆油ニ代ヘテ稱用セリ臘別名乙蘭名及ヒ末兒珍同ハ

頑固便秘。鉛毒症。絛蟲等ニ用フ

○第二千二百二方

大黃舍利別六錢

滿那舍利別

海葱蜜各二錢

右調勻茶匙抄服

〔主治〕乳兒ノ下劑トス

○第二千二百三方〔孤秘私〕

亞爾鮮越幾斯半

格魯莖篤越幾斯半

薄荷一錢半

水酒製附

右調勻每日取一二茶匙塗擦肚腹

主治大便閉並小兒蟲症ニ宜シ

黃疸 イクトリス、ス、羅、ゲ ○膽石 カルキ、リ、ビ、リ、オ、シ、

黃疸ハ膽液ノ分泌障碍アリテ膽液十二指腸ニ流通セザ

ルニ因ル故ニ排泄失常症ノ列ニ算入シテ可ナリ○黃疸

焮衝性ヲ夾ム者ハ放蟻清涼劑酸性瀉藥 五百七十五方至

中和鹽 方四十九方至五十五方 或ハ其症ニ準シテ甘汞モ亦用

フベシ○瘧瘵ヲ帶フル者ハ加密列默栗薩續草ノ浸劑民

埵列利精阿魏菲阿私越幾斯阿芙蓉吐根 二百四十二方 等ニ宜シ

○原因門脈系ノ壅塞或ハ肝脾ノ腫脹ニ係ル者ハ解凝劑

ニ宜シ總テ絞汁殊ニ白屈菜新絞汁 始メ毎服一茶匙漸ク

三次ニ用テ且肝部ニ灰白水銀膏ヲ塗擦スベシ 大黃及

ヒ蘆薈 二千八百九方至二千八百一十六方 ハ皆此症ニ奇

効アリ極テ頑固ノ症ハ穢歇蘭度莨菪ニ大黃ヲ加ヘ 二千

方 十二 過兒栗屈的兒 名ハ 青酸莨菪水 十四方 ハヲ稱用セリ

之ニ兼テ鑛酸脚湯 五百八十七方 ヲ急ル勿レ○黃疸膽石ニ繼テ

發スル者ハ油性劑及ヒ鎮痙劑ヲ與ヘ其見証ヲ鎮靜メ後

膽石根治ノ法ニ移ルヘシ 二千二百六十八方 ○初生兒ノ

黃疸ハ惟緩瀉藥 二千二百十五方 一二服ヲ要スルノミ

○第二千二百四方〔按魯賢佛尼〕 右調勻每時半服一食匙〔黃疸〕

○第一千二百四方〔按魯賢佛尼〕 右調勻每時半服一食匙〔黃疸〕

○第一千二百四方〔按魯賢佛尼〕 右調勻每時半服一食匙〔黃疸〕

○第一千二百四方〔按魯賢佛尼〕 右調勻每時半服一食匙〔黃疸〕

○第一千二百四方〔按魯賢佛尼〕 右調勻每時半服一食匙〔黃疸〕

○第一千二百四方〔按魯賢佛尼〕 右調勻每時半服一食匙〔黃疸〕

○第一千二百四方〔按魯賢佛尼〕 右調勻每時半服一食匙〔黃疸〕

○第一千二百四方〔按魯賢佛尼〕 右調勻每時半服一食匙〔黃疸〕

○第一千二百四方〔按魯賢佛尼〕 右調勻每時半服一食匙〔黃疸〕

○第一千二百四方〔按魯賢佛尼〕 右調勻每時半服一食匙〔黃疸〕

右調勻每時服一食匙

○第二千二百六方〔同上〕

蒲公英越幾斯 白屈菜越幾斯 白石鹼 蘆薈安沒

尼亞幾 大黃末各一錢 蘆薈各一錢

右調勻二丸為一丸衣石松粉早午晚服十二丸

主治黃疸緩瀉藥ヲ與ヘテ効ヲ見ザル者之ニ宜シ

○第二千二百七方〔福福列爾〕

蘆薈安沒尼亞幾 孕礬酒石各二錢 蒲公英越幾斯適宜

右二丸為一丸衣石松粉每服六粒乃至八粒日三四次

主治瘡ニ之ヲ黃疸ニ用フルノミナラス總テ之ヲ以テ

解釋瀉藥トス

○第二千二百八方〔過儼栗屈的兒〕

精製薤謨安沒尼亞幾 蒲公英越幾斯各三錢 白屈菜

越幾斯一錢 白石鹼二錢

右調勻二匁為一九衣大黃末每服十粒乃至二十粒日三次

〔主治〕肝臟變質症及ヒ黄疸ニ宜シ

○第二千二百九方〔匹篤失葛弗士〕

水製蘆薈越幾斯五匁至十匁 蒲公英越幾斯二錢 桂水六

匁溶化加後味

苦扁桃濃水半錢至一錢

右調勻每半時服一食匙臨服宜振盪

○第二千二百十方〔百叔泥姪爾〕

精製薤謨安沒尼亞幾二匁 白屈菜越幾斯 白石鹼

大黃末各二錢 布律謨蔑爾散 失鳩荅越幾斯各一匁

右調勻二匁為一九衣石松粉早晚服十粒乃至十二粒

〔主治〕黃疸原因器敗ニ係ラサル症總テ之ヲ稱用ス之ニ

兼テ大草根泡劑ヲ服シ礪砂揮發加龍腦膏阿芙蓉丁幾

及ヒ的列並油ヲ調和シ肝部ニ塗擦スル一日ニ數回又

屢石鹼温浴ヲ行フベシ

○第一千二百十一方〔弗廉取極〕

白屈菜越幾斯 大黃末 白石鹼各二錢 失鳩峇越幾

斯一草 甘汞半

右調勻二小為一九夜甘草末晨夕服十九乃至十二九

主治黃疸肝臟硬結腫係ル症之宜三十二

○第一千二百十二方〔穢歇蘭度〕

葶芎一 大黃五 白糖一

右調勻為散分八服早晚一服

主治肝脾閉塞及硬結腫頑固黃疸並瘵瘰喘及心悸動宜シ

○第一千二百十三方〔私鳩爾〕

過兒祿山五 甘草末半

右調勻為散分十二服日三服

主治慢久胃腸虧損肝腫脹及焮腫ヲ兼ヌル症黃

疸吐涎削瘦勞瘵熱等皆危險ニ其治望ム可カラサル

ガ如キ者此方良効アリ之ヲ服シテ黃尿能ク利シ大便

順下シ諸候漸々減退セリ○往歲既ニ利毘屈ハ之ヲ驗

查セシニ過兒祿山ハ肝臟病ノ一要藥タリト云フ○過

兒祿山ハ尿酸ト硝酸ト和メ生ス無色ニ真珠ニ類シ

光輝玻瓈ノ如キ結晶物ナリ味鹹酸不佳ニ殆鑛屬ノ

如シ能ク水ニ溶化ス

○第二千二百十四方 穢歇蘭度大黃舐劑

大黃舍利別 苗香水 各半

右調勻每服一茶匙日三次乃至四次

○第二千二百十五方 [遠突土]

蜷姑石 一 苗香水 一 溶加後味

大黃水製丁幾 滿那舍利別 各半

右調勻每一時服一茶匙臨用宜振盪

[主治] 右二方初生兒ノ黃疸ニ宜シ

○第二千二百十六方 [穢歇蘭度]

白石鹼 半 蘊謨安沒尼亞幾 亞爾鮮越幾斯 各二

右調勻二匁為一九衣石松粉每服十九日三次

○第二千二百十七方 受蘭度 名 膽石水

的列並油 半 亞的兒 錢

右調勻每服三十滴乃至六十滴日三次

[附考] 上方ハ穢歇蘭度ノ書ニ據レリ他人記スル所ノ膽

石水 ギョラシラ ハ亞的兒半匁的列並油二錢ヲ調和シ每

服十五滴乃至三十滴日二三服

○第二千二百十八方

新鮮牛膽 薄荷水 各二

右調勻食匙抄服

主治二千二百十六方ヨリ二千二百十八方至膽石症ヲ

根治スルニ宜シ○哆田名ハ石灰水ニ比中ニ炭酸曹達

二錢ヲ溶解シ毎日飲服十四日間持重セシム又乳養法

此症ニ嘉稱アリト鑛泉ノ中ニ就テ「カル、ハ」泉「マリ」ン

「バット」エ「ム」ス等ヲ良トス○菜蔬ヲ食シ身體ヲ運動シ冷

水ヲ多服シ總テ便秘ノ療法ヲ行フニ宜シ

小便失禁

ユニレシス○イシコンチ子シチア。ユリナエ

此症痙攣性或ハ靈敏性ノ者ハ殊ニ胃腸ノ汚物蟲殊ニ膀胱

脱痔尿石ニ注意スベシニ解釋下劑殊効アリ其他吐根ニ百

方十九 莨菪阿魏微温湯浴半身角法等ヲ稱用ス○麻痺性及

鈍性ノ症ハ其治甚難シ此症麥奴ニ千二百二十方及ヒ

芫菁ニ千二百二十方ヲ殊稱セリ其他番木鱉私的列幾尼捏臘實

干斯烏華烏爾識葉ヲ用ヒ並ニ衝動藥ヲ以テ膀胱ノ部ヲ

洗滌シ薦骨上ニ芫菁膏ヲ貼スル等之ニ宜シ一病者十八

歳小便失禁ヲ患フ按スルニ是其因膀胱括約筋ノ無形障

碍ニ係ル苟連名地ノ摺篤私葛兒屈名硝酸私的列幾尼捏每

服十六分ハ一日ニ三服速ニ平治ス蓋之ニ兼テ腰上發

疱法ヲ施シ其部ニ刺戟軟膏ヲ塗擦セリ餘ハ膀胱麻痺條

下ニ列載セル方法千百五十二方至千百六十三方ヲ參考スベシ○小兒

夜間ノ遺尿ハ多ク習慣ニ係ルアリ

○第二千二百十九方〔別栗的兒〕

吐根末_三

甘汞_六

莨菪越幾斯_四

結麗土_一

乳

糖_二

右調勻為散分十二服早旦空心一服及日晡臨卧各一服

主治夜間遺尿ニ宜シ○一人十九歲遺尿ヲ患フ栗的兒

名此散ヲ連進スル一四箇月ニシテ又外用松脂硬膏ニ

吐酒石ヲ和シ薦骨ノ部ニ貼セリ且栗的兒氏ノ說ニ據

ルニ敏性ノ遺尿ヲ治スルハ極メテ尿ヲ緩和スルヲ以

テ第一義トス故ニ扁桃乳。罌粟乳。及ヒ大麻子ニ石松粉

ヲ加用スルニ宜シ

○第二千二百二十方〔私戒蒲兒〕

麥奴_一

滾湯四勺浸

右每半時服一食匙

主治麻痺性遺尿ニ宜シ○一人六十五歲遺尿ヲ患フ私

戒蒲兒名此浸劑ヲ與フル一八日ニノ瘥ユ○別栗的兒

名ハ麥奴丁幾ヲ用フ始早晚半茶匙後一茶匙砂糖水ニ

和服セシメテ良驗ヲ獲シ一屢之アリ但頑固症ハ莨菪

丁幾ヲ加フルヲ要ス始每服五滴後毎日一滴ヲ增加ノ

小便微痛ヲ覺ユルニ至ル

○第二千二百二十一方私的印覽屈

甲方

麥奴煎四勺煮半 葭若葉浸二勺浸 磷酸二錢 番木

鼈越幾斯五 滿那舍利別一

右調勻每二時服一食匙

主治麻痺性遺尿ニ宜シ○二老人嘗テ痔疾ヲ患ニ今冒寒ニ由テ驟ニ遺尿症ニ罹レリ私的印覽屈之ニ上方ヲ處ニ治セリ後調方トノ左ノ水劑ヲ與フ

乙方

葭若越幾斯四 番木鼈越幾斯六 磷酸一

右調勻每服十五滴砂糖水點服日三次

○第二千二百二十二方同上

芫菁末一 麥奴末二十 白糖一錢

右調勻為散分六服每二時半一服

主治婦人麻痺性小便失禁症分娩ニ因ル者之ニ宜シ之ニ兼テ芫菁丁幾ニ忽弗滿拔爾撒謨肝荅ヲ加ヘ外用ス○又膀胱麻痺ノ條ニ列載セル方法殊ニ千百六十方乃至千百六十二方ヲ用ヒ且千百六十三方ヲ塗擦スルニ宜シ

○第二千二百二十三方倭録都溫兒

遊西煎膏

卷二十一

小便失禁

十一

腎

肝

堂

鹽酸金鹽ニ 蒸餾水一匁溶解

右調勻每一時服十滴

主治水腫小便失禁黑障眼侵蝕頑癬及ヒ總テ補給力不足ノ症ニ宜シ但畜血ニ傾ク者ハ適當セズ一老人嘗テ水腫ヲ患ヒ爾後小便失禁ス之ヲ患フルヲ既ニ久シ屈祿都涅兒之ヲ用ヒテ全癒ス

○第二千二百二十四方〔穢歌蘭度〕

曹達カ 純精酒石ハ六

右調勻為散分ハ畏每服一畏日二三

主治小便失禁症膀胱中尿沙畜積ニ因ル者ニ宜シ

小便瀰滯 イキビスア 羅ム 羅シ 羅イ 羅エ 羅レ

小便淋瀝 ド ロ ツ ラ シ ギ リ ア 羅

小便閉 ビス キ リ ア 羅 ベ シ テ

尿石 カル キ リ ユ リ ナ リ 子 ン 蘭

小便ノ疾患ハ每症皆粘滑油質藥或ハ之ヲ石松粉ト配用スルヲ好トス焮衝性尿閉ハ刺絡蟻鍼ヲ缺クベカラズ爾

後灰白水銀膏ニ菲阿私油及ヒ龍腦ヲ和メ膀胱部ニ塗擦シ又緩和蒸劑及ヒ灌腸法ヲ施シ内用甘承阿芙蓉ニ宜シ

三百九 癰癰性尿閉ハ油性乳劑ニ阿芙蓉菲阿私越幾斯或
十四方 老利兒結爾斯水ヲ和スル者 五百八方 五百十二方 至五百十四方 至五百九十四方 至

五百九十六方二石松粉。石松葉二千二百六至二千二百六十八方二至二千二百六十八方二阿魏千二百廿方二小量吐根八百六或ハ吐根乳劑五百三阿魏千九方二等ニ宜シ之ニ兼テ鎮痙ノ塗擦蒸湯法及ヒ局處蒸氣浴等ヲ行フベシ○麻痺性尿閉ハ先葛麥的爾ヲ以テ小便ヲ利シ内用龍腦杜松子烏華烏爾識天造拔爾撒謨劑的列並底那芫菁三十一方二亞兒尼加幾那等ニ宜シ外用薦骨上ニ發疱膏ヲ貼シ衝動藥ニ芫菁丁幾ヲ和シ塗擦スル等佳トス後調法ハエルジンゲル水ヲ用フベシ其他膀胱麻痺ノ條下ニ載スル所ノ方法千百五十三方至並ニ麻痺性遺尿ニ處スル方二千二百廿三方ヲ參照スベシ○

尿閉ノ因器敗ニ係ル者ハ其治法自ラ種々ノ別アリ手術ノ助ケヲ須ツ症多シ尿石ニ因スル者ハ先油質粘滑藥千二百三方ヲ用ヒテ之ヲ緩和シ後尿石根治法方至二千二百六三四方ニ移ルベシ

○第二千二百二十五方帶陽

亞刺毘亞蘆謨錢二 雞子黃錢三 石灰水三 扁桃油一

阿芙蓉丁幾錢一 白罌粟舍利別一

右調勻每四分時乃至半時服一食匙一

主治陽名ノ經驗ニ據ルニ尿閉小便淋瀝結石病ヲ治ス

ルニ未此方ニ優ル者ヲ見ズト云フ

○第二千二百二十六方〔穀煙燻見度〕

石松葉三

右細剉取二匙水半彬篤煮耗至四分一彬篤每十密搗篤
温服一小盞

○第二千二百二十七方〔同上〕

甘扁桃油二錢

亞刺毘垂蘆護適

加石松葉煎煮二錢取之

四弓作乳劑加後味

旃那煉膏〔附〕半

右調勻每半時服半食匙

主治右二方二千二百廿七方尿閉癱瘓性ノ者或ハ膀胱

ノ筋及ヒ裏膜衰弱ニ因ル者或ハ膿水若クハ砂粒畜積

ニ因ル者等皆此方ヲ用フベシ

○第二千二百二十八方〔穢歌蘭度〕

石松粉半

李肉三

右調勻為舐劑每一時服一茶匙

主治大人小便瀯滯小便淋瀝及ヒ小便閉ニ宜シ

○第二千二百二十九方〔昆刺地〕

阿魏半

吐根

阿芙蓉各二

薄荷油滴

右調勻二公為二九衣石松粉每服十九日三次

主治癱瘓性小便淋瀝ニ宜シ○叔泥埕爾名此九ヲ奇方

トシ稱賛ス又一老人八十二歳胃寒ニ因リテ劇甚ノ尿
閉ニ灌レリ患篤結名此丸ヲ用ヒテ偉効ヲ得タリ

○第二千二百三十一方穢歌蘭度

杜松子舍利別一 洋芹水四 稀鹽酸二

右調勻毎二時服一食匙

主治麻痺性小便滯滯ニ宜シ

○第二千二百三十一方同上

芫菁末一 龍腦六 亞刺昆 亞蘆謨漿適

右為四丸衣石松粉早午晚一丸燕麥汁送下

主治同上○上方ニ兼テ膀胱及ヒ薦骨ノ部ニ寒罨法或

ハ灌水ヲ施シ冷水灌腸或ハ膀胱ニ冷水ヲ射注シ脊椎
ノ下部ニ衝動藥ヲ塗擦シ芫菁膏灸越列幾的兒等ヲ施
スベシ

○第二千二百三十二方

的列並油二 雞子黃一 薄荷水三

右丁寧攪和作乳劑塗擦橫隔及膀胱部位

主治尿閉ニ宜シ○礪砂揮發加龍腦膏及ヒ阿芙蓉丁幾

モ亦用フベシ

○第二千二百三十三方穢歌蘭度

石松粉二

石分四畧早晚服一畧

主治幼兒小便淋瀝宜シ

○第二千二百三十四方同上

石松粉錢一 過兒托舍利別錢六 水一 阿芙蓉一

右調勻每一時服二茶匙

主治小兒小便瀦滯小便淋瀝及小便閉宜シ

○第二千二百三十五方別連杜

亞麻油新絞者 一 雞子黃適 一 井水五 一 過兒托舍利別一

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

主治膽石尿石ノ攣痛ニ宜シ

○第二千二百三十六方穢歌蘭度

曹達錢半 純精酒石 白糖各一 一

右調勻為散分十二服日三服

主治尿石ニ宜シ○石灰水日服 一 曹達水曹達半錢セルツ 一

溶化カル、スバット 鑛泉ラハシ ゲル同 ゲイルナウエル

同井ル ジンゲル水同 等撰用スベシ

○第二千二百三十七方別連杜

白石鹼 曹達乾者各 一 睡菜越幾斯適 一

右調勻二丸為一九衣甘草末每服五丸乃至十九日三次

遠西方彙 卷二十 小便閉 尿石 二十 廣月堂

遠西方彙 卷二十 小便閉 尿石 二十 廣月堂

遠西方彙 卷二十 小便閉 尿石 二十 廣月堂

遠西方彙 卷二十 小便閉 尿石 二十 廣月堂

遠西方彙 卷二十 小便閉 尿石 二十 廣月堂

遠西方彙 卷二十 小便閉 尿石 二十 廣月堂

遠西方彙 卷二十 小便閉 尿石 二十 廣月堂

遠田方膏

卷二十 小便閉尿石

二十一

廣肝堂

主治尿石胃中酸敗液等ニ宜シ

○第二千二百三十八方〔屑兒肺耳濕魯〕

礪砂一錢

曹達半錢

健質亞那越幾斯三錢

加密列水

弓六

右調勻每服一食匙日六次

主治尿石ニ宜シ

○第二千二百三十九方〔法兒格濕魯〕加里室氣水メアピチカ。

リナル
羅カ

酒石鹽一錢至二錢

攝爾都兒水三十六弓溶化

右每服二三匙日三次

主治尿砂膀胱結石ニ宜シ○酒石鹽三弓乃至四弓ヲ攝

爾都兒水一盞ニ溶化スルモ亦更ニ簡便ナリトス

○第二千二百四十方〔弗。娼兒的爾〕

酒石鹽一錢

加後味溶和

桂水三弓

實亞格地温半弓

右調勻每服半食匙日四次

主治結石症ニ宜シ○之ニ兼テ三色堇菜葉〔附〕浸ヲ多服

セシムベシ

○第二千二百四十一方

的列並底那半錢

白石鹼

甘草膏各三錢

右調付二方為二九

主治尿石ニ宜シ○此方の列並底那硫黃拔爾撒謨ヲ以テ製スル所ノ「ハールラムムル油」ニ類ス

○第二千二百四十二方〔穢歇蘭度〕

榎植核アシンシノスバト未詳

杜松子各半

右調勻為散每服一茶匙日三次

主治尿石ニ宜シ○又烏華烏爾識葉ヲ散ト為シ每服半

錢日三次乃至四次並ニ之ヲ煎用スベシ千八百三方至千八百五方

且穢歇蘭度氏ハ大根子。栗鼈子。蜜等ヲ稱用ス

○第二千二百四十三方〔繆爾別苦〕

阿褥尼私根附

金花草葉各半

○右細剉分六畧注熱湯四盞

主治腎石ニ宜シ小便閉尿石

尿崩ジアラベテス羅ピ此症醫治甚難キガ故ニ其方法モ亦隨テ多シ別路突ト人

ニ據レハ第一吐劑阿芙蓉。硫磺。或ハ礮銅礬ヲ用ヒテ消食

器殊ニ胃ノ生カラ轉變スル丁ヲ要トス○第二硫黃劑。亞

兒加里劑ヲ與ヘ肉食ヲ命シ務メテ消食機及ヒ全身ノ生

力植物生機ニ傾クヲ防クベシ○第三麻酔劑阿芙蓉有カ誘

導法冷水浴蒸氣浴腎部先ヲ施メ腎臟ノ運營亢進セルヲ

遠西方書

抑遏スベシ○其最要藥トスル者ハ即阿芙蓉吐劑硫磺水

附二千四百六十六方 硫磺水 二千四百九十九方 明礬殊ニ明礬乳清

至二千四百八十八方 結列阿速多 二千二百五十五方 拔爾撒謨字露 二千二百五十三方 凝固

七方 牛膽 二千二百五十五方 全身浴湯及ニ蒸氣浴是ナリ○私

葛爾老^カ人^ラノ說ニ據ルニ尿崩ノ近因ハ脊髓ノ畜血ニ係ル

之ヲ防グノ法第一腰椎第一ヨリ第五ニ至ルノ部ニ串線

打膿烙鐵灸或ハ腐蝕藥ヲ施シ以テ腰部ノ反對刺戟法ト

シ第二脊髓ニ灰白水銀膏ヲ塗擦スト云フ

○第二千二百四十四方救祿

吐酒石丁幾

詳未

阿芙蓉液

各二錢

右調勻每服二十五滴裸燕麥粘汁和用日三四次

主治尿崩ニ用ヒテ胃ノ感觸亢進セルヲ制スルニ宜シ

○第二千二百四十五方蟾

吉納蘆謨

二錢 龍腦

半錢 芳香散

一カ 亜鉛華

右調勻為二十九衣石松粉早晚服二九

主治尿崩右股ノ搐掣及ヒ麻痺ヲ兼ナル症ニ蟾^イ名^人此丸

ヲ用ヒテ治セリ但續草丁幾吉納蘆謨丁幾ヲ兼用セシ

△此丸ハ尿崩ノ症ニ用ルルニ宜シ

○第二千二百四十六方救祿

硫磺水

附一錢

右初每服四滴後十二滴桂水或枸橀水一食匙點服日四

次二十二百四十六

主治蜜尿症ニ之ヲ阿芙蓉ト併用シ且肉食ヲ命ス○韋

列名及ヒ列突歇亞倫同ハ肝色硫黃ヲ用フ

○第二千二百四十七方〔秘歌蘭度〕

硫磺水滴十點栗薩水三四早服則ニ次

右調勻每服二食匙日三次乃至四次

○主治尿崩關節依倔篤腫關節屈折ニ宜シ

○第二千二百四十八方〔秘拔爾託〕

硫磺水各三十阿芙蓉丁幾各三十蒸餾水三四桂水一

右調勻每一時半服一食匙

○主治尿崩依倔篤等ニ宜シ

○第二千二百四十九方〔別路突篤〕

礪銅礬各十精製阿芙蓉各十蒲公英越幾斯 遏見托

末各二

右調勻二公為一九早晚服五丸

○第二千二百五十方〔同上〕

醋酸謨爾比捏十五礪銅礬半牛膽凝固 枯失亞

末各四

右調勻為百丸衣石松粉早晚服五粒

主治蜜尿ニ良驗アリ

○第二千二百五十一方 〔秘老私〕

膽礬 五八至 礪砂精 精製一錢 至二錢

右加蒸餾水適宜溶和作藥液全量一弓每服十滴乃至二十滴日服二次至四次

主治蜜尿ニ用ヒテ胃腸病的運營ヲ轉變スルニ効アリ

○第二千二百五十二方 〔忽佃老調魯〕

結列阿速多 十六滴 亞刺毘亞蘊謨 白糖 各三十

右調勻為三十二丸衣桂末隔日早晚服一粒

主治尿崩ニ良驗アリ ○結列阿速多ノ量漸加ヘテ三十

滴ニ至ル ○暴爾栗 地名 ノ謁兒鄰傑魯 人名 蜜尿ヲ治スルニ

結列阿速多ヲ礪銅礬及ヒ醋酸謨爾比捏ト併用メ偉効

ヲ得タリ之ニ由テ尿ノ質ト量ト俱ニ復良シ且全體殊

ニ肚腹ニ夥多ノ瘡ヲ發シ其瘡含ム所ノ液蜂蜜ノ臭氣

アリ小水一日ノ量先ニ四十五比ノ者今ハ減少メ十五

比ニ至ル此ニ於テ結列阿速多ヲ木炭末ト配用シ之ニ

兼テ魯西亞ノ蒸氣浴ヲ施セ爾後速治ス二月後再發

シ大ニ效咳スルモ他治ヲ須タズメ癒セ其實イ表イ

○第二千二百五十三方

拔爾撒謨字露

右每服十滴漸加至三十滴或六十滴日三次

○主治尿管及ハ蜜尿ニ宜シ○涅優滿名人甫メテ切ニ拔爾

撒謨字露ヲ稱用セリ瀦慾衰エ小水過多ニ其質ト味ト

變ノ饑渴甚シク尿管ノ證徵疑似ナキハ速ニ拔爾撒

謨字露ヲ取テ垂的兒或ハ亞爾箇兒溶化酒與スベシ

但亞爾箇兒ハ扁桃油少許ヲ加フル涅優滿氏拔爾撒謨ヲ用フル

量初日ニ一乃後漸ク加ヘテ四乃至此由テ十日

ノ後既ニ尿中糖質ヲ含メテナクメ著シク小便ノ本真

ヲ現ス然レ尚且久シク連進シ房事ヲ戒ス○其後涅子私

名及ハ叔名館爾名都名涅優滿氏ノ經驗ヲ證セリ益叔館爾

都ハ每服三十滴乃至六十滴砂糖若クハ麵粉泥ニ和用

スル一日ニ三次一症尿管ニ肺勞ヲ合併セル者上法ノ

如ク之ヲ施メ小便減シ尿中脂肪ノ沈澱舌上黒苔掌中

熾熱等皆去リテ乃本復セリ拔爾撒謨ハ胃ニ害ヲ致ス

トナカリシト雖終ニ及テ嘔氣ヲ發シ後服ヲ停メサル

ヲ得ザリキ又蜜尿ノ一症アリ他醫叔館爾都ノ稱譽ニ

據リテ拔爾撒謨ヲ用ヒ暫時ニメ尿中ノ糖質全ク去リ

尿量減シ皮膚潤澤シ生力復康セリ○安頓尿管ニ拔爾

撒謨字露ヲ試用ノ殊効アリ初碓銅礬ノ丸劑ヲ與ヘ微

温全身浴ヲ施シ後魯西亞發汗浴ヲ行フ之ニ由テ其症

著シク緩解スト雖然此丸ヲ服メ一二回不安症ヲ發
スルガ故ニ病者後服ヲ欲セズ因テ轉ノ板爾撒謨字露
ヲ用ヒテ治ス全癒ニ至ルマテ他ノ療法ヲ要スルナ
シ

○第二千二百五十四方〔蒲蘭度〕

牛膽凝固者 白石鹼各一錢

右調勻為三十九衣石松粉每服五粒日四次

〔主治〕百侃私担篤名ノ病院ニ於テ蜜尿症ニ前方ヲ與ヘ

兼テ獸肉食ヲ命メ以テ之ヲ治セリ○膽ヲ以テ尿崩ヲ

治スルハ新法ニアラズ穢歇蘭度名ノ及ヒ越乙都同既ニ

之ヲ稱賛セリ但穢歇蘭度ノ用量ハ病者ノ胃ニ堪フル
ヲ度トス設ハ私鳩爾徒及ヒ弄別兒同モ亦牛膽ヲ
用ヒテ之ヲ治セリ

○第二千二百五十六方〔福傑兒〕

燐酸曹達各半錢 煨麻屈涅失亞十五

右調勻為散分八晝每日取一晝分服四次

〔主治〕蜜尿症ニ此散ヲ用ヒテ尿中ノ糖質全ク消セリ然

ル此散ヲ停テ后糖質復生ス

○第二千二百五十七方〔密溫見地好溫爾〕

醋酸謨爾比涅半 桂水一弓溶化加後味

遠田方鼻

卷二十 尿管

二十

廣胖堂

桂舍利別子

右調勻早晚服四滴

主治一歲兒ノ蜜尿ニ之ヲ與ヘ兼テ肉食及ヒ濃肉羹汁

ニ雞卵ヲ加用シ「ゲイル」ナウエ止水鑛泉ヲ飲料トシ後ニ彬後ニ彬野花詳未ヲ加ヘテ微温浴湯ヲ行ヒ爾後腎部ニ

灌水セリ此兒竟ニ斃止然氏其後好温爾人同法ヲ以テ

野夫ノ尿管ヲ救活セリ

○第二千二百五十八方昏的泥列

芫菁丁幾 拔爾撒謨字露各ニ 硃砂加石灰精詳

複方迷迭香軟膏附ニ

右調勻塗擦脊椎又在婦人塗胸脇及腰部

遺精ホルリ子オ羅サ

陰萎イムホ一テンチアヲリス羅マ蘭

此症主治陰部ヲ強壯ナラシメ感觸ノ亢進ヲ制スルヲ旨

トス 鑛酸二百一方 八百二十方 八百廿一方 八百三十一方 八百四十一方 八百五十一方 八百六十一方 八百七十一方 八百八十一方 八百九十一方 八百零一方 八百一十一方 八百二十一

那二百六十一方 或ハ依蘭苔三百七十九方 至ト併用

ノ能ク功ヲ収ム○又龍腦六十二方 至二百六十六方

内服外用シ陰具ノ感觸亢進ヲ轉スルノ殊効アリ之ニ兼

テ冷水ヲ以テ陰部ヲ洗フ一日ニ數次後川水浴及ヒ海水

藥田方鼻

廣胖堂

廣胖堂

廣胖堂

廣胖堂

廣胖堂

廣胖堂

廣胖堂

浴ヲ行フベシ ○陰萎症ハ房勞過度ニ因ル者多シ強壯劑

ヲ要ス即括失亞ニ千二百六十八方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

方七方幾那ニ千二百六十九方格綸僕ニ千二百六十

等極メテ滋養ノ食餌ヲ用フヘシ

○第二千二百五十九方職歌蘭度

収斂亞的兒弓半 越乙土幾那丁幾附一弓半

右調勻每服五十滴乃至八十滴水一小盞點服日三次

主治遺精ニ宜シ ○或ハ單味収斂亞的兒每服十滴乃至

二十滴日三服スルモ可ナリ

○第二千二百六十方過傑栗屈的兒

龍腦 漿粉 白糖各半

右調勻加過兒托舍利別適宜為二十九衣石松粉頓服四粒

日一次

遠西方彙

卷三十一

廣

廣

堂

主治遺尿ヲ治ス之ニ兼テ穢歇蘭度鎮靜水二十六百ニ龍

腦精少許ヲ加ヘテ外用ス

○第二千二百六十一方〔欲爾田斯〕

龍腦一錢半 精製消石一錢半 純精酒石一錢

右調勻為散分五服早午晚一服

主治小便ト共ニ遺精スル者之ニ宜シ但陰部ニ冰冷

法ヲ施ス退シ水漸ク至ハテ小便ハ一分蓋其弱日三六

○第二千二百六十二方〔烏魯設耳〕

燐酸一錢 乾者 龍腦一錢 鏡粉五錢 赭色幾那末一錢 葛

私加栗刺越幾斯宜適

右調勻為二百四十九衣桂末每服十九日三次

主治遺精患者虛衰シ陰部感觸亢進セル者之ニ宜シ胸

内諸器ニ感動ヲ見ハス者ハ隔日ニ服スヘシ乳汁ヲ服

スルヲ禁忌ス十五六

○第二千二百六十三方〔穢歇蘭度〕

格綸僕末半錢 井水十勺 煮耗至六勺 瀝過加後藥五勺

橙皮丁幾錢 橙皮舍利別一錢

右調勻每一時半服一食匙

附考強壯劑ノ中ニ就テ格綸僕ハ花風陰莖勃起及遺

精等ノ最適藥ニノ單ニ之ヲ服メ治スル者屢之アリ

○第二千二百六十四方同上

阿仙藥隋明礬 玉幾那各對 撒兒末爾秩斯各半 括

失亞越發斯錢一 會退

右調勻二 為一九衣桂末早晚服十九以漸加增

主治遺精 殊効アリ ○冷水ヲ桶ニ盛ルテ屢臀尻及ヒ

○陰部ヲ浸スルニ甚佳効アリ

○第二千二百六十五方欲爾田斯

肉幾那末半 葛私加栗刺末括 失亞末各二 撒爾末

走兒秩斯錢一 加耶普的油糖錢三

右調勻為散晨夕服一茶匙末 每服十日三六

主治遺精後ノ弛緩衰弱ヲ復スルニ宜シ其甚

○第二千二百六十六方穢蘇蘭度

麥糖錢二 龍腦錢二

右調和作藥枕子安畢九周圍

主治遺精ニ宜シ其甚

○第二千二百六十七方同上

格綸僕末半 井水十 多煮耗至六多 瀝過加後味

別私黠攝神經丁幾附二 桂丁幾錢一 橙皮舍利別一

○第二千二百六十八方同上

右調勻每一時半服一食匙

○括失亞越幾斯錢半 忽弗滿健胃丁幾附 越乙士幾那

本丁幾附各 別私點攝神經丁幾錢附二

右調勻每服八十滴日三次 封丁幾

○第二千二百六十九方同也 兼味至六五

○藥括失亞越幾斯半 撒兒末爾秩斯刀 桂末錢半

右調勻二瓜為一九衣石松粉每服十九日二三次

主治右三方陰萎三宜 但補益ノ食餌古葡萄酒鋼酒五千

十四方千五十六方半八百一方 香竄藥口ルモン 上水等ヲ併用ス○或

○ハ陰萎假症ノ是小腹壅塞スル所アリテ神經ノ運營

抑壓セラル、ニ因ル此症カル、ス必ト鑛泉ノ甚嘉稱

ス

○第二千二百七十方鑛 越私畜 存斯

橙皮越幾斯 幾那越幾斯 龍涎香錢各一 阿芙蓉二

右調勻二瓜為一九每一時半服五丸乃至十九

主治陰萎ニ用ヒテ有力ノ淫情挑起方トス

○第二千二百七十一方葉爾鳩私

法尼利丁幾 葛刺布呂篤神經丁幾錢附二

右調勻每服二十滴葡萄酒點服日三次

主治葉爾鳩私名 經閉弛緩ニ因ル症之ヲ稱用ス並ニ陰

萎ニ宜シ○然氏法尼利ハ特ニ陰萎症陰部ノ弛緩鈍性

衰弱ニ係ル者ニ的當ニ敏性衰弱ニ在テハ恐ラクハ害
アラシ

○第二千二百七十二方速別倫歇慙 三六

法ニ尼利丁幾一錢 越栗失爾必篤里阿利二錢 桂酒水四附

桂舍利別一

右調勻每四分時乃至半時服一食匙

主治速別倫歇名ハ腸ノ麻痺壞疽性腹滿數發崩漏及

壞疽性子宮焮衝ニ稱賢ス陰萎鈍性衰弱ヲ兼ヌル者之

ニ宜シ

○第二千二百七十三方

纈草一 白糖半 水五 亞爾箇兒三

右調勻為舍利別取半勺乃至一勺飲液和服

主治淫情挑起方トス

○第二千二百七十四方穢歇齋度

光菁丁幾一錢

右每服三滴乃至四滴粘滑液點服日二次

主治其人鈍質ニシテ陰萎ニ罹ル者其他光菁的當ノ症

例スルニ膀胱麻痺ノ如キ之ニ宜シ蓋此法ヲ用フルハ

尤慎重スベシ

○第二千二百七十五方

遠西方藥

卷二十

遺精陰萎

三十四

廣

財

堂

○荒菁粗末

三二八至

甘扁桃油

新絞者

薰燠滾湯蒸氣

飲飽熟八分時瀘過加後藥

○亞刺昆亞蘆謨末

錢二

白罌粟舍利別

五

五

右調勻作乳劑每一時服一食匙臨用宜振盪

主治性素遲鈍陰萎及患アル者之ニ宜シ○又荒菁ヲ要ス

ル諸病并ニ用フベシ

○第二千二百七十六方

菖蒲根

良姜

法尼利

麝香

荒菁末

忽弗滿液

以上五味

丁寧調和加後味

忽弗滿液

橙皮舍利別

宜

右為煉膏每服一小匙

○第二千二百七十七方

菖蒲根

橙皮黃

法尼利

麝香

荒菁末

丁子

油

過泥子油

過設印

的兒

荳菜舍利別

右為煉膏每服一小匙

主治土耳其人精神ヲ振起スルニ此二方

七方ヲ用フ此方十分効力アリ

○第二千二百七十八方

右為煉膏每服一小匙

主治土耳其人精神ヲ振起スルニ此二方

七方ヲ用フ此方十分効力アリ

遠西方藥 卷二十 遺精陰萎 廣月堂

○鏡酒石球末附一 水楊皮四 井水六匕煮耗至四匕

瀝過放冷加後味

刺賢埴兒精三

右三分加浴湯

主治陰萎ニ宜シ又總テ脫衰病後ノ補益ニ好

○第二千二百七十九方穢歌蘭度

蟻精二 忽弗滿液 忽弗滿ホフマシ 拔爾撒謨バルサム 貯答ダタ 各半 薄

荷水 雪耳セキ 匹兒ヒイ 未詳草名 水各三

主治陰萎症之ヲ以テ陰部及ヒ腰部ヲ洗フベシ

吐涎ピチアリ 羅ス ペキ スル フル ト蘭

吐涎ハ承劑瞑眩ニ因ル者最多シ其症ハ瀉劑旃那煉膏 〇

滿那 硫黃劑二千二百八十四方至 沃胃謨二千二百八十五方

方 鑛酸ヲ粘滑液ニ和スル者八千二百八十八方 結列阿速多 百八十二

方 龍腦阿芙蓉鉛糖等ヲ撰用スヘシ 〇外用粘滑収歎ノ含

漱水ニ宜シ即錦葵葉 過兒把根煎ニ乳汁ヲ加ヘ或ハ之ニ

硼砂着クハ石灰水ヲ和スル者撒爾韭垂葉水楊皮及ヒ櫛

皮煎九千二百 格魯林コロシ 加爾基カールキ 二千二百九十一方或ハ格魯

林曹達ソイダ 溶液明礬九千二百三十三方 龍腦九千二百九十四方 ノ溶液的列並油

見証トシテ流涎スルアリ其治解釋劑ニ宜シ或ハ失苟兒

廣月堂

陪苦ノ見証トシテ發スル者ハ壞血病藥ヲ用ヒテ治区或ハ歇乙私的利ニ因ル者アリ阿魏ニ宜シ

○第二千二百八十方婦兒風

硫黃華半 麻屈涅失亞 菖蒲根各二錢 枸椽油糖半錢

右調勻為散每一時服一小茶匙

主治流涎求劑ニ因ル者之ニ宜シ之ニ兼テ撒爾韭亞浸劑ヲ以テ含漱セシム

○第二千二百八十一方弗越埵僅度

甲方

精製硫黃 菖蒲根末 白糖各一

右調勻為散分六服日晡一服

主治吐涎求劑暝眩ニ因ル者ニ宜シ但左ノ密幾私失爾ヲ飲料トシ併用ス

乙方

精製硝酸錢二 井水半面 白糖三

右調和傑乙爾孺謁兒水或攝爾都兒水俱鑛泉 混和適意

飲服

附考原本硝酸半弓ニ作レ氏其量過多ナリ恐ラクハ謬

誤ナラン

○第二千二百八十二方澁澁滿

西

卷二十

三十一

廣

孕攀酒石四 純精酒石半

右調勻為散分十四晷每服一晷砂糖水一盞和服日三次

○第二千二百八十三方穢歌蘭度

含硫加爾幾安質沒尼錢半 達刺侃篤蓮謨漿宜適

右為六十九衣石松粉玻璃壘收貯每服五九日二次

○第二千二百八十四方同上

含硫加爾幾安質沒尼三 井水五匕煮耗至四匕

右每服一小盞日四次

〔主治〕右二方承劑吐涎及ヒ惡液症承劑久服ニ因ル者并

ニ經久樓麻質病腹内壅塞腺腫等ニ宜シ

○第二千二百八十五方葛弗歌魯綿私篤庚七

沃胃謨二 沃胃謨加里三 井水三勺溶化

右調勻初每服半匙經四日後一匙日四次

〔主治〕衆醫未嘗テ此方ノ効ヲ説ク者アラズト雖承劑流

涎ニ用ヒテ屢利アリ

○第二千二百八十六方簿抄狝斯

沃胃謨六 沃胃謨加里十二 蒸餾水六勺溶解加後

味

砂糖舍利別半

右調勻每服一食匙日三次

〔主治〕瘰癧腫及ヒ汞劑流涎ニ宜シ

○第二千二百八十七方〔葛弗。歌魯綿私篤房土〕

沃胃謨六 健質安那越幾斯一錢 亞刺昆亞蘆謨漿適宜

右為二十四丸衣桂末每服三丸日四次

〔主治〕失荷兒陪苦性吐涎及ヒ汞劑吐涎ニ宜シ

○第二千二百八十八方〔遠突土〕

〔主〕硫酸密幾私去爾附一カ至半錢 沙列布淡煎六 覆盆子舍

利別一 右調勻每一時服一二匙

〔主治〕汞劑流涎ニ宜シ汞劑ヲ服シ終テ十二時ヲ經ルノ

后始メテ酸ヲ用フベシ○硫酸密幾私去爾ニ代ヘテ稀

磷酸二錢ヲ用フルモ可ナリ之ニ兼テ玫瑰蜜若クハ槓

楂核汁ニ硼砂ヲ加ヘ或ハ覆盆子絞汁ヲ塗藥トシ若ク

ハ錦葵接骨木花ノ浸劑ニ乳汁ヲ加ヘテ含漱水トス口

中熱ノ痛ム者ハ冷水ヲ最好トス○遠突土名人ハ汞劑流

涎ニ決メ硫黃劑ヲ用ヒズ何者之カ為ニ水銀ノ奇効力

ヲ失フカ故ナリト云フ又幾那ト篤爾綿ト點刺ト及ヒ其他ノ

収瀋藥ヲ用ヒズ何者皆吐涎ニ兼發スル熱ニ嫌忌スベ

キニ由ルト云フ

○第二千二百八十九方〔實的里屈〕

○結列阿速多

錢半石松粉

錢二亞刺昆亞護謨漿

宜適

右調勻為六十九衣石松粉每服三九乃至五九日二三次

〔主治〕承劑流涎宜之

○第二千二百九十方〔婦兒風〕

撒爾韭薑葉水楊皮槲皮各三井水十六至十八

右浸漬濾過供含漱水

〔主治〕承劑流涎宜之○或ハ阿仙藥丁幾若クハ阿芙蓉

丁幾ヲ加フルモ亦可ナリ

○第二千二百九十一方〔歇乙別爾偈〕

格魯林加爾幾錢半井水六勺溶化加後味

清淨蜜

錢六

右為含漱水

〔主治〕同上○或ハ格魯林加爾幾ヲ加増スベシ○達林偈

名人ハ格魯林曹達ヲ稱用ス

○第二千二百九十二方〔篤劉仙〕

格魯林加爾幾錢二井水一勺溶化加後味

再韶燒酒勺一薔薇油滴二

右調勻取二三茶匙加冷水一盞以洗滌口中

○第二千二百九十三方

明礬錢一薔薇水五勺溶化加後味

遠 玉方齋

卷二十

吐涎

丹

廣

丹

堂

玫瑰蜜錢三

右調勻供含漱水

備考明礬末モ亦用フベシ之ヲ用ラルハ指ヲ濕ホメ細

末ヲ摻布シ以テ齒齦及ヒ口中粘液膜ニ塗敷スルナリ

血兒百奧名人ノ論ニ據ルニ之ヲ施ス一三四日ニメ治ス

ト云フ

○第二千二百九十四方〔機屈私〕

龍腦刀一加塔埵兒精適宜薄荷水八勺溶化加後味

明礬錢一玫瑰蜜勺一

右溶和為含漱水

○第二千二百九十五方〔新僅健地花堂〕

的列並油錢三加亞刺昆亞蘊謨末一錢捏作泥加後味

醋錢半薄荷水錢半

右調勻為含漱劑

主治二千二百九十二方ヨリ二千二百九十五方至汞劑

流涎ニ宜シ○傑陳偃私名モ亦上方ニ類セル密幾斯去

爾ヲ含漱劑ニ用ヒ或ハ單味の的列並油ヲ以テ齒齦ニ塗

擦セシム

○第二千二百九十六方〔骨布〕

鹽酸錢三桑椹舍利別錢三

右調勻加撒爾非亞浸劑作佳味酸液供含漱

主治汞劑吐涎ニ宜シ

○第二千二百九十七方

膽礬半乃至半錢

撒爾非亞葉浸六分

浸半溶化加後味

沒藥丁幾

阿仙藥丁幾

地榆丁幾

蜂蜜六錢

右調勻含漱後吐出之

主治汞劑吐涎頑固ノ症ニ宜シ

遠西方彙卷之二十一

遠西方彙卷之二十一

獨乙加幾安頓 著

和蘭 傑斐婆都 譯

侍醫法印伊東瑤川院 貞文仲 重譯

南洋伊東亨健夫 參校

第二

蟲症 ヘルミンチアシス 羅

此症姑息根治ノ二法アリ姑息法ハ蟲ノ所爲ヨリ發スル
所ノ攣痛ヲ鎮靖スルヲ旨トス其方乳汁ヲ以テ奇藥トス

飲服灌腸俱ニ佳ナリ且油性藥或ハ之ニ菲阿私越幾斯ヲ
加フル者五百八方 五百三十二方良効アリ油ハ是蟲ノ吸着ヲ
妨碍シ又善ク之ヲ殺スニ由テナリ其他水銀煎汁飲液灌腸俱ニ
用纈草阿魏亞鉛華及ヒ自餘ノ鎮痙藥ヲ與フベシ繚蟲ハ
亞爾鮮丁幾一食匙ヲ用ヒテ能ク鎮定ス人シ○根治法ハ
其旨トスル所二般アリ一ハ蟲ヲ驅逐シ一ハ其再生ヲ防
グナリ其之ヲ驅逐スルハ殺蟲藥ヲ用フヘシ蓋親驗說ニ
據ルニ弦月ノ時ヲ俟テ與フルヲ好トス即攝綿施那三百
方至二千方及ヒ其製劑攝綿施那亞的兒越幾斯三百
方至三百方及ヒ三百纈草撒拔實兒子附二百
三十方及ヒ二百珊篤尼捏二十方三百纈草撒拔實兒子附二百

至二千三百方胡桃越幾斯二千三百方至二千三百方太
九十九方二千三百三十三方三十方三百方至三百方
祿矣二千三百方五十五方二千三百斯必竭里亞二千三百
煎四十方一百方龍腦五十二方石腦油五十二方列並油三百
三百方五十五方葛別爾殺蟲油附二十七方阿魏綿馬根
二千三百方六十九方錫屑二千三百方至二千三百方
二千三百方七十八方其他峻下劑ヲ配伍セル方並ニ皆好
トス燒蟲及ヒ虻蟲ノ如キハ大抵速ニ功ヲ收ムト雖繚蟲
ニ至テハ劇劑ト雖亦効ヲ得サル者屢之アリ衆醫多般ノ
方法或ハ甚錯雜ノ劑二千三百方五十九方二千三百方七十一方

遠西方齋
卷二十一
蟲症
廣
財
堂

二百三十七方至
二百三十九方
ヲ稱用スル一アリ之ヲ要スルニ皆

猛烈ニノ病者ノ生涯ヲ誤マル者往々之アリ故ニ知ル奇

劑ノ人ヲ害スル繚蟲ヨリモ酷シキヲ况ヤ此ヲ以テ虚弱

病者ニ處スルハ最謹慎ヲ加フヘシ弼僅僣人名二百三十九方

昆歌兒度同上二百三十三方
穢歌蘭度同上二百三十三方
及ビ叔密土同上二百三十三方

劉屈同上二百三十六方
蒲殮設爾同上二百三十七方

ハ方ノ方法ハ最信用スベシ○一ハ蟲ノ再生ヲ防グノ法

厚強ノ肉食ヲ命シ風日朗清ノ地ニ逍遙セシメ強壯劑殊

ニ鑊製劑ヲ處スルニ宜シルモントル水鑊泉ヲ取テ每

朝少許飲服スル一久々ニシテ甚適當ス

蛟蟲アスカリデス羅

虬蟲ルムブリキ羅ス蘭

○第二千二百九十八方邊傑栗屈的鬼

葯刺巴末半刀至 甘汞二八至 白糖十二

右調勻分三服每朝一服三日連用

主治大人蛟蟲ニ宜シ

○第二千二百九十九方穢歌蘭度

太那設黠錢越幾斯 括失匝越幾斯各二 太那設黠

謨油十滴

右調勻二人為一九衣石松粉早晚服十九

遠西方齋
卷二十一
廣
財
堂

主治 蟯蟲ヲ一掃スルニ宜シ但此丸ハ二三月連用スル
ヲ要ス○大人ニ奇効アリ

○第二十三百方〔刺胃私〕

攝綿施那半一錢 滾湯適宜浸漬瀝過取液三勺加後味

橙皮舍利別錢二

右調勻每半時服一食匙

○第二十三百一方〔叔拔爾託〕

攝綿施那錢二 葯刺巴 白糖各一錢

右調勻為散分六服每一時半一服

主治 右二方大人 虬蟲及ヒ蟯蟲ニ宜シ

○第二十三百二方〔穢歌蘭度〕

攝綿施那錢一 葯刺巴半 甘汞二

右調勻為散分三裹早晚服半裹

主治 虬症之ヲ連進スル一三日六歲内外ノ兒應用方ト

ス

○第二十三百三方〔護利私〕

攝綿施那 纈草各一 甘汞二 白糖二

右調勻為散分四裹每服一裹日二次

主治 四歲乃至六歲兒ノ蟲症ニ宜シ

○第二十三百四方〔佛過栗屈的兒〕

攝綿施那一

續草

精製孕蔡酒石各半

藥刺巴四

撒兒末爾秩斯一至二

右調勻為散分十二包每服半包日四次乃至六次

主治六歲乃至八歲兒ノ蟲症ニ宜シ

○第二十三百五方穢歌蘭度

撒兒末爾秩斯二

藥刺巴

攝綿施那各一

右調勻為散分三包早晚服二包

主治大人虬蟲ニ宜シ

○第二十三百六方孤神律松

栗布私名

病院驅蟲散

撒兒末爾秩斯四

攝綿施那

藥刺巴

續草各六

太タ那ナ設セ黠ハ謨モ亞ア的シ兒ニ油ヲ

右調勻為散分六包每服一包日三次

主治虬蟲蟻蟲ノ奇方トス

○第二十三百七方倚過叔密土

攝綿施那

太那設黠謨葉各二

越秩阿布斯密涅刺

列列藥刺巴各一

桂一錢

右細末調和加白糖薔薇水融解者三弓半捏為泥二錢為一錠大人每服一錠日一二次

主治蟻蟲及ヒ虬蟲ニ宜シ

○第二十三百八方篤埤

交
攝綿施那末錢一 白糖適宜 錫錫蟲 廣
右為十二錠早晚服二錠
○主治大人蛇蟲二宜シ

○第二千三百九方福 攝綿施那末錢五 葯刺巴錢一 叔格刺度末錢三 亞刺昆
亞護謨漿宜適

○右為六十錠每服二三個日四次
○主治十歲兒ノ蟲症ニ宜シ

○第二千三百十方弗 攝綿施那末錢二 叔格刺度末錢半 達刺侃篤護謨漿宜適

○右為三十錠每一時半服四錠乃至五錠
○主治蟲症ノ兒特ニ佳味ヲ喜ム者之ニ宜シ

○第二千三百一方歇爾滿 攝綿施那末 葯刺巴末 纈草末各半 海葱蜜或胡
蘿蔔舍利別宜適

右為十二暴律私 每服一個日三四次
○主治大人蛇蟲及レ 蟻蟲ヲ驅除スルニ宜シ

○第二千三百十二方袂結 攝綿施那 纈草各二 滾湯適宜浸漬漉過取液四弓
加後味

廣
月
堂

遠西方彙

卷二十一

蟻蟲 蚊蟲

六

廣

丹

堂

胡桃子越幾斯 忽弗滿液

橙皮丁幾

各半錢

右調勻每一時服一匙布匙臨用宜振盪

主治十歲乃至十二歲兒ノ蟲症ニ宜シ

○第二千三百十三方 羅仙私的印名驅蟲煉膏

撒兒萊爾秧斯名攝綿施那名藥刺巴末 清淨蜜

各一

右調勻頓服

主治大人蟲症ヲ治ス小兒ハ一茶匙ヲ與ヘテ以テ大便

二行ヲ得ルニ宜シ

○第二千三百十四方 私篤魯屈名殺蟲煉膏

攝綿施那末 纈草末 藥刺巴末 芒硝各半錢 海葱

蜜

右調和作煉膏每一時乃至一時半服一茶匙

備考前四味ノ量等分ニ作ルハ適當ナラズ

○第二千三百十五方 私篤魯屈名製殺蟲煉膏

攝綿施那末錢二 纈草末錢一 藥刺巴末錢半 海葱蜜適宜

右作軟煉膏每一時半服一茶匙臨用宜攪和

○第二千三百十六方 設兒列名殺蟲煉膏

攝綿施那錢六 撒爾萊兒秧斯 幾那越幾斯各二錢 桂

舍利別適宜

遠西方膏
右作煉膏每服一茶匙日二三次

○第二千三百十七方 穢歇蘭度殺蟲煉膏

攝綿施那末半錢 纈草末半錢 葯刺巴末一錢 孕鹼酒

石錢二錢 海葱蜜三錢 覆盆子舍利別宜適

右為煉膏每服一茶匙日三四次

○第二千三百十八方 漢名殺蟲煉膏

纈草末 綿馬根末 攝綿施那各三錢 宜適

右作煉膏每一時半一茶匙乃至二茶匙須準小兒年齡消

息

備考初四日間甘黍一瓜ヲ以テ砂糖ニ和シ每晚服セシ

△而ノ上方二劑ヲ服盡スルノ後葯刺巴ノ峻下藥ヲ與
フヘシ○此煉膏ハ前方ノ如ク嘔氣ヲ發スルトナシ○
二千三百十三方ヨリ二千三百十八方至蛇蟲蟻蟲俱ニ
用フベシ

○第二千三百十九方〔漢私篤〕

〔甲方〕

攝綿施那 纈草各三錢 井水適宜浸瀝過取液六弓加

後藥

未熟胡桃子越幾斯 礪砂各一錢半 纈草丁幾一錢 清淨

蜜一弓 海葱蜜半弓

右調勻每一時服一食匙

主治 蛇蟲ニ宜シ ○謨私篤氏此密幾斯去爾ヲ用フルノ後左ノ舐劑ヲ連進スル一三日

(乙方)

攝綿施那末錢三 纈草末 葯刺巴末各一錢 越秩阿布

私密涅刺列錢半 清淨蜜三錢

右調勻為煉膏小兒八歲乃至十四歲者每服一茶匙日三次更幼者每服半茶匙

備考 謨私篤氏蟲症百餘名ヲ治シテ此ニ方偉効アルヲ證セリ但此方弦月時ニ於テ用フルヲ好トス 謨私篤氏醫學韻府ニ

日夕弦月ノ時ハ 緋蟲縮収スト

○第二千三百二十方 訶兒名緋爾

攝綿施那末錢二 綿馬根末錢一 纈草末 大黃末 蘆

薈水製越幾斯 撒爾萊兒秩斯各半錢 甘汞半錢 太那

設黥謨油滴四 太那設黥謨越幾斯適宜

右二丸為一丸衣石松粉早晚服八九乃至十九 主治 二十年来歷驗方六歲兒ノ蟻蟲及ヒ蛇蟲ニ稱用ス

○又大人ニモ用フ但大人ハ其量三倍スヘシ

○第二千三百二十一方 秘別骨布

攝綿施那末的兒越幾斯附八丸

右分爲三服 每朝空心 舍利別和服 二日

○第二千三百二十二方

攝綿施那垂的兒越幾斯附十攝綿施那末適

右二八爲一九衣石松粉早且空心服八粒二日

○第二千三百二十三方阿別爾也歌兒

攝綿施那亞的兒越幾斯錢一攝綿施那末二錢漿粉

錢二

右丁寧搗和加達刺侃篤趨謨漿適宜作六十錠小兒每朝

服四五錠大人服五錠乃至十錠

主治 二千三百二十一方ヨリ二千三百二十三方至虬蟲

蟻蟲ニ宜シ ○攝綿施那垂的兒越幾斯服量大人八八ヨリ十二八至三四歲兒ハ四八ヨリ五八至

○第二千三百二十四方

精製珊篤尼捏トニ乳糖ト

右調勻爲散分三服每一時一服

主治 蟻蟲及ク虬蟲ニ卓越ノ効アリ ○大人ハ四八乃至

六八散ト爲シ數服ニ分テ用フル片ハ暫時ニ驅蟲ノ功

ヲ収ムルニ足ル小兒ハ年齡ニ準シ半八乃至一八ヲ與

乙或ハ之ヲ甘承大黃若クハ葯刺巴ト配用ノ可ナリ珊

篤尼捏ハ刺戟衝動ノ害ナキヲ以テ諸症皆用フベシ病

者瘰癧ヲ兼ヌル者ハ標實製哥喜ヲ甚稱用ス

○第二千三百二十五方

撒拔實爾子末 苗香油糖各半

右調勻為散分六裏每朝服二裏

主治 蟻蟲及ヒ蛇蟲ニ宜シ ○此方宿膠結爾名創ヲテ之

ヲ施用セリ撒拔實爾子ノ量每服半錢トス 按スルニ其

量過多ナリ此子ヲ過服スレハ嘔吐腹痛大瀉脈不整苦

悶及ヒ五神失常等ヲ發スルカ故ニ用ニ臨テ最慎重ス

ヘシ是故ニ小兒ニ在テハ用ヒザルヲ好トス ○撒拔實

爾ハ甚酷厲ナルカ故ニ粘滑藥或ハ蜜ト配用スルヲ佳

トス

○第二千三百二十六方 護歌取秘

撒拔實爾子四 滾湯九ヲ浸飽熟ハ分時瀝過取液ハ

ヲ每服二匙日二次

主治 蟲症ニ宜シ

○第二千三百二十七方 孤刺律秘

撒拔實爾子末二 撒爾萊兒秩斯末一 攝綿施那

麻屈涅失亞各半

右調勻為散分八服日四服

主治 大人蛇蟲ニ用フヘシ

遠西方書

卷三十一

蟻蟲

十一

廣

月

堂

○第二千三百二十八方〔私篤兒〕

胡桃子越幾斯錢二 桂水半勺溶解

右每服四十滴乃至五十滴日四次

主治三四歲兒〔別連柱〕 蚘蟲二宜シ

○第二千三百二十九方〔別連柱〕

胡桃子越幾斯錢二 林檎錢丁幾附三 桂水二勺溶解

加後味

白糖錢三

右調勻每服一匙布匙日三次

○第二千三百三十方〔秘拔爾記〕

胡桃子越幾斯錢二 太那設黥謨油一 過爾託末宜適

右調勻為六十九衣石松粉每一時服二粒乃至五粒

主治右二方蚘蟲二宜シ

○第二千三百三十一方〔弗肝爾埤蒲蘭度〕

太那設黥謨越幾斯錢各一 顯草越幾斯錢各一 加密列水

大黃水製丁幾各三

右調勻每一時服二食匙

主治蟲症二宜シ

○第二千三百三十二方〔遠別倫馱檣〕

太那設黥謨花 亞爾鮮葉各二 熱湯適宜浸漬漉取

遠西方鼻 卷三十一 蟻蟲 蛇蟲 十一 廣肝堂

液六勺溶續草越幾斯一錢又加後味

橙皮丁幾錢半 橙皮舍利別錢六

右調勻每一時服一食匙臨服宜攪和

主治蟲症胃腸衰弱及七瘕瘰癧兼併セル者之ニ宜シ

○第二千三百三十三方〔穉歌蘭度〕

鷓鴣菜錢三 井水八勺煮耗至四勺瀝過

右每一時服一匙

○第二千三百三十四方〔叔拔爾託〕

鷓鴣菜勺半 井水六勺煮瀝取液四勺加後味

清淨蜜勺一

右調勻早晚服二食匙

○第二千三百三十五方〔骨布〕

鷓鴣菜 攝綿施那錢各一 旗那葉錢一 角茴香勺一

右調勻為散分三包每日取一包泡出連服三日

主治二千三百三十三方ヨリ二千三百三十五方至蛇蟲

及口蟻蟲ヲ治ス但此方大人ノ用ニ供ス

○第二千三百三十六方

傑頭弗祿矣皮勺一 井水十二勺煮耗至八勺加後味

砂糖舍利別勺一

右調勻每一時服一二匙

〔主治〕 蟯蟲及ヒ蛇蟲ニ宜シ ○傑頭弗祿矣ハ峻下劑タリ
服量過多ナル片ハ泄瀉血ヲ交ヘ裏急後重。疝痛。嘔吐。大
苦悶等ヲ繼發ス

○第二千三百三十七方〔穢歌蘭度〕

斯必竭里亞根附二錢 井水一斗沸滾濾過

右每一時服半小盞

〔主治〕 大人蛇蟲ニ宜シ

○第二千三百三十八方

斯必竭里亞葉十六錢 甘永四錢至六錢

右調勻為散頓服應用四歲已上小兒

〔主治〕 蛇蟲及ヒ蟯蟲ヲ治ス ○此散二朝連進シ其第二日

ハ午後又一服シ爾後蓖麻油或ハ旃那浸ニ滿那ヲ加ル

瀉藥ヲ與フベシ

○第二千三百三十九方 蒲列刺名人 殺蟲瀉下飲

蓖麻油新絞者 薄荷水各二錢

右調勻每服一食匙日二三回臨服宜振盪

○第二千三百四十方〔穢歌蘭度〕

蓖麻油新製者 雞子黃一錢 石榴根皮煎煎半者五錢 枸櫞

汁二錢

右調勻每半時服一食匙

遠西方藥 卷二十一 蛟蟲 蛇蟲 十口 廣 胖 堂

主治 右二方 蛇蟲 二宜之

○第二千三百四十一方

水銀 清淨者

右內土器加井水二斗用木匙屢攪滾煮一二時紙濾小盞

頻服

主治 羅仙私的印人名及七穢歌蘭度等 蛇蟲及七蛟蟲 二稱

用セリ

○第二千三百四十二方

青蒿葉 六錢至一匁

熱湯適宜浸漬安暖所飽熟八分時濾

過取液六匁乃至八匁加後味

亞麻子油

右調勻供灌腸

○第二千三百四十三方 劉屯肝

阿魏 三錢

右加牛乳五匁搗爛濾過供灌腸

○第二千三百四十四方 過傑栗屈的兒

纈草 攝綿施那 各半

熱湯適宜浸漬飽熟八分時濾

過取液八匁加後味

阿魏 加雞子黃溶解者一錢

右調勻為灌腸二回之料

遠西方彙 卷二十一 蛻蟲 就蟲 十五 廣 胖 堂

主治 二千三百四十二方ヨリ 二千三百四十四方至 蟲症

殊ニ 蛻蟲ヲ 治ス ○又 乳汁ヲ 以テ 蒜ヲ 煮タル 液蒜ニ錢 乳汁六

ヲ 或ハ 的列並油大人半ヲヨリ一ヲ至 小兒一錢ヨリ半ヲ至ト 裸燕麥汁ヲ 合

シ 灌腸スルニ 宜シ

○第二千三百四十五方 [福 屈 篤]

太那設黠謨花 纈草 攝綿施那各二錢

右 細劉調勻 今六畏 早晚取一畏 熱湯ニ 盪浸漬 取液 灌腸

主治 十歲兒ノ 蛻蟲及ヒ 虻蟲ニ 宜シ

○第二千三百四十六方 [蓮 珍]

撒拔實兒列子附二錢 井水十ヲ 煮濾過 取液七ヲ 加後

味

牛乳三

右 調勻 為灌腸 二回之料

主治 蛻蟲ヲ 治ス

○第二千三百四十七方 [歌 庚]

太那設黠謨油一錢 家猪脂半

右 調和 塗擦 肚腹

○第二千三百四十八方 [突 弗 穢 爾 土]

牛膽 胡桃子 越幾斯各四 家猪脂一

以上 三味 微温 捏和 放冷 加後 味

遠五方膏 卷三十一 緋蟲 十六 廣肝堂

太那設黠謨油一

右調和作軟膏塗擦肚腹

主治右二方蛇蟲ヲ治ス

○第二千三百四十九方骨布

甘黍半 蠟膏一 太那設黠謨油九

右調勻作軟膏每晚取少許塗直腸

主治肛門搔痒蟻蟲ニ因ル者之ニ宜シ

緋蟲タニニア羅リ

○第二千三百五十方 越倚傑兒名入 緋蟲治法

芒硝半 井水二匕溶化

右每晚服一小盞

主治緋蟲ヲ治ス○之ニ兼テ越栗失爾茂印失屈篤三十

六滴若クハ收斂垂的兒十滴ヲ取り砂糖水半小盞ニ點

服セシムル一日ニ二次○此ノ如ク數月連用スルヲ要

ス○此法穢歇蘭度モ亦模倣シ簡易ニシテ些モ害ヲ致サ

ザルヲ以テ世間甚稱賛ス○律私篤ハ蟲症ニ食鹽半錢

ヲ取テ空心ニ服サシメ以テ卓越ノ効ヲ得タルヲ證セ

シ緋蟲ヲ治スルニ亦同ク之ヲ用フ

○第二千三百五十一方 越倚傑兒名入 改制緋蟲治法

收斂垂的兒二 芒硝一 綿馬根末二 水六 砂糖

遠五方膏 卷三十一 廣肝堂

舍利別半

○右調勻每一時服一食匙

〔主治〕縲蟲ヲ治ス○王國字漏生ノ歩卒縲蟲ヲ患フ列實

綿篤軍醫ノ名ノ醫鷄兒名上方ヲ處セリ病者越倚傑兒氏ノ

舊法ニ倣ヒテ肉羹汁ヲ喫スルヲ日ニ三次其他飲食ヲ

禁スルヲ三日ノ後上方ヲ服之ニ由テ縲蟲頭ヲ具セ

ル者無量肛門ニ臨ム尚且肉羹汁ヲ喫スルヲ前ノ如ク

而ノ上方ヲ持重セシ后縲蟲ノ切片ヲ下スル夥多終ニ

又頭ヲ具セル縲蟲長ニ噎兒ノ者一條ヲ獲タリ爾後更

ニ上方ヲ用フト雖復下ル者ヲ見ズ後遂ニ蟲症ノ患ヲ

ルヲナシ

○第二千三百五十二方〔護私葛節〕

龍腦錢半 亞刺昆亞護錢一

右加井水半匕搗和食匙抄服

〔主治〕縲蟲ニ宜シ

○第二千三百五十三方〔秘瀉耳根〕

石腦油錢半 阿魏丁幾錢六

右調勻每服四十滴日四次

○第二千三百五十四方〔東布攪〕

再餹的列並油錢一 清淨蜜宜適

右作煉膏臨卧分服二次乃至三次服盡

○第二千三百五十五方 〔茂幾〕

再留的列並油分一 鷄子黃個二 白糖半

右調勻早旦空心頓服

主治繚蟲宜シ○〔茂幾〕名一二日食ヲ断テ而ノ後上方

ヲ服セシム後二三時ニシテ腹痛泄瀉スル片俱ニ繚蟲

ヲ下スヲ通例トス

○第二千三百五十六方 〔鬼弗蘭屈〕

的列並油錢六 垂刺毘亞薤謨末錢二 加密列水分六

以上調勻作乳劑加後味

亞的兒錢二

右調勻早晚服二匙

主治繚蟲宜シ○繚蟲有無ヲ確知セガ爲ニ的列並

油六錢鷄子黃和シ冷水一坵合シ臨卧一時間ニ服

盡セシム

○第二千三百五十七方 〔葛拔魯篤〕名殺蟲油

實百兒油分一 再留的列並油分三

右飽熟三日密封貯

主治同上○此劑味不佳ナリ每服五滴乃至十滴日二三

次但漸ク加ヘテ每服六十滴ニ至ル其味ヲ佳ナラシム

ルニ拘椽舍利別二分ヲ加フ

○第二千三百五十八方（過荷。極過取也）

傑頭弗祿矣皮二

右加井水二匕火酒四勺飽熟六日而後煮耗至一匕早且

空心每半時服二食匙三次二日連進

主治 繚蟲ニ宜シ ○第三日ニ甘汞藥刺巴ノ下劑ヲ與フ

○第二千三百五十九方 彌彌僅僅僣僣名ハ繚蟲治法

綿馬根去皮者 井水一匕煮瀝取液八勺加白糖適宜

令味佳

右每服半小盞一日服盡

主治 繚蟲ヲ驅除スルニ宜シ ○彌彌僅僅僣僣名ハ繚蟲ヲ治ス

ルニ胃腸ヲ補益スルヲ旨トス故ニ口ヲ戒スルノ左ノ

如シ早起冷水半彬彬篤篤ノ容量ヲ飲マシム而シテ每飲暫時口

中ニ含畜セシム此ノ如クスルキハ虛弱ノ胃モ能ク水

ヲ受クルニ堪ヘ其腎臟ニ循行スルモ亦速ナラズメ久

ク腸中ニ住持スルナリ其後大便ヲ促スヘシ即冷水四

分彬彬篤篤乃至半彬篤ヲ以テ灌腸シ極メテ久ク腸中ニ住

持セシム最初灌腸スルノ後或ハ便氣甚迫ルキハ病者

ヲ行步セシメテ以テ容易ニ之ヲ防キ便氣自ラ已シ而

メ卵牌後半時ニ當リテ淡薄ノ朝餐ヲ命シ又適宜ニ緩

歩セシメテ後午時ニ至リテ冷水少許ヲ飲マシメ以テ
 午膳前ニ胃ヲ強壯ニス食餌ハ新菜蔬淡果肉類殊ニ不
 熟ノ乾肉果實白蒸餅及ヒ牛酪ヲ好トス蒜葱ハ一リシ
 グ名等ハ胃ヲ刺戟スル一甚シクメ却テ胃ヲ虚衰セシ
 ムルカ故ニ之ヲ禁ス晚ニ至テ冷水ニ浴セシム但寒冷
 ノ時令ニハ暖室中ニ在テ浴スヘシ浴スルハ肚腹殊
 ニ肝部ヲ壓迫ス彌僅屈ノ説ニ據ルニ絲蟲症ハ通例肝
 臟ニ患アリ或ハ肝部ニ滴浴ヲ施スモ亦佳ナリ夏月ハ
 懸泉浴ヲ好トス其水幅六獨乙謨厚一獨乙謨ニノ十四
 フー上ノ高キヨリ懸クルナリ病者全體ニ之ヲ灌グノ

後其所ニ卧メ以テ更ニ二三密扭篤ノ間肚腹ニ懸水ヲ
 灌之灌水終テ後適宜ニ體ヲ運動シ緩々蒸發氣ヲ進メ
 尋テ晚餐ヲ命ス若絲蟲劇証ヲ發スルハ彌僅屈氏子
 子ラーレマグ子チスムスヲ施メ佳効ヲ得タリ或ハ其
 証ヲ量リテ肚腹ニ寒罨法ヲ行フ少頃アリテ後乃上ノ
 綿馬根煎ヲ用フ此方決メ身體ニ害アル一ナレニ三日
 ヲ經ルノ后絲蟲ノ切片ヲ下シ其久シキ者モ八日乃至
 十四日ニシテ竟ニ全蟲頭ヲ具メ泄下ス或ハ此ニ下劑
 ヲ要スル一アリ○彌僅屈ノ經驗説ニ據レハ絲蟲ハ一
 回其全體ヲ下スト雖復更ニ生ス故ニ之ヲ逐除スル一

三四次ニ及ブ者往々之アリ一人十三回ニ及ブアリ
ト云フ然レ能ク攝養ヲ守ルキハ再生ノ蟲ハ其成育初
生ノ半ニ至ラス蟲ノ下ルモ亦更ニ速ナリ又其後生ズ
ル者ハ益成長セズ之ヲ逐除スルモ亦容易ニ終ニハ
綿馬根ヲ用ヒテ十二時或ハ六時内ニ功ヲ収ムルコト
リ而メ病者ノ體ヲ補益スルコト十分ナレバ繚蟲症全ク
去テ蹤跡ナシ○吾輩憶フニ此症治法極メテ簡易ヲ貴
フ世上用フル所ノ方法多ク腸中繚蟲ヲ生スルノ素
因ヲ滋蔓シ或ハ身體ヲ害スル者屢之アリ故ニ益此病
ノ施療困難ヲ致スナリ

○第二千三百六十方 〔叔叔爾托〕

綿馬新根末 錢三

纈草末 錢一

清淨蜜 錢二

右調勻為舐劑每一時半服一小食匙

〔主治〕繚蟲ヲ治ス○阿朶魯 名ハ早旦空心綿馬根三錢ヲ

取り水五勺乃至六勺ニ和服セシム或ハ舍利別ヲ加ヘ

テ暴律 私ニ作リテ用ヒ後一時ヲ經テ蓖麻油二勺ヲ取

リ四分時毎ニ一食匙肉羹汁ニ和シ服サレハ此方簡易

ナルガ故ニ最稱用スベシ

○第二千三百六十一方 〔百失寄爾〕

綿馬越幾斯 亞的兒製

綿馬根末 錢二

玫瑰昆設兒弗

適

右調勻為十二丸乃至十六丸衣石松粉分二服臨卧服用

主治絲蟲ニ宜シ○日晡申牌半ヲ過ツレバ患者食ヲ断

チ而メ翌朝緩下劑ヲ用フ但蓖麻油ニテ取テ三服ニ

分テ四分時毎ニ用フ服後過見托若クハ菩提樹花泡劑

一小盞ヲ飲服セシムルニ宜シ

○第二千三百六十二方刺胃私

綿馬越幾斯亞的兒製半錢 玫瑰蜜半

右調勻分二服臨卧一服又翌朝空心一服

主治絲蟲ニ宜シ○刺胃私ハ絲蟲ノ大切片ヲ下スヲ見

ルノ後ニアラザレハ決メ綿馬根越幾斯ヲ用ヒズ絲蟲ノ頭

遺ルヲ屢上方ヲ服シ終テ三時乃至四時ヲ過キテ未効

ヲ見ザル片ハ瀉劑ヲ用フ○刺胃私ハ石榴根皮ヲ以テ

綿馬越幾斯ニ優レリトス

○第二千三百六十三方暴優埵篤

錫屑一乃至半 胡蘿蔔舍利別適

右作煉膏早旦頓服

○第二千三百六十四方蒲錄

錫屑錢 藥刺巴末半 蜜適

右作煉膏每二時服

○第二千三百六十五方 〔百弗蘭屈〕

錫屑一錢 健質安那越幾斯二錢 蜜宜適

○右作煉膏每二時半服二食匙臨服宜攪滾

○第二千三百六十六方

錫屑英吉利產 二錢 撒兒末爾秩斯 攝綿施那各一錢

○右調勻為散分十二包早晚一服或每日與瀉藥

主治右諸方縲蟲ヲ治ス

○第二千三百六十七方 〔弗過。祿斯〕

錫屑 綿馬根末各六錢 白糖半

右調勻為散分四十八服每四分時一服

主治縲蟲ヲ治ス○此散ヲ服スルノ後峻下劑ヲ用フ

○第二千三百六十八方 〔穢歇蘭度〕

石榴根皮一弓半 井水十二弓煮耗至八弓濾過

右每四分時服二食匙

主治長節縲蟲ツタリウニアノ試驗方ナリ然レ氏功力甚緩ナ

レ或ハ之ヲ服メ嘔吐ヲ發スル者間アリト雖懼レテ後

服ヲ停ムルト勿レ通例瀉劑ヲ要セズ北方產ノ石榴皮

ハ大率効アラサルガ故ニ南方產ノ者ヲ撰用スベシ

○第二千三百六十九方

石榴新根皮三弓至 井水二斗浸漬十二時後煮耗至

一北濾過取液加白糖適宜味佳為度

右朝起空心每四分時服二三食匙至液服盡

主治 絲蟲ニ宜シ○又或ハ四分時毎ニ本劑ノ四分一若

クハ三分一ヲ服ノ可ナリ○絲蟲下ラザレハ次日再上

方ヲ與フ或ハ初二三日間石榴根皮一弓半ノ煎液ヲ取

リテ朝夕ニ服セシム

○第二十三百七十方 昆歇兒度名人絲蟲治法

石榴根皮一弓 井水一北煮濾過取液八弓加後味

蓖麻油一弓半

右調和

主治 早起空心ニ一小盞ヲ服シ爾後四分時ヲ經テ哥喜

ヲ飲シム但之ト俱ニ他物ヲ食スルヲナシ又四分時ニ

ノ半小盞ヲ用ヒ後尚四分時毎ニ半小盞ヲ服ノ以テ全

量ヲ盡スニ至ル此ニ於テ一時乃至一時半休歇シテ後

蓖麻油一食匙ヲ用ヒ又四分時ノ後一食匙ヲ用フ或ハ

其症已ムト得ザル者ハ又四分時ノ後服メ第三回ニ

至ル爾後四分時ヨリ一時至ニ絲蟲片ヤトナリテ下ル

通例 絲蟲頭ヲ具シ上方ヲ服シテ酩酊狀ノ証ヲ發スル者屢アリ

ト雖其証四分時ノ後乃休ル此方ヲ服スルノ初即吐出

スルキハ但吐スル者稀 功用確實ナラズ又服藥ノ日ハ

病者ヲ戒メ唯消化シ易キ食餌ヲ許スベシ○昆歇兒度ハ繚蟲ヲ驅逐セル後一年間八週乃至十週毎ニ石榴根皮煎ヲ用ヒ又時々苦味藥ヲ用ヒテ飲食ヲ節ス

○第二千三百七十一方〔姪斯蘭狄秘〕

石榴根皮越幾斯亞兒箇爾製六錢

菩提樹花水 枸椽汁各三

達刺侃篤蘆謨適宜

右調勻每四分時服半劑

○第二千三百七十二方〔同上〕

石榴根皮越幾斯亞兒箇爾製六錢

薄荷水 菩提樹花水

枸椽汁各二

右調勻每八分時服本量四分一

主治右二方繚蟲ヲ治ス

○第二千三百七十三方〔弗肝爾姪蒲蘭度〕

藤黃 甘汞各一 藥刺巴 白糖各一

右調勻為散分四裹每二時服一裹

主治繚蟲ヲ驅逐スルニ宜シ

○第二千三百七十四方 歇爾連斯縮度名繚蟲治法

甲方

綿馬根末一錢

右分四服

○此散連服スル一二日トス但早起空心一服晚一淡薄ノ食餌ヲ喫シ後一時ヲ過ギ又一服ス此ノ如ク二日連用シテ第三日ハ旦日空心ニ左ノ散ヲ與フ

乙方

藤黃十二

亞爾鮮鹽半錢至一錢

私答爾幾石鹼

右丁寧調和

○之ヲ服ノ後通例吐瀉二三回宜ク微温湯若クハ淡味泡劑ヲ服ノ緩和スベシ後一時半ヲ經テ蓖麻油一匁ヲ取リ肉羹汁一小盞ニ和服ス又半時ヲ過キテ再同量ヲ服シ而後絛蟲下ラザレハ又一時ノ後蓖麻油ヲ用フ此

ノ如クニシテ蟲未下ラザレハ乳汁冷水等分ニ混和シ蓖麻油三匁ヲ加ヘテ晚ニ方テ灌腸ス○此治法峻効アリ然レ病者ノ體ヲ侵スヨモ亦甚シ

○第二千三百七十五方 烏耳店便其名 絛蟲治法

甲方

綿馬根三 井水三匕煮半時加瑞香皮一匁乃至半錢 或一錢濾取液再加後味

綿馬根末二錢至三錢

右早旦頓服或分爲數服半時間服盡

○之ヲ服ノ後病者外ニ出テ緩歩シ後又一時半乃至二

時ヲ經テ左ノ散ヲ用フ

乙方

甘汞 撒爾萊兒秩斯 各半

右調勻

○若之ヲ服ノ吐出スルキハ再服スベシ服後日晡ニ至

テ縲蟲尚未下ラザレハ又左方ヲ與フ

丙方

大黃末 葯刺巴末 各二

右調勻頓服

○第二千三百七十六方

別屈名 縲蟲治法

甲方

甘汞 一 鹿角霜 安質没尼末 各半

右調勻為散記ハ符

乙方

藤黃 葯刺巴 葛兒儒別葉 鹿角霜 各半 綿馬根

錢一

右調勻為散分三服記B符

○日晡申牌半ニ當リテ甲方一包ヲ取り水一食匙ニ和

服シ又夜間肉羹汁少許ヲ喫スルノ後甘扁桃油二勺ヲ

用フ翌朝乙方一包ヲ取り桃花舍利別一食匙一和用ス

然レ氏縲蟲下ラサレハ乙方第二包ヲ服シ尚効アラザレハ第三包ヲ與フルナリ亦復効ヲ見ザレハ苦味藥ノ煎液ニ瀉利鹽ヲ和シテ灌腸ス悉上欸ノ方法ヲ用ヒ盡シ畢竟効驗アラザレハ一時半内ニ左方ヲ與フヘシ

丙方

葯刺巴末

錢一

瓦刺扶阿刺葉

刀一

右調勻為散分三服

○此方極メテ猛烈ナリ獨壯實ノ人ノミ之ヲ用フルニ

堪フベシ

○第二千三百七十七方

紐歇爾篤名人縲蟲治法

甲方

綿馬根末錢三

右記△符

乙方

甘承

蘓甘沒扭脂各二

藤黃五

右加水仙花昆設兒弗適宜搗和作暴律斯記B符

○病者水一匕半新鮮酪ニ弓乃至三弓白蒸餅ニ弓食鹽少許ノ晚餐ヲ喫セシメ若其日不大便ノ者ハ錦葵花過爾把葉煎ニ食鹽及ヒ阿列襪油ニ弓ヲ和メ灌腸シ翌早

旦甲方一裹ヲ取り綿馬若クハ菩提樹花ノ浸劑六弓ヲ以テ送下ス之ヲ服ノ吐スルキハ嘔氣退クテ再第

二服ヲ進ム爾後一時ヲ經テ乙方ヲ與フ蓋素性過敏ノ病者ハ今テ二服トスベシ却テ強壯ノ効アリ病者ニ命メ早朝時々稀淡ノ綠茶一小盞ヲ喫セシメ且午餐ヲ節メ度ニ過クルトナカラシム然レ乙方モ亦吐スル者ハ二時ノ後瀉利鹽二錢乃至一弓ヲ以テ熱湯ニ溶解シ用フ絛蟲始メテ下ルキハ之ヲ挽ク勿レ又其全體下ラサルノ前廁ヲ出ル勿レ瀉利鹽ヲ服メ瀉ヲ促スヲ要トス若シ絛蟲ノ切片二三ヲ下メ未全體下リ盡サルキハ翌朝再綿馬根末ヲ與フ蓋上ノ峻下暴律和劑ニ代ヘテ瀉利鹽一弓乃至一弓半ヲ用フルニ宜シ○此治法モ亦

甚猛烈ナリ廣節絛蟲ボトリオセバヲ治スルニ殊稱スベシ

○第二千三百七十八方 末質アサヒ人絛蟲治法

甲方

錫粉英吉利産一弓 綿馬根末六錢 攝綿施那末半弓 葯刺巴

脂末 霸王鹽末各一錢 蜜適宜

右調勻作煉膏記△符

乙方

葯刺巴脂末 霸王鹽各二錢 蘇甘没尼末一錢 藤黃

末半 蜜適宜

右調勻作煉膏記B符

○此方ヲ施スノ前數日飲食ヲ節シ殊ニ淡薄ノ羹汁及
ヒ鹽藏物殊ニハリヲ用フルヲ要ス其後甲方ヲ取り一
時毎ニ一茶匙ヲ服メニ日乃至三日間持重シ患者腹内
ニ惡ムベキ蟲証ヲ覺ユルニ至ラバ乃乙方ノ煉膏ヲ取
リ一時毎ニ一茶匙ヲ與ヘ連服シテ絛蟲下ルヲ度トス
但大便利セサルキハ蓖麻油二三匙ヲ飲マシメ或ハ之
ヲ以テ灌腸ス

○ツグ娼倭列爾及孤祿私並ニ人名絛蟲治法

先絛蟲ノ有無ヲ確知センガ爲ニ左ノ乳劑ヲ處ス

○第二千三百七十九方

甲方

○ハ勿擲祭ア垂テ的レ列レ並レ底レ那ナ一錢 雞子黃適宜

右加薄荷水四勺作乳劑食匙抄服

○絛蟲一二節下リテ其蟲尚存スルヲ確徴シ得ルキ

ハ一月間鹽藏醃屬ノ食餌即チハーリング名魚乾肉鹽藏

肉醃屬酪等ヲ用ヒテ而ノ飲酒平生ノ度ヲ過グサシム

而後始メテ治ラ下スベシ左方ヲ用フ

乙方

甘汞十二 牡蠣半

右調勻淡薄晚餐後冷水頓服

○同夜臨卧甘扁桃油或ハ蓖麻油一弓ヲ與フ又一日ヲ隔テ、早旦左ノ散方ヲ服ス

丙方

藤黄廿六

末兒失温名人癩癩散

白芷根末各八

葛カ

○兒儒別葉末一

右調勻為散分三裏泡劑一盞和服

○此散一服ニシテ通例數回ノ吐瀉ヲ得ベシ宜ク葛兒

儒別葉泡劑ヲ用ヒテカメテ之ヲ鎮靜スベシ其後一時

ヲ經テ繚蟲下ラザレハ第二裏ヲ與フ已ムヲ得ザレ

ハ一時ヲ過ギテ又第三裏ヲ與フ

○第二千三百八十方 批篤繆兒列爾名人繚蟲治法

甲方

甘永十二

蝟蛄石一

右調勻為散記△符

乙方

藤黄廿六

續草末野生者

攝綿施那各十

右調勻為散記B符

○先暫粘液解釋劑ヲ與ヘ其後始メテ甲方ヲ取テ晚酉牌半ニ當リテ之ヲ用ヒ成牌半臨卧甘扁桃油一弓半ヲ

與フ之ニ由テ夜間瀉ヲ得翌朝卯牌半ニ至リテ乙方ノ
 第一裏ヲ取り泡劑一盞ヲ以テ送下スレハ大抵吐瀉ス
 又辰牌半ニ當リテ其第二裏ヲ用フレハ嘔吐ヲ發スル
 一ナクメ大便利シ隨テ條蟲ヲ下スベシ第三裏ヲ要ス
 ルハ甚罕ナリ拙篤繆兒列爾名ハ此治法ヲ施スノ後危
 險症ヲ發スル者唯一人ヲ見シノミト云フ蓋此療法ヲ
 行フノ間ハ都テ葍中ニ在ルヲ要ス

○哮喘度名ハ人條蟲治法

病者毎朝猛烈哥喜一盞ニ砂糖ヲ和服シ辰牌半ニ當リ
 テ「サルデルレ」或ハ「ハーリングスラ」俱ニ下ノ名ニ油及

ヒ多量ノ葱ヲ加ヘテ食シ午牌ニ至リ牛肉ニ沙蘿蔔ノ
 煮タル者ヲ加ヘ日晡ハ沙蘿蔔ノ新擦屑ニ油及ヒ醋ヲ
 加ヘテ喫ス此ノ如ク三日間食ヲ節シ而シテ第四日ノ朝
 空心左ノ丸ヲ用フ

○第二千三百八十一方

（甲方）

巴豆油滴 加白石鹼末半錢丁寧搗和再加後味

藥刺巴水製越幾斯藥刺巴末 綿馬越幾斯亞的兒製

甘草越幾斯適宜

右為六十九衣桂末每半時或一時服四丸乃至五丸

○甲方ニ兼テ同日左ノ湯液ヲ用フ

乙方

鷓鴣菜 綿馬根去皮各半 常水一斗煮濾過取液八斗

右時々服半小盞

○歌戾名 絛蟲治法

甘汞藥刺巴及ヒ纈草虫的兒油ヲ調和シ下劑ト為シテ先之ヲ與ヘ後一日ヲ隔テ左ノ丸ヲ用フ

○第二千三百八十二方ニ日開身ノ痛ム時ノ藥四日ノ時

甲方

牛膽乾者 勿搗祭虫的列並底那 阿魏各二錢 蘆薈越

幾斯水製

右調勻二斗為一九每服十九乃至十二丸日二次或每日得軟便一行為度

○此丸ヲ服メ二三日ヲ過グレハ通例已ニ絛蟲二三節ヲ下スナリ此丸ヲ連服スル下十四日ノ後ハ之ニ代ヘテ左ノ舐劑ヲ與フル絛蟲此丸ニ慣ガ故ナリ

乙方

錫粉半 攝綿施那二錢 亞爾鮮越幾斯一錢 蜜適宜

右作煉膏每服一茶匙或二茶匙日二次

○此方ヲ持重スル下八日ノ後方中ニ綿馬根半ヲ加

へ又八日連服、後再海慈蜜一弓ヲ加フ之ニ由テ繚蟲
數節下ルヲ通例トス然レ氏若其効驗ヲ見ザル氏ハ左ノ
水劑ヲ與フ

丙方

過松巴兒篤油

附半錢

亞的兒

適宜溶化爲度

右朝暮服二十滴乃至二十五滴

○後治法ハ苦味越幾斯劑及ヒ鍊劑ニ宜シ○再繚蟲ハ
成長ヲ防クガ爲ニ時々上ノ舐劑一二茶匙ヲ服スルヲ
要トス○此法ハ他ノ方法ニ異ニシテ身體ヲ侵スル少
ナキガ故ニ殊ニ稱賛スベシ

○穢歇蘭度繚蟲緩治法

○第二千三百八十三方

甲方

亞爾鮮丁幾

阿魏丁幾

各半

右調勻每服六十滴日三次

主治 一婦人體質嬌柔繚蟲ヲ患フ穢歇蘭度上ノ水劑ヲ

用ヒ之ニ兼テ次ノ舐劑及ヒ蓖麻油ヲ與ヘ八日內ニ全

治シテ後害アルナシ又其食ヲ減節シ酷厲ノ鹽藏物

ヲ撰用ス

乙方

錫粉一錢 綿馬根末二錢 玫瑰昆設兒弗適宜
右作煉膏每服一茶匙日三次但每服兼用蓖麻油一匙

○穢歌蘭度繚蟲劇治法

繚蟲ノ有無明ラカナラザルキハ本治法ヲ處スルノ前
二三日間毎日瘡瘡木脂及ヒ苦扁桃水ヲ用フ之ニ由テ
繚蟲ノ切片泄下スルナリ爾後數日ハ一リングザルデ
ルレ並ニ魚名 其他酷厲鹽味ノ食餌ヲ用ヒ晚ニ唯淡味羹
汁ヲ與フ此ニ於テ乃本治ヲ施スヘシ臨卧綿馬根末一
錢或ハ其症ヲ量リテ二錢ヲ服シ若クハ之ニ代ヘテ綿
馬亞的兒油三十滴或ハ綿馬亞的兒越幾斯ヲ以テ散トシ服ヒ翌朝

冷水一盞ヲ飲ミ又左ノ散ヲ與フ

○第二千三百八十四方

藤黃六分 甘汞 菲阿私越幾斯各一分 麻偃涅失亞半分

右調勻

四分時ヲ經ルノ後蓖麻油半ヲ用ヒ乳汁ヲ以テ灌腸
シ肚腹ニ石腦油ヲ塗擦ス之ヲ施スノ後繚蟲下ラザレ
ハ一時ノ後再上法ヲ施スヘシ尚未効ヲ見ス瀉モ亦十
分ナラザル者ハ同法ヲ行フ一第三田ニ至ル繚蟲直腸
外ニ懸ルキハ強テ之ヲ牽断スル一勿レ小心シテ之ヲ
木片ニ卷キ以テ縮收スル一ナカラシム温暖乳汁ヲ桶

ニ盛り罾ヲ其中ニ浸メ漸徐ニ縲蟲ヲ牽キ出スナリ

○屋兒弗私歌憎名入縲蟲治法

○第二千三百八十五方

(甲方)

綿馬根末三錢 菩提樹花水五

右調勻早旦空心半服又四分時後半服臨用宜振盪其後半時ヲ經テ後方ヲ服ス

(乙方)

白肝油三

右

四分時毎ニ一食匙ヲ取リ枸櫞汁ヲ加ヘテ以テ之ヲ服盡シ一時ヲ俟テ後又瀉利鹽ヲ用フル一左方ノ如シ

(丙方)

精製瀉利鹽三至四 井水半匕溶解

右毎四分時或半時服一麥酒盞宜視瀉下之劇易消息之ヲ服スレバ通例五六時内ニ縲蟲片ヤトナリテ下ル

○渴ヲ消スルニ猛烈哥喜ニ砂糖舍利別多量ヲ加ヘテ飲服シ午饌前ハ單穀粉製ノ物若クハ白蒸餅少許ヲ與

フ食ヲ断ツハ更ニ妙トス午饌ハ「ハーリングスラ」飯下

名ノニ多ク葱ヲ加ヘ晚餐ハ消化シ易キ羹汁ヲ用ス○若

施治ノ際嘔吐ヲ發スル片ハ絛蟲下ルナシ直ニ後服ヲ停ムベシ

○名 娼烏留屈名 絛蟲治法

娼烏留屈名 絛蟲ヲ治スルハ断食驅蟲後調ノ三法アリ
第一断食ヲ以テ蟲ヲ衰弱セシメ其驅逐ヲ容易ナラシムルナリ故ニ三四日間唯白蒸餅少許及ヒ脂肪乏シキ肉羹汁ヲ用フル一日ニ三次ノ外總テ飲食ヲ断テ而シテ時々次ノ解釋劑ヲ服セシム

○第二千三百八十六方

甲方

此方一會變て取ル時時大ニ取ルハテマケル

蒲公英根

失格列乙根各一

井水適宜煮八分時濾

過取液ハ弓加後味

精製礪砂錢一

失格列乙加大黃舍利別各一

右調勻每一時服ニ食匙

○之ニ兼テ過兒托葉ハ歇爾拔ハ私屈ハ謨花及ヒ麗春花ノ浸劑ヲ以テ灌腸スル一數次又驅蟲法ヲ施スノ前夜ハ脂肪乏シキ肉羹汁ヲ用ヒ酉牌ヨリ戌牌半至半時毎ニ亞麻仁煎ニ乳汁ヲ加ヘテ灌腸ス

第二 絛蟲ヲ驅除スルハ左方ニ宜シ

乙方

遠西方書 卷之三 綿馬根末 三

綿馬根末 二錢至半

右分三裹

丙方

蓖麻油 二至三

右

丁方

藤黃 甘汞 各六 白糖 一

右調勻為散分三裹

戊方

橙皮黃 半

右供咀嚼

○朝卯牌ニ當リテ灌腸シ。又四分時ヲ過キテ又灌腸ス且脂肪多キ羹汁ヲ與フ。卯牌半ニ至リテ蓖麻油ニ食匙ヲ用ヒ。又四分時ノ後綿馬散第一裹ヲ服シ。辰牌ニ至リテ再蓖麻油ニ食匙ヲ與ヘ。又四分時ヲ經テ綿馬散第二裹ヲ用フ此ノ如ク尚之ヲ連用ノ蓖麻油及ヒ綿馬散ヲ服盡スルニ至ル飲料ハ茶ヲ用フ午牌ニ至リテ峻下劑
丙方第一裹ヲ用ヒ之ニ兼テ肚腹ニ緩和蒸漏法ヲ施ス此ニ於テ絛蟲下ラザルキハ一時乃至一時半ノ後下劑第二裹ヲ與フ此ノ如クニシテ亦復効ヲ見ス且焮衝証モ

遠西方書 卷之三 綿馬根末 三

亦發スル一ナケレハ申牌後四分時ニ當リテ下劑第三
 裏ヲ半分シテ服セシメ同時ニ灌腸ヲ行フ通例下劑第
 三裏ヲ服スルノ後半時一時乃至一時半ニシテ繚蟲ヲ
 下スナリ

第三後療法ハ腸ノ衝動ヲ制スルヲ以テ旨トス即沙列
 布淡煎ニ砂糖ヲ和用シ。緩和蒸漏法及ヒ灌腸ヲ施シ或
 ハ其症ヲ量リテ肚腹ニ放蟻ス而シテ飲酒及ヒ其他衝動
 起熱ノ飲食ヲ禁ス○此法満月時ニ於テ施ス片ハ殊ニ
 効驗アルベシ

蒲廉設爾名繚蟲治法

○第二千三百八十七方

甲方

攝綿施那或ク太那設粗黠半續草末二葯刺巴末

半錢至二孕礬酒石一海葱蜜適

右作煉膏每服一茶匙日二次乃至三次

○此煉膏ヲ服盡スル後早晚葛別爾名殺蟲油二茶

匙ヲ服シ服後冷水少許ヲ追飲之ヲ持重スル一十日

乃至十二日ニノ大抵殺蟲油二弓半ヲ盡スニ至ル尋テ

左ノ瀉藥ヲ與フ

乙方

透西方書 卷二十一 繚蟲 三十九 廣 肝 堂

藥刺巴末一錢 旃那末半錢 孕礬酒石一錢
右調勻為散分三服每半時一服以至得瀉

○次日再葛別爾篤殺蟲油見上ヲ服スルヲ始ム其量繚
蟲強弱ニ準メ或ハ四ヲ乃至五ヲ或ハ七八ヲ服盡メ
甫メテ蟲ヲ驅除スルヲ得ル者間アリト雖大抵最初
ニ於テ下ルナリ但通例蟲體既ニ消化スルカ故ニ尿中
ニ之ヲ看得スルヲ容易ナラズ蒲廉設爾ハ久ク葛別
爾篤油ヲ持重ノ以テ繚蟲再生ノ素因ヲ防止スト云フ
若此油病者ニ不佳ノ感動ヲ起メ頭眩ヲ發スルハ服
量ヲ減少シ大小便ノ時ニ方リテ灼クガ如キ知覺アル

者ハ油質乳劑ヲ與フ味ノ不佳ナルハ桂皮或ハ丁子ヲ
咀嚼スルヲ最妙トス此法ヲ施スノ際ハ粗製穀粉ノ食
餌果實莢ヲ被ル者多脂ノ物等ヲ禁忌ス○後調法ヲ行
フニ要セズ然レ病者素質粘液ヲ釀シ蟲ヲ生ジ易キ
者ハ左ノ水藥ヲ投スベシ

丙方

奧私的爾名複方蘆薈丁幾一錢 林檎酸銹丁幾附越栗
失爾必篤里阿利論也一產

右每服十滴乃至三十滴冷水點服日三四次

○第二千三百八十八方

叔密土名繚蟲治法

甲方

額草六錢

旗那二錢

滾湯適宜浸漬瀉取液六寸融解精

製芒硝三錢太那設點油糖二錢再加後味

滿那舍利別子

右調和每一時服二食匙

○之ヲ服スル一早旦空心ヨリ始メテ晚酉牌半ニ至ル

服後猛烈哥喜ニ砂糖或ハ舍利別ヲ和シ用之午餐ハ淡

薄穀粉製ノ食餌及ヒ白子ヲ孕メルハ一リンダ魚名二三

個ヲ喫セシメ晚戌牌ニ方リテハ一リンダ下名飯

馬鈴薯ヲニ煮ザル乾肉ヲ細剉セル者葱及ヒ油ニ多ク加ヘス

砂糖ヲ加ヘ食セシム飲料ハ砂糖水ニ宜シ此ニ由テ既ニ絲蟲ノ數節下ルナリ○翌朝卯牌ヨリ始メテ左ノ丸藥ヲ與フ

乙方

精製阿魏四十

藤黃五

大黃

葯刺巴各半

吐根

實芟答利斯各

金硫黃各二

甘汞半

太那設點

油 過泥子油各四 蘆根流動越幾斯四十

右調勻二ハ爲一丸衣石松粉玻瓈壘收貯每半時取六丸

以砂糖舍利別一茶匙送下

○上方ヲ服スルノ間ヲ窺ヒ時々猛烈哥喜ニ多量ノ砂

遠西方藥

糖或ハ砂糖舍利別ヲ加ヘテ飲服ス上ノ丸藥一服ヲ用
ヒテ後四分時ヲ過ギ蓖麻油一匙ヲ用フ日午肉羹汁少
許ヲ與フ午後未牌若クハ未牌半ヲ過クレハ縲蟲ヲ下
スヲ通例トス若効アラザレハ再蓖麻油二三食匙ヲ與
ヘ以テ瀉ヲ得ルニ至ル○又次日其功用確實ナラシメ
レガ為ニ再上ノ丸藥少許ヲ服セシムベシ爾後數日縲
蟲再生ヲ防止スルニ「ハーリングス」^出前及ヒ細剉沙
蘿蔔ニ酢及ヒ多量砂糖ヲ加ヘテ屢與フ又八日毎ニ前
ノ丸ヲ一二服スルヲ佳トス後調法ハ補益ノ食餌^{肉羹汁雞}
^{子黃葡萄}酒及ヒ苦味劑ニ宜シ

○縲蟲ノ有無ヲ確證セザレハ先左法ヲ施スヘシ病者
毎日午饌前ハ穀粉製琶布ノ外食餌ヲ禁ジ日晡「ハーリ
ングス」^ラヲ喫シ飲料ニ砂糖水ヲ用フルヲ數日ノ後
早且空心ニ左ノ散藥ヲ與フ

丙方

甘汞 藤黃 ^{各六} 攝綿施那 ^半 葯刺巴 ^{十五} 太那
設黠謨油糖 ^{一錢}

右調勻為散

○午饌ハ穀粉汁晚餐ハ「ハーリングス」^ラ飲料砂糖水
ニ宜シ爾後大便數行アリテ大抵縲蟲二三節ヲ下スベ

シ但其全體下ル者ハ罕ナリ
○此治法ヲ禁忌スル所ノ者ハ老衰。妊娠。經事ノ前後。燼衝症。勞瘵。欬血。痔血等是ナリ○極メテ幼少ノ見ハ其年齡ニ準ノ少量ヲ用フヘシ○其他此法確効ヲ奏シ危險ノ懼ナク既ニ良効ヲ得タル者往々尠シトセズ

○第二千三百八十九方 儒朴チユボイ乙イ私ス名ス 絛蟲治法

甲方

錫屑英吉利一カ 丹寧精製 藤黃各半 加耶普カヤプ的油糖五

右調勻為散分二裏卯牌服第一裏四分時後服第二裏

主治長節絛蟲ソリウマヲ驅除スルニ宜シ○此治法

預食餌及ヒ攝生ヲ節スルヲ要セザルガ故ニ他法ニ優レリ○此散ヲ服スル毎ニ猛烈ノ哥喜コキ加カ砂サ糖トヲ二小盞ヲ飲マシム嘔氣アル者ハ過設アセ印イン亞ア的ル兒ル二三滴ヲ用フ大抵一時許ノ後疝様ノ疼痛ヲ發シ隨テ絛蟲下降ス其蟲多クハ全體ヲ具シテ下ルナリ其痛増進スル片ハ直ニ猛烈哥喜ヲ飲ムニ宜シ儒朴乙私氏此法ヲ施スニ既ニ十人皆偉効ヲ得タリ

乙方

葛刺布カサ呂篤ロト錢丁ニ幾ニ 越乙イ土ト强壯丁ト幾ト

右調勻每一時半四子滴赤葡萄酒點服

主治 條蟲驅除セル後腸中粘液膜ノ生カヲ振起スルニ
宜シ

○第二千三百九十方 陽

黑酸化銅ニハ 白糖半

右調勻為散分ニ服日三服乃至四服

主治 刺堙末設屑名人條蟲ニ之ヲ稱用シ屢奇驗ヲ得タリ

此酸化銅ハ能ク條蟲ヲ殺スカ故ニ之ヲ用フレバ既ニ

其半消化セル蟲節自ラ下リ隨テ其証消除ス○此方人

體ヲ損害スルヲナキガ故ニ他ノ劇劑ノ嫌忌スヘキ症

ニモ亦用ヒテ佳ナリ此ヲ以テ條蟲ノ首尾下ラサルノ

憂アルヲナシ○又刺堙末設屑ハ醋酸化銅丁幾附
與フ

○第二千三百九十一方 爛傑

甘永ニ 藥刺巴錢 桂皮半 綿馬越幾斯亞的兒

白糖半 達刺侃適 蘆薈宜

右作百六十錠衣甘草末早晚服五錠乃至八錠

主治 小兒條蟲ニ宜シ

表西文彙卷之二十一

○第二十三頁九十九

主治小兒驚風宜之

取雞白六十子雞心甘草末早煎雞五錢八至八錢

正白餅一升 煎陳胆黃雞雞葉

此古方也 隨陳四錢 蘇艾 乾濕強雞漢

○第二十三頁九十九

與之 煎陳四錢 蘇艾 乾濕強雞漢

○第二十三頁九十九 ○天懷法市婦風丸 諸鎮心散 下

