

遠西方彙

廿

○卷之二十五

第五

削瘦病

虛衰病

勞

×

e 12

F 9
工-22

499.2
E^m-2
No. 1394
RE 12



伊東瑤川院譯

九條

遠西方彙

原本紀元一
千八百五十
二年鏤行

廣胖堂藏



富士川文庫
3266

遠西方彙卷之二十五

獨乙 加。幾。安頓 著

和蘭 傑。斐。婆。都 譯

侍醫法印伊東瑤川院 貞文仲 重譯

南洋伊東 亨健夫 參校

第五 削瘦病

虛衰病 モルビ。ヘク。チカ。羅。オ。イト。ピ。ツ。テン。デ。シ。キ。テン。蘭。

此症治法第一營養ヲ障碍スル所ノ病毒ヲ探索ノ相當ノ
治テ處スルヲ要ス第二滋養強壯藥ヲ以テ補給機ヲ進ム

ベシ第三百五十六方乃至三百八十二方ニ宜シ第三合併
症及ヒ傍症ノ有無ニ着眼スベシ

○神經勞ルタベス。子ノ治ハ大率上ニ論說スル所ノ慢性熱

三卷之ト同一般ナリ○脊髓勞タベス。トルハ畧遺精ノ治ニ

類スニ卷之但其症劇度ニ進ム者ハ全治ヲ望ムベカラズ猛

烈ノ方法ヲ處スレハ病状益危險ニ進ミ竟ニ死ニ抵ルガ

故ニ寧煩苛ノ証ヲ除キテ生カラ補益スルヲ優レリトス

脊髓ノ刺衝症アラバ蟻鉞芥子泥等ヲ施スヘシ大小便失

禁。麻痺等ハ其法ニ從テ治ヲ下スヘシ生カラ補益スルニ

尋常滋養劑ヲ用フルノ外格綸僕。幾那。錢。香竈藥浴。慄汗塗

擦藥等ヲ施スベシ脊髓勞ノ名醫嚙私的印名人モ上ノ諸品

ヲ用ヒテ病寛解スト云フ○鑛毒勞タルベス。メ初期ニ在テ

ハ鉛毒疝ノ方法千五百卅三方至ヲ用フト雖若麻痺ヲ兼

ヌル者ハ亞兒尼加龍腦番木鱉私的列幾尼捏等ノ如キ衝

動劑ニ宜シ千九十一方ヨリ千四百○小兒削瘦病ノ治ハ

後ニ論載スル所ノ腺病ニ同シ○老衰病セニリスノ如

キハ其實病ト謂フベカラス是體質新陳交代ノ機減衰ス

ルニ由ルナリ○余ハ唯滋養ノ方法ヲ左ニ揭示ス

○第二千六百九十二方福佃篤

搢去仁 細剉内大理石臼注水一北半以木杵搗爛

煮葱取液一匕加白糖八勺以蛋白一個清淨之取幾
那越幾斯二錢赤葡萄酒六勺桂丁幾二錢溶解加前
液冷定令凝結

右每服四分之一日四服

主治諸削瘦病脫液病フロフア等之ヲ用ヒテ補益劑トス

○第二千六百九十三方 泰垣隣

橙葉六錢 注滾湯一匕飽熟一日濾過加沙列布末一錢

煮熟為傑列乙稠加後味

上好列印酒 橙花舍利別各半

右調勻茶匙酌飲

主治神經衰弱及削瘦甚キ症ニ宜シ

○第二千六百九十四方 補益散

葛加阿焙炙末勺 米粉 白糖各二 桂皮末半

右調勻為散取一二兩乃至三兩水或乳汁三四小盞煮飲

服

○第二千六百九十五方

西國米末一錢 水八勺煮徐徐攪和不住手煮熟至傑列

乙稠加白糖適宜味佳為度

右名西國米傑列乙

主治右二方削瘦病ニ用ヒテ滋養強壯スルニ宜シ

○第二千六百九十六方〔設倚迷渴爾〕

沙列布末錢一 加冷水適宜不住手搗和為粥後徐徐加

牛乳煮沸者一北半暫時沸滾放冷再加後味

桂水單方 橙皮舍利別各一

右調勻每一時服半小盞

主治削瘦病胃腸衰弱甚シク或ハ感觸過敏ナルガ為ニ有力ノ滋養劑ヲ用フルニ堪ヘザル者此方ニ宜シ

○第二千六百九十四方〔埋〕

沙列布末錢二 加冷水二北不住手徐徐搗爛隨攪和隨

煮沸耗至一北暫時放冷加後味

上好列印酒三 桂丁錢三 枸櫞皮油糖三

右調勻時時服一茶匙

○第二千六百九十八方 沙列布製叔格刺度

叔格刺度北五 沙列布末二

右調勻內鑊鍋煮作錠如法

○第二千六百九十九方 亞兒魯製叔格刺度

叔格刺度北五 亞兒魯北五

右調勻內鑊鍋煮作錠如法

○第二千七百方 百暴律私人名 依蘭苔製叔格刺度

依蘭苔四 注滾湯二北溶炭酸剝篤亞斯二錢者浸漬

三時去其液用冷水丁寧洗淨曝乾為細末取此末三

勺加後味

葛加阿焙內熱鍊器末

白糖各一北半

沙列布末三錢

右丁寧調勻為叔格刺度

○第二千七百一方 幾那製叔格刺度

葛加阿實末微焙

幾那末三

白糖八

板爾撒謨字

露一錢

右調勻作叔格刺度錠如法

主治 二千六百九十七方ヨリ二千七百一方至削瘦病ニ

用ヒテ滋養強壯ノ効アリ

勞瘵 モルヒプチシキ羅テ

總テ勞ヲ治スルハ其誘因ヲ防グノ後生カラ保持強壯ナ

ラシムルヲ以テ第一義トシ乳養法及ヒ酥養法見慢性ヲ

最トス次テ大麥粉及ヒ亞兒魯根當參照慢沙列布熱條

三百六鹿角菜三百六十四方至依蘭苔三百六十九方至

三百七魚膠三百七十七方鹿角三百七十九方至

又削瘦病ニ稱用スル所ノ方法二千六百九十二方此ニ宜シ

○第二所謂治勞瘵ヲ用ヒテ潰瘍ヲ治スルヲ要トシ結核

肺勞ハ實艾答利斯二千七百五方至歇爾蘭獨留謨二千七

百廿一方 格魯林加爾基二千七百石灰水四勺至和勻日

服沃胃謨加里 二千七百卅九方 孕礬酒石 二千七百四十一方至二千七百四十一

十三 沒藥 二千七百七十七方 過私巴兒篤油 二千七百七十八方 結列阿速多 二千七百四十九方

七百四十九方 肝油 二千七百七十一方 鉛糖 二千七百五十三方至二千七百五十八方

等ヲ用之但病性熾衝ニ傾ク者ト弛緩ニ傾ク者トヲ量リ上ノ諸藥ノ中ニ就テ或ハ清涼降鎮ノ者或ハ衝動刺戟ノ者ヲ撰用スヘシ○第三熱ヲ治スルヲ旨トス熱性熾衝ヲ帶フル者ハ清涼ニ宜シ即乳劑ニ小量消石。礪砂。鑛酸ヲ和用シ或ハ刺絡及ヒ蟻鍼ヲ佳トス熱腸胃汚物ヲ兼スルノ性アル者ハ解釋劑或ハ吐下ニ宜シ神經性ノ者ハ滋養強壯劑ヲ用ヒ且鎮痙劑麻醉劑即小量吐根。老利兒結爾斯水。

菲阿私越幾斯或ハ阿芙蓉ヲ最好トス○第四合併症ニ注

意スベシ朝汗 撒爾非亞池劑冷服。鑛酸。落葉松耳。下利。鷺口

瘡。眠瘡等是ナリ○外治ハ打膿法ニ宜シ○各種ノ勞瘵ヲ

治スルニ患器ノ性ニ着眼スルヲ緊要トス適宜ノ瀉血或

全身或ハ局處大ニ此ニ關係ス之ニ由テ或ハ病勢ノ増進ヲ防遏

シ得ルヲアリ放血後吐劑ヲ與ヘテ奇効ヲ得ル者屢之ヲ

腎勞膀胱勞ハ其瘵學証ト小便異常ニ注意スベシ之ヲ

制スルハ油質粘滑ノ乳劑ニ老利兒結爾斯水。菲阿私越幾

斯。或ハ阿芙蓉ヲ和用シ或ハ吐根浸或ハ鎮痙蒸瀉法及ヒ

菴法ニ宜シ肝勞脾勞ハ甘汞及ヒ水銀塗法ヲ更換シ用テ

ルヲ要ス若夫各種ノ勞ヲ治スルノ方法ハ此小冊子ニ枚
舉スベカラス○肺粘液勞ノ條ニ列舉スル所ノ方ノ參照
スベシ千七百六十三方至
千七百八十六方

○第二千七百二方〔福爾第〕

鱗酸曹達弓半 實芟荅利斯浸液六弓
浸實芟荅利私溶
葉半錢取液

化加後味

櫻實舍利別弓一

右調勻每一時服一食匙

〔主治〕肺臟刺衝症勞瘵ノ素因ヲ拔ム者ニ宜シ

○第二千七百三方〔私刺律私〕

鱗酸曹達弓半 鹿角菜煎六弓
煮鹿角菜
二錢取之 溶化加後味

扁桃舍利別弓半

○右調勻每一時服一食匙

〔主治〕肺瘍咳血アル者及ヒ腹内壅塞ニ宜シ

○第二千七百四方〔同上〕

碎米薺 山薺菜 連錢草 結兒歇爾〔附各生
草半弓〕

已上四味細剉注荅麻林度乳清煮沸者八弓浸漬絞

濾加後味

橙花舍利別錢二

右每朝服半小蓋一次乃至二次

主治結核勞ノ初起之ニ宜シ

○第二千七百五方過私繆斯

硫酸規尼捏錢各一 沒藥末錢各一 寶菱荅利斯 金硫黃十各

五 蒲公英越幾斯宜適

右為六十九衣石松粉每服一九乳汁送下日四服

主治肺勞初起之ニ宜シ過私繆斯氏此方ヲ用ヒテ佳驗

ヲ得ル十三人ト云フ

○第二千七百六方同上

硫酸規尼捏二 寶菱荅利斯十五 金硫黃十 甘草

膏適宜

右為六十九衣石松粉每服一九日四服

主治肺勞初起之ニ宜シ

○第二千七百七方羣的爾

寶菱荅利斯四分一 硫酸規尼捏半一 苗

香六 乳糖一

右調勻為散分十二包每服一包日三四服

主治肺勞ニ宜シ痰豁利シ難キ者ハ小量結兒蔑私密

刺列ヲ與フ

○第二千七百八方穢歌蘭度

寶菱荅利私一 精製消石 護謨散附各

右調勻為散分八裹早晚服一裹

○主治肺勞胸痛アリテ胸内一局處灼クガ如キラ覺エ乾
欬數脈等ヲ見ハス時預防方ニ宜シ先毎四週乃至六週
ニ少量瀉血シ身心ヲ安靜シ清凉食餌及ヒ消燉劑ヲ用
フベシ其他乳養法。酥養法ヲ施シ攝爾都兒水ニ乳汁ヲ
和シ與ヘ弗刺涅兒ノ襯衣。毛布ノ田易。上膊打膿等ヲ行
フベシ

○第二千七百九方侃私恒篤

實芟荅利斯刀 滾湯適宜浸瀝過取液三勺加後果
吐酒石二 實亞格地温勺

右調勻每服一匙乃至二匙日三服

○主治肺ノ結核勞初起之ニ宜シ

○第二千七百十方

實芟荅利斯五 滾湯適宜浸瀝過取液十錢加後味

亞刺畏亞護謨二 白糖半 舍電阿芙蓉液六

右調勻為舐劑每一時半服一茶匙

○主治肺勞ニ用ヒテ姑息ノ良方タリ

○第一千七百十一方湏優倫

實芟荅利斯半 滾湯適宜浸瀝過取液四勺加後味

過兒托舍利別半

右調勻食匙酌飲一日服盡

主治肺勞氣管ノ粘液膜疾患ニ係ル者ニ宜シ其症未肺ノ實體ニ損スル所アラズ而ノ病者尚能ク實芟荅利斯ヲ感受スルハ上方ニ由テ速ニ治ス用訣胸上刺痛咯血下利等アルトナク欬嗽モ又勞セスノ發スル時ヲ俟ツベシ食料ハ肉羹汁乳汁白蒸餅及ヒ粘滑液ヲ好トス此ニ於テ日日實芟荅利斯半錢ノ浸劑ヲ連進シ以テ脈不齊且徐遲トナリ渴咽喉乾燥頭旋及ヒ鼻根ニ一種ノ痛ヲ覺エ殊ニ惡心嘔吐ヲ發スルニ至リテ後服ヲ停止病者總テ藥ヲ休メ極メテ口ヲ戒シ蓐中ニ靜卧セシム

今々實芟荅利斯ノ効驗全ク見ハレテ衰弱惡心ヲ起シ

將三卒倒セシトシ脈至甚遲ニノ不齊トナル濕優滿氏

此症狀六日八日或ハ九日連續ス

此ハ如キ極メテ危險ノ証ヲ發シ大抵欬嗽去平本

病全治ス○或ハ實芟荅利斯ノ効盡テ忽欬嗽再發スル

者アリ此症須ヲ再本法ヲ用フベシ○實芟荅利斯ノ

瞑眩或ハ二三日ノ後即發スル者アリ或ハ五日乃至八

日ノ後發スル者アリ此期ヲ過キテ瞑眩セザル者ハ病

者實芟荅利スヲ感受セサルニ由ルガ故ニ後服ヲ停止

ベシ○失便羣地實芟荅利斯ノ治驗アリ用訣實芟荅

利斯一錢ヲ浸ノ液六ヲ取リ十二時間ニ服盡セシメ
二三日ノ後加増ノ一錢半ニ至リ不安及ヒ嘔吐ヲ發シ
脈至減ノ一密拵篤間三十動ニ至ルト云フ○安頓氏嘗
テ此法ヲ以テ二人ヲ療セリ一人ハ三十有餘歳ノ男子
殆驚ベキノ効ヲ得タリ然レニ三週ヲ經テ後再短促乾
欬ヲ發メ病者復我治ヲ受クルトテ欲セズノ賣藥兒ノ
藥ヲ服メ畧一年ノ後全然肺勞ノ諸症備エ死ス○今一
人ハ小女ナリ此者毫モ効驗ヲ見ズ

○第二千七百十二方

木炭示半 實芟益 塔利斯一

右調勻為散分九服蠟紙包裹每服一裹日三服
主治勞瘵ニ宜シ○木炭ノ量漸加ヘテ日服四月ニ至ル

○第二千七百十三方

雙蘭菊越幾斯半 白糖半

右調勻為散分十二服日四服
主治勞瘵ノ初起氣管ノ裏面刺衝証ヲ帶フル者ニ殊効

○第二千七百十四方

歇爾蘭獨留謨子 乳糖各二

右調勻為散分六服每一時半一服

○第二千七百十五方葛達爾

實芟荅利斯一 歇爾蘭獨留謨子一 白糖半

右調勻為散分八服每一時半一服

○第二千七百十六方同上

硫酸規尼捏一 歇爾蘭獨留謨子未 乳糖各半

右調勻為散分八服每一時半一服

主治二千七百十四方ヨリ一千七百十六方至皆肺勞ニ

非凡ノ効アリ○殊ニ歇爾蘭獨留謨ハ感冒治ヲ懈リ將

ニ肺勞ニ轉セントスル者ニ甚適當ス然再肺ノ粘液勞

及ニ結核勞ニモ亦一般之ヲ用ス何者肺臟ニ感觸ヲ鈍

挫シテ効嗽ヲ減シ分利機ヲ復スルニ由テナリ其他内

外ノ化膿症例スルニ肝臟及ヒ腰筋膿瘍等ニ歇爾蘭獨

留謨ヲ稱賛区又瘰癧喘及ヒ百日効ニ偉効アリ

○第二千七百十七方同上

硫黃華 歇爾蘭獨留謨子 乳糖各半

右調勻為散分十二裹每一時服一裹

○第二千七百十八方同上

硫黃乳 歇爾蘭獨留謨子 乳糖各半

右調勻為散分八服每一時半一服

主治右二方肺勞慢性皮膚疹殊ニ疥癬抑壓ノ後ニ發スル

者三宜之之并兼于吐酒石軟膏之塗擦スベシ

○第二千七百十九方佛陽

歇爾蘭獨留謨子末 乳糖各半 沒藥錢二 肝色硫黃

○第二千七百二十方葛遠

右研和為細末每服一二刀尖日四服

○第二千七百二十方葛遠

沒藥水製越幾斯 歇爾蘭獨留謨子末 乳糖各半

右調勻為散分十二服每一時一服

主治右二方弛緩性肺癆宜シ又粘液肺勞ニ最好トス

○第二千七百三十三方同前

歇爾蘭獨留謨細末錢二 亞刺昆亞護謨末錢一

右調勻加井水適宜為九百二十粒每一時服二十粒

主治粘液勞肺勞及吐膿勞ニ宜シ

○第二千七百三十二方飛勞名地呂的

歇爾蘭獨留謨子末錢三 葛爾儒別越幾斯錢二 精製礪

○藥砂錢一

右調勻二公為一九衣石松粉玻璃壘収貯每服六九乃至

八九日四服

主治慢性刺衝效及ヒ將ニ肺勞ニ轉セントスル者之ニ

宜シ

○第二千七百二十三方葛速屑爾

肝色硫黃半錢 歇爾蘭獨留謨子末二錢 葛爾儒別越幾

斯適

右為九十九內玻璃壘固封貯每一時服十八九六六五至

○第二千七百二十四方同上

歇爾蘭獨留謨子細末二錢 過兒托舍利別一錢

右調勻為舐膏每一時服二食匙

○第二千七百二十五方同上

歇爾蘭獨留謨子半錢 滾湯適宜浸蓋閉飽熟四分時絞

過瀝取液六勺放冷加後味

過兒托舍利別一錢

右調勻每半時服二食匙

○第二千七百二十六方同上

歇爾蘭獨留謨子一錢 滾湯適宜浸瀝取液六勺加後味

牛乳沸滾者 白糖一錢

右調勻小盞酌飲一日服盡

○主治二千七百二十三方ヨリ二千七百二十六方至粘液

肺勞及吐膿肺勞三宜シ

○第二千七百二十七方同上

歇爾蘭獨留謨子半錢 實菱荅利斯半錢 滾湯適宜浸

蓋閉飽熟四分時瀝過取液六勺加後味藥者

○亞刺昆亞護謨漿 蜜去沫各半勺

右調勻每一時服一食匙

○第二千七百二十八方同上 依蘭苔勺 滾湯一北浸漬飽熟少頃加井水二北煮耗

至一北瀝過取液加後味

歇爾蘭獨留謨子浸以一勺浸製者六勺 過爾托舍利別勺

○右調勻每一時服半小盞

○第二千七百二十九方同上

赭色幾那半勺 井水適宜煮耗至八勺投歇爾蘭獨留謨

子半勺瀝過取液加後味

○橙皮舍利別勺

○右調勻每一時服一食匙

○主治二千七百二十七方ヨリ二千七百二十九方至皆粘

液肺勞及肺瘍宜シ

○第二千七百三十方速別倫歇檜

赭色幾那半勺 以稀硫酸半錢井水適宜煮耗至六勺投

歇爾蘭獨留謨子三錢瀝過放冷加後味

○蜀羊泉越幾斯錢 拔爾撒謨字露舍利別勺

○右調勻每一時服一食匙

主治肺癆盜汗アル者ニ宜シ

○第二千七百三十一方列茂爾

歇爾蘭獨留讚子錢 熱湯適宜浸漬蓋閉飽熟四分時

絞濾取液六勺放冷加後味

硃砂加過泥子精錢 砂糖舍利別勺

右調勻每半時服一二食匙

主治粘液肺勞及肺癆ニ宜シ

○第二千七百三十二方篤碌私

依蘭苔傑列乙北半 白糖勺 亞刺毘亞護謨勺

右調勻內磁器上文火煨乾為散每服一茶匙日一二服

主治肺勞ニ殊効ノ姑息方トス先冷乳ヲ以テ此散ヲ融

解シ後徐徐ニ温乳ヲ加シ三百六十九方乃至三百七十

八方ヲ參照スベシ

○第二千七百三十三方屋兒祇勃的兒純別弗蘭屈

鹿角菜半 井水十六勺煮濾過取液八勺加後味

白糖勺 亞刺毘亞護謨勺 伊里斯弗魯連底那根末

○第

右上文火煨乾搗碎為散加亞兒魯粉三勺名複方鹿角菜

傑列乙散

主治勞瘵家ノ咳嗽及下利又小兒疳勞ニ宜シ○此散

一二茶匙ヲ取り冷水少許ヲ加ヘ捏シテ泥トナシ熱湯
一二盞ヲ注テ浸出ス○三百六十四方乃至三百六十八
方ヲ参照スベシ

○第二千七百三十四方

瀝舌草半多至 井水ニ北煮耗至北強力絞濾取液
五分三服早且空心一服日午一服晡時一服宜加微温

○藥 牛乳服

主治慢性效及ヒ諸種ノ肺勞殊ニ結核肺勞ニ宜シ○私
篤蘭斯幾名結典滿 同別弗歇索 同袂栗幾 同栗匹屈 同
最此方ヲ稱賛ス

○第二千七百三十五方 麻健耆

麻健耆青酸精十五滴 傑列格麻歇控刺西浸
淋過見托舍利別一

右調勻毎一時半服一食匙臨用宜振盪

主治肺瘍ニ宜シ○麻健耆青酸アシチ。ヒドロシ 八律殺

屈名ノ青酸ニ亜兒箇爾六分ヲ加ヘテ稀釋スル者ナリ

○第二千七百三十六方 越乙

乙突涅爾名青酸精 蒸餾水錢

右調勻毎一時半服八滴

主治肺瘍及ヒ粘液肺勞ニ宜シ○越乙名此水劑ヲ用ヒ

テ經久ノ症二人ヲ治セリ

○第二千七百三十七方 利昆倔(屋列兒)

甘扁桃去皮 常水宜適 作乳劑濾過取液一ヲ溶後味

○亞密倔達利涅十七

右每一時乃至一時半服十滴乃至十五滴

主治青酸劑適當ノ諸症皆之ニ宜シ。○亞密倔達利涅ハ

油ヲ去リタル苦扁桃ノ亞兒箇爾製越幾斯ナリ之ヲ扁

桃蛋白質ノ溶液ニキテ 或ハ扁桃乳ト合スレハ其實分

離ノ苦扁桃油。青酸砂糖及ヒ他ノ一二物トナシ利昆倔

名屋列兒同 說ニ從ハ亞密倔達利涅十七ハ分離

少青酸一ハ亞的兒性苦扁桃油ハハ得ルト云フ上方

ヲ以テ苦扁桃水ニ可ニ比較スレハ青酸及ヒ苦扁桃油

ヲ含ム一更ニ多シ是故ニ二氏ハ上方ヲ以テ醫藥ニ供

スルニ好トシ每服十滴乃至十五滴ヲ度トス是苦扁桃

水老利兒結爾斯水服量ノ半減ナリ蓋患篤結名及ヒ朴

球屈同ノ試驗ニ擬レハ上方十滴乃至十五滴ハ苦扁桃

水及ヒ老利兒結爾斯水ノ効ヲ充ツルニ足ラズトシ漸ク

其量ヲ増シテ一時毎ニ二茶匙ニ至ルト雖曾テ其害ア

ルヲ見ズト云フ

○第二千七百三十八方 臧歇蘭度

格魯林加爾幾錢一 老利兒結爾斯水錢二 蒸餾水半

右調勻每服四十滴乃至五十滴日四服

主治肺癆ニ宜シ

○第二千七百三十九方 鄧壘結

沃胃謨加里刀半 煨麻屈涅失並刀半 精製甘草膏錢半

右調勻為六十九衣石松粉每服三九日四服

主治結核肺癆ニ宜シ ○一患者十五歲肺癆ニ罹リ削瘦

熱ヲ帶ヒ羸瘦已ニ下肢ニ及ブ者鄧壘結氏此丸ヲ連進

メ全癒セリ其削瘦熱漸漸減退シ咯痰惡臭去リ欬嗽減

少シ食嗜及ヒ生カ増進シ六週ニメ平治ス爾後一平ニ

シテ未病ハ所アラズ其他鄧壘結氏同症五人ヲ治シ皆
良効ヲ得タリ然レ沃胃謨加里ハ每服二ハ多キモ三ハ
日ニ四服ヲ好トス更ニ多量ニ至レハ肺臟ヲ刺戟スル
一甚シ

○第二千七百四十方 預結

沃胃謨加里刀半 茴香水刀五 苦扁桃水錢二 亞麻仁汁

上好砂糖錢一

右調勻每服一食匙日四服

主治肺癆ニ宜シ

○第二千七百四十一方 恩麥傑滿

肝色硫黃半錢 薄荷水二 過炭酸刺篤亞斯半 葛兒
儒別越幾斯半錢 菩提樹炭末三錢 白罌粟舍利別二
右溶和每二時服一食匙臨服宜振盪
主治同上

○第二千七百四十二方同上

肝色硫黃二 葛兒儒別越幾斯二 菩提樹炭細末一錢半
拔爾撒謨字露一

右調勻為百丸衣伊里斯弗魯連底那末內玻璃壘密閉貯
每服十粒日三服

主治咽喉勞氣管勞肺勞宜シ

○第二千七百四十三方鹽別爾秘

木炭末 肝色硫黃各一錢半 菲阿私越幾斯 沒藥越幾
斯水製各半錢 麻兒羅歇越幾斯二錢

右調勻二公為一丸衣石松粉每一時乃至一時半服五丸
乃至六丸

主治肺勞惡臭ノ痰ヲ吐咯スル者之ニ宜シ○肺ノ觸動
甚シキ者ハ苦果劑並ニ拔爾撒謨劑ヲ用フヘカラズ此

方ヲ服スル毎ニ後必温乳一小盞ヲ飲ムベシ
○第二千七百四十四方透結

菩提樹炭末一 礶砂加過泥子精二錢 蜜去沫 海葱

西... 卷... 勞... 廣... 堂

蜜一

右調勻為煉膏每一時服一茶匙

主治吐膿勞口中惡臭ノ者ニ宜シ

○第二千七百四十五方〔秘器列印〕

葛加阿實焙炙者 內熱錢白為細末加後味〔調〕

白糖末一 木炭末半 拔爾撒謨字露半

右調勻二錢為一錠每服一錠日二三服至一部半服五日

主治肺勞溶崩ノ時期口中惡臭ノ者之宜シ

○第二千七百四十六方〔秘器列印〕

過麻刺根一 井水適宜煮過取液八分放冷加後味

甘海鹽精錢 拔爾撒謨字露舍利別

右調勻每一時服一食匙臨服宜振盪

主治溶崩肺勞ニ宜シ

○第二千七百四十七方 忽弗滿名沒藥糖

沒藥半 白糖一

右調勻為散每服一茶匙日二三次

主治弛緩性肺癆ニ宜シ蓋胸內刺痛逼迫或劇熱ヲ發

スレハ直下ニ後服ヲ停ムベシ沒藥ハ粘液肺勞ニ用フ

ルモ其効肺癆ニ於ケルカ如シ

○第二千七百四十八方〔見越索斯〕

過私巴兒篤油半

右每服三滴五滴十滴或十二滴日二服乃至三服

主治肺勞宜殊ニ粘液ニ因スル者ハ其効他藥ニ優
レリ勞瘵潰瘍ニ係ル者モ又此方同効アリ肺管粘液膜
ノ裏面潰瘍ヲ生シ膿アル者モ亦之ニ宜シ唯嫩衝様ノ
症ハ之ヲ禁ス索斯氏是ヲ與フルニ香竈ノ水液及ヒ包
攝藥ノ舍利別ヲ以テス而シテ其症ニ準シ每服甘消石精
一二滴ヲ加用ス又過私巴兒篤油ヲ用フルニ由テ本症
復治セシノミナラス之ヲ服メ他ノ疾患モ亦緩解シ終
身健全ヲ得シ者往往之アルヲ證セリ○往古ノ醫過私

巴兒篤油ヲ殊稱セシ者ハ殊ニ蓮珍名人麥田同版儷同過
傑栗屈的兒同等是ナリ

○第二千七百四十九方屋兒弗

結列阿窠篤錢一 過兒托根末 甘草膏各一錢半 蒸餾水

適

右二匹爲一九衣石松粉早晚服二九

主治結核肺勞及ヒ咽喉勞ニ宜シ別魯列印地名ノ病院ニ
於テ結核肺勞ヲ患ル者十一人アリ屋兒弗氏ノ試驗說
ニ據ルニ八人此方ヲ服メ脈動進ニ削瘦熱増上シ痰ノ
質及ヒ其量變化増減アルヲタテ略痰モ亦易キヲ得

遠西方書 卷之七 勞瘵 廣肝堂

其中四人ハ却テ呼吸困難ヲ致セリ云々是故ニ屋見
弗氏ノ經驗ニ據レハ結列阿宰篤ハ姑息法ニ用テカ
ラス○一人氣管勞ニ罹リ十九日間ニ結列阿宰篤百三
十ハヲ服シ寸効ヲ見ザリシナリ

○第二千七百五十方 (壹別爾私)

結列阿宰篤 一滴二滴 至四滴 亞刺昆亞蘆謨漿 一 沙列布

煎或白罌粟乳 五 白糖 一錢 按

右調勻每一時服一食匙

主治勞瘵溶崩汗及下利ヲ兼ナル症ニ奇特ノ効アリ

○又噎別爾私氏結列阿宰篤氣ヲ吸引セシムルノ法

リ其法廣口玻璃曇凡ニ弓ヲ容ル、者ヲ取リ木棉ヲ以テ
其三分一ニ填テ結列阿宰篤十滴其上ニ點シ玻璃曇口
ヲ以テ病者ノ口ニ接シテ吸引セシム但之ヲ吸引スル
ノ時刻ノ長短ハ適意ニ斟酌セリ隔日結列阿宰篤四滴
乃至六滴ヲ加フ或ハ亞的兒二三滴ヲ和用スル下アリ
○弗儼 名ニ 從フニ結列阿宰篤ハ粘液勞ニ偉効アリテ
結核勞ニ効少ク尋常ノ肺勞ニハ寸効ナシト云フ○醫
屑便 名ハ 結列阿宰篤ヲ丸トシ肺勞十人ニ試用スル
下毎日四滴乃至十六滴而メ曾テ其害ヲ見ズ其中三人
ハ卓越ノ効ヲ得又一人靴ヲ作ルヲ業トス勞瘵ノ素質

アリテ肺癆衝ヲ患フルノ后當時勞瘵ノ末期ニ及テ結列阿宰篤丸ヲ連用スルヲ五月ニメ全癒セリ唯階子ヲ昇ル時僅ニ呼吸短促ヲ覺エルノミ此病者全治スル至七十九日間服スル所ノ結列阿宰篤ノ量六百三滴ナリ

○思德魯名ハ肺癆膿囊カ胸膿エマヒニ結列阿宰篤ヲ用フルヲ毎日一滴乃至三滴ニシテ治セリ其說ニ據ルニ結列阿宰篤ヲ用ヒテ善良ノ運機ヲ挑起スルハ咯痰血縷ヲ帶フルヲ以テ運機ノ挑起セルヲ知ルベシ膿ヲ分泌スルノ機止ムト云フ然レ其運機已ニ挑起スルハ繼テ全身ノ脈管刺衝機亢進スルガ故ニ弱齡殊

ニ感觸靈敏ノ人並ニ肺臟結核勞等ハ禁戒スベシ○屋兒ル弗フ別ベ爾ル私ス同ト弗フ儼レ同ト醫イ屑セ便ベ僣レ同ト思德魯ト同ト革カノ勞瘵治法ハ大ニ之ニ及ス而メ皆實驗ニ據ルナリ○醫イ兒ル中チ名ナハ參爾水ヲ以テ結列阿宰篤ニ優レリトス

○第二千七百五十一方法屑

肝油四

右用量大人每服一食匙日二服小兒一茶匙乃至半食匙

主治結核肺勞ニ宜シ○速ニ上ノ服量ヲ一倍スベシ之ヲ用ヒテ殊効ヲ得ル者三十四人

○第二千七百五十二方潑爾茂突

鹿角油 一
勞瘵 廿四
廣 肝 堂

右朝暮取一錢乃至一錢半塗擦

主治肺勞奇藥ト稱ス○但之ヲ施スルハ病者ヲノ十八度乃至二十度ノ温室ニ居ラシムルヲ要トス潑爾茂突ハ鹿角油氣ヲ吸啜セシムルヲ最良トス

○第二千七百五十三方職賦蘭度

鉛糖ハ 阿芙蓉水製越幾斯ハ 白糖ハ

右調勻為散分八裏朝暮服一裏

主治肺瘍ニ宜シ○肺勞ノ初期ニ在テハ粘糖効アルヨリ却テ害アルト多シ末期ニ及テ結核既ニ軟化セルノ

後或ハ粘液勞ノ肺瘍ニ轉スルノ時ニ方テハ大ニ嘉稱ス○安頓鉛糖ヲ用ヒテ二三ノ症ニ試驗セシニ欬嗽更ニ乾欬トナリテ連綿頻發シ熱勢増上シ食嗜モ亦減ス此ニ由テ之ヲ觀レハ鉛糖ハ必害アリ

○第二千七百五十四方刺胃私

玉鉛糖ハ 阿芙蓉越幾斯ハ 甘草末 甘草越幾

右丁寧調和ノ為六十九衣石松粉每服一九二九或三九

百二三服

主治肺勞結核軟化スル者ニ宜シ又溶崩汗及ヒ下利ニ

遠西方書 卷五 勞瘵 廣 肺 堂

最好トス

○第二千七百五十五方 〔藏屈秘〕

鉛糖 精製阿芙蓉 各六 結列阿窠篤 一 甘草膏 二

右調勻為六十九衣甘草末每服五九日三服

〔主治〕肺勞溶崩ノ時期ニ宜シ

○第二千七百五十六方 〔栗篤擲爾〕

鉛糖 三 甘草膏 一 實芟荅利私浸 實芟荅利私葉半錢以蒸餾水

浸出者 五弓溶解加後味

白罌粟舍利別

右調勻每一時半乃至二時服一食匙臨用宜振盪

〔主治〕肺勞脈管觸動甚シキ者ニ宜シ

○第二千七百五十七方 噉刺滿 名 治勞丁幾

鉛糖 二 上好醋一弓溶解加後味

格碌屈私末兒秩斯 半一錢 再餹燒酒 薔薇水 三

右調勻每服二十滴乃至三十滴

〔主治〕此方往昔多ク肺勞ノ治驗アリ○然氏鉛糖ハ硫酸

ト親和ノ沈澱シ唯鍍ノ醋ニ溶解セル液ヲ餘スカ故ニ

此方舎密則ニ反ス○噉刺滿ノ丁幾劑ハ臧爾列兒 名ノ

丁幾ト同ク肺瘍ニ用フルヨリ却テ肺ノ粘液勞ニ用ヒ

テ善ク適當ス

○第二千七百五十八方 勞瘵 碱爾列兒名 治勞丁幾

十鉛糖同 格碌屈私未 兒秩斯各二 再韶燒酒二 溶解

右每服十五滴乃至三十滴

○主治同上

○第二千七百五十九方 發粟私

麗春花浸一 菲阿私越幾斯 失鳩荅越幾

斯各十八 民埕列利精一 白糖適宜味

右調勻每服一食匙或一食匙餘日四服

○主治 噎別爾私 亦此方之 肺勞之 鎮靜劑一 稱用

○此其症瘰癧病若久皮膚運營ノ妨碍ニ因ル者ハ最好

○第二千七百六十方 設備室

過兒托舍利別 實亞格地温 海葱蜜各半 礶砂加

過泥子精半錢至

右調勻每一時服一匙

○主治 肺勞之 瘰癧之 效及二 百日之 效ニ 好

○第二千七百六十一方 堙霸安

落葉松耳乾者 枸椽油糖半

右調勻為散分八服每晚一服

遠西... 勞瘵... 廣... 肝... 堂

○第二千七百六十二方〔雷布〕

落葉松耳 乳糖 桂油糖各三

右調勻為散分九包早午晚服一包

〔主治〕右二方勞瘵溶崩汗宜又依偃篤病發汗過度ヲ

治ス

○第二千七百六十三方〔戒屈秘〕

落葉松耳 枯礬各三 乳糖半

右調勻為散分六裹每晚服一裹

〔主治〕勞瘵盜汗宜

○第二千七百六十四方

落葉松耳末六分至十八分 阿芙蓉越幾斯二分至三分 蘄謨散

〔附二〕

右調勻為散分六包每晚或午後及日晡服一包

〔主治〕溶崩盜汗兼テ下利セントスル症單味落葉松耳ヲ

用フル其症却テ増進スル者此方ニ宜シ

○第二千七百六十五方〔垢霸安〕

槓植核汁一 雞子黃二 玫瑰蜜三

右調勻每服一茶匙日四服乃至六服

〔主治〕勞瘵ノ鶩口瘡咽喉乾燥及ヒ嘶嘔ニ宜シ

○第二千七百六十六方〔壹別爾秘〕

遠西藥書
卷五
勞瘵
廣
肺
堂

醋酸或硫酸莫爾比捏二實芟荅利私越幾斯十六
右調勻為六丸衣石松粉晚服一九

○第二千七百六十三方同上

莫爾比捏一至三金硫黃四實芟荅利私越幾斯二十

右調勻加亞刺昆亞蘆謨漿為六丸衣石松粉晚服一九

主治右二方肺勞二用ヒテ苦惱ヲ緩解シ夜間安靜ナラ

シム

○第二千七百六十八方急驚結

硫酸規尼捏二醋酸莫爾比捏十六白糖六

右調和為散分八服每二時一服

主治肺勞ノ末期ニ用ヒテ諸証ヲ緩解シ夜間安靜ナラ

シム

○第二千七百六十九方壹別爾私

亞的兒三阿芙蓉丁幾一

右調勻外用

主治肺勞ニシテ肺臟麻痺シ及ヒ窒息ノ恐レアル者之

ニ宜シ又神經性喘息ニ好シ○此液一茶匙ヲ取テ小蓋

ニ盛リ或ハ之ニ熱湯少許ヲ加ヘテ其蒸氣ヲ吸引セシ

ム○此液戒心ノ火炎ヲ切近スルヲ勿レ

遠西藥書
卷五
廣
肺
堂

○第二千七百七十方〔藏歌蘭度〕

皓礬乃半 阿仙藥越幾斯錢半 過兒ル地舍利別一

右為全藥

主治肺勞末期ノ鷺口瘡ニ宜シ

遠西方彙卷之二十五

遠西方彙卷之二十六

獨乙 加幾安頓 著

和蘭 傑婪婆都 譯

侍醫法印伊東瑤川院貞文仲 重譯

南洋伊東亨健夫 參校

第六 慢性病係毛様絡者

腺病リスクロピロシス羅キ漢所謂瘰癧病屬之

此症醫療最注意スベキ者食餌ヲ以テ第一トス肉類及ヒ植物ノ最消化シ易キ者ヲ撰用シ空氣ヲ清潔ニシ屢浴湯

スルハ嘉稱アル醫藥ヨリ却テ効アルヲ聞之アリ施治ノ
 始腸胃中汚物或ハ粘液鬱滯セル者ハ解凝劑下劑ヲ用ヒ
 テ之ヲ除クヲ要ス小量孕鹼酒石或ハ孕礬酒石ヲ緩下劑
 トシ旃那。大黃。葯刺巴。甘汞若クハ蘆會ヲ峻下劑トス次ニ
 腺病ニ的當ノ藥劑即汞劑二千七百八十一方至安質沒尼
 劑二千七百七十一方至鹽酸重土二千七百八十四方至鹽酸
 加爾基及ヒ格魯林加爾基二千七百九十七方至刺必私高私
 秩屈斯二千七百九十八方至癒瘡木。蜀羊泉。失鳩荅。實荃荅。利
 斯等ニ吸收機ヲ催進スルノ品ヲ加ヘ最後ニ保固強壯劑ヲ
 用フ○又二藥アリ輓近殊稱スル所ニシテ其効力復ニ他藥

ニ優レリ即肝油二千八百七方至及ヒ沃胃謨二千八百十
二百廿方是ナリ腺病未深ク宿根セザルキハ肝油ヲ用ヒテ尚
 治スベシ骨布氏ノ言ニ據レハ肝油ヲ用フレハ後全體ノ
 容貌復シテ勞瘵狀ノ色澤去リ筋纖維弛緩セル者充實シ。
 腺腫縮小メ消散シ潰瘍及ヒ漏瘡モ亦漸癒ニ骨腫縮收解
 散シ且吾之ヲ親驗スルニ腐骨疽腺病ニ因スル者モ亦肝
 油ニ由テ平治スル者アリ○沃胃謨及ヒ諸沃胃謨製劑ハ
 其効力更ニ能ク通徹ス然レ之ヲ用フルハ最慎重スヘシ
 唯感觸遲鈍ノ病者ニ適當ス○輓近屋兒姪屈地名ノ設過越
 栗屈地名の兒ハ腺病ノ治方及ヒ其預防方トシテ綠石鹼外

用ヲ稱賛ス用法小兒ハ綠石鹼ヲ列氏十度乃至十二度ノ
 温水ニ溶化シ臨臥頸脊腹及ヒ四肢ヲ洗フ酸物及ヒ總テ
 酸ヲ釀シ易キ食餌並ニ非常ノ飲食ヲ戒ヒ此法ヲ施ス
 八日乃至十四日ノ後已ニ頸圍及ヒ内臓ノ腺腫消散シ皮
 疹減シ眼瞼ノ焮衝モ亦解散シ良効ヲ呈ス○凡腺病ノ如
 キ長病ヲ治スルハ時時藥劑ヲ變換シ或ハ暫ク休藥セシ
 ムヘキハ固ヨリ書載ヲ俟タズ

○瘰癧性焮衝眼モ亦本症ノ治ニ準ス但最初粘滑液ニ阿
 芙蓉丁幾ヲ加ヘタル眼水二千八百四十方ヲ用テ而シ速ニ峻烈
 ノ衝動水二千八百五十二方ニ轉スベシ迷暴謨腺粘液

ヲ分泌スルコト過多ノ者ハ汞劑亜鉛劑ヲ伍セル眼膏二千八百五十八方至二千八百五十八方非凡ノ効アリ

○瘰癧眼ノ羞明ヲ治スルハ甚失鳩苔内服二千八百六十二方至二千八百六十二方稱賛ス而シ灰白水銀膏ニ莨菪越幾斯ヲ加ヘテ朝
 夕眉上ニ塗擦シ或ハ後ニ舉クル所ノ方法二千八百六十八方至二千八百六十八方撰用スベシ

○第二千七百七十一方 穢歇蘭度

越質屋布斯安質没尼 或 越質屋布斯密涅刺列三至三

小兒散一至一錢附

右調勻分八包早晚服半包

〔主治〕良善ノ食餌ヲ用ヒ美日ニ逍遙シ務メテ身軀ヲ清
 潔ニシ且摩挲シ肢體ヲ運動シ石鹼食鹽大麥或ハ香竈
 藥ヲ加ヘタル微温湯ニ浴スル等腺病ヲ治スルノ須要
 タリ然レ上ノ散藥ヲ服スルノ數週或ハ數月持重ス但
 二三週連服スレバ八日間休息シテ復再服スベシ越質
 屋布斯安質没尼或ハ越質屋布斯密涅刺列ノ服量小兒
 ノ年齡ニ準ズ然レハ八ハ過グベカラズ上方ヲ服メ大
 便通セザル片ハ十四日毎ニ藥刺巴甘秉ノ下劑ヲ投ス
 ベシ

○第二千七百七十二方 骨布

越質屋布斯密涅刺列 失鳩峇越幾斯 各二錢
 右調勻為七十九衣石松粉每服二九日三服
 〔主治〕大人腺病ニ宜シ

○第二千七百七十三方 同上

越質屋布斯密涅刺列 一八至二八 失鳩峇越幾斯 一八 乳
 糖 四

○第二千七百七十四方 別連杜

右調勻為散分十二裹每服一裹日三服
 越質屋布斯密涅刺列 半錢至一錢 蜥蛄石末 一錢 茴香油
 糖 二錢

右調勻為散每服一刀尖日三服

主治右二方小兒腺病ニ宜シ

○第二千七百七十五方（弗氏私）

生安質没尼末錢半 枸橼油糖一 桂花末錢半 達刺錢半

篤蘆護漿宜適

右作錠四十八枚每服一枚日二三服（本館藏）

○主治小兒腺病ニ宜シ ○每錠生安質没尼五ハヲ含畜ス

ルカ故ニ之ニ準テ服量ヲ定ムベシ ○生安質没尼ハ安

質没尼製劑ノ中ニ就テ胃ヲ損敗スル事最微ニシテ

ノ腸胃モ亦能ク之ヲ受クルニ堪フ而シテ瘰癧瘡ニ殊効

アリ ○君結兒キマキノ安質没尼錠三千四百方モ亦此方ニ類ス

○第二千七百七十六方（私）越矣葛爾度

生安質没尼末錢六 癒瘡木脂半 雙鸞菊越幾斯錢半

白糖錢十 達刺侃篤蘆護漿宜適

右調和十五ハ為ニ錠每服一錠日四服

主治大人腺病及ニ頸腫ゴロツプニ宜シ

○第二千七百七十七方（藏歌蘭度）

生安質没尼末十五ハ至 麻偃涅失亞ハ五 白糖半 桂

皮末ハ二

右調勻為散分六包朝暮服二包

主治腺病頑癬等二宜シ

○第二千七百七十八方同上

金硫黃 甘汞各一 小兒散附半

右調勻為散分八包早晚服半包

主治腺病二宜シ五歲已上ノ小兒應用方トス

○第二千七百七十九方同上

金硫黃 甘汞 失鳩荅越幾斯各一 癒瘡木脂半

苗香油糖一

右調勻為散分八裏早晚服半裏

主治頑固腺病二宜シ五歲已上ノ小兒應用方トス

○第二千七百八十方際爾斯西兒

老利兒結爾斯水錢二 安質沒尼酒錢一

右調勻每二時半取十二滴乃至十五滴水少許點服

主治四五歲兒ノ腺病並ニ小兒痙攣病ニ宜シ

○第二千七百八十一方過傑栗屈的兒

甘汞三錢 藥刺巴脂一 白糖一 亞刺昆亞蘆護漿

宜適

右調勻六爪為二錠衣麵粉時時服二錠或三錠

主治腺病蟲症ヲ兼ナル者之ヲ用ヒテ蟲及ヒ粘液ヲ驅

除スルニ宜シ

○第二千七百八十二方〔穢歌蘭度〕

瘡瘡木脂 蜀羊泉越幾斯各二錢

失鳩峇越幾斯一錢

硫黃華 甘汞各半

右調勻二匁為二丸衣石松粉早晚服十九

〔主治〕腺病宿根セル者之ニ宜シ

○第二千七百八十三方〔西篤失葛弗士〕

朱砂一匁 失鳩峇葉二匁 赤降汞一匁 白糖半匁

右調勻為散分二十裏每日朝餐後一時服一裏

〔主治〕腺病及此ニ因スル諸頑固症應度駝倫關節骨腫

トロカセル 膀胱痛等ニ宜シ但一二歳兒ノ應用方トス更ニ

大兒ニ用フル片ハ漸ク加ヘテ朱砂四十匁失鳩峇十匁

ニ至レリ之ニ兼テ硼砂軟膏ヲ塗擦ス宿根症ハ沃胃護

軟膏ヲ用フ此治法ヲ行フ片ハ榭實哥喜ヲ用ヒ食鹽浴

ヲ施スヲ要ス病兒甚惡液質ノ者ハ幾那モ亦適當ニ胃

弱ノ兒ハ上ノ散藥ニ蘆薈水製越幾斯一二匁ヲ加用セ

リ此散ヲ持重スル一二月ヨリ四月ニ至ルヲ要ス

○第二千七百八十四方〔穢歌蘭度〕

鹽酸重土半錢 蒸餾水一匁

右調和三歳以下兒每服五滴乃至十滴大兒每服十滴乃

遠西本草
卷之六
腺病
廣
丹

至三十滴俱日三四服

主治 臍歌蘭度ノ説ニ據ルニ腺病ヲ治スルニ鹽酸重土

ハ効力永劑ニ類似シ或ハ之ニ優ルト云フ蓋鹽酸重土

ハ分利シ易キカ故ニ單服ヲ要ス

○第二千七百八十五方 同上

鹽酸重土錢一 蒸餾水分二 失鳩峇越幾斯錢一

右調和每服三十滴乃至四十滴蜀羊泉煎液點服日四次

主治 嚔下困難症腺腫ニ因ル者ニ宜シ○之ニ兼テ失鳩

峇硬膏ヲ貼シ水銀軟膏ヲ塗擦ス

○第二千七百八十六方 遠突土

鹽酸重土錢半 蒸餾水一勺 溶化加後味

安質沒尼酒錢二

右調勻每一時服十滴乃至十五滴但漸加服量

○第二千七百八十七方 列墨爾

鹽酸重土錢半 失鳩峇越幾斯錢半 苗香水分六 覆盆子

舍利別分半

右溶和每服一食匙日四服臨服宜振盪

主治 右二方小兒腺病ニ宜シ

○第二千七百八十八方 孤刺律私

鹽酸重土錢半 碓鏡華錢一 蒸餾水分二

遠西方彙 卷七 腺病 廣 肝 堂

右調勻每服二十四滴日四服漸加量

○第二千七百八十九方 プラグ 地胎設爾

鹽酸重土 鹽酸鏡各半 錢附 薄荷水一弓溶解加後味

橙皮舍利別行

右調和二三歲兒每服八滴乃至十滴四歲乃至六歲兒十

二滴乃至十五滴大兒二十滴俱燕麥粘汁點服日三四次

○主治右二方腺病ニ宜シ解釋強壯ノ効ヲ兼併ス

○第二千七百九十方 越魯涅屈

格魯林加爾幾 錢半 蒸餾水 三

右溶和每一時服一茶匙勿振盪

○主治急性腺病ニ宜シ○此方四週乃至六週連服ヲ要ス

○第二千七百九十一方 扼縵

格魯林加爾幾 錢一 菖蒲根丁幾一弓溶解

右每服三十滴乃至四十滴日二服

○主治童子ノ腺病ニ宜シ

○第二千七百九十二方 朴瀝私

鹽酸加爾幾 錢一 失鳩峇越幾斯 十五 桂水半弓溶解

右調勻日服八滴乃至十六滴 鹽酸加爾幾二弓至四弓失鳩峇越幾斯半弓至一弓

臨用宜振盪

○主治十歲已上兒ノ腺病ニ宜シ

遠西藥彙 卷七十六 腺病 九 廣 肝 堂

○第二千七百九十三方 [基麻]

格魯林加爾幾 一乃至 蒸餾水半比乃至一比溶化

過加砂糖舍利別半弓

右調勻內玻璃壺黑紙被覆貯每一時乃至一時半服二三食匙

主治 瘰癧病 = 宜シ

○第二千七百九十四方 [列墨爾]

鹽酸加爾幾 一錢 蒸餾水六錢溶化加老利兒結爾斯水

二錢

右調勻每服三十滴日三服

主治 大人腺病 = 宜シ

○第二千七百九十五方 [設儂室]

格魯林水 半弓至 蒸餾水 二弓至 過兒托舍利別 一弓

右調勻每一時服一茶匙

主治 腺病 = 宜シ

○第二千七百九十六方 [穢歇蘭度]

格魯林加爾幾 半弓 蒸餾水一比溶化

右供洗滌或醮棉撒絲貼瘡所

○第二千七百九十七方 [春姪隣]

鹽酸加爾幾 一錢 寶芟荅利斯末 二錢 醇醋 二錢 家猪脂

右調勻朝夕塗擦

主治右二方慢性腺腫ニ宜シ

○第二千七百九十八方〔骨布〕

鼈乙典^イ垤羅屈^ラ 酒製桂水^{附各}

右調和朝夕取ニ茶匙乳汁和服

○第二千七百九十九方〔髮設儼室〕

刺必斯高私秩屈斯^半 橙花水一匁溶解

右調勻每服十二滴乃至二十滴日四服

主治右二方腺病ニ宜シ○花列名^始メテ腺病ニ刺必斯

高私秩屈斯ヲ稱賛シ最大量ヲ以テ水銀塗擦法ト併用

セリ軌近獨損地名^之ヲ殊稱メ亦漸漸服量ヲ加増シ甚

大量ニ至レリ葛兒別地名^ノ忽弗滿^名腺病兒二人ヲ治ス

ルニ有譽ノ腺病治方ヲ施スト雖効アラザルカ故ニ竟

ニ獨損地氏ノ法ニ倣ヒ刺必斯高私秩屈スヲ桂水ニ溶

シ急ニ服量ヲ加増シテ乳汁ニ和服セシメ以テ全功ヲ

収ム但之ヲ施スノ際一週毎ニ甘汞藥刺巴ノ下劑ヲ投

スト云フ

○第二千八百方〔設儼室〕

刺必私高私秩屈斯^半 蒸餾水六匁溶解

遠西... 卷六... 腺病

右供養法

主治療瘰癧瘡

○第二千八百一方

外加爾剝亞呢麻里 白糖

右調勻為散朝夕服

主治腺病

○第二千八百二方

大加爾剝亞呢麻里 甘草末

右調勻為散每服半茶匙乃至一茶匙日二三服

主治佝僂病腺病頑癬等

○第二千八百三方

加爾剝亞呢麻里 過兒托軟膏 實芟荅利斯軟膏

錢六

右調和外敷

主治腺ノ硬結腫及潰瘍

○第二千八百四方

老利兒子末 為塊入竈脫苛味加後味

肉豆蔻末 鹿角霜

右研和為散

○第二千八百五方

遠西...

卷六

三

廣平堂

遠西本草
卷之六
腺病
十一
廣月

○勞瘵腺病散 第二千八百一十一方 甘草末 一錢半

右調勻每服一刀尖日三服

主治腺病ニ宜シ之ニ兼テ淡薄ノ食ヲ命ジ微温湯ニ藁

或ハ糠ヲ加ヘテ浴スルノ毎週三次

○第二千八百六方

主勞瘵腺病散 錢 瘡瘡木脂 錢 各半 白糖 錢 二

右調勻為散每服一刀尖日三服

主治腺病ニ宜シ之ニ瘰癧疹ヲ發スル片ハ錢粉ニ代ヘ

テ越質屋布斯安質沒尼一刀乃至二刀ヲ加ヘテ可ナリ

○第二千八百七方 際爾黠亞兒

肝油 錢二 雞子黃 個一 薄荷舍利別 橙皮舍利別 各二

右調勻每服二弓日三服

○第二千八百八方 同上

肝油 錢三 錢 至 蘆謨散 附適 加苗香水一弓作乳劑再

加橙皮舍利別半弓

○若調勻每時服一茶匙

主治腺病。佝僂病。及ヒ小兒疳勞ニ宜シ○盼孤名ニ倣ヘ

ハ幼兒ニ肝油ヲ用フルハ單味ニシテ他味ヲ加ヘズ每服

一茶匙日ニ二服但朝餐後半時午餐後一時半乃至二時

ニ方リテ與フ而メ八日乃至十九日ヲ經テ每服一茶匙

遠西藥書
卷六
腺病
廣
肝
堂

ヲ加増シ竟ニ二茶匙ニ至ル大人ハ初毎服一食匙日ニ
二服漸ク加ヘテ一食匙半ヨリ二食匙ニ至ル而テ毎服
後薄荷水少許或ハ胡椒二三粒ヲ與フ○此方ヲ服スレ
ハ病者著シク快復シ容貌生力俱ニ活潑ス

○第二千八百九方 蒲列歇兒變
肝油 是班牙酒 各四
亞刺昆亞蘆謨 一

已上調和加後藥
薄荷油糖 錢二
橙皮舍利別 一

右每服二食匙日二三服臨服宜振盪
主治腺病。尙樓病。經久依倔篤。樓麻質斯ニ宜シ

○第二千八百十方 劉細爾

沃胃謨 沃胃謨加里 半 蒸餾水 二

右調勻七歲以下小兒每服二滴漸加至五滴砂糖水半麥
酒盞點服日二次

主治腺病。硬結腫。水腫。頑癬等ニ宜シ○七歲乃至十二歲
兒ニ與フルハ初毎服五滴一週毎ニ二滴乃至十六滴ヲ

加増ハ大人ハ三十六滴ニ至リテ可ナリ
○第二千八百十一方 麻健蓋 沃胃謨亞的兒

沃胃謨 亞的兒 錢二
右調勻每服八滴乃至十滴日二三服十歲中六胃點四分

遠西藥彙 卷七 腺病 十四 廣 野 堂

主治腺病神經症ヲ挾ム者ニ宜シ三十滴中沃胃謨四分
ハ入者ヲ含畜ス

○第二千八百十二方

幾那煎ヲ十 沃胃謨丁幾九滴附

右調勻每服二食匙日三服

主治瘰癧潰瘍ニ最好トス

○第二千八百十三方

沃胃謨ハ六 沃胃謨加里ハ十二 蒸餾水ハ五 砂糖舍

利別ヲ半

右調勻每服一食匙日三服

主治大人腺病及吐涎汞劑眩暈ニ因ル者ニ宜シ

○第二千八百十四方

沃胃謨加里一錢 沃胃謨ハ一 蒸餾水ハ五 嬰粟舍利別

ヲ一

右調勻每服一食匙日三服

主治頑固腺病ニ宜シ

○第二千八百十五方

沃胃謨ハ十二 沃胃謨加里ハ四 家猪脂

ヲ二

右調勻作軟膏供塗擦或縛帶用

速 西 方 藥 卷 七 六 瘰癧 腫 廣 肝 堂

主治瘰癧腫骨腫及久潰瘍宜シ○小兒或ハ皮膚感觸靈敏ノ人ニ用フルハ最緩方ヲ處シ大人ハ初ヨリ峻方ヲ投シ後漸ク最峻方ニ轉ズヘシ

○第二千八百十六方（穢歇蘭度）

沃胃謨加里錢半 家猪脂一

右作軟膏塗擦

主治瘰癧性腺ノ硬結腫ニ宜シ

○第二千八百十七方（劉翹爾）

沃胃謨二ハ。三ハ。至四ハ。 沃胃謨加里四ハ。六ハ。至八ハ。 蒸餾水八

至十 六

右外用

至治軟膏五千八百十五方ヲ用ヒテ劇痛ヲ發スル者ハ之ヲ用

フヘシ但瘰癧毒漏瘡焮衝眼鼻中瘡オナザ等ニ射注シ殊

ニ好トス○之ヲ射注スルハ玻瓈製或ハ象牙製ノ小唧

筒ヲ用フベシ而シテ鼻中瘡ニ施ス片ハ能ク意ヲ用ヒテ

甚ク上顎ニ向フテ射スルヲ勿レ

○第二千八百十八方（劉翹爾）沃胃謨膏

癒創膏二 沃胃謨末半 沃胃謨加里二 阿芙蓉越

幾斯附二

右捏和作硬膏

〔主治〕腺病瘡。關節尙痿。病毒腫。關節白腫ルチモル。ア等。二宜

○第二千八百十九方〔鄧錫爾〕

沃胃謨二錢至四錢 沃胃謨加里八錢至四錢 蒸餾水四錢

右調和加浴湯

〔主治〕小兒腺病。二用フ

○第二千八百二十方〔同上〕

沃胃謨二錢至半錢 沃胃謨加里半錢至一錢 蒸餾水六錢

右調和加浴湯

〔主治〕大人腺病。二用フ

○第二千八百二十一方〔薄刺狩斯〕

沃胃謨一錢 亞爾箇兒半錢

右溶和每服十滴漸加日三服

○第二千八百二十二方〔獼屈秘〕

沃胃謨一錢 橙皮丁幾 健質安那丁幾各一錢半

右調勻每一時半服。二十滴乃至二十五滴

〔主治〕右二方鈍性腺病。二宜シ

○第二千八百二十三方〔骨布〕

蒲祿謨加里八錢至一錢 薄荷水四錢

右每服一食匙。日四服

遠西林業
卷之六
肺病
廣月堂

主治 鈍性腺病ニ宜シ ○蒲魯密優謨ハ刺戟衝動スル
沃胃謨ヨリ甚シ故ニ方今ニ至テ内服スル一罕ナリ蒲
魯謨加里ハ其性更ニ緩ナリト雖用フルニ臨テ慎重ス
ヘシ

○第二千八百二十四方 [麻健齋]

蒲魯謨加里 六八八ハ 萬菖水三勺溶解加後味

過兒把舍利別子

右調勻每半時服一食匙臨服宜振盪

主治 腺病 心耳ノ肥大 デロペルトロロロセン 經閉ニ宜シ

○第二千八百二十五方 [同上]

蒲魯謨加里 一乃至半錢 家猪脂一

右丁寧調和作軟膏每用取半錢乃至一錢塗擦日一二次

主治 瘰癧腫ニ宜シ

○第二千八百二十六方 [遷突土]

鹽酸金鹽 六 失鳩苔越幾斯 失鳩苔葉末 各一錢 亞

刺毘亞蘊謨漿 適宜

右一氏為一九衣石松粉朝夕服一九

主治 腺病及ヒ硬結腫ニ宜シ症ニ準メ二日毎ニ一九ヲ

加増ス ○蓋鹽酸金ハ殆沃胃謨ト同効ニ唯遲鈍ノ人

ニ適當ス小兒ハ必用フベカラズ

遠西... 卷七... 廣... 肺... 腎...

○第二千八百二十七方同上

鹽酸金鹽四 苦扁桃水半一 溶解加菩提樹花水一一

半

右每服二十四滴蒸餾水點服日四次

主治感觸遲鈍ノ人ノ腺病ニ宜シ

○第二千八百二十八方春姪隣

胡桃子越幾斯 蜀羊泉越幾斯各一錢 鹽酸加爾基半錢

加後味溶化

桂水一

右調勻每服十滴三十滴乃至六十滴日二服

主治腺病ニ宜シ○輓近涅倭利兒名諸般ノ腺病ヲ治ス

ルニ胡桃葉ヲ用ヒテ殊効ヲ得タリ用法第一浸劑胡桃

握ヲ取テ細剉シ熱湯ハ一半ニ浸シ砂糖一毎日二三小蓋

乃至五小蓋ヲ飲服ス第二煎劑胡桃葉一或ハ之ヲ洗水

トシ或ハ縛帶ニ用ヒ或ハ漏瘡ニ射注シ或ハ浴湯ニ加

フ第三丸劑乾葉ヲ以テ越幾斯トナシ三半一每服二粒

乃至四粒第四舍利別越幾斯六一半一砂糖一小兒每服二三

茶匙大人ハ一二一第五軟膏越幾斯一一家猪脂一塗

擦○蓋上方ハ久ク連用シ兼テ肉食之變革ス或ハセシ

ムルヲ要区鈍症敏症俱ニ此方ヲ用ヒテ可ナリ第一單

遠西... 廣肝堂

純腺腫第二腺腫硬結腫ヲ兼任スル者第三骨腫腐骨疽
ニ傾ク者第四腺病性焮衝眼第五腺病性耳濕白滯下及
ニ發疹等ニ適當ス

○第二千八百二十九方〔樽兎〕

胡桃子越幾斯 沒藥越幾斯 加密列越幾斯各一錢

銅青製神効石溶液三勺融解加後味

阿芙蓉液一錢 玫瑰蜜一錢

右調勻供縛帶用

主治弛緩瘰癧腫ニ宜シ

○第二千八百三十方〔格爾黠謨〕

失鳩荅越幾斯一錢 實莖荅利私 越質屋布私安質沒

扭各半

右調勻二丸為一丸朝暮服八九乃至十九

主治強實ノ人敏性腺病ニ宜シ失鳩荅ハ喉頭及ヒ氣管

ノ瘰癧焮衝肺勞及ヒ羞明眼ニ最適當ス

○第二千八百三十一方〔弗弄繆魯列爾〕

格尼捏附三以 加燒酒一乃蒸餾水五錢溶解

右調勻每服十五滴乃至三十滴日三服

主治敏性腺病瘰癧性焮衝眼眼瞼痙攣羞明症淚眼感覺

靈敏家ノ劇痛等ニ宜シ弗弄繆魯列爾名ノ 歷驗ニ據ル

遠西丸膏
卷七
腺病
廣肝堂
ニ格尼捏ヲ以テ失鳩荅ニ比スルニ其効更ニ確實ナリ
ト云フ

○第二千八百三十二方 遷突土一

實芟荅利斯_{各半} 滾湯適宜浸漬濾過取液四勺加後味

酒石葉液 過兒把舍利別_{各半}

右調勻每服半食匙日三服

主治 小兒腺病ニ宜シ○症ニ應シテ酒石葉液ニ代ヘテ

安質没尼酒一錢ヲ用フルモ亦可ナリ○實芟荅利斯ハ

療瘰腫ヲ分解シ並ニ胸病及ヒ湧乙液滲出症ニ最効アリ

○第二千八百三十二方 別陽

鍊粉 大黃末_{各五} 白糖_十

右調勻為散分八包初日服一包後加増

主治 腺病 佝僂病ニ宜シ○鍊ハ特ニ鈍性症ニ適當ス血

絡及ヒ神經系感觸太過ノ症ニハ必用フヘカラス

○第二千八百三十四方 護利秘

癒瘡木脂 鍊粉_{各半} 牡蠣末_半 白糖_三

右調勻為散每服一刀尖日二服

主治 同上

○第二千八百三十五方 篤煙

遠山丸
卷七
廣月堂

赭色幾那越幾斯 桂酒水附各一錢 大黃丁幾水製六錢

右調勻早晚服七十滴

主治篤姪氏腺病ニ緊用ス

○第二千八百三十六方穢歌藤度

薩沙弗刺斯各一 茜根 甘草各一

右細剉每日取一食匙水二三盞泡出用

主治腺病ニ殊効アル佐藥トス

○第二千八百三十七方同上

濱瞿麥根 蒲公英根 山午房根 薩沙弗刺斯各二

茜根各三 甘草各一

右細剉取一弓水一彬篤煮耗至三分彬篤之二日服

○第二千八百三十八方同上

牛膽新鮮者 白石鹼各三錢 石腦油二錢 揮發鹿角鹽半錢

龍腦一錢 過兒托軟膏附一

右調勻作軟膏每一時半取一茶匙塗擦肚腹

主治腺病ニ宜シ 蟲ヲ兼ヌル症ハ本方ニ太那設黠謨

油半錢ヲ加フ

○第二千八百三十九方過傑栗屈的兒

白石鹼各一錢 龍腦半錢 酒製礪砂精附二錢 實百爾油十滴

右調勻塗擦

遠山丸
卷七
廣月堂

遠西方藥
卷之六
眼病
廣用

主治同上

○第二千八百四十四方（弗。噉門）

硫酸規尼捏二八至 曹達四八至 白糖一

右調勻為散分六服蠟紙包裹早晚一服

主治療癰性焮衝眼ニ宜シ

○第二千八百四十一方

榎植核汁錢三 蒸餾水三 舍電阿芙蓉液六滴八滴乃至十滴

右調勻為眼水

主治療癰性焮衝眼ノ初期眼ノ感觸甚亢進セル者之ニ

宜シ

○第二千八百四十二方（護。調。搦。搦）

老利兒結爾斯水三 接骨木花水四

右調勻外用日三四次

主治療癰性焮衝眼及ニ常習聖京屈焮衝眼ニ施ノ感觸

亢進ヲ變革スルニ宜シ

○第二千八百四十三方（弗。噉。搦。搦）

薔兒名八 神効石八 薔薇水七 榎植核汁錢一 舍電阿

芙蓉液錢半

右調勻濾過取二三滴點眼中日二三三次

○第二千八百四十四方（薄。刺。狩。斯）

○至 薜兒名神効石八分至一分蒸餾水一匁 阿芙蓉液五分

右調勻點眼二三次 煎藥中日二三

主治右二方瘰癧性焮衝眼並ニ鈍性粘液眼及ニ虚性焮

衝眼ニ宜シ

○第二千八百四十五方

翳弗名神効石二分至一分 薔薇水一匁溶解

右調勻點眼二三滴日三四次

主治瘰癧性焮衝眼粘液眼鈍性焮衝眼角膜斑點瘰癧腫

ニ宜シ

○第二千八百四十六方 拂連名焮衝眼水

皓礬一分半 薔薇水一匁半溶解

○右為眼水

主治瘰癧性焮衝眼及ニ總テ慢性多淚焮衝眼ニ宜シ又
眼瞼搔痒ニ用フベシ

○第二千八百四十七方 弗噶刺名

皓礬三分 薔薇水三錢溶解加後味

主亞刺昆亞蘆謨漿一錢 舍電阿芙蓉液半錢

右調勻點眼二三滴日一次或二次臨用宜振盪

主治鈍性焮衝眼及ニ總テ粘液眼ニ宜シ瘰癧性焮衝眼

○ハ殊ニ好

遠西本草
卷之六
眼科
廣
册
堂

○第二千八百四十八方〔列〕

醋酸鉍八錢至十五錢 蒸餾水六勺 溶解宜 瘰癧性焮衝眼宜 宜シ

右為洗眼水

〔主治〕慢性粘液眼珠、瘰癧性焮衝眼宜 宜シ

○第二千八百四十九方〔列〕

鉛糖三錢 薔薇水或 苗香水一勺半 溶解

右為眼水

〔主治〕瘰癧性焮衝眼及聖京傷焮衝眼宜 宜シ

○第二千八百五十方

鉛糖八錢至十二錢 蒸餾水六勺 溶解加後味

舍電阿芙蓉液錢

右調勻為眼水

〔主治〕瘰癧性焮衝眼及粘液眼宜 宜シ

○第二千八百五十一方〔列〕

結晶硝酸銀二錢至八錢 蒸餾水一勺 溶解

右濾過內玻璃壘黑紙被覆點眼水

〔主治〕粘液眼、瘰癧性焮衝眼、角膜潰瘍、葡萄眼宜 宜シ

○第二千八百五十二方〔列〕

硼砂一錢 加後味溶化

井水四勺 老利兒結兒斯水三錢

遠西方藥
卷七
腺病
廿五
廣
册

右調勻醮麻布貼眼

主治療瘰性焮衝眼ニ宜シ

○第二千八百五十三方〔薄刺猪私〕

華涅滿洛承散半 家猪脂錢一

右丁寧調勻作眼膏早晚取鍼頭大塗臉緣

主治療瘰性焮衝眼及口其他諸粘液眼感觸敏捷ニ未

他ノ承劑ニ堪ヘサル者之ニ宜シ

○第二千八百五十四方

白降承一 家猪脂錢一

右丁寧調勻作眼膏

○第二千八百五十五方〔刺猪私〕

赤降承一 家猪脂二刀一錢

右丁寧調勻作眼膏

主治右二方慢性聖京偃焮衝眼慢性眼臉粘液流出症角

膜班點等ニ宜シ○早晚針頭大ヲ取り眼縁ニ塗ル

○第二千八百五十六方〔律私篤〕

白降承六八至 鉛糖 舍電阿芙蓉液各半 新鮮無

鹽酪錢二

右丁寧調勻作眼膏

○第二千八百五十七方

遠西方藥
卷之六
眼科
廣
月

○赤降汞各三 亞鉛華各三 朴麻篤膏附二

右丁寧調和作眼膏

○第二千八百五十八方〔蘇歌蘭度〕

赤降汞二 煨鋤霜八 水製阿芙蓉越幾斯半 單軟

膏錢一

右丁寧調和作軟膏朝暮塗眼瞼

〔主治〕右三方療瘰癧性焮衝眼粘液分泌夥多之症三宜

○第三千八百五十九方〔托保魁〕

越質屋布斯安質沒尼 愈瘡木脂各一 大黃 麻屈

○涅失亞 白糖各半

右調勻為散私葛點刺器 收貯每服一茶匙日二三服

〔主治〕療瘰癧性焮衝眼及差明二宜

○第二千八百六十方〔弗臘門〕

鹽酸重土半錢至一錢 幾那丁幾半至一

右調勻晨夕服十滴乃至十五滴臨服宜振盪

〔主治〕療瘰癧性羞明眼二宜 ○但腺病ヲ治スルハ瀉下發

表ヲ怠ル勿レ瀉劑ハ甘汞ニ藥刺巴ヲ加フルヲ最佳ト

○或ハ叔瀉耳杜名人ノ 歷驗ニ據ルニ小兒醫藥ヲ嫌フ者

通ハ巴豆油一滴ヲ取リ砂糖十ハ 和シ其ハ分一皮膚

刺戟劑ハ吐酒石膏四百五十一方 或ハ骨布氏ノ白降膏

遠西本草
六方
疹ヲ發スルニ至ル
六百卅
ヲ殊ニ好トス
朝暮豆大ヲ取リテ肩脚間ニ塗擦
廣月堂

シ疹ヲ發スルニ至ル
六方
ヲ殊ニ好トス
朝暮豆大ヲ取リテ肩脚間ニ塗擦

○第二千八百六十一方 骨布

失鳩苔越幾斯 錢一 酒製桂水 附 半ヲ溶化

右小兒二歳乃至四歳者每服四滴日三服逐日每服加一
滴至三十滴或三十五滴

主治 癩癧性羞明症ニ宜シ之ニ兼テ耳後ニ發疱硬膏ヲ

貼シ及ヒ單阿芙蓉丁幾ヲ重布ニ醮ノ眼ニ貼ス

○第二千八百六十二方 屑矣埵爾

失鳩苔越幾斯 以新葉製者 白糖 各半 蒸餾水半ヲ溶解

右準年齢初每服四滴八滴乃至十滴漸加至二十滴或老

大患者及病症頑固者至二十五滴日二服

主治 癩癧性羞明ニ宜シ○毘温地 名人 ハ往昔失鳩苔越幾

斯八分ハノ一ヨリ四分ハノ一至日ニ二服 大人半ハス

ルヲ稱賛シ之ニ兼テ失鳩苔越幾斯六ハ乃至十二ハヲ

以テ蒸餾水ニヲ乃至四ヲニ溶化シテ罈法ニ供ス 二百

三十方及ヒ二千八百三十一方ヲ参照スベシ

○第二千八百六十三方 謁爾私忽兒斯 失鷄蒲列爾

苗香水 ニ 臘寶干斯葉丁幾 附 四

右調勻每服一食匙日三服

遠
西
廣
肝
堂

主治療癩性頑固焮衝眼羞明スル症ニ嘉稱アリ○臘實
干斯丁幾漸ク加増ノ八滴十六滴或ハ三十二滴ニ至ル

○第二千八百六十四方〔悅腫度〕
硼砂一 接骨木花水四

右溶和醮棉布貼眼
主治療癩性羞明眼ニ宜シ

○第二千八百六十五方〔烏篤薛爾〕
菲阿私越幾斯十二 新鮮無鹽酪二
右調和作軟膏取豌豆大塗眼上及眼瞼外面日三次

主治療癩羞明症殊ニ焮衝輕微ニシ之ニ比スレバ羞明

甚シキ者ニ宜シ是神經疾患ニ係ル者ナリ

○第二千八百六十六方〔帶暗門〕
莨菪葉半錢至一錢 井水六勺煮四分時濾過加後味

老利兒結爾斯半錢至一錢半
右調勻醮重布貼眼

主治療癩性羞明眼眼瞼痙攣ニ宜シ
○第二千八百六十七方〔托苦〕
青酸亞鉛八分至一分 舍電阿芙蓉液一分 亞刺昆亞趨謨

老利兒結爾斯半錢 黑櫻實水三
右調勻為眼水每半時醮小重布貼眼

西
廣
肝
堂

遠西藥房
卷廿六
疳勞
廣
肚
堂

主治 托苦名ノ 歷驗ニ據ルニ瘰癧性羞明眼ノ一奇方夕

リ此方ヲ用ヒテ治スル者皆八日內ニ全癒セリト云フ

疳勞アトロヒアメセンラ 瘰癧リンチム

此症小兒腺病ノ劇症ニ繼發ス故ニ其治モ亦腺病ト同一

般ナリ初腺ノ閉塞ヲ解釋シ後強壯劑ヲ用フベシ俗間之

ヲ治スルニ癩實哥喜及ヒ麥湯浴ヲ用フ最偉効アリ○余

カ輩此症ニ專腺病條下ニ列載スル所ノ方法ヲ處シ且左

ニ揭示スル方ヲ以テ之ヲ補フ

○第二千八百六十八方臧歌蘭度

幾那越幾斯カ 蒲公英越幾斯錢 酒石葉半 苗香

水 大黃舍利別各一

右調勻每服一茶匙日四服

主治 幼兒疳勞ニ宜シ

○第二千八百六十九方

雞子黃半個至 井水北二 鉢內玻璃壘振盪作乳汁加食

鹽半錢

右為常用飲料

主治 幼兒腺病及ヒ疳勞ニ宜シ

○第二千八百七十方譚私篤

酒石鹽水附一 苗香水五 大黃舍利別一

遠西藥房
卷廿六
廣
肚
堂

遠西考 卷七 疳癆 廣 肝 堂

右調勻每服半食匙日三服

主治小兒疳癆序証ノ期之ニ宜シ○謨私篤氏此方ヲ用

フルノ後安質没尼酒ヲ用フル毎服五滴乃至十滴日

ニ三次十四日間連進スト云フ

○第二千八百七十一方

失鳩荅越幾斯半乃至十五桂水一匁溶解加橙皮舍利別

○第二千八百七十二方

右調勻每服一茶匙日二三服

主治小兒疳癆肚腹既ニ結核ヲ覺ユル者ニ宜シ○之ニ

兼テ亞的兒性軟膏ニ灰白水銀膏ヲ加ヘ肚腹ニ塗擦ス

ベシ小兒疳癆序証ノ期之ニ宜シ○謨私篤氏此方ヲ用

○第二千八百七十二方謨私篤

甘汞十二 金硫黃十 大黃末十六 牡蠣十六

白糖四

右調和為散分八服日三服

主治小兒疳癆本症既ニ發スル者ニ宜シ

○第二千八百七十三方同上

礪銅礬半 蒸餾水二匁溶化

右調勻每服五滴乃至二十滴日三服

主治二歲已上小兒疳癆症宿根セル者上ノ甘汞散八百

七方ヲ連進スル一ニ三日ノ後此方ニ宜シ○謨私篤氏
此水液ヲ用フルニ臨テ毎次日製白蒸餅一塊ヲ喫セシ
此方ヲ連用スル一三週ニシテ乃別私黠設弗神經丁
幾ヲ連用スル一八日ノ後再礪銅礬溶液ヲ持重スル一
十四日爾後鹽酸鐵丁幾ヲ與フル一三週ニシテ功ヲ
收ムト云フ○謨私篤氏沃胃謨ハ唯外用スルノミ

○第二千八百七十四方骨布

格屈林水一 砂糖丁幾一 默栗薩水六

右調勻午時及日晡食後過四分時服ニ食匙

主治小兒疳勞腹内ノ疾患ニ起因スル者之ニ宜シ○大

人ハ格屈林水半錢乃至一錢ヲ取テ水五弓ニ和用ス○
砂糖丁幾ハ燒糖ヲ火酒ニ浸シテ製スベシ

○第二千八百七十五方同上

礪銅礬水一 橙花水三 砂糖丁幾八

右調勻午時及日晡食後過半時取六滴十二滴乃至二十
滴砂糖點服

主治小兒疳勞腹内ノ疾患ヨリ来ル者病兒服藥多量ヲ
嫌ヒ或ハ胃腸ノ感觸過敏ノ者ニ宜シ

○第二千八百七十六方福福篤

牛膽新一 蒸餾水各一 石鹼精附一 揮發鹿角鹽二

牛膽新一 蒸餾水各一 石鹼精附一 揮發鹿角鹽二

右調勻温塗擦肚腹日三次

主治小兒疳勞ニ宜シ

英吉利病何俁病屬之ラキチスラキチス羅

英吉利病何俁病屬之ラキチスラキチス羅

病ノ一種トノ骨系ノ腺病ナリト云フ

二病俱ニ其治同シ食ヲ節シ新氣ヲ通シ皮表蒸發氣ヲ適

度ナラシムルハ醫治ノ第一義トハ尋テ補給機ノ不足ヲ

補ヒ平ニ復スルヲ要ス先腸胃ヲ掃除スルニ葯刺巴甘承

或ハ大黃ニ解釋劑ヲ加用スルヲ良トハ次ニ苦味香竈藥

并ニ此症ニ殊稱アル藥ニ轉スベシ往昔苗根二千八百八

千八百八十四方ハ英吉利病ニ最勝ノ名アリト雖輒近ニ至テ聲

價零落セリ又磷酸二千八百八十五方美稱アリト雖病人之ヲ服ス

ルニ堪フル者罕ナリ故ニ亦稱スルニ足ラズトハ制酸藥

モ亦未嘗テ之ニ由テ英吉利病ノ平治セルコトアラズト雖

通例効アリトハ鍊劑二千八百八十八方モ亦奇藥ニ算入

スベカラス但其末期ニ及ビテ功ヲ収ムルニ至テハ妙ナ

リ設令此症ノ特效藥ヲ立ツレハ乃肝油二千八百七十九方是ナリ

之ヲ英吉利病見ニ用フレハ奇特ノ効アリ

○第二千八百七十七方橘篤涅爾

- 葯刺巴 甘草各一錢 白糖 昆天土各二錢附 苜蒲油二滴

右調勻為散每日與一二刀尖

○主治 埕列私田地名小兒病院ノ醫之ヲ峻下ノ効アリテ兼

テ腸ヲ刺戟シ其運營ヲ挑起スルノ一方トノ肥滿ノ兒

ニ數週連用シ爾後毎日肝油二三食匙至ヲ與ヘテ以テ

功ヲ収ムト云フ其攝生ヲ節スルハ最須要アリ其症ニ

準メ保固強壯藥ヲ番替シ用フ但錢ハ之ヲ格碌屈斯未

兒秩私糖附或ハ収歛錢又杜松木浸ヲ微温湯ニ加ヘテ

液ニ製スル者佳ナリ

毎日浴セシメ且肝油ヲ塗擦シ後直キニ温暖布ヲ以テ

身驅ヲ纏裹シ又肌膚摩挲ヲ稱用ス○昆天土ハ白糖十

六ヲ米三十二ヲ葛加阿實二十四ヲ桂六錢丁子二錢益

智二錢。拔爾撒謨字露五滴ヨリ成ル

○第二千八百七十八方祿斯

肝油 橙皮舍利別 過泥子水各一 菖蒲油滴三

右調勻每服一食匙日三服臨服宜振盪

○第二千八百七十九方易斯

肝油一 酒石鹽水錢二 菖蒲油滴三 橙皮舍利別一

右調勻晨夕服一ユ茶匙

主治 腺病。英吉利病。經久癩麻質斯及ヒ依屈篤性疾患ニ

宜シ六百廿五方。六百廿六方。六百五十五方。二千八百七方ヨリ二千八百九方至。ヲ參照スヘシ

○第二千八百八十方過。傑。栗。屈。的。兒

白石鹼二刀

牛膽乾固者四刀

半夏一刀

右調勻為三十九衣石松粉晨夕服四九

〔主治〕腺病及ヒ英吉利病ヲ療スルノ良佐タリ殊ニ胃中

酸液ヲ挾ム者之ニ宜シ

○第二千八百八十一方〔同上〕

阿魏

括失亞越幾斯

白石鹼各一錢

薤謨安沒尼亞

幾

透明蘆薈各半錢

右調勻二匹為二九衣桂末準年齡早晚與五九乃至十九

〔主治〕腺病疴勞英吉利病其他補給機殊ニ骨質諸病ニ宜

シ

○第二千八百八十二方〔羅仙私的印〕

苗根半 井水五匕煮耗至二匕乘煮熟加後味

橙皮 茴香各一錢

右瀘過為飲料

〔主治〕英吉利病ニ宜レ

○第二千八百八十三方〔朴瀘私〕

苗根二錢 常水六勺煮乘煮熟投後味

橙皮黃 茴香各一錢

右瀘過取液三勺加砂糖會利別一勺調勻每一時服二食

匙

○第二千八百八十四方同上

苗根 白糖各一 桂三

右調勻為散分六裏每服半裏日三四服

主治右二方大率二歲兒ノ英吉利病ニ宜シ

○第二千八百八十五方藏歌蘭度

精製磷酸錢一 蒸餾水半 櫻實舍利別二

右調勻每服十滴乃至二十滴冷水點服日四次準症加增

主治英吉利病及ニ癰毒骨痛ニ宜シ

○第二千八百八十六方護私篤

刺蝟石 大黃各二 姜一 加耶普的油糖三

右調勻為散每服一茶匙日三服

主治腺病英吉利病等之ヲ佐藥トシ用ヒテ好

○第二千八百八十七方同上

甘汞六 麻屈涅失半 實芟荅利斯二 白糖一

亞刺毘亞趨謨廿二

右調勻為散分十二服早晚一服

主治英吉利病未本証ヲ具ヘスノ發熱シ手足腫脹疼痛

ヲ覺エル者之ニ宜シ但里歌利飲ニ纈草浸及ヒ安質没

尼酒ヲ加ヘ隔日ニ與フベシ

○第二千八百八十八方 穢歌蘭度疳勞散

鍊粉一 桂二 麻僞涅失亞五 白糖一
 右調勻為散分六包每服半包日三四服

○第二千八百八十九方護利秘

鍊粉一 蝟蛄石半 白糖二
 右調勻為散每服一茶匙日三四服

○第二千八百九十方遠突土

越質屋布一 麻兒秩斯十二 府利油糖二
 右調勻為散分十二裏每服一裏日三服

主治 二千八百八十八方ヨリ二千八百九十方至英吉利

病ニ宜シ○又鍊粉大黃各五一ラ配伍シ毎日二服スル

ヲ殊稱ス

○第二千八百九十一方山の地遠散刺

珊瑚里 葛兒儒別 口ニセラカフリ草名 フ未詳 へ

ルベナオヒシナル 同 テウクリカマードル 同 フ

子ヲ。互ル同上 フランタグピシルリ同上 各 ア

リスト口久口舌根 未詳 原本脫分量 按各等分乎

右細剉和勻

主治 此劑ヲ濃煎ノ小兒英吉利病ニ早午晚用フル毎服一小匙大兒ハ一大匙或ハ二大匙トス連綿久服ノ病患全ク除クニ至此之ニ兼テ脊推胸骨手骨關節ノ内側

遠西方膏
英吉利病
廣

的里亞加ヲ塗擦シ其部ニ上好蘆薈末ヲ撒布セシメ
麻布ヲ以テ纏裏シ三四日ノ後再塗擦スル至縛帶ヲ脱
セシムル勿レ但之ヲ塗擦スルト三四回或ハ四回ニ止マ
ルヲ常トス○此治法ハ山的地ニ在テ一婦人ヲ試驗シ
方今我邦ニ於テモ亦殆奇方ノ名ヲ得タリ那私屑名切
ニ之ヲ稱用シ每症偉効ヲ得タルコトヲ證セリ
○第二千八百九十二方(遠突土)

牛髓脂半一 上火熔解去汚放冷加後味

忽福滿六錢 振爾撒謨半一錢 振爾撒謨半一錢 露半一錢

右調勻塗擦脊胸及四肢

主治 英吉利病ニ宜シ

頸腫 ストロマ 羅コロツ
フゲス エル蘭

頸腫ハ間腺病ノ見証トシテ發ス此症通例本病ノ治法ヲ

處ノ平愈スルニ足レリ○然レ頸腫ハ多ク一種大氣ノ合

和或ハ水土或ハ其他未探究スベカラザルノ理ニ由テ一

地方ニ行ハル、風土病タリ其一地方ニ行ハル、頸腫ノ

奇藥ハ即海綿霜トス 二千八百九十三方 沃胃謨ハ更ニ峻

効アリ之ヲ丁幾去爾每服五滴乃至十滴砂 或ハ沃胃謨加

里 二千九百十一方 作ル者佳効アリ然レ沃胃謨劑ヲ内

服スルハ欬血肺勞全體羸瘦胸勞其他危險症ヲ將出シ易

遠西方膏

遠西方膏
廣月堂

キカ故ニ沃胃謨加里軟膏ニ作りテ外用スルヲ的當トス
二千九百十四方
二千九百十六方
○肺ノ感觸過敏ノ人ニ在テハ海綿霜モ
亦危険ナル者聞アリ此症ハ曹達二千九百七方殊ニ過炭酸曹達
二千九百九方ヲ用ヒテ更ニ偉効アリ而シテ後害アルナ
シ鑛泉ノ中ニ就テハヘイルブロン地名ノアデライデ泉腺
腫及ヒ頸腫ニ殊稱アリ

○第二千八百九十三方

海綿霜一 常水七

右少頃煮沸後置暖所飽熟六時濾過加桂水二勺每一時
半服二食匙

○第二千八百九十四方藏歌蘭度

海綿霜半 井水十二勺煮沸至五勺濾過加後味

桂水 橙皮舍利別各一

○右調勻每服一食匙日四次

○第二千八百九十五方

海綿霜三 加井水二勺少頃煮沸濾過加後味

薄荷水六 橙皮舍利別半 礪砂加過泥子精半

○右調勻早晚服一食匙

○第二千八百九十六方

海綿霜半 橙皮舍利別半

右調勻作散劑每服一茶匙日二三

○主治 右二千八百九十三方至頸腫二宜シ

○第二千八百九十七方律私篤

實芟荅利斯八八至 海綿霜半 苗香油糖二錢

右調勻為散分十二裹每服一裹日二三服

○主治 頸腫及腺病ニ宜シ

○第二千八百九十八方越矣葛爾度

海綿霜半 哥喜霜二錢 藥刺巴一錢 桂皮半 藤

黃一 栲椽油糖三錢

右調勻為散每服一二日失日三服

○第二千八百九十九方格爾黠謀

生安質沒尼 海綿霜 硫黃華 失鳩荅葉 牡蠣各二錢

右調勻為散早晚服半卯匙乃至一卯匙

○第二千九百方撥歌蘭度

海綿霜半 牡蠣末 栲椽油糖各一 越質屋布私密

涅刺列半

右調勻為散分六裹早晚服半裹

○第二千九百一方叔板爾託

失鳩荅葉二 曹達乾者 海綿霜 越質阿布私安質

透西... 卷... 頭腫

沒尼各六 白糖各十

右調勻為散分十二裹每服一裹日三服

主治二千八百九十八方ヨリ二千九百一方至頸腫ニ宜

○第二千九百二方 苛田人創製頸腫散

海綿霜 孕鹼酒石 白糖各半 精製礪砂 羌活末

桂末各二 金硫黃各一 萆薢各一

右調勻為散早晚服一大茶匙

○第二千九百三方 咩度人及孤刺上同頸腫散

海綿霜各半 麻僣涅失亞 消石 白糖各二

右調勻為散每服一茶匙日三服

主治右二方頸腫ニ稱用ス

○第二千九百四方

海綿霜 叔格刺度各二 達刺侃篤護漿適

右十匹為一錠每服一錠日三服

○第二千九百五方私

海綿霜 叔格刺度末 砂糖各半 達刺侃篤護漿

宜適

右為四十八錠衣桂末乾固每服一二錠日三服

主治右二方小兒頸腫及ヒ腺腫ニ宜シ

遠西之膏
頭腫
廣
肝
堂

○第二千九百六方〔私篤兒〕

硫黃安質沒尼〔附六〕 愈瘡木弓半 雙蘭菊越幾斯錢半

白糖錢十

右調勻加達刺侃篤趨謨漿適宜作錠六十枚每服一枚日二三服

〔主治〕頸腫腺腫等二宜シ

○第二千九百七方〔百失寄爾〕

精製曹達二錢至 蒸餾水四弓溶解

右調勻每服一食匙葡萄酒半盞或香竈藥泡劑和服日二次

次

○第二千九百八方〔同六〕

過炭酸曹達二錢 砂糖舍利別弓一 蒸餾水弓八

右調勻早晚服一食匙

○第二千九百九方〔穢歌蘭度〕

過炭酸曹達二錢至三錢 默栗薩水六弓溶解加桂舍利別

半弓

右調和每服一食匙日四服

〔主治〕二千九百六方ヨリ二千九百九方至頸腫腺腫等二宜シ

○第二千九百十方〔列墨爾〕

...

鹽酸加爾幾附一 蒸餾水六寸溶解加老利兒結爾斯
水二錢

右調勻每服三十滴日三服
主治頸腫及腺病ニ宜シ

○第二千九百十一方
沃胃謨加里半 蒸餾水 白蒸餅心各適

右為百五十九衣石松粉早晚服二九
主治頸腫白滯下及膝頭白腫ニ宜シ

○第二千九百十二方
沃胃謨加里十五 蒸餾水適 海綿霜末 蜀羊泉越

幾斯各五 甘草末適

右為百八十九衣牡蠣末每服六九日二三服
主治頸腫及腺病ニ宜シ○此方必感觸靈敏ノ人ニ用
フルヲ勿レ

○第二千九百十三方
蒲祿密優謨附六 蒸餾水半寸溶化

右早晚五滴砂糖水一匙點服漸加增
主治重証頸腫經久ノ者ニ用ヒテ神効アリ○蒲祿密優

謨ハ最危險藥タリ極少量ニ用フルモ食道侵蝕痛吐涎
輕証疝痛惡心泄瀉等ヲ發迅若久ク連進スルハ上ノ

諸証愈加重シ更ニ呼吸器ノ疾患。怔忡。及ヒ頭痛ヲ生シ
 或ハ瞳孔散開スル者屢之アリ更ニ大量ヲ與フレハ劇
 甚ノ腸胃焮衝症ヲ發シ終ニ痙攣ニ由テ斃ル。○呵林侃
 氏嘗テ上ノ溶液二十滴ヲ頓服セシメテ胃腸及ヒ呼吸
 器大ニ衝動スルヲ見ルト云フ○上款ノ如ク蒲祿密優
 謨ノ効アルモ亦尠カラズト雖病者ノ安全ヲ思ハゞ此
 ノ如キノ危険藥ハ必用ヒザルヲ優ンリトス 此篇此方ヲ載スル者ハ此書ヲ全備セシメシガ為ナリ

○第二千九百十四方 麻健蠶

沃胃謨加里 半錢 家猪脂 半錢

右丁寧調和作軟膏初早晚取半錢八日後取一錢塗擦

○主治頸腫腺腫。畢丸腫。攝護腺硬結腫。子宮癌腫等ニ宜シ

○第二千九百十五方 歌耳

沃胃謨加里 半錢 水銀膏 三錢至四錢 家猪脂 三錢

右調勻作軟膏每一時塗擦

○第二千九百十六方 秘謨拔屈

沃胃謨加里 半錢 加耶普的油 六錢 菲阿私越幾

斯心 家猪脂 一錢

○右調勻作軟膏弦月時朝暮取豆大塗擦

○主治右二方頸腫ニ宜シ○沃胃謨劑ハ外用モ亦久ク連

用スレハ後患ヲ遺スガ故ニ用ニ臨テ小心スベシ
○第三千九百十七方委私滿

德烏篤沃胃謨ハニ 新鮮家猪脂七錢

右不寧調勻作軟膏朝夕取豆大塗擦六 菲阿味缺六

○主治頸腫ニ宜シ ○頸腫ノ初起之ヲ施セバ通例十四日

内治ハ經久ノ症ハ此例ニアラズ此症治ヲ下ス片ハ

皮表刺戟ヲ要スト雖若此膏ニ由テ刺衝甚シキニ過ク

ル片ハ二三日塗擦ヲ休息スベシ

○第二千九百十八方没心失束鼓屬斯 官赤朝善ニ宜シ

德烏篤沃胃謨一乃至 單膏半 日對水一錢 金蘇

右調勻作軟膏

○主治頸腫ヲ治スルニ宜シ 德烏篤沃胃謨ハ此煩苦病ヲ

治スルノ峻藥ニ之ヲ用フル一月ニモ他ノ沃胃謨

劑三四月ノ功ヲ收シ嬌柔ノ人及ヒ頸腫經久ナラザル

者ハ每晚此膏ヲ塗擦シ而シテ皮膚赤色ヲ發シ疼痛スル

片ハ二三日休息スベシ 鱗屑剝脫ノ後再又塗擦スルニ

宜シ ○頸腫硬固且大ニモ既ニ經久ノ者ハ此塗擦法十

分ノ功ヲ收メ難シ此ノ如キハ硬膏ニ作りテ貼スルヲ

要トス但四日毎ニ硬膏ヲ更換シ大腫ヲ治スル片ハ時

時其位地ヲ改メ貼スベシ 頸腫柔軟ニモ未硬固ナラズ

所謂列印巴頸腫ナラハ假令大ナル者モ亦此法ニ由テ
 能ク解散スルコトヲ得没乙失束故屈斯石頸腫巨大ニシテ
 呼吸及ヒ血行ヲ妨ゲ將ニ窒息或ハ卒中ヲ發セントス
 ル症ヲ治セリト云ヌ○其病者皆最初上ノ軟膏ヲ塗擦
 スルニ由テ其危險ノ証狀既ニ去レリ然レ硬結著大ニ
 又既ニ化骨シ或ハ變質セル者ハ單純柔軟ノ頸腫ヲ療
 スルガ如ク多ク軟膏ヲ用ツルナシ又一地方ニ流行ス
 ル所ノ頸腫^{多ク}膿^{多ク}毒^{多ク}條^{多ク}ニ没乙失束屈斯氏德烏篤沃曹謨
 其治難シトハ^{膿毒條ニ没乙失束屈斯氏德烏篤沃曹謨}
 膏ノ歷驗說アリ^{一方三十世}宜ク參勘スベシ

○第二千九百十九方^{越魯濕屈}

格魯林加爾基^半 家猪脂^一

右調勻作軟膏隔日塗擦

主治頸腫ニ宜シ但之ヲ塗擦スレハ肌膚衝動甚シキガ
故ニ時時四五日間休息スベシ

遠西方彙

卷七

頭腫

第廿七

廣

別

姑二部部四五日間於患入
 正治起動之宜之臥之入金器之
 合服之利神膏劑日坐臥
 和蘭
 傑
 婆
 都
 譯

遠西方彙卷之二十七

獨乙 加幾安頓 著
和蘭 傑婆都 譯

侍醫法印伊東瑤川院 貞文仲 重譯

南洋伊東 亨健夫 參校

第七

依倔篤アルトリチス 羅イトガト蘭

依倔篤ノ治法第一急症慢症ヲ分別スルヲ要トシ急症ハ
唯自然ノ妙機ニ委任スルノ方法ヲ最勝トシ食養ヲ節シ

遠日丸
依屈篤
廣
肝
堂

發汗劑ヲ用ヒテ皮表ノ運營ヲ助ケ弗刺涅兒羊毛或ハ兔
皮ヲ以テ患部ヲ被覆スベシ但熾盛焮衝熱ヲ帶フル者ハ
消石或ハ礪砂ヲ以テ扁桃乳ニ和シ若クハ消石礪砂ヲ吐
酒石ト配用スルヲ良ト匹放血ヲ要スルヲ罕ナリト雖強
壯ノ人熱熾ニノ瀉血ヲ要スル者ハ患所ノ近傍ヨリ瀉ス
ベキナリ蓋蜚蟻及ヒ吸角法ハ急症ヲ轉ジテ慢症ニ變ジ
易キガ故ニ慎重ヲ加ヘザルベカラズ慢性依屈篤ハ急症
ト異ニシテ更ニ強法ヲ用フベシ即瘡瘡木六百一十一方至
六百一十八方二
千九百廿方至二
千九百四十方
雙鸞菊六百四十一方至
六百四十九方二
千九百四十四方
爾失屈謨六百二十七方
六百三十一方至
二千九百四十四方
依屈篤六百一十一方
六百一十八方至
二千九百四
十五方至二千

九百四
十七方
蜀羊泉二千九百
四十八方至
二千九百
六十九方
安質
沒尼劑六百八
十方至
二千九百
六十九方
汞劑六百
十九方至
二千九百
六十九方
九百五
十三方
至
二千九百
六十九方
肝油六百
廿五方至
二千九百
六十九方
等是ナリ
全身
微温湯浴
硫黃浴六百
四十九方至
二千九百
六十九方
華爾斯及
七拔爾撒謨薰
法六百
廿四方至
二千九百
六十九方
諸種打膿法六百
三十三方至
二千九百
六十九方
等亦皆扶
治ノ効アリ○蓋根治ヲ要スルキハ諸根治法ヲ行フニ宜
シ即カル、スバツトマリアバツトキツシゲン皆鑛
泉名並ニ過見
地ノ温泉子ンドル井スバーデ刺私達篤名地ノ温泉
ワルムブルンテテックトプリ皆温
泉名等皆施用スベシ

○第二千九百二十方〔拔爾批〕

瘡瘡木屑一弓至 井水四匕煮耗至一匕濾過加橙皮

舍利別二弓

右調勻每服一小盞一日服盡

主治慢性依屈篤二宜シ

○第二千九百二十一方〔弗貯爾田蒲蘭度〕

瘡瘡木屑錢 井水適宜煮四分時濾過取液一匕加格

爾失屈謨子酒二錢

右調勻每二時服半小盞

主治慢性關節痛二宜シ

○第二千九百二十二方〔穢歌蘭度〕

瘡瘡木屑 亞刺毘亞趨謨各二錢 蒸餾水六弓

已上作乳劑加後味

精製消石 安質沒尼酒各一錢 扁桃乳舍利別一弓

右調勻每一時服一食匙

主治依屈篤症熱退キテ局處ノ疾患持續スル者二宜シ

此乳劑ハ毎日上圍ニ行ラ度トシテ用フ

○第二千九百二十三方〔別連杜〕

瘡瘡木屑錢 純精酒石半弓 白糖六錢

右調勻為散每服一茶匙日三服

主治 依倭篤及七腹内壅塞症ニ宜シ

○第二千九百二十四方 透突土

癒瘡木天然脂末廿六 龍腦十二 金硫黄六 白糖

錢一

右調勻為散分十二裹每一時半服一裹

主治 慢性依倭篤及七依倭篤内陷症此方偉効ヲ奏スル

者アリ

○第二千九百二十五方 穢歇蘭度

癒瘡木脂半 金硫黄 甘汞 雙蘭菊越幾斯各二

纈草垂的兒油二 白糖一

右調勻為散分八裹朝夕服半裹

主治 依倭篤性頭痛ニ宜シ

○第二千九百二十六方 倚過秘密篤

雙蘭菊越幾斯一 癒瘡木脂四 薄荷油糖半

右調勻為散分八服早晚一服

主治 依倭篤ニ宜シ

○第二千九百二十七方 穢歇蘭度

癒瘡木脂半 硫黄乳半 金硫黄二 枸橼油糖半

右調勻為散分六裹取一裹分三服日三服

主治 依倭篤ノ素因ヲ除クノ奇方タリ 依倭篤ヲ患ヒ易

キ人毎月四日乃至六日間毎日上圍二三行ヲ度トシ此散ヲ與フレハ本症發作ヲ防止スル一確實ナリ

○第二千九百二十八方（弗蘭屈）

精製硫黄一錢 瘡瘡木脂末一錢 硫黄安質没尼一錢

葛兒儒別越幾斯適宜

右二匹為一九衣石松粉每服十九日二服

主治依倭篤慢性癩麻質斯慢性皮膚病ニ宜シ

○第二千九百二十九方（弗蘭屈）

瘡瘡木脂 越秋阿布私安質没尼各一錢 蜀羊泉莖越

幾斯二錢 砂糖舍利別適宜

右二匹為一九衣石松粉早晚服八九

主治慢性依倭篤及ヒ皮膚病ニ宜シ

○第二千九百三十方（百篤刺）

瘡瘡木天然脂 石鹼 蜀羊泉越幾斯 大黃末各二錢

右調勻二匹為一九衣石松粉每服六九日三服

主治慢性依倭篤ニ稱譽アリ

○第二千九百三十一方（律私篤）

雙蘭菊越幾斯 蜀羊泉越幾斯 亞兒尼加花越幾斯

瘡瘡木天然脂各二錢 金硫黄一錢 甘汞十五分

右調勻二匹為一九衣菖蒲根末每服五九乃至八九日三

服

主治慢性依倔篤ニ宜シ

○第二千九百三十二方（結私列爾）

瘡瘡木脂 蜀羊泉越幾斯 括失亞越幾斯 越秩阿

布私安質沒尼各一錢

右調勻二匁為一九衣石松粉每服五六九日二服乃至三

服

主治一切依倔篤殊ニ依倔篤性潰瘍ニ宜シ

○第二千九百三十三方（鑿達私丁）

瘡瘡木脂二匁 安質沒尼石鹼液附半匁

右調和每服二十滴乃至三十滴泡劑和服日三次

○第二千九百三十四方

雙蘭菊越幾斯一匁至半錢 瘡瘡木脂丁幾二錢 格爾失屈

謨酒半匁

右調勻每服十五滴乃至二十滴日三服

○第二千九百三十五方 噶刺歌八匁 依倔篤丁幾

加里丁幾附半匁 瘡瘡木脂揮發丁幾附二錢 阿芙蓉液

半錢

右調勻每服十滴乃至二十滴日二三服

主治右三方慢性依倔篤ニ宜シ

遠西方彙 卷之六 依倭篤 六 廣 財

○第二千九百三十六方（結列，印）

雙蘭菊越幾斯一錢 瘡瘡木脂揮發丁幾一 橙皮丁

幾二錢

右調勻每服二十滴乃至五十滴日三服

主治一切依倭篤殊々依倭篤性潰瘍ニ宜シ

○第二千九百三十七方（穢歌蘭度）

瘡瘡木脂揮發丁幾一 亞刺昆亞蘆謨漿二錢 扁桃乳

舍利別 橙皮舍利別各一

右調勻每服半匙日三服

主治經久依倭篤内陷ニ宜シ之ニ兼テ今ノ患部ニ芫菁

膏ヲ貼シ始ノ痛所ニ芥子泥ヲ施スベシ

○第二千九百三十八方（結列，印）

硫黃安質沒尼附半 瘡瘡木脂 紫堇越幾斯各一

水製大黃丁幾適宜

右一以爲一九衣石松粉每服十九日四服

主治依倭篤及ヒ慢性疹ニ宜シ

○第二千九百三十九方（海魯陳，佛別）

越質阿布斯密涅刺列半 瘡瘡木脂 白石鹼各二

金硫黃二

右調勻加苦味越幾斯適宜二以爲一九衣桂末晨夕服十

粒

主治慢性依低篤及レ癩麻質斯ニ宜シ

○第二千九百四十方

布律母茂爾名人清血丸做福

甘草 金硫黃各一錢

瘰癧木脂二錢

拔爾撒謨骨拜藿

宜適

右二八為一九衣石松粉早晚服ニ九四服

主治依低篤慢性癩麻質斯及レ慢性皮病等ニ宜シ○六

百八方及レ六百九方ヲ簡易ナリトス

○第二千九百四十一方

雙蘭菊越幾斯一八二八至三八

白糖半

右調勻為散令八服朝夕一服

主治依低篤ニ宜シ○雙蘭菊越幾斯漸加増ノ每服六八

ヨリ八八ニ至ル○急症轉メ慢症トナル者殊ニ雙蘭菊

ヲ稱賛ス六百四方ヨリ六百六方ヲ参照スベシ

○第二千九百四十二方破歌蘭度

薩昆那油二滴 雙蘭菊越幾斯一 白糖一

右調勻為散令八服朝夕一服

○第二千九百四十三方同上

薩昆那油一 硫加爾幾六 雙蘭菊越幾斯二 白糖

右調勻為散分四裏每服三分之一日三服

主治右二方慢性依倭篤ニ宜シ

○第二千九百四十四方 格爾失屈謨加阿芙蓉酒

格爾失屈謨子酒錢三 舍電阿芙蓉液錢半

右調勻早晚服二十滴乃至三十滴

主治依倭篤ニ殊稱アリ

○第二千九百四十五方 孤剌律私

依倭篤蓄薇葉附一 枸椽皮黃糖二

右調勻為散分二裏朝夕服一裏

○第二千九百四十六方 細砂

依倭篤蓄薇葉附二 井水九寸浸安暖所蓋閉飽熟十

二時

右瀝過取液早晚服一小盞

○第二千九百四十七方 速別倫歌愷

依倭篤蓄薇葉二錢至 熱湯九寸浸漬瀝過取液六寸

放冷加後味

雙蘭菊丁幾亞的兒 安質沒尼酒二 格爾撒謨字露

舍利別附一

右調勻每一時半服一食匙

主治二千九百四十五方ヨリ二千九百四十七方至經久

依屈篤及ニ依屈篤性麻痺ニ宜シ○蓋依屈篤蓄薇ハ功
ヲ收ムル者罕ナリ而メ頭旋嘔氣ヲ發スル一屢之アリ

○第二千九百四十八方 繆魯疾

蜀羊泉莖 薩撒弗刺私木 薩爾沙巴栗刺根 甘草
蘆根各一 瘡瘡木二 茴香二

右細劉調勻取二匙水二匕煮耗至一匕半小盞酌飲

主治依屈篤皮病經久癩毒ニ宜シ

○第二千九百四十九方 撒歌蘭度

含硫加爾幾安質母扭二 井水五匕煮耗至四匕

右每一時服半小盞乃至一小盞

主治慢性依屈篤ニ宜シ

○第二千九百五十方 百百喊蒲名 依屈篤丸

吐酒石三 雙蘭菊越幾斯一 瘡瘡木脂二

石鹼各二

右調勻二公為一九衣石粉每服十粒日三服

主治依屈篤症腹内壅塞ヲ兼ヌル者ニ宜シ

○第二千九百五十一方 栗屈の兒ル 解釋丸

吐酒石十八 亞兒尼加花末 續草末 白石鹼

護謨安沒尼亞幾 阿魏各二

右調勻四公為一九衣石粉每服八九乃至十九日三四

服
主治原黑障眼腹内經久ノ硬結腫ヲ兼ヌル症之ヲ稱用
ス而メ依屈篤症腹内確著ノ硬結腫アル者亦小量吐酒
石甚的當ス

○第二千九百五十二方〔新〕 彭 經

吐酒石六人至十二人 水適宜溶化 亞兒尼加或 續草或 蒲公英越

幾斯 白石鹼 護謨安沒尼亞幾 大黃各一錢

右調勻ニ人爲ニ丸衣石松粉每服四丸乃至八九日二服

主治同上○宿繆結爾丸千百廿 八吐酒石ノ量過多ナリ

宜シク此方ヲ代用スベシ

○第二千九百五十三方〔藏〕 歌 蘭 度

甘汞二 雙蘭菊越幾斯半 白糖半

右調勻爲散分八服每一時半一服

主治依屈篤腦ニ轉移セル者ニ宜シ之ニ兼テ頭上放蟻

項窩發疱膏及ニ始メ依屈篤ヲ患フル所ノ部ニ芥子泥

ヲ貼スベシ

○第二千九百五十四方〔連珍〕

升汞二 蒸餾水一弓半溶解加格爾失屈謨子半弓

右調勻每一時服三十滴乃至四十滴

主治急性依屈篤ニ宜シ○六百十六方及ニ六百十九方

ヲ參照スベシ ○第六百十六方及六百十八方

○第二千九百五十五方骨布至四百六方

升承 再餾燒酒適宜溶解加後味大風藥子

雙蘭菊越幾斯錢 阿芙蓉末七 過兒托末適

右為八十四丸夜過見托末每一時服二丸

主治依倭篤性疾患癩毒合併症之宜シ○之ニ兼テ每

日薩兒沙巴栗刺一ノ煎液ヲ飲服シ外氣ヲ避ケ食養

ヲ節ニスベシ

○第二千九百五十六方秘篤兒 白石鹼一 葛私篤樓謨 阿魏各一 板爾撒謨字露

適宜

右四丸為一九衣粉末每服三丸日四服

主治依倭篤ニ宜シ

○第二千九百五十七方遠突土

實芟荑荅利斯末 亞鉛花各十 刺蝟石半 白糖二

右調勻為散分十二服日四服

主治依倭篤胸内ニ轉移セル症及ヒ胸水等ニ宜シ○實

芟荑利斯ハ特ニ單純變形依倭篤ニ用フベシ局部水腫

及ヒ洩乙滲出症ヲ發セシ者ハ遠突土氏醋酸加里液或

ハ孕礪酒石ヲ加フル浸劑ヲ處ス但生力沈衰ノ者ハ甘

海鹽精ヲ加フ

○第二千九百五十八方〔穢歇蘭度〕

炭酸消石一錢

亞爾鮮越幾斯二錢

薄荷水四

橙皮丁

幾一錢半

橙皮舍利別一

右調勻每服一食匙日四服

〔主治〕慢性依屈篤ニ宜シ

○第二千九百五十九方

孤老田名

煤焙丁幾

煤焙帶光澤者半

炭酸剝篤亞斯半

礶砂二錢

接骨木

花水九

右安暖所飽熱濾過每服三十滴乃至六十滴日三服

〔主治〕穢歇蘭度ノ論ニ據ルニ依屈篤性惡液病ノ峻藥ト

ス又月經ヲ促スニ宜シ

○第二千九百六十方〔託爾〕

麥爾

硫黃安質没扭各一

鵝栗拔奴護二錢

蜀羊泉

莖末六錢

右調勻二匁為一九夜甘草末每服六丸乃至十九日三服

〔主治〕實性依屈篤ニ宜シ○託爾氏ノ說ニ據ルニ此方律

加斯名ガ發明ノ秘藥ニ最譽ノ依屈篤丸ナリ而ノ

依屈篤治方ノ中ニ就テ最勝タルヲ確實ナリ起熱衝動

ノカナク間發汗下利スルヲアリト雖食欲ノ復スルヲ

速ナリ又依屈篤症緩慢痺麻質斯ノ性ヲ帶ヒテ而ノ關節ニ激衝性ノ腫起ヲ兼ヌル者及ヒ石灰質凝結ノ假關節ヲ生スル者ニ上方最的當スト云フ

○第二千九百六十一方 [葛戾私]

護謨安沒尼亞幾 瓦爾拔奴謨 癒瘡木脂天然者 蘆

膏乾者 白石鹼各一 石炭油二

右調和為丸丸大每服六丸乃至十九日三服

主治慢性依屈篤ニ宜シ 葛戾私名ハ律加斯名ガ丸方

二十九百ニ代用スルニ此方ヲ以テス

○第二千九百六十二方 [葛巴影私]

硫黃亞爾箇兒錢一 加亞的兒一ヲ溶解

右内玻瓈壺密閉砂糖點服

主治慢性依屈篤及ヒ痺麻質斯ニ宜シ ○滿私歇兒度ト

言ヘラク此劑ノ臭味ヲ覆フハ裸燕麥粘汁ニ和服スル

ヲ最妙トス用法初毎服三滴日ニ二次後增加ノ毎服五

滴ニ至テ極度トハ効驗見ハルレバ皮表蒸發氣異常ニ

倍加ノ一種硫黃亞爾箇兒ノ臭氣ヲ帶フルト云フ六百

ハ方甲乙ヲ 參照スベシ

○第二千九百六十三方 [同上]

龍腦錢二 硫黃亞爾箇兒半ヲ溶化再加再留燒酒一ヲ

右供塗擦

○主治 依屈篤性儂麻質斯ニ宜シ殊ニ儂麻質斯性齒痛ニ

好六百廿八方及七百四十四方ヲ參助スベシ

○第二千九百六十四方滿私歌兒度

硫黃亞爾箇兒 錢二 甘扁桃油半

右丁寧調和作軟膏塗擦

○主治 依屈篤結節ヲ解散スルニ宜シ

○第二千九百六十五方 謁兒列爾名 依屈篤液

鹿琥精 忽弗滿液各二錢 加耶普的油 十二滴

右調和每一時半服十滴二十滴乃至三十滴

○主治 虛性依屈篤殊ニ内陷症 及ヒ諸種瘰癧病ニ宜シ二十九方

ヲ參照スベシ

○第二千九百六十六方 錢錢 蓮私 點存 斯

實百兒油錢 加耶普的油 半

右調勻每服五滴十滴乃至十五滴砂糖點服

主治同上

○第二千九百六十七方 菖蒲油四滴至十二滴 亞設印亞的兒一錢溶化

右每半時或一時服十五滴乃至二十滴

主治 虛性依屈篤ニ宜シ○之ニ兼テ菖蒲油ヲ燒酒ニ和

ノ塗擦スベシ

○第二千九百六十八方憲篤計

硫酸規尼捏一 鹽酸十五

格爾失屈謨子丁幾半

右調勻每服二三十滴日三服

主治 依屈篤性靜脈腫ニ宜シ

○第二千九百六十九方 朴爾篤蘭度地名 依屈篤散

健智亞那末 大黃末 アリストロク。ロキーント根

末 カマビチオス葉 カマトリオース葉 珊篤里

穗各等

右調勻為散每朝服一錢三月。次每朝服二刀三月。爾後每

朝服半錢六月

主治 此方千六百年代伊太里亞ニ於テ王子密蘭度刺 散ト名ケ依屈篤ニ稱譽セシ秘方ナリ其後英吉利ニ傳

ヘ朴爾篤蘭度候依屈篤ニ罹リ此方ヲ服ノ治ス櫻蒲 之ヲ稱賛シ試驗スルニ此ヲ服スレバ能ク依屈篤症ノ

發作治スヘシト雖後危險ノ肺病ヲ發スル者アリト云

フ鳩兒連名ノ說ニ據レハ此ヲ服スル者忽水腫喘息或

ハ卒中ニ罹ルト云ハ輒近之ヲ浸劑ト為シ小量ニ與ヘ

久シク連進セザルヲ佳トスハ上ノ諸說ヲ除ゲハ則此

方慢性依屈篤ヲ治スルニ甚的當ス

○第二千九百七十方〔遠突土〕

家猪脂二錢

硝酸私的列幾尼捏〔附二〕

右調勻作軟膏塗擦日二次乃至三次

〔主治〕脊椎ノ依屈篤症交感ノ胸内逼迫ヲ發シ易シ此症

上ノ軟膏ヲ塗擦スレバ速ニ寛解ス硝酸私的列幾尼捏

ヲ内服スルモ亦屢稱贊ス然レモ慎重ノ醫ハ此危藥ヲ内

服ニ供スルコトナカルベシ

○第二千九百七十一方 秩利澎私名硬膏

水銀硬膏 失鳩荅硬膏 草零陵香硬膏各等分

右捏和

○第二千九百七十二方 煤始剥荅噶刺硬膏

薔薇油二

蠟新製佳香者五

鉛糖半

煤始六錢

阿列

襪油二錢

右調勻作硬膏

○第二千九百七十三方 叔繆結爾名阿魏膏一解凝膏

阿魏一 蘄謨安没尼亞幾三 白石鹼半 阿列襪油

二錢

右調和作硬膏蠟紙包裹

○第二千九百七十四方 歲印失屈篤名發汗膏

別埵兒留謨沒藥屬附 格碌波尼亞各二 黃蠟四

精製護謨安沒尼亞幾一上好乳香二阿里拔奴謨二

錢一珊達刺加脂半琥珀一黃色者半的列並底那一

右

○第二千九百七十五方 同上提別倫私

黃蠟三格碌波尼的列並底那者透明別埤兒留謨

附各護謨安沒尼亞幾一瓦爾拔奴謨一珊達刺加脂

錢各三一拘椽汁六上好松香一乳香各一

右

主治已上ノ硬膏一千九百七十五方至及七加爾幾加爹

爾硬膏六百四戒歇蘭度樓麻質斯六百四瓦爾拔奴謨膏

附 及七往昔稱譽セシ私遠歇爾名二十三味製ノ剥荅嚙

刺脚部依屈名硬膏等ハ虚性依屈篤依屈篤性麻痺或ハ瘰

癰ニ効ア益局處焮衝或ハ全身熱ヲ帶フル者ハ用フ

ベカラズ〇吐酒石軟膏及七硬膏六百廿五方至六百廿

骨布氏赤降汞軟膏六百廿吐根軟膏六百廿毛亦皆用フ

ベシ

○第二千九百七十六方 布刺秩爾名昆布

拔爾撒謨加附六赤幾那薩兒沙巴栗刺根撒

爾非亞葉各一雜腹蘭再留燒酒三

右

主治 此芭布ハ諸依屈篤症ニ時期ヲ論セズ用ヒテ佳効
 アリ顯爾列^レ名ノ説ニ據ルニ此芭布ハ依屈篤ノ發作ヲ
 メ速ニ振起セシメ以テ序証ノ時期ヲ短カクスト又發
 作ヲ速ニ終ヘシメ不正ノ經過ヲ順正シ腫起ヲ分解シ
 内陷セル依屈篤ヲ再關節ニ喚起セシムト云フ○顯
 爾列氏ノ此芭布ヲ稱賛スルヲ恐クハ甚シキニ過タリ
 ト雖他醫モ亦此ヲ歴驗メ依屈篤ノ發作ヲ緩メ且短カ
 クスルノ効カアルヲ確定セシ然レ濕濡ノ劑ハ必依
 屈篤ニ用ヒテ危險ナリトハ遊走依屈篤及ヒ依屈篤再
 發ヲ希望スル症ハ決メ濕濡劑ヲ施スコ勿レ依屈篤内

陷ハ芥子泥ヲ貼メ再喚起スルヲ速ナリ但後直ニ芭布
 ヲ貼スルヲ的當トス○遠突^ト土^ト名^ト膝頭依屈篤腫ニ濕劑
 ヲ施メ其症緩和スル者一タビ經驗セリト雖其他之ヲ
 實驗メ未効功アル者ヲ見ザリシト云フ

第八

失苟兒陪苦 スッルビゴキス羅シ
ケウルボイク蘭

諸清涼酸性ノ菜蔬果實萬箇ヲムメナス。大根ノ
一種葱蒜^シ

ルコ^ルル^ル菜蔬^ノ名^ト芥子^ノ酸性木實^ノヤンスベス。コロイスベス。木
實

名^ト拘櫟等ハ総テ失苟兒陪苦ノ殊効藥タリ之ニ兼テ清涼

ノ空氣ヲ引キ清水ヲ用フルルハ輕症ヲ治スルニ足ル其

遠西方書 卷之七 失荀兒陪苦 十一 廣 肚 堂

他麥藤煎 麥牙二北二水六北ヲ注キ飽 上好麥酒 溜謨 酒名及

砂糖ヲ混和セル水多量 枸椽汁ヲ加ヘタル葯私ヲ稱用

凶藥劑ハ諸種ノ辛癖植物即山蒼菜酸模碎米薺 二千九百七十七方

至二千九百等及ニ鑛酸 二千九百方 ヲ用ヒ大衰弱ノ者ハ亞

爾鮮珊篤里橙皮菖蒲根等ノ浸劑 二千九百方 幾那煎等ヲ最

良トス○皮表赤斑ヲ發スル者ハ尋常醋或ハ香竈醋ヲ以

テ洗フベシ齒齲失荀兒陪苦ハ收斂含漱水及ニ塗藥 二千九百

九十三方至二千九百九十九方 ヲ與ヘ失血スル者ハ明礬溶液等ニ宜シ

○田舎間ノ失荀兒陪苦ハ每一時忽布酒 麥酒類 二匙ヲ與ヘ

テ偉効アリ失荀兒陪苦潰瘍モ亦此ヲ外用スベシ

○第二千九百七十七方 布連幾 山人 山蒼菜酒

山蒼菜 一弓半(一本) 作二弓半 蔣蘿蔔根 弓二 松芽 弓一

已上三果内玻璃壺注冷麥酒四匕蓋閉浸漬二十四

時

右每服一盞或一盞餘日三服

○第二千九百七十八方 別連越

大麥 三 井水三匕煮耗至二匕濾過加後味

枸椽汁 弓半 白糖 適宜味 佳為度

右小盞酌飲

○第二千九百七十九方 秘拔爾地

遠西方書 卷之七 廣 肚 堂

○蔣蘿蔔根二 井水四 浸漬一二時絞濾加後味
白糖適宜味佳為度
右食匙酌飲

○第二千九百八十方別連杜
未熟橙汁三 枸橼汁新絞者半 井水一七 上好葡萄
酒六 白糖適宜味佳為度

右調勻為飲料
○第二千九百八十一方
山薺菜汁 碎米薺汁 睡菜汁各新絞者

○右濾過清定加列印酒少許一日服盡

○第二千九百八十二方福屈篤

碎米薺 酸模各四 蔣蘿蔔屑一
已上三味絞濾取液清定加後味
上好列印酒七 覆盆子舍利別二

右調勻每服一盞日三服
○第二千九百七十三方春埵隣
山薺菜二 芥子末半 白葡萄酒七 浸漬三日濾過
取液加甘海鹽精二錢

右調勻每服半盞日三服
○第二千九百八十四方 噶利名 失苟兒陪苦飲

○生酸模葉 生山牛房根各一 加井水四匕上火煮

水隨八分時投後味三

蔣蘿蔔 山薺菜 碎米齊 睡菜各一

右蓋閉下火冷定後濾過小盞酌飲

○第二千九百八十五方 山薺菜昆設兒弗

生山薺菜葉三 內大理石白木杵搗爛後加白糖末六

分作昆設兒弗益于會

右茶匙酌飲

○第二千九百八十六方 舍電發謨名 失苟兒陪苦煉膏

○山薺菜昆設兒弗二 酸模末一 半夏末錢二 橙皮舍

利別適

右作煉膏一日服盡

○第二千九百八十七方 山薺菜昆設兒弗半 菖蒲根末錢一 橙皮舍利別適

已上三果調和作煉膏加後味

硫酸密發斯去爾適宜味佳為度

右每二時服一茶匙

○第二千九百八十八方 接骨木花水六 山薺菜精半 枸橀汁新絞者 麗春

花舍利別一

遠西方藥

卷七 十一 廣甲堂

右調勻每二時半服二食匙

主治二千九百七十七方ヨリ二千九百八十八方至失苟

兒陪苦ニ宜シ

○第二千九百八十九方鬼越索斯

鹽酸一錢至半錢

覆盆子水四

右調勻每半時或一時服一食匙

主治失苟兒陪苦打撲斑律別阿刺等ニ宜シ

○第二千九百九十方弗附兒田蒲蘭度

菖蒲根錢

滾湯適宜浸漬瀝過放冷取液一比加後味

亞爾鮮越幾斯錢

忽弗滿液半

右調勻每一時服半小盞

主治失苟兒陪苦ニ用ヒテ生カラ助クルニ宜シ

○第二千九百九十一方地爾結列

赤降汞四

生安質没尼四

甘草越幾斯適

右爲八十九衣石松粉早晚服五丸

主治癩毒失苟兒陪苦合併症之ニ宜シ此症ハ先失苟兒

陪苦ヲ治スルヲ通例トス然レ病狀切迫益増劇スルキ

ハ亦癩毒ヲ併治セサルヲ得ス此時ニ臨テハ赤降汞

ヲ好トス何者速ニ吐涎ヲ發スルヲナケレハナリ○上

方八十九ヲ服盡ノ後赤降汞ノ量ヲ増メ六分ヨリ八分

○第二千九百九十二方 同上

硝酸一錢或二錢

沙列布煎

四至八錢取之

覆盆子

舍利別二至

右調勻每半時或一時服一食匙

主治癩毒失荷兒陪苦ヲ合併セル者十二時間ニ此ヲ服

盡セシメ鑛酸類殊ニ硝酸ハ上症ニ用ヒテ永劑ニ優レ

○之ニ兼テ幾那煎那皮ニテ乃至五至水五比乃至十

取蜀羊泉莖煎胡桃殼煎劑日ニ一乃至越幾斯劑每及

他ノ失荷兒陪苦藥ヲ與ヘテ以テ其治ヲ助クベシ四十

六方ヲ參照スベシ

○第二千九百九十三方 傳過秘綴

芸香 撒爾非亞各二錢 注滾湯十二ヲ浸漬濾過取液放

冷加後味

山萸菜精二 紫釧丁幾

右調勻為含漱水

主治口中ノ失荷兒陪苦ニ宜シ

○第二千九百九十四方 律私寫

沒藥丁幾 桂丁幾各一錢 癒瘡木脂丁幾二錢 山萸菜

精一

右調勻取一茶匙加水二食匙含漱

主治齒齲失荷兒陪苦宜シ 山薺菜

○第二千九百九十五方

山薺菜精一錢 沒藥丁二錢 阿仙藥丁一錢 刺達尼丁

各一錢

右調勻名齒齲丁幾去爾

主治齒齲失荷兒陪苦ノ失血ニ宜シ

○第二千九百九十六方格爾黠護

撒爾非亞葉一握 加赤葡萄酒適宜煮濾過取液八多加

後味

玫瑰蜜一錢 鹽酸一錢

右調勻含漱

○第二千九百九十七方弗肝爾田蒲蘭度

櫛皮半 井水適宜煮四分時投撒爾非亞葉二錢蓋閉

浸漬放冷八分時濾過取液一匕加後味

山薺菜精半 生明礬二錢

右調勻含漱

主治右二方失荷兒陪苦口中失血ニ宜シ

○第二千九百九十八方地口爾結列別兒

苦味越幾斯 紺百設木越幾斯 沒藥丁幾 鹽酸各半

錢 尋常蜜二

○右調勻為塗液

○第二千九百九十九方同上

刺達尼越幾斯一 生明礬末半 沒藥丁幾 阿仙藥

丁幾各半 山箭菜精 亞刺昆亞蘆謨各半

右調勻名齒齶丁幾失爾

主治右二方齒齶失苟兒陪苦潰瘍三宜シ並二發益閉

○藥二千九百九十九方

本藥曰會

遠西方彙卷之二十七

江戸芝神明前

書肆

和泉屋吉兵衛

