


保赤全書

Kitasato Memorial Medical Library

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31





F
木-42

Kitasato Memorial Medical Library

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


29

30

31



17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51



490.9

Ho-14

No. 1949

12 h 53-2



富士川文庫

1185



保赤全書卷下

龔居中 增補

管 擇 編 著

吳文炳 較正

女人出痘 第九十三


女人出痘其輕重固已一槩論矣然十四歲之後天癸通人者則又不同蓋天癸既至陰常不足痘瘡以氣爲主血爲附氣以充之血以濡之二者不足則變患易生此又不可不審察之也且如發熱之初正遇經水如期而來此熱隨血解瘡自發出不必施治若遇四日而不止者則熱入血

宰血必妄行爲內動中虛之症矣宜涼血地黃湯一百加人參治之

非經行之期於發熱時而經忽至者此毒火內熾逼血妄行之故瘡必多毒必盛急用涼血解毒湯二百倍加速翹牛蒡使熱得清毒得解痘得出經水止方無變患遲則內虛瘡必陷矣或柳花散亦可三

正當起發灌漿之時適遇經行過三日不止者瘡必應起發而不起發應灌漿而不灌漿頂平形塌或灰白色或黑陷此爲經血去多陰氣虧耗爲陷伏癰瘡矣急宜八物湯大夫地黃加黃芪木香熟附子以調元氣或胡

葵酒噴之使瘡起發灌漿或出增痘者爲苦若寒戰咬牙喘急腫滿手足厥冷者爲內脫不治之証矣一起發灌漿之時經水適來忽口癰而不能言者乃血交少陰不能上榮於口也宜先以當歸養心湯王之三加桂其能言後以太補湯治之二或猪心血調服亦可三待一經水不斷之時適逢出痘身發壯熱神昏沉言語狂妄如見神鬼子衣櫛空此行經之後血室空虛不行邪熱壅虛而人犯於衝脈蓋肝藏血衝爲血海肝藏血開竅於目神昏者魂亂也自妄見者視亂也妄言者肝移熱於心也宜瀉肝散三百



一正值崩漏不止氣血俱虛之後適逢出痘此必不能勝任宜大補其氣血以十全大補湯一百八物湯加木香黃芩官桂主之使裏氣充足毒無停留更可飲食則可保全否則倒壞不治矣


一向來經閉不通血海乾涸適逢出痘毒氣拂鬱於衝任之間二下陽之症併發其熱必甚若攻擊之則血妄行不止毒亦不出爲喘急爲腫脹爲陷伏矣須調其心脾使之得發洩庶可以保以歸脾湯三十五逍遙散治之然亦得脾胃和平飲食增進方可取效

一痘瘡起發至泡漿數日最宜表裏無病飲食如常若當

此時忽然行經者人但知醫穢以觸正痘殊不知此乃已之血安得爲醫但恐血出裏虛而生陷伏之變急宜救裏解毒大補湯一百五之

刀子婦出痘第九十四

姪婦最忌出痘蓋熟能動胎落則血氣衰敗必痘不能起發灌漿而命其危矣故孕婦出痘深爲可慮蓋痘之用藥多主溫補如半夏肉桂之類皆姪婦所忌而黃芩烏附又非痘家所宜故遇此痘者不問輕重悉以清熱安胎爲主不可觸動其胎宜安胎散一百加黃芩芍藥主之血動者四物湯五十六加芩連治之及罩胎散一百七佐之身熱足冷腹脹



者八物湯三百加木香脾氣虛不進飲食毒發不出者四君子湯四百加木香糯米紫艸胎動不安者安胎散大加砂仁痘出相審者參薯內托散四十加紫草芍藥當歸單身熱有外邪無內症者參蘇飲三加木香更以如聖散三百爲主隨症加減如初發加升麻葛根連翹痘出太甚加酒炒黃連大力子連翹山梔不起發加大力子白芍藥口渴加麥門冬知母天花粉痰多加半夏所謂可擾而擾似平無擾故雖有胎不忘半夏也惟在用之者審之耳

一痘瘡正在起發灌漿之時忽遇坐草分娩之期此氣血俱虛之候宜大補湯二百加熟附子主之以補氣血固表

裹若產後小腹急痛者此血未盡也黑神散三百小兒與行之不必拘泥若寒戰咬牙腹脹作渴足冷身熱者此脾胃內虛外作假熱也大補湯二百加熟附子一劑更用四君子湯四百加黃芪當歸陳皮木香多服止者吉不正者凶

一方產之後或半月十日之間適逢出痘此無胎孕繫累止以大補氣血爲主以前大補湯二百八物湯三百去芍藥與服之痘出多者加連翹大力子大便自利者加肉荳蔻只照常一體用藥施治不必妄爲多疑之慮反致變恨也

痘症要訣曰。姪婦出痘後醫之時。胎落者多無事。發熱初出之時。胎落者猶或可救。若時當起脹貫膿而有犯此者。多致不救。益血氣衰敗。不逐毒然也。

麻疹症治 第九十五

古謂麻卽疹也。疹出如麻成朵。痘出如豆成粒。皆象其形而名之也。夫胎毒一也。痘出於五臟。臟屬陰。陰主血。故痘有形而有汁。其痘寒熱俱有也。疹出於六腑。腑屬陽。陽主氣。故疹有形而無汁。其痘多實熱而無寒也。爲痘既異。則治法亦殊。痘宜內實可用補劑。疹忌內實。只宜解散。惟初發之時。略相似耳。既出之後。痘則補氣以生血。疹宜補陰。

以制陽。何也。蓋疹熱甚。則陰分受其熱。而血多虛耗。故治以清火滋陰爲主。而不可少動其氣。若燥悍之劑。首尾當深忌也。世知痘症所係之重。而不知疹之數人尤甚。方責多忽而不備。良可太息矣。


一疹發熱之初。多似傷寒。惟疹子。則咳嗽噴嚏。鼻流清涕。眼泡腫。其淚汪汪面浮腫。雙腮赤。惡心乾嘔。爲異。耳但見此候。卽是疹子。便宜謹避風寒。戒葷腥厚味。用藥以表散之。被皮膚通暢。腠理開豁。而疹毒易出也。

一痘疹之發。雖曰胎毒。未有不由天行癘氣而發者。故用藥發散。必先明其歲氣。加時令溫暖。以辛涼之藥。發之。

防風解毒湯言 暖熱以辛寒之藥發之 黃連解毒湯言
太寒以辛溫熱之藥發之 雄皮解毒湯言 時寒時暖以
辛平之藥發之 升麻解毒湯言 此因時用藥不可悞作
傷寒妄施汗下反伐天和也 又須看入虛實如太便秘
結煩熱甚而發不出者以酒太黃微利之 吐利不止以
參芍之類補之 經云毋實實毋虛虛損不足補有餘禾
人性命也

用前藥發散而疹即隨見則毒盡解矣若發不出再加
藥發之如加味麻黃散言 之類外以芫荽酒糟蒸熱擦
之自頭上至足爲齊若出見而頭面愈多者爲加若遲

延日久而不發出則腹脹氣喘皆咳悶亂煩燥而死矣
一劄麻出之法多以耳後頸上腰腹先見其頭尖而不長
其形小而均者尚也君色見紅者兼火化也症輕可
治化斑湯言 主之 人參白虎湯言 佐之如色白者此血
不足也養榮湯言 主之如色紫赤乾燥暗晦乃火盛毒
熾宜六十一散言 解之 四物湯言 去生地加柴胡黃芩乾
葛牛子紅花蓮翹之類滋陰涼血而熱自除所謂養陰
退陽之義也此亦五死一生之症外大青湯言 玄參解
毒湯言 勿可選而用之若黑色者則熱毒尤甚爲十死
一生之症此尤不可不明察之而混爲施治也



傷寒之病
卷一
一 瘰，表後紅影出於肌膚成片切戒。風寒生冷加一犯之，則皮膚閉色毒氣壅滯遂變爲渙身青紫而毒返內攻，煩燥腹痛氣喘悶亂諸症作矣。欲出不出危亡立至，醫者其可忽諸？

一 瘰已出而反沒者乃風寒所逼而然也。若不蚤治，毒成內致必致庠場而死。急用消毒飲五合升麻湯五熱服，則瘳復出而安矣。

一 發熱之時遍身汗出者此毒從汗散，太府開，瘳易出也。有鼻中血出者此毒從血解也俱不可遽止之。若汗出太多，血出不止者此又火甚逼追太過致液妄流血瘀。


行矣急宜以當歸六黃湯三加深小麥七止汗，茱花湯三加玄參百草霜以止血。遲則汗出而元氣虛，血出多，而精神散爲不治症矣。
一 發熱之時或嘔吐或自利或滯下者此火邪內逼毒氣上行則吐下行則利毒至甚則裏急後重而爲滯下也。吐者竹茹石膏湯三主之自利者升麻泄瀉湯四主之滯下者黃芩芍藥湯四加黃連生地木通當歸人參枳壳治之。或少加大黃微利之。
一 發熱之時未有不口渴者但當以葛豆蔻心炒冰湯飲之。人參白虎湯佐之八以生津雖熱而已。若恣飲冷水，

恐生水畜之症故水入於肺爲喘爲咳宜用葶苈以泄
肺中之水水入於脾爲腫爲脹爲自利水入於胃爲呕
爲穢爲利宜用猪苓澤瀉茯苓以洩脾胃之水水入於
心爲憊爲驚宜用赤茯苓木通以洩心下之水水入於
肝爲胸痛用芫花以洩肝水水入於腎與膀胱爲小便
不利爲陰囊腫用車前木通以洩膀胱之水俱當隨其
証而治之

一疹出之時咽喉脣痛不能飲食者此毒火拂鬱上薰咽喉
候也宜甘桔湯百加玄參牛蒡子連翹主之更以千金
散三百壓鎖匙百吹之切不可妄用鍼出血也

一疹出之時咳嗽口乾心煩者此毒在心肺發未盡也薦
白散四言加天花連翹玄參芍藥以瀉心或黃連杏仁湯
百至之

一疹出之時自利不止或瀉稀水頻數者最爲惡候但要
看其疹若遍身稠密太盛或紫色或紅色甚者則又不
妨蓋毒在太陽非泄則營遇不解惟用平田散三言加葛
根連翹以解之而已疹一發隨依期取去自然瀉止若
疹已收而瀉尤不止者疹必未盡兼用前藥加連翹黃
連牛蒡木通澤瀉以分利之若用詞子肉蔻等滯滿之
藥則變腹脹痞滿喘急不治之症矣



一疹子之出，常以六時卽收爲度。如子後爲陽，午後爲陰，子後爲陰，午後爲陽。午後爲陰，子後爲陽。乃陽生陰成，陰生陽成，造化自然之妙也。故漸出而漸收者，其勢輕可若一出之後，熱不退，連綿三四日而不收者，此毒火太盛，外發未盡，內有餘邪所致。須投以化班湯三錢、三味消毒飲三錢加玄參石膏、桔梗爲治。


一疹子出後，自然退熱。若遍身旣出，而猶拂拂煩熱頻作，嘔吐者，此毒尚未盡留連于肺胃之間，宜化班湯三錢主之。如太便秘者，少加大黃微利之。

一疹已收去，反渾身發熱，晝夜不退，此毒未解，盡邪火鬱

於肌肉之間。久則毛髮焦乾，皮膚枯槁，肌肉羸瘦，爲骨蒸痨瘵之症。急宜蘆薈肥兒丸三錢加龍膽草。當歸連翹等治之。遲則變爲睡，則露睛，口鼻氣冷，手足厥逆，瘛瘲慢脾風。不治之症矣。

一疹收之後，身雖不見羸瘦，但時發壯熱，煩燥不寧，搐掣驚悸，神昏志亂者，此陰血衰耗，致餘毒入肝而傳於心也。宜養血安神四物湯五錢加麥門冬，酸棗仁，淡竹葉，炒心，甘草石菖蒲，龍胆草，茯神，黃連，辰砂爲治。或以前藥爲末，用蒸餅，猪心血爲丸服亦可。

一疹毒入胃，久而不散，致成牙齦黑癟，血出爲走馬瘖停。



於兩頰浮腫。久而穿頰破腮缺唇崩鼻爲崩砂狐惑等危証矣。外用文蛤散三言。雄黃散四言。搽之內用人中白薑。


晉史君子肉龍膽艸黃連五靈脂浸蒸餅爲丸。滾水服之。以清胃火。亦或有得愈者。然不能多見也。

一疹出之時。曾作漏痢。未經清解。至疹退之後。變爲休息痢。不問赤白。裏急後重。晝夜無度。頻併者。此餘毒在大腸也。須分虛實治之。實者。三黃丸三言。利之虛者。香連丸四言。和之。後用黃芩湯四言。養血行氣爲治。潤日養血。而下利自止。行氣而後重自除。誠哉斯言也。鑒之。

一疹退之後。微微咳嗽者。此餘毒未盡也。用清肺飲百加二。

消毒飲百加二。主之。若咳甚。氣喘。連聲不往。名爲頓嗽。甚至飲食湯水俱滯出。或咳出血者。此熱毒乘肺而然也。宜多服麥門清肺飲百加二。加連翹。主之。若見胸高如圭。肩聳而喘血從口鼻出。擺首搖頭。面色或白或青或紅。而色枯黯者。不可治之矣。然亦有肺氣虛爲毒所遏而發喘。連聲不已。但無咳嗽血出。滯食之症者。宜用清肺飲百加二。倍加人參。治之尤不可拘於肺熱之一端。而純用清肺解毒之藥也。

一疹退之後。聲啞不出。或咳或喘。或身熱不退。以致日久而不愈者。此熱毒未盡。肺金受犯故也。宜清金降火湯。



言加竹瀝姜汁王之

一疹退之後飲食如常動止妙故乃卒然心腹絞痛遍身汗出如水者此因元氣虛弱失於補養外雖無病裏實虛損僨然爲惡氣所中謂之中惡此朝發夕死之症


疹退之後熱毒未盡或發壅毒肢節疼痛者以恙活散

言微汗微利

疹退之後有餘熱未盡或熱甚而失血者犀角地黃湯

半合解毒湯半或四物湯半加茵陳木通星角之類以利小便使熱氣下行而後愈也

疹收之後餘熱未盡日夜煩躁譎語狂亂者辰砂益元



後方無禁忌也

一孕婦麻疹當以四物湯倍加白朮條芩艾葉安胎清熱爲主。使胎無虞而疹易沒也。如胎氣上冲急用苧麻根艾葉煎湯磨生棗榔并服之更多服上藥爲妙。一熱毒蒸胎胎多受傷胎雖傷而母實無恙也。蓋疹與痘不同。痘宜內實故胎落而母亡。疹宜內虛故胎去而母存。雖然與其胎去而母存孰若母子兩全之爲愈也。麻疹輕重不治三症要訣 第九十六

或熱或退五六日而後出者輕。發透三日而暫沒者輕。紅滋潤頭面勺溼而多者輕。頭面不出者輕。


紅紫暗燥者重。咽喉腫痛不食者重。冒風沒早晉重。發熱大腸變痢者重。黑暗乾枯一出卽沒者不治。鼻扇口張目無神者不治。鼻清糞黑者不治。氣喘心前吸者不治。

水痘症 第九十七

夫水痘亦類傷寒之狀。身熱一二三日而出。或或咳嗽面赤脹光如水。或噴嚏。或唾涕。與正痘不同。易出易厭不宜燥濕。苟能燥之亦不為害。不能結痂矣。

麥湯散古本只此一方。或作湯服亦可。

地骨皮 滑石 芫艸各五 甜葶苈 麻黃



大黃

知母

卷活

人參各一錢

右爲末每服五分用小麥七粒煎水服

治痘諸方

第九十八

(一)敗毒散治初熱壯盛等症

升麻

乾葛

紫蘇

川芎

地骨皮

枳壳

牛蒡子

蟬退

山楂

桔梗

甘草又方無乾葛加紫艸

右姜一斤水煎加葱白汁五匙熟服如熱甚加柴胡

黃芩

夏加香薷

冬加麻黃

鴻

加豬苓

澤瀉

(二)蘇解散治初熱頭痛或腰痛腹痛焦脹一切熱毒

紫蘇

乾葛

防風

荆芥

白芷

蟬退

紫艸

升麻

牛子

木通

甘艸

右各等分加灯心七根葱白七莖水煎熟服

(三)參蘇飲治壯熱風癩寒熱體虛咳嗽

陳皮

茯苓

半夏

牛草

桔梗

紫蘇

乾葛

前胡

人參

冬加麻黃

右姜三斤葱一莖水煎熟服

加山楂尤妙

(四) 麻黃湯

麻黃三錢 杏仁一錢 桂枝一錢 甘草七分

右姜葱水煎熱服

五 升麻葛根湯 治初熟者甚變似未明服此或痘已出而未熟甚者

升麻 乾葛各一錢 甘草五分

右姜葱水煎服 痘色紅班者芳飯紅花四用

六 升麻 薑根尖各五分 山楂牛子各一錢 冬加麻黃一錢 服

此痘易出易斂

六 和解湯 解表紓中

升麻 乾葛各一錢 白芍一錢 人參一錢 防風各七分

七 川芎八分 甘草五分
右姜水煎服

八 人參卷活散 治痘瘻甚者熟諳諳醫者

人參

卷活

獨活

柴胡

前胡

防風

荆芥

葛芩

甘草

枳殼

桔梗

川芎

茯苓

紫艸

地骨皮

牛子

蟬退

天麻

又方無獨活有猪芩

澤瀉


右水煎熱服 如熱不退雖服數劑不妨

八 解毒疎痘湯 預服燒熟去毒已出服熟毒班疹

又治紅紫口乾壯熱

華蓋

班疹



防風

荆芥

羌活

柴胡

川芎

白芷

當歸

連翹

黃芩

黃連

麻黃

紫草

赤芍

甘草

桔梗

右姜葱水煎服

九加味葛根湯治痘尖表發熱諸證

升麻

葛根

荆芥

防風

連翹

木通

右水煎服

赤芍

牛蒡子

十六靈丹

治壯熱癩狂發驚癲語紅紫班焦乾冒一切惡病

白滑石

飛過三兩

雄黃

飛過三錢

硃砂

飛過三錢

牛黃

斤腦各壹錢

犀角

三錢

麝香

五分

右共研細和勻將升麻甘草防風薄荷灯草生子紫草
紅花黃連各二錢水二十碗煎至半碗細布攏去渣加
蜜四兩同熬滴水成珠爲度和前藥丸如小龍眼大
金箔爲衣每用一十九灯心湯下暑月冷水化下

大凡痘有熱毒陷伏等証解毒藥內加入三分妙方
(三)無比散 初熱服痘出自稀又治痘夾黑點子及黑陷黑
痘等症

硃砂

一錢

后腦

麝香

牛黃

各五分如無牛黃用牛胆

星南

膩粉

二錢

一方有蟾酥

右合研爲細末，一歲兒服一茶匙，大者五分，刺豬尾血二

兩，熱新汲水調和送下，取下物如爛魚腸葡萄穗狀，

愈。

(十一) 小無比散

治痘毒，口渴小便澁，大便祕，口氣熱煩躁，時有熱毒可用。痘一或色焦紫或有紅斑，自發熱至起眼後餘熱亦可用。

滑石

飛過六兩

石膏

飛過

粉艸

未

寒水石

研細

未五錢

薑金

甘草水煮透燒乾研七錢

右合研勻

五歲服二十錢，大人量加，冬用內心湯下。

夏用井水調下，熱甚不解者，井水磨畢角汁調下。

紅紫頭陷不起，

加川山甲末一分，射香半分，紫草煎

湯加酒一二匙，調下即起。

(十二)

大比六一散

治熱毒太甚驚狂譖語引誤痘瘡紅紫黑陷者

滑石

飛過辰砂二錢

粉艸

兩

雄黃

飛過一錢

右研勻，每三五歲服一錢，十歲服二錢，發熱之初用敗毒散調下，亦能稀痘，若報痘後用灯心湯調下。

(十三) 肾砂益元散

治痘熱毒太盛，狂言引飲，本方去辰砂，加龍腦，即龍腦益元散去辰砂，即六一散。

滑石

飛過六兩

辰砂

未一錢

右合勻，每小兒一錢，大人二錢，灯心湯下。

(十四) 退火回生散

治痘熱甚，發渴，紅紫黑陷。

滑石一錢

珠砂二分

水后三厘

右爲末冷水調下得睡少時神安氣寧痘轉紅活。

(大)龍腦膏治痘毒出未透心煩狂亂妙見單方已出未

梅花后腦一錢

右研細滴新汲猪心血和丸如員眼大小兒半丸大人

丁丸

丁十

凡狂妄燥煩者心經毒盛也用紫草湯下昏瞀不醒者伏熱於心經也汲井水調下血泡癰不自者紫草湯下漿坐瘡陷者溫酒化下

(古)猪尾膏同前以一方体虛寒者不可用恐虛益之誤也實與熱者可用

凡痘過服熟藥昏瞀不知人事者取猪尾血滴入后腦

和爲丸如員眼大溫酒化下用猪尾血者取其當欲發散于外也

痘倒齶心神不安者后腦五分辰砂五錢猪尾血爛研

膏用木香磨湯化下

痘不作繫倒齶者后腦丁分猪尾血一錢同研新汲水

調下

(大)威靈龍腦散治痘黑膜

鐵脚威靈散一錢炒后腦一分


石用溫水調下取下瘡痕爲效

(大)獨聖散治痘不起項或瘡黑陷倒盛服此卽時紅活起

川山甲酒炒成珠一錢取紫及加麝一分

保赤金丹

卷之三



右爲未每服小兒三分大人五分用木香煎湯少入酒

調下之症俱可用

宋杏庄方內加紅曲炒五分川烏炒焦五分名曰一十七

金葱湯下

(子)太成散治病出不快或頭陷或灰白黑陷一切不起發

川山甲酒炒一兩

甘草末三錢雄黃一錢硃砂一

五分紫草末三麝香二分

右爲末每五歲用二十分冷症熱酒調下熱症紫草湯下

症寒者加入治中散內症熱者加入小無比散內

王人牙散治瘡不起發田帝陷或紅紫黑斑咬牙寒戰

人牙自落者不拘多少火煅存性入細末麝香或加紅麯二分

右用鷄冠血調成膏好酒半盞乳半盞入葱白一撮煎

調送下

凡服齒不可過多每服止三分多則陽氣盡出于表主痘斑爛無血色陰氣內盛必裏寒而濡泄急以四君子加芎歸服

無憂散治瘡症臨危寒戰咬牙

人牙散丸前加一錢雄黃五分珍珠五分又一方有牛黃五分

右爲末每服三五分多則一錢荔枝煎湯下

至無價散治黑陷欲死者又一方加麝香斤膾少許

無病小兒糞陰乾於臘白將傾銀確一箇上下合定益泥固濟火煅通紅取出爲末蜜水調服一錢

烏金膏治發熱至七日已前或因風寒痘不起發或紅

瘻退去土頭足角

殼全蝎酒洗去足尾

牛艸

紫草

白附子味苦內白者

麻黃各五川山甲炒去二錢五分

右爲末另將紅花紫草各一兩好酒一錢熬至大半去渣下竈五兩慢火同熬縮水成珠爲度丸如龍眼核殼退去頭尾

大每服一丸灯心湯化下

紫金散治倒廝出不快者亦治遠年不愈惡瘡

紫草

蟬退炒焦

牛夢子炒各五錢

右爲細末每服一錢水半錘煎減半去渣溫服

紫草膏治項色紅紫黑陷

殼全蝎

酒洗去頭尾兩

一兩

白附子

製過上白者

五錢

粉艸五錢紫草一兩穿山甲三錢

蟬退

酒洗去頭尾三錢

右爲末另將紫草一兩剉煎去渣熬成膏又用蜜一兩入好酒半盞煉過同紫草膏攪勻調前末藥丸如綠



宜入每三四歲者服一丸大入量加

初熱重者敗毒散化下初發驚狂薄荷灯心葱白

湯下色紅紫黑者紫艸湯下色淡薄灰膚美酒

化開熱服

舌紫草飲治痘一熱出瘡服尤重可變輕

紫草二兩

右細剉百沸湯一大盞泡便以物合定勿令泄氣俟溫

量見大小與服多至一合少至半合雖出亦減

又紫草五錢醇酒半盞煎服能治痘灰黑點子者名

紫艸酒

天茺荽酒 治痘出不快

茺荽四兩

右細切以好酒二鐘先煎數沸入茺荽再煎少時用物合定不令洩氣候冷喫從頸至足勿置頭面使香氣襲蓮自然出快

元連翹升麻湯 治痘一發密如針頭形勢重者連其表而

升麻

黃芩

葛根各一

麥門冬

去心二錢

右水煎服此膀胱胃經藥也

手清地退火湯 治痘不退熱而出多爲火裡苗急用此方以退其熱則後無青黑乾陷之患



地骨皮

錢一錢

地膚子

九分炒研七分

柴胡

五分

紫草

八分用糯米一撮製過

乾葛

八分

連翹

六分

當歸

五分

木通

一分

蟬退

二分

右用姜一斤水煎服如熱不退再服一劑

或與未藥火心湯下亦好

主紫草透肌湯治瘡熱而出不快○頭陷者

數黑陷血

涼不致紅紫

紫草一錢

升麻五分

牛子

防風

荆芥

黃耆各八分

甘草三分

木香五分

蟬退

地骨皮

右姜水煎服如紫色腹痛加蟬退一錢

主化毒湯治痘已出未愈熱毒解毒清熱涼血毒一解不

金銀花

五分

甘草

兩分

木通

防風

荆芥

連翹

牛子各三分

酒炒

又加水通

右名等分水煎服

王解毒散

治毒先發腫者名爲痘毋十熟九死

金銀花

五分

甘草

兩分

木通

防風

荆芥

右用酒水各一鍾煎服

如泄加調子豆蔻

痘紅者

加炒黃芩芍藥

瘡庠者加歸身生地

或加何首烏

尤好

疼痛者加赤芍

透骨解毒湯

治瘡寒戰咬牙


紫草

甘草

當歸

防風

陳皮



赤芍

右各等分水煎服

〔主〕消毒飲 治痘已出，上焦壅熱，胸膈不快。

荆芥二錢 牛子二錢 甘草一錢

〔主〕如聖湯 治痘已出，未愈，身熱如火。

紫草 升麻 乾葛 白芍 甘草

右各等分加姜一斤，葱白二莖，水煎熟服。

〔主〕心煩加麥門冬，煩渴加入參五味，麥門冬，七八九日。

木通

猴梨

右各等分加姜一斤，葱白二莖，水煎熟服。

〔主〕門冬赤苓，煩渴加入參五味，麥門冬。

七八九日

〔主〕身如火者，加酒炒黃芩地骨皮。

〔主〕四聖散 治痘黑陷，倒齧不起，發不紅活，小便不利。
〔主〕紫草 赤芍 黃芪 甘草 木通

右水煎服，熱甚，色紫倍加。紫草芩連紅花，大便秘，加枳壳，如常加糯米。

〔主〕加朱四聖散 治痘出不快及，變陷，倒齧，小便赤，身熱，未退，或風吹復冒者。


〔主〕紫草 赤芍 黃芪 人參 甘草 川芎

蟬退 木通

木香 大便秘加枳壳

右加糯米百粒，水煎服。

〔主〕羌鼠粃子湯 治痘瘡，身表熱，不退服此，防青乾黑陷。



卷一百一十一
牛子 炒 归身 茄草 柴胡 連翹
黃芩 酒炒 黃芪 薑頭 地骨皮

右各等分水煎熱退住服

犀涼血解毒湯 治痘出未曾退熱紅不退地或痘苗乾枯
紫草一錢 生地八分 赤芍三分 紅花二分 蘇木三分
防風三分 荆芥三分 黃連三分 牛子四分 天麻二分
柴胡八分 水通三分 牡丹皮七分 茄草二分

右姜一片灯心二十根糯米一撮水煎服

犀惺惺散 治痘頭痛壯熱喘急此攻毒散熱之劑

人參 白朮 茄草 茄子 茄草

桔梗

細辛各四川芎各五薄荷五分水方無川芎加天花
右用姜三片棗一枚水煎熱服

犀五積散 治痘癰寒阻塞而出不快并有內傷等症

川芎 當歸 芍藥 人參 白朮
陳皮 蒼朮 厚朴 茄草 半夏
白芷 桔梗 枳壳 乾姜 肉桂
麻黃
右各等分加姜三片葱五莖水煎熱服
內托散 治痘不起發根窠不紅从白色咬牙寒戰等症

人參 黃蓍 茄草 川芎 當歸

防風

白芷

桔梗

白芍

厚朴

內木香

肉桂

右用姜丁瓦棗一枚水煎服色紅紫者去肉桂木香加紫草蠶退漿不浦水酒各半煎色淡白者去防風白芷加糯米弱不食加入乳和服

置內托于金散

人參

黃耆

甘草

川芎

當歸

正白芍

桔梗

白芷

厚朴

牛子

地膚子

木香

甘草

川芎

右加

糯米四十粒雞糞牛糞水煎服

四君子湯

養胃補氣

白术

甘草

當歸

右用姜丁瓦棗一枚水煎服

人參

白朮

茯苓

甘草

加味四君子湯

能和胃助氣

白朮

甘草

保元湯


養血安神

白朮

甘草

右加

姜丁瓦棗一枚水煎服



吳太保元湯 治頂陷根窠雖紅而皮軟且薄血有餘而氣不足也

黃耆三錢 人參一錢 甘草一錢 川芎一錢 官桂一分

白朮錢 炒

右加姜棗水煎服 如氣不行去桂加木香若不食加入人乳半鍾又方加白芍首烏黑荳水煮

吳補中益氣湯 治虛症

陳皮丁升麻柴胡

右用姜棗水煎服

王人參歸耆湯 治癥瘕不起血不足治雖或成塊而皮軟色白乃氣血不足之症也

陳皮丁升麻柴胡

當歸 白朮

黃耆一錢 人參一錢 甘草八分 當歸一錢 川芎一錢
官桂三分 山楂八分 紅花酒洗 白朮 榖米水洗八分

右加姜一斤水煎服

王生脈健脾湯 治養已成皮軟色白乃氣不足也氣不足生脈健脾湯補氣血不足補肝脾腎則血生固其本也

黃耆一錢 人參一錢 甘草炙三當歸

白朮各八分 榖米水洗八分 官桂二分 茶芩五分

紫草酒洗四分

右用姜一斤紅棗一枚 榖米五十粒或加酒洗紅花三分

王通天散 治症發熱不出或已出色不紅活


人參

陳皮

桂枝各八分

川芎

熟地



芍藥錢各一當歸一錢紫草一錢紅花

木香各三分

甘草六分知母八分荔枝壳箇十

右用雞汁一鐘棗三枚糯米一撮煎服初服到頸再服

到腰三服到脚神效

升天散

卽灌腹起疽散治疽或灰白或紅紫黑陷者皆可服
或清水不成長漿八九日皆可服

人參六分

黃耆八分

白朮五分

甘草三分

當歸酒洗

生川芎五分

陳皮去白五分

山楂八分

淫羊藿二分

肉桂三分

桂枝三厘

本川山甲土炒黃二分

肉桂三厘

此引陰經之藥引經

則能成膿多則痒

木香二分

右加姜棗水煎服或爲末煎量入大小與服亦可

如嘔姜湯送下

泄白湯下

肚痛神麌煎湯下

煩燥麥門冬湯下

渴用麥門五味煎湯下

吐渴

用藿香陳皮煎湯下

疽不成漿

多服數貼無妨

七真湯

治疽不起膿癰

又方加枸杞子錢黃豆七

滌羊霍三分

多則痒

人參八分

川山甲土炒黃三分

右加姜棗糯米水煎服

溼羊補駿湯

治疽灰白不壯或漿清

比前方加白朮

土炒山楂八分陳皮去白官桂三分

黃豆三粒

笋尖三箇

右水煎服或加防風白芷

四物湯養血

川芎

當歸

熟地

白芍

酒炮後方可用

右水煎服

補元湯

治痘項本薄而根盤不聚色不紅活乃氣有餘而血不足也

川芎

當歸一錢

酒洗

白芍

酒炒熟地一錢

紫草

七分酒洗

紅花

七分陳皮三分土炒

白朮一錢五分

土炒

一錢三分

甘草

三分土炒

右水酒各半盞糯米五十粒棗一枚煎服

當歸活水散

川芎

赤芍

生地

紅花

竹原弁屋九良宗銀父公教痘瘡紅血藥
金口ノシケイハカシタニミリリケツシ諸經カラウカイクルニカウス
大禱元湯 土白木鑿芭蕉加シレ
大禱元湯 土白木鑿芭蕉加シレ

紫草

右水煎服

羌活血散 治痘色漆白

當歸

酒洗赤芍酒浸

紫草

各五錢

血竭

乙錢

木香

二錢

右爲細末每五歲者服一錢十歲已上者二錢好酒調下

熱極血焦不紅活者酒煎紫草湯調下

保生散 治氣血俱虛反白不貫膿回漿

紫河車 一具酒洗去毒水蒸熟敗龜板

研末

蘇炎五錢

又方有鹿茸五錢

右共爲末，每服五分或乙錢。氣虛用保元湯，湯下。

血虛用芎歸紫艸煎湯，下。

(至)異攻散

此方調順陰陽，善救表裏。凡產仄白癥、瘍咬等症，寒不可輕用。

人參

白朮

茯苓

當歸

半夏

厚朴

木香

丁香

附子

官桂

肉果

山楂

(至)內助丹

黃耆

酒炒

人參

酒炒

白朮

茯苓

當歸

陳皮

半夏

厚朴

肉桂

山楂

右加姜三兩一、糯米五十粒水煎。如不食加乳一杯。
寒甚加太附子，寒戰不止加附子防風，渴加麥門冬。
(至)泄加猪苓澤瀉，不止加荳子豆蔻。

(至)助陽丹

治痘癧瘍，不起根葉不少紅。

黃耆

酒炒

甘草三分

川芎

人參

酒炒當歸酒先

白芍

酒炒各一錢

紅花五分

陳皮八分

官桂二分

右加姜棗水煎，如食加山楂厚朴各五分，餘加同前。
(至)回生起死丹
治痘灰白不食寒氣逆上嘔吐腹脹痛惡清水手足俱冷。

丁香九枚

乾姜一錢

右用水煎熱服，被蓋尼時令脾胃溫暖，陰退陽回，痘自

紅海矣

理中湯

治寒渴便溏不渴而噏吐首尾可用

人參

白术

甘草

乾姜

右各等分加姜棗水煎服

附子理中湯

治除寒手足厥冷腹脹自利即煎方加附子二錢

治中散

治虛寒喘利不進飲食

黃蓍

人參

白朮

川芎

當歸

肉桂

肉果

麵包煨熟去麵切片以綿絲包打去油五錢

丁香

一錢木香二錢

右爲細末每五歲兒用五分好熱酒調下衣被益暖少

頃痘自變紅而起

和中湯

治痘虛嘔不止者

本方去人參

人參五分

白朮七分

白朮五分

甘草五分

陳皮一錢

半夏八分

藿香一錢

砂仁一錢

右姜水煎服

蘇發散

治初熱傷風傷食嘔吐

紫蘇葉

陳皮

半夏

蒼朮

厚朴

甘草

白朮

羌活

枳壳


神曲

各等分

姜水煎服

藿香正氣散

治初熱嘔吐



藿香紫蘇 大腹皮 陳皮 桔梗
甘草 茯苓 半夏 厚朴 白芷

右加姜枣煎服

右人參五分白术七分白茯五分
半夏八分藿香一錢砂仁一錢

左加味平胃散治虛寒嘔吐不止

左加味平胃散治虛寒嘔吐不止
陳皮 蒼朮 厚朴 甘草 藿香
砂仁 又加小茴香炒

右姜水煎服

右姜水煎服

主藿香安胃散治胃弱不食嘔吐惡心
藿香一錢人參一錢陳皮一錢丁香五分

右水煎服

主丁附治中湯治傷食物致心腹疼痛而復發不止
人參五分白术 乾姜 陳皮 青皮

右用姜三枣二水煎服


主定痛散治傷寒肚痛或冷氣可服
丁香錢各一 甘草炙三分 附子三尼

右水煎服

主神曲一錢山楂二錢香附一錢良姜
甘草各五分如手足逆冷加附子三分

右水煎服

主神曲一錢山楂二錢香附一錢良姜
甘草各五分如手足逆冷加附子三分



右用姜二枣二水煎服

桂枝芍藥湯治腹痛

桂枝各一芍藥二錢

右加姜二枣三水煎服

桂黃連湯治熱毒在胃中致腹痛甚時欲吐此藥能升降陰陽

黃連

甘草炙

乾姜

桔梗錢

半夏湯泡

人參各八分

右用棗二枝水煎服

羌益黃散治胃冷氣而利小便

陳皮青皮各二錢

丁香五分木香三分

訶子七分

一方無木香有豆蔻乙錢
右用水煎服

人參養胃湯龍脾進食

人參乙錢

白朮

陳皮

神曲各乙錢伍分

茯苓

甘草八分

水煎服

七珍散調胃進食

人參母雞黃蓍正茯苓山楂山藥各一錢


白朮二錢甘草七分

右加粟米一撮姜二棗二水煎服治虛人食慾不進或兼

白朮調元散即參苓白朮散

治胃虛不進飲食或

兼



五味入參 白朮 茯苓 芫草 久
蓮肉 去心 山藥 炒各 二錢五分 桔梗 八分 慧以仁 八分

砂仁 七分

右爲末，每服一錢或五六分紅棗煎湯下或姜湯下
治痘作瀉不止

全堅腸湯 治痘作瀉不止
黃蓍 乙錢 白朮 乙錢 山楂 七分 川芎 五分 陳皮 五分
升麻 三分 肉果 燶過去油一錢
石加牙棗三枚水煎服

全益蘿丸 治痘灰白泄瀉清水不止

柏子肉三味

白龍骨

柏子肉各五錢

木香

砂仁

白龍骨

柏子肉各五錢

赤石脂

枯柏

各七錢五分

肉果

麵包煨五錢

右爲末，麪糊丸如黍米大，每服三十九米飲送下

治藏毒諸熱伏火積熱

全黃連解毒湯

治藏毒諸熱伏火積熱

黃連

黃芩

黃柏

梔子

梔子

全犀角地黃湯

治諸失血

犀角

芍藥

生地

牡丹皮

右三味等分煎熟，犀角磨汁入服，無犀角以升麻代之

治痘已出未能勾遍，壯熱心煩口舌瘡

全加味犀角飲


治痘已出未能勾遍，壯熱心煩口舌瘡

犀角另磨牛子

荆芥

甘草

防風



仲景全書

卷之三

三

升麻 桔梗 麥門冬

右用永煎服

(金)

二寶散 治痘紫癰發熱鼻衄小便赤血口渴亂語

犀角 珊瑚

右二十味磨水頭服卽愈

(金)

斬關散 治痘紫色發熱真血不至

生地 五分 升麻 三分 牡丹皮 五分 黃芩 五分 茅根 三分

右用永煎服

藕節 乙錢 藜蕡 四十九粒

(金)

梔子仁湯 治煩躁譁語驚狂發熱

右用永煎服

梔子仁湯

梔子 二錢 黃芩

石膏 各二錢

知母 五分

杏仁 一分

大青 一錢

桑胡

豆豉 各一錢

升麻 八分

赤芍 乙錢

甘草 五分

右水煎服


(金) 人參白虎湯 治暑盛煩渴虛熱不快又風癱痘斑瘡毒等症
人參 五分 石膏 四錢 知母 一錢 甘草 三分

右加粳米一撮水煎服 李方去人參即白虎湯

(金) 竹葉石膏湯 治痘不惡寒壯熱煩渴小便赤澀

石膏 知母 甘草 麥門冬 淡竹葉

右水煎服



卷之三

卷之三

卷之三

半麥門冬湯 治班疹煩渴吐瀉及癰後條症

麥門冬 人參 乾葛 赤芍

升麻各一 甘草五分 石膏二錢

赤葛芩

右水煎服

生脉散 止煩渴首尾通用

人參 五味子 麥門冬

右水煎當茶服

生白术散 治症已屬未屬身熱不退煩渴不止此藥極能清神生津

人參 白朮 白茯苓 甘草 乾葛

麥門冬

瞿香

麥門冬

甘草

乾葛

右各等分水煎服

柴胡麥門冬湯 治痘瘡熱經日不退

柴胡 麥門冬 甘草 人參 玄參

龍胆草 一方無參

右水煎服熱退即止

柴胡

人參 黃芩 半夏 甘草

加姜棗水煎服


桑芩湯

郎小柴胡合四苓散

赤葛芩

卷之三

卷之三



卷之三

卷之三

卷之三

糸五苓散 分陰陽利水道

澤瀉 肉桂

白朮 赤茯

猪苓

澤瀉

肉桂

右加姜丁尾水煎服

四苓散 亂前方去肉桂

辰砂五苓散 治小便赤並作渴發燥譜語

辰砂五分搗服

古郎前方加辰砂

右前四味加芍心一圍水煎入硃砂五分搗服

允導赤飲 治小便赤煩渴發驚

人參

麥門冬

生地門冬木通

甘草

人參

麥門冬

右各等分水煎服

三八正散

治小便秘

赤茯

貝母

木通

滑石

扁蓄

右各等分水煎服

滑利散

治小便不通淋澀亦可用

木通

六分赤茯乙錢澤瀉一錢

桔梗

甘草

右加灯心二十引經水煎服

前胡枳壳湯

治疽欲回未回壯熱不退寒實煩悶大便堅實臥則喘氣

前胡

五錢枳壳

甘草

大黃

赤茯各五


右爲一貼水煎不拘時服

前胡枳壳湯

治疽欲回未回壯熱不退寒實煩悶大便

甘草

大黃



枳壳散 治癥熱蒸於肺，腹脹太便祕
枳壳三錢 生地七分 紫草一錢 大黃二錢
右用水煎服


西涼膈散 治上膈積熱口舌生瘡煩渴
右各等分水煎加蜜，加桔梗淡竹葉蜜一匙
四順飲 治大便秘

連翹 六錢 薄荷 一錢 黃芩 一錢 枇子 一錢 午草
大黃 朴硝
右各等分水煎，如腹脹加桔梗淡竹葉蜜一匙
大黃 同煎當歸 茄藥 芒草 午草

右各等分水煎服

真通幽散 治大便秘
升麻 當歸 紅花 生地 熟地 桃仁
右水煎服

通腸散 治大便秘結
枳壳二錢 芝麻三錢 當歸二錢 大黃一錢
右水煎加牛膝五分
大柴胡湯 治身熱大便祕
柴胡 芍藥 枳壳 黃芩 大黃各二錢
右水煎服



見承氣湯

治大便秘

大黃

枳實

芒硝各三錢
厚朴二錢
大黃一錢

右水煎服

昇宣風散

治腹痛太便秘煩熱等

枳榔

陳皮各二錢

甘草一錢

牽牛一錢

頭末

紫霜丸

杏仁五十粒去皮尖赤石脂五兩另研巴豆三十粒

代赭石蜜煅碎一兩研


右各爲細末和勻湯浸蒸餅爲丸如黍米大二歲以下

王

二三九八歲以上十數丸米飲或乳汁送下
重醫道法熬蜜法火不及則軟太過則焦蜜多僵中

用蜜二三分合於銅器中微火熬不使手攬勿令焦滴于冷水中成珠不粘手爲度僂人冷右上將牙皂末本入內拌勻捻令頭銳如棗核樣長一寸許大人長寸半放在冷水中待硬然後用油摸過托入谷道中其蜜欲軟再入冷水郎硬

生薑不拘多少水煎帶溫服
大黃薯湯治身體痛



黃耆

白芍各二錢

甘草各一錢

右加姜葱水煎服

治腰背痛初熱勝用

羌活

當歸

獨活各一錢

柴胡五分防風一錢

桂皮各一分川芎

黃柏各一錢

桃仁一錢紅花各八分

右各等分爲末酒下二十三錢

大風頭疽癰毒

又方治腰痛有濕防已蒼术

當歸

桂皮


玄胡索

當歸六黃湯治自汗盜汗

右各等分爲末酒下二十三錢

大風頭疽癰毒

又方治腰痛有濕防已蒼术



黃芩二錢半夏

甘草各一錢芍藥二錢

右用姜一錢棗二箇水煎服

菖根黃芩湯治喘而有汗

乾菖黃芩各二錢黃連

芍藥

石膏各一錢

五味子分甘草五分

右用水煎服

五味子湯治喘促而厥

五味子乙錢五分

人參一錢麥門冬

杏仁各一錢

右加姜三斤棗二枚水煎服

菖蒲清痰飲

黃芩

黃連

黃柏

。

陳皮四分桔梗七分貝母三分甘草五分白芍大分

五味子四分石菖蒲五分玄參三分

右用姜水煎服

菖清肺飲治咽乾聲啞

麻黃乙錢麥門冬錢知母天花粉荆芥各一錢

柯子一錢菖蒲各八分桔梗二錢

右入竹瀝姜汁服

天花散治癥後失音

天花粉桔梗白茯

甘草

本末全書

卷之二

三

右各等分用竹葉七片黃荆莖一寸水煎服

(真)補肺散治痘未出聲醫

阿膠蛤粉炒成珠乙牛子炒三分杏仁泡去皮尖三粒

甘草五分

馬鳴鈴

黃耆各五分

糯米錢

右分二服水煎食後時時薰之

(真)甘桔湯治痘喉膈不利或痛

甘草

桔梗

右水煎服

(真)利咽解毒湯治痘咽喉疼痛自上而用

山豆根

麥門冬

牛子

炒七分

玄參七分

桔梗七分

防風五分甘草二分

右加菜豆四十九粒水煎服

(真)三黃熟艾湯治痘後咽塞喉痺

黃連

黃芩

黃柏

艾葉

右各等分用米酒煎服

(真)甘露飲治牙根腫痛腐爛口臭牙疳去血又治喉舌生瘡

天門冬

麥門冬

生地

熟地

黃芩


枳壳

石斛

茵陳

枇杷葉炙去毛

右各等分水煎溫涼隨意服



嘉玉鎖匙

點熱骨腫痛或垂下及喉舌潰破

硝砂

朴硝

姜桑

片硝

右爲末以竹管吹之

齒轉

走齒

黃連

青黛

兒茶

黃芩

左爲細末吹之

黃芩

艾葉

薄荷

黃柏

黃芩

黃芩

右草分爲末入青黛些需擇之

蟲牙疳方

治痘後餘毒攻牙根腐生瘡內服甘露飲已

池膿雞肉發毒熱物

白芷

白芍

白芍

白芍

白芍

人中白

錢枯礬二錢鹽梅七箇煅存性

麝香

二分

白模子

元燒灰乙錢糞釭姐洗淨焙乾二錢卽五穀虫

麝香

一錢

右爲末先將老芥葉葱根煎湯洗去腐黑肉須見鮮血

乃用乾末擦之

疊擦牙散治痘後餘毒攻牙生瘡一日爛進十分急用此

銅綠雄黃是古方

五倍枯礬和入良

白蘚烏梅全火煅

細辛研末共胡黃

疊鈎藤湯治痘後口禁瘡直腹痛連脅

白芍

甘草

白术

青皮

黃連

官桂 生姜

右各等分水煎不拘時服

蔓紅綿散 治痘感寒發熱驚瘡

全蝎

天麻

麻黃

防風

羌活

桔梗

薄荷

甘草 紫草 荆芥

右各等分加葱白三根水煎服

是消風散 治痘瘡盛驚搐譫語強急口張目直視

羌活 獨活 姜茶

藿香 枳壳

血

防風 天麻 地骨皮

蟬退 前胡

五分

柴胡 黃芩 天花粉

桔梗

茯苓

荆芥 紫草 牛子各一錢 人參 川芎各一錢

甘草四分

右加姜棗水煎服

葛根散 治痘熱極生風驚瘡


右慢火同炒焦黃爲末每服二十分半薄荷湯調下

葛根散 治痘驚搐痰癇氣喘

右慢火同炒焦黃爲末每服二十分半薄荷湯調下

葛根散 治痘驚搐痰癇氣喘

右慢火同炒焦黃爲丸如皂角子大燈心薄荷湯



古选下

菖酥丸 治痘不起發頂陷一切驚風並皆治之

菖酥一分 牛黃三分 人牙三分 雄黃三分 珍珠二分

珠砂五分 治驚加全竭姜桑

右爲細末乳汁丸如黍米大每服七丸入參湯下

菖粉紅丸 治痘後癩癩症

水牛尾二分 破砂 天南星 天竺黃 垚子胭脂各一錢

右煎牛膝汁丸如龍眼核大每服一丸砂糖溫水化下

保命丹 治一切驚風發熱

天麻 蕙金

全竭去毒各五錢

防風

甘草

白附子

炒姜桑

姜升炒青黛

薄荷

南星照下

大半夏

去頭尖火炒

用白滾水浸酒乾再炒

射香少許

砂砂

五錢爲衣

一方有牛黃蟬退茯神桔梗


梗芻藤

右爲細末煉蜜爲丸如芡實大每服一丸灯心薄荷湯送下

菖鮮毒牛黃丸 治痘後餘毒或弦眼或喉痛牙疳瘻壅驚搐等症

菖金乙錢 牛黃一錢 杏仁十四 巴豆五分 去油

右爲末蒸蜜丸如梧桐子大每服一丸薄荷或荆芥煎



古湯下差瘡散取大黃根一斤切薄片
臺參附湯治痘後發癰手足麻木無汗
升豆

人參黃芩附子防風

卷活

麻黃

右用葱水煎服

夏桂附湯治痘後發癰手足難動常出汗

黃耆

附子

當歸

防風

全竭

右用水煎服

葛麻黃散治痘乾疖倒瘡黑瘡

麻黃去節半兩

右一方味蜜拌炒良久水半升煎沸去沫再煎去三分之

五 回漿散 治痘不收漿結膿

何首烏 白芍 黃耆

人參 芡艸

甘草

白朮 甘草 白朮

人參 芡草

甘草

何首烏 半錢

白朮 半錢

甘草 一錢

右加糯米一撮棗一枚水煎送下牙末一錢

五 離白湯 治痘下利膿血身熱

薤白 豆豉

梔子

甘草

右用水煎服

五 蒼風湯 治痘下利膿血

人參 白朮 茯苓 茯桂 川芎

當歸 芍藥

甘草


右加粟米乙百粒水煎

五 阿膠駐車丸 治痘後下利膿血并腸澼

當歸二兩 黃連四兩 乾姜泥一兩五錢

右三味爲末阿膠一两炒成珠醋煮膏和末藥丸如梧桐子大每服二十丸食前米飲下日三服小兒研化

五 黃連阿膠丸 治熱毒下痢不止 後有豆蔻香連丸可



黃連 二兩 阿膠 桃珠

一兩

右以黃連茯苓同爲末用酒調阿膠末搗和爲丸如梧桐子大服同前

玄參升麻湯 治溫毒發熱

玄參

升麻

甘草

一兩五分

右用水煎服

升麻 五錢 犀角

射干

黃芩

人參

右用水煎服

甘草 各三錢五分

赤芍

黃芩

人參

夏陰毒升麻湯 治陰症

升麻 川歸

川椒

鱉甲

雄黃

右爲末每服三錢水煎服

李人參敗毒散 治餘毒發癰腫

人參 赤芍

羌活

獨活

前胡

薄荷

柴胡

枳壳

川芎


甘草 咸半牛蒡子

加防風

荆芥

郎荆

防敗毒散
又加連翹金銀花
頭上加升麻白芷
上身加倍
加桔梗
手上加薄桂
腰間加杜仲
腿脚加牛



仲景全書

膝膚風

夏 消毒飲 治痘後一切瘡毒癰腫

防風 荆芥 牛草 牛子

右用永煎服

夏 活血解毒湯 治餘毒

防風 荆芥 生地 赤芍 當歸

連翹 黃連 牛子 紫草 甘草

蒼术 薄荷 川芎 木通

右各等分水煎服

夏 解毒散 治痘發腫者

此爲痘母先發者吉後發者有九死

戊申四月十六日今發熱大冒余見其時頭痛ウライナククワシナウタモビヒトニコロガス此痘六日十三

チホアスドトニテカル者不復何往十八生テシ同火也又見迄ヨリタイナケハ寒寒イシトウ痘も見合

名千ノヨミニカラバ年三月見其痘母發痘寒出發熱極十三日死不付至死

忍冬藤半斤甘草一兩水通 防風 荆芥

連翹 牛子各二錢

右共春粹用一水一鍾酒一鍾煎服 泄加柯子荳蔻

瘡紅者血熱也加炒黃芩芍藥

瘡痒者加歸身生地或加何首烏瘡痛加赤芍外用大黃膠塗患處

夏 解毒防風湯 治痘十七日後熱甚者服此以和之


防風一錢黃芪

枳壳

荆芥穗 白芍

右用水煎服

仲景全書



卷之三
大連翹飲 治痘後一切發熱赤腫癰毒

連翹

防風

荆芥

牛子

當歸

柴胡

黃芩

梔子

蟬退

赤芍

木通

車前子

滑石

甘草

右各等分姜水煎服

四聖膏 治痘疔挑破以次點入

七粒珍珠火上燒

碗豆七七錠內炒

男髮不拘灰多少

加入胭脂真箇好

二聖散 治同前

雄黃 紫草 各三錢

右共研末用油胭脂調入

趙氏敷藥方 治膿後痘疔潰爛成坑內見筋骨用此敷

赤石脂 乙錢生用

伏龍肝 乙錢

陀僧 二錢飛過

輕粉 乙錢 黃丹 飛過炒八分

髮灰 五分

黃柏 末 乙錢

乳香 三分 没藥 三分 杭粉 一錢 血竭 乙錢 水瓦三厘

有臭氣加阿魏 分

右共爲細末用重羅篩過敷之外用膏藥貼內服人

參敗毒散 加川山甲蟬退姜蜜連翹

金華散 治痘後肥痺疥癬等瘡此藥能收水寒肌膚毒

黃丹

黃柏

黃耆

黃連

大黃

輕粉 射香

右爲末，壅溫乾擦，用臘豬油熬化調。

聖必勝膏

治腫毒

馬齒莧

杵

猪膏

研

石蜜

松脂

右三味熬膏塗腫處卽消。

專 三豆散

痘後癰毒初起紅腫，用黑葵赤三豆以醋浸研漿，時

時以鵝翎刷之，隨手可退。

聖 敗草散

治斑爛流水不

止

朱爛茅根

不拘多少

右取多年蓋屋蓋牆者，此草經露風霜，感天地陰陽之氣，善解瘡毒，其功不能盡述。取來晒乾或焙乾爲極細末，付瘡上或攤在席上，令見半寸神效。

又方

荔枝壳微燒存性，草紙燒灰存性，多年陳茅草

右三味共爲細末，或搗或擦，自收生痂。

又方

黃豆壳燒灰爲末，擦之如痘風癰，以豆壳煎湯洗。

夏生肌散

治痘毒瘡爛不收，并疳敵不飲

地骨皮

黃連

黃柏

桔子

甘草

卷十
右共爲細末，掺之。

醫綿蠶散 治痘瘡毒治四肢節上癰膿瘍水不_止

又取出蠶蠶不拘多少，將生明礬末入內，旗蒲燒令汁盡未_{成灰}，爲末，掺之。

醫秘傳茶葉方 治痘滿身無皮膿水流出，不能抱者

又取茶葉要多，揀去粗梗，入水一煮，取起再揀去梗，溫鋪於床上用草紙隔，一晝夜則膿水皆乾。

醫乳香韶粉散 治瘡亦欲落不落，用此薄塗，當減腫痛，又治熱症癰過身，膿水不絕。

赤乳香末 韶粉一兩，輕粉一兩。

右共爲末，猪油拌膏，用鵝翎敷上。

醫洗用散 治痘毒攻眼，障腫，血縷遮睛。

川芎

甘草

防風

羌活

薄荷

桔子

甘草

右名等分水煎，食後服。如睛痛昏暗，加石膏、穀精草、茺蔚皮，上翳膜加蟬退白蒺藜，熱實便秘加芩連大黃。

醫地黃散 治痘毒入眼，腫痛赤脈或白膜遮睛，熟地、柏朮、當歸、焙乾防風、蟬退洗去、羌活。

白蒺藜

炒去刺

穀精草

木賊各一錢

玄參五分



卷之三

沙苑蒺藜去穢一錢
犀角末一錢
黃連一錢

甘草炙木通各一錢五分

右爲細末，小兒每服二分半，大人五分煎羊肝湯食後。

調日三服夜一服忌口將息

冕撥雲散治痘毒入眼生翳

防風、升麻、甘草、羌活、白芷、荆芥、黃芩、黃連

菊花、川芎、大黃、石決明、龍胆草、石膏

右研末蜜水調下

夏士蜜蒙花散治痘入目翳膜遮睛

蜜蒙花、菊花、石决明、蒺藜草、木賊、羌活


右爲末，每服三錢茶清調下。

更卷活菊花散治眼羞明怕日或有翳

卷活、菊花、龍胆草、谷精草、荆芥、薄荷、木通、梔子、連翹、赤芍

生地、蔓荆子、防風、黃芩、黃連

右灯心水煎服。有翳加石決明草、決明白蒺藜、點用青果核年久者，并水磨點，又用桑樹內細嫩皮，并水浸爛，搗末，瓦罐盛之，遇熱毒攻眼，點之即効。



卷之三

夏 龍胆草散 治痘入眼或生瘡醫

龍胆草五 菊花

蒺藜

炒去刺各分

三

防風

黃連各二

蟬退去土木賊

去節梔子各二

分

右水煎服

夏 兔糞散 治痘入眼

兔糞一合炒黃色

新鮮草

杏仁等

陳芥

夏 若用蟬退木通甘草煎湯頓服

夏 兔糞丸 治痘入眼或生翳障

兔糞四兩

石决明

用七孔者火

草決明一

木賊去節一兩

白芍一兩

當歸酒浸

防風去苦

五錢


兩穀精草二錢

夏 輕粉

黃丹

夏 右爲末左眼點吹右耳右如意

夏 木鱉膏治眼有翳
夏 川芎 川歸 白芍 人參 白朮



赤茯 豉草 柴胡 降芩 防風
荆芥 白芷 乾葛 砂仁 紫草
阿膠 桔梗 一方有陳皮枳壳火熱加薑金，
右加糯米水煎服

(夏)安胎散

川芎

當歸

白芍

人參

白术

白芨

甘草

黃芩

陳皮

紫蘇

砂仁

阿膠珠

香附米


或加艾葉紫草

右各等分加姜棗水煎溫服

(夏)安胎飲

卷之三

大腹皮酒人參 陳皮 白茯 白芍
紫蘇 砂仁 香附 甘草
右加灯心糯米水煎服 胎漏有阿膠珠百草霜本方
有芎歸白朮
(夏)安胎獨聖散 胎動服此服後覺胎熱則安矣
砂仁連壳慢火炒去壳爲末每服半匙熱酒調下
又用苧麻根搗爛敷臍好 用伏龍肝井水調敷亦好
(夏)桃花散治室女發熱經行
右共爲末每服七錢葡萄煎湯調下



夏辟穀丹

蒼术 甘松 細辛 乳香 蕁藶

右共爲粗末文火焚之今俗以黃茶燒烟薰之最好

夏秘傳返靈丹治灰白瘡陷頑瘻凹瀉七日起至十二日

天靈蓋初生者或三五歲者爲止於長流水洗淨二兩再將水淘洗吹乾

上好硃砂二兩同靈蓋其八絹袋懸胸前人參二兩

山楂肉二兩黃芪四兩白朮二兩當歸四兩

青皮一兩麥門冬去心二兩紫草二兩以上各用一斤或

斤量藥多寡荔施壳二兩陳皮二兩大附子八錢

肉果炒泡煨三錢糯米四兩各用水煮乾

紅花乙兩酒水各半甘草八錢連皮炙過
丁香五錢俱老米湯奶奶乳二碗漸漸煮乾
童便男女各二碗煮官桂一兩水浸一宿去桂又用
煮完用桂水浸各依等分漸漸煮之不可倉卒多用數日可
也藥有神功日到更好諸藥煮完取出絹袋內二物
陰乾研細用兌血爲丸如黃豆大金箔爲衣入磁器
內盛之黃泥封口埋土中二十日取出過日開之每用
一丸加雞冠血或酒或乳研服之將被蓋取微汗爲
度少時痘自紅綻神妙

夏回生丸治黑陷灰白瘡瘍但有氣皆可救

天靈蓋

四兩黑前洗

真辰砂二兩如前袋盛煮

川芎

二兩井水煮乾以十俱切片

白附子一箇酒煮

黃耆二兩

人參二兩

牛子二兩微炒丁香五錢陳皮二兩甘草一兩

官桂五錢

前胡一兩二錢以上各用水煮白朮二兩

肉果五個

榔木水煮之當歸二兩白芍酒煮紅花一兩

柯子肉二十個

蜜水陽起石二兩童便煮無真者不可用

右煮完取起靈藥

將陳酒淘洗净陰乾研細聽用

廣木香四錢

紅麵四錢川山甲四錢壁土炒射香當門

豆大每服一丸酒送下

鬼血爲丸如費豆大服同前

右煮完取起靈藥將陳酒淘洗净陰乾研細聽用

廣木香四錢

紅麵四錢川山甲四錢壁土炒射香當門

柯子肉二十個

蜜水陽起石二兩童便煮無真者不可用

右煮完取起靈藥

將陳酒淘洗净陰乾研細聽用

廣木香四錢

紅麵四錢川山甲四錢壁土炒射香當門

豆大每服一丸酒送下

鬼血爲丸如費豆大服同前

夏至龍虎丹

治毒盛氣虛痘不起發一切紫黑陷伏危急

天靈蓋三錢洗炙

川山甲四錢炒四足辰砂六錢

射香五分或加全蝎二錢

右以麻蕡紫草升麻荔枝壳四味煎膏和煉蜜丸如費豆大每服一丸酒送下

夏至二花散

黃臘梅花不拘多少射去毛壳確盛聽用桃花陰乾

山楂去子炒爲末聽用

小絲瓜陰乾爲末聽用

人參去芦晒乾爲末聽用

黃芪蜜炙爲末聽用甘草去皮煅爲末

殊砂飛過爲紫河車酒洗去筋蒸熟鹿茸去毛酥炙

爲末听用

人參去芦晒乾爲末聽用

黃芪蜜炙爲末聽用甘草去皮煅爲末

甘草去皮煅爲末听用

鹿茸去毛酥炙爲末听用

川山甲取頭足尾上者酒炒成珠爲末听用仙靈皮去四弦刺酒浸乾爲末听用

人牙火燒菲菜汁製五七次

天靈蓋洗淨酥炙爲末听用

一痘已出未出不起不發隱在皮膚并麻症班症用

梅花一兩桃花二錢絲瓜五錢硃砂二錢

甘草二錢

右爲末每服五分或參分參蘇湯下

一痘不問前後凡黑陷咬牙寒戰用

杏花五分川山甲一兩仙靈脾五錢射香乙錢

右每服五分或三分咬牙寒戰加人牙一二三厘內托散

送下

一痘不問氣血俱虛或灰白色或水泡不回漿不落膿遍

身作痒抓破或醫後痘疤白皆用後方

黃蓍二兩人參一兩甘草五錢紫河車一兩梅花一兩

鹿茸一兩天靈蓋一

右共爲末每服五分或九分或一錢三分內托散送下

氣實者加山楂陳皮各五錢

夏胎元散治痘不起發不紅潤者是血氣俱虛胎元之不足也謬云竹破還須竹補木壞須用木修人損

須是人補此理雖存但仁人君子豈忍爲此姑錄以備參考云

五月墮胎是胎元乾焙將來極細研

氣血兩虛須用補

酒調和射服安然

夏水楊湯治痘乾枯不起者

水楊柳春冬用枝，秋夏用葉。生水邊細葉紅梗枝上，有員果蒲果，有白鬚散出。

右以楊枝切碎水煎七八沸先將十分置盆內手試不甚熱令患者先服內托之劑然後浴洗漸漸添湯不致太冷浴洗久許乃以油捻點燈照之纍纍然有起勢起處覺暈暈有絲此漿影也如漿不滿再浴若弱者只浴頭面手足可也既不赤體不厭多洗燈照如無起勢乃氣血而津液枯矣

鳴黃連杏仁湯治痘出因內熱兼外感咳嗽及麻症漸出，喉悶煩躁嘔吐，清水眼赤咽喉口舌生瘡。

黃連酒炒陳皮去白杏仁尖去皮麻黃去節枳壳炒

葛根



人參

黃耆

厚朴

姜汁炙去粗皮白芷

川芎

當歸酒洗

甘草

桔梗

肉桂去粗皮

防風去芦藿香去上

右各等分水酒各半盞姜棗煎服

〔宣〕陳氏木香散 治症同前

木香

臨時磨服

大腹皮黑豆汁洗

人參俱二赤茯苓

前胡

青皮炒去穰

半夏七次下香

柯子肉

甘草

俱二錢半

桂心一錢

右爲粗末每服三錢姜棗水煎隨兒大小加減

〔高〕瀉肺散 治痰氣熱鼻中乾燥皮毛枯槁咳嗽瘡色焦紫

〔瀉肺散〕

〔治〕

〔鼻〕中乾燥皮毛枯槁咳嗽瘡色焦紫

桑白皮

蜜炙去粗皮

地骨皮去土梗洗

甘草

右加淡竹葉二十片灯心水煎服或爲末亦可

〔重〕清肺飲 治症同前

麥門冬

去桔梗各二錢

知母一錢荆芥穗一錢天花粉一錢

石菖蒲

九節者佳

柯子肉各八分

右水煎服

〔真〕雙解散 治痘癰瘍不起發身發寒慘咳噠惡風自汗

時作戰慄

各一錢

桔梗

蘇梗

防風

羌活

白芷

蘇梗

陳皮

川芎

柴胡

麻黃

甘草

香附

右各等分姜水煎服

百解散 治痘表熱瘡焦紫不起發熱往來如羽拂佈

升麻

白芍

甘草

葛根

麻黃

薄桂

黃芩

川芎

白芷

右各等分水煎服

參苓白术散

治痘出裏寒飲食少進大便泄濁小便清白神氣倦日鼻氣冷瘡不起發

人參

白术

白茯苓

蓮肉

去心

桔梗

薏苡仁

藿香

砂仁

去土

平和湯

治痘出彼諸穢所觸此藥大能解風邪據毒之氣又能順表裏和陰陽萬舉萬全實不傳之方

右隨意加減水煎服爲末用米飲調服亦可

人參
當歸
白芷
白芍
沈香
檀香
乳香
黃芪
甘草

右各等分剉細用酒四兩和勻晒乾

神功消毒保嬰丹 每歲春分秋分日服藥一丸能預消無虞 繩豆藤 一兩五錢其藤八月間附毛荳梗上生者是採取陰乾妙在此 藥爲川獨活二牛蒡子乙兩炒 黑豆三十赤豆粒七十當歸酒洗赤芍五錢連翹去枝梗七錢桔梗五錢研極細爲衣黃連五錢酒炒防風

荆芥各五錢

苦絲瓜

長五十個
曆年經霜者妙燒灰

右各爲極細末和勻淨砂糖拌丸如李核大每服一丸

甘草湯化下諸藥預先精辨遇春分秋分成上元中

元日修合預在精誠忌茅婦人猫犬見之合時向太

陽祝藥祝日神仙妙藥體合自然嬰孩吞服天

地齊年吾奉

太上老君急急如律令勅口氣唸七遍妙

言

代天宣化丸卽韓氏五蘆舟加減也

人中黃

屬土甲巳年爲

黃芩

屬金乙庚黃柏

屬水丙

弟黃連

屬火戊午年爲

枝子

屬木丁壬苦參

佐

荆芥穗

佐防風

去芦

連翹

去心酒洗

佐

牛蒡子

酒淘燃

佐

紫蘇葉

佐

先視其年所屬取其藥以爲君其餘主歲者爲臣爲君
者倍之爲臣者半之爲佐者如臣四分之三爲冬至
日修合爲末取雪水煮升麻和竹瀝調神麯爲丸外
以辰砂雄黃爲衣每用竹葉湯下○製入中黃法取
大琪草不拘多少用新竹一節納琪草于中緊塞無
節空處放屎盆中浸七十四十九日取出晒乾聽用
龍鳳膏夫臘月東方正月立春日食

龍鳳膏

夫臘月東方

正月立春日食

一個

古地龍卽蚯蚓一條細小紅白

烏雞卵一个

右以鷄卵開一小竈，入地龍在內，夾皮紙糊其竈，飯上

蒸熟去地龍與兒食之。每歲立春日食一枝，終身不出痘瘡，覺隣里有此症，行食一二枝亦妙。或云春分日亦可食。

稀痘仙方

生黃一錢

蟾酥三分

硃砂七分

絲瓜蒂

近蒂取五寸

燒存性五錢

右共爲末，一歲兒服一分，用砂糖調下。

鬼紅丸

硃砂

甘草

六安茶

右各等分研細末，候臘八日午時，取生鬼血，將前二味

和合成丸如梧桐子大，逢三、六、九與兒食之，可免痘

瘡。

鼠肉方
取雄鼠肥大者去皮毛腸穢，用鹽醋爛煮，與兒食之，痘出稀少，切不可使兒聞見，亦不可對言。此肉但只可自設法取用，不可與他人取。計買來者，必有毒藥，死鼠慎之，或只用砂仁、白水煮，不用椒葱蒜韭薤芥，油煎等辛辣熱物，又云未食葷時與食尤妙。此屢試屢驗者也。

鯽魚方

鯽魚不拘大小，去鱗腹不可用，水洗，將空萎切細，畧

用鹽入魚腹內外以草紙包裹灰火中煨熟去火氣
陸續與兒嘗食甚可解痘毒但食後鱗腸骨刺俱埋

之

七言
蝦蟆方

八月內取大蝦蟆去頭皮用淨肉益花香油鍋內燂
燒去骨與食之七十餘枚更妙可免痘疹之虞

十六言
四脫丹

蟬退蛇退鳳凰退卽抱出雞子壳

神仙蛻卽父母底甲

右四味各等分焙爲細末每服一錢煉蜜丸加黃豆

每年除夜服三年後永不出痘

三言
雞蛋方

單養黃雞雌雞一隻不可與雄雞一處及大生蛋七
箇照次序圈起不可寫字好生收藏切忌蚊虫買小
籠籃七箇盛之用繩照數繫細竹棍爲記號置無女
人到東廁中浸十二月初一日將頭蛋一箇浸初二
日將第二箇浸入初二至初七將那五箇照依每日
浸一箇到初八日查看竹棍數記博斯蛋取出用瓦
罐煮熟空心食之初九日取第一蛋食之初十至十
四日每日照數取一蛋食之完小兒食之一生無疾

患壯實功効不可言

玄兔丹 本府鄭府尊方

玄參五兩以木槌打碎晒干取末

兔絲子十兩水淘淨

右二味俱不犯鐵氣共一處用黑沙糖丸如牌子大每

日與兒服三丸以沙糖湯下無時

葫蘆花湯 鄭判官方

八月採葫蘆花不拘多少陰乾入除夜蒸籠湯浴兒

或不出痘瘡縱出亦稀疎

苦練子湯 趙監趙侍郎方

取苦練子不拘多少煎湯浴兒或痘瘡不出出亦稀

少

鳥魚湯

十二月三十日將七星大鳥魚丁尾小者一二尾遇
黃昏時煮湯將兒遍身浴洗耳鼻口孔各要水到不
可因魚腥而用清水洗去時火不信或留一手或留
二足不洗遍行痘症其未洗處偏多爲驗也

已上三洗法或云隨月無拘

三豆湯 以下諸方俱臨時服

大黑豆解腎經毒制赤小豆解心經毒

赤小豆相火也

菉豆解陽明經毒制

以上各等分用清水淘淨將耳

胃火也

藥

卷之二

三

草浸水去盃以甘卿水煮豆熟爲度逐日空心住意飲早汗自然不出此方冬月煮熟令兒常服亦妙

言 麻油擦法 痘發時行之

每夜臨卧時用手中三指蘸麻油擦兒頭額頂背腰兩手膀兩足膀然後睡即可使之輕此亦暢達流通

升膀聚滯之義也

言 猩痘保嬰用

纏豆藤陰亂四兩酒洗紫草鐵器搗荆芥穗二兩牛蒡子二兩炒甘草梢去皮二兩朱砂三錢天竺黃一錢二分真者可用牛黃一錢二分一方無牛貴

蟾酥一錢赤豆

黑豆

菉豆各四十九粒

右爲細末外用紫草三兩角水二碗煎膏半碗八生砂糖半盞和勻將前末藥拌搗爲丸如赤豆大用飛過硃砂爲厚衣末出痘之時濃煎甘卿湯磨丁丸服大人丁丸如已發熱用姜湯磨服厚蓋出汗稠密者則大減稀少者則散而不出已見點甚密用甘草湯磨服丁丸亦可減輕或保無虞但小兒不可過服

言 三花丹小兒將出痘之時用之能稀痘

大梅花 桃花 蕺花

右三花俱取已開未開盛開者陰乾爲末等分取之先

爲丸雄黃爲衣用赤小豆暮豆黑大豆二豆湯下
言六味稀豆飲將發痘時預服之

先生曰朱祁立

出齊回水用
背臙可前後
別去山查紫加桔梗末

山查 紫草 牛蒡子各一錢 防風
荆芥各一錢二分 茄草五分

右姜三片水十盞煎服

言輕班散治痘末見熟服

絲瓜子近帶三寸連皮燒存性爲末硃砂淨未

耳目明眼大

右二味共一處和勻用砂糖調下痘出必稀多者少少

者無未用紫草二錢水煎服

言牽絆丹治出瘡脹之可以稀痘

硃砂不拘多用破石成塊者同炒三次至硃砂黑色去磁石用硃砂末每用些少蜜調服

三酥餅

解毒癰痘神妙初熱表汗用

蟾酥

端午日搗蟾以小蛤蜊上油取听用每用少許

木辰砂將絹囊盛之用力麻麻黃紫艸荔枝殼薑一日

紫草爲細末用蟾酥另搗作餅

麻黃去節湯泡過薑爲末用蟾酥另搗作餅

右各加射香少許另搗作餅各用磁器盛之聽用每遇重痘隨於發熱之初每二歲者將二餅各取十分或半分量兒太小加減熱油化下被蓋出微汗不能飲酒者將消毒飲化下尤妙若痘已出紅紫屬熱毒者

紫艸紅花湯或化毒湯半辰砂紫草二十餅調下少許解之又小兒初生用蜜調辰砂餅一分以解胎毒痘出必稀少皆妙法也麻黃餅痘出後忌用

珠砂解毒舟解毒稀痘神妙

世三言右以猪糞浸水調均令兒服之解一切毒且服於癰發之時

珠砂上丸者一錢研末

稀痘如神散

絲瓜 升麻 茄藥酒炒生甘草 山楂肉
黑豆 赤小豆 牛角用壯麝磨取用

右各等分各爲粗散每服二錢水一大盞煎至六分去

滓不拘時徐徐溫服量大小加減

世四預服萬靈丹痘初發熱丁服郎輕百發百中

升麻小者葛根 三錢 生甘草 五錢 紫草茸一錢
連翹去心雄黃 一錢 射香 一錢 蟬酥全蝎去毒白附子三錢

姜蚕炒去絲三錢 山豆根 五錢 全蝎去毒十個 白附子三錢

右十二味爲末用蟾酥九如阜角子大每服一丸紫草湯下

世五稀痘獸驗丹此藥極消毒氣險者轉吉成祥

右取活兔一隻去皮用頭肉將鹽醃肉晒乾加茵陳連

白牛毛散
魏各三錢，煮熟取汁，與覽量大小服之。

純白牛毛灰五錢，用銀碗炒熟，硃砂二錢研細，絲瓜蒂（或帶五寸焙乾三錢研末）。

右方將種作時以二味和勻，每早晨白湯下，或蜜湯調化一錢，服下即出稀少，但有真正純白牛毛無有不

効。

預防湯 治流未出之時，眼之拂少重者轉輕輕者或無黃連一分，蜜蒙花入升麻一分，紅花子十粒研末，生犀角一錢，苦參一分，梟膽子研山豆根各一錢。

右咬咀白水煎服。

甘草散 預服消毒，使痘出不致太盛。

甘草炙

右爲末，每日食後白湯調下五分。

消瘧飲 痘癰時預服多者可少少者可無。

當歸

五分，川芎五分，白芍六分，甘草三分，升麻三分。

紅花子 二錢研細，天花粉三分，荆芥穗三分，防風四分。

木通

去皮六分，陳皮五分，青皮三分，黃連一錢，姜汁炒一錢。

枸杞

五分，桔梗井水炒五分。

右姜水煎五分空心服，間三百服。

解毒全書

卷六

六

稀痘丹

治發熱三日之內紅癰未見之先壯熱頭疼腹痛一切熱毒盛者服之解散熱毒出毒稀少

雄黃

朱砂各一水瓦二分麝香一分

右各研勻取蟾酥爲丸如棗豆大每七歲五丸納生葱管內溫紙包裹灰火中煨候紙乾取出用升麻紫草防風荆芥穗蟬退白芷牛蒡子紫蘇葛根木通甘草加灯心三十根連鬚葱白五莖水煎乘熱送下前丸取汗則毒自解矣

涼血化毒飲

治痘初出頭焦患

歸尾

赤芍

生地

木通

連翹

牛子

白芍紅花

紫草

桔梗

山豆根

右咬咀白水煎調人糞末一錢同服

清金湯

治口氣臭

知母

黃芩

石膏

桔梗

甘草

天門冬

去頭

麥門冬

馬兜鈴

木通

山枝子

右各等分白水煎服

鮮毒化裏散

治痘瘍蜜

桔梗

去頭

牛蒡子

人中黃

防風

荆芥穗

酒紅花

歸尾

酒洗

蟬退

升麻

乾葛

赤芍

連翹

去枝梗心

卷之三

卷之三

卷之三

右各等分白水煎入燒人尿調服

固陽散火湯 治痘初出色白皮薄

黃芪

甘草

當歸 酒洗升麻

葛根 荆芥穗 連翹去枝防風

赤芍

麥門冬

生地

赤木通去皮節

右咬蛆白水煎

芎歸均氣飲治痘出豆殼蛇皮者此氣至而血不隨王之

當歸 川芎 赤芍

青皮

木香

官桂

右姜水煎服



大補保命湯 治痘皮嫩易破者

人參

黃芪

當歸酒洗

生地酒洗川芎

赤芍

牛蒡子

葛草

防風

去芦荆芥穗

連翹

梗心官桂去粗皮

右各等分白水煎入燒人屎服

平胃快班湯

治痘久陰雨不起發者

蒼术

泔水浸粗皮炒

厚朴

去粗皮姜汁炒

甘草炙

陳皮

防風

羌活

猪苓皮去黑夜冬去皮

右各等分白水煎服

寬中快班湯

治痘傷食不起發者

陳皮

半夏湯泡七次

白朮土炒枳實麴炒山楂

神曲炒

砂仁

黃連去鬚芦酒炒

厚朴去粗皮姜汁製

青皮去穰炒

連翹梗心木香磨服

右各等分生姜二片白水煎服

托裏快班湯

治痘毒甚不起者

羌活

防風去芦

牛蒡子桔梗升麻

荆芥穗

甘草

連翹梗心葛根

右各等分白水煎服


人參

黃芪

甘草

防風去芦

防已酒洗去皮



仲景全書

卷之三

七

官桂少許

去粗皮

右各等分白水煎服

十宣散治痘因邪積所觸陷伏而出不快者

人參二錢黃芩二錢當歸酒洗官桂去粗皮
二錢甘草各五

川芎

防風

桔梗去頭

木香臨時磨服白芷

厚朴去粗皮姜製

紫草錢一

右白水煎服

加味四聖散治痘太便秘

紫草二錢木通去皮節一錢川芎四分甘草二分

白术

土炒三分

白茯

去皮三分

糯米

一撮

木香

臨時磨服

秦艽 酒洗

右水一鍾煎服立退

京血芍藥湯 治痘作痛

芍藥酒炒

當歸酒洗 生地酒洗 紅花

右各等分白水煎服

十全大補湯 治痘項平脚癰不滿足

當歸酒洗 川芎

熟地酒洗 白芍酒炒 人參

白朮土炒

白茯苓去皮炙甘草

肉桂去粗乾姜炒少

右各等分白水煎服或加棗亦可

除溫湯 治痘溫收不齊

右各等分白水煎服

清金導赤飲 治痘熱乘肺金當醫不利欲危者

小便不利欲危者

當歸酒洗 白芍酒炒

白茯苓去皮

甘草去粗

桑白皮蜜枳壳炒

木通皮去粗

白龍散治痘潰爛

右各等分白水煎服

玄參

草前子入參

用乾牛糞燒過取中間白者研篩敷之

當歸涼血湯 治痘出

當歸酒洗 生地 酒洗 紅花 酒洗 地骨皮 牛蒡子

連翹

去枝梗心

耳草

人參

黃柏

右各等分白水煎服

當歸解毒湯 治痘太便秘

當歸酒洗 生地 酒洗 大黃

麻仁

炒研枳壳麪炒

紫草

去白

連翹

去枝梗

大黃

麻仁

炒研枳壳麪炒

右各等分白水煎服

桂枝鮮毒湯 治痘天寒氣鬱遏而不能厭者

桂枝

去粗皮少許

官桂

去粗皮少許

人參

黃耆

甘草

當歸

酒洗

白朮土炒

麥門冬去陳皮

酸棗仁

黃連

酒洗

白朮芩皮去

右各等分加棗一枚去核

糯米一撮

白水煎服

(二)白鷹糞散治痘瘡不落成瘢痕者

鷹糞取白色燒灰

馬齒莧

不拘多少

右晒乾燒灰和蜜水調塗醫上

(三)馬齒莧散治症同前

馬齒莧杵汁猪膏脂石蜜共熬膏塗腫處

(四)蒺藜散治症同前

右各等分加淡竹葉白水煎服。

〔言〕
蝶蛾法

用馬蝗大者二十五條放在紅腫處吮去惡血毒亦從洩也
馬蝗卽水蛭

〔言〕
蚕退散
敷牙疳

枯礬二錢滻火煉白一錢卽屎五棓子二錢退燒一桶中堵也

右共爲細末先以米泔水用蠍蟲翻轉蘸水洗净敗血後以藥末敷之

〔言〕
黃連陰懸丸
治狐惑瘡

黃連二錢蘆薈一錢史君子淨淘二錢五蕪荑一錢分

蕪荑一錢五分

乾蠅燒一錢二分加川棟子去核一錢

右共爲細末用烏梅洗去黑水去核搗膏和在米飲下

〔言〕
陰陽散
治赤口瘡

黃連二錢乾姜一錢

右其爲研末用地雞卽地掘水洗净次敷此藥

〔言〕
朱凡散
治白口瘡

朱凡散二錢白礬一錢

右共爲細末用鵝涎洗之次以此藥敷之

〔言〕
洗心散
治症通三前赤白二瘡

〔言〕
黃連
歸尾

生地酒洗大黃
麻黃

木通去粗皮節 薄荷葉 甘草 桔梗去梗 連翹去枝梗心

牛蒡子

右各等分入灯心一撮，白水煎服。

防風葛根湯治痘後發癰

防風去芦 葛根

升麻

赤芍

甘草

右各等分白水煎服。

覩子湯治痘後發癰

覩子不拘多少，活者以水養五七日旋取其水洗之。

覩衣煮湯亦佳。

十三味敗毒散治痘毒

當歸酒洗 白芷 川山甲炒 金銀花 防風去根

乳香製 甘草 陳皮 赤芍 姜角刺

貝母 天花粉 没藥製 半夏子 直角子

右各等分酒水各半煎服。

涼肝明目散治痘後羞明

當歸酒洗 龍膽草酒洗 蜜蒙花 柴胡 川芎

右各等分以猪肝，煮湯煎服。

望月砂散治痘後兩目暗室中不能開者

穀精草去芦 蜜蒙花酒洗五錢 蟬退去翅足五錢

左各等分以猪肝，煮湯煎服。

五
望月砂散治痘後兩目暗室中不能開者

穀精草去芦 蜜蒙花酒洗五錢 蟬退去翅足五錢

望月砂 一兩

右其爲細末用獐猪肝一兩以竹刀披破用藥一錢掠在肝內水煮肝熟飲汁食肝効。

羊鞘骨髓 治痘癬欲落不落瘡痕。

羊鞘骨髓 一兩

右煉入輕粉一錢研成白膏以磁器盛之塗瘡上。

紫草木通散 治身熱水便赤短者。

紫草茸 木通節

去皮黃連酒炒牛夢子

車前子

白茯苓 芫草

刺史

棗仁

桑角陳

右各等分白水煎服

川白甲

金鑑丸

大風子

桂風子

加味升麻湯 治痘熱甚經月不除。

連翹

去枝梗心酒洗升麻酒洗葛根

山梔仁

炒酒

酒芩

白桔梗去梗米泔水炒木香酒洗臨時磨服

滑石

炒酒

麥門冬

去心牛夢子酒淘研

右各等分淡竹葉灯心爲引白水煎服

荆芥解毒湯 治痘瘡疼。

荆芥解毒湯

治痘瘡疼。

升麻

炒酒

右白水煎服

絲瓜化毒湯 治痘瘡粘黑膿。

絲瓜化毒湯

治痘瘡粘黑膿。



絲瓜乾

近蒂五寸者

白芍

酒炒升麻

生甘草

黑豆

赤小豆

犀角屑

右各等分白水煎服

麻黃解毒湯

治紫黑陷以此發之

升麻

防風

去苦酒芩

酒芩

玄參

牛蒡子

人參

甘草

軟石膏

木通

去皮枝

連翹

去枝梗心

右各等分白水煎服

小靈丹

解毒發熱之聖藥也。治急班風陰項不癢一切惡症危者用此。

雄黃

各一錢

乳香

製

沒藥

蜜各一錢三分

附赤金譜

參耆內托散

治氣虛痒癩及大便頻者

人參 黃芪

當歸 滅洗 川芎

厚朴

去粗皮姜汁炒

桔梗 去頭

白芷

官桂 去粗皮

紫艸

木香

意加減

糯米一撮

右各等分白水煎服

加味四聖解毒湯

治瘡癩大使祕者

紫草 木通

大黃

枳壳

黃芪

楂枝 去粗皮

右各等分白水煎服

調元托裏湯

治瘡癩大使泄瀉者

大黃

枳壳

黃芪

楂枝 去粗皮

人參

黃耆

甘草

柯子肉

陳皮

桂枝

去粗皮

防風

去苦

羌活

赤芍

荆芥穗

木香

臨時

磨服

右各等分姜引水煎服

防風 荆芥穗 升麻

白芍

酒炒桂枝去粗皮

牛子 乾葛

右各等分淡竹葉爲引水煎服

犀角消毒飲

治痘瘡

酒

犀角

升麻

甘草

右各等分白水煎服

卷活當歸湯 治癰出，身背作痛

卷活

當歸 滴洗川芎

獨活

防風去壳

黃柏去粗皮各一錢 柴胡五分 桃仁去皮 紅花各八

桂皮去粗皮七分

右水煎溫服

桃仁承氣湯 治症同前

桃仁去皮肉桂

大黃

芒硝

甘草

右各等分水煎溫服

妙應丸 治脾胃實熱腹痛

妙應丸

大黃 肉桂 桃仁

芒硝

甘草

桃柳二兩 大黃蒸三兩 黃芩

二兩

滑石名二黑丑頭末

五錢

右爲米糊丸如梧子大，量大小，白湯下。

保和丸 治症同前

山楂

神麌

牛夏

姜湯泡

蘿蔔子

白朮各一

連翹

陳皮

陳皮

右各等分姜棗水煎服或爲末調服亦可

平胃散 治傷食作痛不思飲食

山楂

神麌

牛夏

姜湯泡

蘿蔔子

白朮各一

連翹

陳皮

陳皮

右各等分姜棗水煎服或爲末調服亦可

任永全言

四言
芍藥防風湯 治痘出不快腹痛煩燥啼叫者

白芍

陳皮

升麻

防風

桔梗

川芎

枳實

厚朴

甘草

右各等分姜棗水煎服

五言

大黃化毒湯 治太便秘結作痛

白芍

二錢

厚朴

一分

陳皮

七分

甘草

五分

大黃

一錢

右水煎服

六言

一聖散 治味喉痛

苦參

一味

研取細麪

每用一丁字吹之

甚效

七言

射干牛蒡湯 治痘多食辛熟或腹熱藥大過以致音不

清者

八言

當歸湯 治盜汗

當歸

黃芪

生地

麥門冬

甘草

黃連

白芍

浮小麥

九言

右用獐猪心竹力批開煮湯煎藥服之効

神功散

治痘作渴

人參

黃芪

甘草

牛蒡子

紅花

生地 前胡 菊草 白芍

右水煎服

紅花湯 治痘瘡

紅花或子隨意煎湯飲其渴即止雖口中如煙飲之

卽解再加牛蒡子尤妙

加味鼠粘子湯 治咽中有瘡

桔梗 治射干

陳皮 荆芥

右水煎細細呷之

控涎散 治咽喉

淡竹葉三十片

燈心三十根

右水煎湯服

潤腸湯 治虛熱

歸梢 芫草

生地 火麻仁 桃仁尾

右水煎服

人參四苓五皮散 治脾虛浮腫

人參 白朮 茯苓 芫草 麥門冬

辰砂 三分 雄黃 二分 兒茶 五分 柘末 五分 硼砂 一分

右爲細末少許吹入

燈心竹葉湯 治乾渴

淡竹葉三十片

燈心三十根

潤腸湯 治虛熱

歸梢 芫草

生地 火麻仁 桃仁尾

右水煎服

人參四苓五皮散 治脾虛浮腫

人參 白朮 茯苓 芫草 麥門冬

辰砂 三分 雄黃 二分 兒茶 五分 柘末 五分 硼砂 一分

右爲細末少許吹入

燈心竹葉湯 治乾渴

淡竹葉三十片

燈心三十根

潤腸湯 治虛熱

歸梢 芫草

生地 火麻仁 桃仁尾

右水煎服

人參四苓五皮散 治脾虛浮腫

人參 白朮 茯苓 芫草 麥門冬

黃芩 大腹皮 桑白皮 生姜皮 茶芩皮
陳皮 猪苓 潤瀉 木通 滑石
木香

右灯心水煎服
加味五皮散 治傷風溫溼癰
羌活 五加皮 蒼朮 桂皮 木通
防已 防風 束白皮 半夏 生姜皮

右生姜水煎服


白芷 防風 乳香 没藥 茜草
連翹 防風 乳香 没藥 茜草
薄荷 皂角刺 貝母 各一 金銀花 陳皮 各一
右剉散每服四五錢水酒各半鍾煎服量太小加減
或大瘡或麻木痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散凡治疔挑破出毒血者可治若挑破不痛不出血者難治皆用此法灸之即知痛更用針挑破紫血隨出諸毒隨去亦有生者其法用
太蒜頭切三分厚安瘡疖上用小艾炷於蒜上灸之
每五壯易蒜再灸若紫血止後腫痛不止尤宜當灸
治者參之

拔毒膏治瘡疔

雄黃一錢研 脨脂重浸水令濃調雄末點疔瘡頭上
立時即紅活亦神法也蓋雄黃能拔毒脢脂能活血
言三一承氣湯治瘡黑陷二便秘結腹滿喘急熱甚譜語
大黃三錢芒硝二錢厚朴姜汁炙二錢枳實炒
甘草錢一

右白水煎服厚朴枳實二十味量虛實加減用之
涼血地黃湯治室女出瘡遇經不止熱入血室
言

當歸 川芎 白芍 生地 白朮
升麻 黃連 甘草 人參 山梔仁



酒用散治女人經水不斷適逢出痘發熱昏沉言語狂
妄六分當歸一錢山梔仁 龍胆草各五分
慈活六分當歸一錢山梔仁 龍胆草各五分
川芎 防風各八分 大黃蒸三遍六分一方有木
歸脾湯治女人經閉不通血海乾澀適逢出痘以此調
其心脾不使血妄行

人參 白朮 茯神 黃耆各一錢二分
甘草三分木香五分遠志去心地骨皮一錢二分

酸棗仁一錢

右水姜棗前服加柴胡山梔名加味歸脾湯

逍遙散治症同前

白朮 白朮茶 當歸 白芍 甘草
柴胡各等分大棗一枚
右水煎服加山梔仁牡丹皮名加味逍遙散
如聖散治姪婦出痘安胎
六分白朮 白朮茶 當歸 桃壳 黑豆
大腹皮 砂仁 甘草 桑上年兒藤右名薜荔一錢
右各等分水煎服
當歸 川芎 熟地 乾姜炒黑桂心
蒲黃炒 香附米童便木香磨青皮 黑豆

右水酒各半煎服

治麻痘初發熱極時令和緩以此辛涼之藥發之

防風

桔梗

牛子

甘草

連翹

石膏

知母

枳壳

淡竹葉

荆芥

木通

水通

右各等分加灯心水煎服

治麻痘初發熱極時令和緩以此辛涼之藥發之

黃連

黃芩

黃柏

山梔仁

牛蒡子

石膏

桔梗

玄參

木通

知母

石膏

右姜三后水煎服

桂枝解毒湯治麻痘初熱勿時令太寒以此辛溫熱之藥發之

桂枝

麻黃

酒炒

赤芍

防風

荆芥

羌活

甘草

桔梗

人參

川芎

牛子

生姜

牛蒡子

赤芍

連翹

升麻鮮毒湯治麻痘初熱如時緩時寒以此辛平之藥發之

升麻

葛根

羌活

人參

柴胡

前胡

甘草

桔梗

防風

荆芥

右水煎服

右水煎服

加味麻黃散 治麻瘡發不出以此藥之

升麻 酒洗 麻黃酒炒 人中黃 牛蒡子 蟬退

右各等分水煎服

化班湯 治麻瘡色白

人參 知母 石膏 牛子 連翹
升麻 地骨皮 淡竹葉 芭草 糯米

右水煎服以米熟爲度

食榮湯 治麻瘡色白

人參 當歸 酒洗 紅花 酒洗 赤芍 桂水芭草

右水煎服

大青湯 治瘡麻紫赤乾燥暗晦

玄參 大青 桔梗 人中黃 知母

升麻 石膏 桃子仁 木通

右水煎服燒入泉入之如便秘者加酒大黃

玄參解毒湯 治瘡同前

右各等分水煎服

茅花湯 治麻瘡出鼻血

玄參 黃芩 山楂仁 炒桔梗 芭草

生地 葛根 荆芥穗

茅花 歸頭 牡丹皮 生地 茄草

右各等分水煎服

竹茹石膏湯 治麻症作呕

陳皮 半夏 石膏 白茯苓 竹茹

右水煎服

升麻澤瀉湯 治麻症自利

猪苓 澤瀉 滑石 赤茯苓 茄草

右水煎服

黃連去躁鬱酒炒 升麻

右各等分白水煎服

黃芩芍藥湯 治麻症滯下者

條芩二錢 白芍 升麻各二錢 茄草一錢

右水煎溫服

十全散 治麻症烟寒腫痛

黃芩 黃連去皮各二錢 黃蘗去油皮各一錢 苦參錢 玄胡索去浮皮三分 砂砂二分 乳香製一分 孩兒茶

雄黃各五分

右共爲極細末，每用少許，蘆筒吹入。

漏白散 治麻症咳嗽

桑白皮蜜地骨皮洗去土梗 茄草 漆竹葉片

燈心

右各等分爲末或白水煎服亦可

蘆薈肥兒丸治麻後發熱日夜不退髮焦皮枯肌瘦骨蒸癰瘍之症

蘆薈

各三錢生酒洗

龍胆草

各二錢炒

木香

各一錢磨服

人參

白蕪荑

各三錢去根

使君子

各一錢去皮殼炒

麥牙

各二錢炒

枳榔

各一錢

胡黃連

五錢

黃連

各一錢去芦頭酒炒

苦參

八分

驥退紙

大黃

一錢燒灰

右爲末猪胆汁糊丸如黍米大每服五六十九米飲下

雄黃

五錢

五柏子

二錢

枯礬

八分

驥退紙

一錢燒灰

右爲細末米泔水洗淨以藥搽之

四六

雄黃散

治痘同前

雄黃

一錢末

黃柏

去粗皮淨末

二錢

麝香

半分末

四七

雄黃丸

治麻后赤白痢裏急后重身實者

右和勻以艾煎湯洗淨後搽藥末

三黃丸

治麻后赤白痢裏急后重身實者

四八

雄黃芩

蒸

大黃

須炒去芦蒸透

右各等分爲末糊丸如梧桐子大每服一二十九白湯

下量大小虛實加減

香連丸治痘同前身虛者以此煎之

黃連

一兩

吳茱萸

五兩

右用少水搗勻頓滾水內半日取出炒乾揀去茱萸不

用加木香二兩不見火共爲細末醋糊丸米湯下量

太小加減

黃芩湯 治麻后赤白廁

黃芩 炒

黃連 去芦 炒

當歸 酒洗

川芎

人參

木香 磨服

青皮 去穰 炒

枳壳 炙炒

枳榔

甘草

右各等分水煎好再加益元散調服

麥冬 清肺飲 治麻痘咳嗽或出血或瘡湯水

知母

艾貝母

天門冬

去心

桔梗 去頭

甘草

杏仁 去皮

牛蒡子

石膏

馬兜鈴

右用糯米水煎服

清金降火湯

治麻后熱乘肺金聲啞不出或咳或喘

當歸 酒

白芍 酒炒

生地 酒洗

陳皮

貝母 去心

瓜棗仁

白茯苓

去甘草實

桔梗 酒炒

山梔炒

玄參

天門冬

麥門冬

桑白皮

杏仁 去皮

石膏

紫蘇梗

黃連 去芦

炒

右各等分加姜一尾白水煎服

羌活散

口麻後癱毒肢節疼痛

羌活 一兩

川山甲 一兩

酒炒研

大黃五錢

全竭 五個

右共爲細末每服一錢或錢半加牙皂

以發汗爲度

用藥法象

第九十九

夫藥有寒熱溫平之性。酸苦辛鹹甘淡之味。氣味陰陽不同。浮沉升降各異。酸爲木化醣。乃因水而生火。苦土。甘辛則緣金而致輕清。成象。本乎天。重濁成形。本於地。辛甘發散爲陽。酸苦澀泄爲陰。氣爲陽氣厚爲陽中之陽氣薄爲陽中之陰氣薄則發泄氣厚則發熱味爲陰味厚爲陰中之陰味薄爲陰中之陽味薄則通味厚則泄清之清者發腠理。陽中之陽厚之氣清之濁者實四肢陽中之陰薄氣使濁之濁者走五臟陰中之陰乃厚。朱濁之清者歸六腑。陰中之陽薄味耳。辛散酸收淡滲泄鹹軟苦泄甘緩結橫。

行直達要推詳。五味之能難悉別。由是觀之。則藥性爲立法之綱領。而立方者必先明藥性以爲之本也。

治痘合用藥性

第一目

寒性艸部

升麻

味甘苦氣平微寒。陽中之陰陽明經藥也。解百毒。主脾胃。療肌肉間熱。能升提陽氣故。用之以升發痘毒。

出表乃瘡家之聖藥也。首尾可用。發熱時用之以解毒。發痘後實熱及氣下陷者亦可用。但用太過恐有

倒醫

之患。

葛根

味甘氣平性輕。浮無毒足。陽明經藥也。解肌表之熱止胃虛之渴。以上二味有汗不宜服。發驚不宜服。服後猶紅不宜服。唇白者不宜服。

柴胡

味苦氣平微寒。陽明升也。陰中之陽無毒少陽厥陰二經藥也能解肌表熱。發熱時熱毒太盛者可用。毒

本全書

卷一

七



後寒症

不宜用

前胡

味苦氣微寒無毒治風寒咳嗽痰涎可用

黃連

味苦氣寒陰中之陽也無毒入手少陰經邪熱治痘發驚狂言飲水熱鬼神能遏心腎經之邪熱厚

腸胃而涼血痘後引

黃芩

味苦氣平寒陽中之陰也中枯而飄者蕷肺金之火而消痰兼退熱子犯表細實而堅者蕷大腸之火而滋陰兼退

桔梗

味辛苦氣微溫陽中之陰有小毒治痘熱毒咽喉作痛腹滿腸鳴鼻塞發痘排膿托裏寬胸膈咳嗽痰涎

舟楫肺部之引經方

知母

味苦辛氣寒無毒入足少陰經治痘陰火上潮諸熱不退口渴好飲冷水渴氣分中之火

貝母

味辛苦氣平微寒無毒止嗽消痰潤心肺除風熱散瘡瘍苦因爲諸藥之

桑菊苦因爲諸藥之

麥門冬

味苦甘氣寒無毒入手太陰足少陰經治肺氣虛熱上喘作渴及痘無膿者可用安五臟去心火

天花粉

味苦氣寒陰中之陽無毒能行血解熱其用有四排膿消腫毒癰瘍

天門冬

味苦甘平大寒無毒陽中之陽也入手太陰足少陰經保肺氣治血熱痘毒上攻氣分喘促鎮心火

生地黃

味苦氣寒陰中之陽無毒能行血解熱其用有四潤經益血

麥門冬

味苦甘氣寒陽中之陽無毒能行血解熱其用有四生肺止煩

生地黃

味苦氣寒陰中之陽無毒能行血解熱其用有四潤經益血

熟地黃

味苦甘氣寒陰中之陽無毒能行血解熱其用有四潤經益血

白芍藥

味酸苦氣微寒陰中之陽無毒能行血解熱其用有四潤經益血

朱砂

味酸苦氣微寒陰中之陽無毒能行血解熱其用有四潤經益血

腹痛而汎陰用，病中血散，不歸瘡潤，不飲食，賴以
杖之七日前後，必用已後，不禁。
赤芍藥味澀氣寒，利小便，攻血，止癥，解熱毒，其色赤，象
紫草味苦氣寒，無毒，利九竅，通水道，治痘心經，有熱閉塞，
不通，血氣凝滯，而毒壅，色紫，用此，痘心開竅，使痘毒
發越，而痘易起也。不

玄參味苦氣寒，無毒，入足少陰腎經，之君藥也。此乃攝机，
之削管領諸氣，上大肅清而不濁，治空中氣氣之氣，
腎經無根之火除結，熱毒可遇用，恐利大便。

地膚子味苦氣寒，無毒，主膀胱熱，利小便，去皮膚中熱，解
痘毒。

山豆根味苦氣寒，無毒，主解百藥毒，止痛，消瘡腫，療咽喉，
馬兜鈴

車前子味苦氣寒，無毒，主治肺熱，吸嗽痰結，喘促，炒用，
清利咽喉及痘后餘毒。

桔梗味苦氣寒，無毒，主膀胱熱，利小便，去皮膚中熱，解
痘毒。

馬兜鈴味苦氣寒，無毒，主治肺熱，吸嗽痰結，喘促，炒用，
清利咽喉及痘后餘毒。

馬兜鈴味苦氣寒，無毒，主治肺熱，吸嗽痰結，喘促，炒用，
清利咽喉及痘后餘毒。

龍胆艸味苦澀，大寒，氣味俱厚，無毒，除胃中伏熱，益肝膽。

菊花味苦生氣平寒，無毒，除胸中煩熱，安腸胃，明目，去翳。

大黃味苦，大寒，無毒，治痘熱毒，壅盛，小便不通，大便閉，急

泄半囊即仙靈脾，羊食多產，故名，味辛，寒，無毒，治痘，絕陽

茵陳蒿味苦，平微寒，無毒，入足太陽，經，主風溫寒熱，邪氣

射干味苦氣平，微溫，有毒，主喉痺，咽痛，不得消息，散結氣，
消腫毒，行太陰厥陰之積，痘後結核。

香附子味甘氣寒，陽中之陰，無毒，除胸中熱，飲食不多，皮

茅根味甘氣寒，無毒，除瘀血，閉寒熱，利小便，止渴，解腸

澤渴經味甘氣寒，無毒，除濕之聖藥，治小便淋瀝，或吐或瀉，養五臟，止渴，
爲君。

薏苡仁 味甘氣微寒無毒益氣助胃除風溫理腳氣

菖金

味辛若寒無毒治尿血不定敷白柏知煎服又下氣

心蟬腹者佳

木部

黃蘆

味苦氣寒無毒足太陽經引經藥也主五臟腸胃中結熱治瘡瘍皮膚間熱目

枝子

味微苦氣性太寒味薄陰中之陽無毒入手太陰經下竅入腎定燥解諸毒氣利口瘻療膀胱之癰火利

天竺黃

味甘氣寒無毒此竹內所生加黃土者可用主瘧

治肺瘧凡痘狀熱吐血衄血或七竅中出血必用之藥也

牡丹皮 味苦氣寒無毒此竹內所生加黃土者可用主瘧

經治腸胃積血吐衄能漏陰中之火療瘍瘍風瘡

牡丹皮

味苦氣寒無毒入手厥陰經少陰經治風瘡

地骨皮

味苦氣寒無毒入足少陰手少陽經能太肌熱解五內熱毒涼血止渴利大小腸

猪朴

味甘苦淡氣平寒無毒入足太陽經少陰經濕此諸淡滲藥大燥津液無濕症不可用解毒利水道

竹瀝

味甘平大寒無毒養陰退陽開熱痰甚妙用酒加姜汁

鈎藤

味甘苦氣寒無毒主寒熱發驚多服則損腎氣

枸杞

味苦氣寒無毒主五內邪氣熱惡陰益精，痘風寒亦痛風辨瘧膜

淡竹葉


味辛甘氣寒主胸中痰熱欬逆上氣吐血熱毒止，去瘀熱渴少睡痘瘡瘍瘍為未香油調敷擦

蜜蒙花

味甘氣寒無毒去目翳赤澁多眼淚酒蜜拌蒸用

枳壳

味苦氣寒無毒入手足厥陰經藥清頭目利小腸走大腸泄肺氣寬胸膈治遍身風疹皮膚牛蒡如



本草 卷之二
麻子 苦寒
芥炒用
枳實 味苦酸氣寒 純陰無毒主胸膈癰癧脾腫積血
消宿食安胃氣炒用
菜部

荆芥 味辛苦氣溫無毒主寒熱瘡疹除溫發邪通利血脈
清肌利咽治痘皮膚作痒退癰腫解餘熱
薄荷葉 藥入榮衛發汗通利關節治痘壯熱風癲驚搐
味辛苦氣寒性滑無毒主癰瘍毒利大小便治痘后
馬齒莧 藥丹皮膚不宜多服恐損胃氣
味甘性寒無毒解熱毒利小便近帶二寸燒存性益
葛瓜 錠未入砂少許與兒服利心湯下大解痘毒
△ 果部

梨 味甘微酸寒除客熱心煩肺熱消渴流利下氣
穀部

陳黃米 味酸氣微寒無毒主養腎氣去腰腹中熱
菉豆 味甘氣寒無毒除熱氣解痘疔毒治痘煩熱消渴母

△ 石部

石膏 味辛甘氣微寒無毒入手太陰少陽足陽明能發瘡
止渴生津及胃潤發斑眉虛寒不可服軟白者佳
滑石 味甘氣寒性沉重無毒入足陽明經治痘熱甚及驚
在諸證利小便通九竅退諸積熱逐六腑滯結軟白者
辰砂 味甘氣微寒無毒養精安神明目通血脉治兒瘡
傷解痘毒又痘瘡將出蜜調服之令少出又云有毒
不可過服恐心血瘀
代赭石 味苦甘寒無毒殺蟲惡毒氣養血療瘡止渴消暑
血遺溺如雞屎有澤者良
寒水石 味辛甘寒無毒主身熱腹中積聚邪氣皮中如火
燒煩滿其色清明者佳
破石 味辛鹹氣寒無毒養腎臟骨氣益精通關節除寒
熱消痘瘡定驚
保赤全書

苦硝味苦辛寒無毒除積熱消煩渴

輕粉味辛氣寒有毒來血散瘡毒

黃丹味辛微寒無毒除熱鎮心止痛生肌痘分眼用此以

胡粉味甘寒涼血生肌卽黑鉛燒煉成之

雄黃味苦平生氣平寒有毒主驚癲毒殺百蟲

獸部

犀角味苦酸鹹氣寒無毒能安心神止煩亂鎮肝明目涼

丹溪云屬陽性走散痘瘡後用此散除毒若血虛兒忌用但用一時取尖磨之

牛黃味苦氣平涼有小毒解心中火毒凡痘驚熱狂亂發

蟲部

穿山甲氣味寒有毒能發痘解毒用玉液或女人乳汁炒

蟬退味鹹甘氣寒無毒能發痘解毒而退風熱若熱盛紅紫者可用寒証忌之又云不論寒熱虛實皆可用頭起用身乃退無止痒之聖藥也

蟾酥味辛寒有毒治痘解毒發毒點火後毒上女之聖藥

熱性草部

乾姜味辛氣溫大熱陽中之陽無毒生則逐寒邪而發表


炮則除寒冷而溫中治痘虛寒不足之証溫脾理中

生薑味辛氣微溫氣味俱輕陽也無毒主寒邪頭痛鼻

寒上氣入肺開胃口益脾土散風寒痰嗽止嘔吐

卷下

七



附子

味辛氣溫大熱有大毒治痘一切風寒之証熱証忌之取童子小便煎服用之

當歸

味甘氣溫陽中微陰無毒入手少陰經足太陰厥陰經藥也養血行血凡痘不光潤紅活者以者柔佐

之如大便滑者忌之

白朮

味甘氣溫味厚氣薄陰中陽也足陽明太陰經藥補中健脾止瀉飲汎止嘔吐發泡滯溢者多加熱毒煩燥及起脹胃腹滿之時不可

獨活

味苦辛氣味俱蘇陽也亦也無毒乃是步陰引經藥也但羌活氣雄獨活氣細

木部

肉桂

味甘辛氣大熱有小毒能却風邪而實腰理和榮衛以固肌表治痘頰其鼓舞上行以開榮衛又引黃芩以達肌表必虛寒之証用之如大寒証及虛後作癆不可用

桂枝

味甘辛氣大熱有小毒入足太陽經仲景湯液用桂枝以其氣薄上行而發表也

入菜部

丁香

味辛氣溫鈍陽無毒入手太陰足陽明少陰凡痘色白胃寒嘔惡泄爲腹脹不食浮腫硬令胃虛者可用

紫蘇

味辛氣溫無毒王下氣除寒解肌發表頭疼身熱嗽痰寬腹脹開胃痘初用以發表子定喘急散逆潤心肺下氣

胡荽

味辛氣溫微毒療兒痘疹不出欲令速出取葫荽二三兩細切以酒二大盞煎令沸多令泄氣候溫云渣從頭以下噴一身除面不噴竇後莫見風

果部


橘皮

味辛氣溫味厚無毒可升可降陽中之陰也蜜白補胃和中去白消痰泄氣治痘止吐瀉消痰行氣

荔枝

味甘氣溫微毒治痘虛瀉陷伏不起用此養脾發毒壳煎湯亦

穀部



酒味苦辛氣氣大熱有毒通血脉厚腸胃能行諸經多服發庠助人戒之

獸部

麝香

味辛氣溫無毒聞之則麝痘服之則發痘凡遍身不
起隱而作庠者急用此以透心竅使毒氣易于發散
也但不可多用恐催

鹿茸

味甘酸苦辛氣溫無毒凡痘瘡寒喘伏不起而色
白者用此

蟲部

竹青蛇

性熱有毒治痘相合無縫遍身不起可用此之
所謂必毒攻毒也

溫性艸部

人參

味甘氣微寒氣味俱輕陽也無毒補元氣而和中生
津液而止渴安神健脈托裏排膿治痘之聖藥也戒

丁香

用於二日之內

前熟症忌勿用

細辛

忌勿用

細辛

忌勿用

細辛

忌勿用

細辛

忌勿用

黃蓍

味甘氣微溫無毒入手少陽手足太陰經藥也能窮
勝理丸痘氣虛表虛無勝者可用若外有紅紫斑者

羌活

乃表實忌用恐動三焦之火也味苦辛氣味俱輕陽也無毒散肌表風邪利肢節瘳
痛乃手足太陽表裏引經藥也痘症發熱身痛頭疼

防風

味甘辛性純陽無毒足陽明胃足太陰脾二經藥也除風熱而明目療腦痛而止汗痘被風寒閉塞不起

白芷

必用疏風利熱解毒和血止痒風熱之症不可缺也味辛氣溫氣味俱輕陽也無毒入手足陽明經藥治

麻黃

味苦甘氣溫氣味俱薄陽也升也無毒手太陰足太陽手少陰陽明經藥也王下痘症甚熱多寒者用

細辛

以發散寒邪消赤黑班毒瘡倒黴黑者以淨土合酒少許去節燃良久用服後不得見風味辛氣溫純陽無毒手少陰引經藥也治三陽頭痛百節拘挛行血安五臟明目



何首烏

味其苦澀氣微溫無毒治痘血不足過期不起發不入散小都可用大者能發熱動火六日前慎之

紅花

味辛苦氣溫陰中之陽無毒入心養血和血與當歸同功治痘熱血凝不行汚血化成班點用此行滯有去舊生新之妙多用則破血用時必酒炒○子吞數粒主天行時痘不出

胭脂

即紅花汁成之主兒痘未發擦時以此塗眼下兩臉其痘不入目又能活血解毒

川芎

味辛氣溫無毒入手少陽經足厥陰經藥能助清氣而利頭目引參耆以補元陽同當歸治氣虛血滯性溫能走而發散故七日自快頭陷可起但多用恐泄氣而熱症尤忌之

砂仁

味辛苦氣溫無毒治痘虛寒腹中煩悶不思飲食吐溫止嘔噦溫裏進食

木香

味辛苦氣溫無毒入手太陽經調諸氣散肺中滯氣止痢後重凡痘出不快者用此順氣行毒而痘出自快頭陷可起但多用

肉豆蔻

味辛氣溫無毒入手陽明經治痘咬牙寒戰胃寒泄吐逆之要藥也溫中開胃消食下氣用須

金銀花

味甘溫無毒消痘瘡腫痛諸毒

半夏

味辛微苦氣生寒熟溫陽中陰也有毒入足陽明經太陰少陽經藥治痘虛寒嘔噦少食瀉濕痰癧頭止

威靈仙

味苦氣溫無毒通十二經藥治皮膚風痒癩風宣行五臟主痘後兩手痠痛用此能引諸藥橫行手

五味子

味酸氣溫味厚氣輕陰中微陽無毒入手太陰足太陰經藥也止渴生津滋阴補腎消痰止嗽止

山藥


味甘平氣溫無毒補中益氣除陰痘中泄瀉者用之質氣虛者不宜多服

△木部

藿香

味甘辛氣微溫無毒陽也入手足太陰經藥也開胃溫中止嘔吐去惡氣

采收全書



厚朴

味苦辛氣溫陽中之陰也無毒消腹脹止嘔逆健胃寬中泄瀉亦用用須姜汁多去粗皮

柯子

味苦酸氣溫性急喜降無毒治痘虛寒泄瀉不止咽喉不利六棱黑色肉厚者良取皮肉去核

楨榔

味辛苦氣溫陰中陽也無毒治心心疼殺三虫除後重破滯氣

乳香

味辛苦氣溫陽也去惡氣療諸瘡癰爛止痛生肌

冰片

味辛苦氣溫屬陽無毒治痘熱盛在舌昏迷不省及瘻瘍而痘不起者用此毒解

菜部

葱白

味辛氣溫無毒入手太陰經足陽明經主痘初發熱用此鮮肌

果部

大棗

味辛氣溫無毒安中養脾胃助十二經通九竅生津液定驚和百藥

杏仁

味甘苦氣溫有小毒入手太陰經主欬逆下氣定喘潤心肺散風寒去皮尖炒用

穀部

麥芽

味鹹其氣溫無毒治胃虛食難消化腹中脹滿而痘不起者此王道和緩之劑始終無碍

糯米

味苦甘氣溫無毒治胃虛弱作瀉或五六日不起者灌漿者

白扁豆

味甘氣微溫主和中下氣止吐瀉利小便

赤小豆

味辛甘酸氣溫陰中之陽無毒散毒排膿消渴止泄利小便

神麴

味甘氣溫調中下氣化水穀消宿食用須炒者


石部

伏龍肝

味甘微溫微毒卽生中對釜月下黃土也消痘瘻腫止吐瀉

鷄冠血

味甘辛氣微溫無毒二云小毒和無灰酒燉能發痘瘻屬異風故易起發故頂血至清高用神妙



卷之三

蟲魚類

鯽魚 味甘氣溫主胃弱不下食調中下氣腸痺水穀不調
解痘瘡

烏魚 味甘氣無毒煎湯服能治久瘧浴小兒可稀豆毒

蜈蚣 味辛氣溫有毒治痘癰毒蛇咬陰內臟腹滿去頭足
多用

△平性草部


牛蒡子 一名鼠粘子一名大力味辛氣平無毒能潤肺金
而退風熱利咽喉而散諸腫紅紫黑甚者可用

南星

味苦辛氣平有毒除風痰利胃膈破堅消腫

纏翹 味苦氣平陽也手足少陽經陽明經藥也治痘紅紫
熱毒發燒狂言心經有風熱者可用能除五心邪熱
療周身骨節癰腫

- 耳艸 味甘氣平生寒熱溫陽也能補三焦元氣健胃和中
解諸般藥毒若熱嘔者生用畏寒者炙之
- 白附子 味甘氣溫無毒一云小毒治痘四肢風熱不退
及頭不起可用散風利熱解毒如神
- 木賊 味甘微苦無毒退痘後日翳益肝胆
- 決明子 味鹹苦氣平微寒無毒主青盲目澆膚赤白膜腫
痛淚出除肝家熱
- 小茴香 味甘氣平淡陽也無毒治痘熱閉小便不利用此以
胃下食止方嘔吐調中療惡毒腫毒
- 燈心 味苦氣微寒無毒根及苗主五淋清心解熱燒存性
止兒夜啼
- 兔絲子 味辛甘氣平溫無毒治痘瘡癰瘍虛寒腰痛膝冷
明目
- 水通 味甘氣平淡陽也無毒治痘熱閉小便不利用此以
瀉心經之邪熱從膀胱而出與內心同功
- 天麻 味辛甘氣平無毒通血脉開闢竅治風熱頭眩療麻
痺驚癲
- 木部



茯苓

味甘淡氣平陽也無毒入手太陰足太陽少陽補中利水滲瀉益氣生津止渴治痘熱渴小便赤澁如無

赤茯苓

此在慎之乃痘天麻後收斂之藥赤者屬丙丁利小便破滯氣如小便多及汙多陰虛者不宜服

琥珀

味甘氣平屬陽無毒治痘驚風及小便不利而痰熱甚者可用

大腹皮

味辛氣微溫無毒消浮腫除腹脹散毒氣

血竭

味甘鹹氣平有小毒主五臟邪氣一切惡瘡止痛生肌治痘用之活血

沒藥

味辛氣平無毒破血理氣止痛療癰疽餘毒

青皮

味苦氣平入足厥陰肝經能開膈行氣凡痘肚腹脹脹食傷而未得下者可用然小腹微痛乃毒未得

桃核

味苦辟邪除百毒痘毒氣非毒

果部

山楂子

癰疽消滯化痰行氣乃痘科首尾可用之藥也

梅花

味甘微酸氣平陽也無毒能發痘解毒以其次先得萬物生發氣也

桃花

味苦辟邪除百毒痘毒氣非毒

穀部

黃豆

味甘氣平能發痘毒

生豆腐

治痘瘡不起用此極攻膿解毒如鄉間無藥煮此與兒食之故醫家治腫多用効

黑豆

能解毒和諸藥而善利小便不論寒熱虛實皆可用

豌豆

性平味甘氣淡能解毒故痘中用之以拔赤毒也


石部

赤石脂

味甘酸性氣平無毒治胃虛作渴不止燥渴者可

保赤全書

卷六



人部

獸部

象牙

氣平無毒極利小便痘不收瘡用之者以其有利水之功也云能起痘眼中痘磨水搽上好

兔頭骨

味甘氣平無毒與肉同功能解痘毒忌白雞肉食

驟月者良糞能退痘後眼中雲翳

蟲部

蛇退

味鹹其氣平無毒又云有毒凡疽不論寒熱虛實而不起發者用此焙乾以同起發之藥以助之

蠭蚕

味鹹辛氣無毒治驚風癰瘍甚四肢搐搦亦能發

露蜂房

味苦鹹氣平有毒能去風解毒利熱稀痘

石蜜

味甘氣平微溫無毒主心腹邪氣安五臟諸不足益氣補中止痛解毒治癰不落用湯調時以羽翎刷之

龜板

味鹹其氣平無毒痘牛用之以其大有補陰之功也

人部

天靈蓋

治痘灰白頂陷氣血不足乃以人之靈而補人也

人牙

用此以伐腎經之邪凡痘黑陷咬者可用酥炙或酒漿炙

童便

氣寒療寒熱硬疼溫氣鼻血

人乳

氣寒療眼熱赤痛，穢五臟止淚明日痘不貲癆用此以助之

人中白

卽尿桶中沉白厚者煅用治痘牙疳

紫河車

卽混沌皮大補氣血出痘氣血兩虛者用之

人髮

味苦氣溫又云有小寒無毒補陰之功甚捷凡痘鼻鴟者燒末吹之立止

保赤全書卷下終



人妻恐參數不熟人云有私惡惡歸命之良苦也乃進
謀而重相見久人無事出東南道雨露告用之
人母時失禮中此皆我母見死悲子故
人母以禮之此皆我母見死悲子故
人母見母亦殊無正氣九死甲子不無驚感
草頭麻水森森森頭寒上寒風
八毛那葉文則謂外音多聲言語是極秋水之聲至
六寒萬葉之日即謂寒也不遇悲恨人大難而生人
人情



Kitasato Memorial Medical Library

