



h 49

Kitasato Memorial Medical Library

F 18
水-47





1924
1925

Handwritten Japanese text in cursive style, likely a list or record, covering the right page. The text is arranged in several horizontal lines, with some characters appearing to be in a different script or dialect. The ink is dark and the background is light, making the characters stand out.



499.9
H0-5
15

No. 1856
12449



富士川文庫

3428

本草綱目草部目錄第十七卷上

草之六 毒草類四十七種

大黃 本經

商陸 本經

狼毒 本經

防葵 本經

狼牙 本經

簡茹 本經

大戟 本經

澤漆 本經

甘遂 本經

續隨子 開寶

葇荂 本經

雲實 本經

蓖麻 唐本

常山 本經

木藜蘆 拾遺

藜蘆 本經

天雄 本經

側子 別錄

附子 本經

天雄 本經

側子 別錄

本草綱目草部

卷十七 目錄

尾張淺井氏記

漏籃子

綱目

烏頭

本經

白附子

別錄

虎掌天南星

本經

由跋

本經

蒟蒻

開寶
菩薩草附

半夏

本經

蚤休

本經

鬼臼

本經

射干

本經

鳶尾

本經

玉簪

綱目

鳳仙

綱目

坐拏草

圖經
不蘆附

曼陀羅花

綱目

羊躑躅

本經

山躑躅
羊不吃草附

芫花

本經

莨菪花

本經

醉魚草

綱目

莽草

本經

茵蕒

本經

石龍芮

本經
胡椒菜

毛茛

拾遺
每薑附

牛扁

本經

葶麻

圖經

本草格注草

唐本

第十七海芋

綱目

透山根附

鉤吻

本經

草之右附方舊一百三十四新四百九十五

大黃

本經
下品

釋名黃良

本經

將軍

當

火參

吳

膚如

黃其色也

將軍

之號當取其駿快也果曰推陳致新如

集解

別錄曰大黃生河西山谷及隴西二月八月

生黃連其葉圓相當莖高三尺許三月花黃五

月實黑八月采根根有黃汁切片陰乾弘景曰今

采益州北部汝山及西山者雖非河西隴西好者

猶作紫色銅色味甚苦澁色至濃黑西川陰乾者

乾亦有火乾者皮小魚不如西耐乾者

別列粗者便不中服恭曰葉子莖並俱

羊蹄但莖高六七尺而脆味酸堪生啖葉粗長而厚根紅者亦俗宿羊蹄大者乃如盤長二尺其性濕潤而易蛀壞火乾乃佳作時燒石使熱橫寸截著石上燂之一日微燥以繩穿眼乾今出宕州涼州西羌蜀地者皆佳幽并以北者漸細氣力不及蜀中者陶言蜀地不及隴西誤矣藏器曰凡用當分別之若取和厚深沈能攻病者可用蜀中侶牛舌片緊硬者若取馮洩駿快推陳去熱者當取河西錦文者頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之土番大黃正月內生青葉侶苧麻大者如扇根如芋大者如盤長一二尺其細根如牛蒡小者如芋四月開黃花亦有青紅似蕎麥花者莖青紫色形如竹二八月采根去黑皮切作橫片火乾蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛舌大黃二者功用相等江淮出者曰土大黃二月開花結細實時珍曰安初益州藥物圖言蜀大山中多有之赤莖大葉根巨若盤藥市以大者為椀紫地錦文也今人以莊浪出者

為最莊浪即古涇原隴西地與別錄相合

正誤 頌曰興州出一種羊蹄大黃治疥癩甚効初生苗葉累年長大即葉侶商陸而狹尖四月

內抽條出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色呼為金蕎麥三月采苗五月采實陰乾九月采根破之亦有錦文亦呼為土大黃時珍曰蘇說即老羊蹄根也因其侶大黃故謂之羊蹄大黃實非一類又一種酸模乃山大黃也狀侶羊蹄而生山上所謂土大黃或指此非羊蹄也俱見本條

根修治 雷曰凡使細切以文如水旋斑緊重者剉片蒸之從巳至未晒乾又酒臘水蒸之從

未至亥如此凡七次晒乾却酒淡蜜水再蒸一伏時其大黃必如烏膏樣乃晒乾用藏器曰凡用有蒸有生有熟不得一槩用之承曰大黃采時皆以火石燂乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙

蒸 煑

氣味苦寒無毒

別錄曰大寒普日神農雷公皆有

日味苦氣寒氣味俱厚沉而降陰也用之須酒浸
煨熟者寒因熱用酒浸入太陽經酒流入陽明經
餘經不用酒杲曰大黃苦峻下走用之于下必生
用若邪氣在上非酒不至必用酒浸引上至高之
分驅熱而下如物在高巔必射以取之也若用生
者則遺至高之邪熱是以愈後或目赤或喉痺或
頭腫或膈上熱疾生也時珍曰凡病在氣分及胃
寒血虛并妊娠產後並勿輕用其性苦寒能傷元
氣耗陰血故也之才曰黃芩為之
使無所畏權曰忌冷水惡乾漆

主治下瘀血血

閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致

新通利水穀調中化食安和五臟

本經平胃下氣除

痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛

諸老血留結

別錄通女子經候利水腫利大小腸貼

熱腫毒小兒寒熱時疾煩熱蝕膿

甄權通宜一切氣

調血脈利關節泄壅滯水氣溫瘴熱瘧大瀉諸實

熱不通除下焦濕熱消宿食瀉心下痞滿

元素下痢

赤白裏急腹痛小便淋瀝實熱燥結潮熱譫語黃

疸諸火瘡

時珍

發明

之才曰得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚志

怒心下悸氣得消石紫石英菴仁療女子血
崩宗奠曰張仲景治心氣不足吐血衄血瀉心湯
用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足而不用補心

湯更用瀉心何也答曰若心氣獨不足則當不吐
其熱以苦補其心蓋一舉而兩得之有是證者用
之無不効惟在量其虛實而已震亨曰大黃苦寒
善泄仲景用之瀉心湯者正因少陰經不足本經
之陽亢甚無輔以致陰血妄行飛越故用大黃瀉
去亢甚之火使之平和則血歸經而自安夫心之
陰氣不足非一日矣肺與肝俱各受火而病作故
黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血
之合也肝肺之火既退則陰血復其舊矣寇氏不
明說而云邪熱客之何以明仲景之意而開悟後
人也時珍曰大黃乃足太陰手足陽明手足厥陰
五經血分之藥凡病在五經血分者宜用之若在
氣分用之是謂誅伐無過矣瀉心湯治心氣不足
吐血衄血者乃真心之氣不足而手厥陰心包絡
足厥陰肝足太陰脾足陽明胃之邪火有餘也雖
日瀉心實瀉四經血中之伏火也又仲景治心下
痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯主之此亦瀉

脾胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則作
痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結于上焦胃之上脘
在于心故曰瀉心實瀉脾也素問云太陰所致為
痞滿又云濁氣在上則生脹脹是矣病發於陽而
反下之則成結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘分
野仲景大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之
邪而降其濁氣也若結胸在氣分則只用小陷胸
湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯矣成無已註釋
傷寒論亦不知分別此義成無已曰熱淫所勝以
苦泄之大黃之苦以蕩滌瘀熱下燥結而泄胃強
頌曰本草稱大黃推陳致新其効最神故古方下
積滯多用之張仲景治傷寒用處尤多古人用毒
藥攻病必隨人之虛實寒熱而處置非一切輕用
也梁武帝因發熱欲服大黃姚僧坦曰大黃乃是
快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓梁元
帝常有腹痛疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧
坦曰脈洪而實此有宿妨非用大黃無瘥理帝從
之遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶

中便謂此方神奇其差誤則不言用藥之失可不戒哉

附方

舊十四新二十七

吐血衄血

治心氣不足吐血衄血者瀉心湯主之

兩黃連黃芩各一兩水三升煮一升熱服取利

張仲景金匱玉函

兩為散每服一錢以生地黃汁一合水

傷寒痞滿

半盞煎三五沸無時服簡要濟眾方

病發於陰而反下之心下滿而不痛按之濡此為痞也

瀉心湯主之

以麻沸湯二升漬之須臾絞汁

熱病譫狂

腳風氣

令焦搗篩每用二錢空心以水三大合入

氣壯者大黃一兩水二升漬一宿平旦煎汁一升入苾消一兩緩服須臾當利下

傷寒類要

薑三片煎十餘沸取湯調服當下冷一切壅滯

膿惡物即痛止

方治風熱積壅化痰涎治痞悶消食化氣導血用

大黃四兩牽牛子半炒生四兩為末煉蜜丸如梧

子大每服十丸白湯下並不損人如要微利加一

二十丸

又名全真丸金宣宗服

之有驗賜名保安丸

前產後不可服用大黃酒浸蒸熟切晒八兩生黃

芩八兩沉香半兩青礞石二兩以焰消二兩同入

砂罐固濟煨紅研末二兩右各取末以水和丸梧

子大常服一二丸小病五六丸緩病七八丸

丸急病一百二十丸溫水吞下即臥勿動候藥逐

上焦痰滯次日先下槽粕次下痰涎未下再服王

宜六癸日合之用錦紋大黃一斤分作四分一分
 用童尿一盞食鹽二錢浸一日切晒一分用醇酒
 一盞浸一日切晒一分用紅花四兩泡一盞浸一日
 黃去豆不用一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸一日
 切晒一分用當歸四兩入淡醋一盞同浸一日去
 歸切晒為末煉蜜丸梧子大每服五十九空溫
 酒下取下惡物為驗未下再服此
 武當高士孫碧雲方也醫林集要
 心腹諸疾 三物
 尤治心腹諸疾卒暴百病用大黃巴豆乾薑各一
 兩搗篩蜜和搗一千杵丸小豆大每服三九凡中
 客卒忤心腹脹滿痛如錐刀氣急口噤停尸卒死
 者以暖水或酒服之或灌之未知更服三九腹中
 鳴轉當吐下便愈若口已噤者折齒灌之入喉即
 瘥此乃仲景方司空裴秀改為散用不及丸也
 圖經 腹中痞塊 煎大黃十兩為散醋三升蜜兩匙和
 本草 腹中痞塊 煎大黃十兩為散醋三升蜜兩匙和
 下世利為度 腹脇積塊 風化石灰末半斤瓦器炒
 外臺祕要 腹脇積塊 極熱稍冷入大黃末一兩

炒熟入桂心末半兩畧炒下米醋攪成膏攤布貼
 之○又方大黃二兩朴消一兩為末以大蒜同搗
 膏和貼之或加阿魏一 久患積聚 二便不利上檢
 兩尤妙 丹溪心法 大黃白芍各二兩為末水丸梧子大每
 湯下四十九日三以知為度 千金方 脾癖疳積
 不拘大人小兒錦紋大黃三兩為末醋一盞沙鍋
 內文武火熬成膏傾瓦上日晒夜露三日再研用
 舶上硫黃一兩形如琥珀者官粉一兩同研勻十
 歲以下小兒半錢大人一錢半米飲下忌一切生
 冷魚肉只食白粥半月如一月服不愈半月之
 後再服若不忌口不如勿服 聖濟總錄 小兒
 無辜 因癰瘰癧或頭乾黃聾或乍痢乍瘥諸狀多
 者大黃煎生之大黃九兩錦紋新實者若微
 朽卽不中用削去皮搗篩為散以好米醋三升和
 置瓦盆中於大鑪內浮湯上炭火慢煮候至成膏
 可丸乃貯器中三歲兒一服七丸梧子大日再服
 以下出青赤膿為度若不下一服或下少稍稍加丸若

下多又須減之病重者七八劑方盡根大人亦可

用之此藥惟下宿膿不令見利也須禁食毒物乳

母亦禁之一加木香小兒諸熱一兩為末煉蜜丸

一兩半崔知悌方

麻子大每服五丸至十丸蜜湯下

加黃連名三黃丸錢氏小兒方

大黃四分以童子小便五里再服

空腹分為二服如人行五里再服

白濁淋入藥攪勻蒸熟空心食之不過三服愈

簡便相火秘結三錢有厥冷者酒服無厥冷五心

煩蜜湯服劉諸痢初起錢壯人各一兩水煎服

河間保命集

取利或加檳榔集簡方熱痢裏急煎服取利集簡方忽喘

悶絕不能語言涎流吐逆牙齒動搖氣出轉大絕

水二盞煎一盞熱服食已即吐胸中有火也

可安危氏得效方

水一升煮半升溫服婦人血癖二升煮十沸頓服

取利仲景金匱玉函方

千金翼產後血塊梧子大每服五丸溫醋化下良

千金方乾血氣痛好醋一升熬成膏丸芡子大卧

時酒化一丸服大便利一二行紅漏自下

乃調經仙藥也或加香附董氏集驗方

痛小戶腫痛也大黃一兩酒一男子偏墜作痛大

醋塗之乾則濕熱眩暈不可當者酒炒大黃為末

易梅師方小兒腦熱常欲閉目大黃一分水三合浸

也丹小兒腦熱一歲兒服半合餘者塗頂

上乾即再上暴赤目痛四物湯加大黃酒煎

姚和衆至寶方

火牙痛 口含米水一口以紙燃蘸大黃末風熱牙

痛 紫金散治風熱積壅一切牙痛去口氣大有奇效好大黃瓶內燒存性為末早晚楷牙漱去都

下一家專貨此藥兩宮常以數千風蟲牙痛 出常

漸至崩落口臭極効大黃米泔浸軟生地黃各旋切一片合定貼上一夜即愈未愈再貼忌說話恐

引入風 **口瘡糜爛** 大黃枯礬等分為末 **鼻中生**

本生大黃杏仁搗勻猪脂和塗○又方生大黃黃瘡連各一錢麝香少許為末生油調搽 聖惠方

仙茅毒發 見仙茅下 **傷損瘀血** 三因方雞鳴散石壓傷及一切傷損瘀積痛不可忍並以此藥

和濟方治跌壓瘀血在內脹滿大黃當歸等分炒酒一盞煎六分雞鳴時服至曉取去瘀血即愈○

研每服四錢温酒 **打撲傷痕** 瘀血滾注或作潮熱服取下惡物愈

一也 灑湖集簡方 **杖瘡腫痛** 大黃末薑汁調塗

白也 灑湖集簡方 **杖瘡腫痛** 大黃末薑汁調塗

滴玄 醫方 **金瘡煩痛** 大黃末先食水下十九日三服

千金 **凍瘡破爛** 大黃末水調塗 **湯火傷灼** 莊浪木

方 蜜調塗之不惟止痛又且滅癥此乃 **灸瘡飛蝶** 因

金山寺神人所傳方 洪邁夷堅志 **灸瘡飛蝶** 艾

灸訖火毒便退瘡內鮮肉片飛如蝶形而去痛不可忍是火毒也 大黃朴消各半兩為末水服取利

即愈 張 **蠅咬瘡** 大黃末塗 **火丹赤腫** 遍身者

水頻刷之 **腫毒初起** 大黃五倍子黃蘗等分為末

便癰腫焮熱 數易即退甚驗神方也 肘后方

乳癰腫毒

全黃散用川大黃粉草各一兩為末好

先以溫酒服

婦人大匙明日大風癩瘡

取下惡物

婦人經方如亂髮之蟲取盡乃服雄

為未每服方寸七

空心溫酒下取出惡毒物如魚

腦狀未下再服

即取下如亂髮之蟲取盡乃服雄

商陸

本經下品

葉氣味

酸寒無毒

主治

置薦下辟風蟲

相感

志

釋名

遂葛

當陸

章柳

白昌

馬尾

呼

本經時珍曰此物能逐蕩水氣故曰遂葛訛為商陸又訛為當陸北音訛為章柳或云枝枝相

苗葉葉相當故曰當陸或

云冬當陸路而生也

集解

別錄曰商陸生咸陽川谷如人形者有神

甚有毒保昇曰

所在有二種白者人藥用赤者見鬼神

花者根赤白花者根白

二月八月采根日乾頌曰

俗名章柳根多生於人家園圃中春生苗高三四

尺青葉如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紅紫

花作朶根如蘿蔔而長

八九月采之爾雅謂之遂

葛廣雅謂之馬尾

易經謂之莧陸教曰一種赤目

苗葉絕相類不可服之

有傷筋骨消腎之毒惟花

白年多者仙人采之作脯

可下酒也時珍曰商陸

昔人亦種之為蔬取白根

及紫色者擘破作畦栽

之亦可種子根苗莖並可

洗蒸食或用灰汁煮過

亦良服丹砂乳石人食之

尤利其赤與黃色者有

毒不可食按周憲王救荒

本草云章柳幹粗似

雞冠花幹微有縷榜

色微紫赤極易生植

根修治

教曰取水浸兩宿漉出架甑蒸以黑豆葉一重

商陸一重如此蒸之從午至亥取出
去豆葉暴乾判用無豆葉以豆代之

氣味辛平有毒

別錄曰酸權曰甘有大毒忌犬肉
大明曰白者苦冷得大蒜良赤者

有毒能伏礪砂砒石雖黃援錫恭曰赤者但可貼
腫服之傷人痢血不已殺人令人見鬼神張仲景

日商陸以水服殺人果曰商陸有毒陽中之
陰其味酸辛其形類人其用療水其效如神**主治**

水腫疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物本經療胸中邪氣

水腫痿痺腹滿洪直疏五臟散水氣別錄瀉十種水

病喉痺不通薄切醋炒塗喉外良甄權通大小腸瀉

蠱毒墮胎炆腫毒傳惡瘡

大明

發明

弘景曰方家不盡用惟療水腫切生根雜鯉
魚煮作湯服道家乃散用之及煎釀服皆能

去尸蟲見鬼神其實子亦入神藥花名芎花尤良
頌曰古方術家多用之亦可單服五月五日采根

竹筴盛掛屋東北角陰乾百日搗篩并華水調服
云神仙所秘法也時珍曰商陸苦寒沉也隆也陰

也其性下行專於行水與大戟甘遂蓋異性而同
功胃氣虛弱者不可用方家治腫滿小便不利者

以赤根搗爛入射香三分貼于臍心以帛束之得
小便利即腫消又治濕水以指盡肉上隨散不成

文者用白商陸香附子炒乾出火毒以酒浸一夜
日乾為末每服三錢米飲下或以大蒜同商陸煮

汁服亦可其莖葉作蔬食亦治腫疾嘉謨曰古讚
云其味酸辛其形類人療水貼腫其效如神斯言

盡之矣

附方

舊九
新六

濕氣脚軟

樟柳根切小豆大煮熟更以
綠豆同煮為飯每日食之以

瘡為度最効
斗門方

水氣腫滿

外臺祕要用白商陸根去
皮切如豆一大盞以水

二升煮一升更以粒米一大盞同煮成粥每日空心服之取微利不得雜食○千金隨用白商陸六

兩取汁半合和酒半升看人與服當利下水取効○梅師方用白商陸一升羊肉六兩水一斗煮取

六升去滓和葱腹中暴癥治百日死多取商陸根或作雁食之

搗汁或蒸之以布藉腹上安藥勿覆痰癖如石脇下堅硬生商陸根汁一升杏仁一兩浸去皮搗如

泥以商陸汁絞杏泥火煎如錫每服棗許空腹熱酒服以利下惡物

為度聖惠方產後腹大散用樟柳根三兩大戟一兩半甘遂炒一兩為末每服二三錢熱湯調

下大便宜利為度此乃主水聖藥也紫古保命集五尸注痛

腹脹或瀉塊不得喘息上攻心旁攻兩更互熨之取小兒痘毒

小兒將痘發熱失表忽作腹及膨脹弩氣乾霍亂

由毒氣與胃氣相搏欲出不得出也以商陸根和葱白搗傳臍上斑止疽由方免無虞

耳卒熱腫日再易聖濟錄喉卒攻痛商陸切根熨之冷即易立

療癰喉痺攻痛生商陸根搗作餅三四壯良○一切毒腫

再易之章陸根和鹽少許搗傅日外臺秘要

石癰如石堅硬不作膿者生章陸根搗擦之燥即方瘡傷水毒

章陸根搗炙布裏熨之葛花主治人心昏塞多忘喜

卧取花陰乾百日搗末日暮水服方寸七乃卧思念所欲事即於眠中

覺醒悟也蘇頌

蘇頌

狼毒 本經下品

釋名 時珍曰觀其各知其毒矣

集解 別錄曰狼毒生秦亭山谷及奉高二月八月采根陰乾陳而沉水者良弘景曰宕昌亦出

之乃言止有數畝地生蝮蛇食其根故為難得亦用太山者今用出漢中及建平云與防葵同根但

置水中沉者是狼毒浮者是防葵俗用亦稀為療腹內要藥耳恭曰今出秦州成州秦亭原在二州

之界秦隴地寒元無蝮蛇此物與防葵都不同類生處又別太山漢中亦不聞有陶說謬矣志曰狼

毒葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重者為良輕者為劣秦亭在隴西奉高是太

山下縣陶云沉者是狼毒浮者是防葵此不足為信假使防葵秋冬采者堅實得水皆沉狼毒春夏

采者輕虛得水皆浮且二物全別不可比類此與麻黃漏皮半夏根實吳茱萸為六陳也保昇曰根

似玄參惟虛浮者為劣也頌曰今陝西州郡及遼石州亦有之狀如馬志所說時珍曰狼毒出秦晉

地今人往往以草薺茹為之誤矣見蘭茹下也

根氣味 辛平有大毒 大明曰苦辛有毒之才曰大

畏占斯蜜陀僧也 **主治** 欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣

惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸 本經除胸下

積僻 別錄治痰飲癥瘕亦殺鼠 明合野葛納耳中治

聾 抱朴子

附方 舊四新六 **心腹連痛** 作脹用狼毒二兩附子半兩搗篩蜜丸梧子大一日服一

丸二百二丸三日三丸止又從一丸起至三丸止以瘥為度 **九種心痛** 一

起至三丸止以瘥為度

肘后方

二蛙三風四悸五食六飲七冷八熱九氣也又治連年積冷流注心胸及落馬墮車瘀血中惡等證

九痛丸用狼毒灸香吳茱萸湯泡巴豆去心炒取霜乾薑炮人參各一兩附子泡去皮三兩為末煉

蜜丸梧子大每空服溫腹中冷痛水穀陰結心下酒下一丸和劑局方

按之鳴轉逆害飲食用狼毒三兩附子一兩旋覆花三兩搗末蜜丸梧子大每服三丸食前白湯下

日三服○陰疝欲死丸縮入腹急痛欲死狼毒四肘后方

蜜丸梧子大每服三九日兩脇氣結方同腹中一夜三度白湯下肘后方

切蟲病川狼毒杵末每服一錢用錫一皂子大沙下蟲也○乾濕蟲疥

集効方○乾濕蟲疥馬油調搽患處方睡勿以被家頭恐藥氣傷面此維揚潘積年疥癩

氏所傳方蘭氏經驗方

一牛炒研輕粉三合木銀三錢以茶末少許於瓦器內以津液擦化為末同以清油浸藥高一寸三日行藥沉油清遇夜不見燈火蘸油塗瘡上

仍以口鼻於藥盞上吸氣取効永類方積年乾癩生疥搔之黃水出每逢陰雨即惡疾風瘡

秦芫等分為末每服方寸七聖惠方

溫酒下日一二服千金方

防葵本經上品

釋名房苑別錄梨蓋經利茹吳普又名爵離方蓋農

根香味似防風故名防葵

集解別錄曰防葵生臨淄川谷及嵩高太山少室

二月生根根大如桔梗根中紅白六月花白七月

八月實白三月采根恭曰此物亦稀有襄陽望楚

本草綱目卷十七

山東及興州西方有之興州者乃勝南者為隣蜀地也頌曰今惟出襄陽地他郡不聞也其葉似葵每莖三葉一本十數莖中發一幹其端開花如葱花景天輩而色白六月開花即結實根似防風香味亦如之依時采者乃沉水今乃用枯朽狼毒當之極為謬矣時珍曰唐時隴西成州貢之蘇頌所說詳明可據

正誤弘景曰防葵今用建平者本與狼毒同根猶如三建其形亦相似但置水中不沉爾而狼

毒陳久者亦不能沉矣數日凡使防葵勿誤用狼毒緣真相似而驗之有異効又不能切須審之恐誤人疾其防葵在葵州沙土中生采得二十日便生用之惟輕為妙恭曰狼毒與防葵都不同類生處亦別藏器曰二物一是上品善惡不同形質又別陶氏以浮沉為別後人因而用之將以防葵破堅積為下品之物與狼毒同功今古因循遂無甄別殊為謬誤

根脩治數日凡使須揀去艸末用甘草湯浸一宿澆由暴乾用黃精自然汁一二升拌了土

器中炒至汁盡用

氣味辛寒無毒別錄曰甘苦普曰神農辛寒桐君扁鵲無毒岐伯雷公黃帝辛苦無

毒權曰有小毒**主治疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆濕**

瘖癩驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身本經**療五**

臟虛氣小腹支膈臚脹口乾除腎邪強志中火者

不可服令人恍惚見鬼別錄**久服主邪氣驚狂**蘇恭主

疝癰氣塊膀胱宿水血氣瘤大如盞者悉能消散

治鬼瘡百邪鬼魅精怪通氣甄權

發明

時珍曰防葵乃神農上品藥黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒獨別錄言中火者服之令人恍惚見鬼陳延之小品方云防葵多服令人迷惑恍惚如狂按難經云重陽者狂脫陽者見鬼是豈上品養性所宜乎是豈寒而無毒者乎不然則本經及蘇恭所列者是防葵功用而別錄所列者乃似防葵之狠毒功用非防葵也狠毒之亂防葵其來亦遠矣不可不辨古方治蛇痕瘰癧大方法中多用防葵皆是狠毒也

附方

舊一腫滿洪大防葵研末溫酒服一刀圭至新二傷寒動氣傷寒汗下後臍左方同傷寒動氣有動氣防葵散用防葵一兩木香黃芩柴胡各半兩每服半兩水一盞半煎八分溫服雲岐子保命集

狠牙

本經下品

釋名牙子

本經狠齒別錄狠子別錄犬牙普抱牙吳支蘭

李當之弘景曰其牙似獸之齒牙故有諸名

集解

別錄曰狠牙生淮南川谷及宛旬八月采根暴乾中濕腐爛生衣者殺人普曰葉青根黃赤六七月華八月實黑正月八月采根保昇曰所

根氣味

苦寒有毒別錄曰酸普曰神農黃帝苦有

去白蟲治浮風瘙痒煎汁洗惡瘡殺腹臟一切蟲止赤白痢煎服

本經大

附方 舊六 金瘡出血 狼牙草莖葉熟搗 小便溺血

金粟狼牙草焙乾入蚌粉炒槐花百藥煎等分爲

未每服三錢米泔空心調服亦治酒病 衛生易

簡 寸白諸蟲 狼牙五兩搗末蜜丸麻子大隔宿不

外臺 蟲瘡瘙癢 六月以前采狼牙葉以後用根生

秘要 楊炎之冷卽止 小兒陰瘡 狼牙草濃煮汁 婦人陰

瘡 煎水熱洗 外臺秘要 婦人陰蝕 瘡爛者狼牙

瀝洗日四五遍 張仲景金匱玉函 聾耳出汁 牙

之 聖惠方 毒蛇傷螫 獨莖狼子根或葉搗爛

蘭茹 本經 下品

釋名 離婁 別掘据 音結 白者名草蘭茹 時珍曰蘭

藜其根牽引之貌掘据當作拮据 詩云予手拮据手口共作之狀也

集解 別錄曰蘭茹生代郡川谷五月采根陰乾黑

四月華五月實黑根黃有汁亦黃色三月采葉四

月五月采根弘景曰今第一出高麗色黃初斷時

汁出凝黑如漆故云漆頭次出近道名草蘭茹色

白皆燒鐵燂頭令黑以當漆非真也 頌曰今河陽

淄齊州亦有之二月生苗葉似大戟而花黃色根

如蘿蔔皮赤黃肉白初斷時汁出凝黑如漆三月

開淺紅花亦淡黃色不着子陶隱居謂出高麗者

此近之又有種草蘭茹色白古方兩用之故姚

僧坦治癰疽生惡肉有白蘭茹散傳之看肉盡便

停止但傳諸膏藥若不生肉又傳黃芪散惡肉仍

不盡者可以漆頭赤皮藺茹為散半錢和白酒
 散三錢和傳之觀此則赤白皆可用也時珍曰范
 子計然云蘆茹出武都黃色者善草藺茹出建康
 白色今亦處處有之生山原中春初生苗高二三
 尺根長大如蘿蔔蔓菁壯或有岐由者皮黃赤肉
 白色破之有黃漿汁莖葉如大戟而葉長微闊不
 甚尖折之有白汁抱莖有短葉相對圍而出尖葉
 中出莖莖中分二三小枝二三月開細紫花結實
 如豆大一顆三粒相合生青熟黑中有白仁如續
 隨子之狀今人往往皆呼其根為狼毒誤矣狼毒
 葉似商陸大黃
 葷根無漿汁

根氣味辛寒有小毒

別錄曰酸普曰神農辛岐伯
酸鹹有毒李當之大寒之才

日甘草為之
使惡門冬

主治蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排膿

惡血除大風熱氣善忘不寐
本經**去熱痺破癥瘕除**

息肉

別錄

發明

宗奭曰治馬疥尤善服食方用至少時珍曰
素問治婦人血枯痛用烏鰂骨蘆茹二物丸

服方見烏鰂魚下王冰言蘆茹取其散惡血又齊
書云郡王子隆年二十身體過充徐嗣伯合蘆茹
丸服之自消則蘆茹亦可服食但要斟酌爾孟詵
必効方治甲疽生于脚趾邊腫爛用藺茹三兩黃
芪二兩苦酒浸一宿以猪脂五合合煎取膏三合
日三塗之即消又聖惠方治頭風旋眩鴟頭丸中
亦用之

附方

舊二**緩疽腫痛**
藺茹一兩為散溫水**傷寒咽**

痛

毒攻作腫真藺茹瓜甲大納口嚼汁**中焦熱痞**

善忘不禁藺茹三分甘草炙二兩消石為末每
服一錢雞鳴時溫酒下以知為度**聖惠方**

瘡癩癢

藟茹末入輕粉香油調傳之 多能鄙事

大戟

本經下品

釋名 叩鉅 下馬仙

綱目時珍曰其根辛苦戟人咽喉故名今俚人呼為下馬

仙言利人甚速也郭璞注爾雅云蕎叩鉅即大戟也

集解

別錄曰大戟生常山十二月采根陰乾保昇

苦參皮黃肉黃白五月采苗二月八月采根用頌曰近道多有之春生紅芽漸長叢高一尺以來葉似初生楊柳小團三月四月開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參秋冬采根陰乾淮甸出者莖圓高三四尺葉黃莖至心亦如百合苗江南生者葉似芍藥時珍曰大戟生平澤甚多直莖高二三尺中空折之有白漿葉長狹如柳葉而不團其稍葉密攢而上杭州紫大戟為上江南土大戟

次之北方綿大戟色白其根皮柔韌如綿甚峻利能傷人弱者服之或至吐血不可不知

根修治

教曰凡使勿用附生者誤服令人洩氣不

到與海芋葉拌蒸從巳至申去芋葉晒乾用時珍曰凡采得取藥水煮軟去骨晒乾用海芋葉麻而

有毒恐不可用也

氣味 苦寒有小毒

別錄曰甘大寒權曰苦辛有大毒元素曰苦甘辛陰中微陽瀉

肺損真氣時珍曰得棗即不損脾之才曰反甘草用苜蓿解之恭曰畏苜蓿蘆葦鼠屎大明曰赤小

豆為之使惡薯蓣 主治 蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風

皮膚疼痛吐逆 本經 頸腋癰腫頭痛發汗利大小便

別錄 瀉毒藥泄天行黃病溫瘧破癥結 大明 下惡血癖

塊腹內雷鳴通月水墮胎孕權治隱癰風及風毒

脚腫並煮水日日熱淋取愈蘇頌

發明成無已曰大戟甘遂之苦以泄水者腎所主也好古曰大戟與甘遂同為泄水之藥濕勝

者苦燥除之也時珍曰痰涎之為物隨氣升降無處不到入于心則迷竅而成癲癩妄言妄見入于

肺則寒竅而成欬唾稠粘喘急背冷入于肝則留

伏蓄聚而成脇痛乾嘔寒熱往來入于經絡則麻

痺疼痛入于筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱

痛陳無擇三因方並以控涎丹主之殊有奇効此

乃治痰之本痰之本水也濕也得氣與火則凝滯

而為痰為飲為涎為涕為瘕大戟能泄臟腑之水

濕甘遂能行經隧之水濕白芥子能散皮裏膜外

之痰氣惟善用者能收奇功也又錢仲陽謂腎為

真水有補無瀉而復云痘瘡變黑歸腎一證百

祥膏下之以瀉腎非瀉腎也瀉其腑則臟自不實

愚按百祥惟用大戟一味大戟能行水故曰瀉其

腑則臟自不實腑者膀胱也竊謂百祥非獨瀉腑

正實則瀉其子也腎邪實而瀉其肝也大戟味苦

瀉浸水色青綠肝膽之藥也故百祥膏又治嗽而

能吐青綠水夫青綠者少陽風木之色也仲景亦

云心下痞滿引脇下痛乾嘔短氣者十棗湯主之

其申亦有夫乾嘔脇痛非肝膽之病乎則百

祥之瀉肝膽也明矣肝乃東方宜瀉不宜補况瀉

青瀉黃皆瀉其子同一瀉也何獨腎只瀉腑乎繫

古老人治變黑歸腎證用宣風散代百祥膏亦是

瀉子之意蓋毒勝火熾則水益涸風挾火勢則土

受虧故津血內竭不能化膿而成青黑乾陷之證

瀉其風火之毒所以救腎扶脾也或云脾虛腎旺

故瀉腎扶脾者非也腎之真水不可瀉瀉其陷伏

之邪毒爾

附方新十一百祥膏治嗽而吐青綠水又治痘瘡歸

腎紫黑乾閉不發寒者宜下之

不黑者慎勿下紅芽大戟不拘多少陰乾藥水煮
 每服一二九研赤脂麻湯下○紫古活法機要
 棗變百祥丸治痘瘡變黑大便閉結用大戟一兩
 棗三枚水一盞同煮暴乾去大戟以
 棗肉焙丸服從少至多以利為度
 控涎丹 治痰
 在胸膈上下變為諸病或頸項胸背腰脇手足膝
 髀隱痛不可忍筋骨牽引釣痛走易及皮膚麻痺
 似乎癰癩不可誤作風氣風毒及瘡疽施治又治
 頭痛不可舉或睡中流涎或欬唾喘息或痰迷心
 竅並宜此藥數服痰涎自失諸疾尋愈紫大戟白
 甘遂白芥子微炒各一兩為末薑汁打麩糊丸梧
 子大每服七丸或二十九丸以津液嚥
 下若取利則服五六十九丸
 水腫喘急 小
 瀉及水蠱大戟炒二兩乾薑炮半兩為散每
 服三錢薑湯下大小便利為度 聖濟總錄 水病
 腫滿 水二升煮取七合頓服利下水二三升勿怪

至重者不過再服便瘥禁毒食一年永不
 復作此方出張尚容 李絳兵部手集 水氣腫
 脹 大戟一兩廣木香半兩為末五更酒服一錢半
 取大戟下碧木後以粥補之忌鹹物○簡便方用大
 戟燒存性研末每 水腫腹大 如鼓或遍身浮腫用
 空心酒服一錢七 浸過用大戟根苗蓋之瓦盆合定煮熟取棗無時
 食之棗盡決愈○又大戟散用大戟白牽牛木香
 等分為末每服一錢以猪腰子一對批開慘未
 內濕紙煨熟空心食之左則塌右則塌右
 紫古活 牙齒搖痛 大戟咬於痛處
 法機要 牙齒搖痛 良大戟咬於痛處
 四兩白酢漿一斗煮熟
 洗之寒乃止 千金方
 澤漆 本經 下品

釋名 漆莖 本經 貓兒眼睛草 綱目 綠葉綠花草 綱目 五鳳

草

弘景曰是大戟苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦嚙人○餘見下

集解

別錄曰澤漆大戟苗也生太山川澤三月三日七月七日采莖葉陰乾大明曰此即大戟

花也川澤中有莖梗小花黃色葉似嫩菜五月采之頌曰今冀州州朔州及近道皆有之時珍曰別錄陶氏皆言澤漆是大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食然大戟苗澆人不可為菜今攷土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢柔莖如馬齒莧綠葉如首蓿葉葉圓而黃綠頗似貓睛故名貓兒眼莖頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草福莖有白汁粘人其根白色有硬骨或以此為大戟苗者誤也五月采汁煮雄黃伏鍾乳結草砂據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟苗也今方家用治水蠱脚氣有効尤與神農本文相合自

漢人集別錄誤以為大戟苗故諸家襲之爾用者宜審

莖葉氣味苦微寒無毒

別錄曰辛大明日冷有小毒之才曰小豆為之使惡

薯蕷主治皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰

氣不足

本經利大小腸明目輕身

別錄主蠱毒蘇恭止瘡

疾消痰退熱

大明

發明

時珍曰澤漆利水功類大戟故人見其莖有白汁遂誤以為大戟然大戟根苗皆有毒洩

人而澤漆根硬不可用苗亦無毒可作菜食而利丈夫陰氣盛不相侔也

附方

舊二肺欬上氣脈沉者澤漆湯主之澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗

五升去滓入半夏半升紫參白前生薑各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩煎取五升每服五合日

三服 張仲景 心下伏瘕 大如盃不得食者澤漆

金匱要畧方 梧子大每服二十腫水氣 澤漆十斤夏

九日三服 葛洪肘後方 於銀鍋內慢火熬如稀餈

入水一斗 研汁約二斗 於銀鍋內慢火熬如稀餈

入瓶內收 每日空心溫酒調下 一匙以愈為度

聖惠 水氣蠱病 生鮮貓眼睛草 曬乾為末 棗肉充

方 服覺腹中暖 小便利 腳氣赤腫 行步脚痛 貓兒眼

為度 乾坤秘韞 腳氣赤腫 行步脚痛 貓兒眼

等分 每服一兩 水五碗 煎三 牙齒疼痛 貓兒眼

碗薰洗之 衛生易簡方 吐 男婦瘰癧 細井水二桶 五月

迎 湯泡取汁 含漱 吐 男婦瘰癧 細井水二桶 五月

五日 午時 鍋內 熬至 一桶 去滓 澄清 再熬 至一 碗

瓶收 每以 椒葱 槐枝 煎湯 洗瘡 淨乃 搽此 膏數 次

愈 便民 癬瘡 有蟲 調搽 之 衛生 易簡 方

甘遂 本經 下品

釋名 甘藁 別錄 陵藁 普 陵澤 別錄 甘澤 普 重澤 別錄 苦澤

吳 白澤 普 主 田 別錄 鬼 醜 吳 普 時珍 曰 諸

集解 別錄 曰 甘遂 生 中山 川谷 二月 采 根 陰 乾 普

山 江 東 比 來 用 京 口 者 大 不 相 似 赤 皮 者 勝 白 皮

者 都 下 亦 有 名 草 甘 遂 殊 惡 益 贗 偽 者 也 恭 曰 甘

遂 苗 似 澤 漆 其 根 皮 赤 肉 白 作 連 珠 實 重 者 良 草

甘 遂 乃 是 蚤 休 療 體 全 別 苗 亦 不 同 俗 名 重 臺 葉

似 鬼 曰 菀 麻 根 皮 白 色 大 明 曰 西 京 者 上 汴 滄 吳

者 次 之 形 似 和 皮 甘 草 節 頌 曰 今 陝 西 江 東 亦 有

之 苗 似 澤 漆 莖 短 小 而 葉 有 汁

根 皮 赤 肉 白 作 連 珠 大 如 指 頭

根 修 治 數 日 凡 采 得 去 莖 於 槐 砧 上 細 剉 用 生 甘

草 湯 薺 茺 自 然 汁 二 味 攪 浸 三 日 其 水 如

本草綱目卷之七

黑汁乃漉出用東流水淘六七次令水清為度漉出于土器中熬脆用之時珍曰今人多以麩煨熟用以去其毒

氣味苦寒有毒別錄曰甘大寒普曰神農桐君苦

陽也之才日瓜蒂為之使惡遠志反甘草**主治大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水殺道**本經下五水散

膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿別錄能瀉十二種水疾

去痰水權瀉腎經及隧道水濕脚氣陰囊腫墜痰

迷癩癩瘡隔痞塞時珍

發明宗奭曰此藥專于行水攻決為用元素曰味苦氣寒苦性泄寒勝熱直達水氣所結之處

乃泄水之聖藥水結胸中非此不能除故仲景大陷胸湯用之但有毒不可輕用時珍曰腎主水凝則為痰飲溢則為腫脹甘遂能泄腎經濕氣治痰之本也不可過服但中病則止可也張仲景治心下留飲與甘草同用取其相反而立功也劉河間保命集云凡水腫服藥未全消者以甘遂末塗腹邊臍令滿內服甘草水其腫便去又王璆百一選方云脚氣上攻結成腫核及一切腫毒用甘遂末水調傳腫處即濃煎甘草汁服其腫即散二物相反而感應如此清流韓詠病脚疾用此一服病去七八再服而愈也

附方舊三新**水腫腹滿**甘遂炒二錢二分黑牽牛一兩半為末水煎時時呷

濟方**膜外水氣**甘遂末大麥麩各半兩水和作餅燒熟食之取利聖濟總錄

身面洪腫甘遂二錢生研為末以豬腎一枚分為七瓣入末在內濕紙包煨令熟食之

小便一服至四五服當覺腹鳴腎水流注四肢腫痛

即上方便利黃水為驗每用二錢煨熟溫酒正水脹

嚼下當利黃水為驗每用二錢煨熟溫酒正水脹

急大小不利欲死甘草五錢白麩四兩水和作碁子大

木煮令浮淡食之大小便利後用平胃小兒疳水

散加熟附子每以二錢煎服普濟方小兒疳水

珠湯下以遂炒青橘皮等分末三歲用一錢以麥

芽湯下以利為度忌酸鹹三五日名木寶散

總微水蠱喘脹一字水半盞煎三五沸服不過十

服錄聖水腫喘急大小便不通十棗丸用甘遂大

濟子大每服四十九丸侵晨熱湯下利去妊娠腫滿

黃水為度否則次午再服三因方去

氣急少腹滿大小便不利已服猪苓散不瘥者用

太山赤皮甘遂二兩搗篩白蜜和丸梧子大每服

五十九丸得微下仍服猪苓散不下再心下留飲

脈伏其人欲自利反快甘遂半升煮半升去滓入芍藥

三枚半夏十二個以水一升煮半升去滓入芍藥

五枚甘草一節水二升煮半升去滓入芍藥

升同煎入合頓服取利○張仲景金匱玉函脚氣

腫痛腎臟風氣攻注下部瘡痒甘遂半兩木鼈子

四錢摻在內濕紙包煨熟空心食之米飲下服後

便伸兩足大便行後吃白粥二三目為妙及丹田

方二便不通內仍艾三壯飲甘草湯以通為度又

太山赤皮甘遂末一兩煉蜜和勻小便轉脬甘遂

分作四服日一服取利聖惠方小便轉脬甘遂

錢猪苓湯調下立疝氣偏腫酒服二錢儒門事

本草綱目卷之四十一

兩甘遂阿膠各一兩水一升半煮
半升頓服其血當下張仲景方
五錢南木香一錢為末壯者一錢
弱甘遂五分水酒調下怪病奇方
疼痛甘遂麩包漿水煮十沸去麩
為末大人三錢小兒一錢冷蜜水
魚肉普濟方消渴引飲蒸餅丸綠豆
普濟方消渴引飲蒸餅丸綠豆大每薄荷湯下二

魚肉普濟方消渴引飲蒸餅丸綠豆大每薄荷湯下二
為末大人三錢小兒一錢冷蜜水卧時服忌油膩
疼痛甘遂麩包漿水煮十沸去麩以細糠火炒黃
弱甘遂五分水酒調下怪病奇方

為末大人三錢小兒一錢冷蜜水卧時服忌油膩
疼痛甘遂麩包漿水煮十沸去麩以細糠火炒黃
弱甘遂五分水酒調下怪病奇方

魚肉普濟方消渴引飲蒸餅丸綠豆大每薄荷湯下二
為末大人三錢小兒一錢冷蜜水卧時服忌油膩
疼痛甘遂麩包漿水煮十沸去麩以細糠火炒黃

魚肉普濟方消渴引飲蒸餅丸綠豆大每薄荷湯下二
為末大人三錢小兒一錢冷蜜水卧時服忌油膩
疼痛甘遂麩包漿水煮十沸去麩以細糠火炒黃

魚肉普濟方消渴引飲蒸餅丸綠豆大每薄荷湯下二
為末大人三錢小兒一錢冷蜜水卧時服忌油膩
疼痛甘遂麩包漿水煮十沸去麩以細糠火炒黃

魚肉普濟方消渴引飲蒸餅丸綠豆大每薄荷湯下二
為末大人三錢小兒一錢冷蜜水卧時服忌油膩
疼痛甘遂麩包漿水煮十沸去麩以細糠火炒黃

魚肉普濟方消渴引飲蒸餅丸綠豆大每薄荷湯下二
為末大人三錢小兒一錢冷蜜水卧時服忌油膩
疼痛甘遂麩包漿水煮十沸去麩以細糠火炒黃

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油
不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油
不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油
不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油
不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油
不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油
不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油
不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油
不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油
不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油
不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油
不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

瀝之名無價散全幼心鑑麻木疼痛萬靈膏用
二錢半輕粉一角為末每服一字漿水少許滴油
不安謂之馬脾風甘遂麩包煮一錢半辰砂水飛

續隨子

宋開寶

釋名千金子開寶千兩金華菩薩豆華拒冬開寶聯步

釋名千金子開寶千兩金華菩薩豆華拒冬開寶聯步
頌曰葉中出葉數數相續而生

釋名千金子開寶千兩金華菩薩豆華拒冬開寶聯步
頌曰葉中出葉數數相續而生
故名冬月始長故又名拒冬

釋名千金子開寶千兩金華菩薩豆華拒冬開寶聯步
頌曰葉中出葉數數相續而生
故名冬月始長故又名拒冬

釋名千金子開寶千兩金華菩薩豆華拒冬開寶聯步
頌曰葉中出葉數數相續而生
故名冬月始長故又名拒冬

釋名千金子開寶千兩金華菩薩豆華拒冬開寶聯步
頌曰葉中出葉數數相續而生
故名冬月始長故又名拒冬

釋名千金子開寶千兩金華菩薩豆華拒冬開寶聯步
頌曰葉中出葉數數相續而生
故名冬月始長故又名拒冬

釋名千金子開寶千兩金華菩薩豆華拒冬開寶聯步
頌曰葉中出葉數數相續而生
故名冬月始長故又名拒冬

釋名千金子開寶千兩金華菩薩豆華拒冬開寶聯步
頌曰葉中出葉數數相續而生
故名冬月始長故又名拒冬

釋名千金子開寶千兩金華菩薩豆華拒冬開寶聯步
頌曰葉中出葉數數相續而生
故名冬月始長故又名拒冬

氣味辛温有毒 主治 婦人血結月閉瘀血癥瘕

癖除蠱毒鬼疰心腹痛冷氣脹滿利大小腸下惡

滯物寶開積聚痰飲不下食嘔逆及腹內諸疾研碎

酒服不過三顆當下惡物蜀本宜一切宿滯治肺氣

水氣日服十粒瀉多以酸漿水或薄醋粥喫即止

又塗疥癬瘡大明

發明 頌曰續隨下水最速然有毒損人不可過多

惟在相用之得其功皆長于利水

附方 新四 小便不通 者不過再服用續隨子去皮

一兩銖丹半兩同少蜜搗作團瓶盛埋陰處臘月

至春末取出研蜜丸梧子大每服二三十九水通

湯下化破尤妙病急水氣腫脹 壓去油重研分作

亦可旋合聖濟錄 一服丈夫生餅子酒下婦人荆

芥湯五更服之當下利至曉自止後以厚朴湯補

之頻嚼益善忌鹽醋一百日乃不陽水腫脹 子續隨

復作聯步即續隨子也斗門方 綠豆大涎積瘕

去油二兩大黃一兩為末酒水丸綠豆大 涎積瘕

塊續隨子三十枚 膩粉二錢青黛炒一錢研勻糯

熟去皮核同嚼冷茶送下半夜後蛇咬腫悶 欲死

取下積聚惡物為効聖濟錄 蛇咬腫悶 欲死

臺六分續隨子仁七粒搗篩為散酒服方寸七黑

無唾和少許塗咬處立効崔元亮海上方 七

子疣贅 續隨子熟時塗之

自落普濟方

二六

本草綱目卷十七
葉及莖中白汁主治剝人面皮去黥黥開寶傳白癩

癰瘍大搗葉傳蠍螫立止時珍

莨菪音浪蕩
本經下品

釋名天仙子圖橫唐本行唐時珍曰莨菪一作藺

狼放宕
故名

集解別錄曰莨菪子生海濱川谷及雍州五月采
子弘景曰今處處有之子形頗似五味核而
極小保昇曰所在皆有之葉似菘藍莖葉皆有細
毛花白色子殼作罌狀結實扁細若粟米大青黃
色六月七月采子日乾頌曰處處有之苗莖高二
三尺葉似地黄干不留行紅藍等而濶如三指四
月開花紫色莖莢有白毛五月結實有殼作罌子
狀如小石榴房中子至細青白色如粟米粒數曰

凡使勿用蒼莢子其形相似只是微赤服之無効
時人多以雜之時珍曰張仲景金匱要畧言菜中
有水莨菪葉圓而光有毒誤食令人狂
亂狀如中風或吐血以甘草汁解之
子修治數曰修事莨菪子十兩以頭醋一盞煮乾
為度却用黃牛乳汁浸一宿至明日乳汁
黑即是真者
曬乾搗篩用

氣味苦寒無毒別錄曰甘權曰苦辛微熱有大毒
藏器曰性溫不寒大明曰溫有毒
服之熱發以綠豆汁甘草升麻犀角並解之數曰
有大毒誤服之衝人心大煩悶眼生暈火頌曰本
經言性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云溺
川于美人懷子不乳飲以浪藥一撮以酒飲旋乳
且不乳豈熱藥所治又古方主卒主治齒痛出蟲
顛狂亦多單用莨菪豈果性寒耶
肉痺拘急久服輕身使人健行走及奔馬強志益

力通神見鬼多食令人狂走本經療癩狂風癩顛倒

拘攣別錄安心定志聰明耳目除邪逐風變白主疥

癬取子洗晒隔日空腹水下一指捻亦可小便浸

令泣盡暴乾如上服勿令子破破則令人發狂藏器

炒焦研末治下部脫肛止冷痢主蛙牙痛咬之蟲

出甄權燒熏蟲牙及洗陰汗大明

發明弘景且入療顛狂方用然不可過劑久服自

日以石灰清煮十伏時搗出去芽暴乾以附子權

薑陳橘皮桂心厚朴為丸服去一切冷氣積年氣

日甚溫暖也功未見如所說而其毒有甚焉煮一二

日而芽方生其為物可知矣良若雲實防葵赤商

陸皆能令人狂惑見鬼者昔人未有發其義者蓋

此類皆有毒能使痰迷心竅蔽其神明以亂其視

聽故耳唐安祿山誘奚契丹飲以莨菪酒醉而坑

之又嘉靖四十四年二月陝西遊僧武如香挾妖

術至昌黎縣民張桂家見其妻美設飯間呼其全

家同坐將紅散入飯內食之少頃舉家昏迷任其

奸汚復將魘法吹入柱耳中柱發狂惑見舉家皆

是妖鬼盡行殺死凡一十六人並無血迹官司執

柱囚之十餘日柱吐痰二梳許問其故乃知所殺

者皆其父母兄嫂妻子姊妹也柱與如香皆論死

世宗肅皇帝命榜示天下觀此妖藥亦是莨菪之流

爾方其痰迷之時視人皆鬼矣解之之法可不知乎

附方舊二十卒發顛狂莨菪三升為末以酒一升

如小豆三九日三服當見面急頭中如有蟲行額

及手足有赤豆處如此並是瘥候也未知再服取

盡神良 陳風痺厥痛 天仙子三錢炒大草烏頭

延之小品方 未糊丸梧子大以螺青為衣每服十五靈脂一兩為

子首蒲酒下女子芫花湯下 聖濟錄 久嗽不

止 有濃血 真酥一雞子大棗七枚同煎令酥盡取棗日

食三枚 度光祿李丞服之神驗 孟詵必效方 年久呷

嗽 至三十年者 脂塗青紙上撒末于上卷作筒燒烟熏吸之

崔行功 水腫蠱脹 方見獸部 積冷疝瘕 羸困者

藜子三分 乾只取棗去皮核每空心食一個米飲下覺熱即

濟錄 水瀉日久 填滿札定燒存性每粟米飲服

聖惠方 冷疝痢下 棗許導下部因痢出更納新者

不過三度 孟詵必效方 赤白下痢 腹痛腸滑後重大黃煨

為末每服一錢米 飲下 普濟方 久痢不止 變種種痢兼脫肛

淘去浮者煮令芽出晒乾炒黃黑色青州棗一升

去皮核醱醋二升同煮搗膏丸梧子大每服二十

丸食前米飲 下 聖惠方 腸風下血 乾搗篩生薑半斤取汁銀

鍋中更以無灰酒二升搜之上火煎如稠餲即旋

投酒度用酒可及五升即止慢火煎令可丸大如

梧子每且酒飲通下三九增至五七九止若丸時

粘手則以兔絲粉澆隔之火候忌緊藥焦則失力

也初服微熱勿怪疾甚者服過三日當 脫肛不收

下利疾去利亦止絕有效 篋中方 脫肛不收

之 葇荑子炒研傅 風牙蟲牙 撮入小口瓶內燒烟竹

筒引烟入蟲孔內熏之即死永不發 普濟方用

葇荑子入瓶內以熱湯淋下口含瓶口令氣熏之

本草綱目卷十七

冷更作盡三合乃止有涎津可去甚効○備牙齒

宣落風痛苘若子數納孔中以蠟封之亦効及癩瘡咽腫

腫水服苘若子末兩錢乳癰堅硬新苘若子半匙

不得嚼破○石癰堅硬不作濃者苘若子為末醋

外臺秘要燒研傳之千金方打撲折傷羊脂

方惡瘡似癩十年不愈者苘若子七枚吞之

若子末傳之惡犬咬傷日三服千金方

根氣味苦辛有毒主治邪瘡疥癬殺蟲時珍

附方新瘡疾不止量人強弱用千金方惡癬有

蟲苘若根搗爛蜜和趾間肉刺○雷公炮炙論序

云脚生肉刺視繫若根謂繫于視帶上也狂犬咬人日三上外臺秘

要惡刺傷人苘若根水煮汁浸之千金方箭頭不出萬

神應丹端午前一日不語尋見苘若科根本枝葉

花實全好者道云先生你却在這裏道罷用柴灰

自東南起圍了以木楔子掘取根下周迴土次日

日未出時依前不語用鏤頭取出洗淨勿令雞犬

婦人見于淨室中以石日搗如泥丸彈子大黃丹

為衣以紙袋封懸高處陰乾遇有箭頭不出者先

以象牙末貼瘡口後用緋帛袋盛此藥放臍中

綿兜肚繫了當便出也張子和儒門事親方

雲實本經上品

釋名員實別錄雲英別錄天豆吳普馬豆圖經羊石子圖經苗

名草雲母唐本臭草圖經粘刺綱目時珍曰員亦音雲

羊石當作羊矢
其子肖之故也

集解

別錄曰雲實生河間川谷十月采暴乾普曰
莖高四五尺大葉中空葉如麻兩兩相值六
月花八月九月實十月采弘景曰處處有之子細
如葶藶子而小黑其實亦類葶藶燒之致鬼未見
其法術恭曰雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆
故名天豆叢生澤旁高五六尺葉如細槐亦如首
蓳枝間微刺俗謂普雲母陶云似葶藶者非
也保昇曰所在平澤葉似細槐花黃白色其
莢如豆其實青黃色石麻子五月六月采實頌
曰葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石
子草實名馬豆三月四月采苗十月采實過時即
枯落也時珍曰此草山原甚多俗名枯刺赤莖中
空有刺高者如蔓其葉如槐三月開黃花纒然滿
枝莢長三寸許狀如肥皂莢內有子五六粒正如
鵲豆兩頭微尖有黃黑斑紋厚
殼白仁咬之極堅重有腥氣

實修治

教曰凡采得粗搗相對拌淨
顆椽實蒸一日揀出暴乾

氣味辛溫無毒

別錄曰苦普曰神農辛
小溫黃帝鹹雷公苦

主治泄痢

腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱本經消渴

別錄治瘧多用頌主下蠱膿血時珍

附方

新方一蠱下不止雲實女萎各一兩桂半兩川烏
頭二兩為末蜜丸梧子大每服

五丸水下日三服肘后方

花主治見鬼精多食令人狂走久服輕身通神明

本經殺精物下水燒之致鬼別錄

發明時珍曰雲實花既能令人見鬼發狂
豈有久服輕身之理此古書之訛也

羊石當作羊矢
其子肖之故也

集解

別錄曰雲實生河間川谷十月采暴乾普曰
莖高四五尺大葉中空葉如麻兩兩相值六
月花八月九月實十月采弘景曰處處有之子細
如葶藶子而小黑其實亦類葶藶之致鬼未見
其法術恭曰雲實大如黍及大麻子等黃黑似豆
故名天豆叢生澤旁高五六尺葉如細槐亦如首
蓓枝間微刺俗謂苗為草雲毋陶云似葶藶者非
也保昇曰所在平澤有之葉似細槐花黃白色其
莢如豆其實青黃色大若麻子五月六月采實頌
曰葉如槐而狹長枝上有刺苗名臭草又名羊石
子草實名馬豆三月四月采苗十月采實過時即
枯落也時珍曰此草山原甚多俗名枯刺赤莖中
空有刺高者如蔓其葉如槐三月開黃花纍然滿
枝莢長三寸許狀如肥皂莢內有子五六粒正如
鵲豆兩頭微尖有黃黑班紋厚
殼白仁咬之極堅重有腥氣

實修治

敬曰凡采得粗搗相對拌淨
顆椽實蒸一日揀出暴乾

氣味辛溫無毒

別錄曰苦普曰神農辛
小溫黃帝鹹雷公苦

主治泄痢

腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱

本經消渴

治瘧多用

蘇頌主下驢膿血

附方

新一驢下不止
雲實女萎各一兩桂半兩川烏頭二兩為末蜜丸梧子大每服

五丸水下日三服

花主治見鬼精多食令人狂走久服輕身通神明

本經殺精物下水燒之致鬼

別錄

發明

時珍曰雲實花既能令人見鬼發狂
豈有久服輕身之理此古書之訛也

Kitasato Memorial Medical Library



根主治骨哽及咽喉痛研汁嚥之時珍

蓖麻唐本草

釋名 頰目葉似大麻子形宛如牛蟬故名時珍曰 蓖亦作蠅蠅牛虱也其子有麻點故名蓖麻

集解 恭曰此人間所種者葉似大麻葉而甚大結子如牛蟬今胡中來者莖赤高丈餘子大如

皂莢核用之亦良保昇曰今在處有之夏生苗葉似葎草而大厚莖赤有節如甘蔗高丈餘秋生細花隨便結實殼上有刺狀類巴豆青黃斑褐夏采莖葉秋采實冬采根日乾用時珍曰 其莖有赤有白中空其葉大如瓠葉每葉凡五尖夏秋間極裏抽出花穗纍纍黃色每枝結實數十顆上有刺攢族如蠅毛而軟凡三四子合成一顆枯時劈開狀如已豆殼內有子大如豆殼有斑點狀如牛蟬再去斑殼中有仁嬌白如續隨子仁有油可作印色及油紙子無刺者良子有刺者毒

子修治 是顛兩頭尖有毒其莖麻子節節有黃黑斑凡使以鹽湯煮半日去皮取子研用時珍曰 取

蓖麻油法用蓖麻仁五升搗爛以水一斗煮之有沫撒起待沫盡乃止去水以沫煎至點燈不泮滴水不散為度

氣味 甘辛平有小毒時珍曰 凡服蓖麻者一生不能伏丹砂粉霜 主治水瘕以水研二十枚服之吐惡沫加

至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體

瘡痒浮腫尸疰惡氣榨取油塗之唐本 研傅瘡癩疥

癩塗手足心催生大明 治瘰癧取子炒熟去皮每卧

時嚼服二三枚漸加至十數枚有效宗奭 主偏風不

遂口眼喎斜失音口噤頭風耳聾舌脹喉痺胸喘

脚氣毒腫丹瘤湯火傷鍼刺入肉女人胎衣不下

子腸挺出開通關竅經絡能止諸痛消腫追膿拔

毒時珍

發明

震亨曰蓖麻屬陰其性善收能追膿取毒亦

外科要藥能由有形之滯物故取胎產胞衣

刺骨膠血者用之時珍曰蓖麻仁甘辛有毒熱氣

味頗近巴豆亦能利人故下水氣其性善走能開

通諸竅經絡故能治偏風失音口噤口日喎斜頭

風七竅諸病不止于出有形之物而已蓋鸛鵒油

能引藥氣入內蓖麻油能拔病氣出外故諸膏多

用之一人病偏風手足不舉時珍用此油同羊脂

麝香鯨鯉甲等藥煎作摩膏日摩數次一月餘漸

復兼服搜風化痰養血之劑三月而愈一人病手

臂一塊腫痛亦用蓖麻搗膏貼之一夜而愈一人

病氣鬱偏頭痛用此同乳香食鹽搗太陽穴一

夜痛止一婦產後子腸不收搗仁貼其丹田一夜

而上此藥外用累奏奇効但內服不可輕率爾或

言搗膏以筋點于鴛馬六畜舌根下即不

能食或點肛內即下血死其毒可知矣

附方舊九新半身不遂失音不語取蓖麻子油一

中一日煮之令熟細升酒一斗銅鍋盛油著酒

細服之外臺秘要口目喎斜蓖麻子仁搗膏左

○婦人良方用蓖麻子仁七七粒研作餅右喎安

在左手心左喎安在右手心却以銅盂盛熱水坐

藥上冷即換五六次即正也○一方用蓖麻子

仁七七粒巴豆十九粒麝香五分作餅如上用

氣頭痛不可忍者乳香蓖麻仁等分搗餅隨左右

蓖麻油紙剪花貼太陽穴亦効○又方蓖麻仁半兩

棗肉十五枚搗塗紙上捲筒插入鼻中下清涕即

止八種頭風

芫麻子剛子各四十九粒去殼雀腦

掛風處陰乾用時先將好末茶調成膏于壺蓋內

後將灰火燒前藥烟起以蓋覆之待烟盡以百沸

葱湯點蓋內茶藥服之後以綿鼻窒不通

被裹頭臥汗出避風袖珍方

粒大棗去皮一枚搗勻綿裹塞之一天柱骨倒

日一易三十日聞香臭也聖濟錄

疔疾及諸病後天柱骨倒乃體虛所致宜生筋散

貼之木鼈子六筒去殼芫麻子六十粒去殼研勻

先包頭擦頂上令熱以津

調藥貼之鄭氏小兒方

仁二兩黃連一兩石膏水一盞文武火煮之乾即

添水三日兩夜取出黃連只用芫麻風乾勿令兒

日以竹刀每個切作四段每服二十段食後荆芥

湯下日二服終身忌食豆犯之必腹脹死

寶 舌上出血 芫麻子油紙燃燒烟熏

鼻中自止 摘玄方

舌脹塞口 芫麻

仁四十粒去殼研油塗紙上作燃燒烟熏之末退

再煎以愈為度有人舌腫出口外一刺人用此法

而愈 經 急喉痺塞 牙關緊急不通用此即破以

驗良方 烟熏吸即通或只取油

作燃尤妙各聖烟筒

一錢同研新汲水服之連進二三服效○二因方

用芫麻仁荆芥穗等分為末蜜丸綿包喻燕之

千金水氣脹滿 芫麻子仁研水解得三合清旦一頓

止可服五粒 脚氣作痛 芫麻子七粒去殼研爛同

外臺秘要 小便利不通 芫麻仁三粒研細入紙燃內

也 咳 芫麻子去殼炒熟揀甜者食之須多服

生下胞 芫麻子去殼炒熟揀甜者食之須多服

研膏塗脚心若胎及衣下便速洗去不爾

則子腸出卽以此膏塗頂則腸自入也○肘后方云產難取蓖麻子十四枚每手各把七枚須臾立下子宮脫下入仍以蓖麻子仁枯礬等分爲末安紙上托也

心卽入盤腸生產塗頂方催生下胎胎不拘生胎死胎蓖麻二個

巴豆二個麝香一分同上方貼臍中并足心○一切毒又下生胎一月一粒溫酒吞下集簡方

腫痛卽止也肘后方癘風鼻塌手指攣曲節間痛不可忍

漸至斷落用蓖麻子一兩去皮黃連一兩到豆大以小瓶子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後

取蓖麻子一枚劈破面東以浸藥水吞之漸加至四五枚微利不妨瓶中水盡更添兩月後喫大蒜

猪肉試之如不發是效也若發動小兒丹疳再服直候不發乃止杜壬方

個去皮研入麪一匙水調療癰結核皮每睡時服塗之甚効修真秘旨

二三枚取効一生不可瘰癧惡瘡及軟癰用白膠喫炒豆阮氏經驗方香一兩瓦器溶

化去滓以蓖麻子六十四個去殼研膏溶膠投之攪勻入油半匙頭至點水中試軟硬添減膠油得

所以緋帛量瘡大小攤貼一膏肺風面瘡起白屑可治三五癩也儒門事親

赤瘡用蓖麻子仁四十九粒白果膠棗各三粒无松三錢肥皂一個搗爲丸洗而用之良吳旻扶

壽面上雀斑用羊髓和勻夜夜傅之摘玄方

髮黃不黑蓖麻子仁香油煎焦去滓耳卒聾閉子一百個去殼與大棗十五枚搗爛入乳小兒乳

汁和丸作錠每以綿裹一枚塞之覺耳中熱爲度一日一易二十湯火灼傷蓖麻子仁蛤粉等分研

日瘥千金方水調塗之○鍼刺入肉視傷處傅之類看若見刺

本草綱目卷之七

出即拔去恐藥緊弩出好肉或加竹木骨硬莖麻子仁

白梅肉同研尤好衛生易簡方

一兩凝水石二兩研勻每以一捻置舌根嚙自

然不見○又方蓖麻油紅麩等分研細沙糖丸皂

子大綿裹舍雞魚骨哽蓖麻子仁研爛入百藥煎

嘔痰出大良蓖麻子五十粒去殼以井花水化下

卽下惡犬咬傷先以益水洗吹痛處乃貼此膏

袖珍方

葉氣味有毒主治脚氣風腫不仁蒸搗裹之日二

三易卽消又油塗灸熱熨顙上止鼻衄大驗蘇茶治

痰喘欬嗽時珍

附方新 駒喘痰嗽儒門事親方用九尖蓖麻葉三錢入飛過白礬二錢以猪肉四

兩薄批搽藥在內荷葉裹之文武火煨熟細嚼以

白湯送下名九仙散○普濟方治欬涎喘不問

年深日近用經霜蓖麻葉經霜桑葉御米殼蜜炒

各一兩爲末蜜丸彈子大每服一九白湯化下日

一服名無憂丸

附錄博落迴於遺藏器曰有大毒主惡瘡櫻根痛

和百丈青雞桑灰等分爲末傅之蠱毒精魁溪毒瘡癩

有法生江南山谷莖葉如蓖麻莖中空吹之作聲

如博落迴折之有黃汁藥

人立死不可輕用入口

常山本經 蜀漆上品

釋名恒山吳普 互草本經 雞屎草日華時珍

也恒山乃北岳名在今定州常山乃郡名亦今真

定豈此藥始產于此得名歟蜀漆乃常山苗功用

本草綱目卷十七

相同今併為一

集解

別錄曰常山生益州川谷及漢中二月八月
中常山苗也五月采葉陰乾弘景曰常山出宜都
建平細實黃者呼為雞骨常山用之最勝蜀漆是
常山苗而所出又異者江林山仰益州江陽山名
故是同處爾彼人采得繫結作丸得時燥者佳恭
曰常山生山谷間莖圓有節高者不過三四尺葉
似茗而狹長兩兩相當二月生白花青萼五月結
實青圓三子為房其草暴燥色青白堪用若陰乾
便黑爛鬱壞矣保昇曰今出金州房州梁州中江
縣樹高三四尺根似荆根黃色而破五六月采葉
名蜀漆也李令光曰蜀漆是常山莖八月九月采
之頌曰今汴西淮浙湖南州郡亦有之並如上說
而海州出者葉似楸葉八月有花紅白色子碧色
似山棟子而小今天台山出一種草名土常山苗
葉極甘人用為飲甘味如蜜又名蜜香草性涼益

人非此常山也

修治

數曰采時連根苗收如用莖葉臨時去根以
甘草細剉同水拌濕蒸之臨時去甘草取蜀
漆細剉又拌甘草水勻再蒸日乾用其常山凡用
以酒浸一宿漉出日乾蒸搗用時珍曰近時有酒
浸蒸熟或瓦炒熟者亦不
甚吐人又有醋制者吐人

常山氣味苦寒有毒

別錄曰辛微寒普曰神農岐
伯苦梘君辛有毒李當之大
寒權曰苦有小毒炳曰得甘草吐癰之才
日畏玉札大明曰忌葱菜及菘菜伏砒石

主治傷寒寒熱發溫瘧鬼毒胸中痰結吐逆
本經療鬼蠱

往來水脹洒洒惡寒鼠瘦
別錄治諸瘧吐痰涎治項

下瘤癭

甄權

蜀漆氣味辛平有毒

別錄曰微溫權曰苦有小毒元素曰辛純陽炳曰桔梗為

之使之才日枯樓為之使惡貫眾

主治瘧及欬逆寒熱腹中癥堅

痞積聚邪氣蠱毒鬼疰

本經療胸中邪結氣吐去之

別錄治鬼瘧多時溫瘧寒熱下肥氣

甄權破血洗去腥

與苦酸同用導膽邪

元素

發明

數日蜀漆春夏用莖葉秋冬用根老人久病切忌服之頌曰常山蜀漆為治瘧之最要不可多進令人吐逆震亨曰常山性暴悍善驅逐能傷真氣病人稍近虛怯不可用也外臺乃用三兩作一服殊昧雷公老人久病切忌之戒時珍曰常山蜀漆有劫痰截瘧之功須在發散表邪及提出陽分之後用之得宜神効立見用失其法真氣必傷夫瘧有六經瘧五臟瘧痰濕食積瘴疫鬼邪諸

瘧須分陰陽虛實不可一槩論也常山蜀漆生用則上行必吐酒蒸炒熟用則氣稍緩少用亦不致吐也得甘草則吐得大黃則利得烏梅鯁鯁甲則入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草果檳榔則入脾蓋無痰不作瘧二物之功亦在驅逐痰水而已楊士瀛直指方云常山治瘧人皆薄之瘧家多蓄痰涎黃水或停滯心下或結滯脇間乃生寒熱法當吐痰逐水常山豈容不用水在上焦則常山能吐之水在脇下則常山能破其滯而下其水但須行血藥品佐助之必收十全之功其有純熱發瘧或蘊熱內實之證投以常山大便秘點滴而下似泄不泄者須用北大黃為佐泄利數行然後獲愈也又待制李燾云嶺南瘴氣寒熱所感邪氣多在營衛皮肉之間欲去皮膚毛孔中瘴氣根本非常山不可但性吐人惟以七寶散冷服之即不吐且驗也

附方

舊三新截瘧諸湯 外臺祕要用常山三兩漿水三升浸一宿煎取一升

欲發前頓服取吐○肘后方用常山一兩秫米一
 百粒水六升煮三升分三服先夜未發臨發時服
 盡○養生主論王隱者驅瘧湯云予用此四十年
 奇効不能盡述切勿加減萬一無吐者常山酒煮
 晒乾知母貝母草果各一錢半水一鍾
 半煎半熟五更熱服渣以酒浸發前服 **截瘧諸酒**
 肘后方用常山一兩酒一升漬二三日分作三服
 平旦一服少頃再服臨發又服或加甘草煮服之
 ○宋俠經心錄醇醪湯治間日瘧支太醫云乃桂
 廣州方也甚驗恒山一錢二分大黃二錢半炙甘
 草一錢二分水一盞半煎減半醇發日五更溫服
 再以水一盞煎減半日醪未發時溫服○虞搏醫
 學正傳治久瘧不止常山一錢半檳榔一錢丁香
 五分烏梅一個酒一盞浸一宿五更飲之一服便
 止永不復 **截瘧諸丸** 千金方恒山丸治數年不瘧
 發如神 者兩劑瘧一月以來者一劑
 瘧恒山三兩研末雞子白和丸梧子大瓦器煮熟
 殺腥氣則取晒乾收之每服二十九竹葉湯下五

更一服天明一服發前一服或吐或否即止○肘
 後丹砂丸恒山搗末三兩真丹一兩研白蜜和杵
 百下丸梧子大先發時三九少頃再服三九臨時
 服三九酒下無不斷者○曾世榮活幼心書黃丹
 左治大小久瘧恒山二兩黃丹半兩烏梅連核瓦
 焙一兩為末糯米粉糊丸梧子大每服三五丸
 涼酒下隔一夜一服平旦一服午後方食○葛洪
 肘後方用恒山三兩知母一兩甘草半兩搗末蜜
 丸梧子大先發時服十丸次服七丸後服五六丸
 以瘧為度○和劑局方瞻仰丸治一切瘧常山四
 兩炒存性草果二兩炒存性為末薄糊丸梧子大
 每餅時冷酒服五丸五更再服忌鷺羊熱物○
 又勝金左治一切瘧胸膈停痰發不愈者常山入
 兩酒浸蒸焙檳榔二兩生研末糊丸梧子大如上
 法服○集簡方二聖丸治諸瘧不拘遠近大小雞
 骨恒山雞心檳榔各一兩生研末鯪魚甲煨焦一兩
 半為末糯米粉糊丸菜豆大黃丹 **厥陰肝瘧** 寒多熱
 為衣每服三五丸如上法服

如死狀或少腹滿小便如膿不問久近不吐不泄

如神恒山一兩醋浸一夜瓦器煮乾每用二錢水

一盞煎半盞五更冷

服趙真人濟急方太陰肺瘧痰聚胸中病至冷

熱間善驚如有所見恒山三錢甘草半錢林米三

十五粒水二鍾煎一鍾發日早分三次服千金

方少陰腎瘧凄凄然寒手足寒腰脊痛大便難日

錢竹葉一錢半葱白三根水一升牝瘧獨寒不熱

半煎一升發前分三服千金方牝瘧獨寒者蜀

漆散用蜀漆雲母煨三日夜龍骨各二錢為末每

服半錢臨發日且一服發前一服酢漿水調下温

瘧又加蜀漆一錢○牡瘧獨熱半甘草一錢麻黃

張仲景金匱要畧○牡瘧獨熱半甘草一錢麻黃

二錢牡蠣粉二錢水二鍾先煎麻黃蜀漆去沫入

藥再煎至一鍾未發前温服得吐則止王燾外

臺秘温瘧熱多恒山一錢小麥三錢淡竹葉二三

要錢水煎五更服甚良藥性論

十年瘧

肘后方治三十年老瘧及積年久瘧常山

一升半發日早服五合發時再服熱當吐冷當利

無不瘥者○張文仲備急方用恒山一兩半龍骨

五錢附子炮二錢半大黃一兩為末雞子黃和丸

梧子大末發時五丸將發時五丸白湯下支太醫

云此方神驗瘧瘧寒熱劉長春經驗方常山一寸

無不斷者瘧瘧寒熱草果一枚熱酒一盞浸一

夜五更望東服之蓋卧酒醒即愈○談埜翁試驗

方用常山檳榔甘草各二錢黑豆一百粒水煎服

之乃彭司寇所傳○葛稚川肘后方用常山黃連

香豉各一兩附子炮七錢搗末蜜丸梧子大空腹

飲服四九欲發時妊娠瘧疾酒蒸常山石膏煨各

三丸至午後乃食姚僧坦集驗方百日兒瘧水鑑仙

草四分水一盞酒一盞浸一夜

平旦温服姚僧坦集驗方百日兒瘧水鑑仙

瘧是邪風寒熱攻直須術治免成空常山刻作人

形狀釘在孩兒生氣宮如金生人金生在巳即釘

已上木生人釘亥上火生人小兒驚忤暴驚卒死

釘寅上水土生人釘申上也中惡用蜀

漆炒二錢左顧牡蠣一錢二分漿水胸中痰飲山恒

煎服當吐痰而愈名于金湯阮氏

甘草各一兩水五升煮取一升去滓入蜜干金方

二合溫服七合取吐不吐更服于金方

附錄杜莖山 圖經頌曰葉味苦寒主溫瘴寒熱作

絞汁服吐惡涎甚效生宜用莖高四五尺葉土

伴苦蕒菜秋有花冬作實如枸杞子大而白

紅山 頌曰葉甘微寒無毒主骨節疼痛勞熱瘴瘧

而小無毛秋生白花如粟粒不實福州生者作細

藤伴芙蓉葉其葉上青下白根如葛頭土人取根

米泔浸一宿以清水再浸一宿炒黃為末每服一

錢水一盞生薑一片同煎服亦治勞瘴甚效時珍

日杜莖山即土恒山土紅山

又杜莖山之類故並附之

藜蘆 本經下品

釋名山葱 別錄葱苒 同葱葵 音葱葵 豐蘆 音葱葵

綱目鹿葱 時珍曰黑色曰藜其蘆有黑皮裹之故名

日鹿葱 根際伴葱俗名葱管藜蘆是矣北人謂之

葱葱南人謂之鹿葱

集解 別錄曰藜蘆生太山山谷三月采根陰乾普

下極伴葱而多毛用之止剔取根微炙之保昇曰

所在山多毛夏生冬凋八月采根頌曰今陝西山南

東西州郡皆有之遠州均州解州者尤佳三月生

苗葉伴初出櫻心又伴車前莖伴葱白青紫色高

五六寸上有黑皮裹莖伴櫻皮有花肉紅色根伴

馬腸根長四五寸許黃白色二月三月采根陰乾

此有二種一種水葱蘆莖葉大同只是生在近水

本草綱目卷之七十一

溪澗石上根鬚百餘莖不中藥用今用者名葱白
藜蘆根鬚甚少只是三二十莖生高山者為佳均
州土俗亦呼為鹿葱范子
計然云出河東黃白者善

根修治 雷曰采得去頭用糯米泔
汁煮之從巳至未晒乾用

氣味辛寒有毒 別錄曰苦微寒普曰神農雷公辛
有毒扁鵲苦有毒之才曰黃連為之使反細辛芍藥

人參沙參紫參丹參苦參惡大黃時珍曰畏葱白
服之吐不止
飲葱湯即止

主治 蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥癢惡瘡殺諸蟲

毒去死肌 經本療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛

漆不入湯用 別錄主上氣去積年膿血泄痢 吐上

膈風涎暗風癩病小兒覈齶痰疾 頌末治馬疥癬

宗 藥

發明 頌曰藜蘆服錢七一字則惡吐人又用通頂
令人噦而別本云治噦逆甚効未詳時珍曰

歲逆用吐藥亦反胃用吐法去痰積之義吐藥不
一常山吐瘧痰瓜吐熱痰烏附尖吐濕痰萊菔

子吐氣痰藜蘆則吐風痰者也按張子和儒門事
親云一婦病風癩自六七年得驚風後每一二年

一作至五七年五七作三十歲至四十歲則日作
或甚至一日十餘作遂昏痴健忘求死而已值歲

大饑采百草食于野中見草若葱狀采歸蒸熟飽
食至五更忽覺心中不安吐涎如膠連日不止約

一二斗汗出如洗甚昏困三日後遂輕健病去食
進百脈皆和以所食葱訪人乃葱苗也即本草

藜蘆是矣圖經言能吐風病此亦偶得吐法耳我
朝荆和王妃劉氏年七十病中風不省人事牙

本草綱目卷之七十一

關緊閉群醫束手先考太醫吏日月池翁診視藥

不能入自午至子不獲已打去一齒濃煎藜蘆湯

灌之少頃噫氣一聲遂吐痰而甦調

理而安藥弗眩厥疾弗瘳誠然

附方 舊六新 諸風痰飲 藜蘆十分鬱金一分為末

服揆吐○ 中風不省 牙關緊急者藜蘆一兩去苗

經驗方 炒微褐色為末每服半錢小兒減半溫水調

灌以吐風涎為効未吐再服 簡要濟眾 中風

不語 喉中如曳鋸口中涎沫取藜蘆一分天南星

斗四面火逼黃色研為末生麵丸小 諸風頭痛 州和

豆大每服三九溫酒下 經驗方 諸風頭痛 州和

藜蘆一莖日乾研末入麝香少許吹鼻○ 又 痰癯積癯

方通頂散藜蘆半兩黃連三分喘鼻 聖惠 痰癯積癯

痰多 不食欲吐不吐藜蘆末半錢 保命集 痰癯積癯

溫薑水調下揆吐 保命集 痰癯積癯 皂莢

炙各一兩巴豆二十五枚熬黃研末蜜丸小豆大

每空心服一丸未發時一丸臨發時又服一丸勿

用飲食 **黃疸腫疾** 藜蘆灰中炮為末水服半 胸中

肘後 **結聚** 如駭駭不去者巴豆半兩去皮心炒擣如泥

九○ **身面黑痣** 重黎蘆灰五兩水一大碗淋汁銅器

不過三次 **鼻中息肉** 黎蘆三分雄黃一分為末蜜

兩畔○ **牙齒蟲痛** 黎蘆末內入孔中勿 白禿蟲瘡

聖濟方 **牙齒蟲痛** 黎蘆末內入孔中勿 白禿蟲瘡

黎蘆末猪脂調 **頭生蟻虱** 黎蘆末搽 頭風白屑

黎蘆末沐頭搽之緊包二 **反花惡瘡** 惡肉反出如

脂和傳日三五 **疥癬蟲瘡** 黎蘆末生 羊疽瘡痒

二分附子八分爲末傳之 誤吞水蛭 黎蘆炒爲末 水服一錢必

虫自出也 陶隱居方 吐生 德 生堂方

附錄山慈石 別錄有名未用日 苦平無毒主女子

有衣一 參果根 又日苦有毒主鼠瘦生百餘根根

連一名烏蓼一名 馬腸根 宋圖經頌日苦辛寒有

鼠莖一名鹿蒲 生秦州葉似桑三月 采葉五月六月采根

木黎蘆 遺 拾

釋名黃黎蘆 綱 鹿驪

集解 藏器日陶弘景注漏蘆云一名鹿驪山南人 用菹北人用根按鹿驪乃木黎蘆非漏蘆也

乃樹生如茱萸樹高二尺有毒時珍日鹿驪學人 呼爲黃黎蘆小樹也葉如櫻桃葉狹而長多皺文 四月開細黃花五月 結小長子如小豆大

氣味苦辛温有毒主治疥癬殺蟲 藏 器

附子 木經 下品

釋名其母名曰烏頭 時珍日初種爲烏頭象烏之 頭也附烏頭而生者爲附子

如子附母也烏頭如芋魁附子如芋子蓋一物也 別有草烏頭白附子故俗呼此爲黑附子川烏頭

以別之諸家不分烏頭有川草 兩種皆混雜註解今悉正之

集解 別錄日附子生犍爲山谷及廣漢冬月采爲 附子春月采爲烏頭弘景日烏頭與附子同

根附子八月采八角者良烏頭四月采春時莖初 生有腦頭如烏鳥之頭故謂之烏頭有兩岐其蒂

狀如牛角者名烏喙取汁煎為射蔞天雄似附子
 細而長乃至三四寸側子即附子邊角之大者並
 是同根而本經附子出犍為天雄出少室烏頭出
 朗陵分生三處當各有所宜也今則無別矣恭曰
 天雄附子烏頭並以蜀道綿州龍州者佳俱以八
 月采造餘處雖有造得者力弱都不相似江南來
 者全不堪用大明曰天雄大而長少角刺而實附
 子大而短有角平穩而實烏喙似天雄烏頭次于
 附子側子小于烏頭連聚生者名為虎掌並是天
 雄一喬子母之類氣力乃有殊等即宿根與嫩者
 爾教曰烏頭少有莖苗身長而烏黑少有旁尖烏
 喙皮上蒼色有尖頭大者孕八九個周圍底隔黑
 如烏鐵天雄身全矮無尖周匝四面有附子孕十
 一個皮蒼色側子只是附子旁有小顆如棗核者
 木鼈子是喙附烏雄側中毗患者不入藥用保昇
 曰正者為烏頭兩岐者為烏喙細長三四寸者為
 天雄根旁如芋散生者為附子旁連生者為側子
 五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾

宗奭曰五者皆一物但依大小長短以參而名之
 爾頌曰五者今並出蜀土都是一種所產其種出
 于龍州冬至前將陸田耕五七遍以猪糞糞之
 然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高
 三四尺莖作四稜葉如艾其花紫碧色作穗其實
 細小如桑椹狀黑色本只種附子一物至成熟後
 乃有四物以長二三寸者為天雄割削附子旁尖
 角為側子附子之絕小者亦各側子元種者為烏
 頭其餘大小者皆為附子以八角者為上綿州彰
 明縣多種之惟赤水一鄉者最佳然收采時月與
 本草不同謹按本草冬采為附子春采為烏頭博
 物志言附子烏頭天雄一物也春秋冬夏采之各
 異而廣志云奚壽附子也一歲為側子二年為烏
 喙三年為附子四年為烏頭五年為天雄今一年
 種之便有此五物豈今人種蒔之法用力倍至故
 爾繁盛乎時珍曰烏頭有兩種出彰明者即附子
 之母今人謂之川烏頭是也春未生子故曰春采
 為烏頭冬則生子已成故曰冬采為附子其天雄

烏喙側子皆是生子多者因象命名若生子少及
 獨頭者即無此數物也其產江左山南等處者乃
 本經所列烏頭今人謂之草烏頭者是也故曰其
 汁煎為射鹵陶弘景不知烏頭有二以附子之烏
 頭註射鹵之烏頭遂致諸家疑貳而雷斅之說尤
 不近理宋人楊天惠著附子記甚悉今撮其要讀
 之可不辯而明矣其說云綿州乃故廣漢地領縣
 八惟彰明出附子彰明領鄉二十惟赤水廉水昌
 明會昌四鄉產附子而赤水為多每歲以上田熟
 耕作壟取種於龍安龍州齊歸木門青隄小坪諸
 處十一月播種春月生苗其莖類野艾而澤其葉
 類地麻而厚其花紫瓣黃糝長苞而圓七月采者
 謂之早水拳縮而小蓋未長成也九月采者乃佳
 其品凡七本同而未異其初種之小者為烏頭附
 烏頭而旁生者為附子又左右附而偶生者為兩
 子附而長者為天雄附而尖者為天錐附而上出
 者為側子附而散生者為漏藍子皆脈絡連貫如
 子附母而附子以貴故專附名也凡種一而子六

七以上則皆小種一而子二三則稍大種一而子
 特則特大附子之形以蹲坐正節角少者為上
 有節多鼠乳者次之形不正而傷缺風皺者為下
 本草言附子八角者為良其角為側子之說甚謬
 矣附子之色以花白者為上鐵色者次之青綠者
 為下天雄烏頭天錐皆以豐實盈握者為勝漏藍
 側子則園人以乞役夫不足數也謹按此記所載
 漏藍即雷斅所謂木鼈子大明所謂虎掌者也其
 鬲子即烏喙也天錐即天雄之類
 醫方亦無此名功用當相同爾
修治 保昇曰附子烏頭天雄側子烏喙采得以生
 使乾又法以米粥及糟麴等淹之並不及前法須
 日丑物收時一處造釀其法先於六月內造大小
 麴麴未采前半月用大麥煮成粥以麴造醋候熟
 去糟其醋不用太酸酸則以水解之將附子去根
 鬚於新甕內淹七日攪一逼撈出以踈篩攤之
 令生白衣乃向慢風日中晒之百十日以透乾為

度若猛日則斃而皮不附肉時珍曰按附子記云此物最多不能常熟或種美而苗不茂或苗秀而根不充或已釀而腐或已曝而燥若有神物陰為之者故園人常禱於神且為藥妖其釀法用醋醱安密室中淹覆彌月乃發出眼乾方出釀時其大有如拳者已定輒不盈握故及一兩者極難得土人云但得半兩以上者皆良蜀人餌者少惟秦陝閩浙人宜之然秦人纔市其下者閩浙纔得其中者其上品則皆貴人得之矣○弘景曰凡用附子烏頭天雄者熟灰微炮令析勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子須甘草人參生薑相配者正制其毒故也攷曰凡使烏頭宜文武火中炮令斃拆擊破用若用附子須底平有九角如鐵色一個重半兩者即是氣全勿用雜木火只以柳木灰火中炮令斃拆以刀刮去上孕子并去底火擊破於屋下牽地土掘坑安之一宿取出焙乾用若陰制者生去皮尖底薄切以東流水并黑豆浸五日夜漉出日中曬用震亨曰凡烏附天雄須用童

子小便浸透煮過以殺其毒并助下行之力入搗少許尤好或以小便浸二七日揀去壞者以作刀每個切作四片并水淘淨逐日換水再浸七日曬乾用時珍曰附子生用則發散熟用則峻補生用者須如陰制之法去皮臍入藥熟用者以水浸過炮令發拆去皮臍乘熟切片再炒令內外俱黃去火毒入藥又法每一箇用甘草二錢鹽水薑汁童尿各半盞同煮熟出火毒一夜用之則毒去也
氣味辛溫有大毒別錄曰其大熱晉曰神農辛岐有大毒元素曰大辛大熱氣厚味薄可升可降陽中之陰浮中沉無所不至為諸經引用之藥好古曰入手少陰三焦命門之劑其性走而不守非若乾薑止而不行趙嗣真曰熟附配麻黃發中有補仲景麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯是也生附配乾薑補中有發仲景乾薑附子湯通脈四逆湯是也戴原禮曰附子無乾薑不熱得甘草則性緩得桂則補命門李燾曰附子得生薑則能發散

以熱攻熱又導虛熱下行以除冷病之才曰地膽
為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草人參黃耆時珍
豉汁得蜀椒食鹽下達命門主治風寒欬逆邪氣

寒濕踈臂拘攣膝痛不能行步破癥堅積聚血痕

全瘡本經腰脊風寒脚氣冷冷弱心腹冷痛霍亂轉

筋下痢赤白溫中強陰堅肌骨又墮胎為百藥長

錄別錄溫暖脾胃除脾濕腎寒補下焦之陽虛元素除臟

腑沉寒三陽厥逆濕淫腹痛胃寒虵動治經閉補

虛散壅李杲督脉為病脊強而厥好古治三陰傷寒陰

毒寒疝中寒中風痰厥氣厥柔痊癩癘小兒慢驚

風濕麻痺腫滿脚氣頭風腎厥頭痛暴瀉脫陽久

痢脾泄寒瘧瘴氣久病嘔噦反胃噎膈癰疽不斂

久滿冷瘡合葱涕塞耳治聾時珍

烏頭即附子主治諸風風痺血痺半身不遂除寒冷

溫養臟腑去心下堅痞感寒腹痛元素除寒濕行經

散風邪破諸積冷毒李杲補命門不足肝風虛好古助

陽退陰功同附子而稍緩時珍

發明宗奭曰補虛寒須用附子風家即多用天雄

之時珍曰按王氏究原方云附子性重滯溫脾逐
寒川烏頭性輕疎溫脾去風若是寒疾即用附子

風疾即川烏頭一云凡人中風不可先用風藥
 及烏附若先用氣藥後用烏附乃宜也又凡用烏
 附藥並宜冷服者熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽
 上浮治之以寒則陰氣益甚而病增治之以熱則
 拒格而不納熱藥冷飲下咽之後冷體既消熱性
 便發而病氣隨愈不違其情而致大益此反治之
 妙也昔張仲景治寒疝內結用蜜煎烏頭近效方
 治喉痺用蜜炙附子含之嚥汁朱丹溪治疝氣用
 烏頭炮子並熱因寒用也李東垣治馮翰林姪陰
 盛格陽傷寒面赤目赤煩渴引飲脈來七八至但
 按之則散用薑附湯加人參救半斤服之得汗而
 愈此則神聖之妙也吳綬曰附子乃陰證要藥凡
 傷寒傳變三陰及中寒火陰雖身大熱而脈沉者
 必用之或厥冷腹痛脈沉細甚則唇青囊縮者急
 須用之有退陰回陽之力起死回生之功近世陰
 證傷寒往往疑似不敢用附子直待陰極陽竭而
 用之已遲矣且夾陰傷寒內外皆陰陽氣頓衰必
 須急用人參健脈以益其原佐以附子溫經散寒

治此不用將何以救之劉完素曰俗方治麻痺多
 用烏附其氣暴能衝開道路故氣愈麻及藥氣盡
 而正氣行則麻病愈矣張元素曰附子以白朮為
 佐乃除寒濕之聖藥濕藥宜少加之引經又益火
 之原以消陰翳則便溺有節烏附是也虞搏曰附
 子稟雄壯之質有斬關奪將之氣能引補氣藥行
 十二經以追復散失之元陽引補血藥入血分以
 滋養不足之真陰引發散藥開腠理以驅逐在表
 之風寒引溫煖藥達下焦以祛除在裏之冷濕震
 亨曰氣虛熱甚者宜少用附子以行參耆肥人多
 濕亦宜少加烏附行經仲景入味尤用為少陰嚮
 導後世因以附子為補藥誤矣附子走而不守取
 其健悍走下之性以行地黃之滯可致遠爾烏頭
 天雄皆氣壯形偉可為下劑藥之佐無人表其害
 人之禍相習用為治風之藥及補藥殺人多矣王
 履曰仲景入味尤兼陰火不足者設錢仲陽六味
 地黃丸為陰虛者設附子乃補陽之藥非為行滯
 也好古曰烏附非身涼而四肢厥者不可借用服

本草綱目卷之十七

附子以補火必妨涸水○時珍曰烏附毒藥非危
 病不用而補藥中少加引導其功甚捷有人纔服
 錢七即發燥不堪而昔人補劑用為常藥豈古今
 運氣不同耶荆府都昌至體瘦而冷無他病日
 以附子煎湯飲兼嚼硫黃如此數歲漸州衛張百
 戶平生服鹿茸附子藥至八十餘康健倍常宋張
 杲醫說載趙知府耽酒色每日煎乾薑熟附湯吞
 硫黃金液丹百粒乃能健啖否則倦弱不支壽至
 九十他人服一粒即為害若此數人皆其臟腑稟
 賦之偏服之有益無害不可以常理槩論也又瓊
 碎錄言滑臺風土極寒民啖附子常理槩論也又瓊
 子如啖芋栗此則地氣使然爾

附方 新舊二十六 **少陰傷寒** 初得二三日脈微細但
 附子其草湯微發其汁麻黃去節二兩甘草炙二
 兩附子炮去皮一枚水七升先煮麻黃去沫納二
 味煮取三升分作三服取 **少陰發熱** 少陰病始得
 微汗下張仲景傷寒論

者麻黃附子細辛湯發其汗麻黃去節二兩附子
 炮去皮一枚細辛二兩水一斗先煮麻黃去沫
 納二味同煮三升 **少陰下利** 少陰病下利清穀裏
 分三服 同上 **少陰下利** 寒外熱手足厥逆脈
 微欲絕身反不惡寒其人面赤或腹痛或乾嘔
 或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯用大附子
 一個去皮生破八片甘草炙二兩乾薑三兩水三
 升煮一升分溫再服其脈即出者愈百赤加葱九
 莖腹痛加芍藥二兩嘔加生薑二兩咽痛加
 桔梗一兩利止脈不出加人參二兩 同上 **陰病**
惡寒 湯寒已發汗不解反惡寒者虛也芍藥甘草
 湯附子湯補之芍藥三兩甘草炙三兩附子炮
 去皮一枚水五升煮取 **傷寒發躁** 傷寒下後又發
 一升五合分服 同上 **傷寒發躁** 其汗晝日煩燥
 不得眠夜不安靜不嘔不渴無表證脈沉微身無
 大熱者乾薑附子湯溫之乾薑一兩生附子一枚
 去皮破作八片水三升煮 **陰盛格陽** 傷寒陰盛格
 取一升頓服 傷寒論

熱而不飲水脈沉手足厥逆者是此證也霹靂散
 用大附子一枚燒存性為末蜜水調服逼散寒氣
 然後熱氣上行而汗出乃愈
熱病吐下 及下利身冷脈微
 一升煎半升溫服立効
 孫兆口訣云房後受寒少腹疼痛頭疼腰重手足
 厥逆脈息沉細或作呃逆並宜退陰散用川烏頭
 乾薑等分切炒放冷為散每服一錢水一盞鹽一
 撮煎取半盞溫服得汗解
 毒心腹痛厥逆惡候川烏頭去皮臍冷水浸七日
 切晒紙裹收之遇有患者取為末一錢入鹽入分
 水一盞煎八分服壓下陰毒傷寒面青四肢厥逆腹
 痛身冷一切冷氣大附子三枚炮裂去皮臍為末
 每服三錢薑汁半盞冷酒半盞調服良久臍下如
 火煖為度
 者用半兩重附子一箇生破作四片生薑一大塊

作三片糯米一撮以水一升煎六合溫服煖臥或
 汗出或不出候心定則以水解散之類解之不得
 與冷水如渴更煎
中風痰厥 昏不知人口眼喎斜
 浮服屢用多効
 寒多者五生飲用生川烏頭生附子並去皮臍各
 半兩生南星一兩生木香二錢五分每服五錢生
 薑十片水二盞煎一盞溫服
中風氣厥 痰壅昏不知人六脈沉
 煎一盞溫服
 去皮生木香半兩每服四錢薑九片
中風偏廢 活
 湯用生附子一箇去皮臍羌活烏藥各一兩每服
 四錢生薑三片水一盞煎七分服
半身不遂 遂冷痺症用附子一兩以無灰酒一升
 浸一七日隔日飲一合
風病癱緩 手足躄曳口眼喎斜語音蹇澀步履不
 正宜神驗烏龍丹主之川烏頭去皮臍
 五靈脂各五兩為末入龍腦麝香五分滴水為丸
 如彈子大每服一丸先以生薑汁研化暖酒調服

一日二服至五七丸便覺手攪移

或手足不遂生川烏頭末每以香白米煮粥一盃

入未四錢慢熬得所下薑汁一匙蜜三大匙空腹

受之或入薏苡末二錢左傳云風淫未病謂四未

也脾主四肢風淫客肝則侵脾而四肢病也此湯

極有力予每授人良體虛有風空外受寒濕身如在

驗許學士本事方

南星各二錢生薑十片水一盞半慢火煎服予口

曾病此醫傳張子發授此方二服愈

眼喎斜生鳥頭青礬各等分無比名通關散

中秘口卒噤瘖卒件停尸並用附子末

寶方身如角弓反張口噤不語川烏頭五兩到塊黑大

豆半升同炒半黑以酒三升傾鍋內急攪以絹濾

取酒微溫服一小盞取汗若口不開物開灌之未

効加烏雞糞一合炒納酒中服以瘥為度

諸風血風

烏荆痛皮膚瘙癢及婦人血風頭痛目眩腸

風臟毒下血不止者服之尤効有痛風攣搐願頷

不收者服六七服即瘥也川烏頭炮去皮臍一兩

荆芥穗二兩為末醋麩糊丸梧子大

溫酒或熟水每服二十丸和劑方

月候不勻或手脚心煩熱或頭面浮腫頭麻用川

烏頭一斤清油四兩鹽四兩鑄內同熬令裂如桑

椹色為度去皮臍五靈脂四兩為末搗勻蒸餅丸

如梧子大空心溫酒鹽湯下二十九丸亦治丈夫風

疾方 諸風癩疾 生川烏頭去皮二錢半五靈脂

薑湯化 小兒慢驚 搖擲涎壅厥逆川烏頭生去皮

服水一盞薑七片煎 小兒項軟 乃肝腎虛風邪襲

服湯氏嬰孩寶鑑 小兒顛陷 綿烏

天南星各二錢為末薑汁調攤貼

天桂骨內服瀉青丸 全幼心鑑

子並生去皮臍二錢雄黃八分為末麻痺疼痛

葱根搗和作餅貼陷處全幼心鑑

丸治手足麻痺或癱瘓疼痛腰膝痺痛或打撲傷

損閃肺痛不可忍生川烏不去皮五靈脂各四兩

威靈仙五兩洗焙為末酒糊丸梧子大每服七丸

至十九益湯下忌茶此藥常服其効如神普濟

方風痺肢痛營衛不行川烏頭炮去皮以大豆同

焙為末醋熬稠丸綠豆大每腰脚冷痺疼痛有

溫酒下七丸日一服聖惠方大風諸痺痰澀脹

頭三箇生去皮臍為散醋調塗

帛上貼之須臾痛止聖惠方

子半兩者二枚炮折酒漬之春冬五日夏脚氣腿

秋三日每服一合以差為度聖惠方

腫久不瘥者黑附子一箇生去皮臍為散生薑汁

調如膏塗之藥乾再塗腫消為度簡要濟眾

十脂疼痛麻木不仁生附子去皮臍木香各等分

生薑五片水煎溫服王氏簡易方

搜風順氣烏附丸用川烏頭二十箇香附子半斤

每溫酒下十九肌體肥壯有頭風頭痛外臺秘要

風疾者宜常服之澹寮方

頭一升炒令黃末之以絹袋盛浸三斗酒中逐日

溫服○孫兆口訣用附子炮石膏煨等分為末入

腦麝少許每服半錢茶酒任下○修真秘旨用附

子一枚生去皮臍綠豆一合同入銚子內煮豈熟

為度去附子食綠豆立瘥每風毒頭痛聖惠方治

箇可煮五次後為未服之

頭目痛不可忍大附子一枚泡去皮為末以生薑

一兩大黑豆一合炒熟同酒一盞煎七分調附末

一錢溫服○又方治二三十年頭風不愈者用大

川烏頭生去皮四兩天南星炮一兩為末每服二

寒客于頭中清涕項筋急硬胸中寒痰嘔吐清水
 用大附子或大川烏頭二枚去皮蒸過川芎藟生
 薑各一兩焙研以茶湯調服一錢或剉片每用五
 錢水煎服隔三四日一服或加防風一兩○三因
 方必効散治風寒流注偏正頭痛年久不愈最有
 神効用大附子一箇生切四片以薑汁一盞浸炙
 再浸再炙汁盡乃止高良薑等分為末
 每服一錢臘茶清調下忌熱物少時
 沐頭中風多汗惡風當先風一日則痛甚用大附
 子一箇炮食益等分為末以方寸七摩顙上令藥
 力行或以油調稀亦可
 一日三上張仲景方
 調塗太陽
 穴
 經驗
 頭風斧劈
 難忍川烏頭末燒烟熏碗
 痰
 厥頭痛
 如破厥氣上衝痰塞胸膈炮附子三分釜
 墨四錢冷水調服方寸七當吐即愈忌猪
 肉冷
 腎厥頭痛
 指南方用大附子一箇炮熟去皮
 水 生薑半兩水一升半煎分三服○

經驗良方菴根丸治元陽虛頭痛如破眼睛如錐
 刺大川烏頭去皮微炮全蠍以糯米炒過去米等
 分為末菴根汁丸綠豆大每
 薄荷茶下十五丸一日一服
 不可忍者大附子一枚去皮臍研末葱汁麩糊丸
 綠豆大每服十丸茶清下○僧繼洪澹寮方蠍附
 丸云氣虛頭痛惟此方最合造化之妙附子助陽
 扶虛鍾乳補陽鎮墜全蠍取其鑽透葱涎取其通
 氣湯使用椒以達下益以引用使虛氣下歸對證
 用之無不作効大附子一枚剉心入全蠍去毒三
 枚在內以餘附末同鍾乳粉二錢半白麩少許水
 和作劑包附煨熟去皮研末葱涎和丸梧子大每
 椒鹽湯下
 腎氣上攻
 頭項不能轉移椒附丸用大
 五十丸
 以椒二十粒用白麩填滿椒口水一盞半薑七片
 煎七分去椒入鹽空心點服椒氣下達以引逆氣
 歸經也
 鼻淵腦泄
 生附子末葱涎和如
 本事方
 泥會涌泉穴
 普濟
 耳鳴不止

無晝夜者烏頭燒作灰菖蒲等分為末
綿裹塞之日再用取効 楊氏產乳 耳卒聾閉

附子醋浸削尖挿之或更於 聾耳膿血 生附子為
上炙二七壯 本草拾遺 附子去皮炮令拆以蜜塗上炙

灌耳中 喉痺腫塞 附子去皮炮令拆以蜜塗上炙
即膿出未成者即 久患口瘡 生附子為末醋麩調
消出本草拾遺 貼足心男左女右日

再換之 風蟲牙痛 普濟方用附子一兩燒灰枯礬
川附子生研麩糊丸小豆大每綿包一丸 又方川烏頭

咬之 刪繁方用炮附子末納孔中乃止 眼暴赤
腫 砂大着背中以定為度 張文仲備急方 蠶一

切冷氣 去風痰定遍身疼痛益元氣強力固精益
子盛以童子小便浸七日逐口添令溢出揀去壞
者不用餘以竹刀切作四片新汲水淘七次乃浸

之日可換水日足取焙為末酒煮麩糊丸綠豆大
每服十九空 心益湯下少粥飯壓之 經驗方

升降諸氣 二盞煎一盞入沉香汁溫服 和劑局
方 中寒昏困 薑附湯治体虛中寒昏不知人及臍

附子一兩去皮臍乾薑炮一兩每服三 心腹冷痛
錢水二鍾煎一鍾溫服 和劑局方 心腹冷痛

冷熱氣不和山厄子川烏頭等分生研為末酒糊
丸梧子大每服十五丸生薑湯下小腸氣痛加炒

苗香葱酒下二十 心痛疝氣 濕熱因寒鬱而發用
丸 王氏博濟方 厄子降濕熱烏頭破

寒鬱烏頭為厄子所引其性急速不留胃中也川
馬頭山厄子各一錢為末順流水入薑汁一匙調

下 寒厥心痛 及小腸膀胱痛不可止者神砂
溪纂要 一粒丹用熟附子去皮鬱金橘

紅各一兩為末醋麩糊丸如酸棗大朱砂為衣 寒
每服一丸男子酒下女人醋湯下 宣明方

大宜調日宜耶 卷之七 五十五

疝腹痛

疝腹痛 逆臍手足厥冷白汗出脉弦而緊用大烏頭煎主之

寒疝身痛

寒疝身痛 腹痛手足逆冷不仁或身痛不能眠用烏頭煎主之

寒疝引脇

寒疝引脇 脇心腹皆痛諸藥不効者大烏頭煎主之

滑泄

滑泄 腹痛腸鳴自汗厥逆熟附子去皮臍玄胡索炒各一兩生木香半兩每服四錢水二盞薑

小腸諸疝

小腸諸疝 倉卒散治寒疝腹痛小便急難忍汗出厥逆大附子炒去皮臍一枚山

虛寒腰痛

虛寒腰痛 鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍各二兩菴花三分為末棗肉和丸梧

元臟傷冷

元臟傷冷 附子炮去

胃冷有痰

胃冷有痰 附子半夏各

疝腹痛

疝腹痛 逆臍手足厥冷白汗出脉弦而緊用大烏頭煎主之

寒疝身痛

寒疝身痛 腹痛手足逆冷不仁或身痛不能眠用烏頭煎主之

寒疝引脇

寒疝引脇 脇心腹皆痛諸藥不効者大烏頭煎主之

滑泄

滑泄 腹痛腸鳴自汗厥逆熟附子去皮臍玄胡索炒各一兩生木香半兩每服四錢水二盞薑

小腸諸疝

小腸諸疝 倉卒散治寒疝腹痛小便急難忍汗出厥逆大附子炒去皮臍一枚山

虛寒腰痛

虛寒腰痛 鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍各二兩菴花三分為末棗肉和丸梧

元臟傷冷

元臟傷冷 附子炮去

胃冷有痰

胃冷有痰 附子半夏各

疝腹痛

疝腹痛 逆臍手足厥冷白汗出脉弦而緊用大烏頭煎主之

寒疝身痛

寒疝身痛 腹痛手足逆冷不仁或身痛不能眠用烏頭煎主之

寒疝引脇

寒疝引脇 脇心腹皆痛諸藥不効者大烏頭煎主之

滑泄

滑泄 腹痛腸鳴自汗厥逆熟附子去皮臍玄胡索炒各一兩生木香半兩每服四錢水二盞薑

小腸諸疝

小腸諸疝 倉卒散治寒疝腹痛小便急難忍汗出厥逆大附子炒去皮臍一枚山

虛寒腰痛

虛寒腰痛 鹿茸去毛酥炙微黃附子炮去皮臍各二兩菴花三分為末棗肉和丸梧

元臟傷冷

元臟傷冷 附子炮去

胃冷有痰

胃冷有痰 附子半夏各

疝腹痛

疝腹痛 逆臍手足厥冷白汗出脉弦而緊用大烏頭煎主之

寒疝身痛

寒疝身痛 腹痛手足逆冷不仁或身痛不能眠用烏頭煎主之

二錢薑十片水二盞煎七分空心溫服久冷反胃

經驗方用大附子一箇生薑一兩劉細同煮研如

麩糊每米飲化服一錢○衛生家寶方用薑汁打

糊和附子末為丸大黃為衣每溫水服十丸○斗

門方用長大附子一箇坐于磚上四面着火漸逼

以生薑自然汁淬之依前再逼再淬約薑汁盡半

碗乃止研末每服一錢粟米飲下不過三服瘥或

以豬腰子切片炙熟蘸食○方便集用大附子一

箇切下頭子剉一箇安丁香四十九箇在內仍合

定線系入砂銚內以薑汁浸過文火熬乾為末

每挑少許置掌心舐喫日十數次忌毒物生冷脾

寒瘧疾 濟生方云五臟氣虛陰陽相勝發為瘧瘧

附子一枚炮七次鹽湯浸七次去皮臍分作二服

水一碗生薑七片棗七枚煎七分露一宿發日空

心溫服末久再進一服至膠百一選方云寒瘧宜

附子風痰宜烏頭若用烏頭則寒多者火炮七次

熱多者湯炮七次去皮焙乾如上法用烏頭性熱

炮多則熱散也○又果附湯煎熟附子去皮草果

仁各二錢半水一盞薑七片棗一枚煎七分發日

早溫服○時後方臨發時以醋和附子塗于背上

寒熱瘧疾 附子一枚重五錢者麩煨人參丹砂各

未發前連進三服中病則吐或身體麻痺瘧寒熱

木末中病來日再服 龍安常傷寒論

冷瘧寒熱往來頭痛身疼嘔痰或汗多引飲或自

利煩躁宜薑附湯主之大附子一枚四破每以一

片水一盞生薑十片煎七分溫服李侍制云此方

極妙章傑云嶺南以啞瘧為危急不過一二日而

死醫謂極熱感寒也用生附子一味治之多愈得

非以熱攻熱而發散寒邪乎真起死回生之藥也

嶺南 **小便虛閉** 兩尺脈沉微用利小便藥不効

衛生方 臍益水浸良久澤瀉一兩每服四錢水

一盞半燈心七莖煎服即愈 普濟方 **腫疾喘滿**

大人小兒男女腫因積得既取積而腫再作小便不利若再用利藥性寒而小便愈不通矣醫者到此多束手蓋中焦下焦氣不升降為寒痞隔故水凝而不通惟服沉附湯則小便自通喘滿自愈用生附子一箇去皮臍切片生薑十片入沉香一錢磨水同煎食前冷飲附子雖三五枚亦無害小兒每服三錢水煎

脾虛濕腫 大附子五枚去皮四服 朱氏集驗方 破以赤小豆半升煮附子于中慢火煮熟去豆焙研末以薏苡仁粉打糊丸梧子大每服十九丸蘿蔔湯下 朱氏集驗方

陰水腫滿 烏頭一升桑白皮五升水五升煮一升去滓銅器盛之重湯煎至可丸丸卜豆大每服三五丸取小便利為佳忌油膩酒麩魚肉○又方大附子童便浸三日夜逐日換尿以布擦去皮搗如泥酒糊和丸小豆大每服三十九丸煎流氣飲送下 普濟方

大腸冷秘 附子一兩赤石脂一兩為末醋糊丸梧子大每服五十九丸 楊氏家藏方

冷氣洞泄 川烏頭一兩木香半兩為末醋糊丸梧子大每服陳皮湯下二十九丸 本事方

臟寒脾泄 及人中氣不足久泄不止肉豆蔻二兩煨熟大附子去皮臍一兩五錢為末粥丸梧子大每服八十九丸蓮肉煎湯下○十便良方治脾胃虛冷大腸滑泄未穀不化乏力用大附子十兩連皮同大棗二斤於石器內以水煮一日常令水過兩指取出每箇切作三片再同煮半日削去皮切焙為末別以棗肉和丸梧子大每空

小兒吐泄 注下小便少白龍心未飲服三四十九 丸用熟附子五錢白石脂煨龍骨煨各二錢半為末醋麩糊丸 霍亂 黍米大每米飲量兒大小服 全幼心鑑

吐泄 不止附子重七錢者炮去皮臍為末每服四錢水二盞益半錢煎一盞溫服立止 孫兆

水泄久痢 川烏頭二枚一生用一以黑豆半方 秘寶 合同煮熟研丸綠豆大每服五丸

黃連湯下久痢赤白獨聖丸用川烏頭一箇灰火

研末酒化臘丸如大麻子大每服三九赤痢黃連

吞如渴及肚痛以水吞下並空久痢休息熟附子

心服之忌熱物經驗良方聖濟總錄下痢效

未雞子白二枚搗和丸梧子大傾入沸湯

逆脈沉陰寒者退陰散主之陳自明云一人病下

血虛寒日久腸冷者熟附子去皮枯白礬一兩為

去皮生薑三錢半水煎服或陽虛吐血生地黃一

加黑豆一百粒並聖惠方酒少許以熟附子一兩半去皮臍切片入汁內石

器煮成膏取附片焙乾入山藥三兩研末以膏和

搗丸梧子大每空心米飲下三十九昔葛察判妻

苦此疾百藥皆試得此而愈屢發屢効余居士

選奇方 溲數白濁熟附子為末每服二錢薑三片 虛

火背熱虛火上背內熱如火灸者附 經水不調

血臍痛此方平易捷徑熟附子去皮 斷產下胎

當歸等分每服三錢水煎服普濟方

生附子為末淳酒和塗右折腕損傷卓氏膏用大

足心胎下去之小品方折腕損傷附子四枚生

切以猪脂一斤三年苦醋同漬三宿取癰疽腫毒

脂煎三上三下日摩傅之深師方癰疽腫毒

川烏頭炒黃藥炒各一兩為末唾調癰疽久漏

塗之留頭乾則以米泔潤之同上癰疽久漏瘡

冷膿水不絕內無惡肉去附子以木浸透切作大

片厚三分安捺口上以艾灸之隔數日一灸灸至

五七次仍服內托藥自然肌肉長滿癰疽弩肉

研末作餅子亦可薛已外科心法癰疽弩肉如

不飲諸藥不治此法極妙附子削如碁子太以唾

徹內即瘥 癰疽肉突 烏頭五枚 濃醋三升 漬三日 千金方 洗之日夜三四度 古今錄

驗 丁瘡腫痛 醋和附子末塗之 久生疥癬 川烏頭 木煎洗甚 手足凍裂 附子去皮為末以水麩調 足

驗 聖惠 手足凍裂 附子去皮為末以水麩調 方足 釘怪疾 兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如釘脛骨生

腎冷熱相吞用炮川烏頭末傳之 內服韭子湯効 夏氏奇疾方

烏頭附子尖主治為末茶服半錢吐風痰癩癩 特

發明 特珍且烏附用尖亦取其銳氣直達病所爾 厥逆用附子尖一箇硫黃棗大一箇蠟稍七箇為

末薑汁麩糊丸黃米大每服六丸米飲下亦治久 瀉疝癰疔用烏附不可執為性熱審其手足冷者

輕則用湯甚則用丸重者用膏候手足暖陽氣回 即為佳也按此方乃和劑局方碧霞丹變法也非

真慢脾風不可輒用故初虞世有金虎碧霞之戒 附方 舊一風厥癩癩 凡中風痰厥癩癩驚風痰涎

宜碧霞丹主之烏頭尖附子尖蠟稍各七十箇石 綠研九度飛過十兩為末麩糊丸茨子大每用一

丸薄荷汁半盞化下更服溫酒半合須臾吐出痰 涎為妙小兒驚癇加白僵蠶等分 和劑局方

臍風撮口 生川烏尖三箇全足蜈蚣半條酒浸炙 麝香少許為末以少許吹鼻得嚏乃以

薄荷湯灌一木舌腫脹 川烏尖巴豆研細醋 牙痛 字 永類方

難忍 附子尖天雄尖全蠟各七箇 奔豚疝氣 作痛 或陰 囊腫痛去鈴丸用生川烏尖七箇巴豆七枚去皮

油為末糕糊丸梧子大朱砂麝香為衣每服二丸 空心冷酒或冷鹽湯下三兩 割甲成瘡 連年不愈

日一服不可多 澹寮方 川烏頭尖

六

六

六

六

六

六

六

六


六

六

黃藥等分爲末洗了貼之
以愈爲度 古今錄驗
研末薑汁和塗足心男左
女右不過二三次即愈

老幼口瘡

烏頭尖一箇
天南星一箇



Kitasato Memorial Medical Library