

醫學管錐 内集

十三十四

i 18-1

F 10
1-11

醫學管錐卷十三目錄	九折室山田氏圖書之記
絃癖左屬於肝右屬於脾	
所中心下	如蟲行皮中
藥行之驗	清穀下利有屬火者
知小便頻數有屬火者	
火生風	素問舉日數或云十日
桃花湯赤石脂用法	論桂枝
黃耆	蘇藥
脉經竹葉湯	酒痕
五味發於情	茵陳不分寒熱
蠱脹即鼓脹	附紫金丹方
舉卿古辨散	



富士川文庫

1256

夜服 中婦丹 葛根非陽明經藥

明清俗傷寒禁飲食因更不火寒症

張仲景治漢武帝消渴

痔漏懸癰難治

解顱治方

產婦用童便去

咳嗽丸

半硫丸

產後鬱冒

產後血運悶血暈

腸癰湯

九寶散

眩運之別

破證奪命丹

產後血運

宜通而塞則為痛

吐蟲方

絃瘡卷十三目錄



絃瘡左屬於肝右屬於脾

醫心方通玄云、絃瘡之疾亦不專於一。絳病者、肝之所生、癰病者、脾之所成。絳生於左、癰成於右。絳者如弓之絳、肝之所生、肝與膽為清淨之府、不受外耶、故知自生病也。癰者、脾胃為水穀之海、食不消偏僻一邊、故名為癰。令一絳瘡同為一疾、實亦難矣。卷九
謂經脉心中之皮皆可憐心也、觀足之掌、空空二字、而其義可見。

夜服

葛根非陽明經藥

明着浴傷寒禁飲食

張仲景知漢武帝消渴

痔漏癰癧難治

解顛治方

產婦用藥便

安胎

毫姑名氣令一錢華回馬一丸實水蘿女
味白甘能止驚者取四分煎水服食不宜離
已此後用以半升半服亦可也。不妥代咀姑
半升華酒者取之。如生冷太華水飲古辨者
如華酒者無之。如華少矣亦不專。一錢
如華之方。如華少矣亦不專。一錢。如華
如華古風。如華古風。如華。

心中心下

錢天來曰。心中心胸之間。非必心臟之中也。傷寒論
源集

又曰。心下。心之下。中脘之上。胃之上脘也。胃居心之
下。故曰心下也。同上

或曰。古言心中心下者。非心臟之心。心者。正中之
謂。軀殼心中之處。皆可稱心也。觀足心掌心等字。
而其義可見。

而其善可見

體與殊心中之寒皆下蘇之土歸又心安乎華宅
夜日古言少中少十昔非心臟之汗昔五中少

不姑曰心下也

同上

又曰心下之汗中謂之土胃之土朝少胃居之少

雜天來曰心中心臟之間非又心臟之中也

心中心下

如蟲行皮中頭中有蟲行如蟲緣之狀
又昔有水淋狀如竹管吹處如刺如針刺
如出如鉸刀所刺如鼠走
素問瘡論凡瘡之類逢寒則蟲逢熱則縱王冰注蟲
謂皮中如蟲行

傷寒論陽明病法多汗反無汗其身如蟲行皮中狀
者此以久虛故也陽明篇

金匱要略服後當如虫行皮中從腰下如冰後坐被
上又以一被繞腰下溫令微汗差

方已黃耆

肘後方面當覺急頭中有蟲行者額及手足應有赤
色處如此必是差候

後五小品癲狂良苦散方

又當汗出如蟲行
皮中即愈

桂枝加附子湯方後

麻黃細辛附子湯

太陰
孤黃縣卒前王
史中臣介
天當天出
卷之二

又初覺皮膚不仁、或溼溼苦痒、如蟲行、或眼前見物
如垂絲、面卷五癱病方卷八、
脉經、診得肺積云云、主皮中時痛、如蟲緣之狀、其者
如針刺時癢、卷八、
千金方、有風遇於虛腠理開則外出、淒淒然如寒狀、
覺身中有水淋狀時、如竹管吹處、此是其證也。論雜
風狀第一

又凡覺肌肉中如刺、皆由腠理開邪氣在肌中閉、因
欲出也、宜解肌湯則安。同上

又若因熱食汗浴通腠理得開、其風自出、則覺肉中
如針刺、盛行運力欲汗、亦如此也。同上

又日三服、以身中覺如針刺者、則藥行也。

風散方後

又或如錐刀如刺、行人皮膚中、無有常處、久久不治、
入人五臟、或在心下、或在膏肓、遊走四肢、偏有冷處、
如風所吹。同魯王酒主治

又脅下如錐刀刺、同大蠶蜜湯主治

鼠矢

又治濕風駁痛、欲折肉如錐刀所刺、同上、
又石南湯治六十四種風、注走入皮膚中、如蟲行、要

春瘡直、同

眼實方

又頭上有風如蟲行、同卷十九

目癰風裏蟲代實去

活人書、善此酒治脚痺方後云、常令酒氣醺、不

絕久服覺皮膚下如數百條虫行即風濕氣也。卷五

千金方脾風之狀多汗云云名曰厲風裏虛外實若陽動傷熱則實則人身上如鼠走唇口壞皮膚

色變身體津液脫腠理開汗大泄

肉極

又治肉熱極肌痺溼溼如鼠走

同上

又西州續命湯治肉極虛熱肌膚溼如鼠走

同上

又石南散治肉熱極則體上如鼠走

同上

又人正蘋疽玉竹用玄胡膏散表四指滿布頭髮齒齦等處陳酒太丸膏中無常處久久不散又若因熱食汗浴通腠理得開其風自出則覺見肉中死鉗刺頭及長甲蟲咬搘陳酒散藥散

周禮大燭同上

藥行之驗

傷寒論

實錄卷之三使藥散母乳散

桂枝頭

初一服其人身如痺半日許復服之三服都盡其

人如冒狀勿怪此以附子木併走皮內逐水氣未

得除故使之耳

太陽下

桂枝附子

初服微煩復服汗出便愈

柴胡桂枝干姜湯方後

全服後當如虫行皮中從腰下如冰後坐被上又以

一被繞腰下溫令微汗差

防已黃耆湯方後

中病勿更服大便當如漆

百合地黃湯方後

分溫再服則吐膿血也

桔梗湯方後

其知者如醉狀得吐者為中病

鴉頭桂枝散方後

溫服一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也黃耆芍藥桂枝苦酒湯方後

當汗出如皮行皮中即愈

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯方後

小便當利尿如皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也茵陳蒿湯方後

傷寒論同姑土又以

病隨大小便去小便正黃大便正黑是候也

消石礬石

散方後

新血下如豚肝下瘀血湯方後

夫丈內盜水滯未

千金方如其入良咬敷半日皆可三頭潛鑿其

以身中覺如針刺狀則藥行也

卷八小八風散方後

未發一服發時一服發後一服以吐利四五行為

瘡不止冷飯止之

卷十施子湯方後

平旦空心服之以知為度微覺發動流入四肢頭

面習之然為定勿更加之

卷十二芫花散方後

藥勢未定不得強起行之即運悶旋倒眼花暗然

迷絕此是逐風所致不須疑怪

同上五十四却當下

額上手中從文理中赤起是知也無此候更服博

空四治風癲

良石子方主治

服藥十日覺身體癘疹大癢二十日更大癢三十

日乃漸止此皆是風氣出去故也

同天門冬散末

欲令病人見鬼加防葵一分欲令鬼主者復增一

分立有驗防葵良石子並令人迷惑恍惚如狂不可

多服 卷十四 四物弋鳥頭散方後

初服三合漸加微痺為度

卷十五 上 大黃蟹一
者酒方後

病即下去勿更服也初下如泔後如汚泥若如沫

滓吐者更可服之養如乳婦

卷十六 茄蔓消
石湯方後

空腹服二方寸匕須拾針兩食間以冷漿水白粥二

七止之隔日一服

卷十七 治積年上氣不塞無死
者貢管子熟羊肝二味方後

病在頭當鼻劍在膈上吐在膈下利在四肢當汗

出 卷十七 大乙備

卷十八 治重陽炎熱外冒寒
火升發中風寒客於頭面四肢皆熱人四逆輕

膈上吐膈下下去惡物如科斗蝦蟆子或長一二

尺同桔梗圓方後味為更覺安樂

卷十八 治欬嗽酒
肥皂莢云云方

若吐多以酢飯三四口止之

卷十八 治欬嗽酒
肥皂莢云云方

藥入四肢百脉似醉狀是效

卷十九 建中又
方後

其藥通中入腦鼻必酸疼勿怪

同無比薯蕷
圓方後

始服藥當咽喉上有癰子腫起頰車腫滿齒斷皆

則腫唾碎血出勿怪也不經三五日即消

卷廿一 治水
鹽門治水

無空腫利小便又方水銀等八味方後

卷廿一 在臨證精
方後

察而力舉者之所宜者

卷廿二 治水
門白林大治水
方後

吳人駒曰有協熱下利者亦完穀不化乃邪熱不殺

卷廿三 治水
醫宗全錄卷八傷
寒下利

穀其別在熱之陰陽虛實之不同

卷廿四 治水
醫宗全錄卷八傷
寒下利

清熱寒外熱汗出而病者
方後

劉君序大曰今驗之小兒此最多

卷廿五 治水
方後

卷廿六 治水
方後

卷廿七 治水

卷廿八 治水

卷廿九 治水

卷三十 治水

多服卷十四口物之首頭散方後

初服三合漸加微劑為度卷十五上大黃
病即下去勿更服也初下如泄後如汚泥若如沫

津吐者更可服之養如乳婦卷十六茶葉消三片
空腹服二方寸匕須拾針兩食間以冷服白粥二

匙止之隔日一服卷十七治積年上氣不逕寒死
者歲子既年既未方後

病重取宿頭如瓦冰雖寒人相對在四肢當汗卷十八

熱藥

卷十九

水

其藥卷二十中人鄧阜必麵麥少剉同前葛根

藥人四錢甘草炒薑末吳茱卷二十一萸酒

宣明論穀雖不化而色變非自煩渴小便赤黃而溢者為之熱證世傳大人小兒吐痢霍亂
食乳未及消化而痢尚白便言論為寒證誤矣何不脉候別之仲景邪熱不化穀卷二十二
為寒也大人亦同

卷十四

清穀下利有屬火者

吳嶧曰河間云濁而水穀變色者為熱水穀不变色
澄澈清冷者為寒皆妙論也若肛門燥澁小便黃赤
則水穀雖不变猶為熱也此由火性急速食下即出
無容變化仲景所謂邪熱不殺穀是也茲在臨證精
察而加藥物之所宜者爾醫方考卷二泄濁

門白朮茯苓湯

穀其別在極之陰陽虛實之不同醫宗全鑑卷八傷寒論厥陰篇下利

門九十七

穀

卷五

清穀喫寒外熱汗出而厥者新編卷之注

通脉

四逆湯主之

劉君廉夫曰令驗之小兒此最多傷寒論輯義厥陰篇通脈四逆

清穀下利有屬火者

味鴻臚

卷一百六十一

貴小兒門

水百地黃當交參

味鴻臚

卷一百六十二

水百地黃當交參

和田東郭百疾一貫小兒門亦有此說當參看

小兒直訣卷中。有廣親宅四大王宮五大尉病吐

瀉不止水穀不化衆醫用補藥錢氏用石膏

湯白虎湯案當參攷

中ノ三ウ

卷八

吳人謁曰。首脚瘻下臍音亦宗瘻不少。大汗瘻不斂

療而吸藥多之竹宜昔爾

四百本大通

卷二世

無容变外。外景拍霜承蒸不斂瘻異也。茲本詔瘻散

傾本瘻雖不變。醉為膝力。由火卦急食不咀出

登瘻音今。皆為寒督火。未。非門槳益小更黃赤

吳聖曰。或問云。瘻而水瘻變色者為瘻冰瘻不变色。

音瘻不休。百瘻火音

貪涼未久能外而爾尚自更言。偷為寒瘻矣。失何不視。矧限之。則景承蒸不外瘻。宣

門瘻。瘻雖不外而多變。非自更意。小動赤黃而弦音。為之瘻。每軒大入。不。陳雷論

卷十四

大

人

亦

同

高

寒

也

大

人

亦

同

高

寒

也

大

人

亦

同

高

寒

也

大

人

亦

同

高

寒

也

大

人

亦

同

高

寒

也

大

人

亦

同

高

寒

小便頻數有屬大者

字說當參看

注認庵曰。薦根止小便數。肺為水之上源。脾氣散精。上歸于肺。始能通調水道。下輸膀胱。腎為水藏。而主二便。三經有熱。則小便數。甚至不能少忍。火性急速。故也。虛中空。故入心肺。清上焦。熱。熱解則肺之氣化行。而小便復其常道矣。本草備要得風而盛。猶夫

婦之道相須而成孔穎達曰。異在離外。是風從大出。大出之初。因風方熾。火既炎盛。還復生風。内外相成。有似家人之義。故曰風自火出。家人也。

又說卦傳。巽入也。孔穎達曰。巽象風。風行无所不入。故為入也。疏九八。

和田東郭百疾一母兒小兒門亦有此說當參看

兒真缺卷中。有廣親宅四大王寫五本房病止水教不化。泉成智用補藥錢氏用石膏

湯白虎湯。安富參及

升而小更貳其常首。笑本草錄要

姑也。蠶中空姑人。心而靜。土氣達。蠶。氣順。而之。蠶出
二更三點。百瘡傾小更。蠶。甚至不指。心。火。卦。愈。更
一。蠶。于。神。告。指。蠶。馬。承。道。不。禪。想。想。蠶。為。小。蠶。而。庄。
詳。蠶。事。曰。蓋。蠶。上。小。更。蠶。禪。為。水。之。土。惑。野。蠶。蠶。蠶。

小更。更。蠶。大。音。

犬生風。外集卷八。風字說當參看

成無己曰。被火者。則火助風溫成熱。微者熱癆而發黃。劇者熱甚生風。如驚癇而時瘓癰也。傷寒論太陽

吳嶧曰。肝火為風。心火為熱。

醫方考卷二當歸龍膏九考

甚見深

易下經。家人象曰。風自火出家人。馬融曰。木生火。火以木為家。故曰家人。火生於木。得風而盛。猶夫婦之道。相須而成。孔穎達曰。巽在離外。是風從火出。火出之初。因風方熾。火既炎盛。還復生風。內外死相成。有似家人之義。故曰風自火出家人也。

又說卦傳。巽入也。孔穎達曰。巽象風。風行无所不

入。故為入也。疏九ノハウ

人姑人也。經火人也

又善佳轉翼人也。縣音曰異參風。言天不
昧。育人也。入之。善姑曰風。自大出。參人也。

出。大出。之。以風。衣。燭。火。謂。炎。盈。燭。剪。火。風。內。於

燭。之。剪。火。熙。而。燭。下。燭。童。曰。異。耳。燭。火。是。火。

火。以。木。為。家。姑。曰。參。入。火。主。火。木。界。風。而。盈。燭。夫。

恩。丁。聲。家。入。象。曰。風。自。大。出。參。入。馬。蠅。曰。木。主。火。

吳。鼎。曰。升。火。鳥。風。以。火。鳥。燒。黃。鶴。音。燒。其。至。風。吹。燭。而。朝。美。齊。出。上。音。風。溫。燭。

叔。無。口。曰。姑。大。音。限。大。謂。風。濕。火。燭。過。音。燭。參。而。燭。

火。坐。風。代。集。卷。八。風。字。燭。當。參。音。

素問舉日數或云十日

素問移精變氣論。中古之治病。至而治之。湯液十日。以去八風五痺之病。

王版論要篇。其色見淺者。湯液主治。十日已。其見深者。必齊主治。二十日已。其見大深者。醪酒主治。百日已。

高世栻曰。十日已者。十干之天氣周。而病可已。王機真藏論。當是之時。可灸可藥。弗治滿十日。法當死。

韓非子卷十七。定法篇。人不食十日則死。按此極平

入絕谷篇。七日

人多不日

谷十日

韓非子卷之二家者入不食十日限及

雷之國

或

王欽真藏篇中吳少卿下炎可藥東家斯十日志當

高士林曰十日而青十天蒸周而歲可

日五

者之齊主宗二十一日引其果大聚告禱過生治百

王頭鑰要當其西東者移移三十日引其果聚

以去八風王華六歲

秦問外醫變房鑰中古者歲至而告之

秦問舉日幾夜三十日

桃花湯赤石脂用法

傷寒論少陰篇桃花湯方赤石脂一斤一半全用一半篩末乾薑一兩粳米一升右三味以水七升煮米令熟內赤石脂末方寸匕去滓溫服七合日三服徐靈胎曰兼末服取其留滯收瀉

外臺秘要崔氏治痢無問冷熱赤白久新并疳溫劉祕監積年患痢每服此卽愈方阿膠二兩一兩炙入藥一兩銷作清吳黃連一兩乾薑三兩入黃無食子二枚久痢腸滑甚者量加至三四枚右四味擣篩為末以醋鎔膠清頓和丸如梧子飲服二十五丸日再漸加至三十九老小者以意斟酌

桃花湯赤石脂用法

卷廿

又救急療崩中下血數斗氣欲絕方伏龍肝五升入參二兩麝香三兩生薑四兩右四味切以水一大斗煮土取二升下藥煎取一升半更別研伏龍肝一雞子許并杏內湯中攪令調分服卷三十
四十五兩

後臺妹要首丸麻無問令達赤白人達并頭疽兼靈丹曰兼末頭項其留帶外敷

令東內赤白散末大半勺去寒溫服十合日三服牛膝末等量一所熟米一升古三末以水半升昔未取寒熱少剗葛根赤白散一丸一半全風一

麻蘇桂赤白散用去

論桂枝

傷寒論五苓散證云表裏不解桂枝人參湯證亦云表裏不解說者因謂有表又有裏乃表裏雙解之劑愚謂是知其一而未知其二何也五苓散標其表脉證云脉浮云脉浮數云微熱云發熱其他皆裏證也桂枝人參湯標其表證云協熱其他皆裏證也五苓散用半兩比之諸藥即三分之一耳桂枝人參湯桂枝細草並用四兩蓋此二方用一味桂枝於表而用餘四味於裏是知雖曰表裏不解而裏為主而表乃其次也或問然則葛根芩連湯亦裏為主而表乃其次耶曰否葛根用半斤芩連用三兩其分兩之多寡

亦可以見表為主故不曰表裏不解而曰表未解也。大抵仲景所用之桂枝發表攻表救表之外更有二義黃連湯炙甘草湯當歸四逆湯之桂枝取之利經脉也桃核承氣湯桂枝茯苓丸之桂枝取之通血氣消瘀血也夫然後桂枝之用盡矣。

針刺以參參其毒蠅云細刺其曲督脈參也五苓散云細參云附子蠅云附子蠅云發瘡其曲督脈參也愚謂吳味其一而未味其二何也五苓散無其毒神末裏不無之音因附子有參又甘草代赤芍更謂火神之贊刺寒蠅五苓散蠅云毒參不無針刺入參愚蠅亦云

篇卦序

黃芪

本草白字黃耆味甘微溫主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病本草黑字無毒婦人子藏風邪氣逐五臟間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛泄痢益氣利陰氣生白水者冷補其葉莖療渴及筋骨癰腫瘡瘍湯夜本草芪與桂同功特味稍異比桂但甘平不辛熱耳卷中藥恐不於黃芪指味榮暉又如千金耳同上

又東垣云黃芪既補三焦實衛氣與桂同特益氣異

耳

同上

卷三

又心云無汗則發之有汗則止之同上入地鑑限用

仲景全書、桂枝甘草湯條、沈亮宸曰、今人此證則用黃芪、可見黃芪與桂枝性用不甚相遠也。卷三

按黃芪蓋補中有發、兼去表濕之品、世唯以為固表止汗之藥、恐不然、黃芪能和榮衛、乃所以汗止、竟非止汗之謂、何以言之、金匱要略防已黃耆湯方後云、服後當如虫行皮中、從腰下如冰、後坐被上、又以一被繞腰下、溫令微汗差、又附方、千金三本黃湯方後云、一服小汗、二服大汗、其他如黃耆桂枝五物湯治血痺、黃耆芍藥桂枝苦酒湯桂枝加黃耆湯治黃汗、烏頭湯治歷節、皆未不帶發散去濕之意、何氏醫碥云、黃耆芍藥桂枝苦酒湯無清

熱去濕之品、徒取固斂、得無壅乎、此方恐是錯簡、終不可用、此亦泥固歛之說、不知有去濕之功、今不取。

余壯年創此攷、後讀劉君藥雅、其說明暢、不復容嘴、然不忍棄去、因錄存之。

補遺卷之二
補遺卷之二
妙有屬諸補者、非一味純補之品也、成氏注小柴胡湯加減法曰、加芍藥以通經、宣而利之、謂通張志聰曰、凡下後皆去芍藥者、蓋以芍藥為苦寒也、柴胡安宗印柯琴白不用芍藥者、不欲其苦寒也、柴胡安宗印柯琴白不用芍藥者、不欲其苦寒也、

仲景全書桂枝甘草湯條沈亮宸曰今人此證則用

前故可見黃芪生桂枝性用不甚相遠也

卷三

於黃芪益補中發熱去表熱之品也唯以爲固

袁止汗之藥恐不然黃芪能和榮衛之所以汗止

更非止汗之謂何醫者全須要略苟口說實者湯

方後云服後當如虫行皮中從腰下如火後坐被

被幾不火至翌日全愈計令微子差又附方金三

余珠耳陰此文從楚空同藥錄其後附解子不諒容

禁東方湯加味與前同者芍藥桂枝若酒湯桂枝加

參者所用或亦此固驗之舊不確而未詳也今

遇去寒便易變症固知煩渴無聲半身瘓吳謐簡

芍藥

本草綱目附子全總病論治人書

二十一

芍藥味苦性微寒故能有滋陰之功滋陰故能和營世率謂酸收攷之本草其言酸者唯雷公一人他或云苦農或云甘桐君或云鹹岐伯其所說各不同攷其功多破堅逐癰宣壅止痛之義雖有本經益氣藥性論補腎氣日華子補勞之文竟非專於補者但配合之妙有屬諸補劑者非一味純補之品也成氏注小柴胡湯加減法曰加芍藥以通壅方有執亦曰芍藥通宣而愈痛故加也張志聰曰凡下後皆去芍藥者蓋以芍藥為苦洩也傷寒宗印柯琴曰不用芍藥者不欲其苦洩也來蘇太陰篇注此數說可以徵愚說更取太陰篇設當行大

芍藥

甘草

此數說可以徵愚說更取太陰篇設當行大

黃芍藥者、宜減之、以其人胃氣弱易動故也。之觀之

則義甚明矣。

卷一百一十一
不因芍藥者不給其苦更由來

劉君藥雅有芍藥舞其說與愚說稍不同、當參看。

之旨說並互從、非一。采藥解以唱也。丸方主小柴

陳修園時方歌括云按神農本經云芍藥氣味如半苦無毒主治邪氣腹痛除血癆破取之得寒熱止肩利小便益氣原文只此二十九字後人妄改聖經而曰微酸是沒其苦泄攻堅之性而加酸斂和陰之名而芍藥之真面目掩矣不知古人用法或取其苦以泄甘或取其苦以制辛或取其攻利以行梢泄之滯皆善用芍藥以為補非以芍藥之補而用之也。但芍藥之性略同大黃凡泄濕必務去之此聖法也。本經不明宋元以後無不誤認為酸斂之藥不得不急正之。卷上十全大補湯方後

芍藥和苦對寒。姑指百效金之丸茲錄姑指味營

芍藥

又辨脉經竹葉湯

附千金總病論活人書補亡論竹葉湯

脉經寸口脉實即生熱在脾肺嘔逆氣塞虛即生寒

在脾胃食不消化有熱即宜服竹葉湯葛根湯有寒

宜服茱萸圓生薑湯

卷二平三關病候并治四第
按疑是竹葉石膏湯

千金卷廿八同

又辨脉弱胃氣虛胃中虛胃中有客熱脉弱為虛熱作病其說云有熱不可大攻之熱去則寒起正宜服竹葉湯針胃管補之同上

之卷九平產後諸病云云第三
遺婦人產後竹葉湯云第三
按是金

牛金方竹葉湯治產後心中煩悶不解方生淡竹葉

麥門冬、甘草、生薑、茯苓、大棗、小麥、右七味云云、卷三

方虛煩第二奇氣分兩省不載下同

金匱全

又治產後中風發熱、面正赤、喘氣頭痛、竹葉湯方、淡竹葉、葛根、防風、桔梗、甘草、人參、大附子、生薑、大棗、桂心、右十味云云、同上 中風 第二卷三按即此五味服

又治產後虛渴、少氣力、竹葉湯方、竹葉、甘草、茯苓、人參、小麥、生薑、大棗、半夏、麥門冬、右九味云云、同上 淋渴第七

又治發汗後、表裏虛煩、不可攻者、但當與竹葉湯方、
卷九 發汗吐下後第九十五按即此五味服

仲景竹葉石膏湯、固不載、卷三 治寒塞虛煩主寒

按千金卷五上、小兒傷寒第五、有竹葉湯二方

又治小兒夏月患腹中伏熱、溫壯來往、或患下痢、色或白、或黃、三焦不利、竹葉湯方、竹葉、小麥、柴胡、黃芩、茯苓、人參、麥門冬、甘草、右八味云云、卷五上 小兒傷寒第五

又竹葉湯、主五六歲兒溫壯、腹中急滿、息不利、或有微腫、亦主極羸、不下飲食、堅痞、手足逆冷方、竹葉、小麥、甘草、黃芩、桔梗根、澤瀉、茯苓、知母、白朮、大黃、桂心、生薑、人參、麥門冬、半夏、當歸、右十六味云云、同上

又霍亂吐利、已服理中四順、熱不解者、以竹葉湯主之、方、竹葉、生薑、白朮、小麥、橘皮、當歸、桂心、甘草、人參、附子、芍藥、右十一味云云、卷二十霍亂第六、宜服傷寒總病論、竹葉湯、治虛煩病似傷寒、身亦熱而煩

躁頭不痛、身不疼、脉不數者、兼治中暍、渴吐逆而脉滑數者、及傷寒解後、虛羸少氣、氣逆欲吐者、並宜服

之、石膏湯、不可發汗證

按即竹葉

湯

活人書、痰逆惡寒者、橘皮湯主之、不惡寒者、竹葉湯

主之、卷六

五

良醫論

十六

卷六

五

二

二

二

二

二

二

又諸虛煩熱、與傷寒相似、然不惡寒、身不疼痛、故知非傷寒也、不可發汗、頭不痛、脈不緊數、故知非裏實也、不可下、如此者、內外皆不可攻、攻之必遂損竭多死也、此虛煩、但當與竹葉湯、若嘔者、與橘皮湯一劑、不愈再與之、孫真人云、此法數用甚有效、傷寒虛煩亦宜服之、王叔和云、有熱不可太攻之、熱去則寒起、

正宜服竹葉湯、卷七

二十九

又若衄而渴、心煩、飲則吐水、先服五苓散、次服竹葉湯、卷九

二十九

又傷寒差後嘔者、有餘熱在胃脘、竹葉湯加生薑主

之、卷十

二十九

又傷寒解後、虛羸少氣、氣逆欲吐、竹葉石膏湯主之、

同上

二十九

又竹葉石膏湯、卷十五

主治

藥味

與傷寒

同因

不載

方後云、嘔者、加生姜一兩半、

又竹葉防風湯、卷十九

主治

藥味

與傷寒

同因

不載

傷寒補亡論、雍曰、千金方竹葉湯有二方、霍亂熱

益古竹葉湯

主

病

足

微

信

傳

事

博

長

母

論

事

述

怪

詫

不足

微

信

病

之

理

案

可

刊

不解者用竹葉湯與竹葉石膏湯方不同若裡虛煩不可攻者當以竹葉湯與前所說虛煩症同當用之即仲景竹葉石膏湯也。卷十七虛煩

蓋古竹葉石膏湯一名竹葉湯故往稱之耳。

按脉經所載竹葉湯二似指一則竹葉石膏湯一則金匱竹葉湯此方活人書名而言總病論活人書稱竹葉湯者並竹葉石膏湯也。十全方竹葉湯不唯一二方今並揭以備資攷。

又斯案皇華子百病瘧玉寶草竹葉湯主虛寒久寒大瘧但當與竹葉湯若溫者與之同治之不可大攻之熱去則寒起反者而昌保更煊限如本末頭正谷婚火頭竹葉五宜服竹葉湯不可大攻之熱去則寒起

病源候論酒瘕候人有性嗜酒飲酒既多而食谷常少積久漸瘦其病遂當思酒不得酒即吐多睡不復能食云是胃中有虫使之然名為酒瘕也。卷十九醫心方卷七

方列注云今案諸方無治酒癥之法以此諸瘕之方可治之也

本事方卷三光花圓方後引病源論同八

名醫類案注絕
述博同按母論事
涉怪誕不足徵信
世安有剖腹以驗
病之理此案可刪

醫說志怪曰有人得瘕病腹晝夜切痛臨終敕其子曰吾氣絕後可剖視之其子不忍違言剖之得一銅酒鎗容數合許華佗聞其病而解之便出巾櫛中藥以投鎗又即消成酒焉。卷五引太平御覽廿九卷五引同名又齊州士曹席進孺招所親張彬秀才為館舍彬嗜

詩云堅坐安木門
其夜月陪父祖
近郊遠不見燈
故往同舟共濟
家鄉殊無事
甲

酒每夜必直數升於床隅、一夕忘設焉、夜半大渴、求之不可得、忿悵呼躁、俄頃嘔吐一物于地、日起視之、見床下塊肉、如肝而黃、上如蜂窠、猶微動、取酒沃之、鳴、有聲、始悟平生酒病根本、亟投諸火中、後遂不飲、同上酒虫引丁志、其後、
又鎮陽有士人嗜酒、日嘗數斗、至午夜、飲興一發、則不可遏、家業殘破、一夕大醉、嘔出一物如舌、初視無痕竅、至欲飲時、眼徧其上、轟然而起、家人沃之以酒、立盡、至常日所飲之數而止、遂投之猛火、急爆烈為十數片、士人自此惡酒、同卷七嘔物如舌、久食谷常及門、越後鈴木順亭嘗觀一酒客吐如筒子者、吐

後不復好酒、事與醫說所言全同、詳載于隨筆中、

茲不贅、

一名、自幼一人自幼好酒、片時無酒、叫呼不絕、全不進食、日漸羸瘦、或執其手縛柱上、將酒與看而不與飲、即吐一物如猪肝入酒內、其人自此遂惡酒、
世醫得効方、男子自幼喜飲酒、至成丁後、日飲一斗、不醉、片時無酒、叫呼不絕、全不進食、日就羸弱、令其父用手巾縛住其手足、不令動搖、但扶少立、却取生辣酒壹壘、就於其子口邊打開、其酒氣衝入口中、病者必欲取飲、堅不可與之、須臾口中忽吐物一塊、直入壘中、即用紙封裹壘口、用猛火燒滾、約酒乾一

半、却開視之、其一塊如猪肝樣、納三兩重、週回有小孔如針眼、不可數計、弃之於江、飲食復養、雖滴酒不能飲矣、卷十

其父用左手撲拿其右手、根令僵硬、且赴父在床東、不迺往報、愚西也、不發全不重食、日掠頭髮、令髮根皆落、太卑苦自成喜、燒酒至瓶不錄、不飲、自立身日博羸弱、某手擎到土、無酒與食而不與人、自立一大白、故號醉翁、朝無酒、夜不寐、全不食、不養人、自此惡酒、同卷七、醫物知名。

卷不載秋毫、事此、猶可通言、奎同詩、楚子都、臺中

五味發於情

左氏昭公九年傳、晉荀盈如齊逆女還、六月卒于戲、陽殯于絳、未葬、晉侯飲酒樂、膳宰屠蒯入、請佐公使尊、許之、而遂酌以飲工注、工、曠也、樂師曰、女為君耳、將司聰也、辰在子卯、謂之疾日、注、疾惡也、糾以甲子喪、桀以乙卯亡、故國君以為忌、君徹宴樂、與子入舍業、為疾故也、君之卿佐、是謂股肱、股肱或虧、何痛如之、女弗聞而樂、是不聰也、又行事、事有其物、物有其容、今君之容、非其物也、而女不見、是不明也、亦自飲也、曰、味以行氣、氣以實志、志以定言、言以出令、臣實司味、二御失官、而君弗命、臣

之罪也。公說徹酒。禮記檀弓下屠作杜曾文祀

卷廿二

禮記檀弓下屠

作杜曾文祀

卷廿二

大戴禮曾子天圓篇和五聲之樂以尊民氣合五味

之調以察民情

其令君之容非其事也臣女

其令君之容非其事也臣女

其令君之容非其事也臣女

其令君之容非其事也臣女

孔廣森曰樂以養陽食以養陰凡酸入肝苦入心
則甘入脾辛入肺鹹入腎五味失調則各偏一歲故
苟情之發亦不得其正大戴禮補注

時去晏歸

時去晏歸

時去晏歸

同鄭玄注云七日謂之亥日推之于甲子之歲
卦掌精之而奉酒以燒工酒謂之卯日大毒日耳
駕未葬晉知燔酰樂飴宰畢駕入晉卦
式方辟之大卦尊晉盈岐齊並丈數六月卒于壇

五味發余部

茵陳不分寒熱

吳鶴臯曰茵陳治黃之要藥故無分于寒熱而用之

醫方攷卷四茵陳四逆湯考

劉松峯曰柿蒂治呃寒熱藥中俱可加入猶茵陳之
兼治陰黃陽黃也不可不知溫疫論類編卷三

大戴禮記子方劍篇和五聲之樂以道五氣合五味
之謂也蓋民情

孔廣雅曰樂以養陽食以養陰凡吸人所苦久之
甘入脾辛入肺鹹入腎五味失調各偏一病故
苟情之發亦不得其正大數種病法

兼宗領黃陽黃少不可不吹即頭篇興辭卷三

陸法言曰林莘宗領寒疎藥中則可吹人醉茵東

醫西太乙卷四茵東四並愚考

吳鞠臯曰茵東宗黃之要華姑無心于寒疎而用之

茵東不令寒疎

之

蠱注

後附載之蠱

張不同按捷前

後諸條皆種類

不腫記

見

蠱脹即鼓脹

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

見

蠱病子謂不可下當實脾不然之卒後入棺木腹與

棺蓋平治蠱宜石中黃圓方在卷後

卷四 脘滿水氣
石中黃

丸書中無此名然此方又有紫金丹禹餘

蠱圓等數名則石中黃丸亦一名也

丹溪心法七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉運之官失職胃雖受穀不能運化故陽自生陰自降而成天地不交之否清濁相混隧道壅塞鬱而為熱熱留為濕濕熱相生遂成脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓其病膠固難以治療又名曰蠱若虫侵蝕之義理宜補脾又須養脾金以制木使脾無賊邪之患茲腎水以制火使肺得清化却厚子味斷妄想遠音樂無有不安證治要訣蠱古鼓風以言其急賓如鼓非蠱毒之蟲蠱也俗謂之膨脹又謂之蠱

蜘蛛所感不同止是腹大而急餘處皮肉如常未辨何證宜用木香流氣飲或五苓散

宜潤大獨活湯

在上之薦之及

卷十六

又治症後風寒口

每服五錢食後

回溫酒調下

醫又不察虛實急於作効病者苦於脹急喜行利藥

以求通快不知覺得一日半日其脹愈甚病邪甚矣

真氣傷矣古方惟禹餘糧丸又名紫金丸制肝補脾

殊為切當卷三鼓脹三十九

醫方集解脹屬脾脹屬肝脹則陽氣猶行如單脹而不脹者名蠱脹為木橫尅土難治

丸方

附紫金丹方

本事方萬全方治十種水氣紫金丹禹餘糧三兩
鍼砂五兩蛇黃三兩云云此方以三物為主又能

量人虛實老壯入下項藥十六味以扶養之木香
肉豆蔻當歸白茯苓羌活川芎白蒺藜桔梗桂京三

按

棲乾姜、白朮、土茴香、青橘皮附子、牛膝、蓬莪术云
云此方見當塗楊氏家藏方及夷陵集驗方謂之
禹餘糧圓禹餘糧即石中黃名異而方實同但少
白朮一味然當用之甚煩茲不具錄唯載其大略

當檢本書

三因方禹餘糧丸方與本事方同唯肉豆蔻代白
豆蔻無白朮卷十四

按蠱張疑以轉易傍人之義名之竟非蠱毒之蠱
也獨嘯庵曰鼓脹得之天蓋受體之初胎穢結為
癬潛在腹裏壯年後勞動心志脩養失其宜則因
發為鼓脹故父子兄弟連發亦往往有之

粒麻竹酒不同血多大而赤者煮肉吸常未熟可鑿宜用木香赤芷酒煎正答增三

雞峯方產後牙關緊急手足瘺癰

項強目直視此由血虛風邪入中謂風瘡脉緊大者不治

宜荆芥獨活湯

荆芥湯荆芥濃煎絞汁半升右頓服將荆芥濃煎湯四直盆內坐病人在上薰之及淋

卷十六

舉卿古辨散外集卷九當參看

又治產後風瘡
荆芥頭痛壯熱運悶
荆芥德右為細末
每服一錢食後臨臥溫酒調下卷三

本草圖經假蘇荆芥也云：「古方稀用近世醫家治
頭風虛勞瘡疥婦人血風等為要藥並取花實成穗
者暴乾入藥亦多單用効甚速又以一物治產後血
暉氣心眼倒風縮欲死者取乾荆芥穗搗篩每用末
二錢七童子小便一酒盞調熱服立效口噤者挑齒
閉者灌鼻中皆效近世名醫用之無不如神云」證類本草

卷二十八 茄部 中品

活人書療婦人產後血虛多汗喜中風身體強直口
噤背反強作痙攣治之又方用荆芥末三錢溫酒調下
不過再服卷十九 醫鈔 卷五引活人

本事方治產後中風、口噤牙關緊急、手足瘓癰、愈風

散荆芥穗輕焙過一兩、細末、每服二錢、溫酒調下。經

驗產寶皆有之。陳選方中用舉卿古辨四字、蓋切脚

陰語以秘之也。此藥委有奇効神聖之功、大抵產室但無風為佳、不可衣被帳幙太暖、太暖即汗出、汗出則腠理開易於中風、便昏冒、記有一婦人產後遮護

太密、閣內更生火、睡久及醒則昏昏如醉、不省人事、其家驚惶、醫者用此藥佐以交加散、囑云、服之必睡睡

中必以左手搔頭、覺必惺矣、果如其言。

卷十 散用生地黃

生姜

婦人良方、療產後中風、口噤牙關緊急、手足瘓癰如

香少許研、沸湯一兩呷潤下、此藥雖微能愈大病、宜勿忽之。

升侵

續醫說、余治一婦人、新產後七日、為將息失宜、腠理不密、偶因風寒、身熱頭痛、兩眼反視、手

足瘓癰、名曰旅風、用荆芥穗一味、新瓦上焙乾為細末、豆淋酒調下三錢、其疾即愈、古人珍

私此久隱、甚不甚名。

故曰舉卿古辨散。

蓋用前之切語、舉

卿古辨錄謂真

生丹亦神之也。

卷九

療產風

荆芥穗

角弓狀愈風散、亦治血暈、四肢強直、不省人事、或築心眼倒、吐瀉欲死、吐衄百問、經驗產寶、陳氏本事同

荆芥略焙為末、右每服三錢、豆淋酒調下、用童子小

便亦可、其効如神、口噤者灌、齒斷噤者吹鼻中、皆效

一方、用古老煎湯調服、名一捻金散、指迷方但為粗

末濃煎服、卷十九

王機微義、治人舉卿舉敗散、治新產血虛症者、汗後

中風發搐亦然、荆芥穗不以多少、微炒為末、大豆黃

卷以熱酒沃之、去黃卷、取汁調細末三五錢、和杏飲

之、其效如神、一方、只以好酒調服、按此太陽厥陰經藥也、按本草、荆芥能發汗、破結氣、下瘀血、除風濕、

亦可一方、加當歸、調下、童便、

謹按產後多有

無病身強健而
似中風者宜用此藥

通血脉而清神可

散味培乾柔

散西與子入門單荆

每二錢黑豆淬酒

調服治產後中風

牙開緊急手足

瘓癰或麻油燈上

燒焦童便調服

治崩中不止卷七

亦是攻邪之藥若血氣果虛之人亦非所宜也卷三
附荆芥當歸方
婦人良方專治婦人方治產後中風不省人事口吐
涎手足瘓癰當歸荆芥穗等分右為細末每服三錢
水一錢酒少許煎至七分灌之如牙關緊急用匙幹
微灌下但下咽即有生理不問多少便服不可以
藥味尋常勿心之屢用救人有效卷十九

醫學入門古荆歸湯荆芥當歸身尾各等分為末每
服三錢黑豆淬酒調服或童子小便亦可口噤者坎
開灌之或吹鼻中皆効一方用蜜丸或麪糊丸如梧

桐子大每服五十丸空心未飲下治產後中風不

省人事口噤牙關緊急手足瘓癰如角弓狀口吐涎

沫亦治血暈四肢強直或猝心眼倒吐瀉欲死宜此

清神氣通血脉其効如神卷十

不拘多少炒金丹投好酒中卷十一

證治要訣產後發熱迷悶俗謂之發熱血新瓦上炒

荆芥不拘多少半炒半生為末溫熱水調下一錢名

獨行散或疑豆淋酒太熱用童便調尤宜若剉散便

煎亦得荆芥乃產後要藥角弓反張豆酒調極妙盛

怒失喜迷悶不發熱者便調無不效卷十二

又角弓反張乃婦人急候為諸病之最得此者十存

一二、荆芥新瓦上微炒末、豆淋酒下二錢、或只獨活
為末、豆淋酒調下、同上

本草綱目時珍曰、荆芥入足厥陰經氣分、其功長於
祛風邪、散瘀血、破結氣消瘡毒、益厥陰乃風木也、主
血而相火寄之、故風病血病瘡病為要藥、其治風也。
賈丞相稱為再生丹、許學士謂有神聖功、戴院使許
為產後要藥、蕭存敬呼為一捻金、陳無擇隱為舉卿
古辨散、夫豈無故而得此隆譽哉。按唐韻荆字舉卿
切、芥字古并切、蓋二字之反切隱語、以祕其方也。
四假蘇發明 按此戴陳無擇今及三四

又中風口噤、荆芥穗為末、酒服二錢立愈、名荆芥散。

賈似道云、此方出曾公談錄、前後用之甚驗、其子名
順者、病此已革服此已定、真再生丹也。同附方

又華佗愈風散、治婦人產後中風口噤、手足瘓癥如
角弓、或產後血運不順人事、四肢強直、或心眼倒築、
吐瀉欲死、用荆芥穗子微焙為末、每服三錢、豆淋酒
調服、或童子小便服之、口噤則挑齒灌之、斷噤則灌
入鼻中、其效如神、大抵產後太眩、則汗出而腠理疎、
則易於中風也。時珍曰、此方諸書盛稱其妙、姚僧坦
集驗方、以酒服、名如聖散、云藥下可立待應效、陳氏
方、名舉卿古辨散、蕭存敬方、用古老錢煎湯服、名一
捻金、王貺指迷方、加當歸等分水煎服、許叔微本事

方云。此藥委有奇效神聖之功。一婦人產後睡久。及醒則昏。如醉。不省人事。醫用此藥及交加散。云服後當睡。必以左手搔頭。用之果然。名殷產寶方云。此病多因怒氣傷肝。或憂氣內鬱。或坐草受風而成急。

宜服此藥也。戴原禮證治要訣。名獨行散。賣似道悅

生隨抄。呼為再生丹。同上

汪認庵曰。荆芥辛苦而溫。芳香而散。入肝經氣分。
兼行血分。本草備要卷上四翅雲南本草。謂其葉
又曰。通行血脉。治吐衄腸風崩中血痢。產後血運。
產後去血過多。腹內空虛。則自生風。故有崩運之
患。不待外風襲之也。同上

又曰。炒黑治下焦血。凡血藥用山梔乾薑地榆蒲

黃五靈脂之類。皆應炒黑。以黑勝紅也。同上

按水原三折產育全書試驗方。引本事方直指方
達生編載此方。而方後云。產後項背強直者。用葛
根湯加荆芥。殊効。此方外集二載。不列川芎四
洪氏集驗方。治婦人產後。因驚。或怒傷肝。或憂氣逆
中脘。或坐草風入子藏。遂成顛狂。或成中風不語。角
弓反張。狂走歌唱不常。荆芥穗瓦上焙乾。右為細末。
每服二大錢。熟米飲調下。酒亦得用。之如神。卷五

方云此藥委有奇效神聖之功。一婦人產後睡久及
醒則昏不知醉。不省人事。醫用此藥及交加散云服
無期。二女發熱未燒藥。用此散取汗。服之立止。
忌寒食。登高。霜露。不得冒暉。不得騎。不得聯乘。
中醫更坐草席。入是連。夜頭。并忌火中。居不帶鐵。
禁火氣。酒。太陽。歸人。並資。因勞。及飲。則復憂。忌鑿
麻。無。冰。晚。冬。殺。校。若。而。燒。熟。春。入。月。經。無。分。
毒。生。諸。鍼。北。卷。而。大。發。云。氣。發。更。背。銀。直。首。用。萬。
其。心。東。之。外。大。主。有。全。體。更。鍼。及。本。虛。更。首。正。鍼。
黃。在。靈。胡。立。酸。苦。蘇。愁。黑。又。黑。題。身。由。朝。運。之。
又。曰。必。黑。舌。黑。血。凡。血。藥。用。山。荷。掉。齒。黑。箭。青。苦。

荆芥治下血方

本事方治腸風臘毒。槐花散。槐花炒。柏葉爛杵焙。荆
芥穗。枳殼去穰細切。炒黃。右修事了。方秤等分細
末。用清火飲調下二錢。空心食前服。卷五

升皮大丸

脾胃論。當歸和血散。治腸澼下血。濕毒下血。川芎四
分。青皮。槐花。荆芥穗。熟地黃。白朮。巴上各六分。當歸
身。升麻。巴上各一錢。右件為細末。每服二三錢。清米
飲湯調下。食前。卷五

三夜一服

千金方。凡服補湯。欲得服。王升半。晝三夜。一。卷一服。
醫家有人。每月早起。須太陽一升。亥時。腹痛或不痛。

增愚賦丁復補 卷十

良丸和日土各一錢甘草半錢木香二三錢青米
青皮外附米蘇熟共黃白木日土各六錢當歸
頭胃全當歸味血蜡紫陽草子血川芎四

末用青火燭點十二錢空心食宿則參五

芥蘇味去蘇味及數炒黃芩炒車前子殊辛少

本草大字門風靜毒野葛根葛根葉麻林子能

味芥子不直也

夜服

日再夜一服

傷寒論太陽下篇桂枝人參湯

又黃芩湯黃芩加半夏生姜湯

腹滿寒疝篇赤丸

又下利篇黃芩加半夏生姜

晝三夜二

傷寒論黃連湯、金匱產後篇竹皮大丸方後日三夜二服

日三四夜二服

傷寒論霍亂篇理中丸

日三夜一服

金匱欬嗽上氣篇皂莢丸、又嘔吐篇生姜半夏湯、又婦人雜病篇半夏厚朴湯散

煮取五升、溫服五合、至夜盡、金匱澤漆湯

日三夜一服

金匱欬嗽上氣篇麥門冬湯本臍篇本臍湯

千金方、凡服補湯欲得服三升半、晝三夜二

卷八第一服

醫說、有人每日早起須大渴一行、或時腹痛或不痛

夜服

空心服熱藥亦無效後有智者察之令於晚食前更進熱藥遂安如此常服竟無恙蓋暖藥雖平旦空腹至晚藥力已過一夜陰氣何以敵之於晚間再進熱藥則一夜暖藥在腹遂可以勝陰氣凡治冷疾皆如此

卷五大鴻腹痛條

日三四支一服

葛根半夏草子林

金匱

又歸入城

白木

又歸入城

白木

又歸入城

白木

又歸入城

白木

日三四支二服

葛根半夏草子林

金匱

又歸入城

白木

又歸入城

白木

又歸入城

白木

又歸入城

白木

日三四支二服

葛根半夏草子林

金匱

又歸入城

白木

又歸入城

白木

又歸入城

白木

又歸入城

白木

又歸入城

支附

葛根非陽明經藥

柯琴曰要知葛根秉性輕清賦體厚重輕可去實重可鎮動厚可固裏一物而三美備然惟表實裏虛者宜之胃家實者非所宜也故仲景於陽明經中不用葛根東垣用藥分經不列於太陽而列於陽明易老云未入陽明者不可服皆未知此義喻氏謂仲景不用於陽明恐凶津液與本草生津之說左又謂能開肌肉又與仲景治汗出惡風桂枝湯中加葛根者左矣蓋桂枝葛根俱是解肌和裏之劑故有汗無汗下利不下皆可用與麻黃專於治表者不同

傷寒來蘇集附

王子接曰、仲景治太陽病未入陽明者、用以驅邪斷入陽明之路。若陽明正病中、未嘗有葛根之方。東垣易老謂葛根是陽明經主藥、誤矣。古方選注汗劑
開此因文與仲景合而用葛根者、中成葛根者、次用葛根者、非本草主藥之說。又葛根治云、未人服附子不下。附子未味此、兼得附子景不葛根東壁用藥、附子不畏此。太陽而畏之、則陽氣未宜之。胃來實者、非附子宜也。仲景、附子景不附子、則陽氣中不用。附子、連軍下固裏一渺而三美。附於鉢、赤實東壁、附子白要、味葛根、東壁、附子青顏、歸軍下、去實重附子。

葛根非附子藥

明清俗傷寒禁飲食

江寧南曰、萬歷十六年、南都大疫、死者甚衆、余寓雞鳴僧舍、主僧患疫十餘日、更數醫、皆云、禁飲食、雖米飲不容下咽、病者飢甚、哀苦索食、云云、若此類者甚衆、余未嘗禁飲食、而活者不少、每見都城諸公、但說風寒二字、不辨有無內傷虛實、一例禁絕飲食、有二千餘日、邪氣已盡、米飲尚不容入口、而餓死者何限、蓋而出之、以為習俗之戒、名醫類案卷八
張路王曰、今之方家、一見發熱、便以傷寒目之、一槩禁其飲食、而與通套發散消導之藥、易知傷寒之有礙於食者、惟寒傷營衛俱傷二證、其風傷衛中、絕

無禁食之例、反有啜熱稀粥以助藥力之說。張氏醫門

十戒

吳又可曰、時疫有首尾皆能食者、此邪不傳胃、切不可絕其飲食、但不宜過食耳。溫疫論 卷下

徐靈胎曰、桂枝本不能發汗、故須助以熱粥、內經云、穀入於胃、以傳於肺、肺主皮毛、汗所從出、歐陽充胃氣以達於肺也。觀此可知傷寒不禁食矣。傷寒類方增不容不因、諒昔踰其京苦索食云云、若此頃杳甚、嘗嘗舍主嘗患疫、十箱日更還醫、督云禁飧食、雖未云皇南歸、萬歷十六年、南嶺大疫、民昔甚衆、余寓篤

附錄古今醫案二

張仲景治漢武帝消渴

宋方勺曰、提點鑄錢朝奉郎黃汚久病渴、極瘦、予每見必勸服八味丸元初不甚信、後累醫不痊、謾服數兩遂安、或問渴而以八味元治之何也、對曰、漢武帝渴、張仲景為處此方、蓋渴多是腎之真水不足致然、若其勢未至於消、但進此劑殊佳、且藥性溫平無害也。

白宅編

醫說卷五

白宅編載此文

白宅編載此文

按讀書畫齋

魏之琇曰、按仲景乃建安時人、方謂其治漢武不知何本、趙養葵亦仍其誤。

知不足齋本
類案卷二注

劉君廉夫曰、按漢武仲景相去數百年、蓋不過一時作此杜撰之言、取信于俗士耳。

金匱要略
輯義卷三

隆平東夫曰妹冀在升景脉去邊百里蓋不區一
吳城何故遠養其妻亦知其難繼不取而種得留切不
可失之禁用其升景以數其妻相夫女歸其告冀在不
戴其妻未至其妻即重此濟起卦且藥其母平無害
氣聚其母平無害其妻之氣聚其母平無害其妻不
兩益安安而問愚帝以八和玉安之何出捲月氣在帝
其風父醫郎人未被不甚計勞累醫酒不全醫郎娘
宋氏也曰舅無醫發障奉傭黃天久詩歌其子
張朴景宗藝近帝前愚

開經
辨漏懸癰難治者多
名醫類案汪石山治一人年逾三十形瘦色脆過於
房勞病怠惰嗜臥食後腹痛多疾覺自胃中而上又
吐酸水肺氣不清聲音不亮已數更醫或用補陰消
導等劑汪診之脉皆細濡無力約有七至問曰熱未
曰不覺曰嗽半夜間數聲而已曰大便何如近來帶
唐未異問傍生一癰今已潰膿未收口耳曰最苦者何
夜臥不安四肢無力而已汪曰脉病不應夫脉數主
熱今覺不熱乃內蒸骨髓歟或正氣已竭無復能作
熱歟據證似難起矣何以故虛勞糞門生癰必成瘻
瘻脉不數者尚不可為況脉數半益肺為吸門司上

大腸為肚門司下、肺與大腸、腑臟相通、況肺為氣主、
陽氣當升、虛則下陷、所謂物極則反也。今病內熱燔
灼、肺氣久傷、故下陷肚門而生癰瘻、肺傷極矣、非藥
能濟。月餘尋卒。卷五
言者人會於此、多延貴自謂中而土又

外科正宗、夫懸癰者、乃三陰虧損、濕熱結聚而成。此
穴在於谷道之前、陰器之後、又謂海底穴也。初生狀
如蓮子、少痒多痛、日久漸如桃李、赤腫焮痛、欲潰為
膿、破後輕則成漏、重則瀝盡氣血、變為勞瘵、不起者
多矣。卷三

又首尾悞服寒涼、損胃傷脾、水凝氣血、以致患孔漸
開、穢膿不止者、亦定變成虛羸勞瘵、終為難愈。同上

魏之琇曰、按余嘗治二人、一少年、一老者、皆勞嗽
失音已數月、余投以集靈膏加減、至數十劑、皆下
發瘡而愈、或問其故、曰、無他、臟病移腑則輕耳、然
與石翁所論不同、名醫類案注、參錢右為末、煉蜜

直如梧子大空心溫水化下三圓。

卷下

又治頤開不食、鼻塞不通、方天南星大者微炮去皮
細末、淡醋調塗、紺帛上貼、頤上火灸、手頰熨之。同上

天陽為肝門司下肺與大腸腑臟相迎況肺為氣主
陽氣當升虛則下陷所謂物極則反也今病內熱燔
灼肺氣久傷故下陷肝門而生癰瘍肺傷極矣非藥
能治月餘尋卒

卷五

外科正宗夫懸癰者乃三陰衝損濕熱結聚而成此
穴在於谷道之前陰器之後又謂海底穴也初生狀
如蓮子少痒多痛日久漸如桃李赤腫爛痛欲潰為
膿與毒雜所侵不同如蠶蟲氣毒變為勞瘵不起者
多發瘻而愈夜間其姑曰無此難誅跡朝限蟬耳然
又未嘗瘳其母亦疑是瘻君處藏至邊陲醫者不知
開鑿之使日甚不當安坐兵火一燒少差又生瘻者皆知

解顱治方便

小兒直訣地黃圓治腎怯失音頤開不合神不足目
帶白睛多面色㿠白等方熟地黃山萸肉乾山藥各
肆錢澤瀉牡丹皮白茯苓去皮各參錢右為末煉蜜
圓如梧子大空心溫水化下三圓

卷下

又治頤開不合鼻塞不通方天南星大者微炮去皮
為細末淡醋調塗紺帛上貼頤上火炙手煩熨之同
病人亦不覺氣血虛無執著尤不宜多服此亦性寒
故治熱勞方中亦用

卷十六

烏喙末炎酒鹿全縣帛土胡飼生火炎毛敗提之同

又治飼開不合鼻塞不通太天南星大音始歌去又

圓味殊于大空心監水外十三圓

卷十

真金墨黃丹文白茶苓走肉各參達子烏末熟蜜

白靜冬面色相白華志無此黃山黃肉獐山藥各

小兒直指出黃圓治智卦夫音飼開不合軒不以自

稱體或太

產婦用童便

雞峯方凡母子纏獲分解不得問是男是女湏速與
產母童子小便一盞不得與酒卷一產後
又時飲童子小便一盞七日後方可少進醇酒并少
鹽味同上

本草衍義人溺須童男者產後溫一盞飲壓下敗血
惡物有飲過七日者過多恐久逐血藏寒令人發帶
病人亦不覺氣血虛無熱者尤不宜多服此亦性寒
故治熱勞方中亦用卷十六

麻人亦不覺。屎血盡無聲。若木不宜多服也。不對寒惡。財有燈蟲。十日者。蟲多惡入。或血凝寒。令人發帶。本草云。養人。解熱。童叟皆宜。燭蟲。一盞燭。不可照血。

鹽末同上

又。相。燭。童。千。小。町。一。盞。十。日。燭。衣。可。少。塗。鹽。未。心。

垂。母。童。千。小。町。一。盞。不。幹。與。酒。卷。一。垂。燭。

雞。峯。方。月。母。千。燭。燭。分。通。不。幹。問。吳。鬼。吳。丈。頭。東。與。

童。燭。用。童。町。

醫案咳嗽

雞峯方、咳嗽論曰、咳嗽之說、古書咳而無嗽、後人則兼言之、大抵皆從肺出、其聲響音亮、不因痰涎而發者、謂之嗽、如水之嗽蕩、謂能嗽其氣往來也、經稱五臟六腑、皆令人咳、原其至理、必由皮毛先受邪氣以合於肺也、卷十一

儒門事親、嗽與一證也、後人或以嗽為陽、欬為陰、亦無考據、且內經欬論一篇、純說嗽也、其中無欬字、由是言之、咳即嗽也、嗽即咳也、陰陽應象大論云、秋傷於濕、冬生咳嗽、又五藏生成篇云、欬嗽上氣、又診要

經終云、春生秋分環為欬嗽、又示從容篇云、欬嗽煩
冤者、腎氣之逆也、素問惟以四處連言欬嗽、其餘篇
中止言咳、不言嗽、乃知咳嗽一證也、或言嗽為別一
證、如傷寒書中說欬逆、即咽中作梯磴之聲者是也
此一說非、內經止以嗽為欬、生氣通天論云、秋傷於
濕、上逆而欬、與大象論文義同、而無嗽字、乃知欬即
嗽明矣、卷三 煙毒篇、卷六 其序卦來出、卷五 酸正病、卷六
湯液本草有述曰、嗽無延日、欬、卷中 卷半夏條、卷六
醫方考、咳嗽是有聲、嗽是有痰、有聲有痰名曰咳嗽、卷
丁香半夏丸方後 煙毒篇古書文而無嗽、卷六 入限
醫方集解、有聲無痰曰咳、益傷于肺氣、有痰無聲曰

嗽、益動于脾濕也、有聲有痰曰咳嗽、有因風、因火、因
痰、因濕、因食、因虛之異、卷上 補肺湯

釋名、欬刻也、氣奔至出入不平調、若刻物也、畢沅
校注、說文云、欬、甲 氣也、从欠亥聲、王篇、口載切、上
欬也、一切經音義、引蒼頡篇云、齊部謂欬為欬、又
引字林云、欬、癥也、周禮疾醫職、冬時有嗽上氣疾、
注云、嗽、欬也、上氣逆喘也、案嗽嗽字皆說文所無、
蓋本是欬字从欠東聲、廣韻音蘇奏切、訓上氣是
則玉篇之訓為得也、月令云、季夏行春令、則國多
風欬、案欬重讀之、其聲亦近刻、故此訓為刻、太平
御覽引、此下有嗽一條、乃飲食篇之欬、不當在此、

又嗽促也。用口急促也。畢沅校注說文。嗽、吭也。从欠束聲。此加口傍字俗漢書佞幸傳文帝嘗病癰。鄧通常為上嗽吭之顏師古。嗽音山角反。一切經音義太平御覽皆引作用力急促非餓飲候無

劉注。李林云。嗽疾少周醫未醫。劉子房雲。百藥知源。嗽。陳氏。咳嗽。又。齊音。秦代蒼鵠詩云。齊語。鍊。亦效。又。湯效。玉篇。大云。嗽。帝鍊也。从攴。聲。王論。口鍊。对。土。歸。鍊。各效。鍊。走。鼻。奔。至。出。人。不。平。曉。參。鍊。身。畢。元。飛。因。飄。因。食。因。東。少。異。卷。土。肺。飄。飄。

嗽益德能。肺嗽。走。飛。晉。康。延。白。交。嗽。音。因。風。因。寒。因。

半硫丸

和劑局方。半硫圓。除積冷。暖元臟。溫脾胃。進飲食。治心腹一切痃癖冷氣。及年高風秘。冷秘。或泄瀉等。並皆治之。

三硫黃明淨好者研令極細。半夏湯洗。次焙。令用柳木鉗子剝。同研。乾為細末。

右等分。以生薑自然汁同搘入乾蒸餅末攬和匀。入臼內。杵數佰下。圓如梧桐子大。每服拾伍圓。至

貳拾圓。空心溫酒。或生薑湯下。婦人醋湯下。卷六

雞峯方。若心下悶亂。嘔吐不止。夜卧不安。手足躁擾。水穀不下。此由冷熱失和。邪正相干。清濁不分。陰陽錯亂。喜冷者。因熱。惡冷者。因寒。名曰霍亂。寒者其脉。

弦大宜理中湯半硫丸熱者其脉疾數宜小藿香散
不正者宜服青金散大吐衄並脉手腎陽水火金水
半硫元下痰門庭即懷舊齊相不妄空氣而謂之
薑粉人靜氣丁新江

半夏參 硫黃
兩 研細右為細末生薑麵糊和元梧桐子大每服三十丸
飲下不以時卷十八同煮人頭蒸熟末嚙味
三因亥半硫丸治年高風祕冷祕心腹一切痃癖冷
氣暖元臟止泄鴻進飲食

硫黃研細半夏湯洗七次研乾爲末
水合水蒸熟姜並右等分以生姜汁同熬炊餅末攪勻杵數百下丸
如梧子大空心溫酒姜湯下三十九卷十二

證治要訣若痞塞脹諸藥不効大便不甚通者宜感應丸加巴豆或半硫丸備急丸木香檳榔丸通之卷三
諸氣又半硫丸和七氣卷四
半夏湯泡硫黃明淨者研極細用柳木槌敲過

右以生姜自然汁同熬入乾蒸餅攪勻入白肉杵數百下丸如梧桐子大每服十五丸至二十九酒或姜湯下婦人醋湯下有姓勿服卷四類方
又痰涎壅盛而痛者宜小半夏茯苓湯加枳實一錢間進半硫丸卷五胸痛
又肝膽經停痰伏飲或一邊脇痛宜用嚴氏導痰湯

痰結成癖間進半硫丸

卷五

又嘔吐諸藥不効當借鎮重之藥以墜其逆氣宜姜蘇湯下靈砂丹須百粒作一服俟藥得効却以養生

丹半硫圓導之

卷六

又頑延隨氣逆上不為藥解當自下部利之宜五膈寬中散加半錢吞破飲圓仍佐以半硫圓恐大便復祕飲利不盡半硫圓當常服

同上

又痰飲量取及成飲厥者宜別加木杏二生湯吞青州白圓子和靈砂丹名青令丹或吞養生丹半硫圓

同上

五豆皮生麻黃各半錢

葛根白芍各三錢

甘草一錢

水煎服

同上

又胸膈痞甚而翻宜谷神嘉禾散生附二錢或丁沈

透膈湯五膈寬中散加生附一錢仍以來復丹升降其陰陽通其隧道半硫圓亦可通之隧道久不通名結腸翻胃半硫圓尤宜

同上

又大便祕有風祕冷祕氣祕熱祕又有老人津液乾燥是名虛證云云冷祕由冷氣橫於腸胃凝陰固結津液不通胃道祕塞其人腸內氣攻喜熱惡寒宜藿香正氣散加官桂枳殼各半錢吞半硫圓熱藥多秘惟硫黃燒而通冷藥多泄惟黃連肥腸而止泄八又氣祕坐氣不升降穀氣不行其人多噫宜蘇子降氣湯加枳殼吞養生丹或半硫圓來復丹

同上

廢結成癥門進之疏丸 卷五

麻黃桂枝湯 吞服分五升 治風寒來取其風寒
又麻黃桂枝湯不取其風寒而取其大衛
并兼苦酒散而治之 故名此方也 論曰
香薷散治風寒諸疾各半症者半治寒半治
寒者不前胃實故宜其人以麻黃桂枝湯宣散
散風寒者也 云令殊由今麻黃桂枝湯固
又大劑桂枝湯除寒解熱亦可步人寒藥
許氏曰 胎中所服圓示下血之過者又不虛多
其食也 面其如童半亦圓示下血之過者又不虛多
矣謂此法確乎 但恐其人之體太虛從之來終無益

產後鬱冒 血厥 產後頭痛 血還

血厥 血暈

金匱要略問曰 新產婦人有三病 一者病症 二者病
鬱冒 三者大便難 何謂也 师曰 新產血虛多汗出喜
中風 故令病症 亡血復汗多 故令鬱冒 亡津液冒
燥 故大便難 產後鬱冒其脉微弱 因不能食 大便反
堅 但頭汗出 所以然者 血虛而厥厥而冒冒家欲
解 必大汗出 以血虛汗厥於陽上出 故頭汗出 所以
產婦喜汗出者 在陰血虛陽氣獨盛 故當汗出陰陽
乃復大便堅 痘不能食 心聚胡湯主之 卷下

傷寒明理論 卷下 治法而氣不舒也 冒為脣冒而

閑而產後鬱冒 血厥 產後 閑 血運
區 血厥 血量

金匱要略 問曰 新產婦人有三病 一者病痓 二者病
鬱冒 三者大便難 何謂也 師曰 新產血虛 多汗出 喜
中風 故令病痓 亡血復汗 寒多 故令鬱冒 亡津液 胃
燥 故大便難 產婦鬱冒 其脉微弱 嘘不能食 大便反
堅 但頭汗出 所以然者 血虛而厥厥而必冒 冒家欲
解 必大汗出 以血虛下厥 孤陽上出 故頭汗出 所以
產婦喜汗出者 亡陰血虛 陽氣獨盛 故當汗出 陰陽
乃復大便堅 暢不能食 小柴胡湯主之 卷下

傷寒明理論 鬱為鬱結而氣不舒也 冒為昏冒而

神不明也、世謂之昏迷者是也。

金匱直解、產後血暈者為鬱冒、又名血厥。

按鬱冒、原非產後之稱、蓋諸病皆有之。傷寒論太陽中篇、表裏俱虛、其人因致冒、冒家汗出自愈、亦同義也。又平脉法、諸乘寒、則為厥鬱冒不仁、成無同注、鬱冒為昏冒不知人也。不指貪大更爻

病源候論、產後血運悶候、運悶之狀、心煩氣欲絕是也、亦有去血過多、亦有下血極少、皆令運。若產去血過多、血虛氣極、如此而運悶者、但煩悶而已。若下血過少而氣逆者、則血墮氣上掩於心、亦令運悶、則煩悶而心滿急、二者為異、亦當候其產婦血下多少、則

知其產後應運與不運也、然煩悶不止、則斃人。

卷四十三

劉君廉夫曰、巢氏所論如此、知產後血暈、自有兩端、其去血過多而暈者、屬氣脫、其證、眼閉口開、手撒手冷、六脉微細或浮是也、下血極少而暈者、屬血逆、其證、胸腹脹痛氣粗、兩手握拳牙關緊閉是也、此二者、證治霄壤、服藥一差、生死立判、不可審辨焉、本條所論、別是一證、活人書妊娠傷寒門載此條於三物黃芩湯之後、則知是專治婦人草蓐傷風、嘔而不能食者、若以小柴胡湯為產後鬱冒之苗的方、則誤人殆多矣。

金匱輯義卷五

雞峯方論曰、婦人新產去血過多、津液燥少、陰陽俱

虛大凡有疾、如中風傷寒時氣之類、雖當發汗之麻黃慎無用之、取汗無令過多、以意酌量、又產後諸疾、忌脉大、若產後昏迷、由本來氣弱、因去血過多、氣無所主、精神不足、陰陽雜亂、謂之血運、急以炭火投醋中薰鼻及以半夏末少許吹鼻中、即省、卷十六○按末原見于金卷二、自鑒附錄卷一姜生氏立辨穿辟本事方人平居無苦疾、忽如死人身不動搖、默々不知人目閉不能開、口噤不能言、或微知人惡聞人聲、但如眩冒移時方寤、此由已汗過多、血少氣併於血、陽獨上而不下、氣壅塞而不行、故身如死、氣過血還、陰陽復通、故移時方寤、名曰鬱冒、亦名血厥、婦人多

有之宜白薇湯倉公散

卷七〇按此與產後鬱冒不同、但以婦人多有之文、附於

茲血厥證、見脈經卷九、亦與產後證異、宜參攷

蹠西學入門、鬱乃氣不舒、冒乃神不清俗謂之昏迷也。○按此原于明理論、經曰、諸虛乘寒、則為厥、鬱冒不仁子平脈法、一言經氣乘虛中人、如物蒙四草其首、恍惚不省人事、比之眩暉更重、卷一水六升者、取二升分

產大丸有疾知中風傷寒時氣之類雖當發汗之麻黃慎無用之東汗無令過多以意酌量又產後諸疾忌脉大若產後昏迷由本來氣弱因去血過多氣無所主精神不足陰陽雜亂謂之血運急以炭火投醋中薰鼻及以半夏末少許吹鼻中即省君十六世扶用醋及半夏

言歸原中。故多蒙古草其苗矣。
來也。問望歸也。故也。故曰。歸矣。來矣。限矣。
越西華入門。攀垣衣冠也。已發也。眉發也。嘶不威。答辭也。身也。
陽頰血氣之大也。見祖靈。攀柳杆。數數口死氣。過血還。
首也。宜食葛。食空者。同耳。故人發育之文。竹也。
九月改盆。發冒不

立臻治腸癰湯

各二鰱水二鰱魚各貪魚并空

集驗 治腸癰湯方、薏苡人一升、牡丹皮三兩、桃仁二兩、大黃一升、生甘草一升、白芍藥一升、大棗二十枚、水煎服。

國朝四方卷十五

金方治腸癰湯方薏苡仁一升牡丹皮桃仁各三
兩糸辨人二升右四味㕮咀以水六升煮取二升分

再服注姚氏不用桃人用李人崔氏有芒消二兩云腹中疼痛煩毒不安或脹滿不思飲食小便澀此病多是腸癰人多不識婦人產後虛熱者多成斯病縱非癰疽疑是便服此藥無他良也

華峯天子千馬當雲發朝霞以掩陳軒簪首又咬

聖濟總錄治腸癰、薏苡人湯方、薏苡人壹兩、牡丹皮、桃核、湯浸去皮大錐久人炒各壹兩半、瓜子人半兩右

四味鹿擣篩、每服五錢、水一盞半、煎至七分、去滓、空心日晚溫服。卷百廿九 鳴天普惠丸入壹兩丹丸
雞峯方、瓜子湯、治產後腸頭、如以針刺連穀道、又如
痔痛、小便如淋狀、或時寒熱、此產時用力併腸間亦
由陰虛陽邪客乘、蓋毒氣攻衝、謂之腸癰。注：腋定盆子當用冬瓜子，去殼用薏苡仁肆兩、桃仁、牡丹皮各壹分、瓜子
壹兩、右為細末、每服五錢、水二盞、煎至一盞、去滓、溫服、非時。

卷十六
外科正宗瓜蔞子湯、治產後惡露不盡、或經後瘀血
停滯、腸胃作痛、縱非癰、服之亦效。薏苡仁四錢、桃
仁、牡丹皮、瓜蔞仁各二錢、水二鍾、煎八分、食前併空

心服、卷三

又薏苡仁湯、治腸癰、腹中疼痛、或脹滿不食、小便澁
滯、婦人產後多有此病、縱非癰、服之尤效。薏苡仁、瓜
蔞仁各三錢、牡丹皮、桃仁去皮尖、各二錢、白芍一錢、
水二鍾、煎八分、空心服。同上

中藥正傳去滓、煎服、臨日服、而漸張大病、端平大集
每至秋冬、較劇、不可坐卧、百方不差、後得臨平僧法
本方服之、遂差。法本久病、喘三十年、服此藥、年無
絕根本、永不復發。凡服此藥、須久方効。治脚氣流注、
頭昏重、筋瘤、手足冷腫、熱痛拘急、及脾腫、目赤、
或生黑花、卷五 知不足本、乃效丁、治

四味猿壽竹節。每服五錢。水一盞半。煎至七分。去滓。空心日晚溫服。卷百十九

空心日晚溫服、卷一百十九

九寶散

分心氣飲之音以
也

本草綱目

蘇沈良方治積年肺氣丸寶散大腹并皮肉桂甘草
炙乾紫蘇杏仁去皮尖桑根白皮各一兩麻黃去根
陳皮炒乾薄荷各三兩右搗為篋末每服十錢七用
水一大盞童便半盞烏梅二箇薑錢五片同煎至一
中盞瀝去滓食後臨卧服兩浙張天夫病喘二十年
每至秋冬輒劇不可坐卧多方不差後得臨平僧法
本方服之遂差法本允病喘三十年服此藥半年乃
絕根本永不復發凡服此藥須久乃效治脚氣流注
頭昏重肢節痛手足冷重熱痛拘攣浮腫麻痺目赤
或生黑花

局方華蓋散即
麻黃散而無紫
蘇苔蘚生姜
有蘇子

雞峯方、九寶散治喘嗽文與良方頗同。卷十七 八八
聖惠方治久上氣喘急坐臥不得、麻黃散玄麻黃
一兩、去根節杏仁一兩、湯浸去皮尖双人麸炒微
研陳橘皮一兩、桑根白皮一兩剉紫蘇莖葉一兩
中令紫色右件藥搗篩為散每服五錢以水二盞入
水生薑生分煎至五分去滓不計時候溫服。卷四
東坡炒彈丸各三兩甘草大黃末每服十錢少用
火焯梨橘杏子去皮大桑貯白芍各一兩和黃芩
葛根身大字散玉祖犀大寶蜡大朝丹哎肉桂甘草
大寶蜡

眩運之別

雞峯方但運而不眩發則伏地昏昏食頃乃蘇此由
榮衛錯行氣血溷亂陽氣逆行上下相隔氣復通則
蘇脉虛大而澁謂之氣運宜流氣飲子草烏頭湯。卷
八

石門前玉壹大盞以新水流取冷一服而盡汗出
自之出只在鼻孔大上消如水是其應甚好

衛生家實用生薑三片名人參草命散

百一靈方破證養金丹治傷寒陰陽二證不明或投
藥錯誤致卒人亡者死後皆可服傳者云
午不失一好夕參一兩去皮橘核水一大升銀石器
置頭至一盞以熱水大之取空一服而盡汗不自己

局方華蓋散即
麻黃散而無紫
蘇芩芩生姜
有蘇子。

雞客方九寶散治喘嗽文與良方頗同
聖惠方治久上氣喘急坐臥不得麻黃散夜麻黃
一兩去根節杏仁一兩湯浸去皮尖双人麸炒微
黃赤枝桑根白皮二兩剉紫蘇葉一兩隔紙炒
陳橘皮一兩湯浸去白瓤焙甜葶苈一兩隔紙炒
令紫色右件藥搗篩為散每服五錢以水二盞入
水性薑半分煎至五分去滓不計時候溫服
大頭風大而並諸之癰腫宜煮麻煩千草烏頭髮
榮膏龍骨角血國土制酒並甘草不貼附麻煩頭
篤瘡大頭風而不想發限大頭瘡者食之可止由

四庫全書
御醫之院

破證

采石奪命丹

外集卷三

歸正妍出

條安參看周

記始

宋余絅選奇方後集破證奪命丹治傷寒陰陽錯證
不明或投藥錯誤致患人困重垂死七日已後皆可
服手不失二好人參壹兩去蘆薄切水壹大升於銀
石器內煎至壹太盞以新水沈取冷一服而盡汗不
自它出只在鼻梁头上消如水是其應也甚妙
醫衛生家寶用生薑三片名人參奪命散
一百一選方破證奪命丹治傷寒陰陽二證不明或投
藥錯誤致患人困重垂死七日以後皆可服傳者云
今不失一好人參一兩去蘆薄切水一大升銀石器
內煎至一盞以新水沈之取冷一服而盡汗不自它

出只在鼻梁尖上涓涓如水是其應也妙甚蘇軾先
云侍郎方丈嘗以救數十人余嘗宰清流日猝車中
居行父之子婦產後病時疫二十餘日已成壞證偶
見聞因勸其一味只服人參遂安是時未知有此方
偶然暗合耳卷土黃三半各入參草命增

續醫說世謂傷寒汗吐下三法差謬名曰壞證昔張
致和用獨參湯救治一人垂死手足俱冷氣息將絕
口張不能言致和以人參一兩去蘆加附子一錢於
石洮內煎至一碗以新汲水浸之若冰冷一服而盡
少頃病人汗從鼻梁尖上涓涓如水此其驗也蓋鼻
梁上應脾若鼻端有汗者可救以生在身中周遍故

如登

成無己曰宜通而塞故痛傷寒論太陽下篇病治注
也近陸同婦產後患疫證二十餘日氣虛脉弱卽同
壞證亦以此湯治之遂愈孫真人云人參湯須得長
流水煎服若用井水則不驗蓋長流水取其性之通
達耳卷六

萬病回春大集命獨參湯治傷寒汗後終日昏悶不
省人事發熱發渴似有狂言一切危急之症宜此服
後額上鼻尖有微汗是其應也棟參去蘆一兩右
剉作一劑水煎不拘時服渣再煎服卷二指掌標本
又一老嫗年七十患傷寒初起頭疼身痛發熱增
寒諸醫以藥發散數劑弗効淹延旬日漸而飲食
不下昏沈不省只能言眼不能閉咽喉有微氣似欲

絕之意、諸醫潛退、一家彷徨、召余診、六部虛微、若無此真氣、將備乃攻撃手之大過也、以人參五錢煎湯徐灌之、須臾稍省、欲飲水、又煎渣服之頓愈、又逾十年而卒、夫人參回元氣於無何有之鄉、果有起死回生之效、信哉不誣、同上

醫學子入門、單人參湯治元氣素虛傷寒汗下後氣短氣短氣喘、自反脉微、精神困怠、人參五錢甚者

一兩水一盞半煎至半盞服之喘定者生、不定者死

孫少卿神農用桔梗水煎不鍛蓋承氣水煎其效更速
繫醫而久此歌言之通命之無真入迷心參長葛葛根
典古類同歌言幾患委鑿三散翁且疾重用銀鳴同

成無己曰、宜通而塞、故痛、傷寒論太陽下篇結晶注

宜通而塞則為痛

醫說、舒王解痛字云、宜通而塞則為痛、此極有理、凡痛須通利臟腑、乃能隨其冷熱、而須用巴豆大黃牽牛、此最要法、卷五腹痛有數種條引醫餘

證治要訣、荆公解痛字義云、宜通而塞則為痛、諸篇

門

續醫說、荊公解痛字云、宜通而塞則為痛、今醫入凡痛須用通利臟腑、故曰、諸痛為實、痛隨利減、世俗以利為下也、假令痛在表者實也、痛在裏者實也、痛在血氣者亦實也、故在表者汗之則愈、在裏者下之則愈、在血氣者、散之行之則愈、豈可以利為下乎、宜

作通字訓則可故經曰通則不痛、則不通此之謂也。卷三通則不痛條 經文未攷

類經愚按後世之法有曰痛無補法者有曰通則不痛痛則不通者有曰痛隨利減者人相傳誦皆以此為不易之法凡是痛證無不執而用之不知痛而閉者固可通之如本節云熱結小腸閉而不通之類是也痛而泄者不可通也如上節云寒客小腸後泄腹痛之類是也觀王荊公解痛利二字曰治法云諸痛為實痛隨利減世俗以利為下也假令痛在表者實也痛在裏者下之則愈在血氣者散之行之則愈豈可以利為下乎宜作通字訓則可此說甚善已得

庚辰九月宣風而塞姑蘇新刻太醫王叔和著

醫學管錐卷十四目錄

奇疾類

夏子益奇疾方 李樓怪證方

產後肉線

離魂病

人面瘡

冷服

水結腫

下不厭晚

感冒譯語

戴元禮飲食入肝說

酒客病

水腫五不治

養正丹

黑錫丹

白及治吐血

眉稜骨痛

泡藥附擇

病字可故經曰通則不痛不則不通此之謂
也藥細服不病俗以水火為病者
病養五日固者有曰福隨而見也人相傳諸皆以此
為飲食法凡是病證無水藥五不宗知病而閉
者感冒等如本節云熟食之醫為食人取病是
也未詳耳不可通也如上不取病之小腸後泄腹
痛今而養也觀王荊公解方名則字曰治法云諸病
為毒發肉膾成世俗以利潤藥服令扁在表者實
也病矣爾頭口益者乘之益氣致溼令其則愈豈
醫學言難卷十四月經字訓則可此說甚善已得

奇疾類

夏子益奇疾方、凡人自覺本形作兩人並行並臥不
辨真假者離魂病也用辰砂人參茯苓濃煎日飲真
者氣來假者化也本草細目卷九丹砂驗明列人
附方引文有異同驗于後

又髮癥飲油有飲油五升以來方快者不爾則病此
是髮入于胃氣血聚之化為蟲也雄黃半兩為末水
調服蟲自出同上雄黃附方引

又筋肉化蟲有蟲如蠶走于皮下作聲如小兒啼為
筋肉之化雄黃雷丸各一兩為末摻猪肉上炙熱喫
盡自安同上

又熱毒怪病目赤鼻張大喘渙身出斑毛髮如鐵乃

因中熱毒氣結于下焦、用滑石白礬各一兩為末、作

一服水三盞、煎減半、不住飲之。同滑石附方引

又或出怪病、臨卧渾身、或出、約至五升、隨至血肉俱

壞、每宿斬多、痛痒不可言狀、惟喫水卧牀、晝夜號哭、

舌尖出血不止、身齒俱黑、唇動鼻開、但飲鹽醋湯十

數日即安。同卷十一食鹽附方引

又灸瘡飛蝶、因火灸火、瘡癥退落、瘡內鮮肉片子飛

如蝶狀、騰空飛去、痛不可言、是血肉俱熱、怪病也、用朴消大黃各半兩為末、水調下、微利即愈。同上朴消附方引

又鼻中毛出、晝夜可長一二尺、漸粗圓如繩、痛不可忍、摘去復生、此因食猪羊血過多致、用生乳香硇

砂各一兩為末、飯丸梧子大、每空心臨卧、各服十九、

水下、自然退落。同硇砂附方引

又發斑怪證、有人眼赤鼻張、大喘渾身出斑、毛髮如銅鐵、乃熱毒氣結于下焦也、白礬滑石各一兩為末、作一服水三盞、煎減半、不住服、盡即安。同礬石附方引

又離魂異疾、有人臥則魂歸于肝、此由肝虛邪襲、魂不歸舍、病

名曰離魂、用參龍齒赤茯苓各一錢水一盞、煎半盞、調飛過朱砂末一錢、睡時服一夜一服、三夜後真

者氣爽、假者即化矣。同卷十二上子益奇疾方者不一茲特題夏接李時珍別夏丹溢怪證奇疾方又此所引與

冊溢怪證奇疾方又此所引與

又臍蟲怪病、腹中如鐵石、臍中水出、旋變作虫、行逸身、痒難忍、撥掃不盡、用蒼朮煎湯浴之、仍以蒼朮末入麝麝香少許水調服。同卷十二下蒼朮附方引

羅峯方無攻得効方詳載之見後得効

時、大便血出痛、名曰肝脹、用羌活煎汁服數盞、自愈。同卷十三獨活附方引

又產後乳懸、婦人產後兩乳忽長、細小如腸、垂過小肚、痛不可忍、危亡須臾、名曰乳懸、將芎藭當歸各一斤、以半斤剉散、於瓦石器內、用水濃煎、不拘多少、頻服、仍以一斤半剉塊、於病人桌下燒烟、令將口鼻吸烟、用盡未愈、再作一料、仍以草麻子一粒、貼其頑心。

同卷十四芎藭附方引

又玉茎不痿、精滑無歇、時、如鍼刺、捏之則脆、此名腎漏、用破胡紙韭子各一兩為末、每用三錢水二盞、煎六分服、日三次、愈則止。同補骨脂附方引

又肉錐怪疾、有人手足忽長、倒生肉刺、如錐、痛不忍者、但食葵菜即愈。同卷十六葵附方引

又應聲蟲病、腹中有物作聲、隨人語言、名應聲蟲病、用板藍汁一盞、分五服效。同藍附方

又氣奔怪病、人忽遍身皮底混、如波浪聲、痒不忍抓之、血出不能解、謂之氣奔、以苦杖人參青鹽細辛各一兩、作一服、水煎細飲、盡便愈。同虎杖附方引

雞峯方吞作攻

卷八
回春卷
十六
得効方詳載十九
見後得効

又足針怪疾、兩足心腫、上生黑豆瘡、硬如針、脛骨生碎孔、髓流出、身發寒顫、惟思飲酒、此是肝腎冷熱相吞。○吞字疑用炮川烏頭末傳之內服韭子湯效
同卷上附子附方列 萬病回春卷八奇病門 文畧各同

湯日飲三盞、連服五日愈。同卷十九澤瀉附方列

截腸怪病、大腸頭出寸餘、痛苦、乾則自落、又出、名為坐浸之、飲大麻子汁數升、即愈也。同卷二十二麻仁附方列

又血雍怪病人、偏身忽然肉出、如錐、既痒且痛、不能

飲食名血壅、不速治必潰膿血、以赤皮皴燒灰、淋洗、飲豉湯數盞。同卷二十六附方列 萬病回春卷八奇病又人頭面上有光、他人手近之、如火熾者、此中蠱也、用蒜半兩杵汁、調酒飲即愈。同葫附方列 汁半兩和酒服之、當吐出如蛇狀。同蒜發明列

又眉毛動搖、目不能交睫、喚之不應、但能飲食用蒜三兩杵汁、調酒飲即愈。同葫附方列

又產後肉線一婦產後用力、垂出肉線長三四尺、觸之痛引心腹欲絕、一道人令買老薑連皮三斤、擣爛入麻油二斤拌勻、炒乾、先以熟絹五尺、折作方結、令人輕盛起肉線、使之屈曲作三圍、納入產戶、乃以

雞峯方卷八

雞峯方卷八

乃以絹袋盛薑，就近熏之。冷則更換，寒一日夜縮入大半二日盡入也。云此乃魏夫人祕傳怪病方也。但不可使線斷，則不可治之矣。同生薑附方引

雞峯方繫作數手

十五

又脉溢怪病，有人毛竅節次血出不止，皮脹如鼓，須臾目鼻口被氣脹合，此名脉溢。生薑自然汁和水各半盞服即安。同上

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

回春卷八

回春卷八

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

又寒熱怪病，寒熱不止數日，四肢堅如石，繫數手。俱鐘磬聲，日漸瘦惡，用茱萸木香等分煎湯飲之愈。同卷三十二吳茱萸附方引

又咽喉怪證，咽喉生瘡，層累如疊，不痛，日久有竅出臭氣，廢飲食，用臭橘葉煎湯連服必愈。同卷三十六枸橘附方引

萬病回春 卷八

二十九

三十

又血餘怪病，手十指節斷壞，惟有筋連無節肉，虫出如燈心，長數寸，遍身綠毛卷，名曰血餘，以伏苓胡黃連煎湯飲之愈。同卷三十七伏苓附方引

又肉壞怪病，凡口鼻出腥臭水，以椀盛之，狀如鐵色

蝦魚走躍，捉之節化為水，此肉壞也，但多食鷄饌即

愈。同卷四十八鷄附方引

又貓眼睛瘡，身面上瘡，似貓兒眼，有光采，無膿血，但

痛痒不常，飲食減少，名曰寒瘡，多喫鷄魚葱韭自愈。

同上

又血潰怪病，凡人目中白珠渾黑而物如常，毛髮堅直如鐵條，能飲食而不語，如醉，名曰血潰，以五靈脂

方兩回春卷八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

為末、湯服二錢、即愈。同卷四十八寒號蟲附方引
又肉人怪病人項生瘡、五色如櫻桃狀、破則自項分裂連皮剝脫至足、名曰肉人、常飲牛乳自消。同卷五十下牛

奇方引

李樓怪證奇方、灸瘡血出一人灸火至五壯、血出不止如尿、手冷欲絕、以酒炒黃芩二錢為末、酒服即止。本草綱目卷十三黃芩附方引

又大腸蟲出不斷、之復生、行坐不得、鶴虱末、水調半兩服、自愈。同卷十五鶴虱附方引怪疾奇方

又癰疽惡肉、丁香末傳之外、以膏藥護之。同卷三十四丁香附方引

奇方引

又痘爛生蛆、嫩柳葉鋪席上臥之、蛆盡出而愈也。同卷三十五下柳附方引
又疣痣黑子、巴豆一錢、石灰炒過入言一錢、糯米五分炒研、點之。同卷三十五下巴豆附方引
又喫飯直出、危子二十箇、微炒去皮、水煎服。同卷三十六危子附方引
又癰疽不斂、不拘發背一切瘡、用鼈甲燒存性、研摻甚妙。同卷四十五鼈甲附方引
雞峯普濟方、項上生瘡、如櫻桃大、有五色、如瘡破即項皮遂斷、上連髮、卷去下、至足脫之、乃為肉人矣、初見此瘡、治但逐日飲牛乳自消矣。卷廿六奇疾門下並同

又人發寒不止、經數日後、四肢堅如石、以物擊之似鐘磬之聲、日漸瘦惡、治以茱萸木香等分煎湯、飲五日可解愈。

又大腸頭出寸餘痛苦、直候乾自退落、又出名為截、腸病若腸盡乃不治矣、但初覺截寸餘、治用油壹盞、

以殿脣坐之、飲大麻子汁數升愈、又口鼻中腥臭水流、以椀盛之、有鐵色蝦魚梗米大走躍不住、以手捉之、即化為水、此肉壞矣、治用任饌食鷄肝餘可補、完獲安矣、

又鼻中毛出、一晝夜可長五尺、漸生鹿圓如細繩、痛不可忍、雖忍痛摘去一莖、即復更生、此由食猪羊血

遇多乃生、治用乳石硝砂各一兩為末、以飯元如梧桐子大、空心臨卧各一服、水下十粒、自然退落、又面上及遍身生瘡、似猫兒眼、有光彩、無膿血、但痛痒不常、飲身捷奇疾方減少久則透腔名曰寒光食、治多喫魚鷄芻韭、自愈矣、

又肠破腸出臭穢多、急以油摸腸、却送入前人參枸杞湯淋之、皮自合矣、喫羊腎粥、十日愈、

又口鼻氣出盤旋不散、凝如蓋黑色、過十日則漸漸垂下至肩背、與肉相連、堅勝金鑄、無由飲食、此多因瘡後得也、治煎澤瀉湯、日飲三盞、連服五日、自除耳、又婦人月信退出、皆為禽獸之狀、似來傷人、治先將

綿塞陰戶、只頓服沒藥一兩餘、作丸散皆可服、即時愈。

奇疾方廿六
萬病回春卷八

又遍身忽然肉出如錐、既痒且痛、不能飲食、此名血住。○奇疾方廿七若不速治、必潰而膿出、治以赤皮紫燒灰、淋洗、喫豉湯三五盞、自安矣。

奇疾方廿七
萬病回春卷八

又眉毛搖動、目不能視交睫、喚之不應、但能飲食、有經日不較者、治用蒜三兩取汁、酒調下、立愈。

奇疾方廿八
萬病回春卷八

又毛數非時一齊血出不止、皮張膨脹、如皺、須臾眼鼻口被氣脹合、此名脉溢、治飲生薑水二三盞、自安。又手十指節斷、惟有筋連無節、肉出如燈心、龐長數尺、遍身綠毛、脊多、名曰血餘、治以茯苓胡黃連煎。

奇疾方廿九
萬病回春卷八

回春卷八

奇疾方廿九

湯飲兩盞愈。

奇疾方廿九
萬病回春卷八元
肉字又无白本
奇疾方廿九

又遍身忽皮底混、如波浪之聲、痒不可忍、抓之肉血出、亦不能解、謂之氣奔、治以人參苦杖青鹽白朮細辛各一兩、都為末、作一服、水二椀、煎十數沸、去滓飲盡便安。

又眼白人渾黑、見物依舊、毛髮直如鐵條、雖能飲食不語、如大醉、名曰血潰、治用五靈脂二錢為末、酒調下、立愈。

奇疾方廿九
萬病回春卷八
奇疾方廿九

又因着久訖火瘡、便退落、瘡內鮮肉片子飛出如蝶狀、騰空去了、半足墮壞、痛不可忍、是名肉血俱熟、治用大黃朴消各半兩為末、水調下、微利即愈。

又每至臨卧、渾身_{風出}約及五升、隨手血肉俱壞、每宿漸多、疼痛不可忍、狀惟喫水、臥坐床上、晝夜號哭、舌尖血出不止、牙齒俱黑、辰旦動鼻開治、但飲鹽醋湯十數盞即愈。

奇疾方三
萬病回春卷八
萬病回春卷八
目中作胃中

又眼赤、鼻張大、喘、渾身生斑、毛髮起如銅鐵、蓋目中熱毒氣結於下焦、治用白礬滑石各一兩為末、都作一服水三枕、煎至半、放冷不候、飲盡乃安。

奇疾方四
萬病回春卷八
萬病回春卷八
萬病回春卷八

又有虫如蠟、走於皮下、作聲如小兒啼、為筋肉之化、治雷元雄黃各一兩為末、掺在一片豬肉、炙令香熟、喫盡自然安。

奇疾方五
萬病回春卷八
萬病回春卷八
萬病回春卷八

又手足甲忽然長、倒生刺肉如錐、痛不可忍、治只任

又咽喉間生肉層、相疊、五色漸變、腫起不痛、多由乃有竅子、臭氣自出、遂退飲食、治用石楠葉煎湯、喫五盞愈。

又腹脹如鐵石、膍中水出、變作步闌虫之狀、緣身咂啄、痒痛難忍、搔掃不盡、治用濃煎蒼朮湯浴之、別用麝薑杳以水調服立痊。

奇疾方十
萬病回春卷八
步闌虫作蟲行
萬病回春卷八

又眼前常見諸般禽蟲飛走、以手捉之則無有、乃肝膽經為疾、治用酸棗仁羌活玄明粉青箱子花各一兩為末、每服二錢、水一盞滿煎至七分、和滓飲、逐日喫三服愈。

又每至臨卧、渾身_{風出}約及五升、隨手血肉俱壞、每宿漸多、疼痛不可忍、狀惟喫水、臥坐床上、晝夜號哭、舌尖血出不止、牙齒俱黑、辰旦動鼻開治、但飲鹽醋湯十數盞即愈。

又大腸虫出長百十尺不絕斷之復生行坐不得治

服鶴虱末水調下五錢愈

奇疾方二

万病回春卷八

奇疾方十五

萬病回春卷八

又眼睛垂出至鼻如黑角色痛不可忍或時大便血出名曰肝張治用煎毛活汁服數盞自愈

又腹中有物作聲隨人言語不能自言治用板藍汁

氣來假者化矣、遂如舊。

又牙齒逐日微長、漸自除耳、出大便米酒水。

得効方

卷十佐疾門、載四十六方、放大抵奇疾方、雜文有小異同、當就原書而校之、不贅

一書所不載者、載全文、又

項上生瘡如櫻桃大云云、末分頭疽斷頭瘡藥、又寒熱不止經日後四肢堅如石云云、不可用、又大腸頭出十餘云云、末分頭疽斷頭瘡藥、又口鼻中腥臭水流云云、

又腹上麻痺不仁多者灸葱白喫之自愈、

又婦人小便中出大糞名交腸服五苓散效如未盡

愈可用舊幞頭燒灰酒服之

又兩足心凸如腫上面生黑色豆瘡云云

又凡腹脹經久忽瀉數升云云

又四肢節脫但有皮連不能舉動名曰筋解云云

又玉莖硬不痿云云

又咽喉間生肉層層相疊云云

又腹中如鐵石臍中水出云云

又眼前常見諸般禽蟲飛云云

又大腸虫出不斷之復生云云

又眼睛垂出至鼻云云

又腹中有物作聲隨人語言用板藍汁壹盞分五服

服之又名應聲蟲當服雷丸自愈

四十壹卷之五頭
食鹽水所治

又飲油伍升以來方始快意云云

又若卧於床四肢不能動只進得食好大言云：

又手十指節斷壞唯有筋連云云

又遍身忽皮底混如波浪聲云云

又眼白人渾黑見物依舊云云

又因著艾灸訖火痛便退落云云

又臨卧渾身虱出約至五升云云

又眼赤鼻張大喘渾身出斑毛髮云云

又有虫如蟹走於皮下云云

又手足甲忽然長倒生肉刺如錐云云

又人自覓自形作兩人並卧不別真假云云

又男子自幼喜飲酒、至成丁後、日飲一二斗不醉、片時無酒、呴呼不絕、全不進食、日就羸弱、令其父用手巾、縛住其手足、不令動搖、但扶少立、却取生辣酒壹壘、就於其子口邊打開、其酒氣衝入口中、病者必欲取飲、堅不可與之、須臾口中忽吐物一塊、直下壘中、即用紙封裹壘、用猛火燒滾、約酒乾一半、却開視之、其一塊如猪肝樣、納三兩重、週回有小孔如針眼、不可數計、弃之於江飲食復舊、雖滴酒不能飲矣、又夜間飲水誤吞水蛭、入腹、經停月餘日、必生下小蛭、能食人肝血、腹痛不可忍、面目黃瘦、全不進食、若

不早治能令人死、用田中乾泥一小塊、死魚三四箇、將猪脂溶攬勻、用巴豆十粒、去殼膜研爛、入泥內為圓崇豆大、用田中冷水、吞下一圓。○疑十圓小兒只用三圓至五圓、須臾大小水蛭、一時皆鴻出、却以正方四物湯加黃芪煎服、生血補理、

又婦人產後、忽兩乳伸長細小、如腸垂下、直過小肚、痛不可忍、危亡湏臾、名曰乳懸、將川芎當歸各貳斤、半斤剉散、於瓦石器內、用水濃煎、不拘時候、多少溫服、餘一斤半、剉作大塊、用杳爐慢火逐旋燒煙、安在病人面前卓子下、要煙氣直上不絕、令病人低頭伏卓子上、將口鼻及病乳、常吸煙氣、直候用此一料藥

盡看病證如何、或未全安、略縮減、再用一料如前法煎服、及煙燒熏吸必安、如用此二料已盡、雖兩乳略縮上而不復舊、用冷木磨草麻子一粒、於頭頂心上全片時即失去、則全安矣。

又婦人臨產、服催生藥、驚動太早、未嘗離經、而用力太過、以致肓膜有傷、產後水道中、垂出肉線一條、約三四尺長、牽引心腹、痛不可忍、以手微動之、則痛苦欲絕、先服失笑散數服、仍用老薑三片、淨洗、不去皮、於石鉢臼內研爛、用清油二斤、拌勻入鍋內炒熟、以油乾焦為度、先用熟絹一段、約五尺長、摺作結、放令穩重、婦人輕々盛起肉線、使之屈曲作一團、納在水

道口、却用絹袋兜裹油薑、稍溫、傅在肉線上熏、覺薑漸冷、又用尉火斗火、熱使之常有薑氣、如薑氣已過除去、又用新着、如此熏熨一日一夜、其肉線已縮入半、再用煎法、越兩日、其肉線盡入腹中、其病全安、却再服失笑散、另歸湯補理、切不可使肉線斷作兩截、則不可醫。

又有人患勞瘵兩年、諸藥不效、一日無肉味、其腹痛不可忍、又恐傳染、移在空房、候其自終、經停三日、病者腹痛氣息將絕、思憶肉味之急、忽有人惠雞子三枚、其病人俛仰取火、低頭取瓦銚煎熟、吹火屢燃屢滅、鼻中如有所碍、將熟間、忽噴噴一聲、有紅線一條、

自鼻中出、牽抽約二尺長、趁下瓦銚中、病人知是惟
物急用椀覆煎銚中、盡力燒火下住、其銚欲裂方住
火、開銚視之、乃是小虫一條、頭目皆具、已燶死如鐵
線樣、即以示其家人、後不之於江、其病即安、三日未
又居民避石室中、賊以煙火熏之欲死、遂悶而摸
索、得一束蘿蔔、嚼汁下咽而甦、又炭煙熏人、往之致
死、含蘿蔔一片、著口中、煙氣不能毒人、或預曝乾為
末、備用亦可、或新水櫻爛乾蘿蔔飲之亦可、安、再
又自行被擗、穿斷舌心、血出不止、以米醋用雞翎刷
所斷處、其血即止、仍用真蒲黃杏仁去皮尖、鵝沙少
許、研為細末、煉蜜調藥、稀稠得所、噙化而安、魚鹽曾

又身上及頭面肉上浮腫、如蛇狀者、用兩滴堵磚上
苔痕一錢化開、塗蛇頭立消、

夢溪筆談、世有奇疾者、呂縉叔以制誥知潁州、忽
得疾、但縮小、臨終僅如小兒、古人不曾有此疾、終
無人識、有松滋令姜愚、無他疾、忽不識字數年、方
稍、復舊、又有一人家妾、視直物皆曲、弓絃界尺
之類、視之皆如鉤、醫西僧奉貞、親見之、江南逆旅中、

自鼻中出牽抽約二尺長趁下瓦銚中病入知是慄
物急用碗覆煎銚水盡力燒火不候其銚欲裂方住
火開銚視之乃是小虫一條頭目皆具已燶死如鐵
線樣每示其家人後口之於江其病即安三日

又至蘇縣多苦於陰鬱而嘔吐者此南華卷中
索餘之處舊本今寒痰直參西醫及雜界取
死無人識宜辨此令姜連無形甚急不難此寒痰
末醫又辨此諸及諸條對少與古人不會首此辨
又要案姜連奇疾春日醫殊以歸諸發此既感
苔東一辨此辨開余空腹益薄黃杏仁去皮尖鵝沙少
許待去火更面因土爲丸改炮丸參用兩部皆輕土

產婦肉線

夏子益奇疾久產後肉線本草綱目卷十六生薑附

不具錄

世醫得效方肉線卷十文亦見上茲不具錄

名醫類案一婦產後水道中出肉線一條長三四尺
動之則痛欲絕先服失笑散數次以帶皮薑三片研
爛入清油二升煎油乾為度用絹兜起肉線屈曲于
水道邊以前薑裹之冷則敷之日夜縮其大半三
日即盡入再服失笑散另歸湯調理之如肉線斷則
不可治矣卷十

產婦肉線

夏子益奇疾方、產後肉線

本草綱目卷廿六、生薑附方引、文見前奇疾類茲

不具錄

世醫得効方肉線

卷十 文亦見上茲不具錄

名醫類案一婦產後水道中出肉線一條長三四尺

動之則痛欲絕先服失笑散數次以帶皮薑三片研

爛入清油二斤煎油乾為度用絹兜起肉線屈曲于

水道邊以前薑薰之冷則熨之日夜縮其大半二日即盡入再服失笑散芎歸湯調理之如肉線斷則

不可治矣

卷十一

百：漢陰曰文政壬午正月南鴨祠祝泉亭山城

產後肉線

妻妻、乍廿天產畢胞衣不下、醫者探之出一肉筋、長可
不一尺四五寸、彼以為脅帶挽之痛徹心腹、叫苦將
水不可忍、亦無也策而去、不日遂斃。此蓋得效方中
間產後肉線者也、其證恰合、但較短於彼耳、惜不用
其法治之。時還讀我書卷上、以帶又當三十天而
難波經未曰、一少婦從先師乞治、問其疾、羞怍
不言、屏人診視、有肉線橫癥陰戶、麻線取繫紮、歷
日乾枯自落、婦前是再嫁、皆被出。胎產新書 卷五

夏子益奇疾方、凡人覺本形作兩人、並行並臥、不辨
真假者、離魂病也。用辰砂、人參、茯苓、濃煎、日飲、真者
氣爽假者化也。本草綱目卷九丹砂發明引

垂頭肉線

離魂病
夏子益奇疾方、凡人覺本形作兩人、並行並臥、不辨
真假者、離魂病也。用辰砂、人參、茯苓、濃煎、日飲、真者
氣爽假者化也。本草綱目卷九丹砂發明引
又有人臥則覺身外有身、一樣無別、但不語、蓋人臥
則魂歸于肝、此由肝虛邪襲、魂不歸舍、病名曰離魂。
用人參、龍齒、赤茯苓各一錢、水一盞、煎半盞、調飛過
朱砂末一錢、睡時服、一夜一服、三夜後、真者氣爽假
者即化矣。同卷十二上人參附方引

雞峯方、人自覺身形作兩人、並卧不別真假、不語、問
亦無對、乃是離魂、治用辰砂、人參、茯苓、濃煎湯服之。

真者氣來假者化矣遂如雀卷廿六寧每卧則魂飛揚覺身在床而神魂離體驚悸多覩通夕無寐更數醫而不效予為診視詢之曰醫作何病治董曰衆以為心病予曰以脉言之肝經受邪非心病也肝經因虛邪氣襲之肝藏魂者也遊魂為變平人肝不受邪卧則魂歸于肝神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以卧則魂飛揚若離體也肝主怒故小怒則刺董生欣然曰前此未之聞雖未服藥已覺沈疴去體矣願求藥法予曰公且持此說與衆醫議所治之方而徐質之閱旬日復至云醫徧議古今方

書無與病相對者故予處此二方以贈服一月而病除此方大抵以真珠母為君龍齒佐之真珠母入肝經為第二龍齒與肝全類故也龍齒虎睛今人例以為鎮心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄蓋言類也東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎能專靜故魄正而有守予謂治魄不寧者宜以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不失亦在夫人達之而已按醫說卷五名醫類案卷六亦載此案文畧同因不載其

芳村恂益曰明劉王記已瘧編云國初內中嘗失金餅益謂執事內監爲之命斬于市臨刑追免之

益已得也。堅言入市時猶懼懼。既而覺身坐屋簷上。下臨市井。見反縛一人。將就刑。頃之間報至。乃下屋驅還耳。此亦遊魂也。本艸綱目人參附方引夏子益奇疾方。又辰砂發明引奇疾方。兩者其文不同。余未見其書。不可得而校焉。按搜神後記云。宋時有一人。忘其姓氏。與婦同寢。天曉婦起。後其夫尋亦出外。婦還見其夫猶在被中眠。須臾奴子自外來云。郎求鏡。婦以奴許。乃指床上以示奴。奴云。適從郎聞來。於是馳白其夫。夫大愕。便入與婦共視。被中人高枕安寢。正其形了無一異。慮是其神魂。不敢驚動。乃共以手徐撫床。遂再寐。

入席而滅。夫婦惋怖不已。少時夫忽得疾。性理乖錯。終身不愈。法苑珠林作於是終卒。此醫話般山醫話卷中

愈卷十六

本草方。左臂有瘻。人左睛上有瘻。如人面赤黑色。若商人戲酒。其面赤色。以物敷之。而能食。食多亦覺。時皮膚脹起。或不食之。則一臂瘦。有善醫者教其服藥。諸藥不拘。草木之類。悉試之無苦。至月余。其瘻乃聚。眉間口邊之數日。狀如火燎。愈外不知何疾也。因以

益已得也堅言入市時酒醉而頭痛身瘡者
上手臨市井見及續人將酒則墮之問其
刀下屋驅逐此亦送死也本門綱目人參附方
引夏字宣奇疾方又辰石發明引奇疾反酒論其
文不同余未見其病不可得而校正後復神後記
云穴壁有火光其火與婦同宿天曉婦起出
拔其夫尋亦由外歸還見其夫猶在被中服須臾
奴子自外來云郎始鏡視之始知其夫入於一格示
奴子曰向從吾丈入於一格示之入於一格示
詮外良不愈山中醫案林翁吳外客
人無而起夫尋丈不尋丈尋丈起野草
愈卷廿六

人事方人面瘡觀其醜貌既敗面瘡亦可見人面瘡
雞峯方遍身生瘡如橘子大有眉口自鼻眼因喫諸般
肉菓子乃為白人面疾治濃煎貝母湯一核只一服
愈卷廿六

人事方江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無他
苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食
食多亦覺膊內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫
者教其歷試諸藥不拘草木之類悉試之無苦至貝
母其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小
葷筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也卷廿六

○醫說卷七名醫類案卷九並引本事方文同全
楊用道附廣附方卷五唐人記其事云云文亦

類次
本傳方同未云謹按本經主金瘡此豈金瘡之

名醫類案有人患人面瘡多在股上其形似人面有口眼傳藥上卽食之與飲食亦然一日將貝母末傳卽密口不受遂拉之瘡口數次遂愈卷九無苦至貝又江左有商人云洞引本傳方文見前賈戰育善醫又荊州處士侯又元嘗出郊廁于荒塚上及下跌傷其肘創甚行數百步逢一老人問何所苦也又元具言且見其肘老人言偶有良藥可封之十日不開必愈如言及解視遂落又元兄弟五六人互病病必出血月餘兄兩臂忽病瘡六七處小者如榆錢大者如錢皆成全面同上引酉陽雜俎

又正德間神樂觀陸道士生人面瘡在足外臘瘡口似辰巳而有舌無齒能言且索食但開口時必大痛垂絕口閉復甦飲之以酒則四周皆紅啖以脂膏亦能消爍食畢則閉疼乃稍可但流膿血不止每日一度或二度其發無常極受苦楚貝母亦不能療如是者一年人問故答曰年十七時夜與本房老僕忿爭毆之死房後地曠而風烈吾師急取薪焚之天明無知者今經十年瘡自言僕也忽七日不衰以為將瘥矣有兄在牛首寺為僧因往訪之在寺幾半月忽復言痛絕尤甚曰我纔出數日汝卽避我使我尋之苦也雖然冤亦解矣汝明日下山遇一樵者可拜求治之

明日果遇樵者懇焉樵者厲聲怒曰業畜敢言我也去半夜療汝勿不見恍然回觀夜夢金甲神人胸掛赤心忠良四字謂曰藥在案上可煎湯服以左手持藥查出水西門外第二十家門首有婦人發水者卽棄于道而返覺起視案有物如亂髮而無端者江云是正指如亂髮者疑遂如戒果見婦人棄之歸瘡遂愈自後屢探本婦竟無他不知此何故也同上引見闡紀訓吳告五雜組江左商人左膊上有人面瘡亦無它苦戲滴酒口中其面亦赤以物飼之亦能食多則膊內肉脹起疑其胃也不食之則一臂瘠焉有醫者教以歷試草木金石之藥皆無苦惟至貝母則聚

眉閉口商人喜曰此藥必可治也以葷筒抉其口灌之遂結痂而愈此與藍之治噎蟲雷丸之治應聲蟲相類然本草於貝母但言其治煩熱邪氣癰癥喉痺安五臟利骨髓而已不言其有殺蟲之功也宣人面瘡亦邪熱所結耶又一書載人面瘡乃蛇蟲所化以報袁盎者則又生前宿冤非貝母所能療矣卷十一

難方主夏一升生薑八兩前胡四兩桔梗五兩甘草一兩黃芩人參各二兩杏仁去皮去核各三錢白朮五兩右十味㕮咀水九升煮取三分服晝夜各一服

明白累遇樵者惣惡樵者厲聲怒曰某貧敢言我也
去半夜療汝忽不見恍然曰觀夜多鬼甲神人响掛
藥查出水西門外第二扇房門首有婦人浸水者卽
孕癰瘍布衣破烂如乞丐有物如蘭草而無葉者如銀
髮毫端指外以辨衆盈簪頭反至前窗空乏見母子並
本生單人面瘡亦承瘧疾詣耶父一告達人面瘡乃
愈知其安在顧休骨體而曰不育其有殊蟲之害
齋處醉醺然本草茶具與其言其告與殊取所服
齋之藥一粒而愈此與人道是齋嘗謂人云古誠
齋閑中商全善目與華父莫逆也文章高妙其深

冷服 藥治通義卷二反治條空參看

反亦有微氣者，一脉清寒，則各安其分，而病可除。古謂收瘧歸正，返自昇。又疫客而自勝者，全以其人主不生客，宜曰溫其人也。食之無力，體虛多汗者，乃易加之，不可過也。

金匱要略、病人胸中似喘不喘、似嘔不嘔、似穢不噦、
徹心中憒；然無柰者、生薑半夏湯主之、生薑半夏

湯方半夏半升、生薑汁一升、右二味以水三升、煮半夏取二升、內生薑汁、煮取一升半。小冷分四服、日三、夜一服、止停後服。卷中

千金方半夏湯主。胃中客熱心下煩滿氣上大小便
難。方半夏一升、生薑八兩、前胡四兩、茯苓五兩、甘草
一兩、黃芩、人參各各二兩、杏仁枳實各三兩、白朮五
兩、右十味㕮咀以水九升煮取三升分三服。晉中大
熟者沈冷服之。
卷十六

王冰曰、夫大寒內結、稽聚疝瘕、以熱攻除、除寒格熱、反縱、反縱之則痛發尤甚、攻之則熱、口日日不得前、方以蜜煎烏頭、佐之以熱蜜、多其藥、服已便消、是則張公從此而以熱因寒用也。有大氣動、服冷已過熱、為寒格、而身冷、嘔、噦、嗌乾口苦、惡熱好寒、衆議所同、咸呼為熱、冷治則甚、其如之何、逆其好、則拒治、順其心、則加病、若寒、熱逆、冷熱必行、則熱物冷服、下嗌之後、冷體既消、熱性便發、由是病氣隨愈、嘔、噦皆除、情且不違、而致大益、醇酒冷飲、則其類矣、是則以熱因寒用也、素問至真要大論、熱因寒用注、醫門子言不載、證治要訣、吐利不止、元氣耗散、病熱危篤、或水粒不

○又或冷汗自出、手足逆冷、其人狂不止者、宜四逆湯、冷進、陰發狂亡陽證、多死。卷二

○又亦有病屬陰證、下利清穀、陽氣客於上焦、煩躁引食、舌胎如前、證或鼻

烟煤欲去衣被、不可誤以為陽、附子理中湯、四逆湯、冷服、同上

○又寒嘔、中脘停寒、飲食喜辛熱物、入口即吐出、宜三陳湯、加丁香十粒、或理中湯、加枳實、冷服、桂枝湯、或丁財湯、並須半錢、不效則溫中、湯甚則附子理中、湯或丁財湯、並須半錢、不效則溫中、則相入庶不吐出。

卷六

續醫說、封門仰同知璇、喜看方書、凡遇家人有病、輒自料理、其妙六月間、勞倦中暑、自用六和湯、香薷飲之類、反加虛火上升、面赤身熱、後邀劉宗序診視、六脉疾數、三部豁大而無力、劉曰、此病先因中氣不足、內傷瓜果生物、致內虛發熱、非六物香薷所能治療、況夏月伏陰在內、重寒相合、此為陰盛陽陽之證、急用補中益氣湯、加附子三錢、煨乾姜一錢、同前、置冰

中浸冷服之、其夜得熟寐至天明、微汗而愈。仰拜謝曰、伏陰之說已領教矣、但不解以藥水之何也。劉曰

此即內經熱因寒用、寒因熱用之義、何難之有。仰大

歎服

卷二

又世謂傷寒汗吐下三法差謬、名曰壞證。昔張致和用獨參湯、救治一人垂死、手足俱冷、氣息將絕。口張不能言、致和以人參一兩去蘆加附子一錢於石瓶內、煎至一椀、以新汲水浸之、若冰冷、一服而盡、少頃病人汗從鼻梁大上涓涓如水、此其驗也。蓋鼻梁上應脾、若鼻端有汗者可救、以土在身中、周遍故也。近

陸同婦、產後患疫證二十餘日、氣虛肺弱、卽同壞證

亦以此湯治之、遂愈。孫真人云、人參湯須得長流水煎服、若用井水則不驗、蓋長流水取其性之通達耳。

曰、卷六

卷中

醫方攷經曰、寒淫於內、治以甘熱、故用甘草薑附大熱之劑、申發陽氣、祛散陰寒、能溫經、煖肌、而回四逆、因以名湯焉。然必涼服者、經曰、治寒以熱、涼而行之、是也。否則戴陽者、反增上燥、耳目口鼻皆血者有矣。

藥之難用也有如此。

卷一

逆湯

十一

發門

本草綱目、凡用烏附藥、並宜冷服者、熱因寒用也。蓋陰寒在下、虛陽上浮、治之以寒、則陰氣益甚、而病增、治之以熱、則拒格而不納、熱藥冷飲、下咽之後、冷體

既消熱性便發、而病氣隨愈、不違其情、而致大益此
反治之妙也。昔張仲景治寒疝內結、用蜜煎烏頭近
效方、治喉痺用蜜炙附子、含之嚥汁、朱丹溪治疝氣、
用烏頭危子、並熱因寒用也。卷十七上附子發明

醫方集解曰、逆湯冷服、此足少陰藥也、寒淫於內、治
以甘熱、故以薑附大熱之劑、伸發陽氣、表散寒邪、甘
草亦補中散寒之品、又以綏薑附之上僭也、必冷服
者、寒盛于中、熱飲則格拒不納、經所謂熱因寒用、又
曰、治寒以熱、涼而行之是也。卷中

痘癰散用井水根不變甚、勿用冰水、其對面塗膏肓
亦可、愚學之、蓋愈新真火、云入參、麻黃、姜、蒜、蜜、

水結膏

活人書結胸三症、有大結胸、不核而偏胸、腫脹大者
附丸有小結胸、核之下者為小結胸、有水結在胸膈
間、亦名結胸、頭微汗出但結有無大熱、此水結在胸
膈、主之。卷十二

證治要訣、又有水結胸、無大熱、證微汗出、更小柴
胡、枳芍、芩、葛根、如寒多則用理中湯、如火實多錢、茯苓一
錢、枳實理中固、卷二

既消熱性便發而病氣隨愈不違其情而致大錯此
更治之妙也。昔張仲景治寒疝用桑煎烏頭丸
效方治寒疝用桑炙附子合之。張仲景丹參治疝氣
用烏頭丸子去熱因寒用也。卷十七上附子發明
醫方集解曰通湯冷服此反少於妄矣也。寒淫於內而
以其熱故以薑附大熱之劑但發散表散寒邪甘
草亦補中散寒之品又以緩薑附之上僭也。又知肺
者棄盛于中熱飲則格拒不納經所謂禁固寒用又
曰治寒以熱涼而行之是也。卷中

水結胷

活人書結胸有三種有大結胸不按堅硬而痛胸腫脅腹
胸丸有小結胸按之心下痛為小結胸有水結在胸腸
間亦名結胸頭微汗出但結胷無大熱此水結在胸
胸證小半夏加茯苓湯小柴胡去棗加牡蠣主之

卷十二

證治要訣又有水結胸無大熱證頭微汗出宜小半
夏茯苓湯如寒痞則用理中湯加枳實半錢茯苓一
錢或枳實理中圓。卷二多宜急下少陰下利而渴宜

急下厥陰舌苔白滑脉沉遲者主下如是等證當速用利下
之劑苟欲當下而不下則氣毒轉深遂致失下不可
救矣豈可一以下藥宜遲為說同上

卷之二

夏秋苓暴發寒毒限用野中愚水味實半麯苓一
盞當要矣又甘水滌胡大燒盞更燉干出宜小半

邱駢主之 卷之二

間亦名滌胡 頭髮小半夏味知冷熱小柴附去藜
頭大有小滌胡 滌胡頭髮小半夏味知冷熱小柴
古人舊譜頭有三種有大滌胡 不知而謂頭藥大滌
水滌首

下不厭晚

此事難知下無太晚非待久之晚乃當日已後為陰

之分也故曰下無太晚

下不厭晚是為善守

卷上 冷

證治要訣汗之下之者中間節目頗多汗藥宜早下
藥宜遲此亦大綱之論耳

卷之二

溫疫論仲景自大柴胡以下立三承氣多與少與自
有輕重之殊勿拘於下不厭遲之說

卷上 說語不待

證治要訣陽明汗出而多宜急下少陰下利而渴宜
急下厥陰舌卷囊縮宜急下如是等證當速用利下
之劑苟亥當下而不下則熱毒轉深遂致失下不可
救療豈可一以下藥宜遲為說

同上

下不厭晚

辨痘宣丁以丁藥宜風寒發同上

之癰當在當丁而不須燒毒轉惡者當大丁不丁
急丁無創口卷囊發宜丁不破火等當刺用陳丁
醫古要類陽門出而多宜急不火創不破而發宜
首頭重之疾勿計大丁不增氣分發卷上

溫疫論中景自大柴時以丁立三清冬與少與自
藥宜刺此亦大解之篇耳卷二

醫古要類平之丁之者中間確目破之不藥宜早丁
之分也姑曰丁無太頭丁不亂梁吳為善守卷上
此車難味丁無太頭非善人之頭也當日丁發發頭

丁不增氣

感冒譴語

證治要訣有虛人感冒發熱纔得一日熱不為久又
不為重便見譴語此乃虛不禁熱不可遽用十分冷

劑卷二

溫疫論類編時疫初起便作潮熱甚亦能譴語誤
認為裏證妄用承氣是為誅伐無辜不知伏邪附近
於胃邪未入府亦能潮熱半後熱甚亦能譴語不待
胃實而後能也卷下似表非表似裏非裏

溫疫論類編余子秉淪每感風寒必善作譴語若不
習知者遇此認為裡症妄施攻下寧有不殆者耶卷一

皆吸菸點火燭者野處安坐不寧者不吸者無卷
醫變篇頭論余之東金華風寒必善朴薦醫者不

胃實而發肺少卷不外來非毒也東非寒

冬冒冰未人取亦治暍此子發燒其本指醫者不詳
醫者要善用藥更善於無害不吸者來相應
醫變篇頭論却發肺少卷不外應此甚亦指醫者善

隋卷二

不為重則見醫者止禁燒不可處用十分令
醫者要知首重入息冒發肺發一日燒不為火又

息冒發者

戴元禮飲食入肝說

證治要訣有飲食不節傷食以致半身不遂狀如中
風不可作風治蓋人之飲食下咽而入肝由肝而入
脾由脾而入胃因食所傷肝食。一本不理故痰涎
雍塞若中風然亦有半身不遂者肝主筋故也治以
風藥則慎矣宜用消食之劑其中當木瓜散却不可

妄下之食毒物非時物多病此不傷脾不傷胃而傷
肝病不在下故不可妄下卷二

要訣校注飲食下咽直入于胃此云由肝入脾由

脾入胃必自有說○此注不詳何人疑余時雨誤

誤以備他

戴元禮飲食入肝說

誤以備他醫者要知首重入息冒發肺發一日燒不為火又

息冒發者

續醫說證治要訣傷食門有云人之飲食下咽而入肝由肝而入脾由脾而入胃云云余謂此論甚正但云食下咽而先入肝次入脾再次入胃之譖未免有疑按存中筆談云凡人之有咽有喉二者而已咽則納飲食喉則通氣咽則下入胃院次入風胃又次入腸又次入大小腸喉則下通五臟出入氣息五臟之氣呼吸正如治家之鼓鞴。鞴音敗韋囊所以吹火人之飲食藥餌但自咽入腸胃何嘗能至五臟凡風人之肌骨五臟腸胃雖各別其入腸之物英精之氣味皆能洞達但滓穢卽入大小腸矣凡所謂某物入肝某物入腎之類以氣味到彼爾物質豈能

至彼哉余因未諳前說而書此以證之或原禮別有一說也

卷三

吉田首王墩曰左氏莊三十三年神降于莘以其物享焉杜元凱注據月令甲乙日祭先脾主用蒼服上青案甲乙於時為春其色青故用蒼君王青服據素問及五行大義肝屬春其色青自當用肝而今却用脾與素問不同意脾肝附近而體用亦相同故可互通戴元禮證治要訣飲食入咽而先入肝亦此意近聞雜錄

續醫說證治要訣傷食門有云人之飲食下咽而

入肝由肝而入脾由脾而入胃云云余謂此論甚

食久則面赤目赤不加意並間雜欲入胃之誤

醉臘布酥同考古之厥兩邊云醉者安要矣

用酒而令寒風與熱固不同音醉者前立而

顛蹶寒熱之氣互參其身自當

主青色寒火之症無益春其身自當

甚重之珠玉之鑿日令甲子日癸未天朝王田會罪

吉田首領曰主分者三者主解醫于辛亥其病

氣味萬物參互但津液節入大小腸寒凡所謂某

妙處哉余因未詳前類而書此列錄

酒客病

宿酒發目眩頭痛

内外傷辨惑論夫酒者大熱有毒氣陽味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散汗出則愈矣此最妙法也其次莫如利小便二者乃上下分消其濕何酒病之有今之酒病者往往服酒癥丸太熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者是無形元氣受病反下有形陰血乖誤甚矣酒性大熱已傷元氣而復重瀉之況亦損腎水真陰及有形陰血俱為不足如此則陰血愈虛真水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是謂元氣消亡七神無依折人長命不然則虛損之病成矣金匱要略云酒疸下之久為黑疸慎不可犯此戒

不若令上下分消其濕葛花解醒湯主之葛花解醒

湯白豆蔻仁縮砂仁葛花已上各五錢

○醫學六要
葛花作葛根

乾生薑神麴炒黃澤瀆白朮已上各二錢橘皮去白、

猪苓去皮人參去蘆白茯苓已上各一錢五分木香

五分蓮花青皮去穰三分右為極細末秤和勻每服

三錢七白湯調下但得微汙酒病去矣此蓋不得已

而用之豈可恃賴日日飲酒此藥氣味辛辣偶因酒病服之則不損元氣何者敵酒病故也若頻服之損

人天年

東垣試効方

夫西醫大藥百毒產野未與期凡無

配容卷

證治要訣傷酒惡心嘔逆吐出宿酒昏冒眩暉頭痛如破宜冲和湯半夏茯苓湯或理中湯加乾葛七分或用末子理中湯和縮脾飲酒渴縮脾湯或煎葛根湯調五苓散久困於酒遂成酒積腹痛泄瀉或暴飲有灰酒亦能致然並宜酒煮黃連丸多飲結成酒癖腹中有塊隨氣上下冲和湯加蓬朮半錢酒停胸膈為痰飲者枳實半夏湯加神一本神下有麴字麥蘖各半錢冲和湯加半夏一錢茯苓七分

又多飲酒積入脾遂成酒黃詳見拾遺門疸證

明

又神麴麥蘖子去酒積

卷三

又多飲人結成酒癖腹肚積塊脹急疼痛或全身腫

滿肌黃少食宜十味大七氣湯用紅酒煎服

同上

又酒疸因飲酒過傷而黃俗名為酒黃宜乾葛煎湯或梔子仁煎湯調五苓散或生料五苓飲加乾葛一

錢

卷十

又有酒疸後變成腹脹漸至面足俱腫及偏身宜藿香脾飲加木香三錢或木香麥芽各半錢卷同上副又飲酒即睡酒毒薰肺脾土生肺金肺為脾之子子移病而尅於母故黃又肺主身之皮膚肺為酒毒薰蒸故外發於皮而黃此二說故通法當合脾肺而治宜藿朮飲同上○朮音朴朮朮蕷朮中具吹拂萬物

又飲酒過多及食熱物而効先用茅花湯効愈甚則

理中湯加乾葛川芎各半錢或止川芎不必乾葛或於理中湯去乾姜用乾葛或只依本方并芎不必加或止用乾姜甘草二味卷四

蓄肥黃少食宜甘味大七氣湯用紅花等同上
又酒過飲酒過傷而黃俗名為酒黃宜乾姜煎
或桔子煎湯調五苓散或生薑五苓飲加乾姜一
錢

又有酒痘後變成腹脹滿至面目頸腫及偏頭宜連
香附飲加木香三錢或木香來各藥名未錄卷同上
又飲酒即睡酒毒薰肺脾主生肺金肺為脾之子子
移病而克於母故黃又肺主身之皮膚肺為酒毒薰
痰止用薄荷甘草三味水煎去滓通去當令肺而治
火點中止用薄荷甘草葛根只取本太行葛根不似本
野中藥也薄荷甘草葛根同煎止即葛根不似本太行葛根

水腫五不治

葛氏方云、允腫有五不治、面腫倉黑、肝敗不治、掌腫
無理滿、心敗不治、脅滿腫反者、脾敗不治、腹滿無
文理、肺敗不治、陰腫不起、腎敗不治。醫心方卷一引
千全翼卷

十九文畧同因不錄

病源候論水病有五不可治、第一、脣黑傷肝第二、缺
盆平傷心第三、脊出傷脾第四、足下平滿傷腎第五、
背平傷肺凡此五傷必不可治卷廿一
方卷十一
千全翼卷

證治要訣、五心缺盆平、脣腫脣突者、不可治卷三

水腫候

水腫五不治

水鈞針

營官要處正以火盆平氣軸都突者不可當
背平葛補足此正氣又不下舌太醫十一十六金

益平刺之葉三齊出裏刺兼四足平蕭刺智刺五
指頭刺筋首正不可空葉二脣黑葛丹第二知

十五大器同因不難

文聖刺娘不宗刺軸不殊臂娘不宗刺腰小大刺一
無刺蕭刺娘不宗刺蕭刺又音刺娘不宗刺蕭無
葛刺云小刺百毒不宗面刺會雲中娘不宗刺

水鈞五不當

養生丹

和劑局方、養生丹、出寶林真人谷伯陽傷寒論中一名交泰丹

却邪輔正

助陽接真治元氣虛虧陰邪交蕩正氣乘常上盛下虛氣不升降呼吸不足頭旋氣短心神怯弱夢寐驚悸遍體盜汗腹痛腰疼或虛煩狂言口乾上喘翻胃吐食霍亂轉筋欬逆不定又治中風逆潮不省人事陽氣欲脫四肢厥冷如傷寒陰盛自汗唇青脈沈最宜服及治婦人產後血氣身熱月候不均帶下腹痛悉能治療常服濟心火強腎水進飲食

硫黃

研細

水銀 黑錫去滓加砂子

研細

朱砂

研細

各

右用黑蜜壹隻、火上鎔黑鉛成汁、次下水銀、以柳枝子攬勻、次下朱砂、攬令不見星子、放下少時、方入硫黃末、急攬成汁、和勻、如有焰、以醋洒之、俟冷、宜取出研如粉、極細、用糯米粉煮糊為圓、如豆大、期每服貳拾粒、加至參拾粒、鹽湯下此藥升降陰陽、既濟心腎、空心食前、蜜湯送下、神妙不可具述。

朴翁卷五

五更散
飄渺丸
金匱要略
耳言口彈土器
補遺卷一

丹青錄
法承津五
白期
各取
丹青錄
法承津五
白期
各取

證治要訣、諸中或未甦、亥巳甦、其人頑逆、愈盛、或前證不解、或增困重、宜星附湯、或三生飲、加全蝎

三箇、間磨沈香湯、下養生丹、卷一

丹青錄
法承津五
白期
各取

又霍亂之病云云、若膈於上、而不能下、轉服轉秘、須

用來復丹研末、湯調吞下、養生丹百粒、庶可引前藥

到下、同上

又曾記一老成人言、感冒服發汗藥得汙、證候盡除、只身熱未退、再用熟藥、而熱仍在、表裏都無別病、溫涼汗下、俱所不可者、宜進養正丹四五十粒、卷二

又脚氣喘急者、此係入腹、宜蘇子降氣湯、或沈香降氣湯、仍佐以養生丹、或四磨飲、卷三

又曾病衄愈後、血因舊路、一月或三四衄、又有洗面而衄、日以為常、此即水不通借路之意、並宜止衄散

茅花煎湯調下、或四物湯加石膏、阿膠、蒲黃各半錢、煎熟調火煅石膏末一匙、頭許、兼進養正丹、前諸

又陰癰氣、若癰
腹通上攻心、至成嘔
逆先用鹽酒、下養
正丹、次用生料五積
散加吳茱萸茴香
桃仁玄胡索各炒
半錢、卷三

證服不効大衄不止者、養正丹多服、仍佐以蘇子降氣湯使血隨氣下、卷四

又有因虛致衄此為下虛上盛不宜過用涼劑宜養正丹及紫霞丹仍佐以四物湯芎歸湯磨沈杏服

五真水用坐珠五粒

氣用鹽酒丁香

頭風工效之至效

又傷寒咽喉痛有陰陽二證乃間用鹽水吞養生

丹、同上

又嗽血而氣急者補肺湯加阿膠杏仁桑白皮各半錢、吞養正丹或靈砂丹或三砂丹間進百花膏同上

又怒氣傷肝及肺氣不順上衝於腦令人頭痛宜沈

杏降氣湯并蘇子降氣湯下養正丹或用芎附飲

卷五

又傷寒咽喉痛有陰陽二證乃間用鹽水吞養生

丹、同上

又諸嗽皆可佐以應夢觀音散同上人參而加喘者以此於食前吞養生丹、卷六

又風寒喘嗽宜九寶湯若乾喘不嗽不久遠近發宜蘇子降氣湯或神祕湯吞養生丹重則四磨飲或六磨飲吞靈砂丹或應夢觀音散吞養正丹尤宜姜又嘔吐諸藥不効當借鎮重之藥以墜其逆氣宜姜蘇湯下靈砂丹須百粒作一服俟藥得効却以養生

丹半硫圓導之同上

又痰飲暈眩及成飲厥者宜別加木香二生湯吞青州白圓子和靈砂丹名青令丹或吞養正丹半硫圓

同上

又大便祕有風祕冷祕氣祕執云或其人素有風病者亦多有祕宜小續命湯去附子倍芍藥入竹瀝兩塊殼許實者吞脾約麻仁圓虛者吞養正丹冷祕由冷氣橫於腸胃凝陰固結津液不通胃道祕寒其人腸內氣攻喜熱惡寒宜藿香散加官桂枳殼各半錢吞半硫圓熱藥多祕惟硫黃煖而通冷藥多泄惟黃連肥腸而止泄卷八

又氣祕剉氣不升降穀氣不行其人多噫宜蘇子降氣湯加枳殼吞養正丹或半硫圓來復丹未效佐以木香檳榔圓欲其速通則枳殼生用同上

又虛炎陰陽不升降下虛上盛氣促喘急宜蘇子降氣湯去前胡下黑錫丹或養正丹同上

又風熱赤甚者於黑神散消風散二藥中放令消風頸高以折二泔睡時冷調洗肝散或菊花散服仍進四物湯內地黃用生芍藥用赤只須半貼食後作一服却加入赤茯苓半錢醉將軍節酒蒸大黃是也早晨鹽湯下養正丹二枚三兩粒同上言韓文常飲亦又下虛上盛致口舌生瘡若用鎮隧之藥以降陽湯

湯宜鹽水下養正丹或黑錫丹

同上

黑錫丹

文詳

劉勸愚

卷之三

婦入良方患曾治一女人眼見鬼物言語失常循衣直視衆醫多用心藥治之無效僕投養正丹一貼以

乳香湯送下立愈

卷之三

婦人

狂

方論

風邪

一

又養正丹治虛風頭旋吐涎不已蓋此藥升降陰陽補接真氣非止頭旋而已

卷之四

婦人

藥中

父女風

冷秘

一

產婦去面頭子黑頭民女養生丹同君養生丹冷秘又重炎倒頭不長翼不重生津液外證急宜蘿子膏

木香蘇麻圓滑其衷風順味臻至用同上官桂松殼

參參..

黑錫丹

黑錫丹

丹陽慈濟大師

受神仙藥君方

治脾元久冷上實

下虛胸中痰飲或上攻頭目徹痛目瞪昏眩及奔豚

氣上衝胸腹連兩脇脹脹刺痛不可忍氣欲絕者及

陰陽氣上下不升降飲食不進面黃羸瘦肢體浮腫

五種水氣脚氣上攻及牙齦腫痛滿口生瘡齒欲落

者兼治脾寒心痛冷汗不止或卒暴中風痰潮上膈

言語艱澀神昏氣亂喉中痰響狀似癰緩曾用風藥

弔吐不出者宜用此藥百粒煎薑棗湯灌之壓下風

涎即時甦省風涎自利或觸冒寒邪霍亂吐瀉手足

逆冷唇口青黑及男子陽事痿怯腳膝酸軟行步乏

力

少腹脹滿、大便久滑、及婦人血海久冷、白帶自下、歲久無子、血氣攻注頭面四肢、並宜服之、兼療胸膈煩壅、痰飲虛喘、百藥不愈者、常服丸化飲食、養精神、生陽逐陰、消磨冷滯、除濕破癥、不動真氣、使五臟安寧、六腑調暢、百病不侵、不山衣卒暴中風、乘障土邪五金鈴子蒸法、胡蘆巴酒浸炒、木香不覲曲炒、荳蔻附子炮去皮肉、不七肉豆蔻炒熟研末、破故紙酒浸炒、沈香不覲曲、兩箇杏都炒、兩陽起石都炒、千硝鹽中乘燒、肉桂去皮不黑、錫法火半兩、黑錫淨秤、李根味硫黃各一錢、結砂、大柏子大柏子仁、元參元參、令土實。

右用黑錫或新鐵銑、內如常法、結黑錫、硫黃砂子。

昔地上出火毒、研令極細、餘藥並杵羅為細末、都壹處和勻入研、自朝至暮、以黑光色為度、酒糊為圓、如梧桐子大、陰乾入布袋內、擦令光瑩、每服參肆粒、參肆本作空心薑鹽四湯、或乘湯下、婦人艾醋湯下、卷五

證治要訣、傷食證氣虛上逆、遂成痞塞而疼者、六摩飲吞黑錫丹、卷三又干宣有二證、有風壅牙宣、有腎虛牙宣、云々甚者此屬督經下虛、上盛、宜鹽湯下、安腎丸、間黑錫丹、仍用薑鹽炒香附黑色為末、揩擦其妙不可言也、卷四又因虛頭痛、此為腎厥頭痛、宜用正元散、或大三五

七散入鹽煎服或於正元散入炒椒十五粒下來復

丹間進黑錫丹卷五

目錄
卷五
黑錫丹

又腎虛牙浮而痛甚則增寒壯熱全具如欲脫之狀宜安腎丸間進黑錫丹同上

又曾有人腰痛連脇進諸氣藥并自大便導者其痛殊甚後用辛熱補劑下黑錫丹方愈此乃虛冷作痛愈疎而愈虛耳同上

又常自汗出經年累月者多用黑錫丹久病及大病新愈汗出者亦可用此卷九

又有不時眩暈者有早起眩暈須臾自定日以為常者正元飲下黑錫丹同上

目錄
卷九
黑錫丹

又虛炎陰陽不升降下虛上盛氣促喘急宜蘇子降氣湯去前胡下黑錫丹或養生丹氣急甚而不能眠臥者沈附湯或正元飲或四柱散去木香用沈香並以鹽煎下黑錫丹或靈砂丹三妙丹同上

目錄
卷十
黑錫丹

又若赤眼久而不愈用諸眼藥皆無效早起則以蘇子降氣湯下黑錫丹臨睡則以消風散下三黃圓日中別以酒調黑神散此數藥不獨治久赤諸眼疾皆治之卷十

目錄
卷十一
黑錫丹

又腎經久虛耳中潮聲蟬聲無休止時妨害聽聞者當墜氣補腎正元飲喚黑錫丹間進安腎圓同上

目錄
卷十二
黑錫丹

又有不因傷冷而涕多涕或黃或白或時帶血如腦

髓狀此由腎虛所生不可過用涼劑宜補腦散仍以黑錫丹紫靈丹靈砂丹同上又下虛上盛致口舌生瘡若用鎮隧之藥以降陽湯宜鹽水下養正丹或黑錫丹仍於臨卧熱湯洗足炒探淨吳茱萸小撮拭足了便以炒熟致足心用片紫之男左女右同上又曾有舌上病瘡久燭成穴累服涼劑不效後來有教服黑錫丹遂得漸愈此亦下虛故上盛也同上寓意艸黃湛候素有失血病一晨起至書房既爆一口傾血二盆喉間氣湧神思飄蕩壯熱如蒸頸筋鹿頸勁診其脉尺中甚亂曰此昨晚大犯房勞自不用

命也因出驗血見血如太陽之紅其僕云此血如宰猪後半之血其來甚遠不識癡人有此確喻再至寢室謂曰少陰之脈繫舌本少陰者腎也今腎中之血洶湧而出舌本已硬無法可以救急因諦視良久曰只有一法不得已用丸藥一服墜安元氣若得氣轉丹田尚可緩圖因煎人參濃湯下黑錫丹三十粒喉間汨汨有聲漸下入腹項之舌柔能言云云卷二下文有用阿膠及補腎藥等文茲不具錄

體狀此則醫家所主不可通用涼劑宜補腦散仍以
黑物丹服之丹靈砂丹同上
又于虛上盛致口舌生瘡若用鎮逐之藥以降陽湯
宣
取不興火氣而增藥力錫丹仍於臨卧熱湯洗足炒
間時時有齧齒者令其頭項舌參紫蘇是本數三
畏因頭夜簽圖因頭人參紫蘇丁黑驗丹三十珠
又當有者不窮令用我藥一服知安寧產苦醫勞難
散髮而由舌本引發無去而又嫌食因嘉縣東父曰
宜歸白少卿之細榮者本少卿春裡出令腎定益
者安平之食其來其遠不遠無人有私蓄誰再空裏
令也因出銀血真金咬太極口發其難去血盆破穿

白及治吐血

故說白及根便根一大根切片水煎服之可止
吾七次犯死罪蓋久病虛弱不能自持是時止
至於吐血適得一白及用其根如初切煎服之想
持此以數尺白芨二錢水飲調服勿失其效
其根亦可切片煎服之亦可取白芨研末服之
止渴消食之謂其說為好外家多用之故得名
卒忽告咯血尋根後貨之處救之一日即止
曉得本草根用者少王下白及發芽別
曉得本草根用者少王下白及發芽別

白及治吐血

隨筆卷二十一
著豆良血難小不

醫說台州獄吏憫一大囚將死頗照顧之因感語之
吾七次犯死罪盡力抗諱苦遭訊考坐是肺皆傷損
至於嘔血適得一藥每用其效如神荷君庇佑之恩
持此以報只白芨一味末飲調爾其後凌遲僉者剖
其胷見肺間竅穴數十處皆白芨補填之色猶不變
也洪晝之聞其說為郢州長壽宰規之赴洋川任一
卒忽苦咯血勢絕危實之用此救之一日即止

卷四

本草綱目 卷十二下 白及發明引

本草綱目 卷十二下 白及發明引

本草綱目 卷十二下 白及發明引

本草綱目 卷十二下 白及發明引

證治要訣因飽屈身傷肺吐血者白芨枇杷丸或白
芨蓮須散

卷四咯血

按三方本書无文

白及治吐血

按三方本書無文

丹溪心法、白芨末調服治吐血、卷二 吐血一方

方後

本草綱目、摘玄云試血法、吐在水盃內、浮者肺血也、沈者肝血也、半浮半沈者心血也、各隨所見以羊肺、羊肝、羊心者熟、酢白及末、日日食之。及發明下白及
醫方集解卷中、獨聖散治多年咳嗽肺痿咯血紅痰、白芨為末、每服二錢、臨臥糯米湯下。卷中白及不變、
高烏枳園曰、久咳不止、唾血引紅線、或為點斑者、屬至肺損、雖外候似輕、最取為難、治余為一劑、即於桔梗湯
方中加白芨桑白皮名曰白芨湯。淺田栗園先哲醫話卷下

又曰、虛勞吐紅不一、有痰中引血續者、有痰中為栓

顆者、其大或如蚕豆、或如赤豆菉豆、見血雖小、不

可忽諸。同上

又曰、久咳唾血如紅縷、或為點斑者、此屬肺損、他病雖微、終至難治、早可與白芨湯。同上

服三錢、水一盞半、生薑十片、煎至八分、去滓溫服食

後卷八

方溪云去白芨末調服治吐血

卷二吐血一方

本草綱目摘玄云氣血法吐在水盃內冷者肺血也

沈者肝血也。羊浮生沈者心血也。各隨所見以羊肺

至肝羊心者熟薑白及末日日食之

卷二吐血一方

醫易方集解卷中獨聖散治多年咳嗽肺疾咯血紅痰

白芨爲末每服二錢臨臥薑水湯下

卷中

周易松園曰久咳不止唾血有紅線或爲點斑者屬

肺損雖外候似輕最難治余爲一方即於桔梗湯

加白芨半錢甘草一錢白芍數錢

又用大熟地黃血吸子諸藥共細研末蜜丸

一錢

同上或如蚕豆或如赤豆菉豆見血雖小不

眉棱骨痛

楊氏家藏方水玉湯治眉棱骨痛不可忍者此痰厥
也半夏不以多少湯洗七次切作片子右件㕮咀每
服三錢水一盞半生薑十片煎至八分去滓溫服食

後卷八

嚴氏濟生方玉液湯治七情傷感氣鬱生涎隨氣上
逆頭目眩暉心嘈忪悸眉棱骨痛大半夏洗淨湯泡
柒次切作片子右件每服肆錢水貳盞生薑十片煎
至柒分去滓入沈香水一呷溫服不拘時候

卷二

證治要訣肝經停飲一證發則眉棱骨痛眼不可開
晝靜夜處宜導痰飲或芎辛湯去茶牙或二陳湯吞

青州白丸子、併於痰飲門選藥、卷五

東懸吞

鹽舌頭姜用研膏一錢、大半夏、白芨骨頭不可開、
至次日去寒火、木香水一甲、服則不可。見卷二

紫艾叶、甘草、古朴、每服兩錢、水煎、益母草十五根、

蜜配白胡麻子、鹽水、水煎、大半夏、紫草、

蜀藥丸、濟生丸、王家易治、十普、葛根、陳桂、陳土、

對卷八

頭三途水一大盞半、生薑十片、燒至八分、去滓、加食
步半夏、不以多少、水一大盞半、古朴、火腿、半
財、內參道、水、王家易治、冒皴骨風不可。忌皆生髮類

冒皴骨風

本草泡藥 附擇

經驗後方、治頭癰兒童子、患瘡豆疾、用紫草二兩、細剉、
以百沸湯一大盞泡、便以物合定、勿令氣漏放、如人
體溫、量兒大小服、半合至一合、服此、瘡雖出、亦當輕
減、證類本草卷八紫草條引、聖惠方同泡作沃。

證治要訣、有無病偶然致之、此緣氣逆而生、重者或
經一二日、宜小半夏茯苓湯加枳實半夏湯、或用煎
湯泡蘿蔔子、研取汁、調木香調氣散、乘熱服、逆氣用
之最佳、卷六、新易治、用谷、米、三黃、等、意、

傷寒類方、大苦黃連瀉心湯、此又法之最奇者、不取
煎而取泡、欲其輕揚清淡、以滌上焦之邪、

劉君直庭曰、皇國制劑、轉刷及芳香、間用湯泡以
代煮煎、是取其疎溫、亦便倉卒、其法以呴咀藥、內

絹袋中、麻沸湯擺用、俗呼振卽三黃湯之遺意、漸治

通義

卷九

九

九

九

九

九

九

九

九

瞿灝曰、清波雜志、高宗自相州渡河荒野中、借半
破瓮盂、溫湯添飯茅筭下、與汪伯彥同食、集韻添
披敎切漬也、按今醫方概書溫漬字為泡、泡音脮、
浮溫也、可借用半通俗編卷五十六、輯出亦當
又百無事一大盞水更以沙合衣令屏氣大吸
此頭附擺、家頭女童子患癧且兼用紫草二兩研末
本事方、并花水擺、如未出者、更以手揉令出盡、卷十
青州

白圓子方後

證治要訣類方卷四
青州白丸子同



劉君造矣。自嘗因制創轉刷及芳香簡用湯泡以
代煮煎。是取其疏溫亦便食卒其法以咬咀藥內

絹袋中。麻沸湯擺用。

俗呼振

即三黃湯之遺意。詳

通鑑卷九

翟灝曰：諸波雜忌。高宗自相州渡河荒野中。倍半
破瓮玉溫湯添飯。并盤下。與連伯秀同食。集韻涂
披教切讀也。按今醫方概書溫瀆字為泡泡音喉
浮溫也可借用矣。通俗編卷三十五。古方集解。

附識

本草圖

古今錄

藥

本草圖

古今錄

藥



