

段酉學管錐 內集

七八

✕

i 18-1

490.9
I 9-3
7

No. 2041
12 1 18-1



富士川文庫

1253

九折堂山田
氏圖書之記

醫學子管雜卷七目錄

買藥不可爭價卷田螺貼臍下後

買竹葉竹茹有治血之功附若後

買竹根爭價同上論曰二羚羊角滋陰

茅根有治血之功 人參益血

心下溫猶有生意 附溫心下法

利尿類童便 吹鼻中方 卷三五參

漬脚 塗足心法

塗頂法 傅芥子法

紫蘇荊芥薄荷藿香茵陳等併莖葉用
朱奉議治少陰病用柴胡

卒死吹竅

卒死如寢

米奉壽出少劉森用柴貼

地紫蘇蘇蘇芥藜荷藿香茵刺芩荊莖葉用

金匱心志

刺芥心志

費啣

金匱心志

氣不蘇

如鼻中寸 卷三三卷

心下監斷首主意

可監心下志

紫蘇有試血之也

人參益血

廿味

錢羊角慈劉

以葉廿味有試血之也

前蘇

買藥不可爭價

田繁胡韻下

野百國子營對卷十目錄



思眼觀證豆豉膏亦名葱慈延膏黑三乙句曰螺十九个葱

九折堂山田氏圖書之記

買藥不可爭價

買藥不得爭價千金翼卷十八七水凌方後

買藥勿爭價同卷廿大金牙散方後

買藥不可爭價同上論曰云云

異客風姿瀟灑出塵揖之曰方外高士何子才走趨

如此月日一善友久患閉結勢不可療急欲往問客

曰此易事也待奉施一藥即脫靴入水探一大螺而


出曰事濟矣轉抵其家以鹽半匙和殼生搗碎置病

者臍下一寸三分用寬帛緊繫之仍辨觸器以頂其

通月未以為然姑異謝之熊昏不知人妻子聚泣諸

醫知無他藥漫使試之曾未安席若然暴下醫愧歎

買藥不可爭價



買藥不下半貫
買藥不下半貫
買藥不下半貫
買藥不下半貫
買藥不下半貫

幼新書惠眼觀證豆豉膏亦名葱涎膏黑豆乙勻田螺十九个葱一大把右搗爛用
芭蕉汁調貼臍下卷五初生不小便第共藥於心則小兒出一二補相愈卷三

田螺貼臍下每貼臍下

醫說饒醫熊彥誠年五十五歲病前後便溺不通五

日腹脹如鼓同輩環視皆不能措力與西湖妙果僧

慧月相善遣信邀致訣別月驚馳而往於釣橋逢一

異客風姿瀟灑洒出塵揖之曰方外高士何子才走趨

如此月曰一善友久患閉結勢不可療急欲往問客

曰此易事也待奉施一藥即脫靴入水探一大螺而

出曰事濟矣轉抵其家以鹽半匙和殼生搗碎置病

者臍下一寸三分用寬帛緊繫之仍辨觸器以須其

通月未以為然姑異謝之熊昏不知人妻子取泣諸
醫知無他策謾使試之曾未安席若然暴下醫愧歎

醫方考載此文云崑謂便溺不通者熱秘之也大
出螺性寒而善分清故濁水之中一着大螺便能澄
曰徹劑之以鹽取其善潤也卷四小便不通大螺而
又白石董守約以脚氣攻注為苦或教之搗數螺傳
兩股上便覺冷氣趨下至足既而亦類編亦引去
醫方考載此文云蓋螺性能泌別清濁故能療脚
日氣之濕熱也卷五脚氣
續醫說象山縣村民有患水腫者咸以為鬼祟訊之
下者卜者授以此方良效用田螺大蒜車前車和研
餅成餅貼臍中以手帕縛之貼藥後少頃小便出二餅即愈卷三
去皮五個車前子
三錢為末右三件研成餅貼臍中以手帕縛之貼藥後少頃小便出二餅即愈卷三
生葱汁調膏貼
臍中立通卷六

古今醫鑑消河
餅治水腫膨脹
大田螺四個大蒜
去皮五個車前子
三錢為末右三件研成餅貼臍中以手帕縛之貼藥後少頃小便出二餅即愈卷三

萬病回春下痢噤口不食者脾虛胃熱甚也參連湯之方後云外以田螺搗
爛合香臍中引熱下行故也卷三
又蝸生膏治大
小便不通用蝸牛
三枚連殼研為
泥再加鹿野香少
許貼臍中以手
揉按之立通若
用田螺搗爛填
臍中亦然余用
些方治大小便不
通及熱閉者殊
効卷四
又轉胞者卒不
得小便也冬葵
子五錢山梔子五
錢木通三錢滑
石五錢石一劑
水煎溫服外以
冬葵子山梔子
石為末田螺肉

而散月歸訪異人無所見矣熊後十六年乃終卷六

醫方考載此文云崑謂便溺不通者熱秘之也大

出螺性寒而善分清故濁水之中一着大螺便能澄

曰徹劑之以鹽取其善潤也卷四小便不通大螺而

又白石董守約以脚氣攻注為苦或教之搗數螺傳

兩股上便覺冷氣趨下至足既而亦類編亦引去

醫方考載此文云蓋螺性能泌別清濁故能療脚

日氣之濕熱也卷五脚氣

續醫說象山縣村民有患水腫者咸以為鬼祟訊之

下者卜者授以此方良效用田螺大蒜車前車和研

餅成餅貼臍中以手帕縛之貼藥後少頃小便出二餅即愈卷三

去皮五個車前子

三錢為末右三件研成餅貼臍中以手帕縛之貼藥後少頃小便出二餅即愈卷三

生葱汁調膏貼

臍中立通卷六

萬病回春下痢噤口不食者脾虛胃熱甚也參連湯之方後云外以田螺搗

爛合香臍中引熱下行故也卷三

又蝸生膏治大

小便不通用蝸牛

三枚連殼研為

泥再加鹿野香少

許貼臍中以手

揉按之立通若

搗膏或生或干
調膏貼臍中
通卷六

木用
又轉胡
直又
神中
用
神中
萬

本草黑字皮筋微寒主吐血崩中

證類本草列外臺臍下鋪驗同婦人良方卷十五下鋪驗同

婦人良友療姪娠卒不得小便友用車前草汁調滑

右末塗臍四畔方四寸熱即易之卷十五

少採對同

二代大

吾

婦人

善

萬

醫治竹葉竹茹有治血之功附若

本草白字主筋急惡瘍

金匱要略產後中風發熱面正赤喘而頭痛竹葉湯

主之不具婦人產後病脈證治第二十一方

又婦人乳中虛煩亂嘔逆安中益氣竹皮大丸主之

脈經寸口脈訖吐血微訖者衄血空虛去血故也宜

服竹皮湯黃土湯灸臍中卷二十三關病

又關脈訖大便去血數斗者以臍輪傷故也宜服生

地黃并生竹皮湯灸臍輪同上十一

又尺脈訖下焦虛小便去血宜服竹皮生地黃湯同上

竹葉竹茹有治血之功

藥性論淡竹葉味甘無毒主吐血熱毒風

葉條

又青竹茹使味甘能止肺痿唾血鼻衄

千金方治婦人汗血吐血尿血下血竹茹湯方竹茹

二升乾地黄四兩人參芍藥桔梗芎藭當歸甘草桂

心各一兩右九味咀咀以水一斗煮取三升分三服

又卷三雜治第八

又治齒斷間津液血出不止方生竹茹二兩醋煮含

之卷六下齒病第六

又治齒間血出方以苦竹葉濃煮之與鹽少許寒溫

得所含之冷味

本草集解

又治齒出血不止方刮生竹皮二兩苦酒浸之令其

人解衣坐使人含嚙其背上三過仍取竹茹濃煮汁

勿與鹽適寒溫令嗽之竟日為度

又竹皮湯治欬逆下血不息方生竹皮三兩紫苑二

兩飴糖一斤生地黄切一升右四味以水六升煮取

三升去滓分三服

又治上焦熱膈傷吐血衄血或下血連日不止欲死

並主之方艾葉一升阿膠如手掌大竹茹一升乾薑

二兩右四味咀咀以水三升煮取一升去滓內馬通

汁半升煮取一升頓服之取新馬屎與少水和絞取

汁一升不用竹茹加乾薑成七兩

又竹皮湯治為兵杖所加木石所迫血在曾背及脇
中痛不可氣息方青竹刮取茹雞子大二枚亂髮雞
子大二枚右二味於炭火炙令焦燥合擣之下篩以
酒一升煮之三沸止一服盡之三服愈卷十五被蓋
小品方治汗出如水漿及汗血衄血吐血小便血殆
死都梁香散方都梁香二兩紫苑一兩桂肉一兩人
參一兩生竹茹一兩肉縱容一兩干地黄二兩凡七
物治篩以水服方寸匕醫心方卷十三
醫門方治汗血吐血方青竹茹三兩生地黄五兩人
參一兩桔梗一兩芎藭一兩當歸一兩桂心一兩甘
草二兩炙右切以水九升煮取三升去滓分溫三服

甚神效同上

小品方治吐血汗血大小便血竹茹湯方竹茹二升

甘草六分當歸六分芎藭六分黃芩六分桂心一兩

木香兩入參一兩芍藥一兩凡九物以水一斗煮取

三升分四服同上

深師黃土湯療鼻衄去五截熱氣結所為或吐血者

方當歸甘草炙芍藥黃芩芎藭各三兩桂心一兩生

地黃一斤金月下焦黃土如雞子一枚碎綿裹青竹

皮五兩右九味切以水一斗三升煮竹皮減三升去

滓內諸藥者取三升分四服外臺卷三十六

葛氏方云若為人所打舉身盡有瘀血者方刮青竹

皮二升、亂髮如鷄子大四枚、火炙令焦、与竹皮合搗末、以一合酒內酒中升中煮三沸、頓服之、日四五過、又內蒲黃三兩、醫心方卷十八、葛氏方治血氣逆、心煩滿者、方生竹皮一升、水三升、煮取一升半、分三服、同卷廿三、聖惠方治五藏熱結、鼻衄、心胃煩悶、互服伏龍肝散、方伏龍肝一兩、當歸二兩、赤芍藥二兩、黃芩二兩、犀角屑一兩、生乾地黄三兩、刺薊一兩、右件藥搗篩為散、每服五錢、以水一大盞、入青竹茹一鷄子大、煎至五分、去滓、溫溫服之、卷卅七治鼻衄諸方、本草綱目、箬葉氣味甘寒、無毒、主治男女吐血衄血

嘔血咯血下血、並燒存性、溫湯服一錢七、又通小便、利肺氣、喉痺、消癰腫、卷十五濕草類上

本聖濟總錄、肺癰、鼻衄、箬葉燒灰、白芨三錢、研勻、并

花水服二錢、以下係綱目附方所列、本書

升、又經血不止、箬葉灰、替蠟紙灰、等分為末、每服二錢、

米飲下、分熟三四沸、內甘草一兩、水一升、湯

成百一選方、腸風便血、茶萋內、箬葉燒存性、每服三

匙、匙空、心糯米湯下、或入麝香少許、

又男婦血淋、亦治五淋多年者、煮湯酒瓶頭、箬葉三

本五年至十年者尤佳、每用七箇、燒存性、入麝香少

許、陳米飲下、日三服、有人思此、二服愈、福建煮過

藥卷十一 附方 非二代 蕪東三代 在合心下 補精

冬先師蘭軒先生好用竹根余當時漫然不之省以

實為先生好奇之癖頃日讀古人所用深感非臆斷

服無據者固曰尚謙亦云竹根療煩熱治消渴功勝

於竹葉方書多用蘆根茅根等而遺此根不思之

甚觀本草 附方 甘草一兩 麥門冬一升 粳

米二升 黃連一斤 去滓內小麥二升 大棗二十

斤 全大竹葉一石 煮取五斗 分五服 竹葉

本草白字 賦詩 益尿 止渴 醉 盡 不 廉

竹葉

羚羊角滋陰

本草白字 羚羊角 主明目 益氣 起陰 除痰 血 閉塞

本草黑字 久服 強筋骨 輕身 起陰

無毒 婦人 崩中 本 草 黑 字

俗方 稀用 惟療 淋及 崩中 爾 陶隱居

管花 味甘 溫無毒 主衄血 吐血 灸瘡 唐本注

白茅 臣能 破血 主消渴 藥性論

茅針 味甘 平無毒 主惡瘡 腫未潰者 煮服之 服一針

一孔 二針 三孔 生按 傳金瘡 止血者 服之主 鼻衄及

鼻下 血成 白花者 功用 亦同 針即 茅也 藥性論

先師蘭軒先生好用竹根余當時漫然不之有以
為先生好奇之癖頃日讀古人所用深感非臆斷
無據者固可尚諫亦云竹根療煩熱治消渴功勝
於竹葉方書多不用慮根茅根等而遺此根不思之
甚觀本草

本草黑字久則乾蕪骨碎良味甜

本草白字漢羊角生肥日益廣味甜

漢羊角生

茅根有治血之功 茅花 茅針 燈心 煎服

茅根味甘寒主勞傷虛羸補中益氣除痰血血閉寒

熱利小便 本草白字 煎服 四升者取二

無毒婦人崩中 本草黑字 煎服 三升者取一升

俗方稀用惟療淋及崩中爾 陶隱居 注 煎服

管花味甘溫無毒主衄血吐血灸瘡 唐本注 一大把

白茅臣能破血主消渴 藥性論 煎服 煎服

茅針味甘平無毒主惡瘡腫未潰者煮服之服一針

三孔二針三孔生按傳金瘡止血煮服之主鼻衄及

暴下血成白花者功用亦同針即茅筍也 陳藏

屋茅主卒吐血 同上 煎服 煎服

茅根有治血之功

茅針涼通小腸癰毒軟癯不作頭濃煎和酒服花罍
刀箭瘡止血并痛根主婦人月經不勻日華子

茅根通血脉淋瀝是白花茅根也煎之主鼻衄及
屋四角茅平無毒主鼻洪同上黃耆黃芩之類一檢

今人取茅針按以傳金瘡寒鼻洪止暴下血及溺血
者殊效圖經無毒主血吐衄血火瘡唐本

白茅花亦主金瘡止血同上
屋苦茅經久者主卒吐血細剉三升酒浸煮服一升

良已同上以上並見證類本草卷八
千金方治熱湯頭痛壯熱及婦人血氣上衝悶不堪

方茅根切二升三搗取汁令盡湯即飲之卷二十

范汪方治熱病唾血方白茅根一物搗下篩為散服

方寸匕日三亦可絞取汁飲之醫心方卷十四

治小兒大便血僧深方茅根二把以水四升煮取二
升服之同卷廿五

產經小便血方煮白茅根飲之多少任意同上

小品茅花湯療傷寒鼻衄不止主之方茅花一大把
右以水八升煮取三升分三服即差若無茅花取茅

根代之亦可外臺卷二黠鉢外臺大
活人書言茅花湯治鼻衄不止茅花一大把水三盞煎
濃汁一盞分作二服即差如無花以根代之卷十
李時珍曰白茅根甘能除伏熱利小便故能止諸血

歲逆喘急消渴治黃疸水腫乃良物也世人因微而忽之惟事苦寒之劑致傷冲和之氣烏足知此哉

本草綱目卷十三白茅發明

蘇丹之亦在何處卷三經冷變神效大

古以取小其黃疸三粒者三兩湯去其無其外煎藥

小品業並易察對寒鼻血不止主之六葉芥一大叶

至無心野血交黃白葉賦治之多少均意

其雖之輕者始主率吐血細則三升酒浸者服一升

治小兒大更血曾聚之葉賦二叶以水四升煮取二

升食之曰三亦何處經脈者服一升

葉主衣前煎藥重山艾白茅賦一葉賦之補益

難安年方卷一溺死半日及一日猶可活氣若已絕心下脈亦可活

之藥人參益血補藥治通義卷十補氣四指衛代

成無已曰人參生津液益血傷寒論四逆加養養養

李杲曰辛甘微溫之劑生陽氣陽生則陰長或曰甘

溫何能生血曰仲景之法血虛以人參補之陽旺則

能生陰血內外傷辨惑論補中益氣湯

吳崑曰獨參湯凡上下失血過多脉微欲絕者急以

此方主之血者氣之守氣者血之衛相偶而不相離

者也一或失血過多則氣為孤陽亦幾於飛越矣故

令脉微欲絕斯時也有形之血不能速生幾微之氣

所宜急固故用甘溫之參以固元氣所以權輕重於

緩急之際也故曰血脫益氣古聖人之法或者不達

人參益血

中藏經治中眼死
心下偏暖起死功
右金病者仰面取
取溫水不住手
淋瘠中必以童子
小便合生地黃湯
之自治禁與冷水
只與溫熱水飲
之卷下

蘇沈良方予所
秘有一丹王去
病傷寒日久而
但心尚尚暖不
不與藥平其不
救試與以蘇金
丸重之四九丸
遂云云卷五

此理見其失血而主四物湯則川芎之香竄能散幾微之氣而當歸芍藥地黃皆滋陰降下之品不能生血于一時反以失救死之權而遺人夭殃矣醫云乎哉醫方攷卷三
又曰黃耆六一湯虛脫已後盜汗者此方主之虛脫者陰虛而形氣將脫如大病之餘新產失血之後也斯時也更有盜汗寧不復傷其氣血乎故用黃耆七之六甘草七之一大補其氣而汗自止或問何以不用養血之藥余曰太極之妙陰生於陽故元形能化有形無形者氣有形者血耳若虛脫之際而責養陰之藥以固脫是以陰及陰二女同居焉能衛外四卷

雜發年方卷一溺死半日及一日猶可活氣若已絕心下脘亦可活一冊三才

中藏經治中賜死心下猶暖起死取土積死人

右金病者仰面取溫水不住手澆淋臍中次以童子小便合生地黃灌之自活禁與冷水

只與溫熱水飲之卷下

蘇沈良方予所乘船有一船工之子病

病傷寒日久而死但心尚尚暖不忍

不與藥求藥而不救試與蘇合香

丸灌之四九乃醒遂至去春五

心下溫猶有生意

傷寒論辨脈法陽氣前絕陰氣後竭者其人死身色必青陰氣前絕陽氣後竭者其人死身色必赤腋下一

金匱要略心下若微溫者一日以上猶可治之雜療方救

千金方精魂已竭心下纔溫以杖發其口開灌藥咽

夫治五絕者心下溫者一日亦可活

又心下溫者以罷能覆口者果兩人其其兩耳

只與溫者水治之自古禁與合水

三國方如未至死心頭尚溫灌漿米下喉無有不活

又有人常積氣結而死其心下暖以此湯少許汁入口遂活同卷十小半夏湯方後

傷寒總病論有人患時氣經六七日因發狂遂眼瞠不瞬手攣腮曲口噤或有張口者宜沈不知人事口

鼻氣絕但心頭溫面色和六脉皆動一如尸厥如此不省五六日因成作成就計救用風引湯加附子

本事方解毒雄黃圓方後云如至死者心頭猶熱灌藥不下即以刀尺鐵匙斡開口灌之卷五外五

又治破傷風及打撲傷損玉真散方後云打傷至死但心頭微溫以童子小便調下二錢同卷六十二

溫心下蘇百生堂

藥方半日及一日斷可愈麻黃湯心下顛亦同

陳藏器曰道中熱塵土主夏中熱暈死取土積死人心證類本草卷四

千金方凡救自縊死者極須按定其心勿截繩卷廿五治

又治熱暈方取道上熱塵以壅心上少冷即易氣通止同上

又方使人噓其心令煖易人為之同上

又方抱狗子若雞著心上熨之同上

又方屋上南畔瓦熱熨心冷易之同上

小入死人鼻口中、鼻口中水出盡則活、火盡復益之
常以手候死人身及甑、勿令甚熱、當令火氣能使死
人心下足得暖、卒無甑者、於岸側削地如甑、空下如
甑、煖令煖以死人著上、云云、同上

又治冬月落水凍、四肢直口噤、尚有微氣者方、以大
品中熬灰使煖、盛以臺裹、薄其心上、冷即易、心煖氣通、
目得轉口乃開、可溫尿粥稍、吞之、即活、若不先溫
其心、便持火炙身、冷氣與火爭即死、同上

千金方、凡燒自盡、取首、置於其心、以香露、
刺竹器曰甑、中燒、壅土、至夏中、燒、置、頭土、甑、死、入

又癰腫雜効方、療熱腫方、燒人糞作灰、頭醋和、如泥、塗腫處、乾數日、大驗、同卷五、
此下當詳廿四卷

又六人尿、又名黃龍湯、卷六、黃龍湯、二人尿、便、鼠屎、
六畜尿、禽獸尿、

金匱要略、食諸菌中毒、悶亂欲死、治之方、人糞汁、
飲一升、卷下、果實、菜穀、禁、忌、人尿、鼠屎、
肘後方、若已六七日、熱極、心下煩悶、狂言見鬼、欲起
走、絞糞汁、飲數合、至一二升、謂之黃龍湯、陳久者佳、

又姚方、中諸毒藥、及野葛已死方、新小便、和入尿、絞取汁、一升、頓服、入腹即活、解諸毒、無過
又食麩肉、謂在密器中、經宿者、及漏脯、茅屋汁、露脯、

為漏脯、此前並有毒、燒人屎末、酒服方寸匕、卷七
又食菌遇毒死方、絞人屎汁、飲一升、即活、服諸吐痢

丸亦佳、同上、行中、毒、或、檢、黃、諸、毒、及、藥、用、也、不、可、
屎尿類

此下當載廿四卷
前朝朝野

千金方治諸食中毒方飲黃龍湯及犀角汁無不治也飲馬尿亦良卷廿四

又治食山中樹菌中毒方人尿汁服一升良同上

又野芋毒用土漿入糞汁同上

又金銀毒雞子汁及尿白猪脂和服同上

又野葛毒雞屎人尿同上

又治諸熱毒或蠱毒鼻中及口中吐血醫所不治方

取人尿夫七枚燒作火色置水中研之頓服即愈亦解百毒時氣熱病之毒服已溫覆取汗勿輕此方極

神驗同音氣氣 合燭氣氣

又治九漏方乾牛屎乾人屎右二味搗先葛綿瘡上

綿土著屎蟲聞屎香出若瘡即舉綿去之更別取屎

綿著如前候蟲出盡乃止卷廿二

又治蜂瘻方人尿蛇蛻灰臘月猪膏和傳之同上

又治丁腫病思見麻勃見之即死者方以人尿犬傳

之立差卷廿二

又治小兒五色丹方服黃龍湯二合并傳患同上

又治瘰癧著手足肩背忽發累累如赤豆剥之汁出

者方剥去瘡痂温醋泔清洗之以胡鷺窠和百日男

兒屎如膏傳之同上

又治蛇嚙方人尿石子塗去帛裹即消同卷廿五

又同上血不食中支脈入黃腸...
又治針灸瘡血出不止方燒人屎灰以傳之同上
又治金瘡破腹腸突出欲令入方取人屎乾之以粉
腸即入矣同上
本草衍義人屎用乾陳者為末於陰地淨黃土中作
五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良
久俟澄清與時行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗
謂之地清然飲之勿極意恐過多耳又治一切癰癤
熱毒瘡膿血未潰疼痛不任用乾末麝香各半錢同
研細抄一二錢大津唾貼瘡心醋麩錢子貼定膿潰出
去藥諸方亦宜開果香出故醫家呼果香去之更保果氣

此下當載古書

醫方攷人屎人尿人中白牛屎猪屎馬通驢子小便
總考云孫思邈千金方凡療火證熱證率用上件取
汁飲之往往稱其神良何也經曰清陽出上竅濁陰
出下竅屎溺出於二陰則無分人類物類皆陰濁也
惟其陰濁故足以制陽光或者鄙而遠之夫未達醫
之妙也卷二
續醫說還元水者臘月以空罈不拘大小細布絨其
口引之以索浸大糞廁中日久糞水添入其罈內取
出埋土中二三年化為清水略無穢氣凡癰疽毒瘡
初發時取一盃飲之其毒即散此法甚良俗名金汁
者是也小兒初生飲半盃能解胎毒及出痘疹稀少

是其功也。卷九引救急雜記

雞峯方解中毒諸飲食取人屎攪汁一升與飲應解

諸藥中毒元有及此者大抵人意嫌穢不獲已須是

用此為最良。卷廿七

又解中毒蒙昧昏悶不省通療取甘草不以多少寸

剉安乾人糞底以土薄覆却用元糞蓋二經兩後晴

取出陰乾為末水調服一二分即省未省更服大妙

同上一

又方取乾人糞燒末水調服一二分立解諸毒同上

蘇夫去將思... 蘇夫去將思... 蘇夫去將思...

蘇夫去將思... 蘇夫去將思... 蘇夫去將思...

外臺集驗... 小便一升甚驗... 亦得切不得病人者...

又執人尿童便外集卷七童便條當參看人尿絞

傷寒論白通加猪膽汁湯茲畧不錄過此汁同上

全匱要略凡中暈死不可使得冷得冷便死療之方云

云道路窮卒無湯當令溺其中欲使多人溺取令温

雜療方宋並善書小兒尿乳汁共服二升亦

又治馬墜及一切筋骨損方云云右七味以童子小

便量多少煎湯成內酒一大盞次下大黃去滓分温

三服同上

肘後方救卒死云云又方以小便灌其面數迴即能

語此扁鵲方法卷一

又方取牛馬糞尚濕者絞取汁灌其口中令入喉若

口已禁者以物強發之若不可強者乃扣齒下若無
新者以人溺解乾者絞取汁此扁鵲云同上
又傷寒有數種人不能別云云又方鼓一升小男溺
三升煎取一升分為再服取汗同卷二

又若已六七日熱極心下煩悶狂言見鬼欲起走又
方大蜩一升破去以人溺煮令熟去滓服之直生絞
汁及水煎之並善同上

又徐王治蛇毒又方急且尿瘡中同卷七
又蛇卒繞人不解方以熱湯淋即解亦可令就尿之

又蜂螫入取人尿洗之同上

○外臺集驗療肺痿時寒熱兩類赤氣急方童子小便每日晚取之
又凡產後勿忽問目汗出不識人者是暴虛故也方取破雞子吞之便醒若未醒可與童子
小便一升甚驗丈夫
亦得切勿不得病人
者卷廿四ノ十三

又姚方中諸毒藥及野葛已死方新小便和入尿絞
取汁一升頓服入腹即活解諸毒無過此汁同上

千金方治丁腫云云又方鼠新坩土和小兒尿傳之
又治食諸菜中毒方云云小兒尿乳汁共服二升亦
好同卷廿四

又蜀椒毒葵子汁桂汁豉汁入尿冷水土漿蒜上
治漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕臭者

又方正旦以尿洗腋下神妙同上

又治中惡又方使人尿其面上法用後方此扁鵲
又治自縊死方尿鼻口眼耳中同上

昔者... 亦野... 小野... 又... 後... 長...

又治熱暈方，仰臥，以熱土壅臍上，令人尿之，臍中溫即愈。同上

又治卒為蛇繞不解方，以熱湯淋之，無湯令人尿之。同上

又治蝮蛇毒方，令婦人尿瘡上。同上

又治蜘蛛咬人方，人尿傳。同上

又論曰：凡被打損，血悶搶心，氣不能言，可摩開口，尿中令下咽即醒。又墮落車馬及車輾木打已死者，以

死人安著，以手袖掩其口鼻，眼上壹食頃，活眼開，與

身... 亦... 小... 又... 後... 長... 亦... 小... 又... 後... 長...

熱小便貳升，兩上... 又治被打傷破腹中有瘀血方，劉寄奴延胡索骨碎

補各一兩，右三味，以水二升煎取七合，復內酒

及小便各一合，熱溫頓服。同上

又治杖瘡方，服小便良。同上

又治刺在人肉中不出方，溫小便清之。同上

又治惡刺方，苦瓠開口，內小兒尿者，入兩三沸，浸病上，

又治火燒悶絕不識人，以新尿冷飲之，及冷水和蜜飲之，口噤絞開與之。同上

又治金瘡血出不止方，飲人尿三升愈。同上

續醫說諸血之證
醫者便認為熱而
以苦寒攻之至死不
悟殊不知苦瀉主土
脾胃也脾胃一身
之本今火既為病
而瀉其土火固未嘗
除而土先已病矣土
病則胃虛日月虛則
營氣不能滋榮百
脈元氣不循天度氣
隨陰化而無聲肌
寒至此則難治矣按
褚氏遺書云諸血服
寒涼者百無一生飲
溲溺者十無二死楊
仁齋直指

方云吐血須煎乾姜甘草作湯與服或四物理中湯亦可如此無不愈者若服此生地犀角藕節
之類則難救矣如遇相火用事之時血多妄行切禁止澀宜清表攻裏其血自止若先用止
澀之劑去生便遠
卷八

一生、醫書、血、證、諸、血、之、證、醫、者、便、認、為、熱、而、以、苦、寒、攻、之、至、死、不、悟、不、知、苦、瀉、主、土、脾、胃、也、脾、胃、一、身、之、本、今、火、既、為、病、而、瀉、其、土、火、固、未、嘗、除、而、土、先、已、病、矣、土、病、則、胃、虛、日、月、虛、則、營、氣、不、能、滋、榮、百、脈、元、氣、不、循、天、度、氣、隨、陰、化、而、無、聲、肌、寒、至、此、則、難、治、矣、按、褚、氏、遺、書、云、諸、血、服、寒、涼、者、百、無、一、生、飲、溲、溺、者、十、無、二、死、楊、仁、齋、直、指、

本草衍義人溺須童男者產後温一盃飲壓下敗血
惡物有飲過七日者過多恐久遠血截寒令人發帶
病人亦不覺氣血虛無熱者尤不宜多服此亦性寒
故治熱勞方中亦用 卷十六 瓜黃人兩三劑 豉末土

續醫說輪迴酒人尿也有大病者時飲一盃以酒滌
口久服有效跌撲傷損胸次脹悶者尤宜用之婦人
分晚後即以和酒煎服無產後諸病南京吏侍張公
綸嘗在錦衣獄六七年不通藥餌胸膈不利眼痛頭
疼發熱輒飲此物無不見效又潘王府長史王庭任
國子學正時病大便下血勢頗危殆一日昏憤中聞

有人云服藥誤矣喫小水好庭信之飲小水一盃頓
甦逐日飲之病勢漸愈 卷八 引菽園雜記
醫方考人溺咳血者宜此一物飲之褚澄齊之聖醫
也其遺書曰咳血不易醫喉不容物毫髮必咳血滲
入喉愈滲愈咳愈咳愈滲飲溲溺則百不一死服寒
涼則百不一生吾於是求師其言矣 卷三 軒身何也路

又人尿肺痿者取人尿無時呷之良於諸藥蓋天一
生水地二生火人尿潤下鹹寒人身之天一也故可
以交吾身之坎離濟吾身之水火或者因其穢而拒
之夫夫未聞道者也 卷五

又自溺老人夜臥口乾亡液取自己溲溺時進一杯

能長生引年此以吾身之坎交吾身之離諺稱輪迴酒是也同卷六

又咳血者以立里便一物主之同卷三虛損勞瘵門童便考

又煩燥加重便者虛而有火也同上氣門獨參湯

又人尿人尿人白牛尿猪尿馬通驢子小便孫思邈千金方

凡療火證熱證率用上件取汁飲之往稱其神良何也經

曰清陽出上竅濁陰出下竅尿溺出於二陰則無分人類

物類皆陰濁也惟其陰濁故足以制陽光或者齟而遠之

夫未達醫之妙也同上卷二火門

婦人良方新產後不問腹痛不痛有病無病以童子

小便以酒和半錢溫服五七服妙卷十八

婦人良方新產後不問腹痛不痛有病無病以童子小便以酒和半錢溫服五七服妙卷十八

婦人良方凡產後忽冒悶汗出不識人者暴虛故也破雞子三枚吞之便醒若未醒可與童子小便一升甚驗丈夫小便亦得切不得用病人者卷十九

千金方治諸瘡者白痴復發方大蒜鼠矢各取右三

味等分為末傅之日三卷十二

又治乳癰方大青鼠屎新者各一分黃連二分右三

味搗黃連大青末合鼠屎共治以黍米粥清和傅乳

四邊痛止即愈無黍米粟米稷米亦得

後方卷五

又治凡大瀉人及鼠屎臘月猪膏和傅之

千金方治一切
雄白鼠屎各十四
燒令十盡盛末內
煎中溫酒一升投
煎中合和之當服
五合服之當有
出卷三三六

能長生列年此以吾身之故又吾身之故請論
酒是也

咳血者以生薑使一物主之

又煩燥如重便者其虛而有火也

又人尿人尿八中白牛尿猪尿馬通驢子小便

凡瘡大證熱證空月牛尿取汁飲之佳

曰清陽出上敷濁陰出下敷尿濁出於二陰

物類皆陰濁也惟其陰濁故足以助陽

其總丈夫小便亦腎水不腎田諸人皆

婦人小便三味亦以腎水而腎水亦腎水

諸人身太月五五五五五五五五五五五

千金方治一切

雄鼠屎各十粒
燒令汁盡末內
煎中溫酒一升投
煎中合攪之鼠人
五合服之當有蟲
出卷廿三六

漏方柎北陰白皮三十斤剉之以水二石煮取一斗去滓煎如糖又取都廁上雌

鼠屎

金匱要略治馬肝毒中人未死方雄鼠屎二十七粒末

之水和服日再服注屎大者是禽獸魚蟲禁忌并

千金方治諸瘡著白痴復發方大蒜鼠矢書黑右三

味等分為末傳之日三卷廿二

又治乳癰方大黃鼠屎新者各一分黃連二分右三

味搗黃連大黃末合鼠屎共治以黍米粥清和傳乳

四邊痛止即愈無黍米粟米粳米亦得同卷廿三

又治凡犬齩人方鼠屎臘月猪膏和傳之注外其方

易同上
葛氏卒得鼠瘦云云若已有核膿血出者以熱牛屎
塗之日三同上
又睛為所傷損破方生旋日二點避風黑睛破亦差
千金方趙燒方薑石二十五兩牡蠣十兩崔氏七兩
枸杞根皮四兩茯苓三兩右四味各搗篩合和先取
新枸杞根合皮切六升水一斗半煎取五升去滓內
狗屎崔氏云尿二升攪令調澄取清和前藥熟搗捻作餅
子陰乾云云卷二十四疔腫第六
又以枸杞汁攪白狗屎取汁服之更良同上

又魚臍疔瘡似新火針瘡四邊赤中央黑色可針刺
之若不大痛即殺人治之方以臘月魚頭灰和髮灰
等分以雞溏屎和傅上此瘡見之甚可而能殺人外注
又治癰疽發腹背陰匿處通身有數十癰者方取乾
牛糞燒灰下篩以雞子白塗之乾復易同上
又治癰腫發背初作及經十日已上腫赤焮熱毒氣
盛日夜疼痛百藥不效方取雞子一枚新出狗屎如
雞子大右二味攪調和微火熬令稀稠得所捻作餅
子可腫頭堅處帖之以紙帖上時時看之覺餅子熱
即易勿令轉動及歇氣經一宿定如多日患者三日

以帛抹之

帖之一日一易差止此方穢惡不可施之貴勝然其
 愈疾一切諸方皆不可及自外諸方還復備身設儀
 注而已覺者當曉斯方亦備諸急爾同上
 又治膿潰後瘡不合方以牛屎傳之乾即易之同上
 又五色油丹俗名油腫若犯者多致死不可輕之方
 牛屎塗之乾易同上
 又治小兒白丹方燒猪屎灰雞子白和傳之良同上
 又治小兒火丹赤如朱走皮中方猪屎水和絞取汁
 服少許良同上
 又治燥癩方熱牛屎塗之同上
 又治惡瘡方羊矢麻根燒煙斷膏和封有汁者乾傳

之同上
 又治惡瘡似火爛洗湯方白馬屎暴乾以河水和煮
 十沸絞取汁洗之同上
 又治惡瘡十年不差似癩者方煨猴猪矢傳之同上
 又治凍指疥欲墮方馬屎三升以水煮令沸漬半日
 愈同上
 又治人脚無冬夏常折裂名曰尸脚方雞矢一升水
 二升煮數沸停小冷漬半日差止亦用馬矢同上
 又治九漏方乾牛屎乾人尿右二味搗先幕綿瘡上
 綿上著屎蟲聞尿香出若瘡即舉綿去之更別取屎
 綿著如前候蟲出盡乃止同上

又瘰癧瘰癧橫闊作頭狀若杏人形亦作瘰癧方用雄
雞屎灰臘月猪脂和封之同上八ウ

又治蜣螂瘰癧方牛屎和臘月猪脂傳之同上

又方乾牛屎末傳瘰癧即撥却更厚封差乃止同上

又方熱牛屎塗之數數易應有蜣螂出同上

又治蚯蚓瘰癧方蚯蚓屎雞屎右二味末之用社猪下

頷髓和傳之同上

又治雀瘰癧方取母猪屎灰和臘月猪膏傳蟲出如雀

形同上八ウ

又治鼠漏及瘰癧五白膏方白馬白牛白羊白猪白

雞等屎各一升漏蘆二斤右六味各於石上燒作灰

研緝篩之以猪膏一升三合煎亂髮一兩半令極沸

消盡乃內諸末微微火上煎五六沸藥成去瘡痂以

鹽湯洗新帛拭乾然後傳膏若無痂猶須湯洗且再

若著膏當以帛裹上勿令中風冷也神驗同上八ウ

又治腸癰方雄雞頂上毛并屎燒作末空心酒服之

同上八ウ

又治內癰未作頭者方服伏雞屎即差同上八ウ

又治諸瘡疥癬久不差者方取特牛屎五升羊蹄根

五升右二味漬一宿日暴乾復內取尿盡止作末傳

諸瘡等同上八ウ

又治諸食中毒方飲黃龍湯及犀角汁無不治也飲

馬尿亦良同卷廿四

又治食六畜肉中毒方各取六畜乾屎末水服之同上

又治食猪肉中毒方燒猪屎末服方寸匕犬屎亦佳

又治食野菜馬肝肉諸脯肉毒方燒狗屎灰水和絞

取汁飲之立愈同上

又治鬱肉濕脯毒方燒狗屎末水服方寸匕同上

又金銀毒鴨血及尿汁雞子汁及尿白燒猪脂

和服水淋雞屎汁煮葱汁同上

又野葛毒雞子清雞屎人尿同上

又解一切毒母猪尿水和服之同上

又卒死無脉云又方牛馬矢絞取汁飲之無新者

水和乾者亦得注肘後方云以人溺解之

又治卒忤方犢子屎半盞酒三升煮服之亦治霍亂

又鬼擊手之病云云治之方雞屎白如棗大青花麻

把右二味以酒七升煮取三升熱服須臾發汗同上

又治自縊死方雞屎白如棗大酒半盞和灌口及鼻

中佳同正邪

又治衆蛇毒方雞屎二七枚燒作灰投酒服之同上

又治蜂螫方燒牛屎灰苦酒和塗之同上

又治蜂螫方燒牛屎灰苦酒和塗之同上

又治蜂螫方燒牛屎灰苦酒和塗之同上

又治蜂螫方燒牛屎灰苦酒和塗之同上

又治蜂螫方燒牛屎灰苦酒和塗之同上

又治射工中人寒熱云云方白雞屎取白頭者三枚

湯和塗中毒處同上如大熱者

又治剥死馬馬骨傷人毒攻欲死方便取馬腸中屎

以塗之大良服外臺方云取其屎燒灰

治凡犬齧人方以熱牛屎塗之佳同上抄

又治四肢骨碎筋傷蹉跌方筋骨傷初破時以熱馬

屎傳之無癢同上抄

又治竹木刺在皮中不出方羊屎燥者燒作灰和猪

脂塗刺上若不出重塗乃言不覺見刺出時一云用乾

羊屎末同上抄

又治惡刺并狐尿刺方白馬尿溫漬之同上抄

又凡因瘡而腫痛劇者數日死或中風寒或中水或

中狐尿刺治之方燒黍穰若牛馬屎若生桑條取得

多煙之物燒熏汁出愈同上抄

又治刺傷中風水方服黑牛熱尿一服二升三服即

止同上抄

又治諸漏方正月雄狐屎陰乾杵末水和服同上抄

又治漏方鐵落鐵屑狗類車連齒骨炙虎糞鹿皮合

毛燒灰石四味等分治下節以猪膏和丹瘡中須臾

易之日五六度同上抄

易之日五六度同上抄

又治射工中人寒熱云云方白雞屎取白頭者三枚

又治射死馬馬骨傷人毒攻欲死方便取馬腸中屎

以涂之犬良

治凡犬咬人方以熱牛屎塗之佳

又治四肢骨碎筋傷踉蹌方筋骨傷初破時以熱馬

屎

又治禽獸蟲等屎尿

千金方魚臍疔瘡云傳水獺屎大良

肘後方癰已有膿當使壞方以苦酒和雀矢塗癰頭

如小豆

千金方治諸色癰腫惡瘡差後有癥滅癥膏方

云若滅癥取少許和鷹鳥屎白傳之

又治癩子方水和雀屎傳之

又治諸漏方正月雄狐屎陰乾杵末水和服

又治蜚蠊瘻方。蜚蠊丸末傳。即蜚蠊所食屎也。同上
 又治蚯蚓瘻方。蚯蚓屎雞屎各二味末之。用社猪下
 頷髓和傳之。同上
 又治療癩方。狼屎灰傳之。同上
 又治癬方。服驢尿良。同上
 又方。淨洗瘡。取醬辦雀屎和傳之。差止。注。千金翼云。取醬辦尿和。
 十塗之。同上
 又石藥毒。白鴨尿。同卷廿四極。
 又金銀毒。鴨血及尿汁。同上
 又射罔毒。蚯蚓屎。同上
 又斷酒方。虎屎中骨燒末和酒與飲。同卷廿五。

又方。鸕鷀屎灰水服方寸匕。永斷。同上
 又治蜘蛛咬人方。人尿傳。又油淀傳。又炮薑貼之。又
 糊孫尿傳之。同上
 又治狂。大齧人方。飲驢尿一二升。同上
 又治惡刺。并狐尿刺方。以烏父驢尿漬之。同上
 又治金瘡方。蚯蚓屎以水服方寸匕。日三。同上
 又解散除熱鴨通湯方。白鴨通五升。沸湯二斗半。淋
 之。澄清取二斗汁。云云。同上
 又解散治盛熱實大小便赤方。云云。白鴨通五合。同上
 方長不錄。

附後方卷一引張
 仲景諸要方作割
 丹雄雞冠血一升

去卷二豆參者

按指自昇又作啗
 自昇。指以手。啗。古作。許收切。說文。以自昇就自也。字典。又作啗。

賦經。起卒元。卷
 下。厥者勿。

是公... 辛... 辛...

只... 辛... 辛...

去... 辛... 辛...

辛... 辛... 辛...

是中死救之方取葱心黃刺其鼻男左女右入七八寸若使目中血出佳扁鵲法同是後吹耳條中葛當言此云吹鼻故別為一法卷一

又方以綿漬好酒中須臾置死人鼻中手按令汁入鼻中并持其手足莫令驚同上

又方取皂莢如大豆吹其兩鼻中嚏則氣通矣同上

又扁鵲法又云半夏末如大豆吹鼻中同上

又張仲景諸要方搗薤汁以灌耳中同上

又尸厥又方灸其兩脇下取竈中墨如彈丸漿水和飲之須臾三四以管吹耳中令三四入更互吹之又

小管吹鼻孔梁上塵如豆著中吹之令入差同上

又治卒得鬼擊方以淳酒吹內兩鼻中同上

又卧忽不寤勿以火照火照之殺人但痛齒其踵及足拇指甲際而多唾其面即治又治之方末皂角管吹兩鼻中即起三四日猶可吹又以毛刺鼻孔中男左女右展轉進之同上

又方以蘆管吹兩耳并取病人髮二七莖作繩納鼻孔中割雄雞冠取血以管吹入咽喉中大效同上

又方末竈中黃土管吹入鼻中末雄黃并桂吹鼻中並佳同上

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中同上

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中同上

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中同上

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中同上

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中同上

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中同上

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中同上

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中同上

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中同上

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中同上

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中同上

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中同上

又方、搗雄黃細篩、管吹納兩鼻中、桂亦佳。同上九ノ才
 又方、菖蒲末吹兩鼻中、又末內舌下。同上九ノ才
 又毒病後攻目、若生翳者、燒豉二七粒末、內管鼻中
 以吹之。同卷二十五ノ才
 又比歲、又有虜黃病、初唯覺四體沈沈不快、須臾見眼
 中黃、漸至面黃、及舉身皆黃、急令溺白紙、紙即如麩
 漆者、此熱毒已入內、急治之、若初覺、便作苾蒂赤豆
 散吹鼻中、鼻中黃汁出數升者多差。同卷二十五ノ才
 又赤散方、牡丹五分、皂莢五分、炙之、細辛、乾薑、附子
 各三分、肉桂二分、真珠四分、躑躅四分、搗篩為散、初
 覺頭強、邑邑、便以少許內鼻中、吸之、取吐、溫酒服方

寸七、覆眼得汗即差。同上治瘴氣疫癘溫毒諸方第
 又治卒啞不止方、以物刺鼻中、各一分來許、皂莢內
 鼻中、令嚏差。同卷四ノ才
 千金方、治小兒傷寒發黃方、搗韭根汁澄清、以滴兒
 鼻中、如大豆許、即出黃水差。卷五上九ノ才
 又方、小豆三七枚、瓜蒂十四枚、糯米四十粒、右三味
 為末、吹鼻中。同上九ノ才
 又治鼻塞腦冷、清涕出方、通草、辛夷、各半兩、細辛、甘
 遂、桂心、芎藭、附子、各一兩、右七味末之、蜜丸、綿裹內
 鼻中、密封塞、勿令氣洩、丸如大麻子、稍加微覺小痛
 擣薑黃為丸、即愈、用白狗膽汁和之、更佳。同卷六ノ才

又治鼻塞常有清涕出方細辛蜀椒乾薑芎藭吳茱萸附子各十八銖桂心一兩皂莢屑半兩猪膏一升右九味咬咀以綿裹苦酒漬一宿取猪膏煎以附子色黃為度去滓綿裹內鼻孔中并摩鼻上同上十五
又治鼻塞塞香膏方白芷芎藭通草各十八銖當歸細辛莽草辛夷各三十銖右七味咬咀以苦酒漬一宿以不中水猪肪一升煎三上三下以白芷色黃膏成去滓綿沾如棗核大內鼻中且同上十五
又治鼻不利香膏方當歸薰草通草細辛麩人各十八銖芎藭白芷各半兩羊髓四兩猪脂亦得右八味咬咀以微火合煎三上三下白芷色黃膏成去滓取

如小豆大內鼻中且二同上十五

又治鼻塞塞穴至氣息不通方瓜蒂末少許吹鼻中亦可

綿裹塞鼻中同上十五

又治鼻塞塞多年不聞香臭清水出不止方取當道車

輾過疾梨一把搗以水三升煎取熟先仰臥使人滿

口含取一合汁灌鼻中使入不過再度大嚏必出一

兩箇息肉似赤蛹一方有黃連等分同上十五

治鼻鼈方通草細辛附子右三味各等分末之以蜜

和綿裹少許內鼻中同上十五

又方甘遂通草細辛附子等分右四味末之以白雄

犬膽和為丸如棗核大綿裹內鼻中辛熱涕出四五

升差亦治息肉同上桂
 又方灸皂莢末之如小豆以竹管吹鼻中同上然
 又方乾薑末蜜和塞鼻中吹亦佳同上
 又方鐵鏢磨石取末以猪脂和綿裹內之經日肉出
 差同上
 又方以馬新尿汁仰頭含滿口灌鼻中同上
 又方伏面臨牀前以新汲冷水淋玉枕上後以瓜蒂
 末綿裹塞之同上
 又治鼷鼻有息肉不聞香臭方瓜丁細辛右二味各
 等分末之以綿裹如豆大許塞鼻中須臾即通同上
 又治鼻中息肉不通利通草散方通草半兩礬石一

其其三兩
 其四兩
 其五兩
 其六兩
 其七兩
 其八兩
 其九兩
 其十兩
 其十一兩
 其十二兩
 其十三兩
 其十四兩
 其十五兩
 其十六兩
 其十七兩
 其十八兩
 其十九兩
 其二十兩

兩真朱一兩右三味末之然綿如棗核取藥如小豆
 著綿頭內鼻中日三易之同上桂
 又治鼷鼻鼻中息肉不得息方礬石六銖藜蘆六銖
 瓜蒂二十七枚附子十一銖右四味各搗篩合和以小
 竹管吹藥如小豆許於鼻孔中以綿絮塞鼻中日再
 以愈為度同上
 又治鼻中息肉方炙蠟皮末綿裹塞之三日同上
 又治鼻中息肉不聞香臭燒礬石末以面脂和綿裹
 著鼻中數日息肉隨藥消落同上
 又方木瓜丁如小豆許吹入鼻中必消如此三數度
 又同上

初新書卷五引
方後云以筋頭點
入鼻中但孩子病
甚即與吹之或得
七噴可以治之五噴
即甚三兩噴必死
矣此不可深着水
浸臨時入水亦不畏

又方綿裹瓜蒂末塞鼻中同上十七夕

又治鼻中息肉梁起方通草十三銖真朱六銖礬石
細辛各一兩右四味末之然綿如棗核沾散如小豆

并綿內鼻中日再息同上十八夕

又治黃疸方瓜蒂赤小豆秫米各二七枚右三味治

下篩病重者取如大豆二枚內著鼻孔中痛縮鼻須

更當出黃汁或從口中出汁升餘則愈病輕者如一

豆不差間日復用又下里間以筒使人極吹鼻中無

不死大慎之同卷十五夕外臺

千金翼論曰凡遇時行熱病多必內痰著黃但用瓜

丁散內鼻中令黃汁出乃愈即於後不復病黃矣常

須用心警候病人四肢身面微似有黃氣須用瓜丁

散不得令散漫失候必大危矣特忌酒麩犯者死卷

八抄○外臺卷四引畧同傷寒總病論卷五引

又黃疸目黃不除瓜丁散方瓜丁細末如壹大豆許

內鼻中令病人深吸取入鼻中黃水出差同上外臺

傷寒總病論卷五文少異

刪繁療天行毒熱通貫藏腑沈鼓骨髓之間或為黃

疸黑疸赤疸白疸穀疸馬黃等疾喘息須臾而絕瓜

蒂散方瓜蒂二七枚赤小豆三七枚秫米二七粒右

三味搗篩為散取如大豆粒吹於兩鼻之中甚良不

差間日復服之千金范汪集驗同外

新書卷五
方後云以節頭
入鼻中程子
其法與吹之
即其法也
矣然不可深
浸時入水亦
不畏

延年秘錄療黃瓜蒂湯方瓜蒂一兩赤小豆四十九
枚丁香二七枚右三味搗末以水一升煮取四合澄
清分為兩度滴入兩鼻中外臺卷四十六
又療急黃心下堅硬渴欲得水喫氣息喘急眼黃但
有一候相當即須宜服此瓜蒂散吐則差方瓜蒂二
小合赤小豆二合右二味搗篩為散年大人煖漿水
五小合和散一服滿一方寸匕一炊久當吐不吐更
服五分匕水亦減之若輕病直吹鼻中兩黑豆粒
大亦得當鼻中黃水出即歇并宜灸心厭骨下一寸
名巨闕灸五七炷以來初小作炷在後漸大仍不得
大如梧子洞注十九
外有黃瓜蒂散用瓜

許仁則又依前秦光等二味湯藥服後不覺病退漸加困篤勢如前天行最重狀則不可更
服諸冷物冷物在心唯是痞速宜同前天行用半夏等十味湯以救之亦可合瓜蒂等三味散
吹鼻孔中并與之
服方瓜蒂七枚丁
香七枚赤小豆七枚
右藥搗篩末取
如大豆少吹兩鼻孔
中須臾當出黃水
正如煮薤末汁及出
黃最亦可新及水
和一方寸匕與患人
服或利或吐利所
出亦如煮薤末汁
天行用此療亦與
崔氏同同上

崔氏療黃疸方苦胡蘆瓢如大棗許右物以童子
小便二合浸之三兩食頃取兩酸棗許汁分內兩鼻
孔中餘節候與上方同比來常用乃勝瓜蒂散同上
近效療黃疸瓜蒂散方瓜蒂二七枚赤小豆七枚生
秫米二七枚丁香二七枚右四味搗篩重者取如大
豆二枚各著一枚鼻孔中痛縮鼻須臾自鼻中瀝清黃
水或從口中出升餘則愈病輕者如一小豆則可一
與不盡間日復頻用效李暉用之立驗俗人或使人
以竹筒極力吹鼻中無不死者慎之同上此方畧同
千金療小兒黃方搗土瓜根汁澄清滴兒鼻中如大

豆許又服三合同卷卅六○斷塗卷五上作治小兒

無澄清滴兒鼻如大

雷公炮炙論序腦痛欲亡鼻投硝末注頭痛者以硝

石作末內鼻中立止總論本草序例○後傷寒

傷寒總病論傷寒發黃者先用瓜蒂末內鼻中口含

水搐鼻中去黃水用五苓茵陳散最良卷三

又入温家令不相染研雄黃并噴法先研光明雄黃

以筆濃蘸冷鼻竅中則疫氣不能入與病人同床亦

不相染五更初洗面後及臨時點之凡温疫之家自

生臭穢之氣人聞其氣即時以紙筋攔鼻中作探

嚏之為佳不尔邪氣入上元宮遂散百脉而成斯病

皆為同用土或天行用也黃亦出亦吐黃黃藥味亦知味一云十日與入黃連亦可以漢五更煎黃連末中取更出西出西吹大豆火而自吹藥對藥木香子對赤小豆

也以雄黃點之則自不聞其氣并辟諸惡怪夢神良

又黃疸目黃不除瓜丁散瓜丁細末合水畜豆許深

入鼻中黃水出盡為度同上

又傷寒頭痛不止瓜蒂牙硝散藜蘆一錢瓜蒂三錢

牙硝二錢腦麝各少許細末吹少許入鼻得嚏則愈

活人書問病人頭疼鼻塞而煩者何證也此屬濕家

頭中寒濕故鼻塞塞而頭疼也內瓜蒂末鼻中則愈法

在發黃門中卷九○前金匱要略當參看按得効

不以多少吹咀為細末只含水搐

一字許入鼻中流出黃水即愈

不以時若用少許鼻中當有黃水即效

不以時若用少許鼻中當有黃水即效又赤小豆散治陰黃吐赤小豆丁香瓜蒂各貳米粒麝香壹錢青布灰貳錢右為細末每服一錢温水調下日四五服若取少許吹鼻中即出黃水為効又瓜蒂吹鼻散

皆黃心膈躁悶瓜蒂赤小豆秫米丁香各貳錢右為細末取如豆大內鼻中痛搗之須臾當出黃汗或延口中出升餘則愈若病重者加一豆不美即復內鼻中即効○瓜蒂黃汁訛汗惡黃

當出黃水，切不可吹入。同卷八十八又記一家病，身體痛，面黃，喘滿，頭痛，自能飲食，大小便如經，予診之，脈大而虛，鼻塞且煩，予曰：非濕熱，宿穀相搏，此乃頭中寒濕，茵陳五苓，不可行也。仲景云：濕家病，身疼，痛發熱，面黃而喘，頭痛，鼻塞而煩，其脈大，能自飲食，中和無病，病在頭中寒濕，故鼻塞，納藥鼻中則愈。仲景無藥方，此方見外臺，刪繁證云：治天行熱毒，通貫臟腑，沈鼓骨髓之間，或為黃疸，宜瓜蒂散，即此方也。同上十九又記一舟梢，病傷寒發黃，鼻內酸痛，身與目如金，小便赤而數，大便如經，或者欲用茵陳五苓，予曰：非其

治也。小便利，大便如常，則知病不在臟腑。今眼時疼，鼻頰痛，是病在清道中。清道者，華蓋肺之經也。若下大黃，則必腹脹為逆，亦用瓜蒂散，先含水，次搐之鼻中，黃水盡乃愈。同上又半夏散，治婦人血運血迷，敗血衝心，昏悶不省人事，半夏末如豆大許，竹管吹入鼻中，立醒。同卷十又治八般頭風，草烏尖細辛等分，黃丹少許，右為細末，葶管搐入鼻中，立效。同續集卷二又方，定頭疼，楊梅青，硝石，地龍各等分，右為細末，搐鼻立效。同上又治偏正頭風，夾腦風，并一切頭風，不問年深日近，

尅日取效名透頂散細辛長白者三莖瓜蒂七個丁香
香三粒糯米七粒腦子一豆大麝香一黑豆大右先
將腦麝射乳鉢內研令極細却將前四味碾內事治為
末入乳鉢內蕩起腦麝令勻用瓦甌子盛之堅閉甌
口患人隨左右搗之一大豆許量久出冷涎一升許
即安同上

又治牙疼雄黃沒藥等分乳香少許右為末若左邊
牙疼用藥搗左鼻孔次將藥吹入左耳右邊牙疼則
搗右鼻孔及吹入右耳無不效驗同卷四
又取鼻痔巴豆十二個去殼陽起石一錢石蓮肉三
十個右為末每用半字許搗入鼻內入用綿塊子蘸

蘭香至動輒鼻
吹白鼻亦能出水
卷七

藥塞入鼻中其痔內化爛出了同卷五

又方蝎稍一錢巴豆五粒去油丁香五粒白丁香七

粒右為細末用螺青一字和勻用內消膏藥溶開入

上件藥搜圓如龍眼核大用一圓安鼻內同上

又方苦丁香乃瓜蒂十四個赤小豆丁香各十四個

右漫火焙乾為末入腦子少許口內先含水次將小

竹管吹藥入鼻中半盞茶末多入盡為度候頭疼時

取下同上

又消鼻痔方瓜蒂四錢炒甘遂同白礬各半錢枯過螺

青半錢炒草烏尖同炒右為末用真麻油搜令硬得

些子不可爛旋圓如鼻孔大用藥入鼻內令達鼻肉

上其痔化為水肉皆爛下每日一次用妙不可言
醫方考搐鼻法苦瓜蒂不拘多少為末令病噙水一
口將此藥搐一字入鼻中出黃水愈濕家鼻寒頭疼
宜行此法濕家頭疼是濁邪干清陽之分也鼻者氣
竅主通於腦下屬於肺濁邪干之故清竅不利瓜蒂
苦而善湧瀉鼻竅受之則能出濁邪而瀉濕熱經曰
客者除之此之謂也卷一用一圓安鼻內
又瓜蒂散搐鼻法用苦瓜蒂赤小豆等分云濕熱淫
于巔頂之上頭目偏痛者令病人噙水一口以此藥
一字吹入痛邊鼻中泄出黃水即減卷五

蘭臺軌範
吹白界亦能出水
卷七

鼻出黃水唐以前即有此法或用束腰葫蘆內白膜研細加麝香少許
又瓜蒂散搐瘰肉法先將鼻中瘰肉用針微刺令患
人含水一口後以瓜蒂散和麝香少許用水數滴吹
鼻內出涎水則愈此苦能湧泄也能瀉其實則瘰肉
愈矣
劉君直庭曰搐鼻用泄頭中鬱邪金匱治頭中寒
溼內藥鼻中活人書擬以瓜蒂散又外臺治發黃
有瓜蒂等末吹鼻出黃水數方又聖惠治風頭痛
吹鼻散用瓜蒂麝香等五味曰先含水滿口後搐
藥末半字深入鼻中又頭痛門有數方宜閱
用開達壅閉而口噤不能下藥者尤便聖惠治小
兒天癆幼新書治小兒急慢驚風有用牛黃等

如官鼻亦指出水

蘭臺聖輝神鼻鼻出黃水曾以筒吹此法用束頸於鼻內白紙吹之

灌鼻內令嚏方又聖濟中風龍腦雙丸口噤灌藥于鼻內又急中風螬蝴蝶散若牙緊不能下藥即鼻中灌之又易簡方卒中口噤用細辛皂角各少許或只用半夏為末以蘆管吹入鼻中俟噴嚏其人少蘇然後進藥又十形三療痰厥條其說稍詳攷此術本于金匱治尸厥用菖蒲屑法又用治眼目口齒等疾聖惠治眼睛如針刺疼痛有通頂命抽風散又蘭室祕藏治內外障眼有嗜藥麻黃散又楊氏家藏方有治眼疾頑荆散等治喉痺一字入散治身疼失笑散又用發散傷寒治病百法解又利傷寒一法可用不卧散解之於兩鼻內嗜之連

嚏噴三二十次以衣被蓋覆用此藥時當於暖室中嚏罷以酸辣漿粥投之汗出如洗嚏噴者用吐命法也攷其方係川芎石膏藜蘆甘草四味又用無升提下脫產經治盤腸產以半夏為末搐鼻中腸端自上又證治要訣有胎轉胞用搐鼻藥多打噴嚏或用拳打脚心知痛令病人渾身振起則藏府搖動而胎自反上又用驗疝疾生死聖惠治一切疝疝有吹鼻散數方有云如嚏多疾輕易療如不嚏者必死又云良久有蟲子出子細看如斷絲此是全病根去也制塞鼻用通喉閉百一選方治急喉閉兩開口不得者以黃蠟紙裹已豆一箇如患人鼻孔

大小中心切破急以塞鼻氣衝入喉中自破也己
覺通利即除去云云藥治通議卷九十六子少
蘇沈良方裕陵傳王荆公偏頭痛方云是禁中秘方
用生蘿服汁一蜆殼仰卧注鼻中左痛注右右痛注
左或兩鼻皆注亦可數十年患皆一注而愈荆公與
僕言已愈數人卷七論公疾又載良方法限藏諸書
臣王又醫治要略有胡麻油酥薑薑末蘇合香散
并髮不絕蓋蘇合散雖至以香煎膏末蘇合香散
長也效其方然用其膏蘇合香散甘草四根酒又用
中製器以酒煎蘇合散之粉出吹於鼻對香用其
製散三二六六以水研蘇合散用此藥香膏香散

卒死吹敷

素問邪客於手足少陰太陰足陽明之絡此五絡皆
會於耳中上絡左角五絡俱竭令人身脉皆動而形
無知也其狀若尸或曰尸厥刺其足內側爪甲上去
端如韭葉後刺足心後刺足中指爪甲上各一疔後
刺手大指內側去端如韭葉後刺手心主少陰銳骨
之端各一疔立已不已以竹管吹其兩耳髮易其左角
之髮方一寸燔治飲以美酒一杯不能飲者灌之立
已卷十八繆刺論
金匱要略救自縊死方云云若向令兩人以管吹其
兩耳采好此法最善無不活者雜療方
卒死吹敷

肘後方救卒死方令二人以衣壅口吹其兩耳極則
易又可以筒吹之卷一

又方以管吹下部令數人互吹之氣通則活同上

又方取雄鴨就死人口上斷其頭以熱血瀝口中并

以竹筒吹其下部極則易人氣通下即活同上

尸蹙之病卒死而脈猶動聽其耳中循循如嘯聲而

股間暖是也耳中雖然嘯聲而脈動者故當以尸蹙

救之方以管吹其左耳中極三度復吹右耳三度活

同上

又方扇其兩脇下取竈中墨如彈丸漿水和飲之須

臾三四以管吹耳中令三四人更互吹之又小管吹

鼻孔梁上塵如豆著中吹之令入差同上

治卒魘寐不寤方以蘆管吹兩耳并取病人髮二七

莖作繩納鼻孔中割雄雞冠取血以管吹入咽喉中

大效同上

以清脚令沒踝卷下雜方

肘後方治卒心腹煩滿又胸脇痛欲死方以熱湯令

灼灼爾清手足復易秘方

又凡所以得霍亂者云云亦可作灼灼爾熱湯著

中漬足令至膝并銅器貯湯以著腹上衣藉之冷復

易卷二

肘後方救卒死方令二人以衣壅口吹其兩耳極則
易又可以筒吹之卷一

又方以管吹下部令數人互吹之氣通則活同上
又方取雄鴨就死人口上斷其頭以熱血灌口中并

以竹筒吹其下部極則易人氣通下即活同上
尸厥之病卒死而脈猶動聽其耳中循循如哺聲而

股間暖是也耳中雖然哺聲而脈動者故當以尸厥
大效同以管吹其左耳中極三度復吹右耳三度活

聖藥錄同以管吹其左耳中極三度復吹右耳三度活
吹卒復蘇不蘇者以薑膏貼兩耳孔頭盡合氣二均

鼻并粟坐壅吹豆管中吹之令氣盡吹之吹小管吹

宋書漬脚水中醫心方吹之聖藥錄尤好同上

金匱要略礬石湯治脚氣衝心礬石二兩右一味以
漿水一斗五升煎三五沸脚良卷上中風

又救卒死而壯熱者方礬石半斤以水一斗半煮消
以漬脚令沒踝卷下雜療方煎之黃連兩枚絕衣溫

肘後方治卒心腹煩滿又胸脇痛欲死方以熱湯令
灼灼爾漬手足復易秘方卷一外臺卷七引備

又凡所以得霍亂者云云亦可作灼灼爾熱湯著甕
中漬足令至膝并銅器貯湯以著腹上衣藉之冷復

易卷二外臺卷七引備
清脚

又若兩臂脚及胸脇轉筋取鹽一升半水一斗煮令
熱灼灼爾漬手足在胸脇者湯洗之同上外臺
又治毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉煮適寒
溫以漬足令踝上有赤許水止之同上傷寒時
又方以稻糠灰汁漬足同上
又方酒煮大苦參以漬足差同上
又方鹽豉及羊尿一升搗令熟以漬之同上
又方細剉黃芩五斤以水三斗煮漬之亦治攻陰腫
痛同上
又方作坎令深三赤少容兩足燒坎令熟以酒灌坎
中着履踞坎中雍勿令泄同上

又方煮羊桃汁漬之雜少鹽豉尤好同上
又方煮馬矢若羊矢汁漬同上
又方搗常思草絞取汁以漬足同上
又方猪蹄一具合葱者去滓內少鹽以漬之同上
又治卒厥逆上氣又兩心脇下痛滿淹淹欲絕方溫
湯令灼灼爾以漬兩足及兩手數易之也同上
又若腫從脚起稍上進者入腹則煞人治之方小豆
一斛煮令極爛得四五斗汁溫以漬膝已下日二為
之數日消盡若已入腹者不復漬但煮小豆食之莫
雜喫飯及魚鹽又專飲小豆汁無小豆大豆亦可用
如此之病十死一生急救之同上

又方。削楮或桐木。煮取汁以漬之。并飲少許。加小豆妙。同上卅九

又方。煮鼓汁飲。以淳傳脚。同上醫說患赤目。以熱水濯足佳。若澡浴必致失明。切不可食犬雞魚。我鳥鴨卵。卷四十八

又曾有人得脚弱病。方書羅列積藥如山。而疾益甚。余令屏去。但用杉木為桶。濯足及令排樟腦於兩

股間。以脚棚擊定。月餘而安健如故。同卷九引

脩真秘訣。遇夜濯足臥。同卷九引本草衍義。熱湯助陽氣行經絡。患風冷氣痺人。多以湯滌脚至膝上。厚覆使汗出周身。然別有藥。亦終假

湯氣而行也。四時暴泄利。四支冷。臍腹疼。深湯中坐。浸至腹上。而頻頻作。生陽佐藥。無速於此。虛寒人始

坐湯中。必戰。仍常令人伺守。卷四十八

又杉作屑者。火汁浸洗脚氣腫滿。今處處有。同卷九

又治傷寒汗不溜。搗却手脚。海蛤。川烏頭各一兩。川

山甲二兩。為末。酒糊和丸。大一寸許。捏扁。置所患足

心下。臂手旁。白蓋藥。以帛纏定。於暖室中。取熱水浸脚

至膝上。久則水溫。又添熱水。候遍身汗出。為度。凡一

二月。一次浸脚。以知為度。同卷十七
又白頸蚯蚓。自死者良。然亦應時而鳴。此物有毒。云
云。後數日。又有人被其毒。博識者。教以先飲鹽湯。

盃次以鹽湯浸足乃愈。同上。又治頭目風，荆芥穗、細辛、川芎等為末，飯後點三錢。風搔遍身，濃煎湯淋涼，或坐湯中。同十九、五、八、夕。醫方考：目疾者，戒沐頭，宜濯足。崐謂此二句者，先醫之格言也。太極之道，動而生陽，靜而生陰。沐頭則上動矣，必生陽而損目。足夫濕氣難乾，乘風而梳拂不已，則風濕壞于首，而併于目。甚者至於喪明。此沐頭之宜戒也。然何以宜濯足也？足太陽之經，根于足之小指端，上貫乎睛明。足少陽之經，根于足大指岐骨間，上貫于瞳子。足陽明之經，根于足中指內間，上貫于承泣。易曰：水流濕，火就燥。若能以溫水濯其兩

足，則頭目間之熱邪亦能引之而下。况夫溫濯之餘，腠理疏泄，又足以瀉經中之邪，是亦去病之一助也。故曰宜濯足。卷五。計如泥塗足心，緩下便急洗去。蕘病回春，如汗不出，用紫蘇葉煎湯，以器盛於被內，於腳腕下薰之，用生薑渣綿布裹，周身擦之，其汗自出。卷二。傷寒門九味羌活湯方後。

先友清川吉人有溫湯漬腳方，載其著梧陰鎖問雜記中，當併攷。一兩，右為末，每服半兩，用生葱白

煎汁調成膏，厚作餅子，約徑寸半，開左患貼左腳，右患貼右腳，貼在足掌心內，用舊絹片緊扎定於密房中，無風處，待子午時，用湯一盆，將有藥脚浸於

湯中、用小心人扶病人、若汗出、即急去了藥、出汗遍
身、麻木即輕減、漸至無事、此妙不可言。卷三
治滿口生瘡、此因虛雍、上攻口舌生瘡、草烏一個、南
星一個、生姜一塊、右焙乾為末、每服二錢、臨睡時、用
醋調掩子。○掩子、疑貼手心、脚心、來日便效。卷四
又治小兒急慢驚風、一方方後、每服三圓、金銀薄荷
湯化下、次用生朱砂調塗病兒脚中心妙。同卷中
本草衍義、胡大蒜也、鼻衄爛研一顆、塗兩足心下、纔
止便拭去。卷十九
本草綱目、胡貼足心、能引熱下行、治泄瀉暴痢及乾
濕霍亂、止血血。卷二十六
胡主治

又嘗有一婦、衄血一晝夜不止、諸治不效、時珍令以
蒜傅足心、即時血止、真奇方也。同上
又咽喉口舌生瘡者、以茱萸末醋調、貼兩足心、移夜
便愈、其性雖熱、而能引熱下行、蓋亦從治之義也。同
卷三十二
吳茱萸發明

雞峯方、立愈散、治鼻衄不止、朱砂、鵬砂、牙消各壹錢、
右為細末、醋煮麵糊和元、如麻粒大、遇衄時、先用新
汲水洗兩脚心、淨、次用蒜二片、研如泥、貼在脚心上、
次一藥元、貼在蒜上、却以紙裹定、立地擡頭、三次、立
止。卷十
婦人良方、如聖膏、治難產、兼治胞衣不下、兼治死胎、

用草麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞衣即下速
洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腸自縮入如聖之
妙一方男用七粒女用十四粒一方用草麻子百
粒雄黃末一錢同研並用如前法卷十七
諸毒暗末細研黃雌雞味天味麻味大薑四種以酒
釀麥大益愈用酒或鼻血不五葉少雞心酒餘薑雞
湯北下次用藥更發用塗病兒胸中妙同卷十七
野合真對轉煉而強自應中研蓋根發或云是也
又歐氣口古去香香以葉莫末調脂胡兩只心味交
絲制製以明細血出真香若出而七能獨煉及乾
文香前下熱血味二畫亦有不燥不燥都令以

塗頂法 藥治通義卷九摩頂及塗顛條當參攷

本草綱目、蔓菁菜子葉同功其味辛氣溫能溫能散
其用長於行血滯破結氣云云又治小兒驚風貼其
頂顛則引氣上出也卷廿六蔓菁菜發明

良卷五

范汪方治諸卒腫風掣痛方末芥子溫湯和塗命上
以貼然復易不堪其痛熱者小塗之已試良

塗頂法

用草麻子七粒去殼細研成膏塗脚心胞衣即下速
洗去不洗腸出却用此膏塗頂上腸自縮入如聖之
妙一方男用七粒女用十四粒一方用草麻子百
粒雄黃末一錢同研並用如前法卷十七

頁鰓限民屎土出出卷廿六薑薑發明

其用身交并血帶如誤屎云云又云小兒驚風胡其
本草際目薑薑藥干葉同如其和辛屎監指監指

空頁去藥六區美卷五學頁及空鰓新當參以

婦人良方紫蘇葉飲藥中宜兼取梗大能下氣首卷藥物法度

傳芥子法不箇陳薄荷荷薑香研並葉併用

肘後方癰腫雜効方療熱腫以家芥子并栢葉搗傳
之無不愈大驗得山芥更妙又搗小芥子末醋和作
餅子貼腫及癩癰數看消即止恐損肉此療馬附骨
良卷五

范汪方治諸卒腫風掣痛方末芥子温湯和塗帛上
以帖煖復易不堪其痛熱者小塗之已試良醫心方

細

本草綱目薑葉氣味辛温無毒卷十四

荆芥

圖經述世醫家治頭風虛勞瘡疥婦人血風等為要

傳芥子法

藥并取花實成穗者暴乾入藥亦多單用効甚速
證類本草卷二十八廿

本草衍義假蘇荆芥也只用穗卷十九

本草綱目時珍曰荆芥原是野生今為世用遂多栽

時二月布子生苗炒食辛香方莖細葉似獨帚葉而

狹小淡黃綠色八月開小花作穗成房房如紫蘇房

內有細子如葶藶子狀黃赤色連穗收採用之四集

種論因莖葉下紫色而麻甚香夏結莖葉枯實其

又莖穗氣味辛溫無毒同上

薄荷

圖經夏秋採莖葉暴乾古方稀用證類本草卷

醫人夏之氣藥種... 薄荷香... 藥中... 夏秋採莖葉暴乾古方稀用

本草綱目莖葉氣味辛溫無毒卷十四 九十一ノ

藿香

本草綱目時珍曰藿香方莖有節中虛葉微似茄葉

潔古東垣惟用其葉不用枝梗今人併枝梗用之因

葉多偽故耳卷十四 廿 餘且下利不止手足

又枝葉氣味辛微溫無毒同上

茵陳蒿

圖經五月七月採莖葉陰乾證類本草卷七 廿七ノ

本草綱目莖葉氣味苦平微寒無毒卷十五 廿五

按方今市人荆芥茵陳等多證類本草醫家亦恬不

之省竟無識莖葉併用者余往年稍知其不然因

證治要訣陽氣... 入少陰者或... 倦時自煩不... 衣屬大此水胡湯... 卷二

取本草檢之絕無單用實之說世習而不察仍有此弊耳

本草綱目蓋葉厚而苦平燥寒無毒

圖經云用時其葉嫩者為佳

時二苗刺苦而甘炒食辛香方莖細葉似獨活葉而

艾林葉厚而辛燥無毒同并德成房房如紫蘇葉

葉多細枝耳秦十四款黃赤色連穗枚采用之時

藥古東亞針用其葉不用其根令人并林野根之因

本草綱目謂之曰實香古蓋有腹中重葉嫩以試葉

薑香

本草綱目蓋葉厚而辛燥無毒

朱奉議治少陰病用柴胡湯
活人書少陰屬腎古人謂之腎傷寒也腎傷寒口燥
舌乾而渴固當急下大抵腎傷寒亦多表裏無熱但
苦煩憤鬱而極不欲見光明有時腹痛其脈沈細
雀巢用四順湯古人恨其熱不堪用云腎病而體猶有
熱者可服仲景四逆散若已十餘日下利不止手足
徹冷乃無熱候可增損四順湯
又少陰病若惡寒而踈時時自煩不欲厚衣者用去
大黃大柴胡湯

同上○傷寒論少陰篇第九條云少陰病惡寒而踈時時自煩欲去衣被

景者可治發熱用麻黃湯

又問仲景少陰四逆湯又有四逆散何也答曰大抵

證治要訣陽氣傳

入少陰者或惡寒而

倦時自煩不欲厚衣
屬大柴胡湯
卷二

朱奉議治少陰病用柴胡

卷二
本氣大也
射甲自取不格
人心創首左亞以寒而
登空要楚周屏

少陰病不可便用熱藥且如少陰病亦有表熱者仲
景謂之晚發熱用麻黃細辛之類以發汗終不成少
陰病便不得發汗耶今少陰病四肢冷亦有內熱者
仲景用四逆散是也四逆湯用附子乾薑而四逆散
主四逆而其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或
泄利下重已上病皆熱證耳同上枳芍味下止全反
又陰證腹痛即四逆散通脈四逆加芍藥湯同卷十
又寒毒入胃者四逆湯理中湯白通湯加附子四逆
散加薤白主之同卷十一又
又少陰泄利下重不可投熱藥先濃煎薤白湯內四
逆散緣四逆散用枳實芍藥之類又尋常胃中不和

腹中腸鳴下利生薑瀉心湯最妙此二法不特傷寒
證也同上中少尸一寔客忤鬼擊手飛尸遁尸風尸沈
又少陰病小便不利者四逆散加茯苓也同上十才

桃人單方
腰痛用桃人
鯽魚治水
腫又治痢

用鹽四方

用獾肝諸方

心痛用桂心當歸

心痛用黃連旋子

心痛用桃人

就蟲用鶴虱

樞子治十日蟲

誘就法

用黃今一味

鯽魚治諸瘡

羊蹄根治疥瘡

生地黃治諸瘡瘍

椒葉治癰腫諸瘍

姓娘息補麴麥芽

產後血暈用醋

解毒藥宜冷服

少陰病不可便用熱藥且如少陰病亦有表熱者仲
 景謂之晚發熱用麻黃細辛之類以發汗終不成少
 陰病便不得發汗取今少陰病四肢冷亦有內熱者
 仲景謂之四逆散是也四逆湯用附子乾薑而四逆散
 主四逆而其人多欲飲水性或不便利或腹中痛或
 泄利下重已上病皆宜證耳其下利者
 又陰證腹痛助四逆散通脈四逆加芍藥湯治諸
 又寒毒入胃者四逆湯中湯白通湯加附子四逆
 散心氣痛小數不寐者四逆散加枳實芍藥散
 證也四逆散利心重不可投熱藥先服煎雞白湯內四
 逆散中級氣石味坐薑薑以散是疑也此三書不特對寒

醫酉與子管錐卷八目錄

卒死中惡尸一覽客忤鬼擊手飛尸遁尸風尸沈

尸注伏尸急三物丸散及裴表公骨並在後備急

用鹽方死尤良亦可用獾肝諸方附獾瓜中惡

及尸心痛用桂心當歸又自心痛用黃連施子

心痛用桃人

梘子治寸白蟲時兼誘虻法

用黃芩一味用大黃鯽魚治諸瘡用黃芩

羊蹄根治疥癬生地黄治諸瘡瘡

椒葉治癰腫諸瘍妊娠忌神麴麥芽

產後血暈用醋解毒藥宜冷服本所能

桃人單方
 腰痛用桃人
 鯽魚治水
 腫又治痢

朝又字麻
鱈魚字水
朝字用麻入
林入單字

牛涎治噎反胃
反胃滯塞治湯水

茯苓杏仁甘草湯治胸中有瘀血者
長

杏人有治血之功
雞肉者汁益血液

鬼太不可起女用大黃
附痢病亦不可妄用大黃說

不可妄服藥
金石藥之戒

芳香藥不可多服久服
附小兒服腦麝

心藏用封心當離
心藏用黃連赤石

用鹽水
用鹽水

氣五方口

卒死中惡氣一變客忤鬼擊飛尸遁尸風尸沈尸

通百病天宮雜卷八目錄

又令卒死中惡尸履客忤鬼擊飛尸遁尸風尸沈尸

又令尸注伏尸
治法當攻本書茲不贅
虛也應死

肘後方又有備急三物丸散及裴公膏並在後備急

藥條中救卒死尤良亦可臨時合用之凡卒死中惡

及尸變皆天地及人身自然陰陽之氣忽有乖離否

隔上下不通偏竭所致故雖涉死境猶可治而生緣

氣未都竭也當爾之時兼有鬼神於其間故亦可以

符術而獲濟者
卷一
其京地

又客忤者中惡之類也多於道間門外得之令人心

腹絞痛脹滿氣衝心胸不即治亦殺人
同上
五才

又扁鵲治忤有救卒符并服鹽湯法恐非庸世所能

卒尸中惡心尸履是客忤鬼擊飛尸遁尸風尸沈尸注伏尸

注文本事方卷一
日七

尸即身中屍鬼接引也。共為病害。經術甚有消滅之方。而非世徒能用。今復撰其經要。以救其敝。同法

又尸注鬼注病者。葛云。即是五屍之中尸注。又按諸鬼邪為害也。其病變動。乃有三十六種。至九十九種。大略使人寒熱淋瀝。怵怵默默。不的知其所苦。而無慮不惡。累年積月。漸就頓滯。以至於死。死後復傳之旁人。乃至滅門。覺知此候者。便宜急治之。同上

又金卷十七得本事方卷七

病源候論。中惡候。目尸厥候。卒忤候。又名鬼擊候。飛尸候。遁尸候。沈尸候。風尸候。注尸候。注候。伏尸候。並見廿三卷。文繁。故想彈者。因而難。

千金翼。凡中尸者。飛尸。遁尸。風尸。尸注也。今皆取一方治之。卷廿七灸飛尸法。十六才。

本事方。葛洪云。鬼症者是五尸之一云云。卷七十三全文見

後癩肝條。茲不具錄。

醫說引本事方。卷四。文同上。升水二升。和攪飲。

醫方考。凡感臭穢瘴毒。暴絕者。名曰中惡。不治即死。宜燒炭火一杓。以醋沃之。令患人鼻受醋氣。則可復甦。既甦。以感冒門。薰香正氣散主之。卷六火醋。薰鼻法。

又凡遇屍喪。翫古廟。入無人所居之室。及造天地鬼神壇場。歸來暴絕。面赤無語者。名曰尸症。亦曰鬼症。即中惡之謂也。進藥便死。宜移患人東首。使主人焚

香北面禮拜之更行火醋熏鼻法則可復甦否者七
 竅逆血而死東土禮拜法謂者曰我欲飲日界我
 又月界氣變精古應公無入酒界之望及登天世界
 獲相識以恩冒門等者五屏諸主之續論九種
 宜整患人之計以酒飲之令患人鼻受酒屏傾下
 通鼻之氣月息長淋毒毒藥味香各口中惡不吐咽
 通鼻之氣本草之類如此候始服宜急治之續論
金鑑十七本事卷七
續論形勢不具卷七
 本律法論心經云眼耳皆鼻在口半降候夜全文
 卷十七本事卷七
 卷十七本事卷七
 千金翼中候者飛只應風只我也冷皆取一

續論用鹽方身交廉蒸氣息入其赤白及熱氣到
 金匱要略食食食多不消心腹堅滿痛治之方鹽一
 升水三升右二味煮令鹽消分三服當吐出食便差
卷下表裏相廉鹽法二年吳太醫一升食鹽以蒸
 肘後方鬼擊之病云云又方鹽一升水二升和攪飲
 之并以冷水喫之勿令即得吐須更吐即差卷下水
 又卧忽不寤云云又方以鹽湯飲之多少約在意上
續論食鹽之法非受始本經之方當以服
 又治卒中五尸云云又方乾薑桂分等末之鹽三指
 撮熬令青末合水服之即差同上方無火煎湯
 治卒心痛方敗布裏鹽如彈丸燒令赤末以酒一盞
用鹽方

極鹹塩湯三升熱飲一升刺口令吐宿食使盡不吐
更服吐訖復飲三吐乃住靜止此法大勝諸治俗人
以為田舍淺近法鄙而不用守死而凡有此病即須
先用之卷廿七○三因方卷十一文畧同
陳藏器曰生熟湯味鹹無毒熱塩投中飲之吐宿食
毒惡物之氣臚脹欲為霍亂者覺腹內不穩即進一
二升令吐得盡便愈亦主痰瘧皆須吐出痰及宿食
調中消食證類本草卷五
醫方考三因吐法燒鹽十兩熱飲十五升三飲而三
吐之○按三因方全據千金文欲吐不得吐欲瀉不
得瀉腹中大痛者名曰乾霍亂令人暴死急以此方

探吐之鹽鹹物也多則苦矣經曰鹹能軟堅故可以
開宿食頑痰若能湧泄故探之則易吐矣此法能回
生起死幸勿輕而忽之卷二
又鹽湯探吐法燒鹽四合温湯二升和勻飲之以指
探吐飲食自信胃膈飽脹宜以此法吐之同卷四
又木櫛兩脇大痛脉大者此方主之同上
又法諸腹痛連于脇膈手足冷脉來伏匿者此方主
之同卷五

而無處不惡累生積月漸就傾瀉以至於死死後復
傳之旁人乃至滅門雖見其候者便宜急治之衣履
所一具陰乾獨末水服方寸七日三末差更作此云

神良卷二十七外臺卷十三更并散云

千金方江南度世丸主萬病癥結積聚伏尸長病寒熱瘧氣流行皮中久病著牀肌肉消盡四肢煩熱嘔逆不食傷寒時氣惡症汗出口噤不開心痛方蜀椒三兩人參細辛甘草各二兩茯苓真珠大黃乾薑丹砂野葛桂心雄黃鬼白麝香各一兩烏頭牛黃各三分附子紫苑各六分巴豆六十枚蜈蚣二枚右二十味末之蜜丸飲服小豆大二丸加至四九日二加獼肝一具九良卷十七廿九又治疰病相染易及霍亂中惡小兒客忤長病不獼肝一具雄黃莽草丹砂鬼白犀角巴豆各一兩麝香

一分大黃牛黃各一兩蜈蚣一枚右十一味末之蜜

丸空腹服如麻子大二丸加至三丸以知為度同上

廣濟療瘦病每日西即弄色脚手酸疼口乾壯熱獼

肝丸方獼肝六分炙天靈蓋燒四分生犀角四分犀

前胡四分升麻四分松脂五分枳實炙四分甘草五

分炙右八味搗篩蜜和丸如梧子空腹以小便浸鼓

汁下二十九日再不利外臺卷十三

文仲論傳屍病亦名痲瘡疽注骨蒸伏連殭殭此病

多因臨屍哭泣屍氣入腹連綿或五年三年有能食

不作肌膚或三日五日若微勞即發大都頭額頸骨

間尋常微熱翕然死復家中更染一人如此乃至

滅門療之方。獺肝一具，破乾炙。鼈甲一枚，炙。野狸頭一枚，炙。紫苑四分，漢防已一兩半，蜀漆洗，麥門冬去心，甘草炙，各一兩。右八味，搗篩，以成鍊，殺羊腎脂二分，合蜜一分，烱冷，和丸。藥如梧子大，服十九，加至十五丸。日再，以飲下之。其藥合和訖，分一分頭邊著一分懸門額上，一分繫臂上。先服頭邊，次服臂上。次服門上者，大驗。同上。世少部立心不實，失四德，甘草五分。古今錄驗：犀角丸，療百病。鬼疰，惡風入人皮膚，淫淫液液，流無常處，四肢不仁，牽引腰背，腹脹滿，心痛，逆氣填胃，不得飲食，噎噎短氣，寒熱，羸瘦，喜惡夢，與鬼神交通，熱效，唾膿血，皆療之。方：犀角屑，桂心，各三分。

羚羊角屑，生黃，鬼臼，附子炮，獺肝炙，各二分。巴豆三十枚，去心皮，熬，蜈蚣四枚，去足炙，麝香研，真珠，雄黃，研丹砂，研各四分。射干一分，貝齒十箇，燒。右十五味，搗篩，蜜和，搗五千杵。平旦服，如胡豆二丸。日三。同上。延年療鬼氣骨蒸，氣日漸羸。方：獺肝十六分，炙。人參沙參，丹參，各三分。鬼臼，苦參，各二分。右六味，搗篩，蜜和丸。如梧子大，一服十九，飲汁下。日三服，加至十九。

同上。四下十九。惡。藥。

本事方。葛洪云：鬼疰者，是五月之一疰云云。此與

同。宣和間，天慶觀一法師，行孝校極精嚴，時一婦人投狀述患，人有崇所附，須臾召至，附語云：非我為。

禍別是一鬼亦因病人命衰為祟爾渠今已成形在
患入肺中為蟲食其肺系故令吐血聲師掠之曰此
蟲還有畏忌否久而無語再掠之良久出容其說抄
本出作云惟畏獺爪屑為末以酒服之則去矣患家
其作某
如其言而得愈此予自抄本所見也究其患亦相
似獺爪者殆獺肝之類歟卷七十一
本草黑字獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止
久嗽燒服之未詳
藥性論獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣咳嗽勞
損疾尸疰瘦病其骨治嘔不止證類本草卷
藥對獺肝平同上

孟詵云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具
炙末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下
酒水脹但熱毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食
益虛腫甚也只治熱不治冷不可一槩爾同上
日華子云獺肝治虛勞并傳尸勞疾同上
圖經其肉性寒主骨蒸熱勞血脉不行營衛虛滿
及女子經絡不通血熱大小腸秘澁然消陽氣不
益男子宜少食五歲及肉皆寒惟肝溫主傳尸勞
服極四肢寒瘡虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆葉定
數定惟此肝一月一葉十二月十二葉其間又有
退葉用之須見形乃可驗不爾多偽也張仲景有

治冷勞癩肝丸方又主鬼症一門相染者取肝一
 具火炙之水服方寸七日再崔氏治九十種蠱症
 及傳尸骨蒸伏連殮殍諸鬼毒癘疫等癩肝丸二
 方俱妙同上
 食療患咳嗽者燒為灰酒服之肉性寒無毒
 本草衍義肝用之有驗
 李時珍曰殺蟲本草綱目卷五十一
 本草備要吳鶴自率曰癩陰物晝伏夜出故治鬼
 蛙昂謂不然緣其肝獨異于他獸也
 婦人良方卷五癩肝圓文長不錄
 五藏心賦刊主武賦賦一門未患者心刊一具

心痛用桂心當歸大方中用此二味者不為鮮今唯載單捷者

肘後方治卒心痛桂末若乾薑末二藥並可單用温

酒服方寸七須臾六七服差卷一廿〇外臺卷七引備急文小異

又方好桂削去皮搗篩温酒服三方寸七不差者須

臾可六七服無桂者末乾薑佳同上廿五

又方桂心八兩水四升煮取一升分三服同上廿六〇外臺卷七

又方吳茱萸五合桂一兩酒二升半煎取三升分三服

服效同上大三火滿心同上

又方桂心當歸各一兩梔子十四枚搗為散酒服方

寸七日三五服亦治久心痛發作有時節者也同上

心痛用桂心當歸同上

臺卷七引肘後名桂心散文全同

又方桂心二兩烏頭一兩外臺有炮字搗篩蜜和為丸一

服如梧子大三丸漸加之同上外臺卷七引肘後名桂心丸餘煩同

千金友先有冷心痛疾者倍當歸加桂心三兩隨風

湯方後

必効療心痛方當歸末酒服方寸匕頻服外臺卷七

又療蝟心痛茱萸丸友吳茱萸一升桂心二兩當歸

二兩右三味搗篩蜜和丸如梧子酒服三十九日再

服漸加至四十九以知為度同上七文

相炎之崇采心當歸末為論冷桂心二兩並同單用監

心當歸桂心當歸大為論冷用此二和者不

心痛用黃連梔子

大方中用黃連梔子者多今唯舉單捷者

肘後方治卒心痛方黃連八兩以水七升煮取一升

五合去滓溫服五合每日三服卷一計外臺卷七引古今錄驗名黃連

湯文畧同

又方桂心當歸各一兩梔子十四枚搗為散酒服方

寸七日三五服亦治久心痛發作有時節者也同上

外臺卷七引肘後文畧同名桂心散二兩當歸

二兩生薑五兩桂心二兩柴胡二兩朱砂一兩研湯

成下麝香一分研湯成下朴消二兩研湯成下大黃

三兩麝香切別浸湯欲熟內之右三味切以水九升

急火煮取三升溫分三服如人行相去六七里服但

心痛用黃連梔子

心痛用黃連散
臺卷七列附後名桂心散文全用

又方桂心二兩烏頭一兩○外臺搗篩蜜和為丸

服如梧子大三丸漸加之○外臺卷七列附

千金方先有冷心痛疾者倍當歸加桂心三兩○外臺

○代臺卷十代根對文畧同各桂心婚

長沙縣三石眼香藥水心賦寶升符類經曾連○外臺

又方桂心當歸各六兩莖至廿四味煎為膏○外臺

二兩定製同場歸蜜和丸如梧子酒服三十九日再

盧合苦辛溫服去合苦各三眼○外臺卷十

相對大冷卒心賦文黃連八兩以水十升煮取一升

心賦用黃連蘇子○外臺卷十

去藥心痛用桃人限酥出於心蘇赤艾葉再眼○外臺

肘後方治卒心痛方桃人七枚去皮尖熟研水合頓

服良亦可治三十年患卷一廿五○外臺卷七引必効

去皮大兩人熟右一味研湯水

崔氏療心腹痛不可忍似疰病者或暴得惡疰攪刺

欲死桃人大黃湯方鬼箭羽二兩桃人六十枚去皮

尖兩人芍藥四兩鬼臼二兩削去皮橘皮二兩當歸

二兩生薑五兩桂心二兩柴胡二兩朱砂一兩研湯

成下麝香一分研湯成下朴消二兩研湯成下大黃

三兩麝切別浸湯欲熟內之右十三味切以水九升
急火煮取三升溫分三服如人行相去六七里服但
心痛用桃人

得快利三四行必差。春時對人。掛臺卷七十九里眼卧
廣濟療心痛癥塊硬築心氣欲絕當歸湯方當歸桔
梗芍藥各八分厚朴五分炙橘皮八分人參六分高
良薑五分桃人五十枚去皮尖兩入生薑八分右九
味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服服別
相去如人行六七里進一服不利同上十九對去文
又療心刺肋冷氣結痛不能食高良薑湯方高良
薑五分當歸十分橘皮八分厚朴十分炙桔梗八分
桃人五十枚去尖皮兩入碎吳茱萸八分生薑八分
訶梨勒五分右九味切以水八升煮取二升八合絞
去滓分溫三服服別相去如人行六七里再服同上十八

又療心痛心撮肋心悶則吐血手足煩疼食飲不
入桃人九方桃人八分去皮尖兩入熬當歸六分芍
藥八分訶梨勒六分甘草六分炙延胡索四分人參
六分檳榔人十四枚右八味搗篩蜜丸如梧子以酒
空腹下二十九漸加至二十九日再服取快利同上

及男子元氣婦人血氣並宜服之桃人拾枚右細研
如膏以酒二斗淘漉取汁錯中以燂火煎成膏每於
食前溫酒調下一茶匙 卷廿

千金方治風勞毒腫疼痛急或牽引小腹及腰脚
痛方桃人一升研如常法以酒三升攪和頓服之厚
衣蓋令汗不過三劑 卷廿二

得快利三四行必差
廣濟療心痛癥塊硬築心氣欲絕當歸湯方當歸桔
梗芍藥各八分厚朴十分炙橘皮八分人參六分高
良薑五分桃入五十枚去皮尖兩入生薑八分右九
味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服服別
相去如人行六七里進一服不利加上一升
空煎不二劑其漸減至二十日再服更速其效
此方蘇蘇入十四粒或八粒書藉密氏咳蘇長以函
藥公之商集膏六分南草藥五分或或或或或或或
不熱入式衣將入水食去其六兩者或當羅六分
文藥少龍又破蘇則四開限均命未又或或或或或
不

桃人單方

雞峯方桃仁酒治咳嗽右以桃仁三錢去皮尖搗爛
著器中密封頭蒸一炊曝乾以絹袋盛內二斗酒中
六七日可飲四五合稍增之卷十又夫亦可服同
又桃人煎治疝瘕氣心腹疼痛肌膚瘦弱面无顏色
及男子元氣婦人血氣並互服之桃人拾枚右細研
如膏以酒二斗淘濾取汁錯中以燂火煎成膏每於
食前溫酒調下一茶匙卷廿
千金方治風勞毒腫疼痛急或牽引小腹及腰脚
痛方桃人一升研如常法以酒三升攪和頓服之厚
衣蓋令汗不過三劑卷廿二
桃人單方

婦人良方治婦人漏下不斷方桃仁燒灰細研食前
温酒調下二錢卷一
又桃仁煎療萬病婦人產後百病諸氣方桃仁一千
二百枚去皮尖及雙仁熬令黃色右一味擣令極細
熟以上等酒一斗五升研三四遍如作麥粥法以極
細為佳納小長項瓷餅中密塞以麵封之納湯中煮
一伏時不停火亦勿令火猛使餅口常出在湯上勿
令沒之熟訖出温酒服一合日再服丈夫亦可服卷同
十八原出產寶卷中文小異
蘇峯大將二酉試如煉石以林三三錢去及大試關
婦人單方

腰痛用桃人

證治要訣腰者腎之所附皆屬腎有寒有濕有風有
虛皆能作痛有閃挫勞役而痛者宜生料五積散加
炒桃仁五枚卷五
又腰痛如鋸刀所刺大便黑小便赤黃或黑由血滯
腰間名瀝血腰痛桃仁酒調黑神散同上

千金方治風勞毒腫疼痛變急或牽引小腹及腰髀
痛方桃人一升研如常法以酒三升攪和頓服之厚
衣蓋令汗不過三劑卷廿二
婦人良方夫腎主於腰女人腎臟繫於胞絡若腎氣
虛弱外感六淫內傷七情皆致腰痛古方亦有五種
腰痛用桃人

之說如風腰痛宜小續命湯加桃仁杜仲煎服脾胃
氣滯及寒濕腰痛者五積散加桃仁如虛損及五積
腰痛者青娥圓袖應圓諸方並皆可用也如氣滯腰
痛如神保圓黑牽牛茴香橘核必有功也卷四
千金方宗周發毒藥及諸藥內有寒濕腰痛者宜用
藥間各熱血頭眩目眩耳鳴耳聾耳鳴耳鳴耳鳴耳鳴
又難說吐酸及竹陳大黃黑牽牛黃連白芍藥白朮
炒蘇子五苓散酒服一合日再服丈夫亦可服
五積散治諸症有閉結等症而試者宜用五積散
證亦要知要者宜用之竹陳大黃黑牽牛黃連白芍藥
白朮

甄氏用蘇人

又蟲虻蟲用鶴虱積柳湯方鶴虱二兩小兒用一

廣齊瘕九種心痛蛔蟲冷氣先從兩肋背撮痛欲

變吐當歸鶴虱散方當歸八分鶴虱八分橘皮六分

人參六分檳榔十二分枳實六分炙芍藥六分桂心

五分右八味搗篩為散空腹者薑棗飲服方寸七日

二服漸漸加至一七半不利外臺卷七三才三兩

又療諸蟲心痛無問冷熱蛔蟲心痛檳榔鶴虱散方

當歸桔梗芍藥橘皮鶴虱各八分人參六分桂心六

分檳榔八分右八味搗篩為散空腹者薑棗湯服

方寸七漸漸加至二七不利同上四才

又主心腹攪結痛不止仍似有蛔蟲者當歸湯方當

歸湯用歸五

歸橘皮細辛甘草炙生薑各四分大黃八分別漬鶴
 蟲二分右七味切以水六升煮取二升分溫三服如
 人行四五里進一服不利未差三日更作服之調服
 張文仲療蛔蟲心痛鶴蟲散方鶴蟲二分末溫醋一
 盞和服之蟲當出同前法
 延年療蛔蟲吐水心痛鶴蟲丸方鶴蟲三兩搗篩
 蜜和為丸用蜜漿水平日服二十九日只一服調在
 又鶴蟲丸療蛔蟲心痛方鶴蟲六兩吳茱萸五兩橘
 皮四兩桂心三兩檳榔四兩右五味搗篩蜜和為丸
 如梧子大一服二十九日二服加至三十九日
 以蟲出為度同前法
六夕

必効療蛔心痛鶴蟲檳榔湯方鶴蟲二兩小兒用一
 兩大腹檳榔二十七枚切碎皮子右二味以豬肉汁六
 升煮檳榔取三升去滓內鶴蟲末先夜不食明旦空
 腹頓服之須臾病下及吐水永差神效同上八才
 延年療心痛冷痛腹滿如錐針刺及蟲啣心痛當歸
 湯方當歸三兩桔梗二兩吳茱萸三兩桂心三兩芍
 藥二兩大黃二兩右六味切以水六升煮取三升三
 合去滓內鶴蟲一兩攪溫一沸分三服空腹服之微
 利為度同上九夕
 廣濟療心痛三十年不差耳上旬殺蟲雷丸鶴蟲散
 方雷丸八分鶴蟲八分貫眾八分狼牙八分桂心八

分當歸八分、檳榔八分、右七味、搗篩為散、空腹煮
蜜水半雞子許、服方寸匕、日二服、若重不過三服、則
差不利、同上十九分、服不利、未差三日、更作服之

崔氏療虬蟲方、波斯鶴虱三兩、右一味、搗散、以肥猪
羊肉、但得一色、以葱豉為臙汁、每旦空腹、以臙汁和

一方寸匕、頓服、稍多飲臙汁佳、云云、同卷廿六、
全文載後、

廣濟療蛔蟲方、白蟲五、檳榔十二分、當歸鶴虱、蘇美

熬橘皮各六分、貫衆、雷丸各四分、右七味、搗散、空腹

煮大棗湯服、方寸匕、日二服、漸加至三七、微利、無忌

必同註、四十九、
雷丸、
蘇美、
二兩、小兒用一

千金方、治虬蟲攻心腹痛方、苦酒、空腹服方寸匕、鶴

虱佳、卷十八、
方寸匕、
四十九、
枚、
皮、
以月七旬

且平野革裕一夕醫話論古鶴虱即今西洋所用之

施面支那喜多村香城翁曰亦今世洋船齋來稱

施面支那者、覈其形狀、主治即古鶴虱也、晉唐方
選卷三

救延年鶴注近日友人森立之著鶴虱攷、並互參攷、然

啖之能食、意佳、不能者、但啖五十枚、亦得經宿蟲消

自下、無忌、同上、同

千金療寸白蟲、為水瀉出、永除、方、榧子、檳榔、蘇美等

分、右三味、為散、溫酒服、二錢匕、先燒牛肉、肺、喫後服

藥也、同上、
注、
○今本千金無攷

藥也 同上 武林 ○ 今本中全無也

公古三和為精 區酉 照二 雞心 夫熱半肉 翻喫 對照
千金 藥卡 白 蟲 為 水 寫 出 亦 斜 衣 蘇 千 賢 淋 蕪 蕪 等
自下無忌 同上 獸

突之 須食 盡 對 不 指 昔 野 知 五 十 林 亦 野 醫 醫 醫 醫
味 息 藥 白 蟲 又 太 取 蘇 千 一 百 林 去 史 只 只 對 本 然

集 魏 白 蟲 用 蘇 千 烏 照 也 壽 卷 卅 六 集 魏 貫 眾

聖卷卅六 昆 同 獸

且 空 照 照 十 林 十 日 照 盡 由 能 取 水 亦 益 蘇 卅 八 ○ 代
十 金 衣 宗 十 白 蟲 衣 蘇 千 四 十 衣 林 去 史 以 昆 土 質

蘇 千 衣 宗 十 白 蟲

代 集 卷 卅 十 下 白 蟲 蘇 卅 六

誘 虻 法

肘後方 治 心 痛 多 唾 似 有 虫 友 取 六 畜 心 生 切 作 木
四 瓣 刀 縱 橫 各 割 之 以 真 丹 一 兩 粉 肉 割 中 且 悉 吞
之 入 雄 黃 鹿 射 香 佳 卷 一 十 七 聖 卷 卅 六 先 契 肥 香 脯 一

救 急 療 心 痛 不 可 忍 似 蛔 者 胡 粉 丸 方 後 云 先 以 猪
肉 脯 一 片 空 腹 啖 蘇 汁 勿 蘇 肉 後 取 胡 粉 和 胡 麻 搜

作 丸 以 少 清 酒 使 成 頓 服 盡 十 歲 以 上 斟 酌 增 減 外 臺

卷 七 十 七

必 效 鶴 蟲 檀 榔 丸 湯 方 後 云 右 二 味 以 猪 肉 汁 六 升 煮

檀 榔 取 三 升 去 滓 內 鶴 蟲 末 先 夜 不 食 明 旦 空 腹 頓
服 之 須 更 病 下 及 吐 水 永 差 同 聖 卷 卅 六 衣 取 首 无

誘 虻 法

肘後療蛔蟲或攻心痛如刺口中吐清水方取有子
棟木根剉以水煮取濃赤黑汁用米煮作糜宿勿食
旦取肥香脯一斤先喫令蟲聞香舉頭稍從一口為
度始少進自後食一匕食半升糜便下蛔秘不傳同卷
并六甲○今本肘後無及意以土樽酒曾飲
崔氏療虬蟲又方波斯鶴虱三兩右一味搗散以肥
猪羊肉但得一色以葱豉為臠汁每服空腹以臠汁
和一方寸匕頓服云云同上甲子
必效療蛔蟲方菘豆三升煮取濃汁麻子一大升研
取汁一升以下然後取彊半升和豆汁一升更煖令
溫溫正發即炙羊肉脯令熟先含薑汁三五噉即服

之須臾即吐出或利其蟲已消如帛練帶三二百條
如未盡更服節永絕同走○此大昔尋一尺許數
肘後療白蟲方淳漆三合猪血三合右二味相和微
火上煎之不著手成宿勿食空腹旦先喫肥香脯一
片服如大豆許一百丸日中蟲悉出亦主虬蟲同并
○今本肘後無及○馮出永除方○崔氏療白蟲
崔氏療白蟲諸方不差方云云又取乾脯肥者如手
大一片細剉以水四升漬之一宿明旦煮取一升去
滓分三服如人行十里久每欲服先嚼脯一片然後
飲藥并令人以手按所患人腹令藥易宣都服了有
頃當日○程本便蟲出服藥以月一至五日以前是

蟲頭向上服之得力無問多少皆得出盡若疑蟲未盡更合一劑永愈同上又方云云至如明旦欲服藥今日午後便不得食仍須先嚼一片肥乾脯嚥汁然後服藥服一劑去蟲不盡停一日更作服一劑永差後六月勿食膾臠魚肉必效同上備急葛氏療蟻蟲攻心如刺吐清汁方搗生艾汁宿不食平旦嚼脯一片令蟲聞香後飲汁一升當下蟻蟲同上肘後療三蟲方茱萸根取東引指大者長一尺枯樓四兩切右二味細剉茱萸根以酒一升漬之二宿且

空腹先喫脯然後頓服之小兒分再三服亦療寸白蟲同上

備急療三蟲方藿蘆四兩炙乾漆二兩熬吳茱萸四

兩右三味為末依前先嚼脯以粥清服方寸七

服秘要法同上

千金療寸白蟲為水瀉出永除方榧子檳榔蕪荑等

分右三味為散温酒服二錢七先燒牛肉脯喫後服

藥也同上今本千金無此藥

千金方治虻蟲方藿蘆末以飲臞和外臺引服方

寸七不覺加之卷十八外臺引服方

又治寸白蟲方熬錫令速速燥作末羊肉臞以藥方

寸七、內臆中服。同上。錫作錫無一速字。外臺卷廿六引。又方、胡麻一升、胡粉一兩、右二味為末、明旦空腹、以猪肉臆汁噉盡之、即差。同上。外臺卷廿六引。

金匱心典甘草粉蜜湯注云、毒藥即錫粉雷丸等殺蟲之藥、毒藥者拈之以其所惡也、甘草粉蜜湯

者、誘之以其所喜也、自粉即鉛白粉、能殺三蟲、而雜於甘草白蜜之中、誘使蟲食、甘味既盡、毒性旋

發、而蟲患乃除此、藥醫之變詐也。卷下。按尤。昔然誘蟲之義、則古方。因揭于茲。

昔然誘蟲之義、則古方。因揭于茲。黃芩一味、卷九黃芩湯。治五擊條。

○大凡毒藥... ○醫人... ○...

用黃芩一味 卷九黃芩湯

深師療鼻衄去五歲熱氣結所為或吐血者方黃芩

四兩右一味切以水五升煮取二升分三服亦療婦

人漏下血外臺卷三

聖濟總錄治血妄行或衄或蟻獨聖湯方黃芩去黑

心伍兩右一味細剉如麻豆大每服七錢匕水二盞

煎至一盞去滓溫服卷七十血蟻汁九

本草綱目李時珍曰予年二十時因感冒欬嗽既久

且犯戒遂病瘵蒸發熱膚如火燎每日吐痰益許暑

月煩渴寢食幾廢赤脉浮洪遍服柴胡麥門冬荆瀝

諸藥月餘益甚皆以為必死矣先君偶思李東垣治

用黃芩一味

婦人良方引本草
方作霹靂酒調下

肺熱如火燎煩躁引飲而晝盛者氣分熱也宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火遂按方用片芩一兩水三鍾煎一鍾頓服次日身熱盡退而痰嗽皆愈藥中肯啓如鼓應桴醫中之妙有如此哉卷十三山草類下黃芩參及明
本事方治崩中下血方黃芩為細末每服一錢燒秤錙酒調下崩中多是用止血藥補血藥此治陽乘陰前所謂天暑地熱經水沸溢者卷十
婦人良方凡血崩之疾亦有陰陽冷熱之不同不可誤藥用藥僕常療一婦人崩漏暴下諸醫投薑桂附子等藥服之愈甚召余診之六脈緊數遂用此藥兼

局方龍腦雞蘇圓數服即安本事方單用黃芩者亦此意也卷一金華散方後伏龍肝龍下黃土也生薑
傷寒總病論鼻衄或吐血下血黃芩湯黃芩肆兩以咀水三升煮一升半溫飲一盞兼治婦人漏下血不止卷三

又葛氏右慈核腫結不肯散者搗餅以傳之
又葛氏大人小兒卒得惡瘡不可名識者臘月猪膏一升亂髮如雞子大如蠟形以生鱗魚一頭合煎令消盡
又內雄黃苦參末二兩
又附子一枚末絞令凝

肺熱如火燎煩躁引飲而書感者氣分熱也宜一味
 黃芩湯以瀉肺經氣分之火遂按方用片苓一兩水
 三鍾煎一鍾頓服次日身熱盡退而痰嗽皆愈藥中
 青礬如鼓應桴醫中之妙有如此哉卷八
 本事方治崩中下血方黃芩為細末每服一錢燒研
 益下血未崩中多是用止血藥補血藥此治陽乘陰
 兩方則水三升煮一棰半煎服之連服兩日試下
 熱寒熱之病能自止也此血津血黃芩參黃芩兩方
 地黃山藥一金華清心丸崩漏暴下諸醫皆投黃芩
 忌食諸雜雞鷄固煨服而安本事方單用黃芩香煎

○婦人血分本事
 方作黃芩湯

又治鯽魚治諸瘡

勝於已錄互參看
外集卷八十一卷

肘後方乳癰方大黃茵草伏龍肝竈下黃土也生薑
 各二分先以三物搗篩又合生薑搗以醋和塗乳痛
 則止極驗劉涓子不用生薑用生薑四分分等余比
 見用鯽魚立驗此方小品佳卷五○外薑用生薑
 者是文見下三○香廣受藥七六散韻一杖可三和
 又葛氏若惡核腫結不肯散者搗鯽魚以傅之同上
 又葛氏大人小兒卒得惡瘡不可名識者臘月猪膏
 一升亂髮如雞子大如鴨子一枚作生鯽魚一頭合煎
 令消盡不難止又內雄黃苦參末二兩方作又
 內末雄黃雌黃各二兩大附子一枚末絞令凝作攪凝以
 鯽魚治諸瘡

身卷廿二
 味苦小水味鹹之
 赤小豆末五合古二和
 出太陰魚肉生血
 下合則更赤血
 祝壽壽年百歲
 兒未滿百日外
 丹赤炎野間
 又赤小兒天靈

又治小兒天竈大丹病從脾胃間起小兒未滿百日犯行路空君若熱流下令陰頭赤腫血出方鯽魚肉到五合赤小豆末五合右二味和搗少水和傳之良卷廿二

傳諸瘡無不差胡洽療癰疽疥大效同上卷十七別葛
千金方治小兒頭不生髮方燒鯽魚灰末以醬汁和傳之卷五下

又治癩疽著手足肩背勿發累累如赤豆剥之汁出者方鯽魚長三寸者亂髮雞子大猪脂一升右三味煎為膏傳之卷廿二

又治久疽方鯽魚破腹勿損內白塩於腹中以針縫之於銅器中火上煎之令乾作末傳疽瘡中無膿者以猪脂和傳之小疼痛勿恠也十日差同上

五引鯽魚 醫心方卷十七別葛

又治惡瘡十年不差似癩者方燒鯽魚灰和醬清傳之同上

備急葛氏乳癰方大黃竈下黃土各一分末生薑二分右三味搗末醋和塗乳痛即止極驗劉涓子不用

生薑用生魚三味等分余比用鯽魚妙外臺卷三十

僧深方凡得惡腫皆暴卒初始大如半梅桃或有核或不核或痛或不痛其長甚速須臾如雞鴨大即不治之腫熱為進煩悶拘攣腫毒內侵填塞血氣氣息不通一再宿便致人鯽魚搗薄腫上醫心方卷六

又方噉鯽魚膾蒜豉同上

大醫心方卷十七別葛

聖惠方治小兒白
禿瘡久不差方
方少異可攷

又治小兒天癩
丹病從膏用
兒未滿百日
下今陰頭赤
赤小豆末五合
和傳以水知傳之
良卷廿二

葛氏方云治卒毒氣攻身或腫或赤或痛或痒淫亦
分散上下周匝煩毒欲死方取生魚切之如膾以塩
和傳之通身赤者務多作令竟病上千復易之鮓魚
為佳同卷十七
樣要方丹腫方生鯽魚肉搗如泥塗之
剛繁方治癬及疥等乱髮膏方乱髮如鴨子大二枚
鯽魚一頭雄黃二兩八角附子一枚苦參一兩猪膏
一枚凡六物前搗附子三物為末猛火煎猪膏鯽魚
令盡內末藥傳瘡上
治小兒白禿葛氏方云燒鯽魚末以醬汁和傳之
又試惡瘡

雷庵神效

治小兒鬼舐頭方產經云乱髮如鴨子大二枚酢鯽
魚一頭苦參一兩附子一枚雄黃二兩猪膏四升凡
六物搗篩下用膏煎髮魚令盡內諸藥末絞之傳瘡
上良同土
廣利方療小兒面上忽生瘡黃水出方鯽魚一頭燒
作灰和醬汁塗上
錄驗方治小兒眼茫茫不見物方魚膽付且鯉鮓等
良同土
治小兒治雀目新錄方云鯉魚鮓魚膽付並良同土
本草拾遺云鯽魚鮓主小兒大人丹毒同土

聖惠方治小兒白
疳積蘇沈良方

本草註黃魚鱗為鱗生或說其味甘丹毒疔...
崔氏療丹毒或發背及諸腫方搗鯽魚敷之數數易
之良外臺卷三十

肘後療卒得侵淫瘡轉廣有汁多起於心不早療之

繞身周匝則能殺人友取鯽魚長三寸者以少豉合

搗塗之亦療馬鞍瘡若先起四肢漸向頭面者難療

也又取鯽魚油煎去魚塗之外臺卷廿九

集驗療卒毒氣攻身或腫或赤痛或痒并分散上下

周匝煩毒欲死方取生鯽魚切之如鱠以鹽和搗遍

塗瘡上乾復易之此為侵淫瘡也同上

口附錄

千金方治癰疽中風寒...
千金翼治婦人
治下乳汁...
方

和皮巴豆填滿腹麻皮纏以一束稗草燒煙盡研粳

米粥元菘豆大米飲下二元未利盡劑乃安甚者破

者尤効速忌動風物卷廿二按此方原見蘇沈

肘後療患腸痔每大便常有血方常食鯽魚羹及蒸

隨隨意任之外臺卷廿六

本事方續集治腸風痔漏鯽魚一个右將魚破開去

盡腸入白礬各令滿瓦上燒過並為細末用鷄毛捲藥

傳之立效卷七

洪氏集驗方龍遊有患背疽已潰如碗面大視五

臟僅隔薄膜耳自謂必死有用大鯽魚一枚剝去腸

乾糝之瘡口遂收至今無恙卷二

乾糝之瘡口遂收至今無恙卷二
其方集錦之方請述百患背既已竟咬時回大財五
轉以立效科校注瘡腫瘡有六多起於心不早療之
盡照入百瘡各命命五製成並與時末用藥生藥藥
本惠不藥集六製成並與時末用藥生藥藥
諸諸意到心已盡卷六六之妙情
開於瘡患顯者云天更常存立天常食鱸魚羹及蒸
香試候盡去連風水類水
卷張子集豆大末煨和長天末味盡隨入安其首如
宋文子豆其燕頭和文燕以白末草熱敷盡燕燕

口附錄

千金方治癰疽中風寒熱腹中絞痛不可針灸方
千金翼治婦人
治下乳汁鯽魚湯方

鯽魚治水腫又治痢

雞窠方逐水散消腫滿生章陸赤豆各叁兩鯽魚叁
个右三味實魚腹中以麻線縛之水三升煮赤豆爛
去魚只取二物空腹中食之以魚汁送下不汗利即
差甚者過二日再作之不過三劑貴戚家乳姥病水
飲之一劑即愈卷十九

又凡服乳石者覺食不下兼躰弱乏氣力即食鮮鱠

鮮鯽魚右剝去鱗破去腸血勿洗之但用新布二三

條淨拭令血脉斷依常切鱠法作羹不使羸但用椒

薑醬等尤佳益人下食亦療氣利及冷利神效

蘇沈良方治水氣腫滿法張微之屢驗生商陸切作

鯽魚治水腫

千金翼卷第八
口所驗

豆大赤小豆如商陸之多，鯽魚三尾去腸存鱗，右二物實魚腹中，取線縛之，水三升，緩煮，赤豆爛，取去魚，只取二物，空腹食之，以魚汁送下，不汗利即差，甚者過二日再為之，不過三劑，微之家乳媪病水，飲一劑愈。美其音盛三日再非之不過三劑貴熱寒冷數寐水

去田中道乃曰禁口痢不能納藥汁者，鯽魚為泥和，先哲法

鮮家之酒水醋能驅寒生章，刺赤豆各三兩，鯽魚三

鯽魚水

鯽魚水，鯽魚二頭，刺赤豆各三兩，鯽魚三

羊蹄根治疥癬

治久癩，治久癩疥濕瘡，浸淫日廣，癢不可堪，搔之黃

汁出，差後復發方，羊蹄根淨去土，細切，熟熬，以醋和

熟搗，淨洗瘡，傳上一時間，以冷水洗之，日六次，又陰乾

作末，瘡時搔，汁出以粉之，又以生葱根搯之。注千金翼無葱

又治細癬方，蛇牀子，白鹽一作白堊，羊蹄根各一升，

赤葛根，苦參，昌蒲各半升，黃連，莽草各三兩，右八味，

以水七升，煮取三升，適寒溫，以洗身，如炊一石

米頃為佳，清澄後用，當微溫之，滿三日止。同卷廿二更

又方，羊蹄根於磨石上，以苦酒磨之，以傅瘡上，當先

羊蹄根治疥癬

刮瘡以火炙乾後傳四五過注千金翼云搗羊蹄根以白蜜和之
刮瘡令傷先以蜜和者傳之如炊一石米久拭去更以三年大醋和塗之若刮瘡處不傷即不差
今本千金翼文小異

又方羊蹄根五升以桑柴灰汁煮四五沸洗之凡方中用羊蹄根皆以日未出採之佳

又治癬方搗羊蹄根和乳塗之同上

千金翼治癬秘方搗羊蹄根分以白蜜和之刮瘡四

邊令傷先以蜜和者傳之如炊一石米頃拭去更以

三年大酢和塗之以傳癬上燥便差若刮瘡處不傷

即不差卷廿四

秘方作搗羊蹄根分著甕中以白蜜和之先引千金翼與醫心方同

又治諸瘡癬瘰不差方特牛尿壹升羊蹄根切伍升

右貳味內羊蹄漬一宿日暴之乾則內尿中漬一宿

尿盡止搗作末塗諸瘡癬上和猪脂用更精同上

又治癩疥濕瘡浸淫日痛癢不可堪癢之黃水汁出

差復發方取羊蹄根勿令婦女小兒猫犬見之淨去

土細切熟熬以大酢和淨洗傳瘡上一時間以冷水

洗之洗之日一傳凡方中用羊蹄根皆以日未出前

採者佳同上

又方作羊蹄根散瘡時搔汁出以粉上又以生根搯

之神驗同上

深師療癬秘方雄黃一兩研硫黃一兩研羊蹄根一

兩白糖一兩荷葉一兩右五味以後三種搗如泥合五種更搗和調以敷之若強以少蜜解之令濡不過三差外臺卷三十 四十五才

集驗療疥方搗羊蹄根和猪脂塗上或者少鹽佳同上

卅ノ五十一才

范汪方治癬濕方取羊蹄根細剉數升以棗新灰汁煮四五沸校去滓以汁洗創醫心方卷十七九

僧深方云治蝸癬浸淫日長痒痛搔之黃汁出差復發方日未出時北向取羊蹄根勿令婦人小兒見洗去土切搗淳苦酒和洗瘡去痴以傅上一時間以冷水洗之日一傳又可取根搯之神良日未出取者不

欲影加根上同上十

槎要方療濕癬方右以日未出時採取羊蹄根其根須獨並不得有杈枝不得令見風切搗為末和殺羊酪著少鹽於日中曝兩食久以塗癬上同上

范汪方治疥方羊蹄搗根猪脂和塗或小与鹽同上

洪氏集驗方治癬羊蹄根切作片右至五更初先以布揩癬上即取羊蹄根爛嚼止用汁塗後以其片揩之將冷水嗽口及洗手初用藥時忌不得語欲氣勿洩也卷四

又癬藥白礬飛過一兩黃丹半錢白藥子半兩右為細末旋搗羊蹄根獨脚者一根取自然汁調藥先用

布擦解微破用藥傳之同上

此藥... 治諸瘡瘍... 凡有瘡瘍... 宜用此藥... 其效如神... 凡有瘡瘍... 宜用此藥... 其效如神...

又治火瘡敗壞方柏白皮生地黄蛇銜黃芩梔子人苦竹葉各二分右六味咬咀以羊髓半升煎之

三上三下去滓冷瘡上差止同上

生地黄治諸瘡瘍

千金方治腕折四肢骨碎及筋傷蹉跌方生地黄不限多少熟搗用薄所損傷處注肘後方云小品方爛

編夾裏令遍縛令急勿令轉動一日可十易三月差若血聚在折處以刀子破去血卷廿五卅二〇

外臺卷廿九引千金文小異

又治被打傷破腹中有瘀血方生地黄汁三升酒一升半煮取二升七合分三服注肘後方治從高墮下

死者同上卅三〇今本肘後無攷又醫心方引千金與本文畧同

肘後療卒從高墮下瘀血脹心面青短氣欲死方生

地黄搗取汁服一升或二升尤佳外臺卷廿九同按今本肘後无攷

生地黄治諸瘡瘍

近效療墜損方。生地黄一斤，分為三分，右每服取一分，熬令焦黃，以酒半升，煎一兩沸，絞去滓，令溫暖，得所食前日三，無所忌。馬墜亦療之。同上 煎
肘後療腕折，四肢骨破碎，及筋傷蹉跌方。爛搗生地黄，熬之，以裹折傷處，以竹片夾裹之，令痲病上，急縛勿令轉動，一日可十易，三日即差。同上 抄
卷十八引葛氏方
云：腕折，四支破，骨碎，及筋傷，跌方，熟搗生地黄，以薄折上，破竹簡編之，令竟病上，急縛之，一日一夕，十易，地黄三日後則差。

許仁則療吐血及墮損方曰：此病有兩種，一者外損，一者內傷。外損因墜打壓損，或手足肢節，眩頭項傷折，骨節痛不可忍，覺內損者，須依前內損法服湯藥。

如不內損，只傷肢節，宜依後生地黄一味薄之法，及芥子蘇等摩之方。生地黄無問多少，淨洗搗碎，令爛熬之，候水氣盡及熱，以薄折處，冷即易之。如骨蹉跌，即依療折傷法，經縛兼薄羊腦生龜生鼠等法，為有所損，此不復載。如傷損處輕，搗芥子和蘇以摩傷處。云云，同上

集驗療火爛瘡膏方。栢白皮、生地黄、研各四兩，苦竹葉、甘草各四兩，右四味切，以猪脂一斤煎，三上三下，藥成，濾去滓，以摩瘡上，日再摩。同上
刪繁方。治火瘡灸瘡等膏方。栢樹白皮五兩，甘草一兩，竹葉三兩，生地黄五兩，凡四物切，綿裹，苦酒五合。

淹漬一宿用猪膏一升煎取竹葉黃為度去滓摩傳
瘡醫心方卷十八五

葛氏方治腕蹠倒踣有損痛處氣急面青者方干地
黃半斤酒一斗漬火温稍稍飲汁一日令盡之又方
搗生地黄汁二升酒二升合煮三沸分四五服又方
干地黄六兩當歸五兩水七升煮取三升分三服若
煩悶用生地黄一升代干者同上十八并

新錄云治頭破方生地黄不限多少熟搗薄傷處同上

十八并

樣要方療手脚折方取生地黄熟搗以傅折上破竹
木編之急縛之一日一夜十易地黄三日後則差同上

十八并

葛氏方卒從高落下瘀血振心面青短氣欲死方地
黃干生无在隨互用服取消同上十八并

小品方治從高墮下腹中崩傷瘀血滿斷氣方春生
地黃酒沃取汁稍服甚良同上十八并

醫門方療卒墮損筋骨蹉跌或骨破碎方熟搗生地
黃薄之日夜數易之若血聚者以針決去之同上
又方浸地黃酒飲之令酒氣不絕佳同上

樣要方療隋馬崩血腹滿短氣欲死云云新錄方云
搗生地黄封之同上

集驗方治妬乳方搗生地黄薄之熱則易同卷廿一五

小品方治妬乳方云生地黃汁以薄之同卷廿三

婦人良方卷廿三療產後妬乳并癰以地黃汁塗之即愈

肘後方小品方云云姚方搗生地黄傳之熱則易

小豆亦佳卷五

[Faded bleed-through text from the reverse side of the page]

椒葉治癰腫諸瘍

附錄卷五當參看

肘後方葛氏若已結癰使聚不更長方小豆末塗若

雞子白和尤佳即差若潰後膿血不止急痛取生白

椒葉十重貼上布帛寬縛之卷五

千金方治少小頭不生髮一物椒葉方椒葉搗取汁

傳頭上立生卷五下

又治癰腫痛煩悶方生椒葉十重帖之以帛包令緩

急得所日二易止痛兼消腫蝕膿甚良勝於衆物如

冬月先收乾者用時監潤之亦可薄削椒皮用之同卷

廿六文小異

外臺卷廿四引 杜六醫心方卷十五引

葛氏方云凡毒腫多痛風腫多痒按之隨手起或癰

椒葉治癰腫諸瘍

瘰癧軼皆風腫治之方楸葉菜浸水中以裹腫上醫心方卷

救急單驗方瘰癧瘡方煎楸枝菜淨洗瘡內孔中大驗同上廿七

崔元亮集驗方瘰癧毒腫不問硬軟取楸葉十重薄腫上即以舊白帛裹之日三易當重重有毒氣為水流在

葉中如冬月取乾葉塩水浸良久用之或取根皮剉爛搗之皆效證類本草卷十四梓白皮條下圖經引

葛常之韻語陽秋一人患發背腸胃可窺百藥不差一醫者教用楸葉膏傳其外又用雲母膏作小丸子服盡四兩不累日雲母透出膚外與楸葉膏相粘看

瘡口遂平功亦奇矣其方立秋日太陽未升之時採取楸葉熬為膏傳瘡瘍一切惡瘡腫毒立愈謂之楸葉膏續醫說卷九引名醫類案卷十引同

婦人良方卷十三
 千金卷二作神麴三升酢一升
 下同上
 程敬通曰按麥芽神曲墮胎如神凡有孕者不可
 妄用
 千金治妊娠得病須去胎方大麥麴五升酒一斗煮三
 沸去滓分五服令盡當宿勿食其子如糜米令母肥盛
 無疾者千金不傳卷二
 張路王曰酒煎麥麴不特下胎并能絕孕然必母
 神麴已心神麴麥芽

妊娠忌神麴麥芽

小品療妊娠得病事須去胎麥蘖一升末和煮二升

服之即下神效外臺卷三十三婦人良方卷十三千金卷二作和蜜一升服三下

又方七月七日法麴三升煮兩沸宿不食旦頓服即

下同上千金卷二作神麴三升酢一升

程敬通曰按麥芽神曲墮胎如神凡有孕者不可

妄用

千金治妊娠得病須去胎方大麥麴五升酒一斗煮三

沸去滓分五服令盡當宿勿食其子如糜米令母肥盛

無疾者千金不傳卷二

張路王曰酒煎麥麴不特下胎并能絕孕然必母

神麴已心神麴麥芽

氣素充故能勝任而服之反能肥盛無疾稍涉
無虛羸恐難輕試千金方衍義卷二

無定平公五期合重當節飲食其子咳痰令母明盛
千金方取腎味煎去明志大夫之酸正長面一十其大三
妄用

野燔通日與冬羊酥細製似吹嗽凡育孕者不可

下月六 千金卷二 蘇合香丸

又方十月十日去酸三升煮兩兼節不食且酸眼但

那之鳴下物咬似臺卷三十三 諸人第卷十三

小品蘇合散取蘇合香末一升末味煮二升

此散忌酥酪麥菜

產後血暈用醋

千金方治產乳運絕方含醋醋溼面即愈凡悶即溼
之愈 卷二廿一

又方取醋醋和產血如棗許大服之 同上 醫心方
待 全方治產後血暈心悶氣絕方驗醋 卷廿三引作千

崔氏凡暈者皆是虛熱血氣奔逆腹中空所致欲分

免者第一須先取酸醋以塗口鼻仍置醋於傍使聞

其氣兼細細飲之此為上法如覺暈即以醋噴面蘇

來即飲醋仍少與解之 外臺卷三十四 醫心方卷

言 悶暈汗出不識人者是暴虛故也取驗醋以塗口

其母秘錄云如覺暈即以醋噴面蘇合散

其面蘇合散末即令飲醋以醋噴面蘇合散

產後血暈用醋

子母秘錄云產後但迷不醒唇口冷已脉絕面青不語此是運鬼所出血氣上衝心方取駘醋二合鷄子大顆右先破鷄子於坩中煮醋一沸投醋於鷄子中就攪與產者頓服之立定醫心方卷廿三批實面籍本草衍義產婦房中常得醋氣則為佳酸益血也卷
 蜜丹醋蠶昔吳重燕血屎在血中空中竹煙粉
 一升天血血大眼
 金古治血血心開
 又衣頭酒醋味血血大眼
 三合
 千金方治產後血暈
 至發血暈用酒

解毒藥宜冷服

金匱要略凡煮藥飲汁以解毒者雖云救急不可熱飲諸毒病得熱更甚宜冷飲之卷下禽獸魚蟲并右第二十四
 備急凡此諸藥飲汁解毒者雖危急亦不可熱飲之待冷則解毒熱則不解毒也外臺卷三十四
 本草備要凡解毒藥並須冷飲熱則不效甘草條

解毒藥宜冷服

本草綱目卷之二十四
牛延治噎反胃
附錄卷二牛乳治膈噎當參攷
肘後方葛氏方取食噎不下方取老牛涎沫如棗核
大置水中飲之終身不復患噎

牛延治噎反胃 附錄卷二牛乳治膈噎當參攷

肘後方葛氏方取食噎不下方取老牛涎沫如棗核

大置水中飲之終身不復患噎 卷六十一才 外臺卷八引備急文畧同

八十

崔氏療食則吐或朝食夜吐名曰胃反或氣噎不飲

食數年羸削唯飲水亦同此方半夏六兩人參三兩

生薑一兩橘皮二兩杏仁頭糠一升綿裹牛涎一升

厚朴二兩羚羊角三兩右八味切以水八升煮取三

升分溫三服相去十里久欲頻服者可至三劑氣噎

病者胃閉不受食唯飲水水入吐出積年不差乃至

於死人間多有此病此方救療有效 外臺卷八

牛延治噎反胃

修月魯般經後錄千轉丹治反胃吐食等病牛涎半
斤好蜜半斤木別子三十个法作油皮右為細末牛涎
蜜一處於銀器內慢火熬用槐條七根衛生易簡攪
方作枝
之煨乾為度每和白粥兩匙日進三服醫方類聚卷
百四引
又引瑞竹堂方七根作七枝餘同
得效方香牛飲治硬噎翻胃吐食神效先以羯牛用繩掛開牛
口以淨布巾抹令口舌淨却拖牛舌出來候有涎出以椀盛之每服用
八分文盞為壹服研好麝香末一捻打勻却以銀盞盪令溫先以絹
帛束縛中脫胃口令極緊候氣喘乘熱解開隨氣喘一二口便
服藥時先對病人說煮白粥惱煩之并煎丁香汁和粥服藥
罷隨與粥喫同上引百四十九才

雞峯方昆布煎治胃膈滯氣食藥不下搯杵頭細糠
壹合昆布壹兩半末右二味用老牛涎一合生薑汁
一合二味以慢火煎入少蜜攪成膏搜前二藥元如
雞寶大不計時候含化一元細燕津卷二十

淺田栗園曰先輩治膈噎用老牛涎空附錄老涎飲方
見周士梅嬰兒論或曰孫思邈曰牛涎水服二匙終身不
噎余未詳其出典○業廣按牛涎治噎原見肘後文載
前千金方卷十六噎塞門亦云治諸噎方老牛涎束核大
水中飲之終身不復噎

修月曾服經後錄千轉丹治及胃吐食等病牛涎半
 斤好蜜半斤木別子三十个作油皮右為細末牛涎
 蜜水中煑之務使不乾蜜入煎用槐條七根生湯筒攪
 之服之其效甚速○此藥門下亦有說謂宜大寒半或寒效大
聲余未詳其出典○此藥昔時半此口聲京長州以之傳
得長岡三辨醫官傳述曰昔思驗百半其水煎二味然其下
口以麥田栗園白米半量空翻壹圓用半其量其下經其或煑其
發實大不惜翻辨合出二元略其煎製卷二福先以絹
厚合已二和豆豉大煎入水空煎丸膏製兩二藥元味
壹入豆豉而壹兩半末寸二和用去半或一合其量其
難家天長亦頗出皆顯紫屎食藥不可翻林更田蘇

茯苓杏仁甘草湯治胃中有痰血者

千金方治有痰血者其人喜忘不欲聞人聲曾中氣
 塞短氣方甘草一兩茯苓二兩杏仁五十枚右三味
 以咀以水二升煮取九合分二服卷廿五被打

刪繁療下焦虛寒損腹中痰血令人喜忘不欲聞人
 聲曾中氣塞而短氣茯苓丸方茯苓八分甘草七分
 炙杏仁五十枚熬令黃去皮尖人參七分厚朴五分
 炙乾薑七分黃耆六分桂心四分當歸八分芍藥五
 分乾地黄八分右十一味搗篩下蜜和為丸如梧子
 初服二十九加至三十九日再服清白飲進之外臺
卷六

茯苓杏仁甘草湯治胃中有痰血者

廿四ノウ

醫心方卷九治短氣方第三引醫門方云治胸中痞塞短氣膈者或腹急痛方茯苓四兩甘草二兩半復三兩生薑三兩杏仁百顆水七升煮取二升半去滓分溫三服相去八九里泄氣差若氣不下加大黃檳榔人取利為佳按此方雖無瘀血文以其類方記以備運用

此方以水二升煮取一升分二服
寒濕厚大甘草一兩茯苓二兩杏仁五十枚水三升
千金方試官寒血者其人喜忘不冷聞入鑿曾中康
將必杏仁甘草試官中官寒血者

杏人有治血之功

本草白字杏核仁味甘溫主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心賁豚

塞上方治墜馬撲損瘀血在內煩悶取東引杏枝三兩細剉微熬好酒二升煎十餘沸去滓分為二服空心如人行三四里再服

證類本草卷廿三杏核仁條

千金方治有瘀血者其人喜忘不欲聞人聲曾中氣塞短氣方甘草一兩茯苓二兩杏仁五十枚右三味

吹咀以水二升煮取九合分二服

卷廿五被打第三

三因方雞鳴散治從高墜下及木石所壓凡是傷損血瘀凝積氣絕欲死并久積瘀血煩躁疼痛叫呼不

杏人有治血之功

得並以此藥利去瘀血即愈此藥推陳致新治折傷
神效大黃壹兩酒蒸杏仁三七粒去皮尖右研細酒
一盞煎至六分如血裂去滓雞鳴時服次日取下瘀血
即愈若便覺氣絕不能言取藥不及急辟手口開以熱
小便灌之卷九十四

按千金方卷四月經不調第四杏人湯七熬圓等
並用杏人桃人互參攷

醫曹綱子正傳載雞鳴散云愚按此方用杏仁而不用桃
仁者蓋跌乃血入氣久故用杏仁以行氣中之血矣卷六

杏人百試百效

雞肉者汁益血液

素問藏氣法時論腎色黑互食辛黃黍雞肉桃葱皆

千金方下後當大虛口乾可作鷄羹飲五合千金卷十七

本草備要烏骨雞者煮汁飲益胃氣

云治胃氣虛之血液虛之枯涸者近日西洋家用

實民觀之

雞肉者汁益血液

卷二服寫湯利
言條當參

得並以此藥利去於血即愈此藥推陳致新治折傷
神效靈驗之旨兩酒蒸杏仁三七粒去皮大石研細酒
一匙昔至下紙指製醫書入鴉片散安煎藥下卷為
即去安胃虛重之血來氣之味所養血用西藥藥用
小藥藥取製藥高熱為月破奎濟收用藥肉十
本草前要寫骨藥香桂燈益胃厚唇人湯七熬圓案
此圖志發桃人豆參攷
十全大下對當大靈口薄何對藥書後退五合得
辛仁者蓋跌乃血入氣久故用杏仁以行氣中之血矣
素問靈犀法製藥習色黑宜食辛黃木藥肉林藥香
藥肉煮長益血來

卷十二服瀉湯利
害條當參

或老人不可妄用大黃

附痢病亦不可妄用大黃說

本事方昔後周姚僧坦名醫也帝因發熱欲服大黃
藥僧坦曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝不
從服之遂至不起及元帝有疾諸醫皆謂至尊至貴
不可輕脫宜用平藥僧坦曰脉洪而實必有宿食不
用大黃必無差理元帝從之果下宿食乃愈合用與
不用必心下明得諦當然後可卷八
醫說老人臟腑不可用大黃老人津液少所以秘澁
更服大黃以瀉之津液皆去須再秘甚於前只可服
寬潤大腸之藥如養生必用方二仁丸是也卷六引

六 抄錄不可妄用大黃
老人不可妄用大黃附痢病亦不可妄用大黃說

附痢病不可妄用大黃說

千金方素問曰春傷於風夏為膿血凡下多滯下也
夏傷於風秋必洞泄秋多下水也患是冷也夫積冷
積熱及水穀實而下者以大黃湯下之強人勿過兩
劑皆消息五六日更進一劑其補澀湯不效者三兩
日可進一劑卷野五帝炎之果不啻食之愈合風與
不按痢病固因熱毒侵腸則若疾未瘳氣湯桂枝加
附大黃湯河間芍藥湯吳氏檳芍藥湯類症有
靈奇効然在歲運有間不互下者世醫或不審諦其
本寒熱虛實之輕重用攻下而却招害者不鮮天保
庚子夏東垣在汴京郊痢病大行都下亦頗行時醫認

言對症
卷十二 痢症

八

為尋常痢病而用消黃遂不起者比比有之時八
月先君文孝公亦遇此疾而斃事在文孝公
病狀錄中攷仲景雖有下利用大承氣湯法必觀
積熱在腸胃而下之故云先以小承氣湯探之又
云得快利止後服竟非早下久下之義神聖而猶
慎下如斯今人之粗且漏而何反不慎之此可怪
也試取千金以下諸方書治痢者檢之其方數十
許內用大黃者不過僅數首茲知治痢不可無
大黃而必不可輕用也孫氏強人勿過兩劑消息
五六日更進一劑等語實可佩服公極養生之術
也夫為醫者當須先洞曉病源知其所犯以食治之

附刻病不可妄用大黃說

千金大黃湯不可妄用大黃說
夏大黃湯不可妄用大黃說
精持以風大黃湯不可妄用大黃說
刺也持以風大黃湯不可妄用大黃說
日直年攻積令人之味且器而可又不煎之此何全
苦野對時五對眼竟非早若不早藥味雖極酸
費時耗氣且固且平之姓去去以消官屬藥性有
亦難殺在效中曾見體本不味用本藥成藥也
只去去去去去去去去去去去去去去去去去去
為尋常藥而用則其藥效不效昔此地有之謂人

養生主論今則云無病服藥如壁中添柱余則云無病服藥乃無事生事也

是亦不可妄服藥藥治通義卷十一藥性皆偏條臣參商生事此誠

千金方仲景曰人體平和惟須好將養勿妄服藥藥

勢偏有所助令人藏氣不平易受外患卷廿六序論第一

又河東衛汎記曰扁鵲云人之所依者形也亂於和

氣者病也理於煩毒者藥也濟命扶危者醫也安身

之本必資於身救疾之速必憑於藥不知食宜者不

足以存生也不明藥患者不能以除病也斯之二事

有靈之所要也若忽而不學誠可悲夫是故食能排

邪而安藏腑悅神爽志以資血氣若能用食平痾釋

情遣疾者可謂良工長年餌老之奇法極養生之術

也夫為醫者當須先洞曉病源知其所犯以食治之

不可妄服藥

食療不愈然後命藥藥性剛烈猶御兵兵之猛暴豈
容妄發發用乖互損傷處眾藥之投疾殃濫亦然同上
亦六又聖人先用食禁以存性後制藥以防命也同五歲病五味
式對治法廿六本草衍義夫安樂之道在能保養者得之况招來和
氣之藥少攻決之藥多不可不察也是知人之生須
假保養無犯和氣卷一又善服藥不若善保養不善保養不若善服藥世有
不善保養又不善服藥倉卒病生而歸咎於神天噫
是亦未嘗思也同上

養生主論今則云無病服藥如壁中添柱余則云無病服藥乃無事生事也卷十

衛生寶鑑潔古老人云無病服藥乃無事生事此誠
不易之論卷一無病服藥辨

續醫說浙人柯敬仲陳雲嶠口從化三人自恃稟氣
強盛預防癰疽之患皆好服防風通聖散每日須進

一服以為快其後三人不及中壽之年無病暴亡噫
豈非好服涼藥太過銷燦元氣急無所救者歟欲求

益生反致殞命嗟夫張潔古有云無病服藥乃無事
生事可不戒哉卷四引楊太史山居新話

本草綱目李時珍曰艾葉蘇恭言其生寒蘇頌言其
有毒一則見其能止諸血一則見其熱氣上衝遂謂

其性寒有毒誤矣蓋不知血隨氣而行氣行則血散

曰公病中熱論曰中熱不洩者不可服五石石之為藥精悍公服之不得數洩亟勿服色將發臃遂曰扁鵲曰陰石以治陰病陽石以治陽病夫藥石者有陰陽水火之齊故中熱即為陰石柔齊治之中寒即為陽石剛齊治之臣意曰公所論遠矣扁鵲雖言若是然必審診起度量立規矩稱權衡合色脉表裏有餘不足順逆之法參其人動靜與息相應乃可以論論曰陽疾處內陰形應外者不加悍藥及鏡石夫悍藥入中則邪氣辟矣而宛氣愈深診法曰二陰應外一陽接內者不可以剛藥剛藥入則動陽陰病益衰陽病益著邪氣流行為重困於命忿發為疽意告之後

百餘日果為疽發乳上入缺盆死此謂論之大體也必有經紀拙工有一不習文理陰陽失矣

陳藏器曰水銀本功外利水道去熱毒入耳能食腦至盡入肉令百節癱縮到陰絕陽人患瘡疥多以水銀塗之性滑重直入肉宜謹之昔北齊徐王療癩瘡是病以金物火灸熨之水銀得金當出蝕金候金色白者是也如是數度並差也證類本草卷四

本草衍義紫白二石英當攻疾可暫煮汁用未聞久服之益張仲景之意只令吹咀不為細末者豈無意焉其久服更宜詳審卷四

又水銀入藥雖各有法極須審謹有毒故也婦人多

韓說又見後醫
說文小異

服絕娠今人治小兒驚熱涎潮往往多用經中無一字及此亦宜詳諦得鉛則凝得硫黃則結併棗肉研之則散別法煨為膩粉粉霜唾研斃虱銅得之則明灌屍中則令尸後腐以金銀銅鐵置其上則浮得紫河車則伏唐韓愈云太學博士李于遇信安人方士柳賁能燒水銀為不死藥以鉛滿一鼎按中為空實以水銀蓋封四際燒為丹砂服之下血比四年病益急乃死余不知服食說自何世起殺人不可計而世慕尚之益至此其惑也在文書所記及耳傳聞者不說今直取目見親與之游而以藥敗者六七公以為世誠工部尚書歸登自說既服水銀得病若有燒鐵

杖自顛貫其下摧而為火射竅節以出狂痛號呼乞絕其茵蓆得水銀發且止唾血十數年以斃殿中御史李虛中疽發其背死刑部尚書李遜謂余曰我為藥誤遂死刑部侍郎李建一旦無病死工部尚書孟簡邀我於萬州屏人曰我得祕藥不可獨不死今貴子一器可用棗肉為丸服之別一年而病後有人至訊之曰前所服藥誤方且下之下則平矣病二歲卒東川節度御史大夫盧坦溺血肉痛不可忍乞死金吾將軍李道古以柳賁得罪食賁藥五十死海上此可為誠者也斲不死乃速得死謂之智可不可也五穀三牲鹽醯果蔬人所常御人相厚勉必曰強食今

惑者皆曰五穀令人久當務減節臨死乃悔嗚呼哀也
也巳今有水銀燒成丹砂醫人不曉研為藥衣或入
藥中豈不違誤可不謹哉 同卷五

又水銀粉下涎藥并小兒涎潮痰癆多用然不可常
服久過多則其損兼行若兼驚則尤須審謹蓋驚
為心氣不足不可下下之裏虛驚氣入心不可治若
其人本虛便須禁此一物謹之至也 同上

又雌黃入藥最稀服石者宜審諦治外功多方士點
化術多用亦未聞其終始如何畫工或用之 同上

又石硫黃今人用治下元虛冷元氣將絕久患寒泄
脾胃虛弱垂命欲盡服之無不效中病當便已不可

盡劑世人蓋知用而為福不知用久為禍此物損益
兼行若俱弃而不用當倉卒之間又可闕乎或更以
法製拒火而又常服者是亦弗思也在本經則不言
如此服食但專治婦人不知者徃徃更以酒服其可
得乎或臟中久冷服之先利如病熱危急可加丸數
服少則不効仍加附子乾薑桂 同上

又陽起石如狼牙者佳其外不白如薑石其大塊者
亦內白治男子婦人下部虛冷腎氣之絕子藏久寒
須水飛研用凡石藥冷熱皆有毒正宜斟酌 同上

醫說士大夫服丹砂死者前後固不一余所目擊林
彥振平日充實飲噉兼人居吳下每以強壯自誇有

醫周公輔言得宋道方丹砂秘術可延年而無後害
道方洪州良醫也彥振信之服三年疽發於腦始見
髮際如粟越兩日鬚頰頰與背略平十日死方疾亟
時醫使人以帛漬所潰膿血濯之水中澄其下略有
丹砂蓋積於中與毒俱出也謝任伯平日聞人畜伏
火丹砂不問其方必求之服唯恐盡去歲亦發腦疽
有人與之語見其疾將作俄頃間形神頓異而任伯
猶未知覺既覺如風雨經夕死十年間親見此二人
可以為戒矣石林老人避暑錄 卷九服丹之戒
又醫之為術苟非得於心而恃書以為用者未見能
臻其妙如木能動鍾乳按乳石論曰服鍾乳當終身

忌木五石諸散用鍾乳為主復用木理極相反不知
何謂予以問老醫皆不能言其義按乳石論云石性
雖溫而體本冷重必待其相蒸薄然後發如此則服
石多者勢自能相蒸若要藥觸之其發必甚五石
散雜以衆一本藥用石殊少勢不能蒸須藉外物
激之令發爾如火少必因風氣所鼓而後發火盛則
鼓之反為害此自然之理故孫思邈云五石散大猛
毒寧食野葛不服五石遇此方即須焚之勿為含生
之害又曰人不服石庶事不佳石在身中萬事休泰
惟不可服五石散蓋以五石散聚其所惡激而用之
其發暴故也古人處方大體如此非此書所能盡也

况方書仍多偽雜如神農本草最為舊書其間差殊尤多醫者不可以不知也劉頴叔異苑又張中書慤自壯歲時無日不服丹砂暮年歸福州身體充臃飲啖加於人十倍其家困於供億獨一姪與婦竭力祇事張命以官每中夜苦饑但擊床屏須亟以饅頭非五十枚不飽茹菜必十把常食羊肉必五斤經年之後姪家為之朽空忽髮際生瘍浸淫及頂巍然若高阜結為三十六瘡旬餘爆裂有聲瘡翻而外向如人口反唇而卒庚志且服丹之過又服金石藥者潛假藥力以濟其欲然多諱而不肯言一旦疾作雖欲諱不可得也吳興吳景淵刑部服

硫黃人罕有知者其後二十年長子橐為華亭市易官發背而卒乃知流毒傳氣尚及其子可不戒哉泊宅

編 同上服金石藥之戒

又金液丹硫黃煉成乃純陽之物夏至人多服之反

為大患有痼冷則宜服泊宅編 同上金

又川人好服丹蓋西北方土厚人稟氣盛可勝丹不為所反南方魚鹽陰濕之地非宜服之大槩脾惡濕

腎惡燥久服損腎其害尤大瓊碎錄 同上

又服秋石久而成渴疾蓋鹹能走血血走令人渴不能制水妄行瓊碎錄 同上秋石不可久服

又太學博士李子干以進士為鄂岳從事遇方士柳泌

○必一作
實下同 從受藥法服之。徃徃下血。比四年。病益急。乃死。其法以鉛滿一鼎。以物按中為空。實以水銀。蓋封四際。燒為丹砂云。余不知服食。說自何世起。殺人不可計。而世慕向之。益至此。其惑也。在文書所記。及耳相聞傳者。不說。今直取目見親與之游。而以藥敗者六七公。以為世戒。工部尚書歸登。殿中御史李虛中。刑部尚書李遜。遜弟刑部侍郎建。襄陽節度使工部尚書孟簡。東川節度御史大夫盧坦。金吾將軍李道古。此其人皆有名位。世所共識。工部既食水銀。得病。自說若有燒鐵杖。自顛貫其下者。摧而為火。射竅節以出。狂痛號呼。絕其茵席。嘗得水銀。發且止。唾

血數十年。以斃。殿中疽發。其背死。刑部且死。謂余曰。我為藥誤。其季建。○季斬義作李一旦無病死。襄陽黜為吉州司馬。余自袁州還京師。襄陽乘舸邀我於瀟洲。屏人曰。我得祕藥。不可獨不死。今遺子一器。可用棗肉為丸服之。別一年而病。其家人至。訊之曰。前所服之藥。誤方。且下之。下則平矣。病二歲。竟卒。盧大夫死時。溺出血肉。痛不可忍。乞死。乃死。金吾以柳泌得罪。食泌藥。五十死海上。此可以為誠者也。蘄不死。乃速得人相厚勉。必曰強食。今惑者皆曰。五穀令人夭。不能無食。當務減節。鹽醃以濟百味。豚魚雞三者。古以養

老反曰是皆殺人不可食一筵之饌禁忌十常不食
二三不信常道而務鬼怪臨死乃悔後之好者又曰
彼死者皆不得其道也我則不然始病曰藥動故病
病去藥行乃不死矣及且死又悔嗚呼可哀也已

文而死見漁隱叢話同上月服硫黃

又侍其傳服水銀久之發瘡爬搔成赤疹水銀隨爪
出細如粟顆建炎中帥杭已昏不任事既罷疾革未
屬纏諸姬皆散不禁可為世戒泊宅編銀同

又江煥言馮悅御藥服伏火藥多腦後生瘡熱氣冉
冉而上幾不濟矣一道人教灸風市穴十數壯雖愈
時復作又教馮以陰煉秋石以大豆卷濃煎湯下

遂悉平和其陰陽也陰煉秋石法余昔有之沈陽所
傳是也大豆卷法大豆於壬癸日浸井花水中候豆

生芽取皮作湯飲之三槐王氏錄同土服

又馬軍帥雷世賢家貧官眉侍妾數十人出出成建

康上意聲色常餌丹砂乳藥以濟其欲既求諸蜀道

又多市金石珍品晝夜煎煉每日服食不去口使百

妾謹信者專掌之妾父自臨安來依其女雷以近舍

屋處之父苦寒泄不嗜食妾取雷所服丹十粒與之

父但進其半下咽未久覺臍腹間如火少馬熱不可

柰繞舍狂走且百匝後有井徑投其中家人救出之

遍身已突出紫泡如巨李經日皆陷凡泡處輒成一

穴深寸許叫呼六日而卒雷君平日所餌不啻千計
子無病惱此人才吞五粒旋喪其身亦異矣雷世賢丹
又王侁定觀者元符殿帥恩之子有才學好與元祐
故家遊范元實温潜溪詩眼中亦稱其能詩政和未
為殿中監年二十八矣眷注甚渥少年貴仕酒色自
娛一日忽宣召入禁中上云朕近得一異人能製丹
砂服之可以長生久視煉治經歲而成色如紫金卿
為試之定觀欣躍拜命即取服之才下咽覺胸間煩
躁之甚俄頃烟從口中出急扶歸已不救既殮之後
但聞棺中剝啄之聲莫測所以已而火出其內頃刻

之間遂成列焰室廬盡焚開封府尹亟來救之延燒
數百家方止但得枯骨于餘燼中亦可怪也范子濟云
上服丹自焚

又丁廣者明清里中老儒也與祖父為輩行嘗任保
州教授郡將武人而通判者戚里子悉多姬侍以酒
色沉縱會有道入過郡自言數百歲能煉大丹服之
可以飽嗜慾而康強無疾然後飛升度世守貳館之
以先生之禮事之選日初丹竈依其法煉之四十九
日而成神丸祝天置酒大合樂相慶然後嘗之廣聞
之裁書以獻乞取刀圭以養病身道人以其骨凡不
肯與守貳憐之為請僅得半粒廣欣然服之不數日

郡將通判皆疽發於背道人宵遁守貳相繼告殂廣
腰間亦生癰甚皇恐亟飲地漿解之得愈明年考滿
改秩居里中疾復作又用前法稍痊偶覺熱躁因溲
身水入創口中遂不得起金石之毒有如此者併書
之于此以為世誡同上丹發背疽

又宋道方毅叔以醫名天下居南京然不肯赴請病
者扶携以就求脉政和中田登守郡母病危甚呼之
不至登怒云使吾母死亦以憂去殺此人不過斥責
即遣人擒至庭下呵之云三日之內不痊則吾當誅
汝以狗衆毅叔云容為診之既而曰尚可活處以丹
劑遂瘡田喜甚云吾一時相困辱然豈可不刷前耻

乎用太守之車從妓樂酬以千緡俾群卒負手前增
以絲釀導引還其家旬日後田母病復作呼之則全
家遁去田母遂殂蓋其疾先已在膏肓姑宋以良藥
緩其死爾三說皆汝陰王明清餘話同上

本草綱目朱震亨曰石鍾乳為慄悍之劑內經云石
藥之氣悍仁哉言也凡藥氣之偏者可用於暫而不
可久夫石藥又偏之甚者也自唐時太平日久膏粱
之家或於方士服食致長生之說以石藥體厚氣厚
習以成俗迨宋至今猶未已也斯民何辜受此氣悍
之禍而莫之能救哀哉本草讚其久服延年之功柳
子厚又從而述美之予不得不深言也卷九鍾乳

又陽起石右腎命門氣分藥也下焦虛寒者宜用之
然亦非久服之物卷十本草通鑑唐憲宗紀柳泌至台州驅吏民采藥歲餘無
所得而懼舉家逃入山中浙東觀察使捕送京師
皇甫鏞李道古保護之上復使待詔翰林服其藥
日加燥渴起居舍人裴潯上言以為除天下之害
本者受天下之利同天下之樂者饗天下之福自黃
帝至文武享國壽考皆用此道也自去歲以來所
在多薦方士轉相汲引其數浸繁借令天下真有
神仙彼必深潛巖壑惟畏人知凡候伺權貴之門
以大言自銜奇技驚衆者皆不軌徇利之人豈可

信其說而餌其藥邪夫藥以愈疾非朝夕常餌之
物况金石酷烈有毒又益以火氣殆非人五藏之
所能勝也古者君飲藥臣先嘗之乞令獻藥者先
自餌一年則真偽自可辨矣上怒十一月己亥貶
潯江陵令

又穆宗紀初柳泌等既誅方士稍復因左右以進
上餌其金石之藥有處士張臯者上疏以為神慮
澹則血氣和嗜欲勝則疾疹作藥以攻疾無疾不
可餌也昔孫思邈有言藥勢有所偏助令人藏氣
不平借使有疾用藥猶須重慎庶人尚爾况於天
子先帝信方士妄言餌藥致疾此陛下所詳知也

豈得復循其覆轍乎今朝野之人紛紛竊議但畏忤旨莫敢進言臣生長蓬艾廩廩與遊無所邀求但粗知忠義欲裨萬一耳上甚善其言使求之不獲

此言曰血脈以氣為本氣和則血和氣不和則血不和血不和則其全百之藥有疾士氣自生養生之理以氣為本又賦宗脈者味必本氣和則士氣自和曰古之聖王蓋士氣之利同天正之樂也禮樂天下之禮自和自和之五限直為自和之樂也禮樂之天下之禮自和自和之五限直為自和之樂也禮樂之天下之禮自和自和之五限直為自和之樂也

世人芳香藥不宜多服久服 附小兒服腦麝

素問腹中論石藥發狂全文載前金石

又芳草之氣美石藥之氣悍二者其氣急疾堅勁故

非緩心和人不可以服此二者同上

本草衍義龍腦大通利關高熱塞其清香為百藥之

先大人小兒風涎閉壅及暴得驚熱甚濟用然非常

服之藥獨行則勢弱佐使則有功卷十四對本草三

又紫蘇味微辛甘能散其氣香今人朝暮湯其汁飲

為無益醫家以謂芳草致豪貴之疾者此有二焉脾

胃寒人飲之多泄滑往往人不覺同卷十四

活人書小兒尋常不可過當服涼藥胃冷虫動其證

芳香藥不宜多服久服

與驚相類，醫人不能辨，往往復進驚藥，如腦麝之類，遂發吐胃虛而成慢驚者多矣。卷三十一求但粗續醫說，太醫院院判劉公觀嘗侍太宗左右，大暑中，上方束一帶，乃片腦合成者，問觀曰：此帶何如？觀對曰：片腦性寒傷腎，惟有香耳，上處命解去。按本草云：片腦性大辛善走，故能散熱。今劉謂之性寒，何也？丹溪云：龍腦屬火，諸香皆屬陽，豈有至香之物而反寒乎？噫！劉觀漫言，蓋不學無術之過歟。卷四劉觀妄對

本草綱目注機曰：宋仁宗命翰林院定湯飲，奏曰：紫蘇熟水第一，以其能下胸膈浮氣也。蓋不知其次則泄人真氣焉。卷二十四列別八類

又李時珍曰：薰草芳散香，其氣辛散，上達故心腹惡氣，齒痛鼻塞皆用之。脾胃喜芳香，芳香可以養鼻是也。多服作喘，為能耗散真氣也。洞林子三

醫方攷蘇合香丸，世亦用此，防於初中之時，每每取効。丹溪謂辛香走散真氣，又謂腦麝能引風入骨，如油入麩，不可解也。醫者但可用之以救急，慎毋令人多服也。世醫

全書本草義：小兒痲病，俗謂驚風，身體柔脆，易感風邪，固矣。然小兒純陽之體，易生於熱，使腠理開張，風邪乘隙而投，則又所以易感風邪之由也。世醫遽投腦麝金石，若百服百死，竟為鴆毒，豈有當流傳其者乎。

亦必有用之收功于頃刻者所以世醫不復顧慮也
不知用之而當者乃小兒中實熱也證用之不當者
係小兒中虛熱之證斷不容其虛實而驟用之所以
同於鴆毒耳然小兒寒熱亦自有驅風散熱為治之
法備于仲景痙病原文中即風熱壅盛于內急為宣
通亦自有大承氣湯可與何必以腦麝散其真氣以
金石墜其真陽致起他變乎此世醫言驚風傳方之
所以多夭折生命也余不為明其故而但訾議之何
以服世醫之談驚風稱傳方者哉院定湯飲奏曰察
局方發揮夫口鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降血
隨氣上越出土竅法當補陰抑陽氣降則血歸經矣

可以輕揚飛竄之腦麝佐之以燥悍之金石乎
又夫治血以血藥治虛以補藥彼燥悍香竄之劑固
可以劫滯氣果可以治血而補虛乎

亦必有用之收功于頃刻者所以世醫固不復慮焉
不知用之而富者乃小兒中實熱之證用之不富者
係小兒中虛熱之證新不察其虛實而妄用之所以
同於鴆毒耳然小兒寒熱亦自有驅風散寒為治之
法備于仲景痲病原文中即風熱壅盛于內急為宣
通亦自有大承氣湯可轉何又以驅風散寒為治之
金石堅其直陽致起他變乎此世醫言痲風傳方之
所以多夭折生命也予不為明其故一但嘗讀之何

可與法帶涼果何以治血而散寒乎三

又夫論血以血藥攻毒以補藥散寒豈香竇之謂固
僅以神聖無算之謂哉試以藥詳之全



Kitasato Memorial Medical Library