

醫西方彙編

卷三

✕

-126

F 4
1-114

492
Ih
4

No 2287
12/1/26



富士川文庫

2654

醫方彙編卷三

英國醫士梅滕更口譯
慈谿銘之劉廷楨筆述

天台陳子耕

受業 銘三劉廷銓 同校
銘新劉廷璋

收生 Labour.

畧法。凡產婦起居牀鋪均須合宜。醫者須預備醫器。浸入汞雙綠水。二盞
十或加波匿酸水。一化搽藥宜用加波匿酸油。一至如正產不必探摸產門。
惟有時子宮口之前半腫脹。阻塞胎兒之頭者。宜以手指將腫脹之宮
口送上。又宜將一手擋住肛門會陰。不使破裂。又一手或在小腹撥動
胎兒。或以兩手指插入肛內撥轉兒頭。近來查得往往為胎兒之枕阻
於交骨者。宜以右手二指擋之向後。再以左手頂住胎兒之額往上。如

是則頭顱出路極小。易於生下。○又如產門脹大。知其必裂者。不如預先割之。翦之。或已破者。宜在二十四點鐘內縫合。否則難於收口。○至小兒兩肩已出。扶肛門一手。方可撤去。○胎兒頭出之時。一手在小腹。撫拾子宮。不使有血崩之患。○兒既生下。不可當時將臍帶剪斷。至臍帶之迴管平靜不行之時。可以剪斷。此法可使小兒增血二兩。○如一手在外。撫拾子宮。則胎盤自下。可不必拉之。○如胎盤不下者。不可拉動臍帶。宜將手指探入子宮口邊。將胎盤一邊拉下可也。○胎盤既下。腹外仍宜撫拾之。○如胎兒頭出。或已產下。或胎盤亦下。均宜服了葛精。如有血者。治見血崩。○小兒臍帶宜留半至一寸餘。剪斷。酒以礬酸粉。或枯礬。然後包裹。○如冬天生產。胎盤已下。母子先宜安睡。至次早洗之。夏令宜生後當即洗淨。○射洗子宮之藥。或加波匿酸。汞雙綠。鐵錳養水。一匙再化水二十兩每早晚一洗。夏宜冷冬宜熱通行溫熱○產婦宜七八日方可起坐行走。如

四五日起坐行走者甚險。如虛弱者。須兩禮拜至三四日後。可以出門行走。○未生之先宜服通利大便之藥。生後三日內。亦宜通利大便。以草麻油三錢為最妥。○如產後發熱頭痛乳脹者。宜鹽類瀉劑。如溺閉者。宜先以熱海棉花壓之。或以通管通之。房屋宜通風。并忌親戚看望。○生後二三日內。飲食宜流汁。三四日宜雞湯牛肉汁等。後此如常。不必如中土之禁忌過嚴。無關實益。○產後飲酒。最宜慎之。往往以為飲酒可以生乳。功或有之。不若飲牛乳為最效。已去乳油之酸乳

聲管扯緊 或作小兒傷風痰喘作聲 Laryngismus Stridulus

此症或稱為假喉痧。False Croup 小兒一二歲出牙時多患之。切勿誤認

真喉痧。Croup 因此乃喉部腦筋抽搐之病。並無發炎等狀。最宜分辨。

○病原為腦部所累。如體弱出牙抽搐等症。兼而患之。此症發病最速。亦速見症。當以冷水澆頭。後以熱水沐浴。間有聞以輕淡或哥羅方者。如

澆冷水無效。宜以電震。或透呼吸法。或不得已。在喉部開刀。亦有服以嘔藥者。但多欠速。不如聞以淡養氣為妙。○平常不發病時。起居飲食。最宜小心。凡輕淡溴。鉞溴。綠養冰。麝香。草蘇油。嚙啡。淡酸甘油。鉞銻葡。謙落汁。以及蘆茄等。均可用之。其中最效者。宜輕淡溴。每二三點鐘服三釐。約過歲小兒宜之或服嚙啡至安睡為度。如因出牙。宜將牙肉割破。或謂此法與症無益近來亦有用安的拜林。每點鐘服一釐。過歲之兒能使病不常發。

聲管炎 新舊兩種 Laryngitis

病狀與真喉痧畧同。但真喉痧有危險之氣逆。此症並無。○治法。切忌言語。宜住在溫和滋潤天氣。宜用噴或用安息香雜酒。或謙落碘酒。加波匿酸等噴汽。或以絨布浸熱水外壓喉部。飲食宜熱牛乳藕粉等滋潤之物。○內服之藥。○一方。輕淡醋水二兩。銻葡萄酒二錢。嚙啡水二錢。謙落汁六錢。樟腦水至六兩。相合。每四點鐘服半兩。○如痛而氣逆極險

者。○一方。哥根一分。甘油加波匿酸二錢半。玫瑰水至十兩。漱喉。或噴射喉部。○如新症已去者。○一方。炭匿酸一錢。玫瑰湯八兩。相合漱口。○如舊症。詳喉治之最緩。難以速愈。切忌言語。改換水土。另以銀淡養水

牛或一錢化水二兩。搽之。每二三日一搽。重者宜以乾塊搽喉。如不能隔日。必須每日

洗搽者。宜以銀淡養二分。化水一兩。每日搽之。○第欲收斂者。最效。綠二釐。化水一錢。搽之。但以上諸藥。病家不能自搽。必須醫者用之。方不致誤。○亦有以白礬半分。化水一兩。炭匿酸半分。化水一兩。鐵綠酒五至十滴。化水一兩。鏗磺養二釐。化水一兩。銅磺養一釐。化水二兩。碘酒五滴。化水一兩。輕淡綠一分。化水一兩。等藥。漱喉。則病者可以自用之。○或以輕淡溴半分。化水一兩。郁加利達油二滴。化水一兩。松樹油。FIT-WOOD OIL 二滴。化水一兩。汞雙綠一釐。化水八兩。呷啞葡萄酒百滴。化水一兩。磺養三。酸半錢。化水一兩。等漱。或噴吸其汽。均可試用。○

如痛或咳嗽者。宜上文哥根加波匿酸甘油玫瑰水方。噴吸其汽。或以
 謙落、郁加利達、得力平、松樹油、幾阿蘇、薄荷冰、加波匿酸、碘酒、安息香
 雜酒等劑。與熱水相合。聞吸其汽。或吸輕淡綠藥煙。新炎此煙忌用
惟舊症宜之亦有吸入
 藥粉者。如漿粉、鈹淡養、麼啡等相合。抽入。或電震之。○此外另有數種
 病症。一因風濕以致聲管炎者。Rheumatic Laryngitis 照上文之法治之。
 另服哥枝禁、鈹碘、鏹沙利沙、圭阿禁、山采斯等藥。二因嘍吡咖叻致患
 此症者。Tubercular Laryngitis 一宜止痛與咳嗽。二宜去其嘍吡咖叻。痛而
 咳嗽者。切忌言語。宜住在溫和天氣。飲食宜潤。并忌煙酒。如天氣過燥
 者。宜吸噴汽壺以潤之。咳嗽者照上文諸法。或用哥根半錢。汽水半錢。
 甘油合礪砂至一兩。相合。用以拭喉。最有功效。○或以埃阿陀粉。D.P.
 或以埃阿達方。合鈹淡養礪酸與麼啡。搽入患處。或以薄荷冰納諸爛
 處。功能止痛去咳。并解嘍吡咖叻。或以薄荷冰一分。橄欖油十分相合。

搽入亦可。過七日後宜
用一化至五○亦有用藥罩罩在口鼻。聞吸其氣者。○一方。加波

匿酸二錢。幾阿蘇一錢。哥羅方酒二錢。弗莫耳半錢。汽水十五錢。火酒

至四兩。相合滴在海絨。納入藥罩。聞吸其氣。○亦有專用乳酸。三分化水百分
漸濃至七分半

後搽乳酸而愈者。百得二十有七人。○亦有將飲食用皮管通入。所以

不使嘍吡咖叻下咽耳。因鼻患嘍吡咖叻即覺食桑症深此能消
故用此以為能去喉部之嘍吡咖叻也亦有先將喉部括淨。

必不可少。發病在第二候者。最效用汞油藥。在第三候者。最宜鈹碘。每飯
後服

者。宜搽入埃阿達方。或汞雙綠一分化水一兩搽之。切勿下咽或以銅磺養分

半至二分化水一兩搽之。或以銀淡養水搽之均可。

大痲瘋 Leprosy.

此症取治。惟有不使病症加重。而無絕根之法。其飲食起居。宜通風清

醫方彙編 大痲瘋 二百六十七 二百六十八

潔內服補益之劑。魚油、鐵、鉀、石、碘、磷、汞等。均可服之。其中以雞那霜合鉀石最宜常用。亦有有用大楓子油。Chaulmoogra Oil。或格兒夾梧漿。或油。Gurjun Balsam or Oil。或格兒夾梧精。Gynocardic acid。內外交用。謂可治之。惜此藥服後。多有嘔吐者。○或以格兒夾梧精一釐。成丸。每飯後服。或以大楓子油每服五滴。漸漸加多。服至肚瀉爲度。不可再加。頗效。○外搽之藥。可以大楓子油一分。闌納林。或豬油二分。調合。每日以此搽在患處。用力擦之。約一二刻時候再以布塊浸油貼上。久用不已。頗有功效。○格兒夾梧油。內服自五至十五滴。成空丸服。或用此油二兩。合灰水六兩。每日服兩次。每次半兩。或以大楓子油。豬油與灰水各一分相合。外搽患處。亦效。○如病處已潰爛者。宜在爛處。用濃加波匿酸搽之。後以力坐新二分半。合豬油七分半搽之。○或以貝路加力一分。豬油九分。或以克拉砂羅平。或偈克坐兒調油搽之。均可。或以加波匿酸一分。調豬

油十分。或沙利沙酸。硼酸。埃阿達方。克羅林。汞雙綠。汞藍油。均可試用。○疼痛者。宜哥根嚙啡。○若無嚙啡。則用其手足痿癱者。宜扯動該腦筋。有時可愈。

白點風 或名白駁風 又名白食 Leucoderma or Vitiligo.

本皮膚鎂珠變壞之故。概難取治。或謂變白之邊。因鎂過多。遂乃顯其白點。能去此鎂。病可愈矣。○治法。以汞雙綠一至三釐。化水一兩。每日搽洗。○亦有以蠶螫膏貼在變白之邊。謂能退去。○內服之藥。與電震均無功效。積按此症所以變白之故。想爲該處腦筋枯損所致。因而有由此漸變爲木風痲風者。不可不辨。

白輪過多 Leucocythemia or Splenic Leukemia.

乃脾經變大。血液淡薄。白輪加多。血因脾壞之故。○治法。住處高燥。最宜常在曠野或海邊遊行。并使病者合宜運行身體。或每日沐浴。惟風

寒切宜小心。衣服溫暖。法蘭絨者佳。○內服之藥。首推金雞那霜。宜大服常服不止。又須不時審察脾經。是否變小。○亦有服燐丸。每日三次。三十分或鐵酒。三五四分鉀石水。每服五分鉀碘。每一分如合魚油同服更效。○此外脾部最宜電震。其電線之銅管。宜先用麁皮浸鹽水套上。然後震之。電力更大。○亦有以了葛精。用皮膚鍼射入。使脾縮小。或使病人浸在熱水。後忽以冷水噴射脾部。或使病人吸食純養氣。均能使脾變小。○或外搽紅汞碘油藥。搽後宜向日暴之。或以鉀碘肥皂搽藥。以絨布浸濕。貼在脾部。再以布卷紮緊。較紅汞碘更效。○如病重則有發厥流血肺胞發炎積水臃脹等症。兼而患之。均照法治。

白帶 Leucorrhoea.

實非病症。乃病狀也。醫者須審明病原。是否子宮倒前倒後。或發炎。或宮口潰爛。或陰道內皮外戶發炎之故。審明病由。然後治之。略易。但亦

有因起居飲食失宜。并身體虧損虛弱所致者。○如因宮口發炎患此者。最宜用銀鍼撥棉花。浸入加波匿酸四兩合碘片一兩。搽入宮口。搽後當用收斂藥水沖洗。或以硼酸粉一兩。塞入宮口。再以棉花浸甘油。硼砂塞入。約一二日可愈。○此外起居飲食。最宜清潔精細。內服鐵之補劑。海水沐浴。吸淨天氣。運行身體。顧其胃口。并常利大便為要。○如不用碘合加波匿酸。即濃加波匿酸。淡酸。銀淡養水。濃鐵綠水。汞淡酸水等。亦可用之。但必須醫者自用。病家不能試用也。○血薄者宜服代力斯得鐵。○一方。輕淡鐵。檸檬片二錢半。檸檬酸二錢半。汽水六兩。相合。每用一調匙。合鉀炭養水。鉀雙炭養五錢。化水十二兩。二調匙。沸時服之。服此後再服金雞那霜。合輕綠酸。或淡磺酸同服。○至於衣食宜佳。下肢忌受風寒。陰道常宜射洗。初次用熱水洗。漸漸改用冷水洗之。大約每射洗一次。用水四十兩足矣。不可多射。○用以上之法。不效者。宜以銀淡養半錢。化水一兩。搽入陰道病處。搽

後當以藥水洗淨。○如處女患此。其陰道每多癢熱。疥癢難堪者。宜搽
 謙落油藥。○如帶下極多者。宜頻洗之。洗後再以油類潤之。以免蔓延。
 亦有以尖丸納入陰道。尖丸不一。如蘆茄。幾阿蘇。加波匿酸。炭匿酸。埃
 阿達方。鉍劑等。均可用之。○外洗之水亦不一。如白礬六錢化水四十
 兩。硼砂六錢化水四十兩。硼酸六錢化水四十兩。錳磺養二錢化水四
 十兩。鐵礬二錢化水四十兩。鐵酒二錢化水四十兩。銅磺養半錢化水
 四十兩。碘酒半錢化水四十兩。加波匿酸二錢化水四十兩。鉛醋半錢
 化水四十兩。或濃灰水或加淡一半。或炭匿酸一錢化水四十兩。汞雙
 綠半分化水四十兩。惟汞綠不能逐日用之 鈹或鎳雙炭養二錢化水四十兩。鈹錳養
 半分化水四十兩。綠養冰四分化水四十兩。銀淡養二分化水四十兩。
 均可選用。○有時幼女亦有患此症者。多在外面。不在陰道之內。宜以
 解毒水洗之自愈。

汗癬 Lichen.

此乃皮膚發疹之病。與疥子相同。或作癢變紅。或有黃水。○治法。內服
 鉀石。初服二三滴。漸漸加多。至十餘滴。或以此合鐵魚油同服。更效。病
 人起居飲食。須要合宜。並忌酒色。○如服鉀石無效者。宜服汞碘。Bi.
 iodide mercury. 每服三十二分釐之一。或汞雙綠每服十六分釐
 之一。化水服。或服磷亦可。○如服此三藥仍無效驗者。難治。○外搽之
 藥。凡治魚鱗癬。可治之藥。均可用之。或以卡而白兌對兒琴水。或以柏
 油調油搽之。或楷第油一錢調油一兩搽之。均可。○有時極癢者。用鎳
 炭養一兩。化水三十兩。外洗。頗效。或卡而白兌對兒琴水一兩。鉛醋水
 一兩。汽水四十兩。相合。外搽。頗效。○一方。汞雙綠一釐。加波匿酸二分
 半。錳養油一兩。調合外搽。亦可。或以加波匿酸。或幾阿蘇調油。一至二
 十。或化水一至五十。或銀淡養二分化甜消咿咿一兩。均可搽之。○如

有瘰癧體患此者。宜鐵碘糖露。鉀石。合魚油等同服。

電傷 輕曰電傷重曰雷殛 Lightning Injuries and Accidents.

輕者每多發厥。須照法治。內服熱劑。或以冷水熱水。拖擊全體。並透其呼吸。○如一肢因殛焦灼者。照火傷治法。

腎淋 Lithiasis.

見腎經砂淋。 See Stone in the Kidney.

肝生膿瘡 Liver, abscess of.

此症相近赤道暑熱之地多患之。醫者審明有膿。宜預早刺放。或用空氣瓶抽放。如膿稠而多者。必須開刀。並通以皮管。使毒外洩。○亦有肝經一連三四處生膿者。須將每膿窠。均行刺放。又宜及早放之。雖膿未成尚在切勿至不得已。明知有膿之時。始行刺放也。○刺法。務須審明何處有膿。何處刺放。放後使膿有自然下流之勢。即在該處放之。或靠近肋

骨下邊放之亦可。○亦有膿極多脹凸者。可在肚腹脹處開刀。然後將膿胞與割口縫合。或有肋骨阻碍。不妨將骨截去少許。以便流通膿毒為要。

肝變蠟質 Liver, Amyloid disease of.

此症已詳腎舊炎症。如腎有此症。肝亦患之。治法相同。如有花柳或腐骨肺勞瘵癰久爛等症累成者。為諸症之毒釀成此症先治各症。內服之劑。如鐵魚油。鈹碘補劑。或大服輕淡綠。每服半錢並吸淨天氣。海水沐浴。飲食精細。亦有因此告愈者。

肝痿黃 新症或稱肝癰或稱肝消瘦 Liver, Acute Atrophy of.

大抵不治。間有可治者。必醫士誤視別病為此症也。○或謂服鹽類瀉劑。可以治之。○如發厥。或有腦病發出者。治法與腎舊炎之溺毒入血同。○如身極熱者。宜服雞那霜。與別種退熱之藥。

肝縮變實 Liver, Cirrhosis of.

此症肝經必先腫脹。因有舊疾然後縮小變實。上文臃脹篇中。此症已畧論及。○病由。概為飲酒。故治此症。酒宜忌之極淨。又宜常在空曠處運行身體。吸淨天氣。其飲食宜足而能補身。如牛乳去油。愈多愈佳合鏽荷蘭水同服。佳。或自製之馬乳。詳上文瀉瀉蛋白篇或食蔬數月。○內服之藥。鹽類瀉劑。必不可少。或每晚臨睡時服汞藍丸。早起空肚服鎂磺養。如兼有腎病者服此劑可以布道非連代之可以經月常服。但須合飲同服能使發炎之肝。收小至常度。○麥氏每用輕淡綠。或綠汞。每服半至一。蓋日服三次治之甚效。惟不可久服。恐累胃病。又須顧其胃經。最宜服淡輕綠淡酸。與苦補劑同服。亦有用淡輕綠淡酸無效者。乃該藥久藏洩氣力弱。故此藥宜臨用臨製為要。○一方。濃淡酸一兩。輕綠酸二兩。熱水三百二十兩。相合。以絨布浸濕外包肝部。其效更速。如包後皮膚發疹點。宜過數時再包。○一方。淡輕綠淡酸半兩。蒲公英流膏二兩。馬前

酒三錢。先高拿流膏三錢半。其拉大水至十二兩。相合。每服一匙。每日服四次。合水一杯同服。此藥能治肝縮。又能解酒。酒能甚有效驗。○如病症不愈。漸漸變為臃脹者。上文諸藥。仍宜照服。並另治之。照上文臃脹之法。○前醫報論有人治肝縮所患之臃脹。刺放五十次。末次將所放之水。令病人飲八兩。以後病愈不發。○如嘔吐者。宜喉部引炎。並服鈹淡養嘍啡輕衰酸等。或飲冰水。有時可服卑伯新粉。○如泄瀉或有血者。初起聽之。不必速治。此係病標。宜先治其本為要。如咳血則不可緩。治照卷二咳血篇。

肝經生癰 Liver, Cancer of.

此症不治。不過見症施法。首宜止痛。服嘍啡鴉片。便閉者。宜通利之。嘔吐者。宜冰水嘍啡。或胃外部引炎。餘詳卷首癰篇。有名醫盧氏能將肝癰割出。但數年後不免再發。不過救一時之急耳。

見膽淋與黃疸。 See Gall Stones and Jaundice.

肝經積血 即肝經發炎 Liver, Congestion and Inflammation of.

有因心門之病所致者。先治心病。見首卷心門病篇如因飲食不節。或因霉毒。或因感冒所致者。治其病由。又宜靜養。專食牛乳。晚服加路迷。早服鹽類瀉劑。並在肝部外面引炎。○內服之藥。最要者服淡輕綠淡酸。合輕淡綠與叱啤略同服。亦有在肛門之旁。以蜚吮血。極有效驗。

肝傷 破爛 Liver, Injuries and Rupture of.

或因跌打下垂內傷。或因干戈外傷。最宜平臥。痛而厥者宜提神劑。至醒宜在肝部用皮膚針射入嚙啡。以止其痛。或用冰塊壓之。或以冰袋包之。○此症最多之病狀。即口渴。須以小塊冰含口。或飲冷香冰酒。不可多服○此症最宜預防腹統膜發炎。可用冷水或冰袋包壓腹部。餘見後腹

統膜發炎篇

有時可將內傷之瘀血割出。洗淨。然後縫合。○如干戈刺傷者。或以火刀炙之。或以埃阿達方藥布塞入傷口。或以藥水洗淨。然後縫合。見症施治。神而明之。存乎其人也。

肝患楊梅毒 Liver, Syphilitic disease of.

病由因花柳第三候染成。○治法。宜大服汞雙綠與鉞碘為最要。其病狀如肝痛腹痛。或黃疸嘔吐。臃脹者。均先治其本。然後治其標。詳見黃疸腹痛臃脹各篇。

軟脚病 或甩脚 或髓後柱變實症 Locomotor Ataxy.

此乃經久難治之症。如醫者耐心療治。亦有愈者。○初起起居飲食住處衣服。宜法均須合宜。忌勞心思。舊治之法。服銀淡養丸。每四分釐之一。日三次。漸加至每服一釐。但服此藥。每致皮膚變黑。并累及胃病。不如服銀養為佳。或服金綠合鑪。每日服三次每次十六分釐之一更易取效。其功能使脊髓變實。

之連網消去。此外如鉦石、燐、了葛、比魯介賓、鈹溴、伊斯林、銀綠、碘等，亦可服之。○如因花柳質患此症者，宜服鈹碘。每服半至分，半日服三次。或汞雙綠。雖無花柳此藥亦宜試服。或服補劑，如吶嘶頓糖露、金類酸、與金雞那霜、馬前冰等。○外治之法，首推電震。較服藥為更要。震時電線一端納頭部，一端納腰部。震時電須重十至二十格。震後另在頭腦亦須震之。須重三四格。或將兩腳浸入溫水，通以電線，另一端納在頸部中處，或以電刷揩擦患處，均可試用。○此外有以冷水浸被單，包裹全身，或冷水洒洗身體，或冷水沐浴，均能提神腦筋之力，以復其原。○亦有在脊柱貼蟹螯膏，或搽蟹螯水，或鐵烙引病外出，但不甚效。○近來嘉氏 *Charcot* 新法，立三脚木架，中有轆轤連鉤，可以扣定病人頷頰與枕後，緩緩懸起，不可動搖。另有輔帶兩條，繫住兩腋之下。體輕者此帶不可不用。均可隨意上落，每懸半小時，初則二三日一次，後則每日一次。懸時漸漸加多，亦有在脚另懸別物，以加其重者。如此可以提神脊髓。

之力也。惟心門有病，吐血、肺勞、血薄、症重氣珠變大、肥體，以及虛弱之人，忌用此法。○亦有令病人仰臥，以帶繫定兩脚，漸漸扯緊，使脚首相對，成為弓形，亦有提神腦筋之功。○如有病之脚覺有刺痛者，*Tightning Pains*，則宜服鈹碘、嘍啡。或以皮膚針射入。或安的拜林，或噴射伊打，或服克撒而琴。或汾納司丁 *Phenacetin*，比魯介賓，派羅定 *Pyrocin*，或阿失達分納海達拉尋 *Acetylphenylhydrazin* 等劑。○如胃有病者，宜在外部引炎，或皮膚針射入嘍啡。後服平胃各藥。積按此症與卷一之癩脚，或稱甩脚，最宜分別。癩脚乃肌肉之症，有胎成者，此症乃脊腦髓之症，累及脚部，故有疼痛與胃之累病，癩脚輭脚，醫宜辨之。

腰痛 *Lumbago*

有新舊兩種。新者疼痛不堪，宜服鏞沙利沙三四分，或大服安的拜林，可以立愈。不愈者宜射入嘍啡，并服沙羅，或鏞沙利沙，病症畧舊，痛亦

畧減。宜服山米斯酒。或流膏。每服三分頗效。○一方。鈇炭養一錢。合一兩鮮檸檬汁。沸時服之。作一次服。○又方。鈇淡養一分。合淡牛乳飲之。每二點鐘服一次。連服三次。後每六點鐘服一次。○如變為舊病者。宜服硫磺。金雞那霜。鈇碘。松節油。茄菲精。求拉拿等。或熱水。百零六度熱沐浴。蒸氣沐浴。或推拿法。或火酒烙之。如仍不效者。宜以棉花一塊。烘熱。酒以硫磺乾粉。貼在痛處。以布卷包緊。平臥為要。○經年不斷常發者。最效草烏豆搽藥一兩半。蘆茄搽藥二兩。哥羅方雜搽藥二兩半。相合搽之。頗效。或貼蘆茄膏。或以蘆茄膏合甘油搽之。後用油紙包裹。亦有以蘆茄膏藥合鴉片膏藥各半。黏在厚皮。取其硬能助腰貼之。○另有引炎之法。如芥辣膏藥。或辣椒粉合甘油。或濃醋酸外搽均可。○亦有刺放之法。或以針斜刺皮肉之內。或以針輪用力刺之。○亦有以皮膚針用汽水。或濃加波匿酸。或阿未來淡養氣一滴。合酒十滴。射入。亦可。○亦有貼蟹螯膏或火烙之。或以厚紙先貼痛處。後以熱鐵在紙面煨之。至病人難當為度。亦有效驗。○亦有用樟腦酒。或煤油。松節油。郁加利達油。搽之者。亦有效驗。此外惟有電震。震後推拿腰部。並以熱水沐浴。

肺生膿瘡 Lung, Abscess of.

此乃肺部生膿瘡。與別部膿瘡相同。○治法。飲食起居最須合宜。肺勞症相同此症本不可治。近來亦有能割割者。其法先將肋骨割去一小塊。後以火刀直割無病之肺。割至有膿處。將膿放盡。然後通以皮管。與平常膿瘡同法為之。此法雖險亦有愈者如膿瘡累及肺胞發炎。或肺胞已有膿者。病症更劇。難以就愈。○此外有用針刺放者。但往往累及肺胞積膿。治之甚難。○亦有不在肺部開刀。專以加波匿酸。幾阿蘇。汞雙綠。埃阿達方等藥。由氣管抽入者。概無實效。○如病重或不能用刀者。惟大服幾阿蘇。或以解毒諸品。噴吸其氣。頗效。

肺變死肉 Lung, Gangrene of.

此症與外部死肉症同。概為肺部血管閉塞不通所致。○治法甚難。凡病人飲食起居最當合宜。且此症呼吸之氣極臭。故所用之藥以解臭為要。如幾阿蘇每服二至五滴。或松節油末耳多。郁加利達油薄荷油均可服之。病人居住之房中宜用松節油噴汽壺。不但可以避臭。又能解毒。或以松節油滴在木屑。洒諸房中亦可。或以柏油麻絲製成衣被。令病者衣之。最能解臭解毒。或照卷一氣管積痰油藥方。燃吸其氣。或用石綠山尼得斯水。磺養酸。鈦錳養。加波匿酸等劑。解毒亦可。○或以郁加利達油薄荷冰。碘劑綠氣。幾阿蘇。加波匿酸等品。用火酒燈燒藥。噴吸其氣。或以汞雙綠一二釐。化水十兩。或銻綠一化水二十。或鏹綠一化水二十。或磺養酸一化水二十。或幾阿蘇加波匿酸一錢。化水十兩。或汞碘一二釐。合少許。銻碘。化水十兩。或克羅林一化水一百。或化

水五十。或用鼻罩。聞吸郁加利達油。加波匿酸。埃阿達方。弗莫耳。薄荷冰等藥。○一方。幾阿蘇三錢。薄荷冰二錢。石莫耳半錢。Thymol. 火酒到四兩。相合。化後。滲在棉花。納入鼻罩。聞之。甚有效驗。○病人所咳之痰。咳出當即吐於藥盆。以解其毒。○如肺病處兼有膿瘡者。照前篇肺生膿瘡開刀法割之。後再用硼酸。埃阿達方。洒入。并通以皮管。或以汞雙綠水洗之為要。

肺脹積水 或名肺腫 Lung, Edema of.

此症為心腎之病。或因臃脹累及所致。詳心腎臃脹各症。槓按此乃累症。與肺經積水。Congestion. 最宜分別。肺腫乃全肺腫脹。與臃脹病形相同。肺體積水者。乃肺管先炎。後變舊不愈。肺氣管積水也。

肺體破傷 Lung, wounds of.

凡肺破傷。或因鎗彈傷。或因干戈傷。既傷之後。切勿多用手法。察探傷

處恐得無病之肺。故病者宜靜臥勿動。傷之一面宜著牀務使膿血易於外洩。或通以皮管。或包以解毒之藥為要。○兼有因傷以致肺炎。或肺胞炎。氣管變大。氣管發炎。肺生膿瘡等症者。均照症治。詳諸症各篇。

紅熱菌毒 或蠶食桑 或曰 蝮蝨瘡 *Lupus Erythematosus.*

此乃皮膚生啞吡啉之新症。初起紅熱發炎。病者飲食起居。最要合宜。內服之藥。首推鉀石。宜少而久服。又碘、鐵、鈣、埃阿達方、加波匿酸、汞、雙綠、鐵、燐、了葛、以及魚油。必不內外均可取用。最妙以諸藥合魚油同服。則功效更偉。○此症初起用藥。宜潤而止痛散血之品。因此症初起乃該處積血似炎如鉛醋水。一至二十或錕養油合橄欖油。或加波匿酸水。四一均可外搽。其餘別藥不必妄投。有名醫以鈹磺養半分。錕磺養半分。濃火酒半兩。汽水四兩。相合。每日搽二次。每次以棉花滲藥。按擦病處。約一刻之久。能除啞吡啉。不使漫爛。○如炎已退。鈹磺養與錕磺養。可以加重至二分。○亦

有用哥老典恩搽之。能使血管閉縮。並保護病處。不遇天氣。又能使病處。血管易於收縮變小。病亦漸愈。○炎已退。盡可用提神之藥。如柏油等類。○一方。卡而白兌對兒琴水半至二錢。關納林一兩。調合搽之。不效者可用汞油藥。或用汞油粉。洒在絨布上貼之。○又方。濃鉛醋水半錢。卡而白兌對兒琴水一錢。樟腦粉半錢。猪油或滋肌香蜜膏二兩。調合搽之。或加波匿酸油藥。一至十亦可試用。○此外。如納弗石林、哥核精、貝路加力酸、碘水、碘油、力坐新。或成油汞膏藥、硫磺油、碘酒、鉀石水、以及偈克坐兒油等品。均可用之。○亦有專用丹藥消除者。如鏽沙利沙、醋酸。幾阿蘇。加波匿酸。錕綠。乳酸。銀淡養水。汞雙綠。汞淡綠水。鈹錳養等。均可用之。或以火刀鐵匙割刮亦可。或以利刀在瘡面約刺一二分深。如種牛痘法輕輕割之。

菌毒重症 或稱或不 或蝮蝨瘡 *Lupus Vulgaris.*

此症與前症同。但此經久而重變舊之症。或爛或不爛不一。○治法。與前症同。飲食起居。最宜合度。內服鉀石、磷、碘、汞等品。病者宜常住溫熱之地。最忌風寒。○已爛者。宜將患處之啞吡啉叻斑點刮去。或以沙利沙酸與幾阿蘇相合。成水搽上。亦能消除。如用藥後。疼痛者。可以哥根水浸布貼之。○猶納氏。以幾阿蘇合沙利沙製成膏藥貼之亦效。○又方。幾阿蘇二錢。沙利沙酸一錢。淨猪油二錢。調勻搽之。搽後須常審患處情形。或宜再用。或宜少用。大抵此症宜緩治。不求速效。約三月或可告愈○亦有

用乳酸外搽患處。能善去腐。並啞吡啉叻質。或以乳酸用皮膚針射入亦可。或先將患處洗淨。或用後搽哥根水。分半化水百分片刻後。再將患處抹乾。以絨布如患處大小。浸在乳酸水。貼上。其無病之邊。另以白蠟或猪油搽之。不使染藥。大約搽後須痛數點鐘貼一二刻。即行揭去。頗效。惟每日須用幾次。須見症用藥。不能預料。○又貝路加力調油。一化或成膏藥。一化或化伊打中。足化

照乳酸法用之亦可。但功用少遜耳。更有用鉀石水。每日搽在患處。至發炎變紅為度。功亦相同。且無病之邊。並無別害。或將鉀石水用皮膚針。射在無病之邊亦效。○此外如錳綠合銻綠水。Butyr. of Antimony.各

半。與濃輕綠酸合甘草粉各半。共相合調油搽之亦可。○又方。Vienna

Paste. 用鈇輕養一分。清水一分餘。加火酒少許。調成如膏搽之。○又方。

London Paste. 用鈇輕養一分。石灰一分。加火酒少許。調成如膏搽之。或

希白拉氏膏。Hebra's Paste. 用鉀酸分半。紅汞磺養四分半。鯨腦油藥六

錢。相合搽之。○又方。碘片一錢。加碘搽藥一錢。相合。再加甘油二錢相

合磨勻搽之。或以銀淡養一錢。化水一兩。或乾塊。搽之均勻。或以汞淡

酸水浸棉花貼在患處。或以小雞毛刷浸汞淡酸水拭之。或以淡酸。加

波匿酸。鈇錳養水。一化或鏹養酸。宜慎碘磺養。一調汞雙綠。二釐化水一兩或汞雙綠化

於火酒。二分化酒一兩均可選用。○如中處已愈。旁邊未盡。尙有小點者。○一方。

汞雙綠一錢。幾阿蘇四錢。酒醇到三兩。相合。以小刀將旁邊未愈小點。
即此割破。以細木片浸藥搽入。或以小塊棉花浸藥塞入。功用甚效。○

又方。碘片二分。化甘油一兩。以皮膚針射入亦效。○如經久不愈。仍有小點。可以小刀刮之。但亦有不刮。專用藥治者。○一方。用汞油粉一兩。
每百分中有二分至五分沙利沙酸分半。偈克坐兒分半。調勻。用力抹在小點之上。亦甚效驗。○仍有不愈者。惟有用刀。一如種牛痘法以刀劃之。二以鐵匙刮

之。三以藥火刀割之。四電火割之。或以鐵刀煨熱割之。五以補齒之滾輪剝之。六以刀統行割去。七先行割刮。後再以火刀煨之。八刮後或搽

丹藥。九電震或電針刺之。其中以鐵匙刮之為最要。刮後宜用加波匿

酸一錢。汞雙綠二分。伊打酒一兩。相合。搽之。○或又方。用沙利沙酸二分。幾阿蘇四分。相合。搽之。或圭阿柯一分。Guaiacol. 沙利沙酸二分。相合。

搽之。搽後。再搽甘油凍。不使藥洩。或以棉花包裹。每日一換。未搽藥先搽哥根水亦有

刮後。以希氏甘油肥皂。每百分內有皂八分或二十分九分。合幾阿蘇半分。沙利沙半分。相合。搽之。或謂倭力司多兒。Aristol. 搽之亦可。○數年前亦有依種肺爛之

法。佈種藥漿以治此症者。但後多復發。想無實濟耳。○亦有以狗之血液。用皮膚針射入患處而得愈者。

吸核發炎 Lymphadenitis.
此卽瘰癧之類。但瘰癧症乃舊炎。此乃新炎。且此症體質壯強者。亦有患之。必有外毒自傷口入○治法。吸核腫脹者。卽宜辨明相近處。有無外傷。如有傷者。

傷愈而核亦消退。○如起紅筋腫痛者。宜搽碘搽藥。如身熱者。宜通利大便。或服少許草烏豆酒。或萬應退熱藥。其外傷處。切忌運動為要。○

如炎與身熱已退。而傷未愈者。此時飲食宜牛肉汁雞湯等補益之品。並白關地。鐵金雞那霜。服大等品。○一方。鏞加波匿磺。Sodii Sulphocarbolutis.

二錢。甘油半兩。橘皮酒半兩。哥羅方水到六兩相合。每三點鐘服半匙。

合清水大匙同服。其腫痛炎處。有用熱劑壓之者。有用冷劑壓之者。水如

水伊打水或冷水銅管等法大抵熱治冷治。均有效驗。惟冷熱不可合用。如有膿者。必須熱

治為佳。○又有火酒外洗藥。酒一分化水三分用以外洗。或以油紙包裹。善能退熱

解毒。○又方。碘一兩。加波匿酸四兩。相合搽之亦效。或以銀淡養。加波

匿酸。或皮膚針射入亦可濃汞雙綠水。搽之亦可。○大抵吸核新炎之症。不可

多行磨擦。恐磨擦易於成毒。用藥時最宜慎之。○若已成毒。即宜開刀。

且開之愈早愈大為要。如割口小。宜插以皮管。每有割口閉窄。以致重

發者。最宜預防。○如已成毒。甯不用麥皮等熱壓劑。須用火酒外洗藥

搽之。或包以油紙為妙。○如患處在頭面。恐刀後有疤痕。可用皮膚針

刺放。放後插以馬稜。使膿外洩。且仍用火酒外洗藥壓之。或汞綠水射

洗之。○舊炎經久不愈者。若非外傷所致。醫者須審其病由。然後施治。

簡法。可以碘搽藥搽之。或鈇碘搽藥。合肥皂搽藥相合搽之。或以蘆茄

或鉛碘膏藥貼之。頗效。○不愈者。可以加波匿酸。鐵雙綠。碘醋酸。汞雙

綠等丹藥。用皮膚針射入。或以極細藥火刀刺之。刺入時須將火刀四圍一轉然後通入皮

管。外包熱壓劑。自愈。○仍不愈者。或腫不消。漸成爲管者。惟有剖割。或

將全核割出。或將管割通。○其餘瘰癧症。或虛弱以致吸核腫脹發炎

者。詳後瘰癧各篇。

吸核變大 或曰核瘤 Lymphadenoma.

此乃吸核變大。兼有血薄。非炎症也。○治法。宜割去吸核。如病者係瘰

癧體。宜遲割之。否則割之愈早愈妙。○如病重兩腮兩腋兩腿等吸核

均變大者。曰好氏病。乃好氏查出 Hodgkins Disease. 此時割之不及。且不勝其割。

惟有內服鉀石。并補養身體爲要。鉀石可以多服。或合鐵劑同服更效其功不使病症

加重。大約每日服鉀石水八至十五滴。每飯後服日服三四次。亦有服鉀石後

嘔惡者。不可再服。宜用皮膚針射入。此外鱗。鈇碘。魚肝油。亦宜服之。惟

汞劑切不可服。即丹藥如加波匿酸等品用皮膚針射入亦勿妄施也。

吸管發炎極重者即紅絲疔其實紅線乃吸管炎也 Lymphangitis or Angiolenicitis.

此即上文吸核發炎。因外傷所致所起之紅筋。紅筋即吸管也故此症每與吸核發炎相連。○治法。先治外傷。已詳前篇紅腫處宜搽碘搽藥。切忌運動。如腫痛甚至有膿者。宜用熱壓劑。然後開刀。并另服鎂磺養等瀉劑。食物滋潤。吸淨天氣。飲食起居均須小心。

陰毒 或羊毛毒 Malignant Pustule or Woolsorters' Disease.

羊毛工作多患此症。故西國亦名曰羊毛毒。乃羊毛屑中有一種毒質入血所致。由傷處傳入病狀如膿瘡。但更重而毒。略如花柳之疔毒幾與疽同。○治法。宜在患處割十字形。後以丹藥。如鈹輕養。錳綠。淡酸。汞淡酸水。碘。或加波匿酸等品爛之。或以膿加波匿酸射入。最妙。先將患處統行割去。後以火刀煨之。○亦有割後。以金雞那霜調松節油。成爲稠汁。搽在割處。頗效。

○此症患者極形憊弱。故飲食宜牛乳牛汁白酒等。並內服金雞那霜。加波匿磺。硫磺。加波匿酸。沙利沙。鐵酒大服與流火相同等品爲要。○亦有病不在外而生於臟腑者。肺經患之爲多。大抵必先肺體發炎。此時宜以松節油。郁加利達。加波匿酸等。用噴汽壺噴吸其汽可也。

乳核發炎 或曰 乳炎重者生膿即乳毒也 Mammary gland, Inflammation of, or Mastitis.

此症婦女產後。或斷乳時多患之。○治法。最要者宜以闊布包裹乳臍。不使乳垂。並將手臂一同包定。不可少動爲要。因手臂有肌肉與胸乳連病時寧勿哺乳。可以玻璃吸乳瓶。抽出其乳。如病輕者。仍可使嬰兒吮之。如兩乳同病而重者。不若斷乳。不使母子皆受其害。○此症初起。或用熱劑。或用冷劑外壓。各聽其便。惟毒已成者。須用熱壓劑爲宜。壓法。以凹形木盤。大小適如乳臍。中有小孔。使乳頭伸出。以便小兒吮吸。後以絨布浸熱水。墊在盤內。套上壓之。或以熱水合火酒外洗藥壓之。亦有以蘋茄膏合

甘油搽之者。但宜慎用。恐小兒畧吮食之。有性命憂。不如搽蘆茄搽藥。或搽火酒外洗藥。合蘆茄搽藥。均有效驗。○一方。蘆茄搽藥六錢。草烏豆搽藥二錢。濃火酒四兩。玫瑰水到十二兩。相合。燙熱。浸絨布壓之。可也。亦有不用木盤。第將絨布壓上。再用油紙棉花布卷包裹之。可容八點鐘之久不至變冷此法熱不易散。約八點鐘一換可也。○亦有在絨布上。畧加蘆茄甘油少許。或謙落油藥少許。以止其痛。或加亞力加。輕淡綠。查波蘭達。毛地黃。綠養冰。鴉片酒。養金花。印度麻。開羊花等少許。均可。○內服之藥。宜小服草烏豆酒。或銻葡萄酸。并利小便劑。鬆其血管。或服鎂磺養瀉之。減其血液。病者須忌湯水。所以使乳減少。病亦漸愈。○如乳核堅硬不消者。可依乳核之路。輕輕推拿。頗能散之。惟不可顛倒重按為要。○如用推拿法後。仍不退者。可敷熱壓藥與火酒外洗藥。或大服銻碘合蘆茄。噤啡。鎂磺養等品散之。○近來外壓之藥。多不取用。既以吸水棉花。用象皮卷包之。合度。自能漸退。如脹痛者。先以噤啡水。合汞油粉外搽。然後包之。○亦有用電震者。但不甚效。○如能查明病原。治之畧易。大抵多因乳頭少有破爛。或暑天小兒吮吸後。未能洗淨。或略破裂。以致發炎者居多。○如有膿者。惟有用力。先以哥根水。伊打。或用偈矢林噴射。以止其痛。然後割之。愈大愈妙。且不可過近乳頭。過近恐乳頭縮入愈後不能合用并依乳管之路。自乳頭向乳胖內割。切勿向乳頭外割。割後宜插皮管。愈大愈妙常以汞綠水射洗。每日一換。○大約用刀後。多有全身之兼症。此時寧勿哺乳。可用吸乳瓶。每日數次。攝出其乳為安。若不以此瓶抽攝之。恐愈後乳斷難再哺養也○如成乳巖。或成管者。宜以鐵匙刮之。○如不成管而變硬者。乳核變大。舊炎未去之故宜搽汞油。或汞油粉。或蘆茄膏可也。

狂 猛力為狂 Mania.

此症已詳卷二癲狂篇。乃癲症中之最甚者。病由本因腦部炎熱所致。

故此症亦曰腦熱。○治法。患此症者。最宜另住別墅。或住在癲狂院中。治之。所要者。其飲食務須接時。宜每三點鐘一次。如牛乳牛汁雞蛋等。易化之物。萬一不食。惟有用胃水節射入。或由肛門攝入。後宜漸服魚油等。補益之品。○內服之藥。最宜綠養冰。次之如鈹溴。與爾羊花精亦可。惟鴉片切忌取用。

積按癲狂之病甚多。輕重不等。病狀懸殊。而醫治之法則一。無論猛力為狂。Acute Mania. 或憂鬱成癲。又名癩 Melancholia. 或妄言妄想。Delusional

Insanity 或年老後病癡癲。Chronic Weak Mindedness. 或產後瘋癲。Puerperal

Insanity. 或酒醉成瘋。此症中土少見泰西各國患此者極多 Alcoholic Insanity. 或少年輕狂。喜怒不節 Moral

Insanity. 或先天不足。腦虛癡呆。小兒患之 Idiocy and Imbecility. 或糊塗癡呆

不知人事。Dementia. 要不外乎腦體過熱。或過虛。以致腦部知覺靈性之功能異常。熱者過常。虛者過常 所致。醫者療法。宜癲狂。知此二者。斯不遠矣。

以手洩精 或手淫 Masturbation.

此症小兒長大發身之時多患之。無非慾熾於中。意形於外。以至心念不正。不洩不已。若不及早痛改。最易斲喪身體。亦有因包皮過窄。惹動腦筋所致者。如女子同病。則陰道不潔。與體質虛弱者。更易犯此。○治法。為父母者。須嚴為勸誡。或在睡時。將手縛定。或與人同臥。或將蜚蚤水搽在小便。使之發炎 或以小件繫墊腰部等法。所以解其心意。不致再犯。此外便閉者。宜利之。有蟲者。宜下之。凡諸淫書淫畫。女色。切宜避忌。勿動其心。或未睡之前。行走遠路。以至困憊為度。其飲食宜澆淡。切勿濃味。如服藥宜鈹溴。鈹溴合鈹碘同服。或每早冷水沐浴。閒有在枕後引炎。所以平陽物腦筋 謂可以安其脊腦筋者。亦有效驗。其實此係情欲之病。宜自知其害。而痛改之。何必服藥。

麻疹 Measles.

此係有毒熱病。初起與各種熱症相同。最宜靜臥。衣被清潔。房屋通風。
熱六相近門窗。須掛帳幃。以免陽光。恐壞房中不可多有陳設之物。均宜收
 藏。恐傳病毒。凡常用之物。以解毒藥洗之。另以鐵錳養水。一至五納大缸中。
 置諸病人房門。凡經用之物。出房必先浸入此水。以免傳染。或用加波
 匿酸水。一化石綠水。一化亦可。病人之大小便。亦宜隨加解毒之藥。○大約
 初起。不必服退熱等劑。可服者。一方。甜消咿咿二錢。輕淡醋水二兩。
 紅花糖露一兩。汽水到四兩。相合。每二點鐘服一小匙。二至四歲之小
 兒宜之。如成人服宜加倍。○又飲食最宜小心。莫妙全飲牛乳。或乳合
 灰水。或鏹水各半。或專飲牛肉湯。麥湯。流汁之物亦可。惟不可勉強。須
 合病人之胃。○如熱重口渴而乾者。或謂切忌冷水。或謂宜飲冷水。或
 謂麥湯加檸檬汁與糖少許。或謂最妙吞以冰塊。○如鼻塞或傷風者。
 乃病狀不必治。○如咳嗽者。亦不免有之。須待痲瘡回後。可愈。仍不止

者。可用熱水壺噴吸。或噴灑落藥氣。或淡加波匿酸水。或呷啞酒。或
 外壓熱水。如成人可服錒葡萄酒二分。合嚙啡水一分。同服。頗效。○如熱
 內鬱痲瘡不能透發者。宜服安的拜林二釐。或安的非白林半釐。小兒
 服之最效。○如痲瘡發齊。熱仍高升至百零六度者。宜用冷水浸沐。或
 以布浸冷水包裹全身。亦有先服瀉劑。後服粉納斯丁。Phenacetin.不使
 熱度加重。○如痲瘡兼泄瀉者。聽之。不可驟止。○如全身發癢者。最妙
 以鏹炭養化溫水。一錢化以棉花輕抹癢處可也。○如抽搐者。乃腦部內
 熱發痲之故。小兒最多宜用熱水沐浴。浴後以絨布揩擦全身。使血散布全身
 皮膚。然後蓋以絨被。靜臥為要。○如瘡後約六七日。忽有抽搐者。最險。
 必肺與腦胞發炎之故。治照各症。○亦有因而氣管、耳部、眼白衣發炎
 者。均照症治。○亦有瘡後困憊不起者。此症愈至後愈難治飲食最宜易化之物。并服
 鐵魚油金雞那霜忽斯克。或以白蘭地酒合牛乳同服。或以小杯舍利

酒合牛乳二十兩。燙熱。將成塊牛乳揭去。取其清水飲之。頗有補益之功。○或謂內服汞雙綠。或汞碘或輕養水。Solution of Peroxide of Hydrogen. 亦可。○大約麻疹一症。平順者約六七日可以起牀。惟出門不宜過早。飲食仍宜小心。大抵小兒瘦弱。凡諸瘡後內外不起之症。均由出門行走過早所致。為父母者盍慎之。

偏頭痛 Megrin, Migraine, or Hemicrania.

此症已詳卷二頭痛篇。惟偏痛更覺難堪。○偉倫氏云。安的拜林與安的非白林。於此症最有功效。偉氏歷用數年。服無不效。○此症初起。病人自覺將要頭痛。此時宜先服安的拜林一分。或安的非白林五六釐。約半點鐘後。其痛自止。如服後痛不止者。可服分半。每半點鐘一服。其痛必止。如四點鐘後。痛仍不止。不可再服。亦有依此大服不舒者。宜每二點半鐘服二釐半可也。○此外克撒而琴。或鏽沙利沙。二分。或合茄

菲精同服亦可。○或謂頭痛之時。其溺中猶利阿酸最多。可用淡輕綠淡水一錢。合水少許。頭痛時服一半。服後頭痛雖加重。而此後痛可立止。後過半點鐘再服一半。或服檸檬酸亦可。○亦有取用印度蘇膏三分釐之一。或銻溴鏽溴。但無大效。如用必合安的拜林同服則佳。○一方。安的拜林一錢半。銻溴四錢。哥羅方酒二錢。樟腦水至八兩。相合。每服一調匙。或平常每早中晚服一匙。或服茄菲精亦可。但獨用不效。宜合安的拜林。或印度蘇膏同服為妙。○亦有用求拉那。每服約半錢。極有功效。或求拉那精 每服五釐或綠養冰。善能安睡。不知其痛。或服高頓綠養冰亦可。或服白塔綠養冰。治第五對腦筋痛。甚有效驗。或阿沒來淡養。或淡酸甘油。或薄荷冰。郁加利達油。均無大用。或服嚙啡。敦辯 Tonga. 酒司的新 Cysticine. 拉白納 Laburnum. 亞力加 Arnica. 羊躑躅。蘆茄。或輕淡匹克雷得。Picrate of Ammonia. 或加拉巴。或了葛。或酒精其拉撒米姆。山米斯。毛

地黃、樟腦、輕淡綠、甘松、匹克羅到克興 *Picrotoxin* 等。均有效者。有不效者。○至於外治之法。不一而足。或包之使熱。或冷水澆之。或啣呀等噴射之。或以蜚蜚引炎。或以布卷將頭紮緊。或臥在黑房。不見陽光。或眼中滴了刀邊。或額上搽蘆茄。或薄荷冰。或薄荷冰合蘆茄膏與甘油。三者調勻搽之。或電震重四均可試用。○瀉劑有用之者。有不用者。○未發之時。宜細審病由。然後治之。每有明衣高低不平。以致頭痛者。須佩眼鏡。可以制其頭痛。如因用心勞腦過度者。宜靜養毋躁。如因憂鬱與飲食起息無常所致者。須每日按時。以免病發。○如便閉不睡。胃滯虛弱者。均照症治之。○至於預防之法。惟有服鉀石。或鉀石鏽。二者不效。可服印度蘇、銹、輕淡綠、燐、沙利沙等劑。或每早熱水沐浴。浴後再以冷水澆頭脊兩部。忌飲濃茶。○一方、鉀石鏽十二分釐之一。印度蘇膏六分釐之一。蘆茄膏三分釐之一。甘松鏽珠二釐。相合成一丸。每早飯中飯之後服一丸。甚有效驗。經久常服。可除頭痛之患。

大便出血 *Melena*.

多由胃經大小腸之血。溢出之故。○治法。先治其本。如因胃爛。或肝積血。或小腸爛者。均照症治。餘詳卷二流血吐血篇。如病在小腸者。宜以鴉片鉛醋洋蘇木白礬等品。成丸服之。

腦胞發炎 *Meningitis, Cerebral (Simple.)*

此乃腦之胞膜發炎之症。○治法。最宜平臥。頭畧高擱。切勿嘈雜。愈靜愈妙。勿見陽光。飲食惟淡。牛乳合冰水為宜。初起凡有力提神之物。如牛均宜忌之。又須每晚服加路迷。每早服鎂磺。養以瀉之。○頭極痛者。宜在太陽穴貼蜚蜚膏。或以冷水澆頭。或將頭髮剃去。或按以冰袋。或在枕後引炎。使血下行。宜貼蜚蜚膏至將起泡而未起泡之時揭去頭痛者。宜服安的拜林。安的拜林。或鴉片。或撒弗那兒。綠養冰等。使之安睡。銹溴亦可服之。但無大效。惟

抽搐不止者。鈹溴則不可少。○如胃經無累病不吐者。可服鈹碘。甚有效驗。有花柳體者服此更效○如嘔吐者。最宜吞服冰塊。或沸鹽之類。或咖啡水。輕衰酸、鈹劑等可也。○如脉數皮膚乾燥而熱者。宜草烏豆。或冷水澆身。因起者此法更效○如病重熱不減。謔語。或癲狂者。因胞膜發炎過甚之故。此時亟宜放血。否則此後腦膜積水。以致如癡如呆。脉細。瞳神變大。不能收縮。此時放血。已不及矣。惟有大瀉之。或內服鈹碘亦可。大約病勢至此。每多束手。但亦有忽然得愈者。是以病雖危險。仍宜設法救治。以待轉機為要。○一方。汞油藥。用汞一斤。淨猪油一斤。羊油一兩。調合極勻。用此油搽在兩腋與兩膀肚腹之旁。約半點鐘之久。搽後不見多流口水者。須過十二點鐘再搽之。如搽藥後漸有起色。以後之飲飲起居。最宜小心。并須數月靜養。不可多用心思。有勞腦體。并服補益之品。亦有先服鈹溴。鈹碘。然後再服補益之藥亦效。

腦與腦脊根腦膜發炎 或作髓衣炎 Meningitis, Cerebro Spinal.

治法。最宜靜臥。概與上文腦胞發炎相同。疼痛者宜鴉片、安的拜林等品。惟身熱極重者。鴉片、咖啡宜忌勿服。熱減者鴉片、咖啡最為有益。有可或以冷水壓之亦可。身極熱者。宜以被單浸冷水包裹全身。有霉毒者。宜服金雞那霜。如炎後積水者。宜引炎法。或服瀉劑。或服鈹碘。每日服三次每次服一分

腦脊髓根衣發炎 或作髓濕衣血衣炎 Meningitis, Spinal.

治法與上文腦胞發炎同。另有數法。亦可試用。一宜覆臥或側臥。不可仰臥。二飲食宜滋潤流質。肉與菜切宜忌之。三炎處放血。四冷水壓之。五或冷壓劑。六脊部貼蜚蜚膏引炎。七服鹽類瀉劑。八內服鈹碘。如痛者。合開羊花、咖啡、安的拜林、印度蘇、鈹溴、綠養冰等。同服可也。九用汞油外搽。與上法同或內服汞劑。亦有專用蕁茄了葛者。但不甚效。十熱水沐浴。或熱壓劑。十一電震。十二宜以三脚架駕之。見續脚病餘與胞膜炎同

腦膜炎生嘔吐咖啡 *Meningitis, Tubercular.*

此症不治。且辨之極難。如醫者審明此症。切勿施以引炎泄瀉放血之法。病者宜靜臥。不見陽光。頭畧高擱。并服加路迷。初起宜之飲冷牛乳。頭部壓冷水。或枕後貼芥辣膏。或內服銹溴。安的拜林。以止頭痛。或撒弗那兒。或銹碘。如二歲之小兒。可服一釐銹碘。合二釐銹溴。化水少許作一次服。頗效。○又飲食。惟牛乳為最要。牛汁雞湯。恐嫌太濃。○如瞳神變大不動。漸漸昏厥。此時以搽汞油藥為最要。次之宜引炎法。

月經妄行 一時病發曰血崩 *Menorrhagia.*

此症與血崩相同。經期病發。謂之月經妄行。平時病發。即血崩也。均由子宮有病所致。醫者又須查明臟腑各症。以及血路腦筋之病。有無霉毒。或因子宮爛。或生癰生瘤倒垂。或產後子宮收縮不正。或子核積血。或年老經斷之故。○治法。宜平臥靜養。衣被輕鬆。飲食以冷牛乳。乳餅。

為宜。○內服之藥。最妙了葛膏或精。服大每服一錢。或了葛精成丸。每日服三四次。每次服一二釐。或以了葛精用皮膚針射入大腿。或以二三星釐成尖丸。納入陰道。○一方。了葛精一釐半。印度麻膏三分釐之一。金雞那霜三釐。成一丸。每四點鐘服一丸。最效。○如疼痛流血極多。身覺不舒者。宜嚙啡。印度麻。如身體虛弱者。宜鐵之補劑。如身體肥胖者。宜鹽類瀉劑。○如子核積血發炎者。銹溴或輕淡溴。必不可少。○其餘如毛地黃。山米斯。海士林。銹綠。銀養。圭阿禁。兒烏。辛衣格。沙文。馬前冰。幾阿蘇。碘。埃阿達方。蘆茄等品。均可試用。其中推毛地黃。山米斯。海士林為最佳。○一方嚙啡水三錢。毛地黃酒二錢。海士林半兩。海達拉斯酒 *Tinct Hydrastis.* 六錢。甘油到三兩。相合。每服一錢。合水少許。每三點鐘一服。○此症內服白礬。沒石子等。收斂之劑。概無效驗。不能斂子宮所出之血。宜先治其病由為要。○如流血過多。無法可止者。切勿聽之。須

在子宮內用法止之。一電震子宮內面。子宮有小瘡或產後子宮收縮不正者用此法則更效 一端納入子宮

之內。一端在腹外。約震一刻之久。每七日震兩次。不可放電過重。○如

因子宮生瘕者。鉗取之。○亦有棉棉花浸加波匿酸、鐵汁、銀淡養、幾阿

蘇等。塞入或射入子宮者。但此法非醫者善用之不可。射入時必須將

宮口撐開。以便藥水流出。若積在宮內難免潰爛 ○亦有先用海棉絨。Sea-tangle-tents。

塞入宮口。濕後脹大。然後用陰撐撐大陰戶。拊定子宮。搽以淡酸亦可。

○如一時血崩。甚屬危險者。宜照卷一小產篇中。以棉花墊塞子宮之

法治之可也。○如先有子宮血崩。用法止之。後至經期。月經忽閉不行。

全身不舒者。宜服汞藍丸五釐。或加路迷四釐瀉之。瀉後數日內。宜靜

臥。後服一方。嘍啡十二分釐之一。了葛精三分釐之一。蘆茄膏六分釐

之一。相合成丸。每四點鐘服一丸。至月經已行。則每晚服一丸。至月經

再來為度。又行經後兩三禮拜內。宜服鈹溴。每日服二次。每次三分以

佐之。

肚腹吸核變大 Mesenteric Gland Disease.

此症與別種吸核變大相同。故治法亦與瘰癧相同。最宜出門吸淨天

氣。切忌寒濕。飲食宜補。牛乳牛汁雞蛋為佳。內服魚油麥液醬。以及鐵

碘糖露鐵燐鉀石鉅綠等品。○外治之法。宜以魚油搽在肚腹外面。但

病人先宜熱水沐浴。浴後搽魚油。後在爐前烘之。在腹兩旁更多搽之。

再以絨布卷油紙包裹。每日搽一二次。頗有效驗。布卷宜四五日一洗 此法一切虛勞

沉重待補之症。服藥不及者。均可用之。

子宮本體發炎 Metritis.

此症與子宮內炎。詳卷二子宮內皮炎相連。故治法亦同。大抵新炎治法有八。一宜靜

臥勿動。二用熱水射洗肛門。或內服或納入陰門肛門或用皮膚針射入 三嘍啡止痛。或內服或納入陰門肛門或用皮膚針射入 四外壓熱劑。或熱水布

壓藥須合蘆茄或鴉片少許。五用溫熱加波匿酸水。一兩化水十斤射入陰道以潤

之。^六坐熱水盆。^七在肛門邊或小腹蟻吮。^八服退熱發表之劑。身熱一百一二度者宜用此法
 此外另以熱汞綠水。或加波匿酸水。一至三十或鈹錳養水。半盞化水一兩射洗子宮內皮。務須先將宮口撐大。然後用雙通管射洗之。如熱重猶如產後發熱之病形者。宜提神兼退熱之品。切勿獨用退熱之劑為要。林的拜○如舊炎。概因產後。子宮不盡收縮。或收縮不合常度。或有小塊血塊胎衣胎盤內積。產後起牀過早或小產易犯之或因子宮倒前倒後所致。均照症施治。務以去其病由為要。餘詳卷二子宮內皮舊炎之法。○如牛新不舊之症。最效宜服鐵酒與了葛。○又此症最宜靜臥。但不宜久臥。務須適中。因久臥不動。每有子宮積血之患。最妥之法。先用象皮卷 *Ring or Hodge Pessary*。納入陰內。抵住子宮。後略行走為妙。或先以熱水後以冷礬水洗射子宮。并子服鹽類瀉劑可也。○如日久變為舊症。宜服鈹碘鈹溴。另以棉花浸甘油。塞入陰中。能使子宮漸漸收縮。或以碘加波匿酸等。引炎之藥。搽拭子宮之口。或以蜚螯水。或小刀挫擦子宮之口。以引其炎。

異胎 由胎兒死後變成 *Mole Pregnancy*。

此乃胎兒病死不下。仍在子宮。漸漸變成泡形如球。彷彿葡萄。屆時產下。故未產之前。病症甚難分辨。至產後方知此症。如臨產無病者聽之。如覺子宮之內血溢積脹。或外流者。須服了葛精。并以象皮袋 *Barnes's bag*。充塞子宮之口以止之。○亦有將宮口撐大。後將死質盡行取出。取時須極小心。切勿用拊或手指剔刮。須防血崩最妥之法。用手在腹外撫擠子宮。使子宮有力。自然逼出。并服藥以助之。○一方。了葛流膏六錢。馬前酒四錢。毛地黃酒一錢。金雞那酒到六兩。相合。每日四次。每服一中匙。合水少許同服。

痣 或作 癭 *Moles*。

此乃胎成皮膚變厚。兼有毫毛。俗名胎記。○治法宜割。或火刀或剔刮。

或以鈇輕養或錐綠等丹藥。成爲稠汁蝕之。或搽淡酸亦可。

骨變軟症 *Mollities Ossium.*

此乃極重不治之症。最多者。如婦女產後虛弱。盆骨變軟。窄而不正。無異瘦弱之小兒背骨變壞之症。俗名龜背。○治法。飲食起居合宜。初起須安臥靜養。後服補劑。如婦女骨盤已變窄不正者。有礙生產。孕後一二月。即宜下之。以免後患。

傳染軟瘤 *Molluscum Contagiosum.*

此乃皮膚生小瘤如袋下垂。內係膠汁。*Cystic growths.*自小米至黃豆大。○治法。大者宜割之。剪之。小者宜搽硫磺與輕淡汞。或淡酸加波匿酸等劑爛之。

筋網軟瘤 *Molluscum Fibrosum.*

此症與前症同。但較前症更韌而堅。○治法。用線縛之。或火刀割之。

內腎移動 *Movable Kidney.*

此乃內腎移位動搖之症。如婦女多生產者。腹肌寬大。每有內腎移動之患。概無碍處。如病重疼痛不堪。宜屈身仰臥。腎較腰更高。或將病人倒懸片刻。立效。亦有以噤啡內服外射。或用熱壓劑。或以布卷包紮腰部。此法必先移腎至本位然後用之。或以疝帶紮緊患處。或在患處開刀。將內腎與腸迴縫合。不使移動。或將內腎割出。依病之輕重。見症施治可也。

豬頭風 俗名 疝腮 *Mumps.*

此症乃腮核發炎脹大之故。○治法。切忌風寒。不可出外行走。宜用棉花包裹患處。以免風寒。○疼痛不能開口。牙關緊閉者。宜熱壓劑。并先搽以蘆茄膏合甘油。○亦有極重變成毒者。極少不多。即宜開刀。病人飲食。宜滋潤易化之物。○一方。草烏豆酒十六滴。輕淡醋水一兩。糖露半兩。樟腦水到二兩。相合。每二點鐘服一小匙。○此症小兒患之。每有累及腎

子同炎者。或腦胞發炎者。或婦女患此累及子核發炎者。均宜照症施治。積按有患此症兼發癲狂者。想因腦筋累腦之故。

脊髓發炎 Myelitis.

此症概由別病累成。如脊骨損傷者。脊髓必多發炎。○治法。最宜靜臥。切忌行動。另以冰袋。外壓患處。○疼痛者。以蟻吮血。或放血。或搽蟻蝥水引炎。○大約新炎內服之藥。不甚效驗。惟汞綠水或鈹碘。可以取服。間有效者。○至炎退後。宜電震之。或推拿法。或服磷劑。或以馬前冰射入皮膚。○此症久臥。每致背脊臀部。成爲癰瘡。醫者須當設法預防。○又如病人膀胱無力。以致小便內積變臭。宜服硼酸。或以通管放之。先探甘油

近視 Myopia.

此症概爲多耗目力。先覺眼痛。漸致眼球變長。所集光點不合目系之故。○治法。惟有佩帶合宜近視眼鏡爲要。如初起似覺。將近視而未近視者。此時宜靜養目力。每晚滴入加拉巴豆精水。約一二月之久。間有愈者。但不甚多。

痰脹 Myxœdema.

此症極少。乃全身腫脹。內有極薄痰質所致。病人之溺。多涵蛋白。此症長大婦女患之。男子則無。○病狀。皮膚色白腫脹。毫無血色。腫處光亮。猶如白蠟。多屬不治。惟有顧其胃口。衣服宜法蘭絨。內服表劑。宜白蘭地。合比魯介賓。并以熱水沐浴。或蒸氣引汗法。亦有服以鉀石。金綠者。但不甚效。○近有割取別人之脾核小塊。 Thyroid Gland. 或取牲畜之脾核亦可 種入病人肚腹之皮內。亦有以脾核製成糖片以治此症者 謂可以取愈者。亦妙法也。

血絲瘤或血痣 Nevus.

此係胎成之病。由微絲血管變成爲瘤。色藍而紅。猶如雞冠。能漸漸變

大如病在身體。無關緊要。不必治。如病在頭面。或漸漸變大者。宜電針刺之。使該處之血給塊脫下。大約電箱銀片宜以十支浸入藥水刺法。將電針一枚刺入瘤中。一枚刺入相近無病處。或兩針均刺入瘤中。約半刻之久。見瘤漸變為藍色。知時已足。可以將針拔出。以後每七日一刺。漸能退去。○如瘤小者。可以線縛定。但此症根蒂寬闊。概不易縛。不如用雙針穿線。如縛痔瘡法治之。約一二日自脫。脫後照爛瘡治之。○此外有用丹藥爛之者。但不甚效。亦有用火刀割之者。○如瘤極薄者。可以淡酸搽之。或以吡啶

吡啶

Pyridate of Sodium.

搽之。或用刀統行割去可也。

骨爛 或作腐骨 *Necrosis.*

此症病由不一。或花柳。或體弱。或瘰癧。或燐毒。如下牙床骨爛是也等所致。大約施治不易。不能速愈。○治法。一 飲食宜佳。二 住處通風。三 不可過動。○如患處有膿瘡者。宜及早開刀。如膿在骨衣內積者。不易外凸。如是者。最宜

早割。且割口愈大愈深為妙。○既割之後。如腐骨已動者。當將腐骨取出。如腐骨未動者。容後再取。○亦有新骨長於死骨四圍。相輔墊滿。堅固不動。或已動而不易出者。宜將新骨鑿去少許。然後將死骨取出。另以棉花甘油墊滿。每日洗換。最易告愈。

腦筋痛 *Neuralgia.*

此係腦筋所到之處作痛。而腦筋本體並無別病也。○治法。宜審明病故。如因血薄虛弱宜補血。內服鐵劑。或一方鐵養 *Ferris Redacti.* 四釐。金雞那霜二釐。相合成丸。日服三次。或服鉀石。或鐵鉀養合金雞那散。成丸服亦可。至於病人衣食起居。最宜合度。切忌憂鬱忿怒為要。○如有霉毒。或酒風。或風濕。或花柳。或有子宮之病。或各種痔瘡。或臀部之病。或牙痛。或鼻病。或感冒風寒。均可累及腦筋痛者。須照症施治。且起居衣食。最宜小心。○疼痛不止者。宜用嚙啡。或內服。或外射。外射能直達至腦筋較內服更靈驗

但宜慎用。不使成癮為要。○亦有太服輕淡綠。每二點鐘服二分。服三四次後。每三四點鐘服一次。頗效。如一月後不效者。不必再服。○如因霉毒所致者。宜服金雞那霜。每服半至一分。如第五對眼腦筋痛者服金雞那霜最有效驗一方。嘍啡六分。釐之一。輕淡綠分半。金雞那霜半分。相合。成散。每六點鐘吞服一包。飯後服之。○此外安的拜林。安的非白林。汾納司下。沙羅兒等品。均有效驗。惟安的拜林。起初宜服一分。後每服半分。大約合服至二三分後。其痛必止。○又方。安的拜林二錢。哥哥流膏二兩。哥地那六釐。甘油水到四兩。相合。每服小匙。每日一二次。飯後服之亦效。○又克撒兒琴。每三四點鐘服一釐。化水服。約服三四次為度。○印度蘇亦有止痛之功。與鴉片嘍啡同。每服三分釐之一至半釐。成丸服。每四或六點鐘一服。○其拉撒米姆。善止第五對腦筋痛。每服膏一釐。或酒二分。每二點鐘服一次。○綠養冰有效有不效。高登綠養冰或白塔綠養冰。

Crotol-

chloral or Butyl-chloral Hydrate.

善治第五對腦筋痛。又能安睡。內臟腦筋痛則無效初次

服一分。後每二點鐘服半分。或以高登綠養冰三釐。合其拉撒米姆膏半釐。或精 Gelsemium. 一百分之釐之一。成丸服亦可。○一方。印度蘇膏八分。釐之一。白塔綠養冰半分。成丸服均效。○了刀邊與蘆茄。凡內腑腦筋痛宜之。○一方。用蘆茄膏三分釐之一。鉞鉞養十二分釐之一。哥地那六分釐之一。安的非白林三釐半。成丸。每日服三次。每飯後一丸。○一方。開羊花酒養金花酒蘆茄酒各四錢。相合。每服二十五滴。合水少許。日服三次。每飯後服之亦效。○鐵與鉀石。凡纏綿不愈之症。必不可少。鉀石宜服水。鐵宜服鐵丸。如鐵鉀石合金雞那霜同服。功力更偉。○如因用心過度。腦乏以致此症者。宜服燐。每服五十至二十五分釐之一。或合馬前冰同服。或服輕燐養各劑。如鐵燐養。佛羅斯貢邦補藥。與啞嘶頓糖露等均可。○錐之各藥。如甘松錐珠。甚有效驗。○一方。金雞

那甘松珠。Quinine Valer. 甘松鐵。Ferri Valer. 甘松鋸。Zinc Valer. 各釐半。其

拉撒米姆膏四分釐之一。相合成丸。甚效。○此外如哥根、茄菲精、馬前冰、了葛精、謙落、哥地那精、撒姆白等。均可取用。茄菲精大服。善治面腦筋痛。○一方。馬前膏三分釐之一。哥地那精三分釐之二。成丸。善治內腑腦筋痛。○又薄荷冰。此症最宜。或外用或內服。均可。○甘油淡酸。阿末來淡養氣。凡新起腦筋痛宜之。○亦有聞哥羅方。或啞啞或醉酒。以止痛者。但此法欠妥。最宜慎用。○鈹碘、鏹沙利沙。凡風濕與花柳體宜之。又腎大腦筋痛。Sciatica. 亦宜之。○山米斯善止子核之腦筋痛。○鈹溴獨用。概無大效。如因腦筋痛不睡者。宜以此合鴉片鈹碘同服。則功用頗效。○敦稱善治面腦筋痛。此藥出於飛奇島。取用其葉與皮。煉取成汁。功力頗佳。

外治之法。一針刺。Acupuncture. 刺法依疼痛之腦筋。直刺三四處。或以

皮膚針。將淡嚙啡水加入少許。了刀邊水。約五十分釐之一射入痛處之腦筋。取效

更速。二同法。Aquapuncture. 將清水射入痛處。三以阿使米克酸 Osmic

Acid. 一釐。化水一百滴。取此水十五滴。合水少許。分爲五次。相近皮膚

痛處。用皮膚針射入。或以哥根同法射入。每四分釐之一亦可。此外如加波匿酸、

哥根、安的拜林、松節油、與幾阿蘇、薄荷油、丁香等品。均可射入。但無大

效。○哥羅方每次可射入五至十五滴。功用之速。遠勝別藥。四引炎法。

Counter-irritation. 最宜用蜚蜚各藥。如臀部腦筋痛。膏藥宜長而大。如頭

部腦筋痛。膏藥宜貼在太陽。或耳後。亦有以熱鐵煨在痛處。或貼芥辣

與辣椒膏。五止痛之法。Anodynes. 如薄荷冰。或草烏豆、蘆茄。哥羅方等

搽藥。搽在患處。○一方。丁香油四錢。薄荷油六錢。哥羅方二錢。草烏豆

搽藥四錢。相合搽之。甚有效驗。○或以草烏豆油藥。了刀邊油藥。藜蘆

油藥。Ung. Veratrinae. 等均可搽之。或以哥羅方啞啞等噴射痛處。使痛處變冷亦

有功效。或以埃阿達方化在哥羅方。或哥老典恩。輕炭淡酸。或再合以綠養冰樟腦等藥。用以外射亦效。○或以硫磺粉先搽患處。後再用少許合棉花包裹患處亦效。亦有以熱水或冷水包裹痛處者。○電震之法。於此症概無用處。惟有時腎大腦筋痛。電震之或有愈者。○如病久已用各藥無效者。惟有出門。改換水土。常至海邊遊行。吸淨天氣為要。○用盡諸法仍不愈者。一宜將腦筋拉動。 *Nerve stretching.* 二將腦筋割斷。 *Neurotomy, (or section of the nerve.)* 三將腦筋剪斷少許。 *Neurectomy, (or excision of a portion of the nerve.)* 四將腦筋抽出之。 *Nerve-avulsion, (or the tearing out of a nerve trunk from the bony opening through which it passes.)* 五以線縛繫腦筋。 *Nerve ligature.* 此外或用他法。 無異中土之說由科 *Hypnotization.* 改其腦部功用。惟具此術者。類多秘而不宣。此非門外漢所能悉其底蘊也。

腦筋發炎 *Neuritis.*

治法。宜去其病由。如花柳風濕質者。宜服銹碘汞沙利沙等品。如為丹毒。 永鉛等毒 酒毒。以及風寒潮濕所致者。宜靜養勿動。射入嚙啡哥根等品。 詳腦筋痛 或引炎法。如病已變舊。腦筋痿癱者。宜推拿法。并電震之。如別部腦筋或全腦筋均炎者。宜大服銹碘。或安的拜林。如一手一足之腦筋炎而疼痛者。宜以棉花包裹。勿襲風寒。并搽止痛之藥。餘詳腦筋痛篇。

腦筋瘤 *Neuroma.*

大抵此症疼痛難堪。用藥無濟。宜將該瘤割去。後將兩端之腦筋用線縫合。否則病處以下。廢癱無用。

夢魘 *Nightmare.*

大抵為食物積滯。胃部不化。或虛弱仰臥。四肢痠木。或憂鬱思慮。腦不得養。或用心過度。髓海虛乏。以致腦部不安。睡中恍惚。似見鬼魔。或有重物壓身。或呼叫不出。種種病狀。不一而足。○治法。宜去其病故。并服

鉄溴。或撒弗那兒。如病人夢寐之中。似覺病症將發。宜當時起牀。行走散步。提醒腦部。或以冷水澆洒頭面。或聞濃輕淡水。或阿末來淡養氣均可。積按此症本無鬼魔魘壓。或由本人手壓胸膛。或由胃滯腦虛濁氣上升。胃腦筋不安累及腦部以致腦之靈機昏迷。是以夢魘。此夜症也。如日發之症。必與血薄或腦筋諸病相連。此則稱為暈倒。 *Fainting.* 與夢魘大異。不可不辨。

夜汗 或作盜汗

見肺勞。 *See under Phthisis.*

小兒夢魘 *Night Terrors.*

此症與前相同。但此小兒患之。多因出牙疳蟲食積不化之故。每至睡時。驚跳不定。○治法。先宜去其病由。平時忌受驚霍為要。○如胃滯者。宜鏹炭養大黃。忌食甜餅水果蕃茹等物。○內服之藥。首推鉄溴。常服不已。可使不發。○撒弗那兒亦可服之。惟綠養冰嚙啡鴉片等劑。小兒宜忌。勿用為妥。○一方。輕淡溴鏹溴各半錢。錒葡酒半錢。糖露一兩。薄荷水到二兩。相合。每晚服一匙。頗效。○又方。凡虛弱聰明異常之小兒。腦筋過於靈動。兼患此症者。宜之大黃粉四分半。輕淡溴一錢。鏹雙炭養錢半。生薑糖露六錢。薄荷水到四兩。相合。每日三次。每飯後服一匙。亦效。如小兒未病。以此常服。可免此患。

乳頭痛 *Nipples, Sore.*

此症多因小兒吸乳後。不事洗揩。以致皮皴開裂。疼痛難堪。故凡哺乳之時。宜將乳頭不時頻洗。去其污穢。可免乳頭各症。預防之法。最妙用火酒外洗藥。不時洗之。甘油佛士林不用為妙。因用後濕而勿燥。反使污穢皴裂。○如孕時乳頭覺痛者。預防此患。宜先用水洗。後罩鉛質乳蓋。以免揩擦。立效如神。○間有孕婦乳頭縮短。當時不治。則產後無從吮吸哺乳者。宜以鉛罩蓋之。再以布卷包

紫。則乳頭漸能伸長。萬一不效。乳頭仍縮者。切勿用鉗拮之。或用餅吸之為要。○如產後乳頭作痛。尚未吮吸者。宜待乳脹之時。使嬰兒吸之。或另用抽乳瓶吸之。其乳頭另以濃火酒一兩。玫瑰水三兩。相合洗之。或以絨布浸藥貼上。以油紙包裹為要。○有時用濃加波匿酸。或銀淡養擦乳頭者。甚為不宜。每有因此潰爛者。惟加波匿酸水一化可以外洗。○亦有用綠茶汁。或炭匿酸甘油。或炭匿酸化入火酒外洗者。○如乳頭患水蠟癩者。須防漸成乳癰。宜以乾粉羅石散等均宜或甘油合漿粉。或灰水到魯醬。或綠安息香雜酒。哥老典恩汞綠水。以及硼酸甘油等品。均可用之。

乳癰 Nipple, Malignant Disease of.

治法。將癰割去。不可稍留餘根。每有割後重發者。皆因剖割未盡所致。醫者確知此症。割之愈早愈妙。○亦有乳部先發水蠟癩症。然後變成癰者。見症速宜治之。切勿因循自誤。治水蠟癩一方。鉛醋水一分。卡而白兌對兒琴水一分。水二十分。相合洗之。○又方。錐養油七錢。卡而白兌對兒琴水一錢。輕淡汞二分。相合成油搽之。或錐養粉富羅石散漿粉等酒之亦可。詳見卷二水蠟癩篇○如水蠟癩變舊。即漸成乳癰之時。醫者知已成癰。速施刀法。將乳核統行割出淨盡。切勿稍留根底。而貽後患。餘見癰篇。

花癩 Nymphomania.

此係情欲之病。亦由腦弱所致。男少女多。服藥無功。如婦女患此。一見男子。病發愈重。其有羞恥全無。強抱男子。欲與交媾者。醫者遇此。最宜端方謹慎。若無親人服侍。寧勿診視為妙。○間有陰道或子核。或子宮發炎。累及腦筋所致者。故腦虛靈活年輕之婦女每至經期易發此症宜照症施治。并射洗陰具。或服溴樟腦等安腦之品。

肥體 或肥胖 Obesity.

此係皮膚肌肉之中脂油過多之故。○治法不一。大抵不必藥治。祇須飲食清淡合宜。為第一要法。若專恃藥力施治。不第無效。反起別病。有性命之憂。慎之毋忽。○醋酸、蛤蚧、鏽綠、鏽溴、鏽錳、鏽養、鏽碘、鏽水。或植物酸類合蛤蚧等品。均有有用之者。惟海草 Vesiculosus (Bladder Sea-weed.) 或膏或泡水內服。較以上各藥更妥而效。○又病人宜常在空曠處。不時運動。或泅海水。於此症甚有裨益也。或謂不食魚類能除肥胖者不足信○如一月內服藥。或用法一時使油減除者。甚為不妥。不如於數月內緩緩使油減去。其法宜常食酸類之物。凡肉食與油切宜忌之。則全身脂膏自減。而無肥胖之患。此症飲食最宜謹慎。凡油、蛋白、漿粉等類。相合易成脂油之質。均宜忌之。近來泰西名家施治此症。各有食表可考。茲特附錄如左。

潘丁氏 Banting method. 法。以忌油漿粉蛋白類為君

早飯九點鐘。宜肉五六兩。牛肉羊肉火腿魚腰子等惟小牛肉與猪肉宜忌 烹饅頭一兩。茶或茄菲一杯。去乳

乾濕合重一磅。不得過多。

午餐二點鐘。宜魚五六兩。鱈魚鰵魚鱈魚鱈魚等油多之魚宜忌 不食魚。可以雉雞或牛肉代之。菜

少許。惟蕃茹蘿蔔紅蘿蔔宜忌。烘饅頭一兩。果子撲丁。糖忌 少許。舍利

酒或淡酒 Claret. 十兩。惟香冰酒葡萄酒皮酒宜忌。乾濕合重約一

磅四兩。

點心六點鐘。宜已煮水果二三兩。糖忌 饅頭少許。茶九兩。無糖

晚餐九點鐘。宜魚或瘦肉三四兩。淡酒七兩。或舍利酒合水亦可 ○此法近來多不取

用。因依此日久。每有起患酒風胃症與腎症者。即病人亦難久忌。似

覺過嚴。故多鄙之。

歐白司丁氏 Elostein's. 法。以少食肥肉與蛋白為君

早餐六七點鐘。宜烘饅頭一兩七錢。白塔少許。茶八九兩。去乳

午餐二點鐘。宜牛骨湯少許。又肥肉四兩二錢至五兩六錢。合菜豆少許。酒二三杯。已煮水果少許。去糖下午點心。茶一杯。

晚餐七點半。茶一杯。去糖饅頭一兩。白塔少許。雞子一枚。或火腿或肥肉雞子少許以代雞子水果少許。不用酒。

潘歐二家之法。均以減去人身需用成油各質。增減為比例。考壯年身中需用各料分數。與歐氏潘氏增減比例如後。

治肥胖食料比例表	蛋白分數	油類分數	漿粉炭輕分數
壯年養身必需之料	三十錢	二十五錢	九十二錢
潘氏所定食物之料	四十三錢	二錢	五錢二十五分
歐氏所定食物之料	二十五錢五分	三錢五分	十一錢五分
華氏所定食物之料	四十五錢	九錢	二十五錢

歐氏之法較潘氏之法更效。且與病人甚為妥便。即華氏 *Oertel's* 之法

見卷二心門病篇以利水為君。或使病人登高出汗。以去其油。又魏氏 *Weir Mitchell*

之法。使病人常睡。專食已去油之淡牛乳。見卷二百合症或每日兩次推拿全身。

或秤其身體。務使每日減輕八兩至平常為度。又須不時運行身體。○

如日久病人飲食不便。可以雞湯或蛤蜊湯代之。且以後飲食中。以牛

羊肉蛤蜊類為多。凡油類宜減少忌食。

施氏 *Swedish* 之法。專食烘牛肉與開水。後滔氏 *Towers-Smith* 少改其

法。於初起十四日。每早餐午餐食牛肉一斤。晚食魚一斤。一日之中飲

開水約十斤。臨睡時飲半杯忽斯克酒。合水少許。此後至三十五日。宜

每日夜飲開水八十兩。羊肉魚菜饅頭等少許。去油再後至四十二日。宜

每日夜飲開水四十兩。茶餅畧可食之。魚雞雉羊肉牛肉并酒各少許。

又每早晚宜服欬炭養五釐。連服至九禮拜之後為度。

施柯氏 *Schroth's* 之法與前法相反。專食乾物。如饅頭。做後三四日方可食之 麥糊與酒少許。想此法甚難取愈也。

胡氏 *Wood* 云有某將軍自治之法。每月能去肥油甚多。其法每早上六點鐘飲茄菲茶二十兩。麥糊一兩。九點鐘肉四兩。麥饅頭三兩。茄菲三兩。二點鐘肉六兩。饅頭三兩。菜六兩。水或淡酒十兩。茄菲十兩。六點鐘茄菲十兩。九點鐘饅頭二兩。酒一杯。水果少許。甘草粉少許。所以通利大便 每月依此飲食。每月能減去脂油約百有十七斤。

以上之法。有可以取法者。有難以施行者。大抵宜審明病者。有無心病。然後施治。○凡蛋白、漿粉、糖。能忌之愈淨愈妙。○有時脂油稍可食之。○溫開水宜每飯後一二點鐘飲之。不可少○凡酸性之酒。與忽斯克。亦不可飲。如必不能少者。惟皮酒合蛤蜊水同飲可也。○又宜運行身體。并服鹽類瀉劑。○魚類間有可食者。○肥肉至多每日食一次。最妙之法。

早餐用肉。午餐用魚。晚餐雞蛋。○饅頭宜做後二三日者。烘食之。湯與牛乳宜少食。食之宜去乳油 如牛乳多食。別物宜減。○又牛乳與糖類食物。以及甜餅、茶、水果。宜忌之為要。

諸物哽喉 喉者食管也 吞金 附 Esophagus, Foreign Bodies in.

大抵魚骨、骨者為最多。宜用駿毛套刷。 *Bristle Porbang* 探出。如銅錢、骨者。宜以倒彎環圈鉤出。○如一時難覓鉤與刷者。簡法。可用紗線縛在通管頭成團。採取。或以線團大如龍眼。用絲線一條縛定。將線團浸糖露咽下。一手執線頭。度線團咽至哽處。便牽線引物即出。亦有吞食乾硬之餅。或饅頭。隨咽而下。如所哽者係軟骨。不妨隨食咽下。若係堅硬粗糙之物。或三角形者。切勿咽下。恐傷胃經。○亦有服阿伯嚙啡取吐而出者。如柔輦之物則可。若堅硬粗糙易傷食管與胃者。宜慎用之。○如所哽之物。已下咽至胃者。以及吞金之類。切勿吐之瀉之。須服乾

燥之品。飲其渣滓。務使吞下之物。與大便結合。無礙腸胃。且易於便出。故食物亦宜乾燥。大抵以熟雞蛋與乾餅為宜。不可多飲湯水。○如吞下之物過大。或係所鑲牙齒等物。易壞胃部者。速宜剖割取出為要。

食管變窄 或作咽隘 *Esophagus, Stricture of.*

此症每多不治。漸漸餓死。概為誤服強水等毒。以及花柳毒瘤所致。○治法。惟有用通管通之。先用細後用粗○如服毒藥所致者。初宜藥水漱洗。後用通管通之。若用通管過早。每有流血之弊。○如通管不能通入者。惟有在胃外部開孔。將食物灌入。如迫不待割者宜將食物由肛門射入○如因癰瘤所致者。宜四五日一通。不必逐日通之。因患癰者通之易誤。每有通至別處發炎而死者。○亦有將軟通管由鼻孔通至食管。約三四日不必取出。每易打噎亦不得已之法將食物由通管灌入。或由肛門射入。若病至此。每多不治。不過盡人事而待天命耳。

指甲炎 重者曰甲疽 或名指甲挫脆 *Onychia.*

此症疼痛不堪。大約用鈹鉀水 *Liq Potasse Arsenitis.* 二錢。汽水一兩相合。洗之。或浸布貼之。或加波匿酸合火酒外洗藥。洗貼亦效。○一方。加波匿酸一錢。水四兩。相合。浸布包裹。頗效。○又方。綠養冰半至一分。化水一兩。包裹。或用埃阿達方合爐甘石粉酒之。或以鉛淡養成粉酒之。或以硼酸油。栢油。汞油。紅汞養油搽之。亦有初起時搽銀淡養而得愈者。○如指甲下面新肌。有肉刺極疼痛者。宜搽加波匿酸。濃鐵綠水。濃鐵磺水。銅磺養。炭匿酸等品。甚有效驗。○如病重者。宜將指甲拔去。後以鉛淡養粉酒之。

吸食鴉片 或鴉片成癮 *Opium Habit.*

此係中土甚多。極不端之一病。其間或有因疾病所累者。一經成癮。斷除甚難。即染煙之人。亦未嘗不有志願戒。醫者須審其體質何如。或宜

速戒。或宜緩戒。○速戒多有不睡之弊。因醫體功用異常醫者先宜設法預防。或投以撒弗那兒撥拉兒海達。此藥服後約一周時功用尚在與鬧羊花精。鈇溴。鏹溴。均可。惟綠養冰。印度蘇。宜慎用之。因過服亦有成癮之患。○如緩戒。或速戒不能支撐者最妙以哥哥流膏。Fluid Extract of Erythroxylon Coca。或哥根金雞那霜。安的拜林辛高那馬前冰等品亦可。○如嘔吐泄瀉者。均照症治。○一方。哥哥流膏 Extract Coca Liq. 一二兩。辛高那流膏一兩。辛高那酒二兩。輕淡香酒二兩。甘油一兩。相合。每兩點鐘服一錢。化水同服。如煙癮重者。照方加增。甚有效驗。○此外初戒數日。飲食最宜易化流質之物。牛汁藕粉等為妙。大約每二點鐘飲食二次○如困疲虛弱難堪者。宜輕淡香酒。或忽斯克酒。亦有醉以酒藉去其癮者。○如緩戒。凡哥哥安的拜林撒弗那兒撥拉兒海達均可用之。惟綠養冰與酒宜忌。

槓按鴉片一物。貽害於我中國。日復一日。不知伊于胡底。凡吸食者。

毒染臟腑。疾病由是叢生。身體由是敗壞。甚至室家不顧。骨肉無情。或怠惰成性。無能振作。深堪痛恨。是鴉片亟宜消滅盡淨。刻不容緩者也。奈國家稅項。以此為大宗。無異導民於死地通商貿易。藉此為大利。煙館林立。如星羅棋布。通都大邑。窮鄉僻壤。何處蔑有。吸染者。既不知趨吉避凶。互相勸導。即當道巨公。安見設法嚴禁煙土哉。無異縱民於惡以故審時度勢。欲使斷絕煙患於中國。有斷乎不能者也。於是乎射利之徒。製成戒煙各藥。名目甚多。不能屈指。細覈其質。皆以鴉片煙灰煙精等品為魂靈。購服者不過以煙戒煙。祇能抵癮。要難以此戒脫煙癮。一大局不知此案何日可破。是服藥無異吞煙。甚屬可惡。此有心人所以撫膺悼歎。大聲疾呼。奉勸世之溺煙癖者。蓋至各處泰西醫局。妥為戒除。切勿購服各種煙土所製之藥。徒貪一時之安舒。自貽終身之禍患。亦願仕宦商賈。廣設戒煙之局。互相勸戒。須存疾煙如仇之心。庶幾數年以後。煙

患掃蕩而空。再無一人吸食。則中國之元氣由是可復。此鄙人之所默為心香叩禱者也。

有志戒烟者。切勿以市上所售戒烟各藥常服。因服藥後。烟雖不吸。而此藥難以間斷。仍與吸烟等。是以莫妙。至西醫處戒之。務期烟癮戒脫。淨盡。身無後患。而後已。萬一不能到局。謹擬數方。依各人之氣質。酌而用之可也。○一方。先用嘜啡水此藥必須醫士酌用二兩。豆蔻酒三兩。水加至十二兩。相合。納入甲瓶。○再用哥羅方酒一兩半。士的年水三錢。蘆茄酒六錢。豆蔻酒二兩。水加到十二兩。相合。納入乙瓶。○服法。反吸烟二錢者。服甲藥瓶水半兩。每日服三次。飯前服之。已服甲瓶藥水半兩之後。當取乙瓶藥水半兩。加入甲瓶。補其不足。再以遠年黃酒半兩。加入乙瓶。補其不足。每服一次。依法遞加。至甲乙兩瓶。有酒無藥。烟亦從此戒去矣。一方。亞羅一錢。金雞那霜二錢。鐵礦養錢半。沒藥粉一分半。馬前膏半

錢。龍膽草膏足用。相合。分作六十丸。亦有加入嘜啡一分半。用以戒鴉片。並不發癮。惟此法易誤。吸烟者不可照方配戒。必須醫士酌用。凡吸烟

一錢者。服丸一粒。每飯前服一次。漸漸減去。

一方。速戒之法。用印度蔴酒四錢。龍膽草酒六錢。金雞那酒四錢。苦白木酒四錢。水到六兩。相合。不分癮之輕重。每飯前服半兩。○如四五日內。嘔吐泄瀉者。聽之。此藥連服二瓶後。另服。○一方。大黃雜酒六錢。鏞雙炭養四錢。輕淡水一分。馬前酒三錢。薄荷水到六兩。每日服三次。每飯前服半兩。如烟已戒脫。然後宜服補益之品。

一方。此係西醫濤衛氏 *Douthwaite's* 佳煙 所製。專戒鴉片者也。金雞那霜

一釐。鐵輕燐養一釐半。馬前冰五十分釐之一。鬧羊花膏一釐。膠粉足用。成爲藥片。每服一至六片。亦效。

外腎與睪冠發炎 *Orchitis and Epidymitis.*

此係外腎卵核發炎。或睪冠同炎。分爲新舊兩種。

新炎症。○治法。最宜平臥。忌動。並用薄板一條。橫在腿間。將腎囊擱起。如不能靜臥。必須行走者。須用專製之帶。將腎囊兜住。勿動。簡法可用方布一條兜之。亦可。○內服之藥。初起宜鹽類瀉劑。如鎂磺養。每服一錢。日服數次。○身熱不舒者。宜表劑。○一方。綠藜蘆酒。Tinct Veratri Vir. 一分六。輕淡醋水二兩。錫葡萄酒一兩。樟腦水五兩。相合。每兩點鐘服一大匙。○病人飲食。宜滋潤之物。如牛乳。蛤蜊水。藕粉等為宜。○每晚宜服鴉片與銹溴。善能安睡止痛。○外治。初起宜壓冷劑。醋咿咿等。如冷治不效者。宜壓熱劑。或罌粟花壓藥。或搽蘆茄膏。○外腎腫痛難堪者。一宜用銀淡養水。^{一至}搽之。^二蟻吮。^三在迴血管放血。^四用小刀刺在腫處。刺放血水。^五用極細針刺入腎核。以放內積之水。^六針挑。^七用象皮布卷等包裹腎核。助其消退。^{雖包時頗痛後能漸退}或用哥老典恩收縮之亦可。如有膿者。宜放之。大約新症二至八日。可以漸退。○新炎已去。尚未退盡者。

宜銹碘搽藥。肥皂搽藥搽之。最有效驗。或浸布貼上。再以象皮布卷包之。亦可。亦有用汞油藥而得愈者。又碘搽藥亦可用之。但搽後往往發患細小膿泡。故不多用。

舊炎症。○治法。內服銹碘。如因溺管發炎。或酒風發炎累及者。宜服鎂磺養哥枝。禁鏽沙利沙。并外用熱壓劑。大約舊炎多因花柳之毒。是以汞與銹碘。甚有效驗。且舊炎纏綿不已。難以速痊。又須靜養。緩治為要。

○一方。陀糯佛司水。Liq. Donovan's 兩半。汽水四兩。相合。每服一錢。日三次。○又方。汞雙綠二釐。銹碘二錢。汽水十二兩。相合。每服半兩。日服三次。每飯後化水同服。甚有效驗。○外用宜以汞尖丸。納入肛門。或搽汞油。或用象皮布卷包裹。使之收縮。○如舊炎痛甚者。可用汞油藥。合謙落油各半。或合蘆茄膏。^{每百分加蘆茄膏十五至十五分}甚效。○一方。汞油粉三錢。謙落油四錢。蘆茄膏一錢。成油搽之。其痛立止。○至於病人飲食。最宜清淡滋潤之。

物。病已愈。宜服魚油馬前冰碑石鐵劑等品以補之。

爛耳 Otorrhoea.

此係中耳發炎之症。詳見卷二耳症纏綿難愈。膿水交流。治之不易。○治法。須用

鉍錳養水。每日二三次洗之。極淨。然後以棉花揩乾。插入硼酸粉。或以

錳磺養二釐。化水一兩洗之。功力較硼酸更偉。○如膿多極臭者。宜用

鉍錳養水洗之。或汞雙綠一釐。化火醇一兩。以吸水棉花少許。浸濕塞

入。不可進塞過滿。使毒易出為要。日換數次。頗效。○一方。硼酸一錢。埃阿達方一錢。相合。先將

膿水洗淨。後用此粉插入。亦效。

子核發炎 Ovary, Inflammation of.

此係婦女子核發炎。多因子宮別病累及所致。分爲新舊兩種。

新炎治法。宜平臥靜養。兩脚屈縮。使肚腹鬆軟。并服鹽類瀉劑。如鉍磺

養。或鎂磺養六錢。或以熱水射洗肛門。外用熱壓劑壓之。或蜜蚤松節

油芥辣膏等引炎。○疼痛者。宜嚙啡。或服或射。或嚙啡尖丸。納入陰道

或以樟腦搽藥一兩。哥羅方與贛茄搽藥各一兩。半相合外搽。○每晚

臨睡。宜服安的拜林。或鉍溴三分。或印度蘇或嚙啡均可。

舊炎病症已久。治之亦難。每見久病服藥成癮者最宜顧其身體。飲食小心。便閉者。通

利之。須服加斯加拉膏。并熱水外導法。風寒最宜小心。切忌勞心用力。

○舊症。止痛忌用鴉片。宜鉍溴謙落贛茄等爲妙。○一方。鉍溴三錢。鉍

溴三錢。鉍碘一錢。贛茄酒三錢。哥羅方水到八兩。相合。每服二錢。合水

二兩。每飯後服一次。止痛頗效。○如一時疼痛難堪者。宜服安的拜林。

或安的非白林。○大約舊症多爲子宮倒垂。或子核倒垂。易位所致。醫

者宜審明病由。用撐扶正子宮。或用熱水宜多射洗陰道。每日兩次。然後

服藥。○如子宮口炎。或潰爛者。宜以淡酸加波匿酸碘搽藥等。撐開搽

之。○外部止痛。宜用鉍碘肥皂搽藥。或贛茄樟腦哥羅方謙落碘搽藥

等品。○亦有每至經期發病者。屆時最宜靜養平臥。疼痛者。宜坐熱水盆。或電震。或推拿法。均可試用。○如已用以上諸法。經年累月不愈者。惟有將子核或自肚腹割出。或自陰道割出。

子核生瘤 Ovarian Tumours.

治法。前醫多令病人服鈹碘。汞劑。利小便劑。或用碘酒射入子核。或不能割取者。內係用抽氣瓶刺放。近來諸法。概不取用。多於經期前四至八日割之。未割前夜。宜服瀉藥。并用水節射洗肛門。或放去小便。○未割前三四點鐘內。不可飲食。此前所食者宜流汁肚腹外面。宜用加波匿酸水洗之極淨。○割時。不使病人感受風寒為要。○所用刀器。均宜浸入加波匿酸水。惟海絨宜早一日。浸在解毒藥水。○所用刀器。如刀。血管鉗。約十支止血鉗。Well's or Tait's Hemostatic forceps. 剪針。以及專拊瘤根之鉗。套針。Well's small and Tait's large or medium cyst-trochar. 與鈎。Adams's hook. 止血骨鉗。

Clamp. 烙鐵。Cautery Irons. 引膿玻璃管 Drainage tubes. 等均宜揩抹極淨。預

早浸入解毒藥水。○割法。○宜聞哥羅方。平臥棹上。在肚腹上間。離交骨上二寸割起。割口自二至五六寸不定。或至臍為度。如欲再大。可割至臍上。但臍處宜環形割之。將臍留出。○割時由皮膚一層一層割入。至見腹統膜。須用剪剪開。當時便見該瘤。瘤多積水隨用放臆脹之針。將水放出。其瘤之四圍粘連之肌肉。須用手指緩緩剔離。後用一手將全瘤握住。拉出割口之外。或剪去。或用線縛。或與割口縫合。或仍納入原處。不一而定。妥法。依縛痔法。用堅粗絲線十字形穿過瘤根縛之。縛後將瘤割絕。送入原處。割時須另以海絨壓住割口之邊以防腸出當時須用大海絨浸溫熱解毒藥水壓之。或洗之極淨。倘割口內非手法所能盡力洗淨者。可用海絨縛在通管。探入子宮後面左右之隙竅。此處易積血水務須將血水揩抹盡淨。方無後患。亦有用溫熱解毒藥水。自割口澆洗。至流出之水。清淨為度。○如四圍粘

連之肉別開時有血管斷者。當時宜用貓腸線縫合。○如已洗淨。再用大海絨二三塊。塞入割口。刻片至取出毫無血水為度。如仍有之。再宜細審。設法有血管宜縛之洗淨。務至心中不疑。必不再有血水流出為度。然後縫合。若疑其恐有血水將溢者。宜在割口通以玻管一條。然後縫合。縫合之後。外貼加波匿酸絨布等。此外再貼斜條膏藥。愈多愈好不使割口崩裂。不致肚腹過于用力另以棉花大塊。大小如割出之瘤。納于肚外。包以布卷。使肚腹安舒。以棉花○割後宜平臥軟床。肩頭畧高。脚膝畧縮。莫妙在膝下。擱以枕頭使肚腹放鬆。○如久臥不舒。病人切勿自動。務須服侍之人。設法助之。不使割口用力為要。○割後宜常用熱水瓶。且一晝夜內。專飲熱水。忌食別物第二日內。專飲牛汁。別物均忌。○大抵割後最忌嘔吐。嘔時易使割口崩裂患此者宜吞冰塊。如嘔惡兼口渴者。宜飲冰水。不可過多或以溫水。約二兩射洗肛門。頗有止嘔之功。○割後二三日無別患者。宜牛乳藕粉牛汁等物。漸漸加增可也。○割後疼痛者。

宜嚙啡丸。

八分盤或十六分盤之一

不痛者不必服。○如嘔吐黃水或黑水者。宜用溫水

射洗胃管。○割後三四日。宜服鎂磺養或鎳磺養四錢。合檸檬水同服。或草麻油等瀉之。可杜統膜發炎之患。○又割後數點鐘。宜通其小便。此後每日宜通二三次。○割口不必洗換。至第七日。可將縫線剪去。十四日不必包裹。二十一日可以起床。一月可出門行走。此則症之順者。如逆症甚險。難治。○割後一時身熱者。宜表頭上兼用冰水壓之。○割後常熱兼熱度漸漸加增者。須防割口內積污穢。當時割口重開。用加波匿酸水洗之。再行縫合。此次宜通玻管。玻管內充埃阿達方布帶管之外端宜套以海絨引毒外出此症身熱。多因割口欠淨之故。凡內服之藥。多難見效。惟安的拜林每服一分半。略有效驗。○如統膜發炎者。宜將飲食由肛門吸入。或一方用白蘭地一兩。佛倫典牛肉汁一錢。不用佛倫典可用白蘭芝牛汁。Brand's Essence.或貝氏卑伯短凍。Benger's Peptonised Jelly.代之。卑伯短牛乳。Peptonised

Milk 四兩相合作一次射入。每四點鐘一射。且每日一次。宜用溫水二十兩射洗肛門。○又此症與腹統膜發炎相同。其外用最可靠之藥。即嚙啡射藥。醫者審症酌用。甚有效驗。

溺涵草酸 Oxaluria. 草酸又名惡西酸

此症概為食物不化。養生路病所致。治法宜服淡酸、磺酸、或輕綠淡酸。每服二分或各酸合高倫布湯同服亦可。○如因食物過多所致。宜忌酒肉。並節飲食。有時服大黃或糖類過多。或一時過饑過飽。或少於運動。均能致此。時非運行身體。房屋通風。吸淨天氣不可。運行身體宜至疲乏之時再用推拿法

腦流 或鼻淵 或名鼻淵變臭 Ozena.

此係鼻涕穢污變臭。治法宜洗淨。勿使少留臭液。又宜每日洗之。如一日不洗。則更易變臭。○洗法。或用象皮水節。或用洗鼻自來水器。所用藥水。宜食鹽一茶匙。化水一二杯。或鏹雙炭養一錢。化水一二杯射洗

之。洗時。口宜開大。呼吸之氣。由口出入。則射入之水。可由鼻孔出入。有時鼻污乾結不下者。宜先用噴汽射入潤之。然後用棉花捲淨。○此外有用鏹錳養一釐。化水十兩。或鏹綠二釐。化水十兩。或鏹磺養八釐。化水十兩。或查氏解毒水 *Jeye's Disinfecting Liquid.* 二十滴。化水十兩。或

加波匿酸一錢。化水十兩。或山尼得司水半兩。化水十兩。或鹽露一錢。化水十兩。或銀淡養四釐。化水十兩。或磺養酸二錢。化水十兩。白礬三分。化水十兩。甘油硼砂二錢。化水十兩。鏹綠二分。化水十兩。炭匿酸甘油二錢。化水十兩。碘酒二十滴。化水十兩。咱囉甘油二錢。化水十兩。硼酸一錢。化水十兩。納弗石林五至十釐。化水十兩。綠養冰五釐。化水十兩。汞雙綠一二釐。化水十兩等品。外洗均效。○一方。硼砂一錢。鏹雙炭養一錢。水二十兩相合。後用納弗坐兒 *Naphthol (Beta-naphthol)* 一錢。酒醇一兩。相合。用此一錢。合上文硼砂鏹炭養水洗之。頗效。洗後用一

方。納弗坐兒或吸呀納弗石十二釐。肥樹皮酒 *Tinet Quillaja*。錢半。汽水至一兩。相合。用棉花浸藥。塞入鼻孔。或用鈹綠水一釐化水一百滴九分。甘油一分。相合洗之。後用甘油一分化水三分。以棉花浸濕塞入鼻孔亦可。○乾治之法。不甚靈驗。凡硼酸、鈹炭養、樟腦、炭匿酸、加路米、埃阿達方、石膏粉、石炭養、漿粉等。均可搗入鼻內。但不若藥水外洗之效驗耳。○如有潰爛者。宜搽大鼻孔。後搽丹藥。如加波匿酸、淡酸、鐵雙綠、咿呀鑷咿呀。或加波匿碘。 *Iodized Phenal. Ethyl Iodide.* 辯弗那兒 *Galvanic or Thermo Caustery.* 等均可。亦有用火刀烙之者。其最有效驗者。推倭立司篤兒 *Aristol.* 為第一妙品。○間有鼻骨潰爛者。宜將爛骨取出。如因花柳毒者。宜服汞劑。外用汞水洗之。再用加路米搗入。○大約患此症者。體質多弱。宜服補劑。如魚肝油、鐵劑、碘、鉀石、金雞那霜等。均不可少。

甜肉之症 甜肉又名胰 *Pancreas, diseases of*

大約生癰為多。宜射止痛之藥。如患袋瘤者。宜刺放或開刀。甜肉與別部同。其餘他病。患者極少。即患之亦難分辨。惟既服藥。宜服甜肉汁以助消化為要。 按中醫靈樞素問諸書。以及歷來名家所論五臟六腑十二經外。并無甜肉一經。而西醫確查有甜肉一條。在胃下與第一腰骨齊。橫列總脉之前。自右橫左。大端曰頭。與小腸為界。小端曰尾。與脾為界。約長八寸。厚半寸。闊半寸。體質如核。有管生津。與脾相通能化糖化油。故名甜肉字典所稱胰。其即此歟。胰與脾同音。甜肉也。又謂之猪脛。正字通。甜肉。息肉。○按按在猪曰息肉。在人曰甜肉。同物異名耳。

顫癱 *Paralysis Agitans.*

概因年老之故。治之不易。內服鉀石水。每服三滴。漸加至十滴。或用皮膚針射入亦可。或電震之。或服銀綠。每日服三次。每服三分釐之一。或甘松膏。每服一分。或甘松鏗珠。每服五至八釐。宜大服或開羊花精。每二百五十分釐之一。用皮膚針射入。○此症發顫之時。另用好手扶定。惟不

可用夾板包紮。○一方。病輕者宜之。開羊花酒一兩半。鉀石水三錢。甘
 松酒三兩半。甘油五錢。相合。每日服三次。每次一錢。頗效。亦有服馬前
 水。燐了刀邊。鉀碘。服大鴉片。加粒巴豆。綠養冰。鉀溴。了葛等。均可服之。但
 不甚效。惟魚肝油與鐵之補劑。則不可少。○亦有推拿病處。或如上文
 軟脚病。嘉氏所立三脚木架。懸掛全身。間有效者。

爛喉痧癰症

Paralysis, Diphtheritic.

此症先有爛喉痧。後起癱瘓。或一手一脚。或頭面一處。或眼目或喉管。
 則不一定。惟適當爛喉之時。內臟或心或肺。一時癱去多死。醫者宜用
 飲食補之。○如心經無力。手足冷木者。當宜睡臥。或措擦之。或煨熱水
 瓶。或胸膛貼芥辣膏。或內服忽斯克合牛乳。又宜射入肚門。或聞以輕淡水。或內
 服輕淡香酒。每一刻服分半至三分。或心部電震。此症之重者。如輕症。
 病在一手一足。眼面等處者。概在病愈半月。或一月後。一時發病。先覺

病處無力。或麻木。然後痿癱。治宜金雞那霜合淡輕綠。淡酸。與橘皮酒
 同服。又宜運行身體。或推拿法。○胃閉者宜卑伯新酒。○不能下咽者。
 宜用牛乳雞蛋。或別種食物。合卑伯新射入肛門。見卷一心病病。飲食務須按時
 加多。夜間亦宜飲食數次。或以魚油外搽皮膚。或最妙服鐵合鉀石馬前冰。初起新症此藥宜服。頗效。
 ○一方。馬前冰一釐半。鐵酒四錢。金雞那霜三分半。甘油一兩。汽水至
 四兩。相合。每服一錢。日三次。飯後宜之。○電震。初起新症宜息。至舊症
 方可試用。○如病已久。用各法不效者。宜在癱處引炎。貼辣茄膏。○一
 方。薑粉六錢。芥辣粉二錢。猪油足用。調成稀膏。搽之。或攤在布塊。約大
 一寸。貼于癱去一肢。每離四五寸貼一塊。功能提神。全肢腦筋。有時甚
 效。

小兒癱瘓

Paralysis, Infantile.

此症初起發熱之時。宜退熱發表之劑。切忌運動。或先服加路迷後服

鎂磺養瀉之。後再服鈹碘。○如病已變舊經久者。惟有電震。一端震於背脊。一端震於肚腹。或在癱處每日約震一刻之久。宜久用。有電震年牛而愈者勿間。又宜減輕。不宜重震。○此外或推拿法。或以魚油。或提神之藥。如樟腦。辣椒膏。或用上文薑粉芥辣粉調猪油方。均可搽擦。或用海水沐浴。或以馬前冰五十分釐之一。射入癱處。○亦有服補劑。如鐵金雞那霜。鉍石魚油麥液漿等。並出門遊行改換水土為要。

癱後癱瘓

Paralysis, General, of the Insane.

此乃癱症之後忽而瘓癱。治之甚難。病在腦絲。先發炎後積水。壓住腦筋所致。○近來名家施治此症。在顛頂骨右邊。用圓鋸鋸去小塊。或將內積之水一同放出。此法不第癱症可愈。即癱狂亦有用此得愈者。

酒風癱瘓

Paralysis, Alcoholic.

如病已經年。治之不易。病起數月。或不至一年者。尚可施治。最宜靜養。

平臥。飲食清淡。並用電震。或推拿法。或引炎法。或服馬前冰。或用皮膚針射入。

腦筋病癱瘓

附第五對面腦筋癱瘓俗名邪風

Paralysis, Peripheral.

別種癱症。多由腦部有病。或疔血或積水所累。惟此症多由腦筋本體有病。如腦筋半途有瘤。則瘤以下。即形癱瘓。故醫者宜審明此種癱症。是否該腦筋有損壞。或有瘤或失力或寒冷。如第五對面腦筋癱瘓。俗名邪風等均屬此類。○治法。一宜引炎。二宜推拿。三宜馬前冰。用皮膚針射入。四宜電震。如

第五對面腦筋癱

Bell's Paralysis.

輕者不治自愈。重者治之頗難。宜服

鎂磺養瀉之外。搽碘蜚蜚。或在耳後引炎。并以棉花包裹患處使熱。○一方。鈹碘八分。鈹溴二錢二分。橘皮糖露一兩半。樟腦水到八兩。相合。每日服三兩次。每次半兩。合水同服頗效。○此症宜起病之後一禮拜。方可用電震之。此前忌用。○如病已久。宜用馬前冰二十五分釐之一。

用皮膚針射入。如三四六對面腦筋癱者。治法相同。

蘭達氏癱瘓 Paralysis, Landry's.

卽腦脊根炎症見前腦脊根篇。 See Myelitis.

鉛毒癱瘓 Paralysis, Lead.

見後。 See under Plumbism.

見肉痿癱 或肌肉消瘦 又名消肌癱 先肌肉病 後腦筋癱

Paralysis from Pro-

gressive muscular Atrophy or wasting Palsy.

此症治法。與上文小兒癱瘓相同。大抵用藥無效。惟有花柳毒者宜服汞與銻碘。

癱瘓變腫 Paralysis, Pseudo-Hypertrophic.

此乃下肢癱瘓之後。變腫浮大。並非大抵不治。或用海水沐浴。推拿電震。或服馬前冰燐鉀石碘等。概無大效。

包皮緊急 又名玉莖 包皮反勒 Paraphimosis.

因包皮翻上過緊。以致腫脹疼痛。治法。將包皮褪下。另搽橄欖油等潤之。褪法。將兩手食指中指。納定腫脹之皮。使之褪下。大指推送龜頭。如常爲度。或以一手握定勒下亦可。○病重疼痛不堪。若不早治。有潰爛者。宜聞以哥羅方。再用手法褪下。如不能褪下。宜用刀割開。務期褪至常度。然後包裹。

蝨 Pediculi.

人身之虱。分爲三種。 I 在頭。 Pediculi Capitis. II 在全身。 Pediculi Corporis.

III 在陰毛。 Pediculi Pubis or Crab Lice. 又名角虱 與角虱 相同 形狀各別。

治法。一在頭部。如虱極多髮結難梳。多由別病累及者。宜統行剃去。或用使對佛撒子四兩。猪油八兩成油。 Oint of Slavesacre. 搽之。惟此藥祇

能殺虱。不能除子。○如有鬻痂者。宜用芝蔴壓藥。 先搽加波匿酸 甘油于皮膚 或用煤油

一分。橄欖油一分。相合搽之。甚有效驗。皮膚破傷者宜慎用之。○亦有用輕淡汞油

藥。或汞雙綠水洗搽。取功最速。○去虱子法。先以軟皂擦髮。後以火酒

洗之。再以醋或硼砂水洗。後再以細箕梳通。其子自去。否則梳之不下。亦有烟

泡水。或納弗坐兒水。哥羅方。薄荷油。茴香油。丁香油。白木。克羅林等品。

以及汞綠皂。加波匿酸皂。或煤油調膏。均可取用。但不甚效。二在全身

者。虱與子多在衣服。治法。最宜清潔沐浴。衣服宜數日一換。用藥水煮

之。或火烘之。否則其子不死。或以輕淡汞油搽在腋下與肩背。○一方。Solution of

Pentasulphide of Calcium. 硫磺粉二兩。石灰一兩。水八十兩。煮數時。取用

其水洗之。三在下陰者。治之較難。惟加波匿酸水二化祇能殺虱。不能殺

子。或濃加波匿酸合甘油。或汞雙綠二釐化水一兩。均可用之。最效用

輕淡汞三分。調油一兩。搽之。或再加煤油少許。其功更偉。○一方。輕淡

汞綠二分半。煤油二錢半。比魯漿一錢。爾納林一兩。相合調成爲油。搽

在下陰。除虱最效。○加路迷五釐。猪油百釐。調勻。搽之。亦效。○或云汞

雙綠一釐。化醋一兩。善除各種虱與子。○汞淡養油。埃阿達方油。亦可

用之。○哥羅方。吡吡。或噴射或搽之。宜慎用。恐發炎。亦甚效驗。

子宮外炎 或作盆 網炎 Pelvic Cellulitis or Parametritis.

此症初起。多發寒戰。見症宜臥。用熱水瓶煨之。并飲熱劑。肚腹壓以熱

藥。初起與外科作膿寒熱相同。宜辨之。飲食宜慎。或服鎂磺養瀉之。或熱水射洗肛門與陰道。大

約先熱七八十度。後漸加熱至百有八度。每次約三百二十兩。如用此

法不安者。不可再用。其肚腹外面壓以絨布熱水合鴉片酒少許。○疼

痛者宜鴉片粉。先服二釐。或每二點鐘服半釐。○發表之劑。亦不可少。

如皮膚乾燥者。最妙服陀佛散。○初起退熱藥。似不必服。如熱至百四

五度者。宜服安的拜林。○蟻吮引炎等法。宜在小肚肛門邊陰道均可

試用。○如毒入血者。如產後惡露未盡。宜金雞那霜四釐。合半釐鴉片膏同服。最效。

○又汞綠等藥。初起宜慎用之。因服此易致炎處成毒至病已久。炎畧退者。服之極有效驗。善能退炎○一方。加路迷半釐。金雞那霜兩釐半。鴉片膏半釐。相合成丸。

每日服一粒。日服三次。○此後銹碘每服一分至分半。亦效。○嘔惡者。宜服撒林沸鹽。輕炭淡酸。或吞冰塊。并以芥辣膏。外貼肚腹。○泄瀉者。

此症一有泄瀉甚固可危

所瀉臭惡難堪。可知毒已入血。此時加路迷銹碘。不得再服。宜

大服金雞那霜。與提神之品。并外壓熱劑。或以銹錳養水洗之。○不睡者宜撒弗那兒。

用以上各法不效。或已成毒者。惟有外壓各藥。與飲食補之。牛乳醫者又宜靜待。見膿瘡之頭已露。當在該處開刀。通以皮管。并以汞雙綠硼酸

銹錳養等水洗之。餘照膿瘡愈淨愈妙。○如膿毒內攻。破向子宮。或肛門者。醫者審明。當即針刺。或開刀。然後通以皮管。餘照常法。○如膿毒之頭。並無外現。忽向肚腹內破者。必死不治。醫者惟有預先探明。將有內破之

勢。早在肚腹開刀刺放。或有可救。但非手法熟練。精於此者不可。

骨盆內腹統膜炎 Pelvic Peritonitis.

此症本統膜發炎。但此專在骨盆內之統膜炎也。故名。治法與子宮外炎相同。切忌運動。內服鴉片。外壓熱劑。並服退熱各藥。○如胃口照常。熱不重者。宜金雞那霜半分。合鐵酒二分。水二兩。相合作一次服。如熱重者。宜安的拜林二分。或安的非白林一分。鏹沙利沙三分。○如所積之水。漸成爲毒者。多由陰道穿出。治法與子宮外炎同。惟此症忌服鹽類瀉劑。不如用水節射洗。或服草麻油爲妙。

大膿泡 Pemphigus.

此係皮膚生大膿泡與疹子。○病極重者。宜靜臥。專飲牛乳。大抵此症多由體質虧弱。故飲食起居。最宜小心。內服惟鉀石水。必不可少。如瘧疾服雞那霜每服三滴。漸加至六滴。九滴。每飯後服之。○如病久不愈者。宜鉀石合

鐵或魚油麥腋醬等同服。○如內服鉀石不效者。可用皮膚針射入。○仍不效者。宜大服銹綠。或服鏽碘。每一分至分半。以及蘆茄。燐圭阿禁。銻。汞等劑。均可試用。惟服鉀石不效者。諸藥似難奏功。○外治。如膿胞大者。宜刺放。或搽鏽養油。或洒富羅散。鏽養粉。爐甘石。銻炭。養粉。漿粉。鏽油粉。均可合用。又猶納氏膏。 *Uma's Paste*。頗有效驗。可以取用。○一方。銻炭。養鏽。養粉。蘇油。灰水。每一兩。相合。搽之。或用加波匿酸水。 二化或 灰水。合橄欖油。每百分中。合加波匿酸一分。均可試用。○諸法不效。病症纏綿不愈者。宜溫水沐浴。或浸水中。數時後。以鏽養油一兩。合加路迷半至一分。調勻搽之。或以汞雙綠二三錢。化溫水四千八百兩。沐浴。亦有用麥皮絕辣丁加波匿酸。栢油等品。化水沐浴者。或用電震之者。○有時此症專患於口內者。宜以硼砂銹綠水洗漱。或服銹綠硼砂藥片。

脚掌圓枯瘡

Perforating Ulcer of the foot.

此係脚底一時潰爛。形圓猶如彫成之孔。概因腦筋之病所致。故痲風多有此患。重者纏綿不愈。甚難醫治。○治法。有用電震之者。或服補腦各藥。外用提神之品洗搽。如淡淡酸水。或汞雙綠水。或火酒外洗水。 酒二 浸布貼在爛處。外包錫箔或油紙。○骨死者。宜取出。○爛處極大者。宜銀淡養水蝕之。或火刀鐵匙刮之。

心包絡積水

Pericardium, Dropsy of.

此症多由別症 如腎 累及。如身體臃脹者。宜汗之。 熱水 并利小便。宜服毛地黃。瀉之。宜服鎂磺養。○如服藥無效。積水未消。惟有用針刺放。刺法最宜小心。病人宜平臥。用手指擊明積水變實之處。先用皮膚針。試放少許。如內果有積水。宜在四五條肋間。 或五 離胸骨一二寸處。刺入。刺時針頭畧宜向上。然後用抽氣瓶。緩緩將水抽出。○如內積之水。變成稠膿。

不易出者。不妨易以略粗之針。後可通以皮管如膿稠仍不能出者。惟有用刀。最宜小心一層一層割至病處放之。惟所用藥水。宜硼酸水為妙。恐加波匿酸等。其性過烈耳。

心胞絡發炎 Pericarditis.

此係心外包絡。又名心衣發炎。概與風濕症相連。詳風濕篇治法與心房發炎。見卷二心房發炎篇相同。病人宜平臥。外壓熱劑。或蜚吮或螞蟥等引炎。○止痛宜用鴉片各劑。○炎已減去。宜服毛地黃補其心力。此後宜服汞劑。但勿過多。○如因肺本體炎。或肺胞炎累及者。兼治其肺。○如因血分有毒。或心房內爛所致。宜提神之品。飲食精細。并服加波匿磺。每服二分半至三分。并金雞那霜鐵酒等品。○如經久不愈。則成心包積水之症。詳見前篇。

肝外統膜炎 或作 肝肥網炎 Perihepatitis.

此乃統膜炎症。或肝本體炎。或肝生癰生毒所致。○治法。先治病由。痛者宜嚙啡鴉片。并外壓熱劑。肝炎肝癰。均照症治。

腎外統膜炎 或作 腎肥網炎 Perinephritis.

此亦腎部外統膜炎。○治法。首宜止痛。用麻粉壓劑。或搽碘酒。內服。宜補劑。如金雞那鐵酒等佳。○亦有內服硼酸。每日服三次。每次服一分。頗效。○如炎重成毒。惟有膿頭多露膿部開刀。照膿瘡法治之。

會陰破裂 Perineum, Rupture of.

此症多在產婦。因胎兒過大。以致崩裂。○治法。輕者宜洗之極淨。加波匿酸水。或鈹錳養水。均可取用。如破裂大者。宜當時縫合。用大針兩枚。刺過深處。再以銀線或絲線縫合。不可少留微隙。縫後三四日。不宜大便。可用水節射洗為要。○如肛門同裂者。宜縫後六七日。不可大便。其陰道每日二三次。用鈹錳養水洗之。○大抵所縫之線。宜貓腸線不用。

銀線為妙。因縫後多有腫脹之患。用貓腸線易於舒縮也。此症破後不治。或當時不縫。必數月後。方能生合。且多有疤痕。故見症速宜縫合為妥。

骨衣炎 Periostitis.

此乃包裹骨體之衣發炎也。治法宜靜養勿動。輕者搽火酒外洗藥。重者多因跌打損傷。或花柳毒。宜止痛藥。用熱劑外壓。或蟻吮。吮後再壓熱劑或用小刀割至骨面。否則炎重變膿。骨衣與骨相離。以致骨體變死。治之頗難。故能割之愈早愈妙。至有膿時割之已不及矣惟割時解毒之法。最宜謹慎。刀後用絨布浸熱加波匿酸一至四水包壓。如已有膿經久不出。其骨多死。須將死骨剔去能愈。○身熱者宜鹽類瀉劑。并表藥。○有花柳毒者宜銹碘。○一方。銹碘錢半。草烏豆酒半錢。輕淡醋水二兩。橘皮糖露一兩半。樟腦水到十兩。相合。每服半兩。日服三次。每飯後服。○身極熱者。銹碘不服為

要。宜服安的拜林。每四點鐘服半分。後服雞那霜。飲食宜滋潤精細。○

有時全條骨衣統炎者。則全身病狀甚重。不速治之。有性命憂。醫者宜用小刀。在骨面直割數刀。亦有用小錐將骨體穿鑿之以散其炎。并內服雞那霜與酒少許。

飲食宜補。刀口宜用熱水絨布包壓。○如骨已死者。詳前骨死篇。Neger-

Osis.○骨衣舊炎症。多因花柳之毒。治法宜忌動引炎。并服銹碘。每服三四分

與汞劑不效者。惟有開刀。或將死骨取出。○又骨體發炎者。Ostitis.多與骨衣

炎症相同治法與骨衣炎同。

腹統膜發炎新症 Peritonitis, Acute.

此症治之最難。務須依病狀酌用各法。大抵有因別症所累者。有自起者。極少醫者先宜審明病由。然後施治。間有因剖割腹部之瘤。致患此症者。須照外科法治。

大抵統治之法有三。一勿動。用架子架定衣被靜臥。二飲食小心。宜飲冷牛乳合灰水大約每兩點鐘飲半杯又宜次數多每次食物宜少

或冰水或牛汁。○又有嘔吐者。醫者最宜預防。最屬危險須吞冰塊或飲冰水。

○如常吐不止者。宜將食物牛汁牛乳加麵粉六角粉并甜肉汁少許射入肛門。每三四點鐘一次。○

此症初起飲食宜少而冷。如炎畧久並無嘔吐者。宜加牛乳牛汁雞湯

等少許亦可。○如無力困憊者。宜提神之品。須慎用之恐起嘔吐飲香餅酒最效專服鴉片。因

鴉片乃此症要藥。痛多者多服。痛輕者少服。嘔吐亦然。○如不吐而極

痛者。可服鴉片酒四十至六十滴。或服三十滴。隔一二點鐘一服。以後

漸漸減少。○初起宜服鴉片酒。或汁或流膏。後宜成丸服。○服藥後仍

痛者。再服鴉片。後納入肛門。後用皮膚針射入。三法兼用。無有不效。○

一方。鴉片粉一釐。蘆茄膏二十四分釐之一。鈹養一釐。成丸。每日服四

次。所以服鴉片者為欲奪睡不動故不可間斷或常服嚙啡丸十六至八分釐之一亦可。○亦有專用

汞綠者。恐勿用為妙。惟炎退後。或可用之。效驗○亦有專用放血之法。近

來大忌。不如蜚吮為妙。○鹽類瀉劑。發病時宜之。如炎已退。忌用瀉藥。

○如腸迴積滯者。宜草麻油瀉之。或最妙服加路迷六至八釐瀉之。或

以溫水射洗肛門。忌用肥皂松節油等恐性提神太烈○亦有用蘆茄膏十二分釐之一。馬前膏

四分釐之一。亞羅膏六分釐之一。大黃粉四分釐之一。相合成一丸。每

四點鐘服一丸。亦效。

外治之法。○脹痛者宜壓熱劑。或貼芥辣膏。至外皮變紅後。再壓芝蔴

粉。或先用絨布一方。洒以芥辣粉。另將芝蔴粉熱水調勻。攤上壓之。亦

可。或以絨布浸熱水包之亦可。間有用冷水管壓之者。甚覺安舒。○亦

有用草烏豆蘆茄鴉片合壓劑同用者。○亦有用松節油合熱水。浸絨

布包之者。○如炎初退者。可用碘蜚蜚等搽藥。○加腹脹腸風者。可以

空針在腹外刺放。○如諸法用後不效者。在西國惟有將患處剖割。審

其病故何在。再行施治。惟割時宜慎用解毒之法。剖法與割子宮癰同

腹統膜炎舊症 Peritonitis, Chronic.

治法與新炎相同。醫者最宜查明病由。預防積水。積水多○已積水者。須速散之。最妙服碘劑。或外搽碘酒。日搽兩次。或以碘酒合甘油火酒搽之亦可。○如炎處不大者。可搽碘搽藥。或銹碘搽藥。合肥皂搽藥。搽後以法闌絨布包裹之。○身體虛弱者。宜魚肝油。或有時用蜚蜚引其餘炎。熱水沐浴。利小便劑。內服鐵銹碘。或以汞油合魚油。外搽肚腹。詳前肚腹吸收變大

○如用諸法積水仍不去者。須防臃脹。○此外海水沐浴。出門遊行。篇一切補身之物。麥液醬魚肝油均不可少。

穿腸統膜炎症 Peritonitis, Perforative.

此症多因傷寒腸核發炎。漸漸變膿穿孔。累及統膜發炎。治法。不可少動。并忌飲食。外壓冰塊。大服鴉片。此症本不治。近來能將腸穿孔處剖割縫合。以期其愈。用加波匿酸水沙利沙水洗之極淨然而難矣哉。

嘔吐咖啡統膜炎症 Peritonitis, Tubercular.

此則虛弱之人多患之。大約與統膜新炎症治法相同。忌動退熱。外壓熱劑。內服鴉片。此症亦分新舊二種。新症與上文新炎症同。舊症宜止痛止瀉。或通利大便。并外搽魚油。○近來西國已有剖割之法。將患處積水放去。并將嘔吐咖啡質。用藥水洗淨。再通玻璃管。或皮條。使水外洩。待漸漸收口。或有愈者。

闌尾發炎 Perityphlitis and Typhlitis.

治法。大約與腹統膜新炎相同。宜仰臥脚縮。使肚肌放鬆。并外壓熱劑。飲食流質。內服鴉片。○此症最要。即炎處生膿成毒之時。醫者須及早預防。用法止之。如已成毒。現於肚腹外者。先壓熱劑。然後開刀。如隱在統膜內者。甚屬危險。先以皮膚針探明膿在何處。然後將肚腹剖割開刀。在臍下直割或將患處統行割絕。再通皮管。并用藥水洗淨。使毒外洩。○此症辨之最難。治之不易。前醫不知。悞作別治。近來刮解愈精。審症愈明。

始有闌尾炎症之名目也。

汗多 附腋汗手足脚汗 盜汗見肺勞篇 Perspiration, Excessive.

此症多與別病相連。如肺勞、瘧疾、風濕等是也。治法。身不熱者。宜熱水沐浴。會稽後以絨布揩擦遍身。臨睡時以偈克坐兒合松節油調油搽之。早起再宜沐浴。并揩擦全體。再以芥辣粉洒抹全身。或以橄欖油搽抹。亦可。飲食宜乾燥之品。忌飲湯水。○內服之藥。用了刀邊三百分釐之一。或獨服。或合分半至半錢了葛流膏。作一次服。頗效。○亦有服磺酸、炭匿酸、金雞那霜、馬前冰、比魯介賓、錳磺養、錳養等。均可取用。或撒弗那兒。每服半分。日三四次。或電震。或服鉀石馬前均可。○亦有病在一處。如腋下手足腿等處。汗多或有氣息者。因該部汗核有病。治法。衣服每日一換。并以硼酸水洗衣服。汗處先以溫水頻洗。後以手或粗布擦之。極熱。再以硼酸粉洒抹。或以錳養酸化水。或搽或洗。或以硼酸油

搽之。在腋下更效或以芝蔴油合鉛膏。見汗臭篇希氏方搽之。或以沙利沙酸、錳油粉、富羅

石散、滑石粉、納弗石林、鈹炭養、麩粉等。均可洒撒患處。如脚部汗多臭者。見卷一汗臭篇。宜以棉花襯夾趾間。洒以藥粉。或先以火酒外洗藥洗之。後以米粉。Rice Powder.六十分。鈹淡養二十五分。鈹鎂養十分。滑

石五分。洒抹。或錳油粉沙利沙酸汞綠加波匿酸幾阿蘇鉛錳白礬等成油搽之。其中以硼酸為最佳。

鷺鷥咳 Pertussis (Whooping-cough.)

此症小兒患之。一經傳染。非一二月不能全愈。難以速痊治法。宜另居一室。以免傳染。并須通風清淨。如小兒體質尚健。或天氣和暖清爽之時。甯在空曠處遊行。俾吸清氣而益肺經為妙。其飲食最宜小心清淡。易化。不可厚味。○病發甚重胃閉者。宜牛乳等流汁之物。○如發病連咳不止。以致時咳嘔吐者。宜在吐後食之。不必限定每日幾餐。○一切水菓豆類

與堅硬難化之物。切宜忌之。○小兒衣服。最妙用法。關絨於病發咳嗽之時。衣襟宜放鬆為要。○亦有當病將發未發之時。拉定小兒下牙床骨。向下而前。謂能阻病不發。間或有之。未必盡然。○內服之藥。或以加波匿酸水噴吸其氣。或以松節油郁加利達油噴吸其氣。○一方。郁加利達油二兩。松節油一兩。石莫耳一錢。拉文大酒六兩。用香水瓶噴吸其氣可也。○亦有用哥根水噴吸喉部。謂能使病不發者。但此藥過烈。恐於小兒不宜。勿用為妙。○一方。吃啤略葡萄酒五錢。輕淡香酒三錢。海葱酒二錢。樟阿酒四錢。刀魯糖露兩半。哥羅方水到四兩。相合。七歲之小兒。每服一錢。日服四次。初起病輕時服之頗效。○如病重已成驚驚咳。連咳不止者。宜照方加增輕淡溴三四錢。減去海葱酒。甚有效驗。○如病發甚重。一日連發二十次。或服輕淡溴無效甚形困憊者。一宜服綠養冰。每一歲服半釐。六歲可服三釐 二。嘍啡。宜慎用之 如氣管炎痰多者。用嘍啡最宜。

小心。○一方。嘍啡六分釐。二三歲小兒宜之 至半釐。六七歲小兒宜之 糖露半兩。水到一兩半。相合。每服一錢。日三四次。此藥治驚驚咳。最有效驗。惟醫者可用。如服後熟睡者。忌勿再服。三 了刀邊水。每服一滴。即百分之一 日三四次。或蘆茄酒。每服十二滴。均可試用。務須大服至瞳神放大為度。否則無效。如服藥後似顛狂者。忌勿再服。○亦有以了刀邊合綠養冰嘍啡同服者。四 安的拜林。或謂甚有效驗。但宜慎用。大約每一歲服一釐。日三四次。合刀魯糖同服可也。又安的。非白林。汾納矢丁。哥第那。間有用之者。○亦有信用金雞那霜。謂甚有效驗。惟此藥味苦。小兒服之甚難。且氣管有痰者。服金雞那霜。反使內痰積滯不出。醫宜知之。○一方。加波匿酸分半。哥羅方酒分半。蘆茄酒三分。碘酒一分。糖露到二兩。相合。每兩點鐘服一錢。二至十二歲小兒宜之。頗效。○亦有用金綠水。一化五十滴 哥根。白礬。三歲服二釐 輕淡綠。哥羅方。吡吡。印度蘇。錐養。二歲服半釐 錐磺養。阿倍納。○Unabaine。週歲服二千分釐之一

阿末來淡養氣了葛辛衣格淡芭菰得力平輕炭淡酸其拉撒米姆阿魏樟腦等品。但不甚效。○亦有在頸後貼蟹螯膏。頸前壓冷水管。謂能使病不發。○如病已數禮拜。宜出門改換水土。吸淨天氣。○或謂使有病小兒。吸食煤氣。最能安肺。如中國無煤氣。可用硫磺一小塊。燃燒房內片刻。緊閉門窗。不使走洩。待燒盡開窗通風。使硫磺氣沖淡。至進入房內。易受不咳為度。○如病已退。後服魚油鐵碘鉀石等補益之品。○一方。搽抹胸膛。用郁加利達油二兩。樟腦搽藥二兩。加絕布的油四錢。薄荷油二錢。調勻。每晚搽抹一次。或以少許納噴氣壺。吸食其氣。均有效驗。

食管頭發炎 或喉管發炎 俗名喉痛 Pharyngitis, Acute.

新症宜通利大便。服鎂磺養佳。又宜發表。○一方。輕淡醋水二兩。甜消啣啣四錢。綠藜蘆酒十六滴。樟腦水到八兩。相合。每服一匙。每兩點鐘

一服。另以淡加波匿酸水漱喉。○一方。加波匿酸一錢。哥根八釐。甘油硼砂半兩。玫瑰水到十二兩。相合。漱喉。治新炎頗效。○如不能漱洗者。可以鵝毛刷刷之。或以噴氣壺噴吸藥氣。或內服沙羅兒治杏仁核炎症更效均效。

喉痛舊炎症。即喉啞痰多之類○概因胃滯酒風所致。治宜除其病由。并宜通風。吸

淨天氣。運行身體。內服鐵魚油鉀石金雞那霜等補劑。或出門遊行。改換水土。切忌呼叫重咳。另以銹溴或淡加波匿酸水漱喉。或服加波匿

酸糖片。或以加波匿酸甘油刷喉。○如炎處已退。宜用炭匿酸甘油。或白礬甘油。或炭匿酸化於啣啣。或銹綠水。分半化水二兩銀淡養水。分半至三分化水一兩或以

輕淡綠銹綠。白礬。錳磺養。鏽雙炭養。鏽綠。各一分。化水一兩。或漱喉。或噴吸其氣。○一方。可以久用。功力甚效。甘油加波匿酸三錢。炭匿酸二

錢。辣椒酒一錢。玫瑰酸湯到十二兩。相合。漱喉。甚有效驗。初用宜畧淡。後可漸濃。有用銹綠哥根硼砂片。或碘酒合甘油各半搽刷。或以碘酒

二分。合白礬甘油六分。每早晚搽之。或以塔蘭拉醋酸

Trichloroacetic

Acid. 水百 薄薄搽之。均可取用。
喉管炎生肉砂症 Pharyngitis, Granular.

概因舊炎不愈所致。治法宜忌煙酒謳吟。運行身體。海水沐浴。內服碘鐵魚油。鉀石。磷雞那霜等補劑。大便宜常通利。○外治之法。與舊炎相同。加波匿酸切不可少。并以銀淡養乾塊。或一錢化水一兩。搽刷喉部肉砂。但不可一時遍搽。須每日搽點二三肉砂。漸漸消之。并服哥根加波匿酸糖片。疼痛者可搽哥根。○亦有以哥根水水一化或以碘化於鈹碘水。用硬刷搽抹肉砂。至流血為度。大約五日一搽。連搽二三次自愈。○亦有以棉花浸塔蘭綠醋酸水水一化搽在肉砂。再搽甘油亦效。○如經久不愈。可以錳綠分半至二分 化水一兩或碘酒合甘油白礬。用大刷搽喉。惟各藥搽後。須另以藥水漱口為要。○一方。輕淡溴二錢。哥根一分。甘油加波匿酸

四錢。玫瑰水至十兩。漱之極效。○近來通行之法。吸輕淡綠藥烟。甚有效驗。○如有花柳毒者。宜服汞鈹碘每二三分外搽之方。鈹綠四錢。加波匿酸一錢。玫瑰水至二十兩。相合漱口。○不效者。宜以汞雙綠水搽之。切宜或以埃阿達方銀淡養碘加波匿酸等搽喉。○一方。汞雙綠一釐。輕淡綠七釐。甘油白礬一兩。相合搽喉亦效。

包皮變窄 Phimosis.

此因包皮過多而長。以致發炎變窄。治法。先退其炎。後將包皮割去少許。或以攝鉗撐大。每禮拜撐兩三次。至包皮易於翻上為度。腫痛者搽滋潤止痛之油。○昔猶太國每嬰兒生後八日。必施行割禮。將包皮剪去少許。故猶太人無此病症。○割法。或用刀向上割通翻出。然後將割口縫合。用豬腸線或將包皮扯長割去少許。均可。

迴血管發炎 Phlebitis.

大約脚部多患之。治法。不宜運動。用夾板或砂袋扶定。輕者搽止痛藥。或碘搽藥。重者先搽碘搽藥。後壓熱劑。或專用厚塊棉花。并用布卷油紙包紮。須一週時一換。不得少動。○如小塊迴血管發炎者。宜搽火酒外洗藥。酒三然後包裹。并服鎂磺養瀉之。或海士林內外均可用之。○一方。輕淡炭養二錢。輕淡香酒一兩。鉀碘二錢。海士林二兩。甘油合水至六兩相合。每服二錢。合水小杯。每日服四次。飯後服之。頗效。能使迴血管痔積發炎之質易於散去。○如成膿者照膿瘡治。○如一處累及全肢統炎者。則全身兼症甚重。宜大服輕淡劑。并牛汁牛乳等流質食物。○如病退患處腫脹者。宜象皮布卷包緊。或外搽汞油。內服鉀石雞那霜鐵碘等品。或套以象皮襪。

溺涵燐質 或溺變蛤蚧 Phosphaturia or Phosphoric Acid Dialysis.

治法。去其病由。如胃閉不睡勞腦過度所致者。均照症治。又宜出門改

換水土。運行身體。海水沐浴。飲食精細。或以淡酸一錢。溫汽水十兩。相合。射洗膀胱。或內服硼酸。每服八釐至一分。甚有效驗。

蝨子 Phthiriasis.

見前篇 See Pediculi.

肺勞 或勞瘵 又損症 Phthisis.

此本身體虛弱。肺經先炎後爛之症也。治之甚難。如有嘔吐咖啡者不

治。如別部患嘔吐咖啡近來有割治之法。如因父母遺體。或本身虛弱所致者。初見病兆。宜及早出

門。至溫熱之地。改換水土為要。○治此病畧法。一病人之衣服宜輕鬆

暖熱。冬夏常用絨衣為佳。絨衣之外再加麂皮之衣。以衛本熱冷熱切宜小心。

不可偶感風寒潮濕。二病人之飲食。較服藥為更要。惟不求其多。求其

養身。又宜乾食多流汁少。每日飲食中。凡油類牛乳雞蛋白塔等。必不

可少。如病人身熱之時。油膩宜忌。惟飲牛乳為要。至熱退盡。可食別物。

發熱時宜專飲牛乳。每日夜約八十兩。只能加多不得再減或合藕粉等同食亦可。或專飲淡牛乳。已去白塔或以好乳合淡牛乳各半同飲。或牛乳擠出時當即飲之。更易消化。如胃弱飲牛乳不化者。宜加卑伯短料。Fairchild's Savory, and Moore's, or Berger's. 助其消化。或馬驢羊乳亦可服之。或自製馬乳亦可。○一方。用淡牛乳已去白塔者一分。水一分。鮮牛乳八分。白糖小塊。相合納瓦罐中。置溫熱處。約二十六至四十八點鐘。不時搖動。待其發酵。然後飲之。頗佳。○病人不發熱時。肉食與牛乳牛肉湯。或生牛肉汁。魚雞蛤蜊。均可取食。○或謂芡茹與飯之鹽類。能滋養嘍吡啉質。切宜忌之。惟麥液漿魚肝油。此症必不可少。宜久服不已。有名醫列成肺勞食物之表如後。

早茶。未起床時。牛乳一杯。加開水少許。并鹽與鏽雙炭養。或另加茶茄菲哥哥等。有時可加白酒或勿斯克酒一小匙。

早餐。宜饅頭魚肉。或火腿雞蛋麥糊牛乳茄菲茶等。

上午九十點鐘。宜牛乳或牛肉湯。

中飯。宜一二點鐘。鮮魚與肉雞鮮菜牛乳藕粉。撲丁。已煮水果。并淡酒少許。下午五點鐘。宜牛乳哥哥茶。或雞蛋合水與酒少許。

晚餐七點鐘與午餐同。

未睡前約九點半鐘。宜牛乳白酒。或牛汁合藕粉。或加酒少許。每夜十點鐘宜睡。

如病重身熱者。飲食宜流汁多。并次數多。惟白酒等提神之品。宜審明病體。然後用之。大約初起不用者多。如病已重肺變實者。服白酒頗有裨益。善能止咳甯睡補益全體。頗有功效。三宜得清淨天氣。是以居住房屋。最宜通風。惟不可感冒風寒雖病人偶有不願照行。醫者當細審有否碍乎養生之理。預為設法。使常受清氣為要。故病人須常在空曠處運行身體。

或騎馬賽船。舒其筋絡。行其氣血可也。亦有依易筋經法舒其筋骨勞其身體或提舉合宜重物或兩手攀空舒張肺體亦可 病人

之住處。須宜溫和。房屋宜高燥。東南向者佳。或在溫和海邊遊行。吸受

海風甚有益肺之功。如能行走。每日飯前可行六至九里。每日可行三

十餘里。亦有在高山行走居住。則天氣愈清。其益愈大。惟有心症或病

重者。不宜登高。往往有因此增其病勢。五服藥。諸藥之中。一魚油決不

能少。故西國常以魚油代食物。功能滋補肺經。易於消化。二麥液漿。如

以魚油合麥液漿同服。其功更偉。或合別種補劑同服亦可。大約魚油

宜飯後服之。或臨睡時服少許。如病人舌苔。或身熱者。魚油宜止勿服。

須另服鹽類瀉劑。或一方。礮炭養六錢。嘆啡水一錢。羅耳烏司櫻桃

水 *Aquæ Laurocerasi*。一二錢。汽水到八兩相合。用一大匙。合鮮檸檬汁一

半。作沸時服之。每四點鐘一服。功能退熱平胃。三有用甜肉汁所成之

品。如 *Trypsin, Pancreatin, Bengers' Liguor, Fairchild's Pulverized Extract*。等。合

食物同食者。或以鮮甜肉小塊。切碎。加水少許。過一二時。濾取其水一

兩。合魚油半兩調勻。射入肛門亦可。或專食羔羊之甜肉。甚有功力。四

服磷劑所合之品。如貢邦藥水。鐵磷養糖露等。均可。如以磷合魚油同

服。久久不已。其功更效。五有用幾阿蘇殺其微生物。又有止咳化痰退

熱。歛汗開胃止瀉之功。如痰多變臭者。幾阿蘇更不可少。或每日服五

滴。宜大服方有效頗有效驗。如以嘍吡啉虫浸在一化四千幾阿蘇水中。不久

即死。故每日服十五滴幾阿蘇。即血中有一化四千改變之比例。用治

肺勞。甚有效驗。惟幾阿蘇宜選上品。又宜成水服。勿成丸服。○一方。淨

幾阿蘇 *Creasoli (Morsen)*。半錢。桂皮酒四錢。橘皮酒二兩半。甘油到四兩。

相合。每服一錢。化水少許。每日三次。飯後服之。如久服幾阿蘇。漸可加

增。○又方。幾阿蘇二十滴。酒精六錢。糖露六錢。桂皮水到三兩。相合。每

服一錢。或幾阿蘇六滴。甘油一兩。忽斯克酒二兩。每用五十滴。合牛乳

或酒同服。或以幾阿蘇成丸服亦可。○一方。幾阿蘇四十滴。扶桑粉甘草粉各錢半。樹膠水足用。分作一百二十丸。每三丸有幾阿蘇一滴。依病酌服。○亦有以幾阿蘇一滴。合二錢魚油同服者。○如幾阿蘇內服嘔惡者。宜射入肛門。或合魚油十化搽抹肚腹與兩腋亦可。○亦有用埃及達方。圭阿枯。Guaiacol。橄欖油。佛矢林。四者相合。用皮膚針射入者。每用分半。每分半內有圭阿枯七釐半。埃及達方一釐半。射後善能退熱。斂汗。化痰止咳。生新健體。功效甚捷。

此外亦有用硫磺粉。能殺微生物。又能化痰。氣管新炎服藥頭甚效。其中有硫磺故也。或服石磺。或飲硫磺泉水。或服鉀石。宜常服之初起。服此甚有效驗。或汞劑。汞雙綠水。服小或初起服迦路迷。善能止咳退熱化痰。或服汞碘。每十二分釐之一。或郁加利達。薄荷冰。石莫耳。沙羅兒。亞力使篤兒。丁香油。比魯漿。養氣。阿純。即臭養氣加波匿酸。安息酸。石綠。得力平。大楓子油。鏽綠。沙利沙酸。松節油。碘。炭。匿酸等。均有用

之者。○近來有噴吸藥氣。或以藥粉射入肺管者。或用熱氣冷氣或溫

熱濕氣噴入肺經者。概無大效。如用之可以幾阿蘇化火酒十五滴。幾阿蘇一分

分酒醇三四分聞吸其氣。或純用石莫耳。碘。加波匿酸。郁加利達。埃及達方。薄荷

冰等。聞吸之亦可。○一方。埃及達方二分四釐。淨幾阿蘇四滴。郁加利

達油八滴。濃哥羅方四十八滴。酒精與吡啉到四錢。相合。○又方。幾阿

蘇一錢。加波匿酸二錢。碘吡啉酒二錢。濃火酒三錢。相合。滲在海絨。聞

吸其氣可也。○又方。汞碘一分。鈦碘一分。化水五千至一萬五千分。用

香水瓶噴吸其氣。或照方加濃五至十倍。蒸氣聞吸。能殺嘔吡咧之

虫。○近來有用栢蜜來松油。Oil of Pinus Pumilio。或噴吸。或聞吸。治肺

勞甚有功效。○亦有專用納弗石兒一釐。合棹腦三釐。或汞雙綠水。三化

或汞碘。或幾阿蘇合郁加利達油。或佛士林合郁加利達油。用皮膚針

射入。或用薄荷水。十二化水一百幾阿蘇水。二化水一百與橄欖油相合。用少許抽入

氣管之中頗效。○亦有在肺爛處。依外科法割開。洗淨。西國已有施治者。但取效不易。恐此法不能久行。數年前有郭君 Koch's Method. 創行佈種之法。與種牛痘法相同。以為藉此可以免肺勞之患。其法無關實益。且施種甚險。至今此法已湮。人無用之者。

至於肺勞兼症。不一而足。一咳嗽。凡肺勞初起。必多乾咳。或咳而作痛。或因咳而身熱者。宜上文退熱方。惟嘍啡須加倍。并另加輕衰酸少許。又夜間亦宜服此。較日間更多。或另服鈹梅鹽檸檬汁。以止咳嗽。二肺勞痰積難出者。宜輕淡炭養。或輕淡香酒一錢。合水小酒杯。或檸檬汁一匙。嘍啡水一分。相合服之。或以鈹碘合吡啤略葡萄酒同服亦可。或服幾阿蘇魚油。柏油。克羅林。亦有止咳化痰之功。或外用一切引炎之品。或聞吸幾阿蘇與柏蜜來松油。或謙落與輕衰酸相合。吸食其氣亦可。三肺勞痰多變臭者。幾阿蘇為最佳。四肺勞一時暴咳。不止者宜謹落輕衰酸五肺勞咳嗽而痛或因肺胞

發炎。或因肺腦筋發炎而痛者。宜外搽止痛之藥。草烏。豆樟腦。蘆茄哥羅方等。均可。或外貼斜條膏藥。不使肺動。或用布卷包紮胸肋。至於壓藥。概無用處。又有綠養冰嘍啡。開羊花。鈹溴等。善能止咳。但久服有癮。宜慎用之。六肺勞身熱。最為可慮。大約金雞那無甚功效。且服之恐有阻痰之弊。反致痰多。須服上文退熱各藥。近來有用安的拜林與安的非白林。善能止肺勞之熱。宜先服半錢。服後熱退。則不必服。不退。逾一點鐘再服分半。至共服一錢為度。切勿多服。有取服過多。減其本熱者。最宜留意。故有中服每四五六點鐘服一分。至熱退為度。取效雖緩。而無後患。大服後熱難升。小服後熱易升。又安的非白林功用畧同。每四點鐘服四釐亦效。亦有用沙利沙退熱者。而功效欠速也。七肺勞泄瀉兼腸迴爛者。鴉片嘍啡。必不可少。服後能使腸迴安舒不動。易於收口。並服植物之欵劑。較金類欵劑更效。如紅蘇木精。每服一分至分半。成丸服。或服汞雙綠幾阿蘇。或乳酸。均

可用之餘詳卷一泄瀉篇。八肺勞盜汗亦所不免。○一方。錐養三釐半。蘄茄膏八分釐之一。開羊花膏二釐半。成丸服。每晚臨睡時服之。或服了刀邊。亦有斂汗之功。惟服後多有口乾咳嗽者。故不多用。大約了刀邊水服一滴。即百分之一或蘄茄酒。先服分半。後每二或四點鐘服五滴。亦效。又阿耨立新。Agaricine. 每四點鐘服八分釐之一。斂汗之功。堪稱第一。或用開羊花精。每用二百五十分釐之一。用皮膚針射入。或吃囉略雜散。每服一釐。或馬前冰或雞那霜。三至六釐 鍾石。撒弗那兒。六至八釐 石磷。八至一分二釐 炭匿酸。磺酸。鐵磺養。了葛。白礬等。均可取用。亦有用海棉花。浸淡醋水。揩抹身體。或以綠養水二錢。白蘭地酒小杯。化水揩抹身體亦可。或以熱水或礬水沐浴。或以冰袋壓在肚腹。均可試用。九肺勞喉痛。以及喉部各症。見前聲管發炎篇。十肺勞腹統膜發炎。見前腹統膜發炎篇。

紅蛇皮癬

Pityriasis Rubra or Exfoliative Dermatitis.

此係皮膚病症。因假皮枯乾脫落。大抵難治。○內服之藥。宜鍾石并表劑。○一方。輕淡醋水三兩。鈇醋二錢。鍾石水三十五滴。樟腦水到十兩。相合。每服半兩。日三次。飯後服。兼服鐵魚油為要。○外治之法。首宜保護病處皮膚。不可揩擦。○痒癢者。宜蛤蜊水洗之。或以鈇炭養漿粉。并少許加波匿酸相合。化水洗之。○又用油類外搽。甚有功效。○一方。猪油一斤。合二兩樟腦搽藥。調勻。先將壓痂洗去。後搽此頗效。或錐養油九分。合橄欖油一分。相合搽之。每日五六次亦可。如四肢患此者。宜敷藥後。包裹為要。

黃斑蛇皮癬

Pityriasis Versicolor.

此係小塊皮膚患癬。各處均可患之。概因有虫之故。因不癢不痛。無關緊要。多不介意。○一方。汞雙綠分半。輕淡綠分半。拉文大酒六錢。杏仁粉到十兩。相合。用海絨裹藥。外搽甚效。或搽碘加波匿酸。水或肥皂亦可

