

醫學管錐 外集 四

⊗  
i18-2

490.9  
Ig-4  
4

No. 2049  
12 i 18-2



富士川文庫

1261

醫學管子錄卷四

九折堂山田氏圖書之記

瘡瘍有蟲

難痘治驗

鯉魚湯

瘡痂同因

用導痰湯訣

與三原良適手簡論胸氣新論

麝香利水

赤小豆煎

千金治水腫一方

駁西洋醫

絕穀法

劉寄奴

用崔氏療脚氣方及蘇恭防已湯訣

擇乳看法

產後少腹鞭滿不可槩為瘀血

産婦忌早浴 生兒禁浴

針灸書法

風室丹藥神效厚大父の秘本

雜書

千金方水腫

寶香林水

三氣身毒

用草藥

腹前患

奪命散

疑西醫

瘡瘍有蟲 當与本集卷六所載相參看

大人小兒トモニ頭瘡久シク愈エズ痛甚シキハ瘡ノ痂ヲトリシレバ内ニ虫アルコトアリ予一病人ノ頭瘡ヨリ虫ヲ三百ホド取タリ痛忽止ムナリ婦人ノ陰門ニ虫ヲ生スルコトアリ色白ノ髮ノ如シ苦參ヲ煎メ洗ハセタリシニ其夜ヨリ虫失タリ又男子肛門ニ虫ヲ生スルコトアリ雄黃ニテ薰メ効アリ金匱ニ狐惑病アリ婦人ノ此證ト同類ナラン東郭醫談

瘡瘍有蟲



難痘治驗  
 椿庭隨筆  
 卷以國字載此治驗當  
 參看  
 藩士大河内友左衛門女年四歲正月初壯熱驚搐  
 嘔吐不食時痘疹方行疑似間先與加減升麻湯二  
 日吐止能食三日見點頗密舌白胎干燥乃用四順  
 飲加升麻葛根微利三四行其翌轉十神解毒湯起  
 脹初與大保元湯起勢勃三日根暈稍失收緊鷺  
 溲一行急作參歸鹿茸湯加丁子肉桂與之灌膿二  
 日痘窠平塌尋腹脹氣急根暈料飛去舌變淡白急  
 用聶氏建中湯方內倍參附至夜搖頭弄舌四肢微  
 冷更作參附各一錢濃煎灌之自朝至夜計用建中  
 湯十餘貼大劑參附四五貼次日諸證依然其夜精

難痘治驗

椿庭隨筆

卷以國字載此治驗當參看

藩士大河内友左衛門女年四歲正月初壯熱驚搐

嘔吐不食時痘疹方行疑似間先與加減升麻湯二

日吐止能食三日見點頗密舌白胎干燥乃用四順

飲加升麻葛根微利三四行其翌轉十神解毒湯起

脹初與大保元湯起勢勃三日根暈稍失收緊鷺

溲一行急作參歸鹿茸湯加丁子肉桂與之灌膿二

日痘窠平塌尋腹脹氣急根暈料飛去舌變淡白急

用聶氏建中湯方內倍參附至夜搖頭弄舌四肢微

冷更作參附各一錢濃煎灌之自朝至夜計用建中

湯十餘貼大劑參附四五貼次日諸證依然其夜精

神昏瞶謔語躁癢如狂。溘利無數。四肢厥冷。急用回陽酒。食頃盡吐。氣息奄奄。余謂衆曰。勢已極矣。特聲劑參附。凡二十貼許。而不覺微熱。候乃是純陰無陽之極。且法在死期。幸得到明日。或可延三日耳。顧接續微陽之外。無他法。於是據鄭氏合痘經會成說。灸天樞神闕。幾千壯。時得睡着。至天明。諸證自若。傍議紛然。余確守前法曰。蓋積陽為天。不明積陽之理。則無以奏回天之功。因倩看護十餘人。且灸且藥。無少間斷。收壓五日。間凡用藥日十七八貼。灸數千壯。計參附不知幾兩。自灌膿至收壓五日。間墨守前方。不

肯移易。至十三日朝。面色微紅。身體微熱。舌大微燥。是陽氣正回復之兆。余喜可知。乃徹參附大劑。用建中湯五貼。十四日。陽氣大復。諸證平穩。弄舌未止。精神未全復。用調元解毒湯。加烏梅蜀椒數日。精神復常。灸瘡大潰。令瘍科貼膏。用小連翹飲。後用八物湯調理數十日。而全愈。余在痘兒側。五晝夜。其間用藥近百貼。灸壯不遑數。飲食消息。一出於余。同僚瀧波敦教。大助此役。四鄰來助者。日數十人。自非病家鐵心。醫者石腸。與看護得其人。焉得奏此大功哉。追憶先師京水翁遺教。未嘗不佩服也。時天保十一年庚子春。山田業廣識。

池田天谿評治術精到大得古人用峻補之髓但  
熟玩其變化用十神解毒際或稍過涼欬此雖白  
璧微瑕友誼之情忠告云爾

按傷寒補亡論卷十四郭雍治從兄案有灸千餘  
壯金液丹千餘粒四逆湯一二斗文茲據名醫類案  
卷一所以文  
當參攷

### 鯉魚湯

香川修德曰狩野菴九家五某妻年將三十產後調  
攝乖理成大腫脹其父福井某為醫頗有名于時凡  
自通利分消藥至于補劑施用不遺餘力轉治轉甚  
腫日甚食日減元氣幾傾遂及漫附駁補絕不見效  
乃請診於予予診寸口腫滿脈不應手似有似無不  
可為斷人迎跌陽亦同大脹仰臥不可轉側欲小便  
則頭足臂背腫左右十人一齊舉之不可昂仰離席  
一尺施夜壺於下僅通點滴一日夜溺不及一合福  
井醫曰術已盡矣唯守死耳補攻寒熱唯命是從懇  
請益堅予視眼中猶有精采乃曰至是之時只有鯉

魚汁法而已矣。若用漫附諸藥，則死矣。此時人間未見聞鯉汁之功，疑信相半。予曰：不用則已，其他無策。可出病家人決意請用，乃止藥，專一用鯉魚汁。一日夜，其翌恬然無異，再依前法用之。一日夜，其翌小便始通二升，衆人欣然有喜色。令人報言如是，如是仍用前方，其翌小便通至四升八合。次日四升，次日三升五合，次日三升，又次三升，以後二升內外，凡溺合三斗餘，皆驚且懼。曰：溺通其速，恐元氣亦隨脫去否乎？予曰：他物通溺，或亦有之，唯鯉則不然也。溺亦通，元氣亦益，不可疑也。遂用鯉魚三十日，四十餘頭，終不用藥而安。自是世人始知鯉汁之神效。

行餘醫言卷十四水

張門附治驗六

又曰：二條石垣街湊家三某，患大脹，家素割烹者，流和羹為都下第一，故滿城貴介紳袴，富足飲食之人，皆莫不嗜易牙之味。是以時興醫流亦皆多知而赴會。凡易十五醫，脹滿極矣。最後延予診視，唯坐而不能臥，亦不可俯，以故腐肉破而潰爛，痛楚號哭，呼吸短息，間有讖語。予曰：此非讖語，即吟嚙也。蓋以欲交睫則痛而驚，覺不能寐，只管睡如夢中，故語言如是耳。方今非藥功可到，除鯉魚汁外，無他術。終決意用鯉魚七十餘頭而安。病人大喜，使工畫大鯉，裱而掛之壁。日夜禮拜謝恩。同上。

又曰僧森嚴住妙心寺中聖澤院飲食不慎成大水  
脹易數醫不能治招予診曰此非尋常藥物所可治  
只有鯉魚汁法而已矣其侶曰僧人有一死耳何得  
犯肉而生也予乃辭去其夜徒弟柙首座竊來語曰  
妙心監院素分四派聖澤居其一倘師兄死則派脉  
漸衰後或向斷絕今徒止用人漫無他策而待死實  
是為兒孫者之不忠不孝也若使他人知之決不成  
事弟須獨犯罪擔當此事他日發覺弟應受責耳乃  
竊作鯉汁用之水日利食日進不服藥而安同上  
釜座里中御門東北角丸家次郎後號岸海壽曾到  
備後州福山幹事患瘡客中不堪其苦遂用截藥淹

滯成水脹便昇病還京膨脝益甚眾醫皆辭乃請診  
仍用前法而安後患痢痢後復成水脹亦用鯉魚汁  
而愈後患疝疼痛拘攣少食脫肉轉成水脹年向六  
十元氣頗衰其人朴而慤深信予不棄他固守前法  
漸安前後三回腫脹俱鯉賴鯉功壽及八十而卒同上  
又曰朱雀街花連理木瓜家武某患水脹亦用前法  
而平復同上  
正傳里嶋家產某房事過度漸成勞傷遂患大水脹  
勢及危篤醫皆畏元氣之脫徒守淺木不為通利之  
事乃招診予曰今水已有襄山上陵之勢又且日夜  
頻到如此則元氣將無所持苟不為疏決之策而徒



局補住悠悠度日畢竟同于無算倘得用通利去水而元氣不脫則幸之又幸矣而欲審索保去水而元氣不脫者則舍鯉魚奚以哉生死事大幸不幸在天須自謀慮病人決意服之終向安同上

又曰二條洞路西洞院東藥舖小西伊某患癩凡半年餘其意以為其心似沈似陷如將死意敬為憐懼惶惶不安醫皆為心虛用歸脾湯不能治藤田醫以自亦患此證自畏又怖病人專用入淺駭補單淺湯以五錢為一貼晝夜三貼又用歸脾大補諸人淺加一錢二貼約一日夜至十七錢四兩凡三月餘食漸減面脛浮腫術窮需救予曰此即癩證固非死證但

殺事說約附錄經驗方鯉魚湯方鯉魚自七八寸至一尺昆布一尺五寸右水一升合先煮昆布取六合去昆布內鯉魚者取三合溫服惡苦味者去腸膽惡腥者或加柚或椒茅

由藥為敵以成若斯重病乃祛藥湯以白湯服平平小丸藥十四五粒用鯉魚汁數日腫漸退食漸進而後施灸灼平復滿城稱奇鯉功益顯世醫皆效此法

同上

和田泰純曰腫滿指ヲ以テ按ニ濡硬其中ヲ得テ肌表ヒカクト光澤アリ其脉實ニシテ稍浮數ヲ帶ル者是實ニシテ虚ヲ兼アルノ證ナリ温藥ニテ是ヲ導クヘシ大蒜煎ニ空シ病人蒜臭ヲ惡ムモノニハ鯉魚煎ヲ以テコレニ代フヘシ若又鯉魚ノ腥ヲ惡ムモノニハ鯉魚霜ヲ用ユヘシ鯉魚煎方鯉魚長七八寸者一頭去其鱗不去其腸昆布

方三寸二片、花椒一錢、右水一升八合ヲ以テ煮テ  
四合ヲ取り、其汁ヲ飲ミ、且鯉ヲ食セシム、毎日一  
劑、鯉魚霜方、鯉魚大者一頭、不去其鱗腸、冬瓜各  
等分、右土器ニ入レ、鹽泥ニテ固濟シ、炭火ヲ以テ  
燒テ性ヲ存シ、末トナシ、白湯ニテ送下ス、每服一  
錢、日ニ二三回、導水瓊言

原南陽曰、鯉魚湯ヲ脚氣ニモ用ユルコトアリ、鯉  
魚湯療脚氣上氣引湯、脉大者水腫ニモ用ユ、何レ  
モ腫ニ光リテ艶アルヲ治ス、生鯉魚一尺者、去腸  
洗淨、右以水六合、煮至三合、去鯉、服一合、日二夜一  
凡服用漆器、生柚皮、獨活、茅山椒等、隨好入之、為避

蘇林  
黃白丸、市販六合、治脚氣、水腫、三合、日服、生鯉魚、一尺、去腸、洗淨、右以水六合、煮至三合、去鯉、服一合、日二夜一、凡服用漆器、生柚皮、獨活、茅山椒等、隨好入之、為避

腥臭故也、醫事小信卷三

有持桂里曰、往年伊勢屋次郎左衛門管家與兵衛  
ト云者、癆病中、脚氣腫滿ヲ病ム、諸藥不應、衆醫皆  
不治トス、余亦診之、篤疾交加、真ニ生理ナシ、雖然、  
腫ハ則我消之ト言テ、切ニ口味ヲ戒慎セシム、鯉  
魚湯ヲ與ヘシニ、小便稍長シテ、腫脹漸クニ消シ  
又病家大ニ歡抃セシガ、十餘日ヲ過ギ、一朝尿復  
タ短少トナル、余其然ル所以ヲ解セズ、反復シテ、  
之ヲ問究ムルニ、特病極沈思稍久シテ、日久、病人  
養護ノ一事前途ニ異ナルコトナシ、但此コトニ至  
リ、煮過セル鯉魚、徒ニ之ヲ地ニ棄ツルモ、惜ムベ

シトテ豆油ニテ再煮テ以テ下飯ト為スト余曰  
水能浮舟又能覆舟食藥不得法則豈得不有害乎  
コレヨリ益口腹ヲ慎ニシメ仍前方ヲ連進セシ  
ニ小便復利シ腫全ク消スサテ世ニ瘡ヲ疾テ素  
有ノ患ヲフルヒ落シタリト云事アリ此人水病  
愈ルニ及テ向ノ勞病焉有トナレリ不亦奇乎  
轉

觀卷九

本草黑字鯉魚肉味甘主欬逆上氣黃疸止渴生  
者主水腫脚滿下氣

本草綱目煮食下水氣利小便卷四十四

又鯉乃陰中之陽其功長於利小便故能消腫脹

黃疸脚氣喘嗽濕熱之病作鱠則性溫故能去痰  
結冷氣之病燒之則從火化故能發散風寒平肺  
通乳解腸胃及腫毒之邪按劉河間云鯉之治水  
驚鳥之利水所謂因其氣相感也同上附錄及諸  
書今不具錄

本書

本草備要古方治水腫有鯉魚湯鯉魚炙卷四

肘後方治卒腫滿身面皆洪大方大鯉一頭醇酒

三升煮之令酒乾盡乃食之勿用醋及鹽豉他物雜

也不過三兩服差卷三醫心方卷十引葛氏方  
乾盡作令苦酒盡醋作飯外臺卷廿引

乾盡作令苦酒盡醋作飯外臺卷廿引

又治腫入腹苦滿急害飲食方鯉魚一頭重五斤

者以水二斗煮取斗半去魚澤漆五兩茯苓三兩  
桑根白皮切三升澤瀉五兩又煮取四升分四服  
服之小便當利漸消也同上 外臺卷二十一引附  
後方後作右五味取四物  
內魚汁中煮取四升

千金方治妊娠腹大胎間有水氣鯉魚湯方鯉魚  
一頭重二斤白朮五兩生薑三兩芍藥當歸各三  
兩茯苓四兩右六味呖咀以水一斗二升先煮魚  
熟澄清取八升內藥煎取三升分五服卷二十一外  
引千金作生魚湯

又鯉魚湯主婦人體虛流汗不止或時盜汗方鯉  
魚二升葱白切一升豉一升乾薑二兩桂心二兩

右五味呖咀三物以水一斗煮魚取六升去魚肉  
諸藥微火煮取二升去滓分再服取微汗即愈勿  
用生魚卷三 肉疑內

又治大腸水乍虛乍實上下來去方赤小豆五升  
桑白皮切二升鯉魚重四斤白朮八兩右四味呖  
咀以水三斗煮取魚爛去魚食取盡并取汁四升  
許細細飲下魚勿用鹽卷二十一

又澤漆湯治水氣通身洪腫四肢無力或從消渴  
或從黃疸支飲內虛不足榮衛不通氣不消化實  
皮膚中喘息不安腹中響響脹滿眼不得視方澤  
漆根十兩鯉魚五斤赤小豆二升生薑八兩茯苓

三兩人參麥門冬甘草各二兩石八味呔咀以水  
一斗七升先煮魚及豆減七升去之內藥煮取四  
升半一服三合日三人弱服二合再服氣下喘止  
可至四合晬時小便利腫氣減或小溲下若小便  
大利還從一合始大利便止若無鯉魚鮪魚亦可  
用若水甚不得卧卧不得轉側加澤漆一升湯加  
枯樓根二兩欬嗽加紫苑二兩細辛一兩欬冬花  
一合桂三兩增魚汁二升同上澤漆根湯金翼卷十九  
壹枚重伍斤者淨去腸胃外臺卷廿古今錄驗  
澤漆根湯方去赤小豆生姜餘同而主治頗異今  
不具錄

又治水氣通身洪腫百藥治之不差待死者方大

麻子一石皆取新肥者佳赤小豆一石不得一粒  
雜右二味皆以新精者淨揀擇以水淘洗暴乾蒸  
麻子使熟更暴令乾貯於淨器中欲服取伍升麻  
子熬令黃香惟須緩火勿令焦極細作末以水五  
升搗取汁令盡淨密器貯之明旦欲服今夜以小  
豆一升淨淘浸之至旦乾漉去水以新水煮大豆未  
及好熟即漉出令乾內麻子汁中煮令大爛熟為  
佳空腹恣意食之日三服當小心悶少時即止五  
日後小便數或赤而唾粘口乾不足怪之服訖常  
須微行未得即卧十日後針灸三里絕骨下氣不  
爾氣不洩盡服藥後五日逆不可下者取大鯉魚

一頭先死者去鱗尾等以湯脫去滑淨洗開肚去  
藏以上件麻汁和小豆完煮令熟作羹葱豉橘皮  
生薑紫蘇調和食之始終一切斷鹽湯即飲麻汁  
秋冬煖飲春夏冷飲常食不得至飽止得免飢而  
已慎房室瞋恚大語高聲酒麪油醋生冷菜茹一  
切魚肉鹽醬五辛治十十差神驗并治一切氣病  
服者皆差凡作一月日服之麻子熟時多收新瓮  
貯擬施人也同上  
又治男子女人新久腫得暴惡風入腹婦人新產  
上圍風入藏腹中如馬鞭者嗑吸短氣欬嗽又方  
鯉魚長一尺五寸以尿漬令沒一宿平旦以木從

外臺引異方同

口中貫至尾微火炙令微熟去皮宿勿食空腹頓  
服之不能者少再服勿與鹽同上  
千金翼灸鯉魚主腫滿方取鯉魚長壹尺伍寸以  
尿漬云云同但執文与前條所載千金畧  
古今錄驗已試鯉魚湯療上氣方杏仁去兩人天  
皮熬貝母桂心各三兩橘皮人參甘草炙厚朴炙  
麻黃去節茯苓胡麻白前各二兩鯉魚五斤生薑  
六兩半夏五兩洗右十四味切先以水二斗煮魚  
得一斗二升去魚內藥煎取三升二合分四服日  
三夜一服外臺卷十  
古今錄驗鯉魚湯療欬逆上氣喉中不利方生鯉

後

魚一枚重十三斤熟艾二升白蜜一升紫苑牡蠣各四兩熬款冬花一升杏仁二十枚去皮大兩人者豉半升射干二兩細辛三兩飴八兩昌蒲二兩右十二味以咀藥和內魚腹中置銅器中蒸之五斗米飯下藥成一服一升日三夜一綱上宋本

據明版

古今錄驗療通身手足面目腫食飲減少此是三焦決漏精液不通水氣却行者鯉魚湯方鯉魚重五斤者茯苓六兩澤漆五兩炙人參二兩杏仁一兩去皮大兩人碎澤瀉五兩甘草二兩炙右七味切以水二斗五升煮魚取一升半汁內藥者取四

前

升未食服一升日三以小便利為度年八十病大困服此差同卷二十

崔氏療水病身腫方鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉右一味以水二斗赤小豆一大升和魚肉者可取二升以上汁生布絞去滓頓服盡如不能盡分為二服後服温令煖服訖下利利盡即差慎牛肉白酒生冷麩猪魚油酪藥滓埋之勿令人食同上抄

傳効鯉魚湯療水腫腹大面目身體手足盡腫喘欬短氣又脅滿不得臥方鯉魚一枚重三斤桂心三兩紫苑一兩木防已二兩黃芩二兩消石二兩

乾薑二兩人參二兩右八味切以水一斗五升煮  
魚如食法取汁一斗二升出魚內藥者取三升去  
滓先食溫服一升日三同上  
廣濟療婦人懷妊數傷胎方鯉魚二斤粳米一升  
右二味如法作臛少著鹽勿著葱豉醋食之甚良  
一月中頓三過作效安穩無忌同卷三十三  
集驗療婦人懷胎不長方鯉魚長一尺者水漬沒  
內鹽如棗者令熟取汁稍稍飲之當胎所腹上當  
汗如鼻狀雖有所見胎雖不安者十餘日輒一作  
此令胎長大甚平安同上  
古今錄驗療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男  
婦人良方卷十三集驗  
當汗如鼻狀作當汗出如牛鼻狀

子漏血下白少氣思美食方用生鯉魚長一尺去  
頭內取骨擣末熬黃黑以猪脂和以絹袋盛如常  
法內陰中至痛處即止同卷三十四

千金生魚薄主乳癰方生鯉魚長五寸大黃莽草  
竈中黃土各六兩右四味別擣魚如膏三物下篩  
更擣令調以生地黄汁和傅腫上日五六夜二三

即愈同卷三十七  
大黃莽草生斷伏龍肝與此不同

錄驗方治任身體腫方生鯉魚一頭長二尺完用  
水二斗煮取五升食魚飲汁醫心方卷廿二

葛氏方治產後虛羸白汗出鯉魚湯方鯉魚肉三  
斤葱白一升香豉一升凡三物水六升煮取二升



嚴氏濟生方曾有婦  
腹脹小便不利吐逆諸  
證百雜進溫脾胃寬氣  
去脹等劑服之反吐藥  
物不納轉加脹滿奏心  
驗之胎死腹中又服諸  
下胎藥不能通解舉  
家直及惶因得鯉魚  
湯論曰脚腫俗呼為  
鰓脚亦有通身腫滿  
心胸急脹名曰胎脹遂  
去妊婦心前衣服看之  
胸肚不舒急以鯉魚  
湯三五服大小便皆下  
惡水腫消脹去方得  
身免死胎可謂更生  
之人矣此證蓋緣懷  
身腹大妊婦不自知覺  
人皆謂以謂身娠如  
此終不以為胎水病證  
豈人何以得知故書此  
諭病家自當總見察鯉  
魚湯當歸去芦酒

浸白芍藥各三錢白茯苓去皮四錢白木五錢石咬咀每服四錢用鯉魚二尾不拘大小破洗  
鱗腸白水煮熟去  
魚每服用魚汁一盞  
半生薑七片橘皮少  
許同煎至一盞空心  
心服如胎水去未盡  
再合服 卷九  
名醫類案一婦年三  
十以姓娠水腫以鯉魚  
湯加五苓散人參淫  
加倉木一錢厚朴陳皮  
五分薏苡術子炒重煎  
子滑石各二錢作一貼  
若喘急加苦葶藶小  
便不利加木通燈草甚  
者重煎子滑石散其  
淫毒自消防已治腰  
已下淫熱腫如內傷  
胃弱者不可用也 卷

今再服微汗即止 同卷廿三 廿五

按古用鯉魚類者不一千金卷三茅根湯用鯉魚  
齒卷四帶下白馬蹄圓用鯉魚甲雲母芍藥散用  
生鯉魚頭卷六上目病篇真珠散合用鯉魚膽鯉  
魚腦卷六下耳病篇外治方中合用鯉魚腦鯉魚  
腸鯉魚酢凡此類不可勝計今不備載

嘉永辛亥春御鳥見大塲源五郎內室累年水腫  
ヲ患フ諸治効ナシ余ニ治ヲ乞フ血水ノ證ニ  
似タリ先少心氣飲ヲ投シ桂枝茯苓丸ヲ兼用  
ス寸効ナシ或俗人鯉魚湯ヲ用ルヲ勸ムコ  
レヲ用ルニ翌日ヨリ小水利シ十日餘ニ又常

二復ス余慚愧汗背ニ徹ス書メ以テ他日ノ用  
ニ備ス

往年竹腰某トイヘル證自生ニ遇タルトキイヘルニ鹽  
味ヲ禁ジ麦飯ヲ喫シワセノ赤小豆ヲ煮テ食スルナト  
ハヨロシク勿論ナレバ鯉魚尺許ナルモノ昆布方三寸位ナル  
ヲ十片ホド花椒三四粒ヲ入レ湯ニ煮テ服ス若腥ヲ  
惡シ服スルヲ能ハサルモノハ已ムヲ得ス名古屋味噌  
少許ヲ加テ用ベシ

雞峯方治療瘰癧右用鯉魚一箇要重半斤已上  
者使巴豆不計多少和皮以杖子填巴豆入魚口  
腹內候滿紙糊口使新磚一箇放魚在上以新瓦

產寶治妊娠損動胎  
鯉魚壹斤、梗米壹斤  
右作臙食之佳卷上  
人良方臙當作臙

蓋使木炭燒魚成灰去炭取藥搗羅為末煮麵糊  
為元如菘豆大每服十五元晚食後煎烏梅湯下  
若取及兩月皮肉如故孕婦不可服卷廿二  
婦人良方治妊娠胎動不安護胎法鯉魚二斤梗  
米一升葱一握豉姜右作臙食之每月一度卷八  
萬病回春化龍丹治單腹脹方用大鯉魚一箇巴  
豆四十箇將魚刷了將魚脊割開兩刀將巴豆下  
在兩刀路合住用紙包裹慢火燒去豆食魚米湯  
補神效卷三

瘡痢同因

後藤良山曰瘡痢ノ因同ク邪氣ナリ初邪氣經

絡ニアタリイニ次第ニ表裡ノ間ニ入り鬱結シ

テ瘡トナル痢ハ邪氣腸胃ニアタルナリ病因考

又曰瘡ハ表裡間ニ在故其狀寒熱往來頭痛等ノ

外證ヲナス痢ハ唯下焦ニツク故ニ表ヘ不發シ

テ裡ヲ傷ナリ同上

又曰瘡ハ外ニテ其邪又ケ易ク痢ハ裡面爛レル

故ムツカシキナリ同上

原南陽曰痢ニ瘡ヲカ子タルヲ瘡痢ト云是モ葛

根湯ナリ後ニハ柴胡加芍ナトヲ用ユルナリ

瘡痢同因

病因考ニ瘡痢同因ニ論シタリ瘡ノ奇怪ナルハ  
痢ノ因ト異ナラント思ヒシニ後ニ考レハ下利  
スル人初起ノ時鯉膾ヲ取ヘハ即時ニ痢ヤシ却  
テ秘結ヲ患ル者アリ乾柿ヲ味噌ニ煮或ハ炮食  
ス東海ノ人ハ京ノヒモト云海州ヲ味噌ニ煮食  
ス皆痢ヲ治スル奇品也又蒜ヲ煮食ト寒中ノ餅  
並ニ雞卵ヲ食鹽粟穀ヲ煮服シテ痢ノヤムハ其  
理モ可解ナレト山民魚ニ之地ニテハ茄子冬瓜  
類ヲ酢味噌ニテ食シテ痢ヲ治ス外ニモ奇藥ア  
ルヤ未聞見サリナカラ漫リニ行フヘカラス小  
便不利シテ腫ヲ催スフアリ酢ニテ止ルヤト思

ハル又瘡ハ酢ニテ再復ス瘡ノ巫祝或ハ奇藥ニ  
テ截ルト同意ト見ユ先年岩城ノ湯本村ヘ招カ  
レシトキ里醫曰此地ノ人瘡ト痢ヲ病マスト因  
テ知ル艮山ノ說可信ヲ頃讀張杲醫說曰瘡并  
甫因道中冒暑得泄痢疾夢至一處類神仙居一人  
被服如仙官延之坐視壁間有韻語藥方一紙讀之  
其詞曰暑毒在脾濕氣連脚不瀉則痢不痢則瘡獨  
煉雄黃蒸餅和藥甘州作湯服之安樂別作治療醫  
家大錯夢回如方服遂愈益シ是等ニ據テ考タル  
モノ歟醫事小言卷三

備急夫瘡與瘡分作兩名其實一致或先寒後熱

或先熱後寒，嶺南率稱為瘧。江南揔號為瘧，此由方言不同，非是。別有異病，然南方溫毒，此病尤甚。原其所歸，大畧有四：一山溪毒氣，二風溫痰飲，三加之鬼癘，四發以熱毒。在此之中，熱毒最重，故所用藥物，須審病源。患瘧瘴之後，特須防瘴，而發痢死不旋踵，所以然者，瘴體先虛，虛不宜痢，又瘴宜冷差，痢宜溫斷。斷痢則益瘴，斷瘴則益痢。大率如此，不可不慎。非直藥療，亦須宜加將息。取適若能一色藥，兼二種病，冷而止痢，溫而斷瘴，最其妙也。如不然，先須斷痢，然後療瘴，瘴緩痢急，故也。仍率須作挾毒防之，不得專醫其痢。外臺卷五

醫說昔盧丞相自渠州被召，途中冒暑，得泄痢連月。夢觀音壁間有韻語一紙，讀之數遍，其詞曰：暑

毒在脾，濕氣連脚，不泄則痢，不痢則瘧。卷三觀音

按原依普通本，今舉潘王府本，以示其異同，未詳孰是。

張介賓曰：凡患瘧者，必因於盛暑之時，貪涼取快，不避風寒，或浴以涼水，或澡於河流，或過食生冷，壯者邪不能居，未必致病。怯者畜於營衛，則所不免。但感於寒者，多為瘧；內傷於寒者，多為痢。使能慎此二者，則瘧痢何由來也。素問瘧論注

又曰：瘧痢發于夏秋，本因溽暑，豈非濕熱，但炎蒸之令出於天，苟能順天之氣，安能有病。惟因熱求

涼過于縱恣則病由於人矣故凡風寒感於外者其邪在經病多為瘧生冷傷於內者其邪在臟病多為痢痢之來也暑濕鬱久則為濕熱然有瓜果生冷涼風水火未必鬱積加以飲食相犯觸而成痢則痢未有不本于寒濕生灾者豈必專以濕熱為患哉曾疑錄

尤怡曰痢之為病氣閉于下而火復迫之是以腹痛裡急糟粕不出而便腸垢也其源皆由于暑濕與瘧病俱發于夏秋益傷于經絡則成瘧而入于腸臟則為痢也經絡之邪可散而愈故治宜辛苦溫之藥腸臟之熱非清不愈故治宜辛苦寒之藥

亦發表不遠熱攻裡不遠寒之意醫學讀書記下

先友大洲醫官中川宗俊嘗嘗余余語語曰奧州ノ内ニ瘧ヲ病メハ痢ヲヤメズ痢ヲ病メハ瘧ヲヤメサル地アリ何人ヤラシ隨筆中ニテ見タリ今其書名ヲ忘ル追テ鈔錄メ贈ルベシトイヘリ

導痰湯

用導痰湯訣

附生薑說

濟生方治一切痰厥頭目旋運或痰飲留積不散胃  
膈痞塞脇肋脹滿頭痛吐逆喘急痰嗽涕唾稠粘坐  
臥不安飲食不可思半夏湯泡柒次四兩天南星炮  
去皮橘紅枳實去穰麩炒赤茯苓去皮各壹兩甘草  
炙半兩右以咀每服肆錢水貳盞生姜拾片煎至捌  
分去滓温服食後

卷二

業廣上毛高崎二住スル丁七年其間馬脾風ノ

流行スル丁數ニ十ノ驛中五十餘年ノ醫生麻

黃湯麻杏甘石小青龍加石膏大青龍湯ノ類其

他後世ノ諸方或ハ走馬湯桔梗白散滾痰丸無

用導痰湯訣

此方治一切痰厥頭目旋運或痰飲留積不散胃膈痞塞脇肋脹滿頭痛吐逆喘急痰嗽涕唾稠粘坐臥不安飲食不可思半夏湯泡柒次四兩天南星炮去皮橘紅枳實去穰麩炒赤茯苓去皮各壹兩甘草炙半兩右以咀每服肆錢水貳盞生姜拾片煎至捌分去滓温服食後

價散奪命丹等、百計試用セザルコトナシ、倣幸ニ  
シテ愈タルモノハ、百中ノ一トモ謂ヘシ、サレ  
ハ、醫者生ノ會合スル毎ニ、其事ヲ談セスト云コ  
ナシ、五六年ノ後、余不圖思フニ、普通ノ歎嗽ハ、  
邪先肺經ニ入テ、漸ニ肺藏ニ及フ、馬脾風ハ直  
ニ肺藏ヘ入ルモノナラン、直中スルコトハ、速ニ  
去死ニ至ル、藏ハ陰ニ屬ス、寒涼攻劇モ効ナキ筈  
ナリ、卒中風ノ理ト同シカラント思ヒ、丹キ、導  
痰湯ヲ用テ、四五人大効ヲ得タリ、其頃濟生方  
ノ本方ヲ檢セシニ、生姜十片ヲ用ユ、諸方書ニ  
引用シタルハ、皆生姜水煎トノミアリ、ソレヲ

草ニニ看過シテ、本書ヲ檢セザルコト、申訳モ  
ナキコト、明治七年、再東京ヘ歸リシニ、往年ト  
違ヒ、矢張馬脾風ヲ診スルコト數ニナリ、仍テ導  
痰湯ヲ用ルニ、十二六七ヲ救フ、勿論濃煎ニシ  
テ、生姜ヲ多ク入レ、一日ニ五六貼、乃至七八貼  
ヲ用ユ、多服セサレハ効ナシ、小兒ノコトコトハ、父  
母徃ニ多服ヲ厭フコトアレバ、死生瞬息ヲ出サ  
ルコトヲ嚴シク喻シ、油断スヘカラズ、其發反ル  
ヤ、日ヲ歴サレハ、十二九ヲ救フ、タトモ、皆脇  
アオリテ、奔馬ノ如ク、二三日ヲ過タルモノモ、  
十二五六ヲ救ヘシ、此法ヲ兩三人ノ醫者生ニモ

吐シタレ氏格別効ヲ得ズト云フ此皆濃煎多  
服下生姜ノ分量ニ心ヲ用ヒサリシナリ水一  
盃半  
ヲ一盃ニ煎生姜ニ三片入レ一日ニ三服位  
用ヒタルヤウノ緩慢ノ下ニテハ死生反掌ノ  
病ニ理ハキカ或ハ胎毒ナド言ヒ罵ルモノモア  
レ氏甚シキ臆断ナリ因テ憶フ昨乙亥復一醫  
生ノ脚氣ヲ診スルニ虚候ニテ嘔吐アリ小半  
夏加茯苓湯ヲ處シ生姜ハ五片位入レ水ハ二合  
餘ヲ一合位ニテ空シカラント云フ其醫生生  
姜十片餘ヲ用ヒ水モ余程濃煎ニシタリ水量  
生薑  
トモ尾臺超ノ類トモ  
方廣義ニ據裸過半差タルトモ再ヒ診ス  
ルニ當人言フ濃煎ニシタレハ生姜格別ノ辛

味ヲ覺エズ吞心甚ヨロシ但數日用タレハ體  
中熱スルヲ覺ルノミ古方ノ妙感スルニ餘リ  
アリト語ル因テ悟ル方後消息等尤心ヲ用テ  
粗畧ニスヘカザルナリ

再按ルニ天南星ヲ用ユル方ニハ生姜ヲ多ク  
用ユ局方卷一ノ省風湯ニ生姜十片ヲ用ヒ  
生飲ニ薑十五片ヲ用ヒ大醒風湯ニ生姜二十  
片ヲ用ユ易簡方三生飲方後星香散ニ生薑十  
四片ヲ用ユ濟生方卷一星附湯ニ生薑九片ヲ  
用ユ方書中ゴノ類枚舉スヘカラス今唯其一  
ニヲ茲ニ舉ルノミ



二八廿二與  
 四八廿二與  
 六八廿二與  
 八八廿二與  
 一〇八廿二與  
 一二八廿二與  
 一四八廿二與  
 一六八廿二與  
 一八八廿二與  
 二〇八廿二與  
 二二八廿二與  
 二四八廿二與  
 二六八廿二與  
 二八八廿二與  
 三〇八廿二與  
 三二八廿二與  
 三四八廿二與  
 三六八廿二與  
 三八八廿二與  
 四〇八廿二與  
 四二八廿二與  
 四四八廿二與  
 四六八廿二與  
 四八八廿二與  
 五〇八廿二與  
 五二八廿二與  
 五四八廿二與  
 五六八廿二與  
 五八八廿二與  
 六〇八廿二與  
 六二八廿二與  
 六四八廿二與  
 六六八廿二與  
 六八八廿二與  
 七〇八廿二與  
 七二八廿二與  
 七四八廿二與  
 七六八廿二與  
 七八八廿二與  
 八〇八廿二與  
 八二八廿二與  
 八四八廿二與  
 八六八廿二與  
 八八八廿二與  
 九〇八廿二與  
 九二八廿二與  
 九四八廿二與  
 九六八廿二與  
 九八八廿二與  
 一〇〇八廿二與

外台原久矣  
 喘者不齊并  
 喉裏呼聲絕  
 方  
 杏 痰 喘 宗

相摸屋傳藏芝神末女多滿年二歲戊寅四月感外邪微  
 熱咳嗽與五虎湯其聲全啞氣急咽中如曳鋸殆  
 欲絕依椿翁先生之說急投導痰湯一點生薑七片以水一杯半煎取七分日進  
 十餘貼次日氣急稍緩滑便二行咳唾粘痰其次日滑  
 便三行聲漸復追日全愈

鮫洲平林美德女年良年二歲同病同方又得効

通一町目中屋宗四郎女年九歲六月十日感外邪微熱咳嗽

下條氏投神秘湯至十三日熱勢加重咳嗽氣急聲啞汗出

欲絕柴田元春投導痰湯生薑其夜延余會洋醫福原

某之去是急性コトフ勢加一層則非用咽喉截閉之法不可救余去馬脾風之險症也余遇此症屢用峻劑而不得效不若用導痰湯多服為優患家決意於是其夜用十五貼其翌晝夜不用三十貼之多病勢頗減吐粘痰下滑便逐日而愈雖處方得宜非患家信服之篤耐多服之勞則何能羨此偉切此歲此病宛者頗多詢是椿翁之賜而父母慈愛之篤行發不可<sub>レ</sub>化而傳也時明治十一年六月也

清川玄道

通巻丁目中屋宗三郎女九年

本月下旬ヨリ感冒痰咳ヲ發シ十日ヨリ咳嗽甚ク率ニ咽喉迫リ声全啞ス同日午後一時始テ僕ヲ延リ急導痰湯生姜十片ヲ加ヘ多服ヲ命シ其夜脈浮微痰汗出時々頑痰ヲ吐シ大便一行小便五六行頗ル快通ヲ得タリ其翌十二日熱退キ脈ニ又沉ナリ強テ前方ヲ多服ス十三日ニ至テ頑痰大ニ吐出シ麻浮緊自汗出テ喉中漸ク利シ兩便益泄スニ晝夜ニシテ前方進ムト七十五點ナリ此餅然レ氏声未發及十四日ニ至テ前方ニ十點ヲ投与ス其日同篇ニ小便數行大便下ラス十五日ヨリ柴陷湯加竹茹及滾痰丸并用ス二十日ニ至テ喉中愈々利シ声漸ク發ス終ニ

全治ヲ決ス時明治十一年六月

南ハ所臨三丁目加田屋某娘四年同症ニ罹リ道守

湯三十貼ニシテ全愈ス

木挽町三丁目五之屋秀次郎男六年前症ニ罹リ

前方ニシテ全愈ス

出雲所小川善助男六年前症ニ罹リ前ノ如ク

全愈ス然レテ後頓嗽ニ変ス

銀座三丁目報告社長大野某男三年同症同方ニ

シテ治ス

此亦田元春誌

廣文堂

中橋伊勢屋庄藏男本年四年三月

本月九日微熱及ヒ咳嗽ヲ発シ其夕鼻塞喘鳴

声全啞ス然ルニ父母意ト為サズ翌十日始テ僕ヲ

延ク僕之ヲ診スルニ脉沉ニシテ胸肋肩動喉中塵

迫動モスレバ窒息セント欲ス確然タル馬脾肌ナリ

急ニ山田君試験ノ濟生方導痰湯十貼ヲ與フ

其夕診スルニ微汗出テ大便一行小便二三行共ニ快

通ヲ得且頑痰ヲ吐シ脉浮緊喉中少ク利ス咳嗽

猶々増進ス其夜前方五貼ヲ与フ翌十日從診ス

ルニ喉中愈利ス亦前方施ス四五日ニシテ全治ヲ

得タリ

明治十一年四月

柴田元春謹誌

東京府下北豊島郡瀧川村平民矢田部宇太郎長女喜多齡五歳四  
 月一日外感發熱誤テ浴シテ後再感咳嗽ヲ發ス近邊ノ医治療セシ處  
 同七日正午十二時暴ニ痰喘壅塞呼吸息迫聲啞シ虛里動甚レ且  
 一日二三度昏冒ス四肢微冷煩躁不得眠十九日午後愚姑診スルニ  
 舌上白苔口中ヨリ咽喉ニ至マテ涎沫油ヲ含タルカ如シ是即馬脾風因テ  
 導痰湯ニ生薑十片ヲ入三晝夜三拾五貼ヲ投ス廿二日鷄鳴粘  
 痰三四合ヲ吐ス廿三日朝下利二行大便中糊ノ如キ者アリ後痰喘呼吸促  
 迫水ヲ以テ流シタルカ如ク愈エ但鼓耳猶未タ唾ス午後錢位白朮散ニ轉  
 不用元一四五日前症全ク愈昨廿八日休藥ス時明治十二年四月  
 廿九日

飯島貞庵識

與三原良適手簡論脚氣新論附方割出典

近日脚氣新論の恩借ら下早速一過淺存なれ三  
 浦公直核手経強いる一実指し論臆新鹵奔の  
 比ニあつた実ニ感服いる一但し唐侍中の一  
 方裁婢加木附あどハ先輩後進とし比効強を  
 比るといふらと吾人の親試目撃せらるとあるた  
 るニ比ニ方を用ざるハ缺典ともいふ一亦缺文  
 桂枝木香呉茱萸烏頭附子と聚して用ひせざ  
 へるハ翁の癖不テ通論ニ非ざるニ似多ク其他  
 ハ先間然をりするありと云べし其試用のる必  
 定唐宋以還のる方多ク抄れん其出處を考け  
 與三原良適手簡論脚氣新論

且方名を改めて出し、多々ハ享保以前の習之る靴を隔て痒を搔くの激を免とて、今其出典を探り得たる方ニニを識し、四目ニかけし、審たのざるものハ他日を俟て補べし、余ハ面路ニ及り、不一、明治九年一月、栲老老人、

脚氣新論諸方出典考

獨活散邪湯 即和劑局方三和散去羌活代獨

活去木香加生姜

大檀榔湯 未考

犀角茯苓飲 未考

黑豆檀榔湯 即外臺崔氏療脚氣遍身腫方

聖方雜鳴散即外臺  
聖方加桔梗陳修園時  
聖方脚氣第一品藥不  
其意厥如感風濕流注脚  
聖方而脈浮腫者並聖方

犀角檀榔湯 未考

導水大腹皮飲 即濟生方大腹皮散枳殼代枳實

加犀角

隆氣旋復花湯 即聖濟總錄旋復花湯去杏仁加

半夏

鷄鳴散 未考

犀角蘇子湯 即蘇子降氣湯去甘草大棗桂心生

姜加犀角沈香檀榔

旋覆代赭石湯 未考

降毒犀角飲 未考

七石鎮氣散 即金匱風引湯去桂枝

天台烏藥散 聖惠方懷香散懷香子苦楝子  
檳榔木香青橘皮本事方治小腸氣不可忍者友  
烏藥良薑苗香青皮 按此蓋合此二方名天台  
烏藥也

加味蒼柏散

即醫學子入門加味蒼柏散

防已飲

即壽世保元防已飲

當歸粘痛湯

即蘭室秘藏粘痛湯去人參茵陳

大犀角湯

即千金大犀角湯去香豉大棗桂

心加大豆麝香

小犀角湯

即千金犀角麻黃湯去桂心

麝香利水

三浦茂樹曰風毒脚氣ノ證寒熱微ニシテ周身腫

滿シ小水赤澁大便秘結シ脚膝痠急シ或ハ膝骨

熱痛其脉浮數膻中微動アリテ精神恍惚トシテ

爽ナラス腹脹スルモノハ上下ヨリ水脉ヲ閉塞

シテ血中ニ併セント欲スルノ疝ニシテ水道ノ

閉塞甚キモノ也膻中微動アルモノハ衝心ニ近

シ急ニ此湯ヲ與ヘテ小水ヲ通利スルニ宜シ此

疝外表ノ閉塞輕ク下部水道ノ閉塞重シ加味蒼

柏散或ハ當歸粘痛湯ノ疝ヨリ來テ此疝ニ至ル

コト多シ内ヲ利シ表ニ發シテ寒熱去リ遍身腫

満スルコト有リ、大犀角湯ニ轉シ、一時ニ水ヲ通  
利スルニ互シ、大犀角湯方、犀角、白木、防己、黃芩、  
陳皮、茯苓、大豆、前胡、蘇莖、紫蘇、桑白皮、生姜、麝香、右  
十三味煮方前方ニ依ル、水三合ヲ以テ煮テ分  
半ヲ取リ去テ分  
合ヲ温メ、一  
合ヲ服ス其方意ニ於ルヤ、犀角、動脈中ノ濁氣ヲ  
降解シ、防己、白木、茯苓、桑白皮、生姜、外表ニ在ル外  
ノ濁水ヲ下シ、水脈ノ閉塞ヲ利ス、大豆ハ其垢ヲ  
流ス、陳皮、蘇莖、紫蘇、經脈ノ閉塞ヲ通利シ、前胡、黃  
芩、鬱熱ヲ清解シ、麝香ノ芬芳香發ヲ以テ、下部ノ  
閉塞ヲ開キ、諸藥ヲ導テ、水道ヲ利ス、是ヲ立方ノ  
本旨トナス、此疴ニ誤テ、桂枝、麻黃ノ類ヲ以テ、コ

レヲ發汗スルトキハ、小水益不利シテ、終ニ衝心  
スルニ至ル、慎ムヘシ、恐ルヘシ、脚氣新論

按ニ大犀角湯、千金方七卷ニ出、以即本方中香  
豉、大棗、桂心ヲ去テ、大豆、麝香ヲ加ルモ、人三浦  
氏ノ增損スルトコロ、本草ヲ攷ルニ、麝香利  
水ノ功ヲ云フ稀ニ、茲ニ古人用ルトコロヲ鈔  
メ、試用ニ備フ、

肘後方、水病之初、先目上腫起、如老蠶、色俠頭、  
千金卷廿一、外臺脈動、股裏冷、脛中滿、按之没指、腹  
卷二十、頭作腫內轉側有節聲、此其候也、不即治、須臾身體稍腫、  
肚盡脹、按之隨手起、則病已成、猶可為治、此皆從

虛損下別提大病或下痢後婦人產後飲水不即消三焦受病小便不利乃相結漸生聚遂流諸經絡故也治之方雄黃六分麝香三分甘遂芫花人參各二分搗蜜和丸服如豆大二九加至四九即差卷四治卒大腹水病第二十五

千金方治水腫利小便酒客虛熱當水飲冷水腹腫陰脹滿方當陸四兩甘遂一兩芒消吳茱萸芫花各二兩右五味末之蜜丸服如梧子飲服三九日三一方有大黃芫花各二兩無茱萸加麝香猪苓各一兩卷廿一

又治婦人短氣虛羸徧身浮腫皮膚急人所稀見

麝香散方麝香三銖雄黃六銖芫花甘遂各二分右四味治下篩酒服錢五七老小以意增減亦可為丸強人小豆大服七九

小品麝香療水腫方麝香三銖芫花三分煎甘遂三分右三味合下篩酒服錢半邊七老小錢邊三分七亦可丸服之強人如小豆十九丸老人五丸注

金有雄黃一味并麝香各用六銖肘後又有人參二分卷廿一

和劑局方調經散治產後敗血乘虛停積於五臟循經流入於四肢留滯日深腐潰如水漸致身體面目浮腫又治產後敗血上干於心不受觸致心煩躁臥起不安如見鬼神言語顛倒並互服之方



藥赤者沒藥別研肉桂去麻皮琥珀別研當歸去  
苗各壹兩麝香別研細辛去苗各半兩右為末入  
研藥勻每服一錢溫酒入生薑汁少許調勻服大  
抵產後虛冷醫人不識便作水氣治之凡治水氣  
多以導水藥極是虛人夫產後既虛又以藥虛之  
是謂重虛往往因致枉夭但服此藥血行腫消即  
愈醫方類聚二百三十四引云簡易方濟壽察友王  
氏自驗方同六十三方類聚又引濟生方皆見  
大全良方醫方集成等互有異同今不具錄劉  
君觀聚方引產育寶良集九十四方

赤小豆煎

賀古恬菴曰赤小豆煎脚氣疝脹產後腫滿水腫脹  
滿不論虛實喫之皆有驗實濟生奇劑芫花大戟各  
八分桑白皮一錢葶藶子一錢二分商陸二十錢生  
薑五錢赤小豆一合右七味以水八合先煮六物取  
四合三夕去滓內赤小豆更煮令熟一日一夜喫盡  
禁忌千金方云喪孝產乳音樂喧戲并一切魚肉生  
冷醋滑蒜粘食米豆油并須戒忌三年慎之永不復  
發不爾者雖愈必復發不可更治也余友橘春菴  
阿波勝瑞村人善醫特善治腫滿起死回生歲以百數余所  
親耳目也乃懇請受其奇方乃赤小豆煎也後周遊

四方過尾州名古屋時一男子患腫滿命懸旦夕諸醫束手余欲與往昔所受于橘氏之方以救之失其方書益為人所奪也深以為憾苦思終日遂作此方與之十有餘日病脫然復故爾後活幾十人皆用此方凡病水腫者喫之如法則無不有神効者若不可起者則必不能喫之也文化某年余歸舊里偶會春菴言及此話質以此方則與其所傳大同小異後數旬書報曰以兄方試諸數十人十舉十全比之舊方效最速矣奇生方

奇生方一卷文政中阿波人賀古恬菴壽所著其人屬東洞派故不取陰陽五行是當時之習氣耳但其論徃有可取者學者當一讀友人平原玄道屢稱書中赤小豆煎有效因載于斯

此方治大腹水腫氣息不通命在旦夕者友牛  
 黃二分昆布海藻各十分牽牛子桂心各八分葶  
 藶子六分椒目三分右七味末之別搗葶藶如膏  
 合和丸之如梧子飲服十九日二稍加小便利為  
 度大良正觀九年漢陽王患水醫所不治余處此  
 方日夜尿一二斗五六日即差差後有他犯因爾  
 殂矣計此即是神方注崔氏云蜜和為丸蜜  
 子金治水腫一方

千金治水腫一方

附雞峯方神助散

吉田良獨醉醫談禹功散治水氣滿腹有息煩悶者  
 牛黃昆布海藻牽牛子桂心葶藶子椒目吳茱萸右  
 為末以白湯送下一錢

千金方治大腹水腫氣息不通命在旦夕者友牛

黃二分昆布海藻各十分牽牛子桂心各八分葶

藶子六分椒目三分右七味末之別搗葶藶如膏

合和丸之如梧子飲服十九日二稍加小便利為

度大良正觀九年漢陽王患水醫所不治余處此

方日夜尿一二斗五六日即差差後有他犯因爾

殂矣計此即是神方

注崔氏云蜜和為丸蜜

子金治水腫一方

按吉田氏禹功散依孫真人方加吳茱萸一味者豈別有所得耶抑不知而錄之耶何不檢之千金也

雞峯方神助散仁宗賜名治十水之病四肢面目俱腫喘急不得卧小便澁腹中氣滿葶藶參兩黑牽牛貳兩半木猪苓水浸軟切去黑皮焙澤瀉各壹兩椒目壹兩半右為細末先以葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒半盞調藥三錢絕早面東服如十行十里以漿水葱白煮稀粥至葱爛入酒五合熟啜量入啜一升來不得喫塩并麵自平旦服至日午當利小便三四升或大便喘定腫減七八

隔日再服既平之後必須大將息及断房室等三年孫兆父子常進卷十九

又勝金煎治大腹水氣背刺喘急自不能通牛黃昆布海藻各貳兩半牽牛貳兩桂壹兩冷者加作貳兩甜葶藶參兩椒目壹兩右為細末煉蜜和元梧桐子大每服二十粒食前未飲下日三漸加至四五十粒日三四以水利為效尋常些小發動覺氣促疾盛夜卧不安數服見效卷十九

又海藻元治諸水病者不可頓取令便下其水盡其後再發必便困敗三分利之一分立便断塩醬諸酸膩滑淡食經旬日後患者氣稍調則更利之

校与較同

如是三度服藥將養以校為度緣先以脾熱克腎  
號土水相尅也脾土既病下尅於腎水氣不收故  
成其疾也范汪曰脾胃為表裏胃為水穀府胃虛  
不化水穀氣海溢而經絡閉故患者大便小便不  
通寒之氣扇於脾而脹矣主水病坐臥喘急海藻  
昆布黃牽牛子各拾兩葶藶拾貳兩椒目桂各肆  
兩牛黃貳兩右為細末煉蜜和元如梧桐子大每  
服二三十元橘皮湯下同上

宣明論葶藶膏治水腫腹脹生黃廕射杏龍腦各一分  
昆布海藻上同三分洗牽牛桂心各八分椒目三分葶藶  
六分炒右為末別搗葶藶熬成膏丸如桐子大每服十  
九日再服稍利小便為度詳虛實加減卷八 按此方千金方中  
更加廕射杏龍腦

平四篇鳥鼠曰後世躬ツカラ良法ナリト試シテ徳カ入殊更ニ岐衢ニ就テ人神  
ノ医道ノ淵源ヲ念ヒ術方藥ヲ漸ニ艱難ナラシメ遂ニ西洋風ノ小智ヲ振ヒテ

馭西洋醫

大田錦城曰醉荷蘭夷學者不知疾病亦天地神氣

剖體尋之同于斷木尋花獨醉醫談叙醫談吉田  
良所著

劉君標陰曰近世斯邦醫家亦好剖解驗以荷蘭內

景書頗極精微然有益於外科而無裨於內科矣醫

卷上

劉君蒞庭曰按岐伯有異法方宜論而五常政大論

辨高下温涼之異自來諸家所說其意大約相同仍

不繇引夫 皇國六千餘里之幅員西海北陸其藥

猶不無斟量而今之醫有篤信龜馬絕域之術以欲

療此地之人者惑矣哉性年琉球信使來朝時方寒  
來從者頗病彼醫守其國套

馭西洋醫

迂拘ナ方藥ヲ神  
トモ神ト信ヲ窮ニ其  
方論ニ拘ミタルヲ數  
醫共世ニ多ク殖  
蕃テナリ將テ八思ハ  
シキニラシ所以禮ノ  
數醫ヲ豈知ラム  
ヤ方法ヲ巧夫ノ極  
ムレ然レ世ト共ニ病狀  
ヲ夕信ニ難ク生  
スル理ノ抑ル事ヲ今  
此真理ヲ本ハ事  
長キカ上ニ容易ケレル  
此云不別ニ論フ  
景書考

時還讀我書續錄、西洋ノ醫シ何カト、崎奥ニ寓セシ時、  
筑前ノ樂善老侯、適職ニ在テ、彼地ヲ巡見ス、渠ニ問ニ醫術  
ノ極意ハイカニヤ、倘子ヲシテ此國ノ人ヲ治療セシメ、何カナル法  
方ヲ施スベキヤトアリシカ、其對ニ亞細亞ハ亞細亞ノ治術ニテ  
サレハ病ヲ已ス、アタハス、歐羅巴ハ歐羅巴ノ方藥ニテアラサレハ、效ヲ  
得ル、アタハス、印度地方ハ佛經ニ載ク、トヨノ論說ニ本タルコソヨ  
ロシケレ、醫ノ術ハ自其風土ニ隨ミ、人ニテ、彼此相通スベキ者ナラス、  
是其極意シトイヘリ、シト、老侯ノ語スレシ、渠カ醫理ニ精メ、  
固執心ナキハ、誠ニ貴フヘキトニコル

必為風  
義卷一  
讀ム嘗テ  
コ口定處  
ハ符合ス  
其處ヲ異  
表ノ差アリ  
ト、時還讀  
我書卷

山下玄門曰、當今世  
間ニ流布スル蘭醫  
ノ内科ヲ見ルニ、去年  
ニ今年、今年ニ去年  
ハ、タシク藥品モカワ  
リ、且、病人ニ五種モ  
種モカスリ、アタハス  
ハ元ヨリ治療ノ驗、  
解ソナワラサル故ナリ、殊更漢醫ノ手ニ治セサル病ハ、彼ガ手ニ治シタルヲ  
見ズ、但、外治ノ手術ハ、良奇ナルトモ、粗見及ベリ、其中無益ノ事モ少カラス、俗ニイフ

先友同僚藤崎東陽嘗テ西洋ノ内景ヲ究テ疾  
大病ノ因ヲ説ク、トヲ論メ曰、夫死物ヲ觀テ、病ノ  
活物ヲ論スルハ、既ニ死活ノ相違アリ、是ヲ木

令見於為人ノ手段尤多シ、全躰煎藥方ハ、蘭醫ノ行ハサルコトナルベキ、内科選要ハ、ジメ  
テ梓行ノ節、一切見ヘサルニモ、知ラルベシ、後廿餘年ヲ經テ、煎藥法ノヲコリシハ、全  
日本醫師ノ作ル  
コトアキラケシ、又漢  
醫方ニテ生立シモ  
ノ、蘭家ニ歸入ス  
ルハ、遠キヲ信シテ、  
近キヲウツシスル  
世情カツ、漢方ニ熟  
セサル人ノナスト、コ  
ナリ、憐レハ、レ、又、蘭  
家ニ生タチシ人ハ、  
漢方ヲ塵芥トシ、ト  
ク言ナスハ、知ラスシハ、  
ソシルヘカラスト、テ、取  
ニタラサル所ナリ、古先  
聖王ノ徳和ヲ、ヨツ  
テ、治ル御世ノ録ヲ  
食人ニシテ、テ、ク、  
方ヲ嘲議スルハ、正シ  
ク無倫ノ言ナレバ、更  
ニ取ハカル所ナキコト、  
ヲ待ヘカラス、讀神

ヲ剖テ、花ノアリカヲ尋ルニ、譬言フ、窮理ニ似テ、  
畢竟空理タルトヲ免レズト、此説大田氏ノ言  
ト合ス、又先友伊澤柏軒曰、西洋家ノ窮理ト云  
ハ、實ハ窮理ニハアラス、窮理實ナリ、

劉君柳泚曰、近時醫家或信西洋體療之說者、余每  
嘆其術不唯於世無裨、而受害者不數、偶見古人論  
及西術者、因記于此、朱錫鬯定歷王衡序曰、西洋之  
學、溺于數之内、而不能出于理之外、傲人以所不知  
錢曉徵與戴東原論婺源江氏推步之學、書曰、江氏  
大率祖歐羅巴之說、引而伸之、其意頗不滿於宣城、  
而吾益知宣城之識之高、何也、宣城能用西學、江氏

法專施辛温斃者甚多然則入地鄉必為風  
土所移亦不可不知也  
又曰加藩ノ大高元哲好テ西洋ノ書ヲ讀ム嘗テ  
語リシニ癰疽ノ類ハ大抵其發スルトコロ定處  
アリ此方ノ人ノ病トコロ唐山ノ説トハ符合ス  
レト西洋ノ書ニイヘルトコロハ悉ク其處ヲ異  
ニスト此一事ニ就テモ彼我ノ病霄壤ノ差アリ  
テ治法モ取用カタキヲ知ルニ足レリト  
我書卷  
上

先友同僚藤崎東陽嘗テ西洋ノ内景ヲ究テ疾  
大病ノ因ヲ説クヲ論メ曰夫死物ヲ觀テ病ノ  
活物ヲ論スルハ既ニ死活ノ相違アリ是ヲ木

下玄門曰當今世  
間ニ流布スル蘭醫  
ノ内科ヲ見ルニ去年  
ニ今年今年ニ去年  
ハタシク藥品モカワ  
リ且病人ニ五種セ  
種モクスリヲアタラ  
ハ元ヨリ治療ノ驗解  
見ス但外治ノ手術ハ  
良奇ナルトモ粗見及  
ベリ其中無益ノ事モ  
少カラス俗ニイフ

今見於為ノ手段尤多シ全躰煎藥方ハ蘭醫ノ行ハサルコトナルベキハ内科選要ハジメ  
テ梓行ノ節一切見ヘサルニモ知ラルベシノ後廿餘年ヲ經テ煎藥法ノヲコリシハ全  
日本醫醫師ノ作ル  
コトアキラケシ又産  
醫道クニ生立シモ  
ノ蘭家ニ歸入ス  
ルハ遠キヲ信シテ  
近キヲウツスルノ  
世情カツ漢方ニ熟  
セサル人ノナストコ  
ナリ憐ムヘシ又蘭  
家ニ生タチシ人ハ  
漢方ヲ履キテト  
ク言ナスハ知ラスハ  
ソシルヘカラスト取  
ニタフナル所ナリ吉  
聖王ノ徳和言ツ  
テ治ル御世ノ録ヲ  
食人ニシテソノ醫  
方ヲ嘲議スルハ正  
ク無倫ノ言ナレバ  
ニ取ハカル所ナキ  
ヲ待ヘカラス

ヲ剖テ花ノアリカヲ尋ルニ譬言フ窮理ニ似テ  
畢竟空理タルヲ免レズト此説大田氏ノ言  
ト合ス又先友伊澤柏軒曰西洋家ノ窮理ト云  
ハ實ハ窮理ニハアラス窮理實ナリ  
劉君柳泝曰近時醫家或信西洋體療之説者余每  
嘆其術不唯於世無裨而受害者不數偶見古人論  
及西術者因記于此朱錫鬯定歷王衡序曰西洋之  
學溺于數之内而不能出于理之外傲人以所知  
錢曉徵與戴東原論婺源江氏推步之學書曰江氏  
大率祖歐羅巴之説引而伸之其意頗不滿於宣城  
而吾益知宣城之識之高何也宣城能用西學江氏





方の二が三教師に  
 未だ注釈しかく  
 ひと通りを  
 のはふに活生の術  
 あまよひと信  
 うきやたけりて  
 凡そしるゝる  
 木しれりて  
 うきやたけりて  
 もすゝるひめ  
 さる小をりける  
 好む似たりは  
 同主なる  
 の人あはんと  
 いかやあはんと  
 つたりさすの  
 伝をなやせり  
 うきやたけり  
 とて治療といは  
 うきやあはんと

日本ハ日本ニ事足ハ死古ハ長壽ノ人多ク有  
 之。昨今ハ漢蘭之長をろし大抵傳來ハ何事し  
 之。支ハ有之乃成。一昨ハ蘭學のみちハ右國  
 之交易ニ至ハ害のみまで益少キ存存ハ一切  
 小制禁マてハ存存ハ。  
 天保九年水府公  
 獻策記

昔のことは  
 をとくむ  
 はせと  
 ちりひ  
 とて丁の車  
 るハ人  
 けをし  
 たりて  
 卷五

人をしての  
 うきやあはんと

醫道

醫道ハ至精至妙之術ニテ一朝一夕ニ  
 學得ヘキニ非サレハ幼弱ノ頃ヨリ  
 其道ニ入り研究イタシ候ハ固ヨリノ  
 事ニ候得共其際彼ノ長ヲ取リ此短ヲ  
 捨虚心平氣ニアテザルヨリハ往々短  
 ヲ掩ヒ長ヲ嫉ム事俗情ノ常ニテ修  
 ノ大意ヲ失フ事アルモノシ當時洋學  
 者解剖究理精密ニテ日新ノ治療甚盛  
 ナリ就中外治ハ異表ニ出ル事屢見聞  
 不ル處シサレドモ元來精妙之術ナレ  
 ハ内科ニ至テハ漢洋互ニ得失ナシト  
 セ不況ヤ傷寒脚氣ハ漢方ニテモ回天  
 之功ヲ奏スル事比々有之是十日ノ所

俗人の食えとせぬハ

絶親法

醫道ハ至精至妙之術ニテ一朝一夕ニ  
 學ビ得ヘキニ非サレバ幼弱ノ頃ヨリ  
 其道ニ入り研究イタシ候ハ固ヨリノ  
 事ニ候得共其際彼ノ長ヲ取リ此短ヲ  
 捨虚心平氣ニアラザルヨリハ往々短  
 ヲ掩ヒ長ヲ嫉ム事俗情ノ常ニテ修  
 ノ大意ヲ失フ事アルモノニ當時洋學  
 者解剖究理精密ニテ日新月异ノ治  
 療甚盛ナリ就中外治ハ異表ニ出ル  
 事屢見聞ナリ處ニサレドモ元來精  
 妙之術ナレ厚味ノ  
 小別テ内科ニ至テハ漢洋互ニ得失  
 ナレセ不況ヤ傷寒脚氣ハ漢方ニテ  
 天經ル病  
 之功ヲ奏スル事比々有之是十日ノ所  
 見一箇ノ私論ニアラ不固テ考ルニ漢  
 洋並存シ人ノ信不信ニ任セ其趣向ヲ  
 壓スル事無ンハ却テ濟生ノ鴻益鮮カ  
 ラサレバ心欤ト覺申候就テハ漢醫ハ漢書  
 ニテ勅勵イタクシ候ハ乍恐  
 天朝救民之御仁政ニモ戾リ不申候ト  
 奉存候也意御採周ニ相成候様奉懇  
 願

明治十二年二月

利者若十人 在在府ん出、まゝし易也  
 出る者



方の三治三治師よく  
未考注釈しよくある

月六日日本事足い死古へハ長壽の人多く有

見一箇ノ私論ニアラ不困テ考ルニ漢  
洋並存シ人ノ信不信ニ任セ其趣向ヲ  
壓スル事無シ却テ濟生ノ鴻益鮮カ  
ラサル歎ラ覺申候就テ漢醫ハ漢書  
ニテ勸勵イタク候ハ、乍恐  
天朝救民之御仁政ニモ戾リ不申候哉ト  
奉存候 世意御採問 相成候様奉懇

明治十二年二月

利名と人 古事本府ん出、あし思成

學曰醫人の非ニ非ニハ一障一ニ  
醫術ハ、三昧至極ニハ一障一ニ

小川顯道塵塚談曰、断食して茶と和らする、釋迦の病を療する法は七日断食して茶  
とのみをする、は生れ死の境に在り、其の佛經に死るふとくや、今も律僧の言に

**絶穀法**聖善五反胃瀉毒禁食水飲法  
相參參看

津田玄仙曰、凡胸痛ノ證其主藥ヲ與ヘテモ治セ

ス、縱令治シテモ、又幾度モ打カエシテ治セ又病

人アリ、其時ニハ必食餌ヲトフベシ、厚味ニ忌ル

魚鳥ヲ食シ、其病邪ヲ助ケテ治セヌアリ、ソレ

ナレハ急ニ厚味ノ物ヲ禁スベシ、ヨシサウナク

凡此忘ノモツレタルニハ、二日モ三日モ、厚味ノ

モノハ勿論穀食ヲモ絶シメテ療治スヘシ、コノ

通ニスルト、藥ノ効早く立テ、半年ハカリ經ル病

苦モ、一時ニ治スルコトアルモノニ、予カ經驗甚多

シ、蓋此義乾霍亂ノ證ニ穀ヲ入ル、コトナカレ、若シ  
絶穀法

俗人の食さるも七  
人ハ用カハ、予數  
効驗トシ、予數  
氣湯トシ、絶食  
小別テ、予數シテ  
積聚區區の病  
傷寒之淋瀝腹痛  
の療治ニ、痢病食  
より、証病不最上

仕多しもの心口を不  
 食の病人小強者へ  
 我進むとけて婦人  
 ハ多理多神小食せし  
 もいをも介抱と思ふ  
 ことひつとこ又俗人  
 ハ多を好む病人ハ  
 少のを好むとさるる多  
 し然る小少をともめ  
 て却るをりあ命を  
 失ふる少くも吃早  
 妙のちあふふ計飲  
 ておる系乃ハ完全  
 使を多し多し張  
 仲景水と飲んと欲  
 せむあふふを  
 なる一しとひ又新  
 汲水とせ然の自虎  
 湯とせ小なる一し  
 中草本とくたり世怪のあふふ皆害小あふふ多しとけりハ文化中人

些少ノ食咽ニ下レハ忽死スト云戒アリ本ヨリ  
 穀ハ人命ヲ養フ靈物ナレバ邪實中滿ノ證ニハ  
 反テ其中州壅塞ノ邪ヲ助テ天地否絶ノ遂ニ死  
 證トナルノ義トヒトシスヘテ胸痛ノミニ限ラ  
 ス胸脇ヨリ腹部ヘカケテ邪實有餘ノ證其外嘔  
 吐反胃膈噎痞滿食鬱等ノシモツレタルニハ此法  
 ニ從テ治ヲ施スヘシ其利甚著ルシサテ右ノ諸  
 證其キニ至テハ七日ヲ限テ食ヲ絶シムヘシ其  
 中ニ病人空腹ノ心アルハ必其病愈ニトスル下  
 地ノ吉兆ナリ然レバ食餌ハムサト与フヘカラ  
 ス其時老黃米一兩人參五錢陳皮二錢右ノ三味

ヲ調合シテ水煎シ本病ヲ治スル煎劑ト別ニニ  
 煎シワケテ掛合ニ用ベシコレガ食餌ノ代リニ  
 ナル若病人空腹ニナイト云フウチハヤハリ此  
 方モ用ヒズ食ヲ絶シムルガヨシ又定メ七日ヲ  
 モスキ十日十五日ヲヘテモ食氣ナクシテ空腹  
 ニナラヌハ極テ死證ナリ老黃米トハ俗ニ云ヒ  
 子粟ノコトニ是モ三年餘ヲヘタル品ヨシ人參ハ  
 其邪氣ノ多少ヲ見テ宜キニ從ベシサテ病人イ  
 ヲク快ナルニ隨テ空腹モ次第ニツノル其時ハ  
 粥ヲウスク煮テ少シツ、與ヘシ右ノ方モ醫宗  
 必讀ノ反胃門ノ末ニ出タル方ナリ即コノ方前

經法詳見于太田無聲研  
論可參證

見亦東坡與孫運司  
論可參證

ニモ凡反胃ノ證藥ヲ得テ愈ルモノ最ハ愈ルガハ  
切ニ粥飲飯ヲ与ヘカラズトアリ予コノ方ヲ  
得テヨリ愚案ヲ廣メ右ノ諸證ニ施シ人ノ難治  
ノ痛苦ヲ救ヒ起シタルヲ甚多シ療治茶談  
南海傳云若覺四候乖舛即以絶粒為先醫心方  
病大體引

南海傳云若覺淡飲聞胃口中唾數鼻流清水糲  
糲咽閉戸滿槍喉語聲不轉飲食之味動歷一旬  
如此之流絶食便羸不勞灸頂無假據咀斯乃不  
御湯而能蠲疾即醫明之大規矣同卷九治淡  
飲方第七引

劉寄奴

和田東郭曰劉寄奴本草家乙切草ヲアツル説ア  
リ又ハンコン草秋ノキリシ草ヲ劉寄奴ニアテ  
オトキリ草ヲ小連芫ニアツルノ説アリイツレ  
カ是ナルヲ知ラスコレヲ試ルニ乙切草効アリ  
故ニ乙切草ヲ用ユ導水瓊

又曰脚氣冲心治シテ後小腸疝瘕有テ下焦ノ氣  
メクテス痿弱麻痺久ク愈サル者アリ是千金附  
子湯八味丸等ノ疝ニ非ス其脉腹ノ虚實ト疝瘕  
トヲ能ク候ヒテ寄奴湯ヲ用ユヘシ若心下痞鞭  
脇下逆滿等ノ疝ヲ兼ハ呉茱萸牡蠣乾姜ナトヲ  
劉寄奴

加フヘシ。寄奴湯方、木桂枝、茯苓、柴胡、劉寄奴、

甘草、本無甘草、今加之。右水煎、同上。

又曰、一貴人ノ簾中、春秋四十歳、一疾ヲ得ラレテヨリ、既ニ十八年ニ至ル、其間唯一醫ノ藥ヲ絶ズ服用セラル、其醫ノ進ル處、悉皆輕浮ノ氣劑ノミ也、然ノ其症ハ、頭痛、頭眩、鬱冒シテ、席上ヲ歩行セラル、一モ成リカタク、コレニ因テ、面モ細長ク瘦ラレテ、皺ツキ、血色ヲ失ヒ、脛ナトモ骨立チ、既ニ十年來ハ、夕ヘテ經行ナク、右臍傍ニ疝塊アリ、テ、脇肋ノ下甚拘攣ス、予即四逆散ニ、良姜、牡蠣、劉寄奴ヲ加ヘタルヲ用、風市三里三陰交ノ辺ヨリ

初テ、段ニ日ゴトニ灸火ヲ施ス、其間時ニ小故アリト云ヘ氏、始終轉方セス、乙卯初冬ニ至リ、未夕

期年ナラサルニ、脇腹大ニユルニ、肌肉長ノ無病ノ時ノ如ク、頭眩、鬱冒等ノ諸腦、一洗スルガ如シ、

即初冬ノ日、院參多ノ時ニ至テ、初テ少シク月使ノ至ルアリ、此等ノ處ハ、理氣湯ナドニテ經行ヲ順

ニスルモノトハ、腹候大ニ相違アルコトナリ、蕉窓雜話

又見 三編ハナ

劉寄奴ハ、スベテ疝ノ腹裏ヲカラムヲヨクユルメルモノ也、ユヘニ総メ疝ヨリ出タル病ニ用ユ、此物古來ヨリ、トカク血分ノコトニヨク用テアリ、

此物ヲ用覺タル其モトハ、或家ノ傳方ニ、劉寄奴  
大甘艸少、二味ノ藥ヲ疝ニ用ヒ、妙ニ治驗アリ、予  
此方ヲ得テヨリ、色ニ作畧ノ用ルニ、其効驗日ニ  
新也、先陰囊へ強ク脹モノナド、或行氣香蘇散又  
ハ三和散ナドニ、茴香川棟子ノ類ヲ加ヘ用ル場  
合ナドヘ、四逆散或抑肝散加芍藥ノ方等ニ、劉寄  
奴ヲ大ニ加ヘ用レハ、奇効ヲ奏スルヲ甚速ナリ、  
勿論劉寄奴ハ、莖葉花實ニ刺ニ用ルヲナリ、

同上抄

又曰、一婦人乳及背ニ流注毒アリテ、甚憔悴シタ  
ルカ、一日左脇肉大ニ痛ヲ發シ、皮肉ノ中、鎗ニテツ

カル、如シサレハ腫物ニナルベキ容子ナドモ  
見ヘズ、又ザクザクト痛ニテハナシ、右ニ因テ、少  
シモ起臥スルヲ能ハズ、小便頻數、身ニ寒熱アリ  
テ絶食ニ困苦コ、ニ極ル、予コレヲ熟診スルニ、  
左臍旁一ノ疝塊アリテ、ヨクコレヲオセバ、醫へ  
ツキヌク如シサレハスベテ腫ル、コナシ、故ニ  
四逆散ニ、吳茱萸牡蠣劉寄奴ヲ加タルヲ用ユ、三  
日ニメ、ホツクリトユルニ、諸疝失スル如シ、唯其  
流注ノ毒未ダ全ク愈ガルノミ也、此氣味合ノ病  
人甚多キモノニテ、其持カ、シリノ疝ニ拘ルナハ、  
必誤ルモノ也、カヤウナル病人ハ、ヨク彼此ヲ引

合セ見レハ、腹脈言語精神ナドハ、苦ム處ヨリハ  
ヨキモノナリ、肝氣ノ所為ニ因ル者ハ、兎角極虚  
ノ如ク見ヘテ、思ノ外ナルアリ、又實ニ極虚ノ病  
人ニ至テハ、彼此引合セテ、筭用ノ合ヌハ、甚恐ル  
ベシ、同五編

小兒生レ立ヨリ、陰囊偏墜スル者ハ、先天ノ毒強  
キ故、治シ難シ、夕トヒ生レ付ニテ、十クハ、幼年ノ  
内ニテ、イマダ腎元ヲ損ズルコトモナキニ發スル  
ハ、ヤハリ先天ノ毒強キモノユヘ、治シ難シ、サレ  
ド大人ト違ヒ、未陰陽ノ道ヲ知ズメ、下元ヲ損セ  
サル故、毒ハ強クテモ、反テ治ヲナシ易キ場モア

・モノ字ヲ脱スルカ

ル也、何レニ偏墜シタルモノナドハ、劉寄奴入ノ  
劑ナドニテ、裡ヨク取アツカウベシ、サレド又偏  
墜シテ居テ、其上ニ皮膚瘰癧メ、搔ケハ疹ヲ發スル  
疔モアル者ナドハ、先其胎毒ヨリスルヲ先手ト  
ス、馬明湯ナド用テ、胎毒サハケレバ、其拍子ニ疔  
モサハケルコトアリ、同上

本草黒字、劉寄奴草、味苦温、主破血下脹、多服令  
人痢、生江南、證類本草卷十一

唐本注、今按別本注云、昔人將此草、療金瘡、止血  
為要藥、產後餘疾、下血、止痛、極效、同上  
日華子、劉寄奴無毒、治心腹痛、下氣、水脹、血氣通



婦人經脉癥結止霍亂水瀉同上

圖經六月七月採苗花子通用也同上

經驗方治湯火瘡至妙劉寄奴搗末先以糯米漿雞翎掃湯著處後搽藥末在上並不痛亦無痕大凡湯著處先用塩末搽之護肉不壞然後藥末傅之同上

本草綱目劉寄奴附方集簡方大小便血劉寄奴為末茶調空心服二錢即止千金方折傷瘀血在腹內者劉寄奴骨碎補延胡索各一兩水二升煎七合入酒及童子小便各一合頓温服之衛生易簡方血氣脹滿劉寄奴穗實為末每服三錢

酒煎服不可過多令人吐利此破血之仙藥也

聖濟總錄霍亂成痢劉寄奴草煎汁飲本事方

湯火傷灼與證類所載經驗方畧同故不具錄聖惠方風入瘡

口腫痛劉寄奴為末搽之即止聖濟總錄小兒

夜啼劉寄奴半兩地龍炒一分甘草一寸水煎灌

少許艾元英如宜方赤白下痢陰陽交帶不問

赤白劉寄奴烏梅白薑等分水煎服赤加梅白加

薑以上並見綱目卷十五

附蘭山劉寄奴說此說東瀛ト異今攷證ノ為ニ載ス

ヲトギリ草金瘡ヲ療スルノ効相似ルヲ以テ

古來劉寄奴ニ充ルハ大ナル誤ナリヲトギリ

草ハ小連翹ナリ本草啓蒙卷十一 劉寄奴草

ハハハゴニサウ子アサ州 タツミアカ

リ、花戸蘇頌ノ説トコロノ劉寄奴草ハ俗名キ

ンクハ一名アキノキリンサウナリ時珍ノ説

トコロト同シカラズ同 鱧腸集解小連翹ハ

ヲトギリサウ此草山野ニ多シ同卷十二 連

翹集解頌曰南方生者云コレ小連翹ニメヲ

トギリサウノコナリ翹上連

按ニ綱目卷十六濕草下鱧腸集解連翹集

解並ニ小連翹ノ名アレ其功能ヲ言ハズ疑

ハ連翹ト功同キ歟

和東郭曰腫狀脈狀大抵多消湯ニ類シテ心下覆蓋如ク痞鞭最甚シク緩ニ身ヲ動搖

用崔氏療脚氣方近世編 及蘇恭防已湯訣本集

和東郭曰黑豆湯ハ先黑豆ハ消導ノモノニテ

心胸ノ間ヨリ胃中ヘ向ケテ滯ル處ノ水飲ヲ推

シスカシ桑白ハ胸中ノ水飲ヲサバキ楨榔ニテ

心下ヨリ下ヘクツトラス也何レ此方ハ心下ヲ

推シスカスカヲ專トス故ニ心下ノ候大柴胡湯

志ノ心下ノヤウナル氣味合ナリ三蕉癒雜誌

劉君直庭曰蘇恭防已湯ハ面部腫アルモノニワ

ケテ宜キニ似タリ

清川吉人曰木防已ハ曾中ニ水氣ノ凝結シタル

モノニアラザレハ效ナシ按ニ全覆木防已湯ノ

用崔氏療脚氣方及蘇恭防已湯訣

和東郭曰腫狀脈狀大抵多消湯ニ類シテ心下覆蓋如ク痞鞭最甚シク緩ニ身ヲ動搖  
スレハ氣息逼迫ス  
ルモノ是水モツラ心  
下ニ結取スル他  
藥ニテ救フヘキ者  
ナレ外臺黒豆湯ヲ  
用ニレ此若下ノ診  
後ノ書ストコ若腹  
滿減シ難キ者ハ三  
聖丸ヲ兼用スルモ  
ヨレ若脇下ヨリ水氣  
上衝スルヲアラハ木  
柴丸ヲ兼用スレハ三  
四錢目ヨリ五六錢  
目ニ至ル或方中ハ  
柴萸ヲ加ルモ亦可  
也

看參當湯豆卷

ベシ味

又曰蘇恭防已湯ヲ水氣ニ用ルニハ心下ムツクリ  
ト高く膨脹スルヲ目アテトスヘシ凡黑豆ヲ用  
ルニハ皆此心持ニテ用ユベシ

本草  
目録  
四  
五  
六  
七  
八  
九  
十  
十一  
十二  
十三  
十四  
十五  
十六  
十七  
十八  
十九  
二十  
二十一  
二十二  
二十三  
二十四  
二十五  
二十六  
二十七  
二十八  
二十九  
三十  
三十一  
三十二  
三十三  
三十四  
三十五  
三十六  
三十七  
三十八  
三十九  
四十  
四十一  
四十二  
四十三  
四十四  
四十五  
四十六  
四十七  
四十八  
四十九  
五十  
五十一  
五十二  
五十三  
五十四  
五十五  
五十六  
五十七  
五十八  
五十九  
六十  
六十一  
六十二  
六十三  
六十四  
六十五  
六十六  
六十七  
六十八  
六十九  
七十  
七十一  
七十二  
七十三  
七十四  
七十五  
七十六  
七十七  
七十八  
七十九  
八十  
八十一  
八十二  
八十三  
八十四  
八十五  
八十六  
八十七  
八十八  
八十九  
九十  
九十一  
九十二  
九十三  
九十四  
九十五  
九十六  
九十七  
九十八  
九十九  
一百

擇乳者法 附飲汁法出乳法

賀川子啓曰凡試乳之法先須注之於黑漆器上以  
視其色淡者為上濃者為下淡蓋血液所化居多濃  
乃穀味所化居多濃者其來不久而易止且以飲初  
生小兒性重滯必傷其胃不可不察其乳房捫之堅  
實若覆椀者為上垂下者為下凡乳來之長短常與  
經水相為表裏其兒已死者其乳易止而經來必早  
乳出久者其經或三四年不來古人云在上為乳在  
下為經者其言似不誣凡產後初出乳汁者勿與飲  
此蓋數日房中畜積之汁飲之必有害須要數回絞  
去之後始飲之為可凡乳婦其氣血不和煩則其乳  
擇乳者法

不出若其忿怒若勞心傷氣者必忽止又富貴之家  
買乳婦入門一二月徃徃忽止者人多謂之詐騙殊  
有不然者蓋其乳婦多卑賤平日家居時放縱恣性  
驟入貴第法度森嚴身不得自由氣因致鬱滯是以  
其乳頓歇不出耳此等事醫亦不可不略通其故者  
此并論之庭論翼乾

和田東郭曰乳相ヲ試ルハ先ツタレチハ惡シ  
甚垂レタルハ夏ナト乳汁クサリテ兒ニアタル  
モノ也 不相應ニ乳フサノ大ニメ穴一ツアル  
ハ必乳汁ナキモノ也屢試ルニ皆然リ 小サシ乳  
ト云モノ佳シ是ニ大サシ小サシアリ小サシト

云ハ大サラニ佳シ穴數十四五モアルハ最ヨシ  
免角サツサト乳汁ノ出ラ佳トス 乳ト乳ノ根  
ノ間行キ合テ其間ノスカヌハ根廣キ故佳シ  
ミチト云ハ甚見知リカタキモノ也此乳ハ最  
惡シ是ヲ漢文ニシテ見レハ名ケテ肉乳云ヘ  
キヤウナル者也至テ美シク青筋立テ佳キ乳ト  
見ヘテモトクトヒ子リテ見レハ肉脹ノアルモ  
ノナリ肉脹シテアル故皮肉ノ分ヲツマミ知カ  
タシ此乳ハ汁少キ故必其兒羸瘦スルモノ也佳  
キ乳ハ何ホト脹リテモ皮ト肉トハ知レルモノ  
也 又産婦ノ乳核起リカタキモノアリトカク

内へ引込テ表へ浮キカタキモノアリ。産后俄ニ乳汁ノ多ク出ルハ、暫時ニアカルモノナリ。三日モシテカラ、ソロソト出ルモノ佳ト知ルヘシ。雀窓雜誌五編廿九

又曰、乳汁通セサルモノ、格別ノ子細スラナクモ、只通ントメ通スルヲ能ワサルモノ也。総テ虚實ニ拘ラス、極上品ノ天花粉ヲ、葛糕ノ如ク餅ニシ、砂糖ナト付テ、大抵三斤許食スレハ、必出ルモノ也。此方モト別ニ組合セアリシヲ、予カ作畧ニテ、一味ノ餅トシ用ニ、甚便利ナリ。同上

平野元良曰、産後初出の乳を去き、見不喫

三原三折曰、産母初出ノ乳ハ色味甚タ薄キモノナレド、其性自ラ粘滯ヲ除クノ能アルナレド、生兒ニ取テハ其益ヲ得ルヲ多シ。世俗此理ヲ會セス却テ初乳毒アリナド云。陋習アリテ、自乳ヲ絞リ

ステ、他乳ヲ請ヒ与ルヲ多シコレ美玉ヲ棄テ、瓦礫ヲ取ルガ如ク、ル抑兒ノ子宮ニ在マ、母血以テコレヲ去リシ己ニ生ルヤ、乳汁勿チ脹洩シ兒ヲ給養スルヲ、實ニ天ノ賦與シモフ者ニ決ノ

他ニ求ム所ノモノ非ルヲ其理甚瞭ナリ。産育全書外篇 卷七十五ノ

又曰、按三折氏云、産後初生乳汁者、勿與飲。此蓋數日房中蓄積之汁、飲之必有害、須要數回絞去之後始飲之、為可ト殊ニ不知、初乳

ハ自ラ粘穢ヲ驅逐スルノ性効ヲ具テ、并兒ニ於テハ金丹ニモ復ス。奇効アルヲ、産書ニ云、其初乳ニ三日間則、水様而薄味極酸、酸

性軟質濃、蓋胎在母体之時、胎中自ラ蓄聚、黒屎諸藏中亦貯不潔穢物者、哺其乳、則悉蕩滌其穢物

汁の出るを期とて、喫しむるを可とんた。始

て乳を喫しむる小他人乃乳を以て、後害取甚とハ、近世言貴の家の兒の多病横夭を致との十

が七八々、おぼし不因との多哉、能悟者のあしハ、嘆

以立令生兒康健之功也、云人言誠然、然、  
 同、上、金書、乳疾、  
 諸法、文、長、不、錄、當、  
 於、本、書、

くはホとたふさぎや、性婆必研下  
 又曰産後乳汁出るに心少とのハ日、  
 房を摩するくし、蓄たれどけ、  
 う不きぐし、かぐもきまば、  
 どし喫て又出ば、さのふ喫、  
 乳の傳輸る管あ、  
 じ、  
 り、  
 ち、  
 ち、  
 をひ、

以上金生乳康健之功也、云人言誠然、然、  
 同、上、金書、乳疾、  
 諸法、文、長、不、錄、當、  
 於、本、書、  
 又曰産後乳汁出るに心少とのハ日、  
 房を摩するくし、蓄たれどけ、  
 う不きぐし、かぐもきまば、  
 どし喫て又出ば、さのふ喫、  
 乳の傳輸る管あ、  
 じ、  
 り、  
 ち、  
 ち、  
 をひ、

病、乳の出ざるその因とある病を治すに乳ハ自然と出るものナリ、同上

千金方擇乳母法凡乳母者其血氣為乳汁也五情善惡悉是血氣所生也其乳兒者皆宜慎於喜怒夫乳母形色所宜其候甚多不可求備但取不胡臭癭癯氣軟瘡疥癢癢白禿癭瘍瀰唇耳聾艷鼻瘡癩無此等疾者便可飲兒也師見其故灸癥便知其先疾之源也卷五上柳

格致餘論乳母宣受之厚薄情性之緩急骨相之堅脆德行之善惡兒能速肖尤為關係

論

以五合正...  
 同...  
 六月...

胎前產後...  
 論...  
 或...  
 或...  
 或...  
 或...  
 或...  
 或...

產後少腹鞭滿不可聚為瘀血

有持桂里曰。產後腹痛。虛實二途アリ。治方モ亦氷炭ナリ。其疰去血甚少。腹滿痛シテ。按ス<sub>1</sub>ヲ拒ム者。此ヲ實痛トス。逐瘀ノ劑所主ナリ。如シ腹滿

セスシテ。按ス<sub>1</sub>ヲ好ミ。或ハ熱慰ヲ喜ヒ。食ヲ得ルハ稍緩ナル者。此レヲ虛痛トス。

以上全ク景岳產後腹痛ノ

論ヲトリテ。數字ヲ建中ノ劑所主ナリ。一種兒枕痛ト稱スル者。張景岳說アリ。誠ニ前賢未發ノ秘

ヲ闡ク云云。方輿輶卷一

又曰。新產後腹痛スル者。古來指シテ胞中ノ宿血

トナシ。名ツケテ兒枕痛ト謂フ。兒枕トハ。兒在胎

產後少腹鞭滿不可聚為瘀血

時此ヲ枕トシテ居タルノ意ナリ、諸家論說、  
トシテ皆是ナリ、景岳獨リ不然トシ、新ニ之ガ説  
ヲ立ツ、明辨纖悉、一辭ヲ贊スベカラス、唯憾ムラ  
クハ、治方當歸建中湯ニテスムベキニ、別ニ方法  
ヲ設クルハ、亦煩ハシカラズヤ、景岳張氏識見卓  
越トイヘドモ、方藥ニ於テハ、通變ヲ得ス、夏后氏  
之璜モ、不能無考、同上  
平野元良曰、惡露已下尽たりとおとくども、  
の臍下猶堅實とのハ、子宮の腫グイマ、  
この多し、惡露の多少をえとらひ、  
小いふ心、蓄血なりと、切、  
破血劑

あどむ用させぬが、坐婆必研卷下

景岳全書凡新産之後多有兒枕腹痛者、摸之亦  
有塊、按之亦微拒手、故古方謂之兒枕、皆指為胞  
中之宿血、此大不然、夫胎胞俱去、血亦豈能獨留、  
蓋子宮畜子既久、忽爾相離、血海陡虛、所以作痛、  
胞門受傷、必致壅腫、所以亦若有塊、而實非真塊、  
腫既未消、所以亦頗拒按、治此者、但宜安養其臟、  
不久即愈、惟殿胞煎為最妙、其次則四神散、五物  
煎、皆極佳者、若誤認為痰、而妄用桃仁、紅花、玄胡  
青皮之屬、反損臟氣、必增虛病、卷三十九



時此之枕... 青... 煎... 不... 報... 越... 之... 王... 之... 景... 之... 之...

產婦忌早浴

加賀川子玄曰產後十四五日當忌浴蓋新產惡露未盡血氣又虛而浴則腠理大開虛邪必襲至與瘀血熱氣相搏則其生禍害決非淺淺也矣多見人家守俗習陋規產後六日鹽湯浴之浴後冒衣令汗大出由是平穩之產婦忽變成發狂譏語若大熱發斑等惡症或遂致虛羸不起之病者生平所見者不可勝舉矣故余當治產婦他一切禁忌皆無所拘而獨於沐浴嚴加禁防者為之也產後八日當厚被覆下身以熱湯濡巾盡拭去其汚痕畢後又脫上體別拭之則身得清潔功與浴同而賊風無所乘龍矣

產婦忌早浴

產論卷三

又曰病候曰產後譫語發斑測法曰得之新產未踰  
七日而浴浴後大取其汗也治法曰喫冷水於其面  
與以洞當飲渴者加麥門冬括婁根當自清解如虛  
者必死同上洞當飲即小柴胡湯去  
大棗加黃連茯苓青皮芍藥  
又病候曰產後發熱煩渴測法曰得之產後數浴下  
身浴後受寒冷也治法曰洞當飲主之同上  
又一婦已娩四日浴後忽發熱遍身發紫斑其家急  
遣人迎子子因問曰無斑成赤而脉已細邪其人無  
作讖與答曰皆未也然則尚可救矣因急為趨其家  
以口含冷水數喫其體婦發寒戰甚熱退斑沒次日  
全瘥同附錄

又一婦產後六日子固戒其浴而其家不肯至哺竊  
浴之夜半發熱紫斑遍體且讖語始大驚馬迎子子至  
見之怒曰自招其斃非吾所知也且此必不可救至  
明則必死因謝去其明日死同上  
賀川子啓曰浴產前後皆吾門所大禁亦無輕視姪娘  
中屢浴者必多患水腫或病淋疾故姪婦九月已後  
宜禁浴嘗見因浴致胎動上逼心下卒就危殞者往  
往有之是故雖乃暑天亦切不可每日浴但午前  
後輕輕浴之為妙如產後無他病者經二三日後欲浴  
者須以巾漬熱湯絞拭去其汚痕如稍重者若艱產  
後者此拭亦禁如平穩之婦過二七朝後看其脉忘

平和始許輕浴為可而其浴又切不可用浴盆而須用浴桶多設其湯輕浴之余數見平穩產婦早浴忽發熱氣息短促遂致危斃者甚多不可不懼也產論  
之卷浴法

平野元良曰いさつと平産たりとし七夜を過る  
まぐと決し浴をぬる難産と三五七日  
以上といむべし腰湯も無用なり暑月ありし  
嚴禁をすし堪ざるもの熱湯も手巾を淹  
し腰以下を拭く後風小あらしぬる小畏はと  
ひて後小面部手掌おど拭ハセ坐下  
ガ

業廣嘗テ産後七八日腰湯ヲナシテ大患ニ

至リシモノヲ屢目見セリ甚シキハ腰湯ノ卒

ラザル中ニ大惡寒ヲ發シ起ツヲ得ズ終ニ

瘵勞ニナリテ斃レタルモアリ又肝志トモ云

フヘキ容體ニナリ半年モ一年モ愈サルモノ

アリ古人風從下入玉函又風從陰戶侵入血海

編注ト云ヘル志ニテ畏ルヘキノ甚シキナリ

二卷三物黄芩湯因攷ルニ破傷風大毒鼠毒ナ

ドノ理モ同シ担風ノ經絡ニ走ルヤ甚速

ナレ氏幸ニ稟賦實シタルモノハ經絡ニノミ

在レハ荏冉引日トモ死ニ至ラズ若シ深ク臍

生兒禁浴

二入レハ必ス死ニ至ルハ産後ノミニ限ラズ、  
 破傷風等皆同理ナリ、余尋常ノ産ニテモ彼是  
 難涉ヲ云テ、廿一日ノ間ハ禁セリ、若貧家壯實  
 ノ婦ニテ、數日床ニ著スルヲ能ハサルモノハ、  
 賀川氏熱湯手巾ヲ淹シ、汚穢ヲ拭ヒ去ルノ法、  
 甚妙ナリ、  
 醫國子心傳丹溪曰、凡産前當清熱養血為主、産  
 後宜大補氣血為要、雖有雜證、以末治之、此萬世不易  
 之確論也、雖然亦有離襦太早、或澡浴身垢、以致感冒  
 風濕、或多啖雞子糍粽難消之物、皆能惡寒發熱、  
 變證多端、卷七、十八日、  
 大書ニ

生兒禁浴

賀川子啓曰、其浴初生手須輕捷、切不可久浴、世多  
 有因發臍風等病、宜深戒之、産論翼乾

平野元良曰、臍口いまい乾ざるるものを浴するのち、  
 腹痛く惱あるハ、搯撮を發シ、或は卒死したる、  
 兒を見るらるとあましハ、必そのあとの乾涸さるが  
 ち小浴させますと多し、坐婆必研上知

又曰、産兒臍帶退落の後、臍の中を上下へむらた  
 くららふい、乾ざるとのハ、必浴せしむるこ  
 ちふらし、初しいふ如く浴し、湯の臍帶よ  
 リ浸入く、腹痛を為し、搯撮逆發く、卒死と  
 生兒禁浴

るもの常小多く居るとありあう、よく心得さ  
せしむる、同卷下杖

先年與力飯田某トイヘルモノ、妻、兎角半産、  
或ハ八九箇月ニ産スルニ、子育ナキヲ嘆キ、  
余ニ治ヲ託ス、余妊娠中ノ調養ヲ嚴シク言合  
メ、服藥モサセシニ、幸ニメ臨月ニ、一男子ヲ産  
セリ、コレヲ視ルニ、先ツ薄弱ノカタナレバ、三  
日目俗ニ三ツメノ湯ト云ノ浴ヲ嚴ク禁シタルニ、ソノ日、  
坐婆ノ來リテイヘラク、吾是ニテ數百人ノ救  
生ヲナセシニ、一人モ其ヤウナルコトナシ、醫者  
ハ産ヲ見ルコト鮮ク、其上不巧者ナル醫ナレハ、

左様ノ妄誕ヲ述テ、人ヲ驚嚇ナラシナド罵リ  
タレバ、其言ニ從ヒ浴セシニ、半直ニ顔色變シ、  
坐婆未タ還ラザル中ニ死セリ、余屢浴後ニ  
ニ死セシヲ見シユヘイツモ浴ヲ禁シテ、七夜後  
ニナラデハ、浴セシメス、シカシ右ノ小兒ノ如ク、  
水浴中ニ卒死セシハ、始テ見シナリ、慎ミ畏レス  
ニハアルヘカラズ、

原南陽曰、臍風ト云ハ、臍帶ノ退落ノ後ニ、保護宜  
シカラス、或ハ臍口未タ歛ラサルニ、兒ヲ浴シ、臍口ヨリ  
水氣入テ死スル也、退落シタル當日ニ浴シテ、即死スル  
ヲ度ニ見タリ、附帶ノ跡ヨクク乾キテ、愈サル間ハ、

慎テ浴スヘカラス、二三日ヲ経タルハ、即死セストモ、病身  
ニナルコト毎ミ見受タリ、先臍帯落タラハ、小艾ノ灸ヲ  
スル、臍帯ノ落タルロノ形ニ隨テ、取立ナラハ、取立横ナラハ  
横ニナラヘテ、一炷ツクヲ灸ス、是ハ火氣ノ温ミヲ望ミ、ア  
ラス、臍口ヨク歛シテ、再ヒ開カサルノ為ナリ、此處ヨリ  
水氣ノ入ヲ己コトヲ知ス、或ハ茶碗ノイナレリニ、熊膽  
ヲ水ニテトキ傳ルト、小兒腹滿シテ死ス、恐ルヘレ、五倍  
子ノ末ヲ傳ルハ、早ク乾ス為也、醫事小信卷五  
又曰、グレクレモ、臍帯ノ落ントスル氣味ヲ見タラハ、浴  
スヘカラス、臍帯ノ落タル故ニ、水氣ノ入ニアラス、落ント欲シ  
テ、浴サルトキハ、帯ノ四方ハ、既ニクツロキテ有ナリ、故ニ浴

スヘカラス、浴タル後ハ、五六日モ過テ、能ク歛リタルヲ見テ  
浴スヘシ、同上

横テ浴スルハスルハ  
 三六日  
 又曰ク  
 子ノ末ヲ傳  
 又曰ク  
 子ノ末ヲ傳  
 又曰ク  
 子ノ末ヲ傳  
 又曰ク  
 子ノ末ヲ傳  
 又曰ク  
 子ノ末ヲ傳  
 又曰ク  
 子ノ末ヲ傳  
 又曰ク  
 子ノ末ヲ傳



Kitasato Memorial Medical Library