

醫法明鑑

三



F
1-123

卷之三
目錄

頭痛	一丁
腹痛	三十丁
脇痛	五十七丁
黃疽	七二丁
諸蟲	九三丁
吐血	計附唾血 咳血
漏血	三十九丁
病氣	十三四甲
氣	痰血
目	十五四丁
眼	十七七丁
鼻	十九六丁
咽喉	二十一七丁
髮	二十三七九丁
心痛	二六丁
腰痛	四十丁
腳氣	六二丁
消渴	八三丁
衄血	十三三丁
下血	十二四丁
脫肛	十四四丁
銳逆	十六四丁
耳	十八九丁
口唇	二十六丁
牙齒	二十二七十三丁
痔漏	二十四七九丁

490.9
Ih-10
5

No. 2105
12 / 39



富士川文庫

1316

損傷

二十五 隆墮

跌撲

金瘡

竹木刺

湯火傷

八四 危傷

蟲傷

骨鯪

滌瘡

醫法明鑑卷之三

頭痛門一

傳

○頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所主乃氣虛頭痛也

心煩頭痛者病在膈中乃濕熱頭痛也

如氣上不下頭痛顛疾者下虛上實也甚則入脣寒濕頭痛也

如頭半寒半痛者偏頭痛也

有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至筭者死

有厥逆頭痛者所犯太寒內至骨髓者以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛也

血虛頭痛 芎歸為主

氣虛頭痛參芍為主

氣血俱虛頭痛調中益氣湯少加芍蔓細其効如神

白朮半夏天麻湯 治瘧厥頭痛藥也

清空竅胃，乃風濕熱頭痛藥也

羌活附子湯

治厥逆頭痛藥也

如濕氣在頭者以苦藥吐之不可執方而治先師嘗病頭痛發時面頰青黃暉目不欲開懶言身肢沉重冗冗欲吐繆古曰此厥陰太陰合病名曰風痰頭痛以局方玉壺丸治之更灸俠溪穴即愈是知方者體也法者用也徒執體而不知用者弊體用不矣可謂主矣學者其可執而不知變乎丹溪曰頭痛多主於痰痛甚者火多宜清痰降火選淺近者名頭痛其痛卒然而至易解散速安深遠者名頭風其痛作止不常愈觸感復發風邪則驅散之痰厥則溫利之

心肥人頭痛濕痰半蒼瘦人頭痛是熱酒芩風

形瘦色白而頭痛者是血虛宜用歸芍芍酒柏之類勞役下虛之人似傷寒發熱汗出兩太陽穴痛甚此相火真下壅宣補中益氣湯加芍歸甚者加知蔓細偏頭風在右屬痰屬熱痰蒼半熱酒芩在左屬風及血虛風荆芍或云荊芍是頭痛血虛芍歸芍酒柏

心少陽偏頭痛者多太便秘或可下之

○額角上痛為偏頭痛足少陽經也痛久不愈令人喪自

偏痛久不愈服藥針灸不効者濕氣在頭也

○偏頭痛連睛痛惠瓜蒂一味為末少許吹鼻中水徐出晝夜濕盡痛止

○偏頭風頭上有赤腫結核或如酸棗刺用針出血愈雷頭風頭上有赤腫結核或如酸棗刺用針出血愈

石膏鼠粘子炒為末茶酒下

○偏頭痛連睛痛石石膏鼠粘子炒為末茶酒下

子和以芩茶調散，吐以神芎丸下後，服愈。風餅子藥不効宜。

清震湯

○傳

治風濕熱頭痛，片芩一兩酒蒼

風各五分，蒼耳子三分

細各二分

右為末，生姜一斤搗細，和藥末三錢，茶清調下。

一方無風，細有生甘

酒連，芩半。

清空膏

治偏正頭痛久不愈及治風濕熱頭痛除血虛頭

痛不止，片芩三兩酒拌濕一斤

甘炙一分，細各二分

右為末，每服一錢，茶清調如膏，臨

臥抹口內，少用白湯送下。如苦頭痛加細，脉緩有痰

減羌

風，芩甘各半，加半夏一錢，偏正頭痛服之不愈。

減羌

風，芩一半，加柴一錢，如發熱而渴陽明只服

白虎湯，加生甘立愈。

細辛散

治偏正頭痛，細

瓦粉各二分，生芩一錢，芍各三分

酒連

芩各半，甘炙炒芩酒炒各八分

右水煎食後服。

遮舌湯

治風熱雍盛，上攻頭目昏眩。

酒柏

白芩酒括各四分，柴五分

酒芩、風、羌酒連各三分

玉壺丸

治風濕頭痛，亦治癆患。

雄一

星裂木半

右水煎食後服。

天各一

右為末，姜汁浸蒸餅丸。

如聖餅子

治風寒伏留陽經，痰飲氣厥頭痛。

風天半

各半，星姜芩甘各一錢，去皮

右為末，蒸餅調作餅子，如錢樣，每用五餅同荆末，嚼茶清下。

川芎茶調散

治諸風上攻頭目昏痛，鼻塞聲重。

芎四兩

荆穗各二兩，羌芷甘各一兩，細半兩，風三分

右為末，每服一錢，食後茶清調下。

川芎散 治頭目不清利

芎立

柴立

羌風

藁 生甘 升各一 夜甘 生地各一 連酒

酒片芩各二

酒片芩各二

右為末食後茶清調下

祖傳 治頭風熱痛不可忍者

片芩

二兩酒拌濕炒再拌

荆穗四

苛二

每次如斯三次不可

鱗 小芎一 芍半 細茶芽三 荆穗四

右為末每服二錢自湯或茶清調下

清上瀉火湯

一小年人於氣海三里節次灸之至年老

成熱厥頭痛喜寒風風吹之頭痛即愈

荆穗 芎 生甘各二 蔓 归身 蒼

細分各三

酒連

生地 藁各四 分

升

柴各一

酒各三

酒柏

炎甘

蕤各五

分

酒製

右等分

為末每服一錢茶清調下

又方 蕤 風各二 甘一冬夏

酒片芩

一水半冬不

用

甚者冬亦炒用

右等分

右煎服

食後用

治筋壯人氣實有痰或頭暈而重痛立効

大黃

酒拌炒乾再拌三次

右為末茶清調下

○川芎石膏湯

治風熱上攻頭目昏眩痛悶口瘡煩渴

淋

片芩

桔

寒

甘渭各二

木 菊各半

膏

風

苛

翹

各一

桔

寒

甘渭

各二

宿三分

右水煎

食後溫服

忌姜蒜熟物

厥頭痛

治風寒在腦頭痛及傷寒風

一切頭痛

芎

湯

羌

蒼

甘菊各一

細茵

各七

荆

甘各一

苛

芷各二

右為末每服二錢食後茶清調服

兩半

正

右為末每服二錢食後茶清調服

兩

正

各一

苛

右為末每服二錢食後茶清調服

兩

正

羌活附子湯 治久寒犯腦，頭痛，齒亦痛。名曰腦風。

麻不去 根節 黑附 炮芷 蚕柏 各三錢 蒼朮 各半錢 甘草 分

芍药 分

升分

寒嗽

加佛耳草

右水煎食後溫服

川烏炮風

膏肓各一

兩

甘草 分

追風散

治諸風上攻頭痛目眩鼻塞聲重皮膚癰瘡

眉角牽引婦人血風及一切頭風

蝎子

毒蝎

川烏炮風

膏肓各一

兩

甘草 分

炙甘

桑条嘴

荆芥

七分

麝麝

二分

半

甘草 分

右為末茶清調下

點頭散

治偏正頭疼

芎藭

二分

莎草

四分

右為末茶清調服

偏頭痛連睛痛

加膏

鼈粘子

炒為末茶

酒任下

三生丸

治痰厥頭痛

半夏

南星

白附

等分

為末姜汁浸

蒸餅丸 姜湯送下

治痰厥頭痛

烏梅肉

十分

鹽

二分

水一盞煎七分去粗溫

此數過待渴即瘻

治頭風脣蓋骨痛

皂角水

浸春三夏一浸洗新瓦上焙乾

朱每一字茶調服以少許搗鼻

○加味調中益氣湯

治氣血俱虛頭痛

其妙如神

陳柏酒

炒酒

各三升 柴胡 各四分

甘炙蒼

芎藭 各六分

茵蔯蔓

細分

一方有木分無柏

林無柏有芍歸

五味

半夏白术天麻湯

治痰厥頭痛眼黑惡心煩悶上喘心神顛

倒目不開四肢厥冷

柏子仁

姜分

澤白芍

天麻

茤

參 蒼朮各三錢

炒木各五分

麥芽半

橘紅各七分

分半

右作一服加姜三片水煎食前稍熱服可三服而愈

半夏治痰厥

天麻治眼黑頭旋

風虛內作

茤甘溫

水

分半

水

火補氣安實表止汗 參甘溫渴火補中益氣

二木苦

甘溫除濕補中 澤苓利尿導溫 橘紅苦溫益氣調中

麵消食蕩胃中滯氣 夷蘗寬中助脾

干姜辛熱滌

中寒 桔苦辛治冬夫小火在泉發躁

○林大追風散

治久新偏正頭痛肝虛血氣裏風毒上攻頭

芎四天一右為末煉蜜丸酒茶任下

二芎餅子

治氣厥頭痛上盛下虛痰飲風寒伏留陽經偏頭

疼連腦顛吐逆惡心目眞耳聾清頭目化風痰 撫芎

川芎 姜 藜 蒼朮 蒼耳 星 風 甘炙

右為末姜汁浸餅丸晒乾細嚼茶酒任下

神芎丸

治心經積熱風痰雍滯頭目赤腫咽喉不利

大生芩各一牽生滑各四 連苛

芎各半

愈風餅子 治雷頭風眩暉先吐後服此

芎 川烏 檀各

甘菊芷 風 細 天麻 卷 荆 苛 甘炙各

右為末餅丸作餅子細嚼或茶或湯下

清震湯 治雷頭風頭面疣瘡腫痛寒熱狀如傷寒

升蒼各一荷葉一右㕮咀每服五錢水煎去粗溫服

一方荷葉一箇燒研前藥煎調服亦可

頭風痛天陰風雨先發者 桂丁兩為末酒調傳頸上額角

頭痛不可忍多是風痰所致 桑末和蜜濃傳舌上吐即止

治頭風 大豆三升炒乘熱投酒中密封七日溫服

治頭風熱痛不可忍者 朴硝 大黃等為末用深井底泥

和作餅子貼兩太陽穴 骨上髮際動脈處外瞼通也又徐氏

童子膏一名太陽十四經瞼子膏目

○頭項風強五十一分

八月後取荆芥穗作枕鋪床下立春日去之

心痛門二

傳

丹溪曰心痛即胃脘痛須分久新身犯寒氣口得寒物而病

於初得之時當用溫散溫利之藥若病久則成鬱鬱則

成熟若欲行溫散溫利寧無助火添病耶由是多用山梔子

為君熱藥為之嚮導病安之後若恣縱不改前非病必無

作難治此病雖日久不食不寐若痛方止即吃物必復作必

須再服三五服藥後以漸而少食方可獲全安

致病之由多因恣口腹好辛酸飲熱酒食前燙復冷朝

傷暮損日積月深自鬱成積自積成痰痰火煎熬血亦妄行

血相雜升降故胃脘疼痛吞酸嘈雜皆膈噫及胃

之漸者也俗醫不究其源例以火濟火良可痛哉古方九種

心痛在胃而不在心有真心痛者太寒犯心君

又曰活血衝心手足青過節者旦發夕死夕發日死

心膈大痛致走腰背發厥嘔吐諸藥不効者以鵝翎探吐出瘀

積碗許而痛即止或藍葉生姜合汁服又薑姜汁調服

脈堅實不大便者下之亦可

以物輕按而痛定者屬虛一陳加炒姜和之而愈

平日好熱物死血流於胃而作痛者桃仁承氣下之

虫痛者必面上有白斑唇紅能食時作時止二陳加苦

練根或錫灰

濕痰作痛白螺蝴蝶去泥砂煅末方寸匕溫酒調下

久者良妙效

氣痛者

牡蠣粉

一錢溫酒調下

玉蠣粉與鹽炒

痛甚者脉必伏宜溫藥附子之類不可用參木

一方用海粉佐以香附以苦梔煎湯入姜汁調服

無藥處以鹽置刀頭燒紅淬水中乘熱飲之吐痰而愈

一方山施大者七枚炒焦黃水煎入姜汁二三匙含辣熱飲

草荳蔻性溫能散滯氣利膈上痰若胃脫因寒而作痛用

之如鼓應桴若濕痰鬱結成痛者服之多効若因熱鬱

而痛者理固不當用此俱宜以涼藥監制如芩連梔之

屬其功尤速 東垣草荳蔻丸寒熱心痛俱獲奇功

但因熟者不可多服久服則心有積溫成熟之患

臣壹共蔻丸治客寒犯胃痛或因濕熱鬱結痛亦可

而止之又治氣弱心痛亦好 草蔻丸

右為末蒸餅丸白湯下

○木附湯 治寒厥心痛手足逆冷汗出脉微氣弱方見傷寒門

寒厥暴痛非苟病朝發暮死急當救之

愈痛散 治急心胃痛 五靈脂石 延炒莪良

歸等 右為末醋湯調服 鐵刷湯

治心脾積痛婦人血刺氣痛及中酒泄瀉 良

甘草 蒼朮製各二分茴炒七枚右為末鹽湯點服或酒調或煎服亦可

加味七氣湯 治七氣病發心腹刺痛欲死或傷寒邪

半夏延炒桂各二分參一冬甘炙一乳半右分二貼姜

棗一枚 婦人加歸芍各一

燒脾散

治啖生冷瓜菓生菜留中焦心脾冷痛

姜朴

果縮

麵炒薑米炒陳良炒各一
甘灸一右入鹽少許

水煎服又鹽湯點服亦可

詞子散

治心脾冷痛不忽又治霍亂吐利

詞煨去甘灸

朴製姜炮果

陳良炒芩麵炒薑炒各

右水煎入鹽

少許溫服

參木散

治虛弱人心脾疼

參木炒姜炮白荳蔻縮

丁香

陳

甘各二右分一貼入姜片水煎調炒過蚌粉各

手拈散

治心脾疼

荳蔻延五靈沒各等為末酒或米飲調

勻氣散

治證同前半自効此方風氣藥

方見中風門

順氣木香散

治氣不升降嘔逆痞悶脇肋脹滿及婦人血

氣刺痛

方見氣門

○祖傳加味枳术丸

治痰積食積酒積茶積肉積在胃脘而痛及痞滿惡心嘈雜噯氣吞酸嘔吐脾疼等証

白术

三

蒼焙實炒

猪

蘖麴炒半

各一澤赤苓

芎連

陳壁土

白螺螄殼煅各縮草蔻芩陳壁土

萊炒干生姜

各五

陳去白莎童便

蔓朴

姜制衣同炒

各三

木甘

各二

呑酸加茱萸月五錢熟月二錢半

久病挾虛加參扁蓮

各五口吐清水加炒滑一蠟

各一兩縮木半

右為末用青荷葉泡湯浸晚粳米研粉丸清米飲下

白螺殼丸

螺殼

滑炒蒼星煨

柏莎童便浸宿木半

青枳

各五

右為末姜汁浸蒸餅丸春加芍夏加連

各一兩縮木半

倉卒散

治氣自腰腹間攻心痛腹中水冷

自汗如洗手足

繩急厥冷

治氣自腰腹間攻心痛腹中水冷

自汗如洗手足

大者四十粒附一枚炮

附去皮膚右酒煎溫服

金鈴子散

治熱厥心痛

鈴延

各一為末溫酒或白湯下

○煮黃丸

治太實心痛心胸高起按之愈痛

雄

巴

五冬去皮油

右入白麪二兩研勻水丸如桐子大漿水水煮十二丸熟瀝入冷漿水內食沉用浸藥水冷將水水下二十丸日盡十

二丸如得利不可再服宜服

藁本湯

利後用此去餘邪

藁半

蒼一右水煎

五積丸

治心脾痛如刺吐酸水不止

百草霜一巴十四粒去

右飯丸

如藁豆大每服三丸先煎醋滾入艾葉下握再煎去粗送下

香附散

治心脾疼良炒莎炒

各等分為末鹽湯點服

丁方加木香鳥藥

一方

治心痛熊膽如豆大和水服

百草霜一巴十四粒去

治卒心痛經年不愈

延年炒五甘灸一右水煎

百草霜一巴十四粒去

勻氣散

治九種心疼棟子肉延姜黃各等分為末酒服

○玉集効丸

治臟腑虛弱或多膏肥致蛇動方見諸藥門

○惠治心痰欲絕

金底煤五鹽一研湯調服

芩味

平補鎮心丹

治心血不足時怔忡夢墮層崖

桂各一兩遠

谷一兩地一兩酸二冬參五車神

門桂各一兩半

辰半兩

甘草天門山姜製各

龍齒二兩

辰半兩

右煉蜜丸湯下或溫酒下

○灸法

治心痛手中指端灸三壯

傳

△腹痛門

三

○東垣曰腹中諸痛皆由勞力役過甚飲食失節中氣不足

寒邪乘虛而入之故卒然而作太痛

○難知曰傷寒中脘痛太陰也

理中湯

黃芪建中湯

臍腹痛者少陰也

四物湯

真武湯

附子湯

小腹痛者厥陰也

重則正陽散

回陽丹

輕則當歸四逆湯

雜病腹痛

四物苦練湯

酒煮當歸丸

夏月腹痛

肝熱惡熱脈洪數

黃芩芍藥湯

秋月腹痛

肌寒惡寒脉沉實

桂枝芍藥湯

四時腹痛

芍藥甘草湯

血虛瘦弱之人津液枯涸傳

送失常鬱火燥熱前成結糞異滯於大小腸之間而作痛

者宜枳實導滯丸備急大黃丸之類先通其滯止其

痛然後用四物等生血潤燥之劑以治其本

卒然心腹大痛欲吐不得吐欲渴不得渴辰口厥逆死在

須臾內因食積外感寒邪是名乾霍亂宜急以

活鹽湯灌之而以鵝翎探吐取涎而愈

食積為患者保和丸枳术丸消之枳實導滯丸木香換補丸下之

惡寒而痛加桂

惡熱而痛加柏

如腹痛欲以物柱按者屬虛用參术姜桂之類

手不可按者屬實用建中湯加大黃或調胃承氣湯加

桂枝下之而愈

因飲食過傷而作痛者必問傷何物如傷生冷硬物者

東垣木香見曉丸三稜消積丸如傷熱物枳實導滯丸

三黃枳木丸看強弱用而下之

氣虛之人飲食過傷而腹痛者宜補瀉兼施二陳湯

加芎木麴芽參蒼木之類或送下前推積等

丸子以下之

腹中常覺有熱而暴痛暴止者為積熱調胃承氣湯止之
因跌撲損傷而作痛者此瘀血桃仁承氣湯

抵當湯逐去其血而愈

如因事損傷或酒後涉水血凝腹痛者大柴氣湯加桂

○戴氏曰痛甚欲大使去後痛減者食積也綿綿痛而無增減
者寒也時痛時止者熱也其痛常處而不移者死血也

因寒氣作痛者小建中加姜桂芎蒼芷沙縮芍

因熱而痛者二陳加芪連梔痛甚者加炒姜從之

腹痛不禁下者芎蒼芷苓莎滑加姜煎服

飲食過傷而腹痛者木香換棉丸下之

小腹實痛用青皮以行其氣小腹因寒而痛桂茱

小腹革滿而痛尿利者蓄血之證尿不利者溺溢之證

○腹中水鳴乃擊手動其水二陳加芩連梔又有藏寒痛者

○心腹痛不得息脉細小遲者生大而疾者死

腹痛脉反浮大而長者死臍下忽大痛人中黑色者多死

高良姜湯治因寒心腹大痛良久朴桂各一右

草荳蔻湯治臍腹虛脹作痛澤一分草蔻半實麴

芍勿用甘各七分歸苓各七分青陳各六分木四分

右作一服加姜三片

益胃散治因服寒藥過多腹痛不止參朴甘

白蔻姜黃宿姜澤各三分益六分茲陳各七分右加姜水煎

厚朴溫中湯治胃虛寒脹滿疼痛朴陳各一

芩 草蔻 甘 木 各半 姜三分 加姜

酒煮當歸丸 治小腹寒痛及婦人白帶症癩寒証 方見尿

○五辛湯 治心腹冷痛 椒細桂 姜茱芍 風苦參

甘 干地 歸各一梔 烏梅 大棗各一

○小建中湯 治寒氣入腹痛輕按痛重按愈脉弦緊

桂枝四兩 甘枝一兩 右分二貼 姜三兩 束一枝

蟠葱散 治脾胃虛冷心腹脇肋刺痛胸痞嘔逆及外

腎腫痛及女人血氣攻刺癥瘕一切疼痛 延年

蒼芩 炙藜青各一丁皮縮枳各一桂 姜炮各

甘 炙一兩半 虛寒甚者加茱木各半右分二貼入葱白姜水煎

理中湯 治心腹經痛諸虛冷氣滿痛歸芍 朴

草荳蔻丸 治客寒犯胃痛者 方見心痛門

當歸湯 治心腹經痛諸虛冷氣滿痛歸芍 朴

大七氣湯 治挾冷腹痛亡氣四肢面色青白 方見積聚門

葱白散 治一切冷氣及膀胱氣刺痛婦人胎前產後血

氣刺痛 茴歸枳炮朴青桂練炮去姜炮

茴炮芩 紫炮 茴宿根一瓣炒熟地麵炒芍 木

○傳河間木香枳榔丸 治食鬱氣滯作痛 木 枳各三

青陳木各五錢炒七寶 麝炒朴各右為末湯浸蒸

餅子丸如桐子大每服五十丸溫水下

芍藥甘草湯 治四時腹痛 白芍 甘炙各等分

沒藥散 治一切心腹疼痛不可忍者 没乳各三

穿山甲

五分
灰火煅

木鱉四分
去殼右酒煎服

枳實導滯丸

治傷濕熱之物不得施化腹痛滿悶方見內
枳實導滯丸

黃連湯

治胸中有熱胃中有邪氣腹內痛時欲嘔吐此藥

升降陰陽連甘炙枝姜絡五半

半合湯泡七次去皮膚參和右入

大棗二枚水煎

四順清涼飲治腹痛大使結小便澁喜飲冷以手按之痛甚

赤芍

大蒸各歸一子甘炙一右

一方加青枳

大柴胡湯治証同前方見傷寒門

烏梅丸治胃冷蛇蟲攻心腹痛嘔吐四肢冷

方見諸魚門

化禹丸治腹中有塊以手按之不見痛無休止嘔吐涎沫清

水顏色青黃或寒或熱沉沉嘿嘿不知病之去處

方見魚門

治虫咬心痛鶴虱一為末空心溫醋下禹當出

治療積作痛

脉滑者是凡痛必小便不利

苔芩莎

立蒼為末以姜汁入熱湯調服

傳

腰痛門四

○丹溪曰有腎虛有瘀血有濕熱有挫閃有痰戴氏曰疼
之不已腎虛日輕夜重者瘀血天陰及久坐而發者濕也
諸腰痛不可用補氣藥亦不宜峻用寒涼藥

腎虛腰痛用柏仲板知杓五味地猪脊骨髓丸服
瘀血宜行益順氣補陰丸加桃紅針灸中出血
濕氣燥濕行氣用柏仲蒼芎或芩通巴羌膝
痰宜半南加快氣藥佐之使痰隨氣運

因房勞辛苦而腰痛者四物加知柏仲五味之類否
補腎丸或大補陰丸

風寒濕流經絡而作痛者 二陳加麻芎蒼

芷風卷獨之類

因挫跌撲死血流本經而作痛者 四物加桃紅蘇木之類 脉實人壯盛者 太兼氣加桂下之安

醉飽入房酒食之積乘虛流本經腰痛難忍仰者四物湯 合二陳湯加麵蘖仲柏桂縮葛花桔

腰曲不能伸者 鈎委中立愈

三因膏丸 治腎虛腰痛壯筋補虛 仲一斤生姜十兩

破一斤右為末用胡桃肉百二十箇湯浸去皮膜研膏炒蜜些亦丸如梧子大每服五十九鹽湯姜湯任下

三因立安丸 治五種腰痛溫補腎元壯健腰脚

破瓜各半膝酒仲姜汁炒續各一錢二兩右為末煉蜜丸

補膏脂丸 治腎虛及寒濕腰痛 藥

各浸一晝夜仲四兩炒補三兩胡桃八兩去油右不犯鉄器糯米糊丸秋冬燥蜜丸如桐子大每服五十九鹽溫酒下乾物壓之

補腎丸 治腎虛腰痛 方見虛損門

獨活寄生湯 治因腎虛坐卽冷濕當風所得

獨桑寄仲炒細膝艽白芍桂炙甘芎風參

熟地歸各五右水煎空心溫服

○林八味丸 治房勞傷腎腰痛 方見加歸芍續風

一方 治積年腰痛有時發地膚子酒服方寸七

杜仲酒 治風冷傷腎腰痛不能屈伸 杜仲

右用無方酒三升浸十日每服二三合或為末酒調一錢下

地膚子甘苦
氣寒強陽益
精入膀胱除
虛熱利小便
癩症散惡瘧
而通淋治

牛膝酒 治跌傷風毒攻刺腰痛

地骨 五加 蕃 芒

膝 巷 海桐皮各一生地十兩 甘

右帛包入無灰酒內

浸冬七日夏三五宿

一法加杜仲

每服盞令酒氣不絕

神應丸

治腎經不足風冷乘之腰痛或勞役傷腎或

濕地或隊伍土傷損腰痛

歲二桂

歸各一右為末酒

糊丸空心酒下

茴香湯亦可

婦人桂心湯下忌茶麴等

麻黃艾蒼术湯

治寒溫所客身躬沉重腰痛面色蒼黃

麻澤白芩

麵炒陳各一

艾蒼甘炙各杏子十個半

草蔻枝各半

芍藥

分右

川芎肉桂湯

治冬月露臥感寒濕腰痛傳治瘀血在足

太陽少陽少陰三經腰痛

羌活

柴桂桃歸尾艾蒼

申灸川芎各一獨

麵炒各

風漢巴

酒製各右酒煎

便自利謂之腎著之證

姜炮芩各一

甘炙半木半

獨活湯

治勞役腰痛如折

獨風

羌澤桂各三

大酒

煅甘

巴酒柏酒炒各歸

翹

各五桃三十右酒水煎

粘痛湯

治濕熱為病肩背沉重肢節疼痛胸膈不利

术參升

苦參酒葛

艾蒼

各五知酒

風

澤芩

猪歸各六

炙甘生芩酒

茵酒

卷各八

如神湯

治挫閃腰痛甚者不過三服平安

歸桂延

各等

右為末每服二錢七熱酒調下或細功酒煎亦可

地龍散

治腰脊痛或打撲損傷或從高處卒下惡血在

太陽經腰脊痛或髀股脛痛

歸尾二桂地龍各四

麻五

廿不六獨柏鹽酒

甘炙八卷一水桃六個去皮尖右水煎

林熟大黃湯 治腰墮臍臍腰痛不能屈伸 大炒生姜

各半 两

右咬咀水浸一宿五更空腹頓服之

一方 治腰痛 大黃

半 两

生姜半 两

同切如小豆大鍋內

炒黃投水兩碗五更初頻服天明取下腰間惡血 加烏膽

痛即止

○治腰疼如神 桂一木

仲 炒去絲

右為末酒調下

○治腰疼散 茴香根

搗爛酒下甚妙

一方加紅麴

各等

○敗毒散 治風熱濕毒腰痛

方見傷寒門加續天芍瓜

各等

薏苡仁丸 治腰脇疼痛

手足枯痺

薏 一斛用細者

附細參甘枳

柏子 苕

歸 二斛

勝桃各一

○塗藥 治反腰有血痛

桂三升搗篩醋和塗上乾再塗

○生姜四兩搗爛鍋內炒極熟安地上出火毒縮包略烘熟

敷緊腰疼處覺熱甚妙

○瘻腰痛黃狗皮久裏腰痛處取燒徹為度頻

乾地分右為末煉蜜丸酒下

○塗藥 治反腰有血痛

桂三升搗篩醋和塗上乾再塗

○塗藥 治

一寸灸各七壯

○治腰痛灸腰俞

△ 腸痛門 五

○傳經曰肝病者兩脇下痛引小腹令人善怒虛則目睂睂無能見耳無所聞善恐如人將捕之云云蓋因大怒而血不歸經

留本經而為脹痛或歲木壬太過而本氣自甚或歲金庚

有餘而木氣被鬱皆能令胸痛經曰病脇下滿氣逆二

三歲不已名曰息積是亦肝木有餘之証也外有傷寒發寒

熱而脹痛者足少陽厥陰二經病也治以小柴胡湯無不効

或有清痰食積流注脇下而為痛者或有登高墮仆

死血阻滯而為痛者又有飲食失節勞役過度以致脾

肥白人氣虛發寒熱而脹痛 參 茵 補氣

柴 芎 退熱 木 蒿 調氣

瘦弱人寒熱脹痛多怒者必有瘀血 桃紅歸大柴青之類

凡脇痛者多是肝木有餘也 小柴胡加青 苓 芍 膽

甚者煎成正藥入黛麝 痰流注者本方倍半加橘

紅 星 蒼 白朮 芎 苓 之類 瘀血作痛者本方合

四物湯加桃紅或乳沒 痛甚而元氣壯實者 桃仁

承氣下之 性急多怒之人腹脇作痛者 本方加芍

吉 芍 之類 甚者以前藥送下當歸龍蒼丸

左脇痛以柴木為君 苓 青 膽 或芍桂為佐

右脇痛 推氣散 奴 桂 菟 陳 升

咳嗽脇痛 陳 加星青莎黛姜汁一日四物加青疏肝氣

氣弱之人，腰下痛，脉細緊或強多，從勞役怒氣得之。

八物加木青或加桂

發寒熱，腸痛似有積塊是飲食太過勞力所致，必用龍薑丸。

當歸龍薑丸

鴻肝火

火盛內有濕熱兩脇痛者用之。

歸臍施連柏芩

各一錢

大黃薑

各半錢

木一錢

麝五分

右麪糊丸

如桐子大每服二十九

姜湯下

一方

加青一兩

紫五錢

水半兩

推氣散

治右脇痛甚，脹滿不食。

姜黃

枳

炒桂各五

甘炙三

為末，姜湯下

水煎亦可。

枳芍散

治左脇疼痛不忍。

實

桂

各五

甘水半

右為末，姜東東湯或酒調下。

芎葛湯

治脇下疼痛不可忍。

芎

葛

細

風枝

分量紫蘇湯

治腹脇疼痛氣促喘急。

方見喘急門。

加味二陳湯

治湿痰流注脇內作痛。

方見痰門。

加蒼星芎

一方

治死血作痛。

桃尖

去皮留

另研

紅糖

酒拌

乾

葛甘各

右入姜水煎。

右等分水煎。

枳殼煮散

治悲哀煩惱，有傷肝氣。

兩腋骨痛筋脉拘急。

方見氣門。

腰脚重滯大治脇痛

芎細

風

枳

桂

桔

半

葛甘各

右入姜水煎。

三和散

治脇痛背痛妨飲食。

方見氣門。

枳實散

治肝氣不足，兩脇痛。

方見氣門。

參各

右為末，姜湯或酒下。

一方

大柴胡湯

方見傷寒門。

治脇痛口燥渴服此仍間服。

煮黃芩。

大柴胡湯

方見傷寒門。

治脇下疼癬如神。

加鷓鴣更妙。

芍藥散

治婦人脇痛

香附二兩醋一升鹽白芍桂半兩同煮乾

延炒各一兩

右為末向湯調食前服

治脇痛如掣

大豆半升炒焦好酒一升煮之熱酒取醉

息積証脇下滿氣逆二三十年不已不可針灸但導引

服白朮丸水

寶炒桂各一兩半陳桔

甘一兩

右為末煉蜜丸溫酒送下

傳瓊珀膏

貼脇痛之處

大黃

朴硝各一為末以大蒜

膏調貼之

又芥菜子水研付

又方吳茱萸

研水調付

又葉搗炒熟貼而以熨斗盛火熨之

○灸法

治脇卒痛以繩橫渡兩乳中間屈繩從乳橫

以趨痛

脇下灸繩下屈處三十壯

○灸法

治胸脇滿痛不得息丘墟二穴灸三十壯在外踝下如前

陷中去臨泣三寸

脚氣門六

傳經曰

諸溫腫滿皆屬脾土又曰傷于濕者下先受之

蓋脾主四肢足居於下而多受其湿

濕成熱濕熱相搏其病作是以先從氣衝穴隕核痛起及兩足脛

紅腫或惡寒發熱狀若傷寒筋攣掣

痛是其候也或一旬或半月復作如故漸漸而致足筋腫大如瓦勒者

多有之東南卑濕之地比比皆是西北高燥之方鮮有從外感而得者有從內傷而致者所感雖有內外之殊其

爲溫熱之患則一也

大抵病因有内外之殊而治法無表裏之異耳故為治者宜通用二术之類以治其湿知柏條芩之類以去其熱歸生地芍之類以調其血瓜棗之類以行其氣恙獨以利關節而散風溫兼用通已膝之類引藥下行及消腫去湿

○男子多由腎虛而生婦人亦因血海虛乘七情而病自外入者止於下脰腫而痛自內致者乃或至於手筋腳氣是癆主疾故用宣通之劑若壅既成而盛者刺惡血去其腫熱然後藥之

○傳脚氣入心則恍惚謬言吐食不眠卧不安左寸脉大乍發動不得露足當風入水冷水洗足夏時腠理開不可風睡暑月冬月俱宜溫暖兩脰平生莫過酒

○脚氣之禁忌嗔嗔則心煩脚氣禁大語大語則傷肺發聲不得露足當風入水冷水洗足夏時腠理開

○小衣有不無者死入貯月則腰脚腫小便不通呻吟目睛額皆

○腳氣下注成脚氣不可嗜慾嗜慾則脚氣發忌濕

○食飽食湿地濡衣每食後行數百步惡氣下散

○經曰逸者行之每丑寅日割手足甲少侵肉去氣

○治濕熱脚氣方蘇柏鹽酒芍瓜澤通已換

○蒼枳炒甘炙湯恙痛加芥

○加大連右水煎服痛退腫退則住服

○防已飲柏酒蒼鹽水木巴各七生地換芍各半犀屑

○甘節通連各三右水煎食前溫服有熱加芩

○熱甚及禾令暉熱加膏膏有痰加竹瀝姜汁或南星

太便祕ヒツヒツ 加桃アモリ 小便祕ヒツヒツ 加膝ヒヅチ 常腫者ヒツヒツ 專主濕疣肥人ヒツヒツ 加瘻藥

健步丸 蒼アカウ 歸尾エイテ 各一生地イキジ 芍アハラ 陳ミツ 各一膝ヒヅチ 五腹子ウタマツ 三

茱條芩スルガク 各五 右為レバ 末湯シロトヨウ 浸蒸シンボシ 餅丸ヒツク 如桐子ヒナギコ 大每服

一百丸白术木通シロクモドキ 前湯マサニヨウ 食前シキセン 送下スンダ

加味四物湯 治脚氣衝心ブツツク 方見虛損門ヒツツクモン 加炒柏アマメタガ 煎服ケンブ 更於漏

泉穴用附子末ツブシ 漆調作膏ヒツトトシハコ 貼穴止ヒツツクシテ 以艾多灸引熱下行ヒツテテカイタク

一方治食積流注ヒツク 蒼アカウ 已イ 桔カク 酒アルコール 炒星ヒツク 苓アハラ 芎アモリ 楝辱シモク

血虛加膝板ヒヅチバン 酒糊アルコール 丸服ルンブ

轉筋屬血熱ヒツキンスルヒツク

四物加酒芩紅アハラ 有筋動足ヒツクヒツク 大指上至大腿

近腰結ヒツクヒツク 此奉養厚ヒツクヒツク 因風寒ヒツクヒツク 而作又當加蒼星アカウ

羌活導滯湯 治脚氣初發ヒツクヒツク 身盡痛ヒツクヒツク 或肢節腫痛ヒツクヒツク 便溺阻

隔先カクシ 以比導方之用ヒツクヒツク 當歸梅痛湯ヒツクヒツク 以散其邪ヒツクヒツク

當歸粘痛湯 治濕熱脚氣肢節煩疼ヒツクヒツク 肩背沉重ヒツクヒツク 胸脇不利

及遍身疼痛足腫腫痛ヒツクヒツク 脚膝生瘡ヒツクヒツク 赤腫ヒツクヒツク 巷ヒツク

芩アハラ 各四 分ヒツクヒツク 風ヒツク 歸身ヒツク 酒アルコール 知製澤ヒツクヒツク 猪ヒツク 术ヒツク 各半

葛アマ 升ヒツク 參ヒツク 苦參ヒツク 各四 分ヒツクヒツク 右空心ヒツク 瞑卧ヒツク 溫服

麻黃左經湯 治風寒濕流注ヒツクヒツク 足太陽經腰脚痙ヒツクヒツク 痛關篤重

痛憎寒壯熱無汗惡寒或自汗惡風頭痛脚軟ヒツクヒツク

葛アマ 左ヒツク 紅ヒツク 各半

細木門ヒツクモン 萍ヒツク 風ヒツク 姜芩ヒツク 各半 小草ヒツク 肾柴ヒツク 各三

半夏左經湯 治足少陽經為風寒暑湿流注ヒツクヒツク 發熱腰脇疼ヒツクヒツク 痛頭目眩暈嘔吐ヒツクヒツク 不食煩心腿痺緩縱不能行ヒツクヒツク 半ヒツク 葛ヒツク

右加姜末ヒツク 熟悶ヒツク 加竹瀝ヒツク 嘴急加杏ヒツク 又桑ヒツク 分ヒツク

六物附子湯 治四氣流溼足太陰經骨節煩疼四肢拘急

自汗短氣小便不利或手足時浮腫

附炮桂

巴各一 甘炙五 术苓各七 右入姜

換腿丸 治足三陽經為四氣所乘為癰腫緩從上攻胸

脇肩背下注脚膝疼痛足心熱行步艱難薏炒星炮

斛 石南葉 桤 薜 腎酒 差風丸各四 茴歸尾

天續各一 右酒糊丸 塗湯下

五積散 治寒濕流注經絡脚膝腫痛 方見傷寒門

祖傳 杏木簷飲 治脚氣發作惡寒發熱兩足腫大心

煩體痛垂死者 杏木簷四 桤腹酒汽青橘葉

四十片右作一服用順流水三升煎至一升分三服一日服盡

如大便通利以杏木簷水煎湯洗之神妙

○林加味敗毒散 治足三陽經受熱毒氣腳踝上爛赤腫痛

病根去處度外以杏木簷水煎湯洗之神妙

竹瀝湯 治兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁腹脹惡心不食

寒熱自汗惡風或無汗而寒方見傷寒門加大分量入姜

煮取三升分三服取汗丁方無芩杏有术一两

風引湯 治兩脚痺弱或不仁拘急不得行 麻膏獨

芩各二 菊附 茉桂參風芎巴甘各一

姜米一两 术三 杏十六枚去皮尖右煎服取汗

枳實大黃湯 治腳氣腫痛 大實各半 差風半

歸芍右水煎空心服下利一兩行痛止

換藥湯

治一切脚氣腫痛，順氣防壅。

換湯陳

蘇瓜

五加 甘草各二

右分二貼入姜五片

婦人脚氣多由血虛

加歸室女脚氣多由血虛

加歸

太便祕加大黃

壯者加枳實

大腹皮散

治腳氣腫滿小便不利

腹二分

瓜二分

沉桑炙枳

炒各一
水二分

右入姜煎

石南丸

治風毒脚弱疼痺，腫生瘡足心痛，頭面浮腫，心

腹脹滿

二便祕澁

赤芍

五加

小豆

陳麻

芎

仲炒腹

各二杏去皮
尖炒黑丑炒石南葉

薏

膝

各三

獨

醉瓜

各四右為末酒浸蒸餅丸如梧子大每服二三十

陳去白

烏藥各四黑丑炒杏去皮石南葉

膝

各三

獨

綻酒續瓜

赤芍各一右為末酒煮糊丸空心溫酒送下

三和散

治腳氣上攻胸腹滿悶太便不通

方見氣門

紫蘇散

治風毒脚氣脚重虛腫

蘇通

桑茴

炒各一

枳炒三

羌獨荆瓜青各七

腹子

二分

右分一貼等

三片葱

一莖水煎

澹寮方

治腳氣入腹衝心疼，痛腫，脚骨熱痛及癰

沉木炭

白芍根各五

甘

芍

青枳各二

蘇

瓜各一

蘇子

六右入姜水煎

一方

治風寒、濕熱足膝痛，赤腫，脚骨熱痛及癰

蒼米泔浸丁宿糞

柏酒浸一宿

各七

冬半

右水煎

空心服

百用

百效

○惠治婦人足腫 生地 柏子星 膽膝 紅芍 右水煎
治腳氣筋骨痛 金銀花 瓜歸芍 桂 甘 右水酒煎
全 桂蘇散 治風濕腳痛 蘇 莎 各二陳 甘 桂

瓜 各一右加姜、葱

加減地仙丹

○治風濕留滯下焦足膝拘繩腫痛 方見霜風門

思仙續斷圓

○治肝腎風虛脚膝痛引腰背一切風毒流注

蘇 四思仙木

局半 杜仲 紗絲斷 蒼 蕺 風 各五 藤酒 繢 卷各三

生地 五加

○各一右為末酒三升化青鹽三兩木瓜半

斤去皮子以鹽酒煮成膏

○杜仲丸空心溫酒鹽湯任下

烏藥平氣湯

○治腳氣上攻頭目昏眩喘滿脚膝酸痛

神甘 灸芷 歸木 芎味 蘇子

○烏藥瓜參各等右入姜裏

搜風散

○附氣愈後可常服之

桂 半 右入姜裏

○桂枝各二麻根 姜炮各一蒼酒浸

○林治腳氣衝心悶亂不知人 大豆一升水三升濃煮汁頻

服半升如未定可更服半升即定

○王洗藥

外感濕邪腫痛禁洗渫內致濕氣淋渫開道守

渴其邪 磬石

○右用將水一斗五升煎沸浸脚治腳

氣衝心

又方 蔚風荆地骨歸升白芍

○朔翁葉各等

右剉咀水二斗煮一斗五升去粗熱淋洗

又方 治腳氣每朝用鹽搽腿膝至足甲淹小時候却用熱湯泡洗

敷藥 正蒼差各半細

○二分右為末姜汁調敷患處

一方 治腳氣止痛草烏同酒糟搗爛貼

○姜汁調草亦可

又 小豆 南星 為末，姜汁調塗。

又 時喫煮熟蘿蔔令飽，以下氣醋調飛麪罨痛處。

又 豬牙皂角不姓者大皂角木香各等分右為末，醋調先於不腫處塗之，截斷毒氣不令上冲，次塗下腫留指尖不塗仍剪去足瓜里。

出毒氣

又 草烏

芷 風 獨

羌 各等分

石為末，生地龍數條研爛米醋調敷

一方 治脚氣痛不可忍 惠處用布裹於暖處，蓋之痛立止。

患處用布裹於暖處，蓋之痛立止。

黃牛糞翼入鹽炒熱罨之。

○脚氣是壅疾故用宣通之劑若壅既成而盛者刺

惠脚跟疼不著地，惡血而去其腫熱後藥之。

○夫黃疽為病，肌肉必虛腫而色黃，蓋濕熱鬱積脾

胃之中，久而不散故其土色形于面與肌膚。

丹溪曰不必分五等，是濕熱如盦麵。

黃疽之病當以十日為期治，十日以上為瘥，又刺者難治。

病疽而渴者難治，不渴者其病易治。

發於陰部其人必嘔，發於陽部振寒而發熱。

諸黃疽但宜利小便，脉浮當以汗解之，宜黃芪建中湯。

黃疽小便色不變，欲自利腹滿而喘，不可除熱，熱除必噦。

噦者宜小半夏湯，方見傷寒門。

病消發黃必小便不利，心中熱足下熱，又心中懊惱而熱，不能食時，欲吐名曰酒疸，心中熱欲嘔者，吐之即愈。

又曰酒疽心中實熱而煩宜小柴胡加茵大連葛鼓額上黑微汗出手足心熱薄暮即發膀胱急小便自利名

曰女勞疽腹如水狀不治

王玉○又曰黃家日晡當發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急小腹滿一身盡黃額上黑足下熱同作黑疽其腹脹如水狀太便必黑時溏此女勞之病非水也腹滿者難治硝石礬蠶散

林○黃疽通身面白自悉黃宜生料五芩散加茵陳

又宜小柴胡加茵芩 實

穀疽食已頭眩心中憊欬不安飢飽則致胃氣蒸衝

而黃宜小柴胡加穀芽朴 實 桔 大黃

黃汗者因脾胃有熱汗出入水濕浴亟致故汗出黃染衣而

不渴 茵陳散 並因兼湯

又以苦子杏仁大深吸鼻中出黃水而癥
急黃者脾胃有熱穀氣鬱蒸因為熱毒所加故卒然發黃心滿氣喘命在頸刻故云急黃有得病即身熱面白發黃者有初不知是黃死後及身面黃者其候得病但發熱心戰者是急黃也宜連用桔子丸

諸疽口淡怔忪耳鳴脚軟微寒發熱小便白濁此為虛証宜

四君子湯吞入味丸不可過用涼劑強通小便

脉經曰寸口脈近掌無脉口鼻冷並不可治傳冷字作黑字

黃茂散

治黃汗并蜜 赤芍 苒 各三 膏六 門

豉各一水半 甘草各七 右分二貼入姜三片

茵陳散

治黃疽并通 桔各一分 大炒一水膏二分

薯一分 甘草八右作一貼姜三片葱一莖水煎

黃連散

治黃疽二便秘滯壅熱累動

連分

大

一兩
拌炒
醋

芩

甘

炙五

右為末

每服一錢食半飽溫湯調服

日三服

梔子丸

治時行忽發如腹脹氣喘不治

茵梔

大

蒸各二

杏炒一錢

半水浸

敝魚

醋

巴

去油

炙

右為末餅

丸如桐子大

每服三丸米飲下得吐利

加九此証

人最急如覺

躊躇氣有異便急制衣服之不拘時

茯苓梔子湯

治黃疽寒熱嘔吐而渴欲飲冷身自黃小便

不利不得安卧

全不思食

白芩二

澤

半水

茵三

巴

去油炙

右為末餅

芩連梔

大根實炒

芩白朮

二味並米

陳青各一

右水煎

一方加枳實炒

芩連梔

大根實炒

芩白朮

二味並米

陳青各一

右水煎

茵陳蒿湯

治穀疽寒熱不食食即頭眩心中不安

葛根湯

大四分

梔一

右

右水煎

本方去葛根

加大

名梔子根實大黃湯

大根實

葛根各三

甘炙半

酒蒸黃連丸

連去鬚三好酒五升

右將黃連以酒煮乾為度

為末水煮麪糊丸如梧子大

每服三十丸食後

一陳湯葛

茵等分姜棗煎湯送下

傷酒下血米飲吞下

白木湯

治酒疽下後成黑疽

目青面黑心中如啖韭狀

太便黑皮膚不仁脉微

而數

桂术

桂枝炒各

葛

杏去皮尖炒

甘炙各一

右入姜

當歸白朮湯

治酒疽發黃結聚

飲癖心胸堅滿

不飲食

木芩枳

枳炒前杏去皮尖炒

甘炙各二分

歸酒侵

芩甘炙

茵各七

半半

右分二貼入姜三斤

辰砂妙香散 治醉後行房酒熱苦心經 方見遺精門二

再加辰砂箇藤湯下

入參散 治飲酒房勞酒入血脉恍惚失常

參枳炒楚

桔白芍神酸各二分

熟地一两右水煎

○傳一方治黃疽 蒼連 楂茵 猪澤 蒼青

膽各五分

穀疸加稜 義縮 陳麵一右水煎

硝石礬石散 右二石等分煅為末每服一錢以大麥粥汁一和

服取汗愈

茯苓湯 治胃疽消穀善飢面色萎黃心中煩熱胸脇脹滿小

便赤瀉 赤苓 陳去白澤桑各三分赤芍木參

桂各二分膏八分病甚者加大黃朴硝各二分右作服加姜片

桂枝湯 治胃疽目黃或渾身黃小便赤瀉升菴卷

風藁紫葛木各半荳猪四澤甘麵炒

參各三分芩柏各二分右一方無芩有

茵陳五苓散 治傷寒或伏暑發黃小便不利煩渴

本方加茵入姜東煎服

茵陳茯苓湯 治發脈沉細數四肢冷尿澁煩燥而渴

芩枝猪各一滑一条茵二分右煎服如脉未出加歸一

茵陳四逆湯 治發黃脉沉細而遲肢脉逆冷腰脊自汗

甘炙一姜炮一附一枝作茵二分右

○養榮湯 治五疽脚弱心忪口淡耳鳴微寒發熱小便白

當作虛勞治之 方見虛損門

林秦艽散 治證同前

芍歸酒

芍桂陳赤苓

熟地 小草 芳 各一 半七 甘淡半右入姜

分

外

右入姜

治黃疽一絲瓜連子燒灰爲末因麪得病麴湯下因酒得病

酒調數服可愈

一方濃煎樺木汁時時飲之多服効

一方柳枝一把濃煎汁不拘時服

治急黃疽百合蒸蜜和食之作粉食尤佳

仙丹花不

治皮膚眼睛如金色生蔓菁子爲末熟水調每服三錢

者可用

擗食白花

治黃疽身眼皆如金色

東引桃枝一握細切用冰二錢煎至

一鍾去心空心酒服服後三五日黃如薄雲散多服瘥百日

方平復身黃散後可待時飲一匙飲酒則眼紅且勿食

治黑疽多死宜急治

括蓼根竹搗絞汁六合頓服當有驚

水隨小便出如未出更服之

△消渴門 八

○傳經曰陽結謂之消 東垣曰二陽者陽明也手陽明大腸主津液不足也足陽明胃主血若熱則消穀善飢血中伏火乃血不足也結者津液不足結而不潤皆美而多肥故其氣上溢轉為消渴

岐伯曰脉實病久可治 脉弦小病不可治

丹溪曰三消者多屬血虛不生津液俱宜四物湯為主上消者肺也多飲水而少食小便如常加參門 五味

天花煎入生藕汁人乳飲酒人加生葛汁
中消者胃也多飲食而小便赤黃加知膏滑寒水石降胃火
下消者腎也小便濁淋如膏加柏知熟地五味滋腎水
未傳能食者必發腦疽背癰不能食者必傳中滿鼓脹皆
為不治之証

能食而渴者白虎加入參湯

不能食而渴者

錢氏白朮散倍葛

太法黃連 天花粉二味為末藕汁人乳汁生地黃汁
佐以蜜姜汁為膏和二味留舌上徐徐以白湯少
許送下能食者加石膏

天花粉 治消渴之聖藥也

飲食滋味皆從小便消焉是水火不交濟然不孰知脾
土不能制腎水而心腎二者皆取氣於胃乎當服養
白朮散以養脾自生津液兼用好粳米煮粥以薺肉碎
細入鹽醋油葱林茴調和少頃粥熟而後入以此養腎
則水有所司

○凡消渴大忌飲酒房事食油麵煎灸燭藏鹹物及一切熟
物百日以上不可針灸瘡中生膿水或成癰疽膿水不止
者死

○傳和血益氣湯 治口乾舌乾尿數舌赤生津除燥生肌
紫甘炙 生甘麻黃根各三分歸梢酒洗口酒
酒洗各桃去皮尖各六分生地酒連酒洗柏洗升各一紅少半
酒洗各桃去皮尖各六分生地酒連酒洗柏洗升各一紅少半

右水煎 忌酒醋熟溫麵

當歸潤燥湯 治小便多大便秘渴好溫飲舌乾口燥眼

澁難開陰頭退縮

細分 生甘

炙甘 熟地各三分

柴分 栢酒

知洗

膏桃歸身

麻仁風

荆穗各一

升半 紅少

杏許

小椒粒

右水煎

忌辛熱物

生津甘露湯

一名清治消中能食而瘦口舌乾自汗太便

結燥小便頻數

酒膽

膏柏各一半

芪炙甘柴

卷各一

歸身六分

升四分

生甘生地

風漢已各三

紅少

桃五

杏十

右水煎入酒一匙稍熱服

辛潤緩肌湯

前証

愈止有口乾腹不能努此藥主之

生地細各一

熟地膏各四

柏酒連

生甘知各半

柴

參术歸芍

大柏酒

荊穗苦桔知

澤各五

芩黃丹漢已

薯各等爲末溫漿調下

參散

治腎消善飮而食小便頻數白濁如膏

芩黃丹

葛各一

藿兩

青木桂

寒水石

芩翹

桔葛各一

藿兩

青木桂

寒水石

絳雪散

治消渴飲水無度小便數者大効

芩黃丹

漢已

薯各等爲末

溫漿調下

人參散

治腎消善飮而食小便頻數白濁如膏

參一木澤

桔柏翹縮

葛芩太苦

白芩各五

甘膏一

滑寒各一

右水煎入蜜許

腎消食前

上消食後服

麥門冬飲子

治心移熱於肺名曰謃消心膈熱久則引

上消食後服

飲為消渴 門一升 括 知 甘 五味 生地 參

葛 神各半

右作二服

入竹葉七片

原蚕爾畱湯 治腎消白瀦及上卡下消飢渴不生肌肉其効如

神 原蚕

却再養晚蚕也其繅絲湯極効如無絲藥絲湯以前殼絲綿煎湯皆可代之

林防風羌活散 治一陽病心脾受之精血虛少真氣日漸口

乾

葛蜜炙一

羌解風枳

參

生地

芩

蠟

附炮五味

膝各一續立

地骨

七分

右水煎

參芩丸

治胃中結熱消穀善食不生膚肉名曰食休

參芩

葛遠

膝浸酒

地骨

各等分

右煉蜜丸米飲下

加味白朮散

治消穀善食

參术

芩

甘炙藿

各半

右水煎

葛

三分木枳

炒

五味

柴各八

右水煎

生地黃飲子

治消渴咽乾面赤煩燥

生地

天門

麥門

參芪蜜斛

炒枳杷

甘炙各一

澤熟地

各一半

右燒蜜丸湯下

六神湯 治三消渴疾

蓮房葛杷毛

括

葛蜜

右分三貼

三和甘露飲

大治消渴有此証者每日必須進一二服

甘

右等分小便不利加芩

渭六

膏四

知木

芩澤各一

澤各一半

右燒蜜丸湯下

加葛粉

天花粉各一

水煎

降心湯 治心火上炎腎水不足煩渴引飲氣血日消

遠用甘草煮去心歸身熟地白芩

葛蜜五味

各二分

右燒蜜丸湯下

天花粉

右入東東煎

食後溫服

三消丸 治消渴骨蒸

黃連為末搗冬瓜自然汁和

末成餅陰乾再為末再用冬瓜汁拌和成餅如此七次
又用冬瓜汁丸如梧子大每服五十丸冬瓜煎湯下或大

麥煎湯

黃芪湯

治肝消飲少溲多

芪

五味參門

桑炒各

枸

熟地各一半右

括接散

治恣慾

腎虛弱

不能房室

却多服丹石燥藥唇

口乾焦精自泄

小便頻

併白苓

天花連

白扁

膏

木甘節

寒水參

猪右等分為末白湯調下

珍珠粉丸

治腎消白液

因溲而下或夢遺精滑

方見尿濁門

三才封髓丹

治証同前

方見虛損門

烏梅木瓜湯

治飲酒積熱血濁焦枯

小便多、肌肉消好冷飲

硃砂黃連丸

治心虛蘊熱

或因飲酒過多發渴疾上

辰生地連

右煉蜜丸

煎燈心末末湯送下

酒蒸黃連

丁方黃龍丸

解酒毒止渴

三神湯治証同前

烏梅遠

中草者去心姜

實

麸炒

右每服七錢糯米根一握

如無以荆根代之

夏加連

不加

加減八味丸

治腎水枯竭心火熾煩渴

尿數膚肉日削

熟地丙山藥炒山茱萸桂各一

半

半

半

半

半

半

半

半

半

右煉蜜丸如桐子大五更初未言時

鹽湯送下

五十九午前

日晡一日三服

房勞傷腎水竭

心火炎上口舌焦乾

消渴

消渴

消渴

消渴

便敷精神恍惚羸瘦加鹿角

丁

鏗

沉

半

半

半

半

半

半

消痞丸

治三焦壅滯

痺熱消渴及心火盛而咳血下血

等証

連葛

黛丑

未各芩大柏梔

芩

柏

梔

梔

梔

梔

梔

藿朴茴

炒各二分桂木各一右水糊丸食前白湯下

加減三黃丸

治消渴及服丹石成消渴上

芩春四兩夏秋六兩冬

連春四兩夏七兩秋三兩冬二兩

大秋三兩冬二兩

右

煉蜜丸

錢氏白朮散

亦治消渴

參三

朮甘各一

藿

朮各一葛括各三

右水煎空心送下

三黃丸最妙

白虎加入參湯

治消渴而小便濁成澁

方見尿濁門

清心蓮子飲

治渴而小便濁成澁

方見尿濁門

玉泉丸

治煩渴口乾門參芩芪

半生半

烏梅焙

甘各一括葛各一

右煉蜜丸溫湯下

玉壺丸

治消渴引飲無度

參括各等煉蜜丸門湯下

治肺燥熱渴大腸秘

括薑實九月十月間取糲以葛粉拌

分

煉蜜丸門湯下

主胃中熱消渴利尿

陳粟米炒散食之良

△諸蟲門

九

○傳經曰腸胃為帶無物不受無物不包又曰飲食自倍腸胃乃傷若夫飲食不能謹節則朝飧暮傷自傷成積積以成熱濕熱相生而諸般寄生之虫各從五行之氣而化生若麝草為螢之類是也若夫膈噎勞瘵癰風蠱脹疽惑等訛無不

生蟲

丹溪曰濕熱之生虫藏府虛則侵蝕上半月虫頭向上易治下

半月蟲頭向下難治

已近月字並宜依日字蓋虫無半月轉頭之理

先以蜜或砂糖或炒肉吃引虫頭向上然後用殺虫藥

薰艾根濃汁龍膽水煎青黛麪糊丸水下雷丸末

腹內熱腸胃虛虫行或食上唇有瘡日惑虫食其藏下

居有瘡曰孤虫食其肝

○鑑藏寒蛔虫動作上入臍中煩悶嘔吐時發時止得食即

嘔常自吐蛔謂之蛔厥

○林庭白蛈者長虫也胃中冷昂吐蛈虫謂之蛔厥
理中湯加砂門椒粒一枚吞烏梅九粒蛈見椒則頭疾故也

鳥梅丸

梅

細

附炮桂

參

柏

各六兩

歸

椒

各四兩

姜十

連十六

右以苦酒

浸烏梅

一宿去核

蒸搗成泥

餘

藥

為末

和勻入蜜

杵丸如桐子大

每服三十丸

米飲下

集効丸

治藏府虛弱

多食甘肥

蛈虫

動作心腹

病疼

發作

從來腹中煩熱

口吐涎沫

昂是蛈咬

又療

下部

有

連

柏

婦人

醋湯

下

傳有鳥梅

二十

一方有連

柏

各一

附皮

膚

蕪

燒

姜

兩

三木

右煉

蜜丸

陳皮湯

下

化虫丸

小兒病多有虫因藏府虛弱而動腹痛

蛔咬

又療

下

部

有

連

柏

各半

水面

青黃

寒熱

沉嘿不知

痛處

虱

換

胡粉

炒

根

去浮皮

白礬

一兩

二

右

練

根

各五兩

白礬

水半

右為末

麵糊丸

如梧子大

一

歲

五九米飲

下

木香三稜湯

治腹中有蟲

面色痿黃

一

積滯

黑丑

米炒半生二兩

腹皮

一枚

雷丸

各二

大

棗

各二

雷丸

一

錫灰

醋

稜

燶

莪

木

大

各一

右為末

每服三錢

空心

蜜水

調服

遇仙丹

逐蟲積消癰

癰

癧

痲

一枚

大

棗

各一

右為末

每服三錢

空心

蜜水

調服

五丁子

朱木多小

右為末

白角

半支皮

核切碎

用永木

碗浸丁宿冬

二宿去粗

磁器熬膏

膏得冷和藥

丸如桐子大

每服四十丸

半宿加減茶清五更初下如未通再喫溫

茶清助之下

虫積惡物盡了白粥補之

○傳 桃仁湯 治狐惑之証

桃 槐子 艾各五

大棗一枚

右水煎

雄黃銑散

治前証

雄青葙子

苦參

連各二

桃木

右為末

搗新艾

汁和捏

如小指頭大內

穀道中治蟲食其肛也

外甚至化虫丸

能化虫為水

硫一

木五

蜜陀僧

附子

炮散

右先以附子末醋一盞敷臂餘藥為末和匀丸荆芥茶清下

一方

黑鉛灰

朱末

各等分

米飲調下

一方

棟根 風 桃

三味濃煎湯飲之

一方

酸石榴根東引者

根細切右以

水七升煮取

二升半去

一石半去

粗用晚糯米

三合煮糜

空心吃

先吃炒肉引蟲而

上進藥

疎一

口少嚥

吃一上一

漸加至一

碗二碗虫盡下

而愈

祖傳楨榔丸

治小兒疳病積塊腹痛有虫証

葛根

細茶

酒

葛根

細茶

葛根

細茶

葛根

并細切醋

各五升

楨

一兩

青

去穎

陳

白

雷

漆

蠶麪炒

麵糊各

五升

葛根

二升

風略

甘草

木

火

胡連

炒各

三升

葛根

二升

葛根

一升

葛根

葛根

葛根

葛根

葛根

葛根

葛根

葛根

林治蛔虫

攻心痛

薏苡根

二斤

水七升煮

三升食食盡

服之

治蛔虫

攻心如刺

吐清水

龍腦一

水

葛根去粗

陳宿平且

頓服

治蛔心腹痛

青黛

葛根

水浸去皮切焙乾

為末五更

初先食多肉

治白蟲

雷丸水浸去皮切焙乾

為末五更初先食多肉

便以一錢七藥稀，粥調服之。

又 檬子日食七顆，白瀉魚化為水。

治薑食下部癢，扁畜一杷水二升，煎空心服。

○夫人腹中有虫，此物與人俱生，而為人大害。凡治諸虫，
之道，察寒熱虛實，辨脉之浮沉遲數，隨脉証施藥，
小兒藏府弱，食肥，背動，腹痛哭倒，嘔水涎面青，飲食不進，
生肚脹，或寒，或熱，或沉沉默默，其虫不早治，相生不已，
長一尺，則能害人，虫若貫心，殺入。

○金治寸白蟲妙方，木，桃，右朱，每服三錢，先空心嚼，猪
肉之類，只吞汁吐滓，便服藥，調米飲下之，辰巳，其病永除。

▲ 痰血門

十

○四物加知柏，為主治。

○傷寒、血者，邪氣不得發散，壅盛於經，逼迫於血，因
而致衄也。角經中，邪氣則愈，脉浮緊，麻黃湯，浮緩，
桂枝湯，微者二藥俱不可用，宜黃芩芍藥湯。

○人參飲子，治衄血，門，歸身，白芍，甘各一參。

○芪各一
木半
五味九
右

○生地黃散

○治齧熱，衄血，咯血等証，

○生地

○熟地

○枸，地骨，柴連，白芍，甘，天門，芩各等，右

○林門冬飲子

○治衄血不止，門，生地，分右

○五黃丸

○治衄血不止，大便結燥者，大芒，生地，各六

○甘，一連三梔，芩二

○右為末，煉蜜為丸，如桐子大，每服

三十丸，食後白湯，下。

葛根散

治血終日不正心神煩悶

葛芩

膠粉

側柏葉

生地各三

甘炙一

右入龕

川芎三黃散

治積熱衄血

大煨

芎芩連各等分

右為末每服三錢食後井水下

止衄散

治氣鬱發衄

葛參

赤芍

白芍

歸酒

浸生地

膠炒各

右水煎臨卧服

○^五黃芩芍藥湯

治衄血多歲面黃眼濁手麻

葛三

甘炙二升

葛各一兩半

右

○^金治衄血

四物加側柏葉煎服

蘇子降氣湯

治衄芩芍甘各等分

鷹嘴香散

枯凡

龍骨各五分

治壅虛鼻血

方見瘻飲門

○^林治衄血百治不正

蒲黃血竭為末吹之

○^林灸法

甲鼻出盜不止

灸上星五十壯在入髮際二寸

○^傳又太推

啞門灸二三壯月止啞門入後髮際五分

吐血門

十一附唾血咳血瘀血

○^傳凡諸見血證皆是陽盛陰虛君相二火亢甚煎迫其血而出

○^{諸竅也}

悉宜四物湯加知柏為主治

衄血咳血瘀血者

皆從肺中來也加酒洗薄芩茅花

嘔血咯血及潮熱咳嗽

從胃中來也本方加石膏知柏

嘔血咯血及潮熱咳嗽

從胃中來也本方加石膏知柏

桂少許

治吐血ノ 銀金為末以姜汁童便和好酒調服
又童便二分酒一分搗側柏葉溫飲之ヲ

又乾姜炮為末童便調服

梔字最能清胃腕之血ヲ

唾血用二門知貝桔柏熟遠或加干姜
咳血痰盛身熱多是血虛用薑荳貝梔海石

為末姜汁蜜丸噙化

嗽盛者加杏後八物加減調理

三黃補血湯

治吐血ヲ

芍

生地

各二

牡

升

各半

右

芍 生地 各二 牡 升 各半 右

黃芩散

治咳血成瘀方見咳嗽門

一方 治癆帶血咳出

木半 歸 芍 牡 各一 桃

甘

各半

右水煎

膠 球貝

茅 各一

桔 蒲

黑門

甘

各半

右水煎

林有嗣纂

水

犀角地黃湯

治吐衄血

方見傷寒門

四生散

治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行

生艾葉

生地

各半

右水煎

生荷葉

聖餅子

治咯血 黰一杏四十粒炒右研杏仁入 黰末作餅

生艾葉

細研丸

鹽湯下

子以柿餅一箇破開以藥餅置於柿中合湿紙包煨連

柿研細米飲調下

○林赤茯苓湯

治暴怒傷肝氣逆胸中吐血衄血

赤苓 參 桔

陳 各三門

芍

梅 各一

右加姜

歸脾湯

治思慮傷脾心健忘吐血下血

方見怔忡門

赤苓 參 桔

陳 各三門

芍

梅 各一

右加姜

加味理中湯 治醉飽傷胃吐血其色鮮紅 參 姜炮

木各三分 术二分 葛二分 甘灸一右

白朮散

治飲食過度負重傷胃吐血 白芍 术 參

芍蜜炙各

山百合前柴各六

甘灸一右入姜枣

雞蘇散

治虛損氣逆吐血不止 雞蘇 茗各一

歸浸各

芍各七

膠炒三

芍灸

小蘗生地各半

伏龍肝

水半

右分二貼

姜三片竹茹一彈大

側柏散

治內損吐下血或因酒太過血妄行口鼻皆流須臾不救則死

側蒸燒

荆穗燒灰各

右為末

入飛羅麪

一錢每服一錢新汲水調如稀糊空心啜服

生地黃散

治衄血吐血下血屬熱者方見衄血門

陳各半

右水煎

一方治吐血 百草霜 白芷 各等為末每服一二錢米飲下或加蚌粉等分治損傷吐血用側柏葉研汁

調下尤妙

一方治吐血

百草霜 白芷 乾為末每服二錢米飲調下

一方治吐血

陳槐花炮各半

右水煎

黑神散

治食飽吐血并血妄行口鼻俱出聲未矣皆効

百草霜

取村中燒草鍋底煤最妙為末每服一錢糯米飲調下

傳舌上出血如線

槐花炒末摻之

又蒲黃炒焦末付之妙

○林炎法 治虛勞吐血 焚胃脘三百壯昂上腕三百壯昂上腕在巨闕下一寸

○治吐血唾血上氣咳逆 焚肺俞午壯 治吐血嘔血 焚太陵穴在掌後兩骨間手厥陰經之俞之穴也

△下血門 十二

○傳大便下血有熱有虛 热四物加炒梔 升丸 膠
便血有風邪下陷者蓋風傷肝脾生益故也須升提之
虛四物加乾姜炮升

○四物加風 荆升柴 升丸 槐枳條芩 地榆
有濕傷血者宜行濕消熱 二木連柏歸芍 苓槐地榆
因積熱下血 蒼 蔥 陳各一 韶五 蔥 連 柏各七

○血糞後來曰遠血 四物加通連
心治近血面色黃 榴皮末 茄子枝煎湯調一錢下

○治遠血不止 艾葉 不以多少姜汁二合和服

○五治先血後血 赤豆 濑出歸等

分為末將水水調服

○治先糞後血 伏龍丹 炙甘 熟地 膠芩 术各三

○右㕮咀水煎服名龍肝湯

○惠勝風藏毒因坐臥 風濕醉飽房勞生冷停寒酒麯積熱取致挾熱下血清而色鮮腹中有痛清腸風連柴
挾冷下血濁而色黯腹中略痛濁藏毒 桃 蘸

○治法大要先解散腸胃風邪熱則敗毒散冷者不換金氣散

○一方治腸風下血 桃 大各三歸

○傳

○一方治腸風下血 桃 大各三歸

○傳

○一方治腸風下血 桃 大各三歸

枳各五 蟲皮勿利 黃ス 連炒 兮 槐角子各一 右為末麥糊丸如桐子大每服五十丸白湯下如鮮血下甚者加棕

柏灰 蓮房灰各五

治便血ト 白芷 五倍 丸服効ヒカク

烏梅丸

治下血ト 如神

蚕一两

鳥梅肉一两 右醋糊丸醋湯下

槐花散

治腸風藏毒下血ト

槐炒

側柏葉半

荆穗

枳麸炒等分

右為末空心米飲調下

加減四物湯

治腸風下血ト 生地

歸

芍側各八

枳麸炒

槐炒

荆穗

甘葛各四分

地榆

條芩

風各六

鳥梅大者

丁今

右入姜

當歸和血湯

治腸澼濕毒下血ト

槐炒

青 荆穗

秘方 枳蔻湯

治腸風下血ト

枳麸炒

連一两

以槐花

槐右水煎

升陽去熱和血湯

治腸澼下血ト 別作一派喝シテ 然出者有

而遠ト 四散腸中痛熱 毒所 作也

陳二分

熟地

歸身

林各

大

葛各三

生

地

壯

生

甘

各

五

升

甘

各

七

升

甘

各

八

升

甘

各

九

升

甘

各

十

升

甘

各

十一

升

甘

各

十二

升

甘

各

十三

升

甘

各

十四

升

甘

各

十五

升

甘

各

十六

升

甘

各

十七

升

甘

各

十八

升

甘

各

十九

升

甘

各

二十

升

甘

各

廿一

升

甘

各

廿二

升

甘

各

廿三

升

甘

各

廿四

升

甘

各

廿五

升

甘

各

廿六

升

甘

各

廿七

升

甘

各

廿八

升

甘

各

廿九

升

甘

各

三十

升

甘

各

卅一

升

甘

各

卅二

升

甘

各

卅三

升

甘

各

卅四

升

甘

各

卅五

升

甘

各

卅六

升

甘

各

卅七

升

甘

各

卅八

升

甘

各

卅九

升

甘

各

四十

升

甘

各

四十一

升

甘

各

四十二

升

甘

各

四十三

升

甘

各

四十四

升

甘

各

四十五

升

甘

各

四十六

升

甘

各

四十七

升

甘

各

四十八

升

甘

各

四十九

升

甘

各

五十

升

甘

各

甘半
右水煎

日金三

芍藥黃連湯

治大便後下血腹痛謂熱毒下血

連歸

芍酒浸各

大桂各一

甘灸半

右水煎

痛甚調木換末送下三黃丸

聚金丸

治因酒毒大腸蓄熱下血不已

芩風各一

連四兩生

酒浸一兩

火煅一兩

右醋糊丸空心米飲下

平胃地榆湯

治結陰便血

木陳

芩朴

葛姜各半

芩升

地榆七

甘炙歸

麵炒

白芍參

益各三

芩升

槐角散

治腸胃不調脹滿下血

蒼朴酒

浸入陳歸

枳各一

槐角二

甘

烏梅各半

右水煎

茄蒂

燒存性

卷柏散

蒲毒神效

卷柏各一分

為末米飲

調下

年者尤佳

又柏子

粒五十

研破袋盛

用酒二盞煎

至一盞服

初服一錢亦可

再服立止

又荊穗

縮等分

為末米飲

調下入百草霜一錢亦可

清米飲調下二三錢立止

○傳治渴血

乾柿餅燒灰存性

卷柏各一分

為末米飲

調下

年者尤佳

灸法治便血不止

灸脊中

對臍一穴

○林又灸

勞宮二穴

在掌中橫紋屈無名指著處厥陰之經

榮也中指頭無名指頭間也

又灸太白二穴

在足內側核骨下陷中

太陰經俞穴也

又灸會陽二穴

在膝下三寸

骭骨兩傍

○至又灸三里二穴

在膝下三寸

骭骨外廉兩筋間舉足取之

按火熱脉盛實者非所宜

溺血門 十三

目錄三

四十四

○玉尿血 因心腎氣結或憂勞或房勞得之，
心尿血屬熱有血虛 热炒槐水煎服 血虛 四物

加膝 生地

○傳小便出血不痛者血從精竅中出也四物加連梔條芩，又曰血出於小便者或四物加瞿門梔以清之或四物加滑通大小薊以行之

○渴潤血或四物加連棕灰或用六味地黃丸方見淋門治潤血髮灰每服二錢淡醋湯調下

○治潤血神交生地四分小薊滑通炒蒲燒竹葉
藕篇 歸酒梔黑各半分甘桂各七分右水煎

○林生地黃飲子一名生地黃散方見血門治潤血屬

○熟者如脈微身涼惡風加桂

一方 竹茹一大塊水煎服

又歸芍為末每服二錢米飲調下

○治尿後有血乾柿燒存性為末米飲調下

○治小便出益酒蒸地黃丸方見血門治潤血屬

○又辰砂五苓散方見傷寒門火心煎湯調服本方加辰砂，茯苓調血湯治酒麴過度房勞小便出益方見淋門

鹿角膠丸 治証同前

方見淋門

○傳小兒尿血 甘草升麻煎湯調益元散，凡用血藥不可單行止又不可純用寒涼藥必加辛溫升藥，

○傳小兒尿血 甘草升麻煎湯調益元散，凡用血藥不可單行止又不可純用寒涼藥必加辛溫升藥，

如用涼藥用酒煮酒炙之類乃寒肉熟用之法也

△脫症門

十四傳症，膏下部病也。俗作肛非。

○脫症屬氣血虛與熱

氣虛參芪升芎

血虛四物加茅桂一

熱加柏

一方 治腸風下血等証

乾柿餅燒存性

酒瓶箬包酒過酒

槐花半兩炒

枳半兩炒黃色各二兩

百藥煎一兩如無以五倍子炙焦黃代之

七八十九醋湯下或加枳半兩

蝟皮散治肛門或因洞泄或用力脫症

蝟一枚燒存性

磁石煅桂各五

右為末每服二錢空心米飲下

若女人陰脫加鯛魚頭一枚燒灰研

香附散治脫肛歷年不愈生鉄

水一斗鯛取五分洗之日無

水一斗鯛取五分洗之日無

赤石脂末摻芭蕉葉上頻用托入

小兒脫肛五倍子末蜜調攤油紙上貼之手托

一方 加鷄角醋調如前用

蛤散五倍子為末水煎洗更入白礬蛇床子尤佳洗後用

赤石脂末摻芭蕉葉上頻用托入

木賊燒存性為末摻肛門上按入即愈

一方 治脫肛煎葱湯洗軟用芭蕉葉托上

一方 治鴉多時脫肛疼痛大蜘蛛一百草霜

子內燒令黑存性取出細研入黃丹少許同研先用白凡葱

根煎湯洗拭乾後將藥末摻之將手掌按托妙

一方 石灰炒熟以故帛裹坐甚上令即易之

一方 烹麻鞋底頻按又故麻鞋底敷魚頭各一枚燒敷魚頭

揭為末，薄肝門，將難底按入即不出。

一方 蒲黃一猪脂兩右煉豬脂和蒲黃成膏塗之。

○治脫肛 香附荆縮右煎洗，又煎服亦可。

○一方 陳壁土泡湯先薰後洗。

又以莎荆等煎湯洗之，摻五倍子細末緩緩揉入。

○一方 艾葉濃煎湯浸之，即收。

○一方 艾灸脫肛太入長強穴七壯。又灸臍中壯，小兒百會穴三

壯。又灸長強穴。

△疝氣門十五

丹溪曰：病氣者，畢九連，小腹急痛也。有痛在畢九連，痛在五樞穴，當引足厥陰之經，則收而不行。所以下部以寒益寒，主收引經絡得寒，則收而不行。所以作痛大抵此証始於濕熱，在經脈而至久，又得寒氣外束，不得諫散，以作痛，若只作寒論恐為未備。

以鳥頭 柚子作湯服之，効速後隨証加減。

又當分濕熱多少，而治濕則腫多癰，病是也。

又有挾虛而發者，當以參木為君，疏導藥佐之，棟子

茴香 枳實 山楂 柚子之類。

三因葱白散 治寒疝作痛，芎歸枳炒朴炒。

茴炒桂青芩 姜棟 麴炒 藥稜炮 薑炮。

熟地木白芍參各等分，右每服五錢，葱白二莖。

鹽少許水煎空心服。

吳茱萸湯 治厥疝腹中冷痛，積氣上逆，陰囊冷。

茱半川鳥炮去皮細各七

良歸姜炮桂各二

右水煎

蒺藜湯治陰疝牽引小腹痛

蒺藜去刺附炒去皮膚

梔子右水煎食前溫服

沉香桂附丸治脾胃虛寒心腹痛手足厥逆便利無度七病

引痛

沉附炮川鳥炮姜炮桂良吳茱炮

茴炒各一兩

右為末醋煮變糊丸空心米飲下

加味五苓散治疝氣卒腹痛小便秘滯

方見傷寒門

本方加棟子一分為末每服二錢空心米飲下

祖傳馬蘭花丸治七疝癲氣及婦人陰癩墜下小兒偏

墜等証馬蘭花炒棟子橘核海藻海帶昆布

味

僵鹽桃去皮尖酒洗各一兩朴製通實桂木

各半

一方治疝橘核炒桃柏炒茱炒川鳥炮右水煎

小腸氣腎核脹痛荅陳各二

甘芍蘇各半

右酒水

各一盞連鬚葱白五葉煎服

丁香棟實丸治男子疝痛婦人瘕聚帶下皆任脉所生也

歸附炮茴炒棟各一右細切用好酒三升煮酒盡為度

乾為末每末一兩入丁木各半

延全蝎

炒石蠍

與前藥拌勻酒糊丸空心溫酒送下

烏藥散治小腸疝氣牽引臍腹痛

鳥木茴

炒

良谷牛枳椇

根

棟子放

巴根十七右先以巴微打破用棟

子炒黑去麩及巴不用其餘藥同為末

每子錢溫酒下

甚者姜酒調下

當歸散 治疝氣大使秘
陰囊引小腹痛。久病者不治。

桂
丑 炒取頭末
各半茶
歸 大
桃 去核皮炒
各二茶半
全蝎 七条
半

右剉每十錢入蜜一錢煎服後以青陳芩木

甘生姜等分煎服和胃

丁方諸病發時用海石香附等分，右為朱姜汁調服一錢。

亦治心痛。一方去参，加茵芋一斤，生薑、芍药各一两，盐一钱，百酒炒，早服。

○一方治丸 築葉 炒木上ノ爲君ト書延
已上ヲ付鹽 苗甘炙ル已上ヲ古頭流水煎服ニテ益

參臣內炒 十一
金加味通心散 治腎膀胱實熱小腸氣痛小便不通
不順治水道首尾
為使子

瞿通梔莖翹甘枳棟各等右加沙心車前子

補腎胃湯 治寒疝入腹リハツ，小腸氣痛時泄濶胸膈痞塞キツコクヒツセイ。

蘇半七家右加姜束束一嘔吐加半夏半生姜七

敷法 治臍瘻偏墻
又臍瘻偏墻 蠕熾 良各一右為末，喉調傳

五葉湯 洗肺痛
杞葉 蘇葉 蒼耳葉 蒲葉

桃葉水煎洗痛立止

灸法 太敦二穴在足大指端去趾甲二分葉及三毛中
土上十全玉堂之旨 ハセキラノサカナリ

灸三壯，金曰足太冲聚三口。天柱為上，三手骨下陷中灸三壯，或蒸脾。

三陰交 三焦 命門
太陽 腎經 脾胃
太陰 胃經 脾經
太陽 腎經 膀胱經
太陰 胃經 脾經

亦在腹內氣海穴七壯在臍下寸半

又灸臍左右各去一寸半名外陵灸七壯立効永不發

○諸氣心腹痛
痴氣小腹急痛
足大指次指下中節

敘當中炙五壯男左女右極妙

又治病氣偏墜

閑元灸百壯在臍下三寸

治陰肺偏大癰病，又量病人口角兩角為一摺，如是則三摺成三角，如△樣以一角安臍心兩角在臍之下，兩旁盡處是穴，左偏灸右，右偏灸左，一七壯。若灸兩邊赤無害。

秘方 治偏墜氣神効

五去風

歸子

用五

火

燒

廩

存性

右為細末

以好酒調服，以醉為度，立効。

○林小兒疝氣偏墜，將兒帳物扶向上，張頭盡處是穴，灸三壯。如在左斜扶向左盡處，右亦如此。大人亦依此法神効。

△ 飽逆

十

傳韻書與飪通氣上逆，作聲之名也。古方以爲飪逆，爲咬逆，又誤以爲咳，嘯爲咳逆。孫真人誤以爲噦，爲

林雜記曰：古人謂之馬瘞，其說以是而非蓋瘞者

乾嘔也。如有物直出，則爲吐也。嘔物旋出，則爲嘔也。嘔無物出，則爲噦也。咳逆者，或水漬於肺，而心痞，或連續不已，而氣逆，或喜笑過多，而氣噎，或嚥飲而錯喉，而氣搶，或急食乾物，而氣塞，皆能作咳逆之聲，連續不絕。俗謂之吃忒，是也。太抑欬逆者，不順之義。吃忒者，差錯之義。二者皆氣不得下，爲火熱，托之而使上至咽喉中，噎而止也。或以紙撫鼻，嚏而止，或詐寃盜賊，因恐而止，或鼻熱聞食香，調氣而止，皆抑之駭之而使氣下也。

○傳大率有痰，有氣虛，有虛火，上衝視有餘不足，治之，廢與食在上者，吐之。參蘆稀涎散之類。

不足者補之，參木煎湯，下火補丸。

痰用陳半，氣虛用參木，陰火用連柏滑，飪逆自汗，滑

甘 柏 芍 參 术 陳 竹瀝

參 木煎湯調益丸散頻服自止

陳皮竹茹湯

治傷寒餘熱未解氣虛發飴

陳去白
三丸

青竹茹四
糸

參二
糸

甘炙一
糸

右入姜束

橘皮竹茹湯

治胃熱多渴嘔噦惡心不進食飲

陳 茄 赤苓 柏

門 半

各二糸

炙甘

參各一
水

右入姜

橘皮乾姜湯

治欬逆不止

陳

姜桂通草

甘炙各
二兩

參一
糸

右

六君子湯

治痰挾氣虛發飴

陳

苓

參各一
糸

术半

丁香白散

林生姜半
半
右入姜束

丁
糸

橘皮帶
糸

各三
糸

右入姜五
糸

生姜半
糸

右水
方水

右為末每服一錢熱湯調服

桔帶湯

治胸滿欬逆不止

桔帶

丁各三
糸

右入姜五
糸

王六

一方加青
糸

陳芽分
糸

卷活附子湯

治吐利後胃寒欬逆

卷

附炮

尚微炒各
半兩

木 姜各
糸

右入鹽一
糸

捻水煎熱服

一方無木有丁

大承氣湯

治欬逆太便祕者

方見傷寒門

渴心湯

治咳逆太便軟利者

連一為末水調與之

皂莢丸

治欬逆上氣時時唾濁但坐不得眠

皂
皮用醋煮右為末煉蜜丸如桐子大棗湯吞三丸

○小柴胡湯

治陽証咳嗽

方見傷寒門

日金三

卷之三

○傳凡傷寒發飴有四証 中氣不足脉虛微 氣不相續而空
飴者用補中益氣加生脈散黃柏以降虛火或少加附子立愈
○陽明內實失下而發飴者大姜氣下之
○渴而飲水太過成水結胸而又發飴者小陷胸湯或
小青龍湯去麻加附 ○傷寒傳經熱証誤用姜桂
等熱藥咳逆者黃連解毒白虎湯及竹瀝之類
灸法 乳根二穴灸七壯直乳下一寸六分婦人在乳房下
起肉處 林婦人屬乳頭向下盡骨間丈夫及乳小者以
一指為率男左女右與乳相直間陷中動脈處

覆盆子五味子各二
熟地兩兩半
煉蜜丸空心鹽湯溫酒任下
桂角一
續各一

奇物○神仙巨勝子丸 安魂定魄改易容顛通神仙延壽命
風損 液髓駐精補腎益氣壯筋骨潤肌膚髮白再黑齒落更生目
添冰膏 駐精補腎益氣壯筋骨潤肌膚髮白再黑齒落更生目
視有光心力無倦行步如飛寒暑不侵能除百病

巨勝子焙一
兩
一生地
熟地
何首烏各四
兩
枸杞子
菟絲子

五味子 酸棗仁 破故紙 炒柏子仁

廣木香 蓮花蕊 巴戟天 心肉芙蓉 酒浸天門冬 官桂

人參 茯苓 去皮 楚賓子

山藥一兩
已上各右為細末

桃仁十箇搗如泥同藥末和更搗千餘杵丸如梧桐子大每

服三十丸空心用溫酒送下。鹽湯亦可。云如冬服。一月元
藏。彈勝六十日。髮白。變黑一百日。白容頗改。目明可黑處。穿
鍼。冬月單衣不寒。若時白雞用藥拌飯喂六十日。則變
為黑雞矣。

聖濟總錄百九十九日 神仙巨勝丸 巨勝 酒浸一宿

牛膝酒浸切焙巴戟天去心知門冬去心山芋 熟地黃 柳桂去皮酸棗仁 覆盆子 遠志去心兔絲子酒浸別搗燒乾。菊花人參
白茯苓去黑皮各一兩右十四味揀擇。擣羅為末。煉蜜
為丸。如桐子大。每日空心溫酒下。二十九服。一月身輕健。
萬病不侵。

△眼目門 十七

五經曰。諸脉皆屬於目。目得血而能視。

聖人雖言目得血能視。然亦有太過不及。太過則目壅塞而
發痛。不及則目耗竭而失明。故年老之人多不及。年少之人
多太過。但年少之人則無不及。年老之人間有太過。

原病式曰。目昧不明。目赤腫痛。翳膜皆瘡。皆為熱。或言目昧。
為肝腎虛冷者誤也。

林上虛則肝虛也。下虛乃腎虛也。肝虛則頭暉耳聾。目眩。腎虛則壅生花耳。作蟬鳴。大宜補肝益腎。

丹溪曰。目病屬風熱。血少神勞。腎虛肥人。風熱上壅。散潤云芩。柴菊。瘦人多血少養益加惠。

風藥四物

風 菊

冬病晝暗熟地為君。卷風甘菊佐之。

暴發赤腫芩

風為君以瀉之。連歸為臣以養血。

甘菊佐之。

卷 柴 升 芝 甘 為使

白睛紅加白荳蔻少許

血熱壅痛 四物加膽已 風

卷一

肥人風熱上壅眼疼

卷

瘦人目痛血

少兼熱歸

生地酒

玄參

芍

風

荆

酒芩

連

味

各三

勞役飲食不節內障

夜盲

蔓

甘

炙

葛

白芍

柏參

菊

少許

滋陰地黃丸

少許

○惠滋陰地黃丸

治血弱陰虛瞳子散大視物則花

生地

熟地

柴

八

天門

甘

炙

枳

地骨

連

味

各三

○傳益陰腎氣丸此壯水之主以鎮陽光澤神

參

歸身

酒芩

各五

右為末

煉蜜丸

茶清下

婦人尤宜

勿犯鐵器口蒸搗煉蜜丸如桐子大每服五十九空心淡鹽湯下

○當歸湯

補益腎水瞳子

歸身

白芍

各二

連

酒

浸

○生地酒牡

山藥

歸梢酒

五味

柴

各

五

熟地

二

右為末

勿犯鐵器口蒸搗煉蜜丸如桐子大每服五十九空心淡鹽湯下

○當歸湯

補益腎水瞳子

歸身

白芍

各二

連

酒

浸

○芩各一

生地三

甘

柴

四

右

勿犯鐵器口蒸搗煉蜜丸如桐子大每服五十九空心淡鹽湯下

○補肝散

治睛上有圓翳日中見之羞小陰處見之則大視

物不明乃肝腎俱虛也宜補肝腎

熟地

白芩

細

勿犯鐵器口蒸搗煉蜜丸如桐子大每服五十九空心淡鹽湯下

○明目地黃丸

治肝腎虛熱眼見黑花翳膜遮障等症

熟地

白芩

細

勿犯鐵器口蒸搗煉蜜丸如桐子大每服五十九空心淡鹽湯下

○生地

熟地並洗焙

膝酒浸

斛

去芦又杏

去皮尖

迷

勿犯鐵器口蒸搗煉蜜丸如桐子大每服五十九空心淡鹽湯下

○定志丸

治目不能遠視能近視者

方見怔忡門

兩

勿犯鐵器口蒸搗蜜丸食前溫酒下或飯飲鹽湯亦可

勸風之

勿犯鐵器口蒸搗蜜丸食前溫酒下或飯飲鹽湯亦可

玉淚黑花羞澀

勿犯鐵器口蒸搗蜜丸食前溫酒下或飯飲鹽湯亦可

勸風之

兩

勿犯鐵器口蒸搗蜜丸食前溫酒下或飯飲鹽湯亦可

勸風之

勿犯鐵器口蒸搗蜜丸食前溫酒下或飯飲鹽湯亦可

地芝丸

治目不能遠視能近視者

方見怔忡門

兩

勿犯鐵器口蒸搗蜜丸食前溫酒下或飯飲鹽湯亦可

勸風之

勿犯鐵器口蒸搗蜜丸食前溫酒下或飯飲鹽湯亦可

天門ミツル 枳炒四 甘菊二 右為末煉蜜丸

六味地黃丸 治証同前

方見淋門一

益氣聰明湯

治飲食勞役脾胃不足內障耳鳴

葛參甘各半

升葛各三

蔓一冬 芍半

柏酒炒各一兩

右水煎臨睡熱眼近五更再服之得睡更妙

如煩悶有熱漸加黃柏春夏加之盛暑倍之如此一味多則不效

沖和養胃湯

治內障眼脾由元氣虛弱心火與三焦俱盛

飲食勞役不得休息故為此疾服之効

柴芩連各七分

風半 羌炙甘

葛各一兩半

歸酒外

木參葛各一兩

白芍六

白芩三

姜一

五味二 右

還睛丸 治眼內赤澁

有花或黑或白或紅一參桔芩

大燉牛燒芩菊白疾炒細

荆各一兩 草決一兩半 蒼炒二

右為末臨卧溫酒調下

傳後明散 治內障一 陳去芩名坐青 三炙甘 生地

翹柴各一葛一冬 歸身二 右水煎去粗稍熱服

忌酒醋濕麪辛熱火料物之類

秘傳撥雲退翳丸 治內外障膜遮睛昏暗太効

川椒七冬半 去目炒歸酒浸一兩半 右為末煉蜜丸食後臨卧日

蜜蒙花荊地骨甘菊白疾羃各一 蟬蛻連各三

實桔甘羃各五 芍各一 賊蜜便浸下宿乾

川椒七冬半 去目炒歸酒浸一兩半 右為末煉蜜丸食後臨卧日

三服翳障米飲睛暗當歸湯內障木香湯三 下

當歸龍膽湯

治眼中白翳

風

膏

各二柴

羗

味 升 各三甘 分

連 酒

葵 各四 分半

芩 酒 炒

柄 酒 炒

歸身 酒

膽 酒 洗 芍 各七 分半

右前去粗

入酒少許

治眼熱

洗

石膏羗活散

治久近內外

翳障風熱昏暗倒睫

拳毛

切眼疾頭風一羗

治腦熱頭風一

蜜蒙

治偏頭風一

賊頭

細乾菜子二味起麻子

荆生蕎一

葵

治頭風一

芩

右各等分爲末食後臨卧蜜水調下

茶清亦可日三服

明目細辛湯

治目赤微痛羞明怕風寒鼻塞涕唾稠粘

芎一分 生地

浸酒

蔓各三

歸身梢

白芍

荳各四 分

荆五 分

風 麻根

羗各八 細分

紅花川椒粒

桃皮尖

七个去壳

助陽加血陽

治眼發之

有上熱白睛紅隱

有上熱白睛紅隱

有上熱白睛紅隱

風各半 升

右水煎

稍熱服

救苦湯

治眼暴發赤腫臉高苦疼不可忍者

桔翹紅細各二

歸身

灸各蒼

膽各一

分

藁本風連

羗太陽

升陽

柴少陽各

分

知各三 莖六

右水煎

食後服

若苦疼則多用苦寒

林散熱飲子

治眼暴赤腫

風羗芩

連各等

右水煎

食後服

太便秘加大黃

痛甚者加歸生地

煩不得眠加梔

熱痛赤腫小柴加大

歸生黑豆

四物龍膽湯

治目赤暴發雲翳

翳疼不可忍

芎歸

芍地各二

羗各半

風各一

膽各一

右

洗肝散 治風毒上攻目暴腫痛難開隱澁眵淚

芍 归 卷 苣 大 風 桑 芎 各等分

右為末白湯調服剉煎亦可

菊花散 治目赤腫痛麻豆傷寒後食熱物腫痛

芩 大 菊 苣 風 彙 各等分 右

羚羊角散 治火入小兒風熱上攻眼暴赤腫生瘡疼

羚 羔 荸 升 苣 炙 車 各五

梔 膽 各二

決明 十兩半

右為末食後白湯調下

繫古柴胡散 治肝風實熱頭疼眩眼赤心煩

梔 地骨木

玄參 羚 甘菊 赤芍 荸 各一 甘 炙 半兩

右入姜

菊花散 治風毒眼目赤腫昏暗疼肉痒漸生翳膜

洗藥 大青散 治暴風客熱目赤睛疼癰澁難開

銅青 半兩 姜粉 二分 右和勻少沸湯泡帛六指擦洗

造姜粉法 臟月生姜切搗爛布擦汁澄取粉陰乾

秦皮散 治風毒赤眼腫痛痒澁眵淚昏暗羞明

秦 滑 連 等 為末每用半錢沸湯泡去粗乘熱洗

湯泡散 治風熱上攻眼目赤澁睛疼漸生翳膜

赤芍 归 連 等 右咬咀每用二錢以極滾湯泡乘熱洗

冷再溫洗一日六七次或加荆芥

凡眼目之病血凝氣滯使然故以行血藥合黃連血得熱

局散必熱洗之有効 一方加風杏煎洗亦可

一方加滑細古父錢煎洗

一方 截惡眼

明礬石

大梔

不夫壳，一味碎，白鹽包井薪水

一方 治眼淚出不止

黃連煎濃汁漬帛拭之

一方 治晚不見物

取鼠膽點之

常洗目法

空心用鹽末揩齒

漱口，少時吐水於手中洗眼

冷目明夜見細字

點眼春雪膏

治肝經不足，風熱上攻眼

自昏暗痒痛

羞明不能遠視，迎風有淚多見黑花

腦子

研半

生仁

去壳去油干，右用生蜜六錢和勻銅筋點此目頭

退翳膏

治黑白翳

生仁

升各三匙

風

青各四分

歸身

六分

甘紫各半

荆

水半盞浸

生地一冬半

連

三分

右細朱水一丁碗

煎至半碗去粗更上火煎半盞入荆芥

白炉甘石

煅灰甘石通紅淬黃汁如蜜，七次

辰

鵬各五分

輕片腦

三分多至五分

麝

分

如赤眼腫痛加乳沒

鵬各五分

內外翳障

加真珠粉

膽礬石二分

熊膽一分

右細朱水一丁碗

煎至半盞去粗更上火煎半盞入荆芥

光明丹

治風熱上壅，目赤腫痛及内外翳障等証

一方

治翳膜遮睛

加真珠粉

膽礬石二分

熊膽一分

右細朱水一丁碗

煎至半盞去粗更上火煎半盞入荆芥

一方

治翳膜遮睛

加真珠粉

膽礬石二分

熊膽一分

一方

治翳膜遮睛

加真珠粉

膽礬石二分

熊膽一分

右細朱水一丁碗

煎至半盞去粗更上火煎半盞入荆芥

一方

左鼻百發百中

一方 治沙石草木入目不得出 以書中白衣魚和乳汁注
眼中自出

○治稻麥芒入眼 取蟻螬以布覆目上持蟻螬於布上
摩之其芒出著布上

○治倒睫拳毛 木鼈一枚去鬚為末綿裹塞鼻中左

目塞右右目塞左一二夜其睫自正

○灸法 眼暗灸太推下數第十節脊中二百壯以多為佳

三里 治目不明人年三十以上不灸三里金氣上目不明

○風翳灸手中指本筋頭骨上五壯左患灸右右患灸左

目卒生翳灸大指筋橫爻三壯左灸右右灸左

王

小兒瘡眼灸合各二穴各一壯

△耳病門

○傳經曰耳為腎之外候一曰腎通竅于耳一曰心通竅于耳

其嗜欲無節勞役過度或中年之後太病之餘腎水

枯涸陰火上炎故耳痒耳鳴治法宜瀉南方之火補北

方之水無有不安者

○惠歌龍耳必有眩暉之証流氣飲加葛姜葱

○風龍耳必有頭痛之証桂星散

○憂愁傷心心虛血耗而龍耳或鳴當寧心順氣平補鎮心丹房勞過度腎虛精竭而龍耳或鳴當生精補腎肉蓴從蓉丸

○傳本病後及陰虛火動而龍耳者宜補陰降火四物加杞耳鳴宜當歸龍荳丸方見癰瘤門醫林等當取龍膽丸

多飲酒人宜木香檳榔丸 方見氣門

聾以茱萸白頭小大黃三味為末津調貼涌泉穴以引火下行
大補丸 治耳鳴枯谷龍耳 葉柏一味細切鹽酒拌炒褐色
為末滴水丸氣虛四君子湯下

滋腎丸 治耳鳴血虛膏物湯下

滋腎丸 治耳鳴耳龍耳 方見淋門

蔓荆子散 治上焦熱耳鳴而龍耳及出膿汁 多耳

升 通 赤芍 桑蜜門 生地 前甘菊 蔓

赤苓 各半 右作二服加姜片木棗一枚

桂星散

治風虛耳龍耳

桂

芍

歸細

菖

通

蒺藜木

麻

甘各一星

煨芷

各四

蘿

各半

右入蘿

白

地黃丸

治耳鳴耳龍耳

地

歸

甘

蔓

荳

桂

芍

歸

細

菖

白

破炒

蒺藜炒

胡蘆巴炒

仲炒芷

甘

蔓

荳

桂

芍

歸

細

菖

白

林平補

鎮心丹

治心

氣不足

精神恍惚

夜多異夢

夢取

桂

芍

神

方各

七兩

氣傷

敗足脛酸疼

遺精

白濁

漸羸弱

以致耳龍耳

桂

芍

神

方各

四兩

熟地

生地

山

天門

麥門

柏子

神

方各

四兩

辰

桔

各

三兩

曹

甘

遠

甘草

歸

七兩

歸

六龍骨

兩

右煉蜜丸

如桐子大

每服

三十丸空心

飯飲或酒

桂

芍

神

方各

四兩

葵荳

山茱萸石龍芮

曹

鬼絲酒

鹿茸酒

浸

卷

解

蓬

酒浸

山茱萸

石龍芮

曹

鬼絲

酒

浸

卷

解

磁

煅醋漬附炮去皮腸

蝎

去毒二

麝

十個

麝

右

蜜丸

如桐子

大

每服七十九空心

鹽酒

送下

清神散

治風壅於上頭目不_{スキヨカラ}清耳常重聽上

甘菊

蚕

炒去糸嘴各五分

荆穗

羌

風

芎

通各四灸

甘

术

菖各半

右為末食後臨卧

茶清調下

芷芎散

治風入耳虛鳴不聞

芷

芎

菖

蒼

蘇甘陳細朴半桂

通各等右入姜葱

菖蒲圓

治卒龍耳並耳內卒痛

菖附

炮去皮膚各等分

右為末醋糊丸如杏仁大綿裹置耳中日二易之

○治龍耳草麻子四十粒

東棗肉枝入乳搗膏石上晒乾

丸如梧子綿裹塞耳中

○林治龍耳菖寸巴一粒

毒壳蝎去毒古為末葱涎丸如東棗核

繩裏塞耳中或用生鳥頭為末綿裹塞耳中亦效

治龍耳菖寸巴皮

右搗合分作七九每用丁丸

○治耳鳴菖草鳥

根性菖格三為末綿裹塞耳日三度外

又以醣醋微火煎附子軟削令尖塞耳

又雄黃硫黃等分為末綿裹塞耳

治久龍耳生鼠膽汁滴入耳中或生鼠膽綿包塞耳

治龍耳芥菜子搗人乳和綿裏塞耳

通耳法堅磁石

豆粒如穿山甲研綿裏塞耳

中口中含小生鉄一塊覺耳內如風雨聲即効

一方治久龍耳蝎黃色小者

四十個生姜切如蝎大四十

右二味為末作一服臨卧空心溫酒調服一法向晚勿飲食

酒調作一服至一更徐徐盡量飲五更如耳中聞數百筆

音自聾

目錄三

治耳聾耳中如風水聲或如鐘鼓聲耳

椒目

巴去油壳

菖松枝各半為末以蠟溶化同攤紙上候冷捲作管子塞耳內二日一易效

治聾耳用貓屎滴入耳中効

取屎法用干姜末擦於貓屎上其屎自出收用

治耳內痛用白鹽炒熱車帛包熨耳邊四圍

○傳治耳痛及聰耳

桑螵蛸炙黃末加鹿射少許吹入耳中妙治耳內大痛如有鬼奔走或血水流出自乾痛不可忍者

蛇退性存研以鵝翎管官吹入耳中立愈

○治耳痛以枯礬石吹入耳中

○林犀角飲子治風熱上壅耳內聾閉腫痛膿血流出

犀

菖

通

玄參

赤芍

小豆炒

甘菊

各三錢

連

鳥頭骨

○風客熱壅膿血流出名曰聰耳

白礬

連

烏頭骨

○赤石脂各等分為末吹入耳中即効

明礬石散

○治熱壅氣滯或沐浴水入耳中為膿為水

枯礬石

龍骨研

各黃丹四分

○治聰耳底耳膿出不正陳皮火上燒為麝少許右如箭法

又方乾胭脂

枯凡等分如前法

又枯凡黃丹等分

又方五倍子

酒一冬半

右前法

又方治耳中出血

龍骨為末吹入耳內

治聰耳膿不乾

香附毫毛為末摻耳中日三次効

百蟲入耳好酒少許灌耳中却行起自出

又灌脂麻油可

又灌藍青汁少頃虫出

又灌雞冠血，又滴小蒜搗汁。

懣虫入耳

用葱涕灌

又用桃葉按田塞耳。

又桃葉枕頭虫

自鼻出

傳桃葉捲作涌子切角其頭入耳中其虫從角中走出

治蟻虫入耳

猪肉一指許置耳孔邊即出

治蜈蚣入耳

生姜汁灌耳中韭汁亦可即出

灸法治耳聾耳鳴

聽會各五壯

在耳微前陷中張口得之

治耳聾耳丹痛

翳風各七壯

在耳後陷中按之引耳中

又耳門壯各三

在耳前起肉當缺之前

鼻病門

○傳經曰：鼻者肺之外候。丹溪曰：肺之為藏，其位高其身。

○脆性惡寒，又惡熱，故好飲熱酒者，始則傷于肺，憊時熱

此謂熱極云云，或觸冒風寒，始則傷于皮毛而用藥塞不通，久則見於外而為白鼻，鹽漬之，候得熱愈紅，未寒則黑。

之候，或為濁涕，或流清涕，久不已，名曰鼻渊，此為外寒束內

熱之証也，原病式曰：肺熱則出涕是也。

○選河間謂鼻病悉屬乎熱理，固當矣。然鼻者肺之候。

○丹溪曰：寒傷皮毛，氣不利而壅，麻黃桂枝之類表之。

○熱壅清道氣不宣通，以芩連梔之類清之。

○丹溪曰：寒傷皮毛，氣不利而壅，麻黃桂枝之類表之。

○生姜煎調五靈脂末服，氣弱者加芪。

○外用山硫黃一兩，內火燒成乳，輕烏頭尖，醋調付。

○或用膽礬粉，外用。

○惠酒瘡皆壅熱所致，又有肺風不能歛，自生者非盡因酒。

○酒瘡皆壅熱所致，又有肺風不能歛，自生者非盡因酒。

一方 治酒瘡 機子末密丸如彈子 大空心白湯嚥下
鼈鼻息肉乃肺氣盛用枯礬末胭脂綿裹塞鼻數日自消

○林 芒 蔊 散 治鼻塞為鼈 芒 桦 麻 去 等 桂 巴

通 細 芝 葛 各一木 椒 甘 灸 各 右入生姜紫蘇煎

凹丁散 治鼻鼈息肉不聞香臭俗呼鼻痔

瓜蒂 細 等 為末綿裹塞鼻中良黃水點滿三四日愈

一方 治久患鼻瘡膿極臭者 百草霜為末每服一

錢食後冷水調服

治鼻瘡皂角尖末小豆許以竹管吹入鼻中

又方 柑橘核為末猪脂和綿裹鼻中數日瘡肉隨藥出

治鼻中生瘡 揭杏仁乳汁和傳之

蘿澄甘加九 治鼻寒生不通 蘿 半 苛 三 荆穗 三末

右為末煉蜜丸如梅桃大每服十九粒噙化津嚥

菖蒲散 治鼻塞不通 菖 皂 等 為末綿包塞鼻內

辛夷散 治肺虛風寒加之鼻塞涕出不已不聞香臭

辛夷仁 細 萝卜 芒 通 風 番 甘 灸 芝 等

為末食後茶清調服

參散 治肺氣上攻鼻塞不通 參 白芩 芩 陳 茯

麻 等 差 椒 炒各半右煎食後服

○傳溫肺湯 治鼻不聞香臭多痰 丁香 分 風 葛

卷 炙甘 各半升 芩 各七 麻 不去根半右入葱白

○林離澤通氣湯 治鼻不聞香氣

忌一切冷物及風寒涼處坐卧

芪

四
水

羌

獨風升葛

蒼

各三
水

灸甘

二
水

芷止

麻

不許
節

椒

各一
水

右每服五錢姜三片束束一枚葱白寸水煎稍熱服

○治鼻塞

傳防風湯

治鼻濁

腦熱塗

濁涕

不正久不已必成

中血

火

水

立通

○治鼻塞

傳防風湯

治鼻濁

腦熱塗

濁涕

吹鼻中

立通

○芩參

芩參

灸甘

芩

門各一
水

風一兩

右為末

沸湯

調服

○半芩

桔陳芩等

入生姜薄荷煎服

川椒散

治鼻流濁涕

椒炒

荳肉

細風

羌桂

歸

○細木

分等

為末食後酒調服

○防風通聖散

方見前加苦連

治頭旋

腦熱

鼻塞

濁涕

加苦連

○硫黃散

治酒皏鼻及女人鼻上生黑粉刺

石硫

分

○輕許

杏皮研膏

為末杏膏和作餅臨卧陰鼻擦洗去

一方

治赤鼻久不瘥

大黃

朴硝等

為末水調敷患處

通風

火

水

通風

火

水

通風

火

水

通風

火

水

通風

火

○治鼻面酒皏

鷄鵝糞一合研

臘肉豬脂和

每夜敷之

○治酒皏

馬鬚子并花杵

爛敷不過五七次復固

灸法 治鼻龜

願會一穴七壯入髮際二寸

通夫二穴各七

在承光後一寸灸後鼻中心真出積塊方愈

上星一穴七壯入髮際一寸治鼻塞不聞香臭

風門二穴各二壯治衄不止及清涕流

通風

火

水

口唇門 附舌

○傳肝熱則口酸心熱則口苦脾熱則口甘肺熱則口辛腎熱則口鹹又有口淡者胃熱也外有謀慮不決肝移熱於膽而口苦者又有脾胃氣虛弱木乘土位而口酸者或膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜生瘡

肝膽有實熱口酸而苦

小柴胡加甘 膽青

甚者用當歸龍鬚丸

方見癩門

心熱而口苦或口苦生瘡

黃連湯心湯

連生地 知

甘等

牛黃清心丸

方見中風門

涼膈散

方見傷寒門

脾熱而口苦者

三黃丸

方見消渴門

平胃散

方見內傷門

肺熱而口辛者

甘桔湯

方見荆門

瀉白散

方見喘急門

腎熱而口鹹者

滋腎丸

方見腎門

腎熱而口苦者

大補陰丸

方見虛門

腎熱而口鹹者

滋腎丸

方見腎門

滋陰太補丸

方見耳門

謀慮不決膽言熱口苦者

小柴加門酸地骨遠

方見淋門

謀慮不決肝膽虛而口苦者

參遠神甘

方見淋門

柴 膽為甚者鐵氏地黃丸

方見淋門

益膽湯 治謀慮不決肝膽虛氣上溢則口苦

方見淋門

芩桂炙甘 參各一桂 苦參袖各三遠去心右

方見淋門

林龍膽湯 治熱口苦曰膽薄一柴一分甘參天門連

方見淋門

瞻梔麥門知味各五右

方見淋門

導赤散 治膀胱移熱於小腸上為口糜水煎淋門

方見傳

五苓散 寒門

○柴胡地骨皮湯

治証同前及治心胃雍熱水穀不化

柴

竹

籜

等

右

水

煎

食

後

服

大

便

實

加

虎

ノ

○肖露飲

治

胃

中

客

熱

齒

齦

腫

痛

及

口

舌

生

瘡

咽喉

腫

痛

○杞

熟

地

生

地

天

門

枳

炒

茵

麥

門

芩

斛

各

分

○右

水

煎

食

後

服

升麻湯

治上

膈

熱

毒

口

舌

生

瘡

咽喉

腫

痛

升

赤

芍

參

桔

葛

各

二

甘

生

一

右

分

二

貼

入

姜

三

片

赤

水蘚木圓

治口

舌

生

瘡

石

片

腦

蘚

苟

各

等

分

生蜜丸

如

彈

子

大

每

服

一

九

含

化

治口

舌

生

瘡

牛

膝

酒

浸

含

之

胸

膈

汗

汁

亦

可

反治之甚者

加

附

子

或

用

官

桂

含

之

亦

妙

治口瘡

細

柏

蜜

右

等

分

為

末

摻

舌

止

吐

涎

乃

愈

治口瘡

野

蘚

微

花

根

煎

湯

漱

之

根

杵

汁

付

之

治口瘡

蒲

黛

鷹

鵬

焰

硝

生

甘

等

分

祖傳

治

舌

大

塞

口

不

通

飲

食

者

真

蒲

黃

一味

頻

刷

上

自

退

若

能

嚥

藥

以

黃

連

煎

濃

汁

細

細

呷

之

林

治

口

瘡

生

白

礬

末

貼

之

極

効

柳

花

散

治

口

舌

生

瘡

延

一

梢

連

各

半

蜜

陀

僧

黛

分

各

腫痛 女參 赤芍 升 犀角 桔 苓 管仲各一
甘半

右作一貼生姜一片煎食後服

治重舌喉閉朴硝 白礬石爲末摻入口中

治重舌 五灵脂砂石各一 為末醋一盞煎含漱

一方 朴硝二 黃丹分一為末擦之

薄荷煎

治口舌生瘡咽喉腫痛痰涎壅塞

苛半

甘二

苛二

腦半

右煉蜜和成餅嚼服

一方去腦加桔梗

蒲黃散

治舌忽然腫硬或血出如涌

鳥鷗魚骨

薄炒各等分

為末傳舌上

治舌上血出

智薰而煎汁飲數盞瘥

丁香圓治口臭

桔梗一 槐花少許乾薑舌上

煉蜜丸

彈子大綿裹含嚥津

一方 乾胡丸子末蜜丸如梅桃大每白漱口了含一丸

治口臭及匯齒腫痛

細辛者以濃汁熱含冷吐之

治口臭

杏葉一把以水一斗煮取三升稍稍含嚥之

訶子湯治失音不語

訶生半錢 桔梗一 甘生半錢

桔梗一 甘生半錢

生半錢

右分二貼水一盞童便一盞煎食後服

玉粉丸 治冬月寒疾結喉口語音不出

桂半

草烏半

為末姜汁浸蒸餅丸如鷄頭大每服一

丸至夜含化多年不愈者亦効

卿音勝破留丸 治歌謳失音不語者

翹桔甘各二

苛四 訶肉炒縮

大各一 莩半

百藥煎

兩

右為末，鷄子清和丸如彈子大，每用一十九臨卧含化。

一方 治失音不語 百藥煎 杏去皮 百合 詞肉

薏等 分 右為末，鷄子清和丸如彈子大，每用一十九臨卧含化。

一方 杏去皮桂 槐等 分 為末，煉蜜丸如彈子，綿包含嚥。

一方 謂曰紅茶湯，點自如常，生入香油三滴，良臨卧之時，乘熱服。聲聲音漸漸自通揚，又槐花瓦上炒令香，夜到三更，仰卧床枯取花來，如意食明朝聲響音漸琅琅。

鴉黃飲子 治風熱右脾經唇燥瀦列衣無色 正升

枳椇 茅 風 半 解各二 相一 入姜
薏苡仁湯 治風熱在脾唇白，瞞動或生結核或為浮腫，可和猪脂調敷佳。

白布散

緊唇又名瀉唇，用白布作灯炷，如指大，安行力丸上燒，食口不能開合，飲食不得，不急治則死，名曰。

出取敷唇口三度，旧青布亦佳，或青布燒灰酒調，二錢服亦可，或以脂膏調敷佳。

一方 敝蕙申及頭燒灰作末傳之。

一方 生馬齒莧煮汁洗，冬月用乾者，患處妙。

一方 治緊唇以頭垢傳之。

一方 治緊唇不能開合，灸虎口，男左女右。

一法 炙承將水三壯，在頤前下唇之下，宛中。

△咽喉門

林原病式曰：喉痺，不仁也，俗作閑，閑塞也，內經言喉痺。

則咽與舌其兩間耳然其病同於火故不分也後之醫者
名詳其狀強立八名熱氣上行傳於喉之兩傍近外腫作以
其形似是謂乳蛾一為單二為雙其比乳蛾差小者名閑喉
單熱於舌下後生三小舌子名曰子舌脹熱結於舌中舌
雙熱於舌下後生三小舌子名曰子舌脹熱結於舌中舌
為之腫名曰木舌脹木者強而不易和也熱結於咽喉腫
遠於外且痒腫而大者名曰瘧喉風喉腫暴發暴死者
名曰走馬喉痺此八種之名雖詳若不歸之火則相去遠
今之醫者皆有其藥至走馬喉痺何待此乎其生死又
掌之間耳無如石針出血

○傳其會厭之兩傍腫者俗謂之雙乳蛾易治下邊腫者謂之單
乳蛾難治布方通謂之喉痺背相火之所律逆耳

火者癥之本疾者火之標火性急速故病發則畢卒平而止
法必先大湧其痰或以鍼金刺其腫處此急則治標之法
也用藥者必須以内經從治之法而以中桔甘玄參
復用芩連柏栢之類正治之腫勢稍退為獲効
殊不知上熱未除中寒復生

○林銅人中亦有灸法然痛微者可用病速者恐遲則殺人故
治喉痺之火與救火同不容少待

○林巢氏病源云脾胃熱其氣上衝喉咽生瘡
真懸壅但在上脣懸門暴腫閉塞喉嚨亦如喉痺
甘桔湯治喉咽熱腫聲不出桔甘各水煎食後服

一方 治喉痺非時疫毒 桔甘外堯風牛芩酒炒各半

右水煎食遠細細飲服

牛房子湯 治風熱上壅咽喉空塞或痛或生瘡

牛玄參升桔甘犀通芩各等分右

敗毒散

方見傷寒門

治証同前加芩半翹倍桔痰盛加石膏

鮮毒雄黃丸

治癰喉風急喉痺牙關緊急不省人事

小兒喉嚨赤腫

散驚熱痰涎壅盛並宜服之

方見中風門

玉鑰匙

治風熱喉痺及癰喉風

燭硝半鵬五腦

蚕炒去絲嘴二冬半右研勻少許吹入喉中

二聖散

治癰喉風急喉痺

鴨嘴膽礬三分

右為末少許吹入喉中立驗

通關散

治咽喉腫痛水穀不下

青鹽三

枯礬二分

鵬一夕

右為末少許吹入喉內有涎吐出一二千次腫自消

吹喉散

治咽喉腫

薰雄鵬膽礬等分

右為末少許吹入喉中

奇方 治喉痺

射于新者擂爛取汁吞或用米醋同研

取汁含引出涎更妙

一方 治癰喉風急喉痺

陳白梅入膽礬在內綿裏

含之

惠六白梅鵬砂亦良

一方 治走馬喉痺

馬鞭草根研自然汁嚥

丁合

一方

治喉痺

桃皮汁含而服之或煮豉汁含吞之

治急喉

風平關緊閉

巴豆

去壳紙包去油在紙上以此紙作

紙燃點火吹滅以煙薰鼻中昂時口鼻涎流牙關遂開

治急喉

朝

皂角

去皮子生半兩為末少許以筋頭點腫

處更以醋調藥末傅頸下須臾便破少血出愈

治喉痺

初

牛房子

分六

馬蘭子

分八

為末空心暖水調下

治喉痺

風

生韭研爛敷候項下

治喉痺

初

起腫痛

鵬砂含津嚥之

傳通關飲

治喉痺

腫痛不能言語者

參

術

芩各一

治喉痺

不下食

生韭研爛敷候項下

治喉痺

初

起腫痛

鵬砂含津嚥之

治走馬喉痺

不下食

生韭研爛敷候項下

治走馬喉痺

初

起腫痛

鵬砂含津嚥之

治走馬喉痺

者用一枚立透

○惠_王誤吞穀芒刺在喉中 芝麻炒湯點細細呷之

喉痺心腹腰脇痛者難治

牙齒門

○傳曰：夫齒者，腎之標骨之餘也。足陽明胃之脈絡上齦，手陽明太腸之脈絡下齦。手陽明惡寒，飲而喜熱；足陽明惡熱，飲而喜寒，飲故其為痛有寒、惡熱之不同也。

○開口喫風則痛甚者，腸胃中有風邪也。開口則齦臭不可近者，腸胃中有積熱也。或痛而齒動搖者，或痛而齒侵蝕太抵齒齦宣露而動搖者，腎元虛也。治宜滋陰補腎，憎寒惡熱而口臭穢者，胃氣熱也。治宜安胃瀉火，風邪蟲蝕之証，蓋因熱生風，而風生虫也。腸胃之火既平，更以擦丹謝虫之藥擦。

以治其標也

○林獨活散 治風毒牙疼，牙根腫痛

○細荊芥 生地各二 川烏各一 細五

定痛散 治風牙痛立效

○芷 川烏各一 細五 乳一

右為末，每用少許擦牙，吐涎須臾以鹽湯漱灌。

○烏辛散 治風牙疼

○細草鳥等爲末，先以水漱口，淨少許擦患處

○一方加川椒

細辛散 治風牙疼，腮頸浮腫

○紅椒 鱷縮 牙皂

○撥各五 荆穗細各一 芝麻炒湯點細細呷之

頻擦患處，有涎吐之，仍用鹽湯漱

玉池散 治風蛀牙疼，腫痒，齦齶宣露出血，口氣臭

歸蘿地骨 風芷 槐炒芎 甘灸升 細各等

右為末每用一字指之痛甚取三錢加黑豆半合姜三片水

丁蓋半煎七分溫漱

一方 治風牙疼 芝一 硃二 煉蜜丸如櫻桃大擦牙
如神散 合氣虫牙攻注疼痛牙齒動搖連頰浮腫

椒 椒炒去子 蜂房 蜂等分 右為末水煎熱漱即止

一方 治風牙蟲牙疼 椒 細 風 蝶 荆 獨等分
右水煎乘熱漱之

一方 治風牙一 芝 膏 升 細 草烏 芝 風 巷等分
右為末擦牙 單方用鶴風

一方 升 細 膏 葵 檀 皂 等 分 麻 草烏 芝 風 巷等分
風牙不怕冷熱宜用 皂 蟾 蜂房 草烏等藥
寒牙怕熱湯宜用 皂 蟾 蜂房 草烏等藥

芭 升 各一 吳茱 芝各四 歸 熟地 各半

枝 半 瓷八 右為末先用溫水漱淨以藥擦之

丁香散 治牙疼 丁 機 蝶梢 大椒 等分 為末擦

患處有津即吐

一方 草蔻 芝 細 草烏 丁 蝶梢 右擦牙

一方 升 歸 機 細 機 芝 荊穗 等分 右為末瓦

盒貯之緊閉勿泄氣每用少許擦痛處後以荆芥

湯漱之

古方 治牙疼 草機為要藥也

熱牙怕冷水宜用 牙硝 姜黃 雄

荆等藥

驅毒飲 治熱毒上攻宣露齒血牙齦腫痛

熱牙怕冷水宜用 牙硝 姜黃 雄

荆等藥

屋遊

鬱子尾上吉

右水煎

澄清入鹽

一撮

頻漱

犀角升麻湯

治陽明經受風熱

口瘡

車牙腫痛

犀升

半

風

卷各五

芎

芷

芩

白附各二

甘

半

右水煎

食後漱服

姜黃散

治牙疼不可忍

姜黃

細

芷等分

為末

擦牙須臾

吐涎

鹽湯漱口

又治牙疼面赤腫

去姜黃加立效

清胃散

治因服熱藥

齒疼引頭腦滿面發熱

喜寒

惡熱生地

酒浸連

歸酒浸各半升

右水煎

食遠冷服

傳神功丸

治多食肉口臭牙

齒疼

蝕齒肉欲脫牙落盜不正

蘭香葉

如無藿

歸藿木

升各一

生地

酒生甘

芩

連酒

縮各五

右為末

湯浸蒸

丸白湯

食遠下

祖傳

治胃有實熱齒痛

涼膈散

方見傷以大黃

酒為君

為君

○蛀牙必有竅宜用雄黃

石灰等藥

砂糖丸

治蛀牙

石炭為末

砂糖丸如黃米大塞蛀孔

一方

川椒

粒五十一

巴

右飯丸如豆大綿包

塞蛀孔勿令嚥汁

一方

枯凡

滴乳味

為末同蠟溶化九

塞蛀孔

勿令嚥汁

一方

川椒

粒五十一

巴

右飯丸如豆大綿包

塞蛀孔勿令嚥汁

一方

雄雀糞

帛裹塞

蛀孔日二三次易之

者是雄

一方

風蟲牙疼

鶴虱

以醋擂爛入鹽少許漱口良久

出又含

治齒中痛

嚼薰陸香

其叶

瘻

又雄黃

末蜜丸如東

核塞牙間

又薑薑薑

未先以鹽指

齒令淨傳

少於上

又 杏仁 燒煙未盡研如膏物裹內孔中
又 新堀李樹根取白皮細切水浸濃汁含之良久吐去
治風虫牙疼 霜搗老絲瓜燒存性為末擦之

又 茄蒲切片抵痛牙處咬定

虫食齒根齒黑者以松木灰揩之末搗黃塗齦上百日效
安腎丸 治腎虛牙齒腫疼

從酒 桃仁皮

木

補火

山斛

白蒺藜刺去

川烏頭皮

巴戟心

分各等右為朱砂

安風牢牙散 住顏補腎牢牙固齒

青鹽細各七

宣風牢牙散 住顏補腎牢牙固齒

青鹽研酒洗乾

川烏頭皮

巴戟心

芎歸酒洗乾

右為朱砂許清晨擦牙漱口連藥嚥之

青鹽研酒洗乾

巴戟心

牢牙石燕子散

治斷不固及腎弱止齒踈或血出侵蝕一

青鹽研酒洗乾

巴戟心

漱嚥不嚥亦可

末每用半錢以指蘸藥擦斷止合口

青鹽研酒洗乾

巴戟心

洽牙根動欲脫 生地黃剉帛裹著牙上

右為朱砂許清晨擦牙漱口連藥嚥之

青鹽研酒洗乾

巴戟心

三五次嚥之十肉交

右為朱砂許清晨擦牙漱口連藥嚥之

青鹽研酒洗乾

巴戟心

取齒藥 黑鉛半斤炒過溶化入桑柴皮灰

右為朱砂許清晨擦牙漱口連藥嚥之

青鹽研酒洗乾

巴戟心

分溫水漱在盆內以水洗眼能明

黑翳須鬚治牙齒動搖

青鹽研酒洗乾

巴戟心

疼痛大能牢牙

末每用半錢以指蘸藥擦斷止合口

青鹽研酒洗乾

巴戟心

擦牙散 窮牙 芎風升細芩芷機甘松

右為朱砂許擦之

青鹽研酒洗乾

巴戟心

香附膏一方

右為朱砂許擦之

青鹽研酒洗乾

巴戟心

治牙踈陷物寒水石煅

右為朱砂許擦之

青鹽研酒洗乾

巴戟心

擦牙忌用刷牙脂麻茶物

常常用治虫牙去風熱寧露一切齒疾

青鹽散 常用治虫牙去風熱寧露一切齒疾

香附

炒三
兩

青鹽

半兩

右為末擦牙

治諸般牙疼

病

香附

另研

生艾葉等濃煎湯漱之

一方

枯凡

蜂房等分為末

煎湯含漱冷則吐去再含

一方

蕓菜梗

燒灰為末

擦疼痛上

一方

茄蒂

燒灰為末

擦疼痛上

一方

馬夜眼

燒存性為末

敷上立愈

一方

蒼耳子

水煮汁熱含之

莖葉亦可入鹽亦可擦良草烏芎

治一切風瘡

蟲牙

疼痛不

可忍者發加胡椒為末酒糊丸咬在患處有涎吐之立愈

治牙疼

燕子屎

丸桐子大用

疼痛上咬之丸消愈

治風熱上攻牙齒疼痛

蒜苔

荳草霜後收之

臘乾為藥

未每用三

以滾湯泡

漱之醋煎尤妙

其牙自牢密

治齒腫痛及口氣

細辛

煮濃汁

冷含吐出

治卒齒痛

苦竹燒

頭一頭

得汁多揩齒疼

治諸牙齦疼

杏仁

百枚去皮鹽

方寸水一升煮令沫出含之

六効散

治牙疼微

惡寒飲大惡

熱孰飲細分

炙甘半升

分

風一

膽酒洗三水

抄在牙疼處

得少時

則止

如多惡熱飲更加膽水

牙疼諸藥不効

甘草

煎濃汁

含漱三五日愈

○治走馬牙癆如神

乾姜

東古燒

性枯凡分為末付之即愈

小兒走馬牙癆

床石膏腐爛即死此方神効○傳林

牙疼諸藥不効

甘草

煎濃汁

含漱三五日愈如惡風加葛連各五勿加膽水。。。。。。。。。。。。。。。。。

婦人尿桶中白堈火煅銅線三分麝半右末付之立愈
○林取牙藥 草烏 檀各一
兩半椒 細各三右為末少許指患處其牙自落

○金地龍散 治牙痛宣露出益 地龍土延機等分

為末綿裹隨左右痛處耳內塞之

○林灸一切風腫單牙疼痛以草量手中指至掌後橫灸止將草折為四分去三分將一分於橫爻後量臂中灸三壯隨左右灸

丁法兩手交文中指盡處灸七壯是列缺穴也

又灸肩髃七壯隨左右取之

又灸耳垂下盡骨上三壯夫効再加壯數

治口齒蝕生瘡漏痛承將水一穴灸三壯

○上牀痛灸足三里二穴七十壯足陽明經在手大指次指本筋後內側陷中手陽明經

△髮病門

○惠五神還童丹仙家傳授花髮明目延壽

赤石

川椒 辰 茯神乳各一右為末棗肉丸如梧子大每

服三十丸空心溫酒下

○林治白髮還精丸治白髮極効燒已髮合頭垢等分丸如梧子大每

豆大每服三丸噙頭不落

○惠治白髮落不生側柏葉陰乾為末菜油調塗治無髮甜瓜葉搗汁塗之即生

△痔漏

○選痔漏者肛門邊内外有瘡是也成漏不破者曰痔破
潰而出膿血黃水淋瀝不止者曰漏

○諸痔出益肛門間別有小竅下如血線不與便物共
道久不愈必至穿穴瘡口不合漏無已時此變為瘻也
腸風臘毒與痔瘻同出而異名久則滯蝕腸頭濕爛可
畏致蟲是也治法當化虫

○傳丹溪曰痔病因風熱燥歸于太陽也治益為主太法用
芩涼大腸參連生地槐角涼血生益當歸和血
芎升枳寬腸

漏瘻先用補氣血藥參芪歸木為主太劑服之
外以附子為末津和作餅如錢厚以艾多灸之令灸微熱
不可令痛餅乾即易之又以補氣血藥作膏貼之
秦艽羌活湯 治痔漏成塊下垂不復其瘡卷二分

尤 茜各一 風升 炙甘 麻 柴各五 膏分 細
紅 許 各少 右煎服 忌寒風處大小便

秦艽蒼朮湯 治痔核已破謂之漏大使秘澀必大痛此
濕熱風燥四氣合而為痛 尤 桃去皮皂仁燒研性
蒼米泔浸風分 柏酒洗各五分 潤歸梢酒洗各一分
右除枳桃皂餘藥水煎去粗入枳桃皂再煎空心熱
眼待少時以美膳壓之不犯胃氣也服藥日忌生冷硬物
及酒濕麪桂姜等

秦艽當歸湯 治痔漏大使結燥疼痛 大燬四尤 實各
澤 歸梢皂 木各五 紅 許 二十分右煎服忌如前
秦艽防風湯 治痔漏大使時發痛如無痛者非痔漏也

燒已止。白飯。芎。祝各二分。右為末。米醋煮麪糊丸。如桐子大。各存性。

每服七十丸。調氣用。枳殼散。方見卷之六

消血熱。荆芥煎湯下。食前服。

乾葛湯

治酒癆。葛

枳炒半分。芩

生地

杏

去皮。各半兩。

芩

甘炙各二分半

右每服五錢。黑豆

百姜

白梅

五個。煎服。

猪甲散

治諸癆。猪後蹄垂甲

燒存性。

為末。陳米飲調服。

橘皮湯

治氣癆。陳

枳

麸炒。去皮。

槐

炒各二分。

枳木

桃

去皮。半兩。

遂瘀湯

治痔漏熱証。瘀血作疼。

通利太小腸。取下黑物。

芩芷

生地

赤芍

五灵

枳

膠

芩

義

神生甘

各一大

桃

去皮尖。各一冬半。

右每服八錢。姜三片。蜜三

匙水煎服以利為度。

地榆散

治痔瘡瘍腫痛。

地榆

芪

枳

梅

芩

赤芍

白刺丸

治痔瘡而復癢。

皂刺

盡存性。

白礬

蝦

枳

白蒺藜

炒去刺。

羗各半

白斂

蜂房

炒焦。甘。右亦煎。

槐

各三分。

右亦煎。

潤腸丸

服此以防肛門急燥欲無微痛而已。

枳

炒大。煨。

芎歸丸

治痔下血不止。

芎

白飯

芪

麵

炒。地榆。槐。

槐角丸

右為末。煉蜜丸。空心白湯下。

白飯

分。右為末。除根。

槐角

一兩。

印飯

治腸風下血。痔瘡脫肛。服此除根。

芩

風枳

炒各半。竹。

右為末。酒糊丸。如桐子大。

每服三四十丸。米飲下。殺蟲止疼痛。

服三四十丸。米飲下。殺蟲止疼痛。

芩

酒浸芩

宿芩

風枳

炒各半。竹。

右為末。酒糊丸。如桐子大。

每服三四十丸。米飲下。殺蟲止疼痛。

神應黑玉丹

治腸風痔漏痒痛多生

石核此疾多人

外塗

殊不知病在腸臟有虫去根易愈

蝟皮坐

牛角腮

各八
分

猪懸心蹄

百

槐角 雷 脂麻

各二 分

亂髮

皂角煎 湯洗焙

敗棕

咀各四兩

練二兩

右咀碎用龜鑽燒存

性為末

入乳香一麝四錢合和勻酒糊丸如桐子大

每服五十丸先細嚼胡桃一枚以溫酒吞下日二服甚者三服罕

心切忌別藥

地黃丸

治五痔滋陰

地酒蒸熟

槐角炒柏

仲炒芷

各兩

山藥

山茱 独

各八分

沵 牡

苓 各六分

芪 一兩

白附二分

右為末

煉蜜丸如桐子大

每服五十九空心米湯送下

治五痔

蒼耳莖葉端午日採陰乾為末空心水服方寸七

粒

驗法

凡用治痔藥後及大小便間努肉疼如針刺及痛上

腎根令久

衣物火上烘令熱屬痛處三五次立止

又治痔

刀起痛痒不止以自己穿舊毛襪底烘熱頻慰

乏冷則再烘其痒即止

又慰

痔頭出或痛不可忍枳殼於塘灰中煨熱尉盡救

立定發即慰之

洗痔方

槐花 菊 枳艾

等水煎入白礬薰洗

一方

用槐柳枝煎湯洗痔便以艾火七壯

一方白礬石末洗薰

枳殼末煎湯薰洗亦可

一方

連芩 荆 麻側柏葉

槐條 鏡面草 虬蝦草

等分水煎洗

一方

用槐柳枝煎湯洗痔便以艾火七壯

治腸痔太便常下血

葱白三五竹煮湯盆中坐洗立癒

惠

目錄三

卷三

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百零一

一百零二

一百零三

一百零四

一百零五

一百零六

一百零七

一百零八

一百零九

一百一十

一百一十一

一百一十二

一百一十三

一百一十四

一百一十五

一百一十六

一百一十七

一百一十八

一百一十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

一百五十八

一百五十九

一百六十

一百六十一

一百六十二

一百六十三

一百六十四

一百六十五

一百六十六

一百六十七

一百六十八

一百六十九

一百七十

一百七十一

一百七十二

一百七十三

一百七十四

一百七十五

一百七十六

一百七十七

一百七十八

一百七十九

一百八十

一百八十一

一百八十二

一百八十三

一百八十四

一百八十五

一百八十六

一百八十七

一百八十八

一百八十九

一百九十

一百九十一

一百九十二

一百九十三

一百九十四

一百九十五

一百九十六

一百九十七

一百九十八

一百九十九

一百二十

一百二十一

一百二十二

一百二十三

一百二十四

一百二十五

一百二十六

一百二十七

一百二十八

一百二十九

一百三十

一百三十一

一百三十二

一百三十三

一百三十四

一百三十五

一百三十六

一百三十七

一百三十八

一百三十九

一百四十

一百四十一

一百四十二

一百四十三

一百四十四

一百四十五

一百四十六

一百四十七

一百四十八

一百四十九

一百五十

一百五十一

一百五十二

一百五十三

一百五十四

一百五十五

一百五十六

一百五十七

○惠痔久不差用銀膽塗神効一切方不及

○林灸法治五痔對膸脊背上灸七壯

又治五痔便血灸長強穴年壯在脊窮骨上

一法治痔疾大如胡瓜貫腸頭熱如爐火發則僵仆以

柳枝濃煎湯洗之次灸其上三五壯若覺一道熱氣入腸中大渴鮮血穢惡一時許甚痛渴後乃愈

損傷門

墜墮

跌撲

杖瘡

金瘡

茅刺

馬咬

湯火傷

大咬

貓咬

鼠咬

蛇傷

蜘蛛瘡

入咬

蜈蚣咬

蠍傷

風蚊

骨鰻

蜂傷

○從高墮下敗血凝滯從其所屬入於肝逆所行之血以破血行氣之藥治之

○林肝膽之經俱行於腋下屬厥陰少陽况血者肝之所藏故惡血必歸於肝當以柴胡引用為君佐以破血之藥治之○墮墮打撲皮不破而內損者必有瘀血及破皮出血或亡血過多二者其治不同有瘀血者攻利之亡血者兼補而行之宜先逐瘀血通經絡和血止痛之藥然後調氣養血補益胃氣則無不効

○林凡傷重者未服損藥先服氣藥加氣散之類傳凡治損傷妙在補氣血俗不知惟在速効多用自然銅以接骨然此藥必煅方可服新出火者其火毒與金毒相

扇挾香热藥毒其燥散之禍甚於刀劍戒之

○洛趺撲損傷用蘇木以活血黃連以淨火白朮以和中草

便煎為妙在下者可下瘀血俱壳須補托在上者宜飲

韭汁或和粥吃切不可飲冷水蓋血得寒則凝但一絲血

入心即死

○林 凡 打撲墜墮、及傷便覺氣絕不能言取藥不及急開口以熱小便灌之

凡手腳骨傷甚者不可治

凡損傷用火炙則醫不得服藥不効

凡傷重必藥水洗然後塗藥傷輕不必洗便塗藥凡損太小便不通未可便服藥蓋損用酒必熱且服四物湯又服大養氣湯加木通如二便尚未通又加朴硝待二便

通後服藥

凡傷重者用此方洗之然後傳藥 生葱 一方作生姜 荆 白

右三味煎湯溫熱洗

仙正散 洗藥 治骨斷用此煎水洗後整骨却用烏龍角貼之如破留口當夾縛 桂仁 面 去尾 荆 四 蒼 風

兩片煎至三升去滓於損處及冷水風脚筋脉拘急行步艱苦可用此藥用被蓋覆候溫淋洗

一方 治骨斷 仲五加七 葱根七 右每服二两半水五升煎至七分去相淋洗後整骨了用烏龍角貼傷破留口用藥

烏龍角貼藥 治跌撲傷損筋骨碎斷差交 蚕

小豆 膜各六桂 桔 白芨 山枇杷葉 生剉 一百草霜

各一骨碎補去毛研末 細竹 南星 煥 赤芍

何首烏 白欽 各十 知 草烏 姜汁煮 各一兩

冷水茶水調攢紙上於痛處貼之三日一洗換貼

打撲及刀刃傷 肉破青腫急用未經水葱搗爛炒乘

热傷處冷即換指爪搘破煨葱乘熱貼冷再換

一方 治傷損筋骨腫痛 草烏三個去皮尖搗羅麵貝母

南星各半黃丹二右為末姜汁調如潮熱茶清調貼
皮破見血者去草烏

止痛法

白礬為末每用一匙沸湯一碗衝了以手怕蘸

熱尉傷處少時痛止然後用貼藥

接骨丹南星四木別三兩去壳桂一乳五右為末生姜一片
去皮搗汁入米醋少許白麪糊調藥攤紙上貼傷處以帛
縛之麻皮纏之

追毒散

白礬雄黃等為末乾擦或油調塗

治腦骨破及骨折

葱白研和蜜厚封損處立瘥

治因傷血出不正

大黃燒存性為末傳蠅牛合加石楠葉心葉

尤妙忌鳥魚骨韭窩苣菜
治打撲瘀血流注紫黑 太黃末姜汁調塗一宿黑者紫
二宿即白

接骨散

治從高墜下筋斷骨碎痛不可忍

明砂七分半一定粉

白朮各五右為末前蘇木湯調一二

錢服如病在上先喫淡粥半碗

服藥別作糯米粥入

藥末和勻攢紙上裹傷處

當歸散

治打撲傷損皮肉破筋骨斷瘀血壅滯結腫

不散或作癰疽疼痛甚及傷後中風手足痺痺

澤蘭

白朮續各十芍芷芎桂白楊皮

不生用亦可

細各五

川烏

川椒各三桔

甘各四

右芍末熱酒調下

匂氣散

凡傷重先用此藥調氣然後服損藥

苗青朴芷烏藥杏去皮尖半兩陳蘖前桔

蒼甘各一右每服二錢姜三片棗一枝煎空心服

兩

陳蘖前桔

桔

桔

大承氣湯傷損極重二便不通者方服此可加木通如未通加朴硝候二便通服損藥云云不可用酒蒸愈不通

夕

セ

加朴硝

候二便通

服損藥

云云不可用酒蒸愈不通

未通加朴硝候二便通

服此可加木通如

未通加朴硝候二便通

如

矣然亦須量入肌弱用孕婦小兒莫服大枳各四芑

未通加朴硝候二便通

服此可加木通如

未通加朴硝候二便通

服此可加木通如

未通加朴硝候二便通

服此可加木通如

未通加朴硝候二便通

如

甘陳紅白蘇木通各二

少許

右水煎專治傷

少許

右水煎專治傷

少許

右水煎專治傷

少許

如

重瘀血不散腹心悶急

將此藥通下瘀血不散腹脹二便不通上攻心腹

陰紅湯治婦人傷損瘀血不散腹脹二便不通上攻心腹

陰紅湯治婦人傷損瘀血不散腹脹二便不通上攻心腹

陰紅湯治婦人傷損瘀血不散腹脹二便不通上攻心腹

陰紅湯治婦人傷損瘀血不散腹脹二便不通上攻心腹

陰紅湯治婦人傷損瘀血不散腹脹二便不通上攻心腹

陰紅湯治婦人傷損瘀血不散腹脹二便不通上攻心腹

如

閼亂急將此藥通下瘀血後服蘿藥產婦油髮燒

鹿角膠各一沒少許右為末溫酒調服

鹿角膠各一沒少許右為末溫酒調服

鹿角膠各一沒少許右為末溫酒調服

鹿角膠各一沒少許右為末溫酒調服

鹿角膠各一沒少許右為末溫酒調服

鹿角膠各一沒少許右為末溫酒調服

鹿角膠各一沒少許右為末溫酒調服

如

止痛當歸散治打撲損傷腫痛不可忍米殼去蒂蕷

止痛當歸散治打撲損傷腫痛不可忍米殼去蒂蕷

止痛當歸散治打撲損傷腫痛不可忍米殼去蒂蕷

止痛當歸散治打撲損傷腫痛不可忍米殼去蒂蕷

止痛當歸散治打撲損傷腫痛不可忍米殼去蒂蕷

止痛當歸散治打撲損傷腫痛不可忍米殼去蒂蕷

止痛當歸散治打撲損傷腫痛不可忍米殼去蒂蕷

止痛當歸散治打撲損傷腫痛不可忍米殼去蒂蕷

如

復元活血湯治墜惡血流於腋下疼痛不可忍

桃仁去皮尖右二貼水一盞半酒半盞同煎至八分五更平

明溫服得利為度利後痛未盡更服

當歸導滯散治墜打壓述腫滿疼痛一大白坂尾半

當歸導滯散治墜打壓述腫滿疼痛一大白坂尾半

當歸導滯散治墜打壓述腫滿疼痛一大白坂尾半

當歸導滯散治墜打壓述腫滿疼痛一大白坂尾半

當歸導滯散治墜打壓述腫滿疼痛一大白坂尾半

如

麝麝等分麝不通用

右為末熱酒調服通利為度

補損當歸散治墜馬落車傷腕折臂服三日筋骨即

相遠神効沃蘭附炮去皮坂炒椒炒甘炙桂各三

分

分

分

分

如

沒藥乳香散治打撲傷損痛不可忍

术炒二兩半坂培

分

分

分

分

分

分

如

甘炙芷沒乳桂各五右為末溫酒下

分

分

分

分

分

分

分

如

甘炙芷沒乳桂各五右為末溫酒下

分

分

分

分

分

分

分

如

雙鳥散

治打撲時痛及肉損者

川烏 連烏並炮各三兩

○

飯 白芍 蘇木 大黃 生地 紅 麵 炒各五兩 麻蔚少許 右為末。酒煮一盞放令服如覺麻痺無害但二鳥生用雖好恐太猛故炮之去皮臍用也。

一方 治頭撲傷損瘀血者留經絡成痼疾右為末 薄切瓦上焙乾為末溫酒或鹽湯調三錢服雖十年積血亦可下。

接骨良方

乳香五

燒過人骨一兩男用女用

飛羅麵三兩端骨女用男骨

半錢

老黃、茄種

右為末用無根水丸如梧子大每服三十丸好酒送下。

益母膏

治折傷肉損有瘀血遇天陰痛方見婦

○傳元戎接骨丹

沒

乳 飯 椒

自然銅火煅

骨碎補

酒

赤芍

敗龜板炙

虎腎骨

芷

千金藤

醋淬骨

酒

○

大黃一兩 杏二十粒 去皮去核右酒煎去粗鷄鳴時服至曉必下瘀血即愈此方用杏而不用桃者蓋跌乃血入氣分故用杏以行氣中血

一方加龍骨芎

雞鳴散

治從高墜下及木石所壓瘀血凝積不可忍

大黃一兩 杏二十粒 去皮去核右酒煎去粗鷄鳴時服至曉必下瘀血即愈此方用杏而不用桃者蓋跌乃血入氣分故用杏以行氣中血

一方加龍骨芎

鷄鳴散

治打

傷血聚皮不破

蘿蔔研爛盦之

治杖瘡及湯火惡瘡不生

膚肉者

黃蠟四兩

清油一斤先

味煎三五沸次入黃丹一兩再煎五七沸候冷入乳

沒末各五

攪勻成膏厚紙貼患處

○金瘡出溢過多

四物加參芪

兵刃器傷血出者，必渴，不可與水，只食乾肥膩之物，不妨，如食薄粥，則血沸而出，必死。

○林禁殼耳飲子 治棒瘡刀刃傷疼痛，不可忍。

防風 南星 湯洗等分 右姜一片水酒煎食，遠服。

金瘡腸出飲入之 磁石 滑石 各二兩 為末米飲調方

寸七日三服

治金瘡未愈而交攢，血出不正 婦人衣帶二十寸燒末水調服

治箭頭在骨內不出者 大雄鼠一枚取精肉薄片焙為末，每服一錢熱酒下。若覺箭瘡癢，不挾忍痒，少時箭頭自出。

治金瘡弓弩箭前中悶絕無所識 琥珀 研碎 童便調服

刺被毒箭後，搗藍青絞汁飲，并傳瘡上，如無藍可瀉青布絞汁飲之。

龍骨膏 治金瘡，龍骨 海螵蛸 五倍 赤石脂

黃丹 煅各等分

右各研細入麝少許，先鹽水洗，搗乾，傳

一方 治金瘡止痛止血，連根等研末付。

又大黃燒存性末付，又紫蘇一味末付之，又龍骨黃柏，

破血丹 治金瘡止血止痛 天花粉 三兩 姜黃 各一兩

赤芍 二兩 右為末少許乾摻於患處，或蜜調塗。

黃丹散 治金瘡并一切惡瘡 黃丹 軟石膏 煅通紅等分

右為末，掺傷處甚妙。

治金瘡，人膽汁敷患處極妙，不可再用他藥，傷益爛如先已敷他藥，亦不可用此。

治金瘡止痛，桑紫灰研傳佳。

治金瘡血不止，兼痛，鱗鷄末傳之立止。又方紫檀末傳之。

一方 治金瘡止盜 石灰炒和雞子白如彈子，大炭煅赤

搗末傅瘡上。

又 石灰同韭菜搗陰乾為末，摻之縛定，痛血皆止。

又 此血止痛，白芍藥末傅之即止。

○惠金瘡出血急，以石灰厚付裏衣之，瘡深不宜速合者，加滑石末付之。又 韭根木皮為末，付之。又用松香加琥珀末付之。又 蒜花或綿花或紙灰填瘡口，血止不

臘 又 驚苧葉或荳葉揉付冬乾，首付之。

○林箭鏃及針力不出，鼠肝及腦傳之。

○瀉三十五度，箭頭自出。又象牙屑水和傳上，即出。

段藥散

治刀箭前傷止血定痛。

胡粉

石灰各一

枯凡 三 乳香 段藥 各一 右為末，傅乳 分一

出箭鏃頭方 蟾娘 乳 各等

麝為末，機動摻之。

治箭頭入骨，不可拔者，巴

半 小

蟬娘

許右同研傳傷處，微

痒不忍即撼動，拔之以黃連，貯衆洗以牛膝製石灰傳之。

治竹木刺，在肉中不出，生牛膝莖搗塗之，即出。

又以頭垢塗之。又搗蟬蟲傳之。

又白梅肉傅之。又白茅根燒末，脂膏和塗之。

又以鼠腦厚塗。

湯火傷神效，當歸膏。

治湯火傷赤疼，痛腐化成

膿，當歸，黃蠟各一，麻油四兩先將油煎令當歸焦黑。

去滓入蠟急攬之，放冷入甕，內每服每日故帛擣。

貼之、自礮為主。

赤石脂散

治湯火所傷赤爛熱疼一赤石

寒水

大黃等分為末，新水調塗

一方 治湯火傷神妙

草麻子

蛤蚧等分為末，湯搊油調

火傷水調塗

又蛤蜊

殼燒

為末油

調塗

湯火灼成瘡

柳枝燒灰

以粉

塗之

又石灰水和塗

治湯火灼爛

竹中虫艸

末傳之

治湯火瘡

水煎膠

令稀稠

待冷塗之

一方 薙與蜜

搗塗

又單傳

濕牛屎

痛立已

一方 杵生胡麻如泥厚塗之

驗○黃蘚散 治湯火傷

柏大

朴硝

雞子殼

寒水石 右等分為末水調塗

○林治中熱油燒痛以白蜜塗之

○治熱油及湯火燒瘡痛不可忍 石膏末傳瘡上

治中熱油及火燒瘡

榆白皮末

猪脂前塗

治瘴瘡多時不癒

痒痛

出黃水

槲葉或根皮

為末付

太咬傷不可便貼膏藥及生肌散之類

謂毒不出也

先用

導水丸禹功散渴十餘行即時減腫然後敷貼之木香換

柳丸亦可下

導水丸 大芩各一丑

渭各二

右為末水丸

白湯下

禹功散

丑四兩

茴炒一或加木

兩右為末姜汁調服

定風散

治犬咬毒氣入腹嘔

不下食頭痛

星生

禹功散

治犬咬毒氣入腹嘔

不下食頭痛

防風等右為末摻或南星洗 防風去
姜汁酒調服童

便更佳又姜煎入酒服可

狗咬瘡卒無藥

用葱搗爛貼之 又牛糞塗之

一方嚼杏仁傳

又百草霜末油調付

又鼠矢末油調塗

治犬傷腫肉色黃爛

草麻子粒五十去殼研成膏

先以鹽水洗次以此膏貼

人口咬者亦用此方

一方治顛犬所傷或經久後發

雄五

麝少右研勻

用酒調一錢服必得睡切勿驚起

自醒利下惡物再進一服

治顛犬咬

韭菜根搗汁多服

又灸傷處三五壯

又膽礬石為末貼瘡上

治狗咬 桃白皮一搗水煎服

一方枯礬妙

又方 梔子皮

燒末石硫黃等為末傳目二三度

治鼠咬

麝香末津調塗

治犬咬人發狂 虎牙

虎頭骨末酒服方寸匕

治貓咬 捣薄荷汁塗之

治犬咬凡初被傷用針排起咬處皮輕輕剪刀去捏出少血

即愈慎勿妄用雄黃傳瘡恐毒氣不泄攻內仍服後藥

芷 細各五

雄各右為末入麝少許酒調服

一方名灵脂散 治蛇毒及一切虫傷

五靈酒洗去沙雄五石乾一兩大細研入

右為末酒調服

又為末傳

又龍腦薄荷研汁溫酒

調服又塗傷處露中心出毒氣

又細礬雄研入

麝少許酒調服

治蛇毒及惡犬傷

虎礬研

解毒散 治毒蛇傷人眼黑口噤手足強直

白礬研甘等分為末冷水調下

○全毒蛇齧人急掘地坑埋處，堅禁其上毒即入土中痛止

○中蛇毒勿渡水，渡水則痛甚。

○蛇入人竅急用刀割尾挾辛辣物用絲綽定自出不可拔
辟蛇法 雄黃成塊秤五兩帶之入山則諸蛇不敢近

○蛇傷取大糞異塗 又灸咬處或付朱砂

○馬咬用栗子嚼傳 又燒灰油調付可

○人咬龜板燒灰末油調塗

○蜈蚣傷香油點燈火吹滅以烟薰傷處不痛即愈

○又用鷄糞異塗 又用雄黃搽

○一方用雞冠血塗 又巴豆一粒研豬脂和塗

○又用頭垢傳 又梨葉菖根研汁塗

○又嚼鹽傳之止痛 又鹽湯浸瘡妙

○凡蛇虺蜈蚣咬傷灸二十五壯拔去毒處

○凡一切虫獸咬傷腫毒及杖瘡燐發或透入裏者宜先

○用導水丸禹功散或木香換榔丸下之

○治蛇蜂蠍蟲傷雄黃末水調敷仍酒調服諸虫傷用之

○治蜂救火人 蜂房末猪骨和傳蜂房煎湯洗亦可

○治蜘蛛瘡 用清油擦之 又蜂毒芋葉汁妙

○治蚯蚓咬其形如大風眉須皆落以石灰水浸身

○治壁虱一燒一於床下其虫自死

○駢蚊蚋壁虱一蒼耳木別雄各二右煉蜜丸如彈子大床

○下燒一丸或於蚊合時當門燒之

薰蚊子アブ 香附カクホ 茼蒿シラカバ 雄オニ

芩キン 附ツバキ 苍カヤウ 雄オニ

樟腦シナモン 各半ハーフ 右為末スル 入雄黃オニロウ

樟腦重羅臨卧時略焙令燥シナモンウツラリムコトヒヨクヘイヨウシテ

兩ツバメ

右スル

為末スル 入雄黃オニロウ

辟蚊子アブ 木別モツベツ 苓キン 各一雄ハーフ

兩ツバメ

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

治頭上風子アフタ 梨芦末摻髮中經宿虱子カシラ 皆死スル

兩ツバメ

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

治骨鰐入喉カツシテウツク 縮甘クシクガム 等ドコロ 為末綿裹ウツクシ 嘴之ウツクシ 又含水獺骨即下スル

分スル

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

一方野芋根搗丸噙之ノウイチジンツクシテ 又含水獺骨即下スル

分スル

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

又鯉魚鱗皮燒末水服未出更服スル

分スル

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

又鹿角末含之スル 嘸津カツヅ 又瞿麥末服方寸ハーフ

分スル

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

又以魚骨於頭上立即愈スル 用狗涎頓服為主スル

分スル

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

鷦鷯サザエ 云骨即下スル 云云スル

分スル

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

漆瘡用貢仲煎湯洗之スル 又用磨力石上泥塗之スル

分スル

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

又以韭葉研傳之スル 又以湯溶芒硝令濃搽之スル

分スル

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

又取薄荷葉一水斗スル 煎取五升洗瘡即止スル

分スル

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

又用莧菜煎湯洗之スル 又用白礬煎湯浸洗スル

分スル

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

又用松木煎湯洗スル 又用芥菜葉煎湯

分スル

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

又用糯米生朱付立効スル

分スル

蜜丸ミツガム

如皇子大燒辟惡虫ノコヒノタケル

兩ツバメ

右スル

